



(19) 대한민국특허청(KR)
(12) 공개특허공보(A)

(11) 공개번호 10-2024-0059256
(43) 공개일자 2024년05월07일

(51) 국제특허분류(Int. Cl.)

A61K 31/19 (2006.01) A23L 33/10 (2022.01)

A61P 27/16 (2006.01)

(52) CPC특허분류

A61K 31/19 (2013.01)

A23L 33/10 (2022.01)

(21) 출원번호 10-2022-0140306

(22) 출원일자 2022년10월27일

심사청구일자 2022년10월27일

(71) 출원인

고려대학교 산학협력단

서울특별시 성북구 안암로 145, 고려대학교 (안암동5가)

(72) 발명자

최준

경기도 안산시 단원구 광덕동로 26, 111동 1002호(고잔동, 푸르지오1차아파트)

이상현

서울특별시 동대문구 답십리로56길 105, 104동 1302호(답십리동, 답십리파크자이)

(뒷면에 계속)

(74) 대리인

특허법인태백


전체 청구항 수 : 총 6 항

(54) 발명의 명칭 암모늄 락테이트를 유효성분으로 포함하는 난청 예방 또는 치료용 약학 조성물

(57) 요약

본 발명은 암모늄 락테이트를 유효성분으로 포함하는 난청 예방 또는 치료용 약학 조성물에 관한 것으로서, 젠타마이신에 의해 손상된 유모세포에 암모늄 락테이트를 처리하여 정상 유모세포의 개수가 증가함을 확인하여, 암모늄 락테이트를 유효성분으로 포함하는 약학조성물은 항생제인 암모늄 락테이트를 사용함에 따른 부작용 난청을 예방 또는 치료하는데 활용될 수 있다.

대표도 - 도3



(52) CPC특허분류

A61P 27/16 (2018.01)

A23V 2002/00 (2023.08)

A23V 2200/30 (2013.01)

A23V 2250/30 (2013.01)

(72) 발명자

한은정

대구광역시 달서구 선원로 241, 103동 1206호(용산동, 성서2차보성타운)

박새미

경기도 안산시 단원구 안산천남로 245, 910동 104호(고잔동, 주공그린빌)

조유지

경기도 안산시 단원구 도일로 60-34, 406동 1001호(신길동, 휴먼시아)

최윤재

서울특별시 동대문구 약령사로 11-1, 303호(제기동)

명세서

청구범위

청구항 1

암모늄 락테이트(ammonium lactate)를 유효성분으로 포함하는 난청 예방 또는 치료용 약학 조성물.

청구항 2

청구항 1에 있어서,

상기 난청은 이독성 난청, 돌발성 난청, 소음성 난청 및 노화성 난청으로 이루어진 군에서 하나 이상인 것을 특징으로 하는 약학 조성물.

청구항 3

청구항 2에 있어서,

상기 이독성 난청은 항암제 또는 아미노글루코시드계 항생제에 의한 난청인 것을 특징으로 하는 약학 조성물.

청구항 4

청구항 3에 있어서,

상기 항암제는 시스플라틴(cisplatin) 또는 카르보플라틴(carboplatin)인 것을 특징으로 하는 약학 조성물.

청구항 5

청구항 3에 있어서,

상기 아미노글루코시드계 항생제는 아미카신(amikacin), 아르베카신(arbekacin), 카나마이신(kanamycin), 겐타마이신(gentamicin), 네오마이신(neomycin), 네틸마이신(netilmicin), 디베카신(dibekacin), 시소마이신(sisomicin), 스트렙토마이신(streptomycin), 토브라마이신(tobramycin), 리보도마이신(livodomylin) 및 파로모마이신(paromomycin)으로 이루어진 군에서 선택되는 하나 이상인 것을 특징으로 하는 약학조성물.

청구항 6

암모늄 락테이트(ammonium lactate)를 유효성분으로 포함하는 난청 예방 또는 개선용 건강기능식품 조성물.

발명의 설명

기술 분야

[0001] 본 발명은 암모늄 락테이트를 유효성분으로 포함하는 난청 예방 또는 치료용 약학 조성물을 제공한다.

배경 기술

[0002] 겐타마이신(gentamycin)은 오랫동안 우수한 항생제로 널리 사용되며 미국식품의약청(Food and Drug Administration)으로부터 허가를 받은 약물이다. 미크로모노스포라 푸르프레아(micromonospora purpurea) 및 미크로모노스포라 에키노스포라(micromonospora echinospora)가 생산하는 아미노 글루코시드 계열의 항생물질로, 겐타마이신 C1, C2, C1a의 혼합물이다. 그람양성균 중 포도상구균과 그람음성균 중 대장균 살모넬라균 및 변형균 녹농균 등에 효과가 있다. 겐타마이신은 페니실린이나 암피실린(ampicillin)과 함께 장내구균성 심내막염의 치료에도 사용된다. 비경구적인 방법으로 투여하거나 외용제로 많이 사용된다.

[0003] 최근 연구 발표에 의하면 겐타마이신은 항생제 투여를 통하여 약효를 볼 수 있는 뒤센형 근위축증의 진전을 완전히 차단할 수 있다고 한다. 다만, 부작용으로 영구적인 청각 상실과 신장 손상 등이 대표적인 것으로 알려져 있다.

[0004] 이독성 난청은 이독성 약물의 사용으로 인해 발생하는 부작용으로서, 아미노글리코사이드(aminoglycoside) 항생

제 및 일부 항암제 등이 이독성을 유발하는 것으로 알려져 있다. 아미노글리코사이드 항생제는 박테리아 30s 리보솜 서브유닛에 결합하여 단백 합성을 억제함으로써 항균작용을 나타내며, 이러한 아미노글리코사이드 항생제가 와우각 세포(cochlear cell)에 지속적으로 노출되면 코르티(corti) 기관의 외유모세포(outer hair cell)와 유모세포(sensory hair cell)가 사멸(apoptosis)하게 된다. 사멸 기전은 아미노글리코사이드 항생제와 Ca^{++} 복합체가 형성하는 반응성 활성 산소종(ROS)에 의한 것으로 알려져 있다.

[0005] 현재까지 개발되어 임상시험이 진행 중인 이독성 난청 보호 약물 대부분은 활성산소 차단을 기전으로 하고 있다. 활성산소 차단 기전의 약물은 강력한 친핵체를 가지고 있어 항생제와 착화합물을 형성하여 활성산소의 생성을 억제하는 효능을 가지고 있으나 항생제 효과 또한 이로 인하여 저하되며, 비특이적 기작으로 인하여 그 효과가 미미하다는 근본적 한계를 가지고 있다.

[0006] 따라서, 항생제의 효과가 저해되지 않고 이독성 난청에 대한 치료 효과가 있는 치료제의 개발이 필요한 실정이다.

선행기술문헌

비특허문헌

[0007] (비특허문헌 0001) 1. Journal of the American Academy of Dermatology Volume 26, Issue 4, April 1992, Pages 535-544

발명의 내용

해결하려는 과제

[0008] 본 발명의 목적은 암모늄 락테이트(ammonium lactate)를 유효성분으로 포함하는 난청 예방 또는 치료용 약학 조성물을 제공하는 데에 있다.

[0009] 본 발명의 또 다른 목적은 암모늄 락테이트(ammonium lactate)를 유효성분으로 포함하는 난청 예방 또는 개선용 건강기능식품 조성물을 제공하는 데에 있다.

과제의 해결 수단

[0010] 상기 목적을 달성하기 위하여, 본 발명은 암모늄 락테이트(ammonium lactate)를 유효성분으로 포함하는 난청 예방 또는 치료용 약학 조성물을 제공한다.

[0011] 또한, 본 발명은 암모늄 락테이트(ammonium lactate)를 유효성분으로 포함하는 난청 예방 또는 개선용 건강기능식품 조성물을 제공한다.

발명의 효과

[0012] 암모늄 락테이트를 유효성분으로 포함하는 난청 예방 또는 치료용 약학 조성물에 관한 것으로서, 젠타마이신에 의해 손상된 유모세포에 암모늄 락테이트를 처리하여 정상 유모세포의 개수가 증가함을 확인하여, 암모늄 락테이트를 유효성분으로 포함하는 약학조성물은 항생제인 암모늄 락테이트를 사용함에 따른 부작용 난청을 예방 또는 치료하는데 활용될 수 있다.

도면의 간단한 설명

[0013] 도 1은 암모늄 락테이트(ammonium lactate)의 분자구조를 나타낸 것이다.

도 2는 암모늄 락테이트(ammonium lactate) 투여에 따른 제브라피쉬의 유모세포의 개수를 확인한 결과이다.

도 3은 암모늄 락테이트(ammonium lactate) 투여에 따른 제브라피쉬의 유모세포의 생존율을 확인한 결과이다.

발명을 실시하기 위한 구체적인 내용

- [0014] 이하, 본 발명을 보다 상세하게 설명한다.
- [0016] 본 발명은 암모늄 락테이트(ammonium lactate)를 유효성분으로 포함하는 난청 예방 또는 치료용 약학 조성물을 제공한다.
- [0017] 상기 난청은 이독성 난청, 돌발성 난청, 소음성 난청 및 노화성 난청으로 이루어진 군에서 하나 이상일 수 있다.
- [0018] 상기 이독성 난청은 항암제 또는 아미노글루코시드계 항생제에 의한 난청일 수 있다.
- [0019] 상기 항암제는 시스플라틴(cisplatin) 또는 카르보플라틴(carboplatin)일 수 있다.
- [0020] 상기 아미노글루코시드계 항생제는 아미카신(amikacin), 아르베카신(arbekacin), 카나마이신(kanamycin), 겐타마이신(gentamicin), 네오마이신(neomycin), 네틸마이신(netilmicin), 디베카신(dibekacin), 시소마이신(sisomicin), 스트렙토마이신(streptomycin), 토브라마이신(tobramycin), 리보도마이신(livodomyacin) 및 파로모마이신(paromomycin)으로 이루어진 군에서 선택될 수 있다.
- [0023] 본 발명의 다른 구체예에서, 약학 조성물은 약학 조성물의 제조에 통상적으로 사용하는 적절한 담체, 부형제, 붕해제, 감미제, 피복제, 팽창제, 윤활제, 활택제, 향미제, 항산화제, 완충액, 정균제, 희석제, 분산제, 계면활성제, 결합제 및 윤활제로 이루어진 군에서 선택되는 하나 이상의 첨가제를 추가로 포함할 수 있다. 구체적으로 담체, 부형제 및 희석제는 락토스, 텍스트로즈, 수크로스, 솔비톨, 만니톨, 자일리톨, 에리스리톨, 말티톨, 전분, 아카시아 고무, 알지네이트, 젤라틴, 칼슘 포스페이트, 칼슘 실리케이트, 셀룰로즈, 메틸 셀룰로즈, 미정질 셀룰로스, 폴리비닐 피롤리돈, 물, 메틸히드록시벤조에이트, 프로필히드록시벤조에이트, 탈크, 마그네슘 스테아레이트 및 광물유를 사용할 수 있으며, 경구투여를 위한 고형제에는 정제, 환제, 산제, 과립제, 캡슐제 등이 포함되며, 이러한 고형제에는 상기 조성물에 적어도 하나 이상의 부형제, 예를 들면, 전분, 칼슘카보네이트, 수크로스 또는 락토오스, 젤라틴 등을 섞어 조제할 수 있다. 또한 단순한 부형제 이외에 마그네슘 스테아레이트, 탈크 같은 윤활제들도 사용할 수 있다. 경구를 위한 액상제제로는 현탁제, 내용액제, 유제, 시럽제 등이 있으며 흔히 사용되는 단순 희석제인 물, 리퀴드 파라핀 이외에 여러 가지 부형제, 예를 들면 습윤제, 감미제, 방향제, 보존제 등이 포함될 수 있다. 비경구 투여를 위한 제제에는 멸균된 수용액, 비수성용제, 현탁제, 유제, 동결건조제, 좌제 등이 포함된다. 비수성용제, 현탁제로는 프로필렌글리콜, 폴리에틸렌 글리콜, 올리브오일과 같은 식물성 기름, 에틸올레이트와 같은 주사 가능한 에스테르 등이 사용될 수 있다. 좌제의 기제로는 위텟솔(witepsol), 마크로골, 트윈(tween) 61, 카카오지, 라우린지, 글리세로스테라틴 등이 사용될 수 있다. 본 발명의 일실시예에 따르면, 상기 약학 조성물은 정맥내, 동맥내, 복강내, 근육내, 동맥내, 복강내, 흉골내, 경피, 비측내, 흡입, 국소, 직장, 경구, 안구내 또는 피내 경로를 통해 통상적인 방식으로 대상체로 투여할 수 있다. 본 발명에 따른 유효성분의 투여량은 대상체의 상태 및 체중, 질환의 종류 및 정도, 약물 형태, 투여경로 및 기간에 따라 달라질 수 있으며 당업자에 의해 적절하게 선택될 수 있고, 1일 투여량이 0.01 mg/kg 내지 200 mg/kg, 바람직하게는 0.1 mg/kg 내지 200 mg/kg, 보다 바람직하게는 0.1 mg/kg 내지 100 mg/kg 일 수 있다. 투여는 하루에 한번 투여할 수도 있고 수회로 나누어 투여할 수도 있으며, 이에 의해 본 발명의 범위가 제한되는 것은 아니다.
- [0025] 또한, 본 발명은 암모늄 락테이트(ammonium lactate)를 유효성분으로 포함하는 난청 예방 또는 개선용 건강기능식품 조성물을 제공한다.
- [0026] 상기 건강기능식품은 여러 가지 영양제, 비타민, 광물 (전해질), 합성 풍미제 및 천연 풍미제 등의 풍미제, 착색제 및 증진제 (치즈, 초콜릿 등), 펙트산 및 그의 염, 알긴산 및 그의 염, 유기산, 보호성 콜로이드 증점제, pH 조절제, 안정화제, 방부제, 글리세린, 알코올, 탄산음료에 사용되는 탄산화제 등을 함유할 수 있다. 그 밖에 천연 과일 주스, 합성 과일 주스 및 야채 음료의 제조를 위한 과육을 함유할 수 있다. 이러한 성분은 독립적으로 또는 조합하여 사용할 수 있다. 또한, 건강기능식품 조성물은 육류, 소세지, 빵, 초콜릿, 캔디류, 스낵류, 과자류, 피자, 라면, 껌류, 아이스크림류, 스프, 음료수, 차, 기능수, 드링크제, 알코올 및 비타민 복합제 중 어느 하나의 형태일 수 있다. 또한, 상기 건강기능식품은 식품첨가물을 추가로 포함할 수 있으며, "식품첨가

물"로서의 적합 여부는 다른 규정이 없는 한 식품의약품안전청에 승인된 식품첨가물공전의 총칙 및 일반 시험법에 따라 해당 품목에 관한 규격 및 기준에 의하여 판정한다. 상기 "식품첨가물공전"에 수재된 품목으로 예를 들어, 케톤류, 글리신, 구연산칼륨, 니코틴산, 계피산 등의 화학적 합성품, 감색소, 감초추출물, 결정셀룰로오스, 고랭색소, 구아검 등의 천연첨가물, L-글루타민산나트륨 제제, 면류 첨가 알칼리제, 보존료제제, 타르색소 제제 등의 혼합 제제류 등을 들 수 있다. 이때, 건강기능식품을 제조하는 과정에서 식품에 첨가되는 유효성분은 필요에 따라 그 함량을 적절히 가감할 수 있으며, 바람직하게는 식품 100 중량부에 1 중량부 내지 90 중량부 포함되도록 첨가될 수 있다.

[0028] 이하, 본 발명의 이해를 돕기 위하여 실시예 등을 들어 상세하게 설명하기로 한다. 다만 하기의 실시예 등은 본 발명의 내용을 예시하는 것일 뿐 본 발명의 범위가 하기 실시예 등에 한정되는 것은 아니다. 본 발명의 실시예 등은 당업계에서 평균적인 지식을 가진 자에게 본 발명을 보다 완전하게 설명하기 위해 제공되는 것이다.

[0030] <실험 예 1> 제브라피쉬 사육

[0031] 제브라피쉬 유생(Wild type, Brn3c:EGFP 등)을 본 연구기관의 사육실에서 배양하였다. 각각의 유생은 embryo 배지에서 배양(15mM NaCl, 0.5mM KCl, 1mM CaCl₂, 1mM MgSO₄, 0.15mM KH₂PO₄, 0.05mM NH₂PO₄ 및 0.7mM NaHCO₃)하였다.

[0033] <실험 예 2> 제브라피쉬의 유모세포(hair cell) 분석

[0034] 수정 후 5일경 된 제브라피쉬에 이독성 유발물질인 젠타마이신을 투여하여 제브라피쉬의 측선(lateral line)의 유모세포(hair cell)의 손상을 50% 정도 유발하는 시스플라틴의 농도(LC 50)와 시간을 산정하였다. 연구 결과에서 젠타마이신 50 μ M, 1시간 투여시에 유모세포의 50% 정도가 손상되어 이를 선택하였다. 이에 암모늄 락테이트를 10 μ M, 100 μ M, 500 μ M 및 1000 μ M을 젠타마이신 50 μ M에 1시간 동시에 투여하였을시에 그 효과를 확인할 수 있었다.

[0035] 제브라피쉬의 유모세포의 위치는 안와(S01 and S02), 귀(O1) 및 후두(OC1)의 4곳으로, 유모세포의 개수를 현미경(형광현미경, Confocal 현미경 등)을 통하여 분석하였다. 젠타마이신에 의한 유모세포의 손상을 억제할 수 있는 후보물질을 농도를 달리하여 제브라피쉬 유생에 투여하여 그 효과를 비교 분석하였다.

[0037] <실시 예 1> 암모늄 락테이트의 제브라피쉬 유모세포 보호 효과 검증

[0038] 암모늄 락테이트의 제브라피쉬 유모세포 보호 효과를 검증하기 위해 제브라피쉬에 암모늄 락테이트와 젠타마이신을 함께 투여하여 대조군과 유모세포의 생존율을 비교하였다.

[0039] 그 결과, 도 2 및 도 3에 따르면, 아무것도 처리하지 않은 대조군의 유모세포의 수는 53개였으며, 암모늄 락테이트를 투여하지 않고 젠타마이신만 50 μ M 투여한 대조군의 경우 유모세포가 26개로 생존율이 50% 감소하였으나, 이후 암모늄 락테이트를 10 μ M, 100 μ M, 500 μ M 및 1000 μ M을 젠타마이신 50 μ M과 함께 투여한 군에서는 농도의존적으로 유모세포의 생존율이 증가함을 확인할 수 있었다. 특히, 암모늄 락테이트 100 μ M 및 500 μ M의 경우 유모세포가 28개 및 29개로 생존율이 약 10% 증가한 반면, 암모늄 락테이트 1000 μ M의 경우 유모세포가 총 42개로 생존율이 60% 이상 증가함을 확인하였다.

[0040] 따라서, 암모늄 락테이트가 유모세포의 보호 효과가 있음을 확인할 수 있었다.


[0042] 진술한 본 발명의 설명은 예시를 위한 것이며, 본 발명이 속하는 기술 분야의 통상의 지식을 가진 자는 본 발명의 기술적 사상이나 필수적인 특징을 변경하지 않고서 다른 구체적인 형태로 쉽게 변형이 가능하다는 것을 이해할 수 있을 것이다. 그러므로 이상에서 기술한 실시예들은 모든 면에서 예시적인 것이며 한정적이 아닌 것으로 이해해야만 한다.

[0043] 본 발명의 범위는 후술하는 청구범위에 의하여 나타내어지며, 청구범위의 의미 및 범위 그리고 그 균등 개념으


로부터 도출되는 모든 변경 또는 변형된 형태가 본 발명의 범위에 포함되는 것으로 해석되어야 한다.

도면

도면1



도면2



도면3

