



(12)发明专利申请

(10)申请公布号 CN 109965911 A

(43)申请公布日 2019.07.05

(21)申请号 201910305765.9

(22)申请日 2019.04.16

(71)申请人 绍兴锦斌生物科技有限公司

地址 312300 浙江省绍兴市上虞区百官街
道广场新村半山路154#营业房

(72)发明人 傅惠明

(74)专利代理机构 杭州橙知果专利代理事务所
(特殊普通合伙) 33261

代理人 朱孔妙

(51)Int.Cl.

A61B 10/00(2006.01)

A61K 36/896(2006.01)

A61P 19/02(2006.01)

A61P 29/00(2006.01)

权利要求书1页 说明书10页

(54)发明名称

一种振挺敲打液及其制备方法

(57)摘要

本发明涉及医药领域,提供了一种振挺敲打液及其制备方法,振挺敲打液为虎刺全草、兔儿伞根、肺筋草根等十七种药材浸入白酒中制成,本发明将古老的医术为当代服务,采用十七种常见药材制作成振挺敲打液,十七种药材的药性相辅相成,可直观显示痹症(风湿病)病灶,及时诊断出肩颈腰腿痛疾病的病灶位置并对其进行治疗,用法简单,效果良好。

1. 一种振槌敲打液,其特征在于,包括下述质量份的组分:

虎刺全草10-60份、兔儿伞根10-60份、肺筋草根20-120份、透骨草(剪草)10-60份、白接骨根8-50份、牛郎花根2-20份、刺茎樛木根10-60份、树参根40-280份、落新妇根20-120份、野蛟子草20-280份、柘根40-280根、八角枫根2-20份、支柱蓼根10-60份、及己根2-15份、蒴藋根10-60份、红茴香根4-30份、紫花景天全草10-100份,白酒2000-3000份;所述白酒的度数为41-85度。

2. 根据权利要求1所述的一种振槌敲打液,其特征在于,包括下述质量份的组分:

虎刺全草15份、兔儿伞根15份、肺筋草根35份、透骨草(剪草)15份、白接骨根12份、牛郎花根4份、刺茎樛木根15份、树参根70份、落新妇根30份、野蛟子草70份、柘根70根、八角枫根4份、支柱蓼根15份、及己根2份、蒴藋根15份、红茴香根7份、紫花景天全草20份,白酒2000-3000份;所述白酒的度数为41-85度。

3. 根据权利要求1或2所述的一种振槌敲打液,其特征在于,所述白酒的度数为60-70度。

4. 根据权利要求1或2所述的一种振槌敲打液,其特征在于,所述振槌敲打液可通过喷雾或涂抹方式使用。

5. 根据权利要求1或2所述的一种振槌敲打液,其特征在于,所述振槌敲打液涂抹在病灶处后,可配合棒状工具拍打或徒手拍打,以增加病灶处对振槌敲打液的吸收速率。

6. 一种振槌敲打液的制备方法,其特征在于,包括以下步骤:

S1、将虎刺全草、兔儿伞根、肺筋草根、透骨草(剪草)、白接骨根、牛郎花根、刺茎樛木根、树参根、落新妇根、野蛟子草,柘根、八角枫根、支柱蓼根、及己根、蒴藋根、红茴香根全部晒干;

S2、将步骤S1中晒干的药材全部打粉;

S3、将步骤S2中全部的粉状药材放入白酒中;

S4、将紫花景天全草过开水烫一下,使之体积减小;

S5、将紫花景天全草晒至半干;

S6、将紫花景天全草放入步骤S3中的白酒中;

S7、将所有药材在白酒中浸泡20-90天;

S8、过滤药材后得到药液。

7. 根据权利要求6所述的一种振槌敲打液的制备方法,其特征在于,所述步骤S7前还有步骤P1,步骤P1为,前三天每天搅拌药材1-10分钟。

8. 根据权利要求6或7所述的一种振槌敲打液的制备方法,其特征在于,所述步骤S8后还有步骤P2,步骤P2为,将药液静置48小时以上,去除底部残渣,取上清液。

9. 根据权利要求6或7所述的一种振槌敲打液的制备方法,其特征在于,所述步骤P2后还有步骤P3,步骤P3为,将步骤P2中的上清液用紫外线杀菌,得到杀菌后的药液。

10. 根据权利要求6所述的一种振槌敲打液的制备方法,其特征在于,所述步骤S7中,所有药材在白酒中浸泡25-35天。

一种振挺敲打液及其制备方法

技术领域

[0001] 本发明属于医药领域,涉及痹症治疗和显示病灶的振挺敲打液,特别涉及一种振挺敲打液及其制备方法。

背景技术

[0002] 痹,即痹阻不通。痹症是指人体肌表、经络因感受风、寒、湿、热等引起的以肢体关节及肌肉酸痛、麻木、重着、屈伸不利,甚或关节肿大灼热等为主症的一类病证。临床上有渐进性或反复发作性的特点。主要病机是气血痹阻不通,筋脉关节失于濡养所致。古代痹证的概念比较广泛,包括内脏痹和肢体痹,肢体的痹症,包括现代医学的风湿热(风湿性关节炎)、类风湿性关节炎、骨性关节炎、痛风等,主要表现为颈肩腰腿疼,也是普通的常见病,大多数家庭都 有人患有该病,只是轻重不同而已,目前对该病诊疗的工具很多,但是普遍用 费昂贵,仪器检查使用麻烦,需要专业人员使用,还不能当场显示出病灶的位置,有时候需要病人来回几次去医院检查病灶位置,加上其他的化验参与诊断,由于医生技术参差不齐,导致误诊率高。因此,需要一种简单、有效的显示病灶及治疗病症的方法。

发明内容

[0003] 本发明的目的是针对现有技术中存在的上述问题,提供了一种振挺敲打液。可当场及时地显示出颈肩腰腿疼的病灶位置,并对其进行诊断治疗。治疗方法 应与痹症振挺敲打棒配合使用。振挺,即木棒也,长尺半、园如钱大、或面杖 亦可。盖受伤之处,气血凝结、疼痛肿硬,用此挺微微振击其上下四旁,使气血流通,得以四散,则疼痛渐减肿硬渐消。为了实现上述目的,本发明提供的 痹症振挺敲打液,采用民间常用的中草药配制而成。

[0004] 本发明的目的可通过下列技术方案来实现:一种振挺敲打液,包括下述质量份的组分:

[0005] 虎刺全草10-60份、兔儿伞根10-60份、肺筋草根20-120份、透骨草(剪草)10-60份、白接骨根8-50份、牛郎花根2-20份、刺茎樛木根10-60份、树参根40-280份、落新妇根20-120份、野蛟子草20-280份、柘根40-280根、八角枫根2-20份、支柱蓼根10-60份、及己根2-15份、蒴藋根10-60份、红茴香根4-30份、紫花景天全草10-100份,白酒2000-3000份;所述白酒的度数为41-85度。

[0006] 作为优选,一种振挺敲打液,包括下述质量份的组分:

[0007] 虎刺全草15份、兔儿伞根15份、肺筋草根35份、透骨草(剪草)15份、白接骨根12份、牛郎花根4份、刺茎樛木根15份、树参根70份、落新妇根30份、野蛟子草70份、柘根70根、八角枫根4份、支柱蓼根15份、及己根2份、蒴藋根15份、红茴香根7份、紫花景天全草20份,白酒2000-3000份;所述白酒的度数为41-85度。

[0008] 作为优选,所述白酒的度数为60-70度。

[0009] 作为优选,所述振挺敲打液可通过喷雾或涂抹方式使用。

[0010] 作为优选,所述振挺敲打液涂抹在病灶处后,可配合棒状工具拍打或徒手 拍打,

以增加病灶处对振挺敲打液的吸收速率。

[0011] 一种振挺敲打液的制备方法,包括以下步骤:

[0012] S1、将虎刺全草、兔儿伞根、肺筋草根、透骨草(剪草)、白接骨根、牛郎 花根、刺茎 楸木根、树参根、落新妇根、野蚊子草、柘根、八角枫根、支柱蓼 根、及已根、蒴藋根、红茴香 根全部晒干;

[0013] S2、将步骤S1中晒干的药材全部打粉;

[0014] S3、将步骤S2中全部的粉状药材放入白酒中;

[0015] S4、将紫花景天全草过开水烫一下,使之体积减小;

[0016] S5、将紫花景天全草晒至半干;

[0017] S6、将紫花景天全草放入步骤S3中的白酒中;

[0018] S7、将所有药材在白酒中浸泡20-90天;

[0019] S8、过滤药材后得到药液。

[0020] 作为优选,所述步骤S7前还有步骤P1,步骤P1为,前三天每天搅拌药材 1-10分钟。

[0021] 作为优选,所述步骤S8后还有步骤P2,步骤P2为,将药液静置48小时 以上,去除底部残渣,取上清液。

[0022] 作为优选,所述步骤P2后还有步骤P3,步骤P3为,将步骤P2中的上清 液用紫外线杀菌,得到杀菌后的药液。

[0023] 作为优选,所述步骤S7中,所有药材在白酒中浸泡25-35天。

[0024] 各味草药药性如下:

[0025] 虎刺:又名绣花针、蛇不过、朝天刺、鸟不停

[0026] 形态特征:常绿小灌木,高6寸~2.5尺。根粗大分枝,或壁缩呈念珠状,根皮淡黄色。茎多分枝,有直刺,长3~6分,对生于叶柄间,黄绿色,小枝有 灰黑色细毛。叶对生,卵形或阔椭圆形,长2.5~7分,先端凸尖,表面有光 泽,革质,全缘,叶柄极短。花小,1~2朵生于叶腋,萼筒倒卵形,宿存,花 冠漏斗状,白色,顶端4~5裂。核果球形,熟时红色。4~5月开花,11~12 月果熟。

[0027] 分布和生长环境:生于阴山坡竹木林下和溪谷两旁草灌丛中。

[0028] 采集处理:根或全株全年可采,采后洗净,切碎,晒干备用。

[0029] 性味功效:性平,味甘苦。清热利湿,舒筋活血,祛风止痛。

[0030] 应用:1.急、慢性传染性肝炎:全株或根、海金砂藤、棉茵陈、丹参、风 居草各五钱,红枣二两,水煎服。此方使用4例,均愈。

[0031] 2.坐骨神经痛、关节风痛:全株、楸木各一两,钩藤、桑寄生、锦鸡儿根、卫矛、络石藤各五钱,威灵仙三钱,水煎服。此方使用数十例,均有效。

[0032] 3.跌打损伤:根五钱至一两,用黄酒适量煎服。

[0033] 附注:同属植物中尚有大叶虎刺一种,又名串珠、大虎刺、白老鼠 刺等,和前种的主要区别,在于它的根肥大,质柔软,针刺长仅1分左右。功效和虎 刺相似。另一种大形虎刺根为圆柱形,也有呈念珠状的,叶片阔卵形,长,针 刺长1.5~2.5分。

[0034] 兔儿伞:又名铁雨伞、破阳伞、棱伞、铁阳伞、铁凉伞、破雨伞。

[0035] 形态特征:多年生草本,高2~3尺(或以上),根茎短而匍匐,细根条状,质坚切。茎直立,粉绿色,初有绢毛,略带棕褐色。基生叶有长柄,叶片园形,直径1~2尺,盾状着生,7

~9掌深裂,裂片常2回中裂,小裂片先端锐尖,边缘有锐锯齿,叶片背面灰白色,初有绢毛,茎生叶2~3片稀疏着生,中部叶较小而有短柄,裂片4~5,近花序的时为披针形,无柄。头状花序多数,排列成伞房状,花两性,花冠全为管状,带红色。瘦果圆柱形,有棱线冠毛多数。7~8月开花,9~10月果熟。

[0036] 分布和生长环境:生于向阴山坡、丘陵地杂木林下和山谷草丛中。

[0037] 采集处理:夏、秋季采全草或根供药用。

[0038] 性味功效:性微温,味辛,有小毒。舒筋活血。

[0039] 应用:1.跌打损伤:全草或根捣烂,加烧酒或75%酒精适量,外敷伤处。

[0040] 2.毒蛇咬伤:根捣烂加黄酒适量,外敷伤处。

[0041] 附注:本省民间有将本种当作山荷叶收购使用,二者的主要区别点如下:

[0042] 山荷叶根茎横走,粗壮,有明显的节,叶片浅裂,有细密锯齿:花5~8朵,簇生于叶柄基部交叉处:果为浆果。兔儿伞根茎短而匍匐,叶片7~9掌状深裂,又分小裂片,边缘有稀疏锐齿,花为头状花序,排列成伞房状,生于长花茎顶端,果为瘦果。两者不能混用。

[0043] 肺筋草:又名粉条儿菜、金丝吊自米、鼠牙草、鼠牙半枝。

[0044] 形态特征:多年生草本,根茎短,生丝状根,根上有白色米粒状膨大体。叶多数基生,狭线形,长4~6寸,宽1~1.5分,在花茎上的叶小,呈苞片状。花茎自叶丛间抽出,长1~2尺,具棱角,上部具粘质的短柔毛。花小,成细长疏生穗状花序,苞片线形,花被筒状白色,先端有时带粉红色,外部密被短柔腺毛。蒴果倒卵状椭圆形,顶端残存花被,5~6月开花。

[0045] 分布和生长环境:常生在向阳空旷草地、山坡路边、杂木林缘。

[0046] 采集处理:夏秋季采根或全草,去泥杂,晒干备用。

[0047] 性味功效:性平,味甘。祛风除湿,活血祛瘀,消肿解毒。

[0048] 应用:1.关节风痛:根半两至一两,水煎服。

[0049] 2.跌打损伤:根半两至一两,用米汤炖。

[0050] 透骨草:又名剪草、接骨草。

[0051] 形态特征为:多年草本高9寸到2.4寸,茎直立,四方形,有侧生短毛,节部膨大,叶对生,至卵状长椭圆形,先端尖,基部窄狭成翼,边缘有粗圆锯齿,膜质,两面流生短毛。花排列成顶生和腋生的穗状花序,花开时向上或平展,花后渐向下方,花萼筒状,淡绿色,顶端2唇形,上唇3裂,呈芒状钩,下唇2浅裂,为三角形;花冠粉红色或白色,筒状,顶端5裂,呈2唇形。果为瘦果,外包宿存花萼,6~8月开花,9~10月果熟。

[0052] 分布和生长环境:生于低山坡溪谷两旁阴湿草丛中、稀疏的竹木林下潮湿处、山脚、水沟边。

[0053] 采集处理:夏、秋季采全草或根,晒干备用。

[0054] 性味功效:性凉,味涩。清热利湿,活血消肿。

[0055] 应用:1.骨折:鲜全草、鲜万年青、鲜紫金牛各一两,乳香、没药各一钱,捣烂,整骨后敷伤处,包扎、固定。或全草加野葡萄根、青棉花藤皮、白桑皮各等量,加黄酒适量,捣烂,外敷伤处,包扎固定。

[0056] 2.跌打损伤:全草、土牛膝、念珠藤各三钱,及己一钱,水煎服。

[0057] 白接骨:又名金不换、血见愁、猢猻节根。

[0058] 形态特征:多年生草本,高7寸~1.5尺,基部略匍匐。根茎倾斜或直立,节部膨大,

多肉质而脆,表面白色,富粘液,须根细长。茎直立,有4棱,节 部稍膨大,棱上疏被白色短毛或光滑。叶对生,长卵形,卵状长椭圆形,先端 渐尖基部狭楔形,常下延状花序,至叶柄,边缘有稀疏锯齿,膜质。花排列成 顶生的总状花序,常偏于一侧;花萼钟状,5裂,花冠漏斗状,顶端五裂,呈二 辰形,淡紫红色,蒴果长椭圆形,成熟时二瓣开裂。7~8月开花,9~10月果熟。

[0059] 分布和生长环境:生于低山坡、山谷林下阴湿的石缝内和草丛中、郊野向 北田边、路边和村旁墙脚等处,性喜阴湿、温暖和富含腐植质的土壤。

[0060] 采集处理:夏、秋季采全草或根茎,鲜用或晒干备用。

[0061] 性味功效:性凉,味淡。清热解毒,活血止血。

[0062] 应用:1. 外伤出血:根茎或全草捣烂外敷。

[0063] 2. 扭伤:根茎、黄插子、麦粉各等量加食盐捣烂,包敷伤处。或根,加蒴藋 根等量,捣烂外敷,每天一次。

[0064] 3. 断指再植:鲜全草加食盐捣烂外敷,再包扎固定。每日换药一次。此方治 愈断指2例。

[0065] 附注:据实验报道,切断家兔股动脉后,敷以本种根粉末,三十秒钟即能 止血。

[0066] 牛郎花:又名羊蹄躄、黄牯牛花、黄花杜鹃。

[0067] 形态特征:落叶灌木,高2~5尺幼枝有短柔毛及刚毛,老枝光滑。叶互生, 叶片长椭圆形至倒披针形,先端钝而有短尖头,叶柄短,表面疏生粗毛,背面 被灰色短柔毛,全缘而有睫毛状细齿。花成伞房状花序,着生于小枝顶端,花 冠钟状漏斗形,黄色。蒴果长椭圆形或卵形,表面疏生柔毛。4~5月开花,9~ 10月果熟。

[0068] 分布和生长环境:生于向阳低山坡、丘陵地、干燥山谷灌丛中和低山坡稀 疏的竹木林下与林缘。

[0069] 采集处理:根全年可采洗净切片,晒干用。花4~5月盛开时采收,鲜用或 阴干备用。

[0070] 性味功效:性热,味辛,有大毒。驱风祛湿,经活血,杀虫止痛。孕妇忌 服。

[0071] 应用:1. 坐骨神经痛:根一钱(去外皮),土膝二两,威灵仙、六月霜根各 一两,水煎冲黄酒服。

[0072] 2. 跌打损伤、关节风痛:侧根一钱,土牛膝二两、六月霜根一两,血藤、自 茅根各三至四钱,水煎服。

[0073] 附注:本品花含根木毒素和另一有毒中性物质。根木毒素为痉挛毒对循环 及呼吸均有抑制作用。闹羊花的花和果有一定的镇痛效力,果尤佳。

[0074] 刺茎楸木:又名红毛刺桐、鸟不踏、鸟不栖、红千枚针。

[0075] 形态特征:落叶小乔木,茎干不分枝,高达9尺,密生红褐色针刺,向上 渐稀疏。叶为2回羽状复叶,光滑无毛,多少近茎顶着生,长1~1.5尺,叶柄 较叶片短或略等长,羽片2~3对,小叶多至4对,基部有单生小叶1片,小 叶卵形至披针形,无柄或近无柄,先端渐尖,基部圆形至歪楔形,边缘有细锯 齿。花小,白色,成伞形花序,再集成单独顶生的圆锥花丛。果实球形,紫黑 色,具5肋。

[0076] 分布和生长环境:多生于山坡疏林下和林边及沟谷灌丛中。

[0077] 采集处理:根全年可采,掘起,洗净,剥取根皮或切片,晒干备用。

[0078] 性味功效:性温,味微苦。活血破瘀,祛风行气,清热解毒。

[0079] 应用:1.风湿性关节炎:根二两,加猪前蹄一只,煮熟,冲黄酒,吃肉和汤。

[0080] 2.外伤血肿:鲜根皮加食盐少许捣烂,外敷伤处。此方使用10多例效果良好。

[0081] 3.胃溃疡病:根二到三两,长梗南五味子藤(红木香),乌药,枳壳,甘草各三钱,水煎服,此方使100多例,效果良好。

[0082] 4.坐骨神经痛:根、凌霄根、山药,石豆兰各虎刺根五钱,水煎服。

[0083] 5.跌打损伤、风湿痛、神经痛:根、红茴香根、细柱五加根各二斤,虎杖根三斤,甘草半斤,烧酒三十斤,先将药物用冷开水浸泡,再加入烧酒,浸三十天,取出过滤即成。每次成人服10毫升,一天三次。此方使用200多例,效果良好。

[0084] 附注:刺茎槲木和槲木是同属的植物,形体极为相似,惟刺茎槲木的茎为红棕色,刺很密,而槲木的茎为灰白色,刺较稀,节间部分更稀,易于区别。

[0085] 树参:又名杞李藻、疯气树、半边枫、枫荷梨、鸭掌柴、金鸡趾。

[0086] 形态特征:常绿小乔木。苗枝上的叶为倒三角,长可达6寸,2~3深裂偶有4~5掌状深裂,裂片披针形,先端尖,边缘有稀疏的细锯齿,有时不裂,无毛有3~5条基出主脉,叶柄长3~6寸,花枝或老枝上的叶椭圆形或倒卵状至卵状长椭圆,长2.3~3.6寸,基出脉3条,先端短渐尖,基部圆至楔形,全缘或有疏锯齿,叶片的脉网中有红棕色透明腺点。花小,带绿色,30~40朵成顶生的伞形花。果实长圆形,干后有凸出的纵肋约10条,顶上有残留的部分花冠。6~7月开花,9~10月果熟。

[0087] 分布和生长环境:浙江省除东北部外,多有分布。

[0088] 性味功效:性温,味淡,气香。祛风除湿,舒筋活血,止痛。

[0089] 应用:1.陈伤、风湿性关节炎:根一两、红榿木根、虎杖、威灵仙、制寄生、木通、中华常春藤凌霄根各三钱,水煎服。或根、虎杖根,红榿木根、拨节根各一斤,木通半斤,加烧酒六斤,浸七天成风湿酒,每天一小杯饮服。

[0090] 2.偏瘫:根一至二两,水煎服,连服一个季度。

[0091] 附注:另有一种类似植物,民间叫:枫荷挂的原植物,为樟科的槲树,希勿混用。

[0092] 落新妇:又名金毛三七、野升麻、天格公。

[0093] 形态特征:多年生草本,高可达2.4尺,根状茎粗大,呈块状,被有棕黄色长绒毛和褐色鳞片,下生暗褐色须根,茎直立,基部和基生叶柄均被有棕黄色长绒毛。基生叶常3~4回3出复叶,具长柄,小叶片卵形,卵状椭圆形或倒卵形,先端渐尖,基部阔楔形或近心形边缘具不整齐的重锯齿,茎生叶柄较短。花白色或红紫色,密生于花茎的分枝上,成顶生的圆锥花序,花茎上部密生棕色长毛。蒴果2个合生,成熟后枯黄色。6~7月开花,9~10月果熟。

[0094] 分布和生长环境:多生于山坡林下阴湿处及林缘、路边草丛中。常生于丘陵山地沟谷常绿阔叶林中。

[0095] 采集处理:夏,秋采根茎,除去须根、鳞片,绒毛,鲜用或晒干备用。根全年可采,洗净,切片,晒干备用。

[0096] 性味功效:性温,味涩。活血祛瘀,清热解毒,止痛镇痉。

[0097] 应用:1.跌打损伤:鲜根茎一两,切片加黄酒蒸熟,分三次于饭前服,或水煎冲黄酒服。或根茎五钱,铁扫帚根二两,水煎服。

[0098] 2. 关节炎:根茎三钱,及己四升,红茵香根皮三分,水煎(红茵香根皮先煎 一小时,然后加入他药共煎),黄酒冲服。

[0099] 3. 手术后止痛:根茎五、六钱,水煎服。此方用于各种手术后止痛17例,均有效。

[0100] 附注:同属尚有一种华南落新妇与落新妇极为相似,但植株较大,高可达 3尺,叶为1~2回3出复叶,或一部分似2回羽状复叶。

[0101] 野蚊子草:又名白花壶瓶、银壶瓶、白葫芦。

[0102] 形态特征:多年生草本,主根肥大呈圆锥形,表面淡黄白色。茎直立,高 1.5~3尺左右,基部稍带木质,上部分枝很多。叶对生,倒披针形,长3分~1 寸左右,先端尖锐,基部狭窄成细柄。花白色或淡红色,成短聚伞花序;花萼 长管形,光滑,有纵脉10条,先端5裂;花瓣5片,基部有瓣柄,瓣片2裂,每裂片再裂成狭条。萌果长圆形,上部略膨大而下部狭小,呈棍棒状成熟时顶端6齿裂。7~10月开花结果。

[0103] 分布和生长环境:多生于溪边、路旁草丛中。

[0104] 采集处理:夏、秋季采根或全草,鲜用或晒干备用。

[0105] 性味功效:性凉,味辛涩。清热利湿,解毒消肿。

[0106] 应用:1. 痢疾、嗜盐菌性肠炎:全草一两,加糖一两,水煎服。此方使用数 百例均有效。

[0107] 2. 蝮蛇咬伤:取鲜根十株,捣烂加开水浸五至十分钟,取汁内服,渣敷伤口 周围。此方使用10例,有效。

[0108] 3. 挫伤、扭伤、关节肌肉酸痛:根五钱,加烧酒或75%酒精三两浸泡,取汁 外搽伤痛处,此方治疗数十例均有良效。

[0109] 附注:近似种瞿麦,容易混用。但瞿麦的叶多为线状披针形,较长;萼筒 有少数细脉,基部紧抱以3~4对苞片,而野蚊子草的叶多为倒披针形而较短,萼筒有脉10条,基部无苞片,可以区别。

[0110] 柘:又名柘树、黄疸树、柘叶。

[0111] 形态特征:落叶灌木或乔木,具有坚硬棘刺,叶互生,有短柄,叶片卵圆 形至圆形,长4.5分~3寸,全缘或三裂,托叶小。花小,雌雄异株。雌雄花均 成花腋生的头状花序,雄花序梗长3到4分,密披短柔毛,后雌花的花被及苞 片一同增大结成肉质的蓇果,近球形,红色。5月开花,果9~10月采。

[0112] 分布和生长环境:常生于疏林中或路边。

[0113] 采集处理:根皮全年可采,果9~10月采。

[0114] 性味功效:性平,味苦。清热凉血,舒筋活络。

[0115] 应用:1. 跌打损伤:根皮三至五钱,黄酒适量,煎服,连服二至三剂,重 伤者连服五至七剂。或取将成熟果实切片晒干研粉,每次一调羹,用黄酒吞服, 每日二次,连用五至六天。或用根皮捣烂加酒外敷伤处。

[0116] 2. 咯血、呕血:根皮(去粗皮)一至二两,炒焦,水煎,冲白糖一日三次分服。

[0117] 3. 腰痛:鲜根皮四两,酒炒后,水煎服。

[0118] 附注:树皮含脂肪及蜡质6%。

[0119] 八角枫:又名花冠木、五角枫。

[0120] 形态特征:落叶小乔木,高可达2丈左右。枝水平开展,小枝曲折。叶互 生,叶形变

化较大,卵形、圆形或椭圆形,通常3到5裂,少为7裂,顶端骤尖,基部偏斜,两侧不对称,叶背无腺点;柄长6分到1寸2分。初开时白色,后变乳黄色。6到7月开花,9到10月果。

[0121] 分布和生长环境:常生在山坡、溪边、旷野及山坡灌木丛中。

[0122] 采集处理:全年可采。

[0123] 功效与主治:散瘀止痛止血,有毒。

[0124] 1. 外伤出血:千叶或干根研细粉,外敷伤处;或鲜叶捣烂,敷伤处。

[0125] 2. 跌打损伤,支根五分,加牛膝根一两,混和醋炒,水煎服。另取鲜根皮或树皮加蛇葡萄根和酒糟捣烂,烘热外敷。

[0126] 3. 风湿痛、风湿瘫痪:支根一两,烧酒二斤,浸泡七天,每日早晚各饮酒五钱至一两。

[0127] 附注:本品有毒,不可久服;如发生中毒,据江西经验,可用萝卜子。两捣碎,水煎服。孕妇、小儿、年老体弱者均不宜服用。

[0128] 支柱蓼:又名螺丝三七。

[0129] 形态特征:多年生草本,高6寸到1尺2寸。根肥厚而质硬,棕褐色,粗如手指,分节似螺丝状。茎直立,不分枝。根出叶有长柄,卵形,膜质,长1寸半到3寸,宽9分到2寸,顶端急锐头或急锐尖头,基部截形至心形;茎生叶3到5片,卵状心形,无柄而抱茎;叶朋羽状;具鞘状托叶。花白色,成穗状花序,顶生和腋生。7到8月开花,9到10月结果。

[0130] 分布和生长环境:分布于本省西北部和西部东部山区。常生在1千公尺以上杂木林下阴湿含腐植质的土壤中,或山沟石缝中。

[0131] 采集处理:6到10月。

[0132] 功效和主治:散瘀活血。

[0133] 1. 跌打损伤:根茎去细根,晒干研粉,每次服七至八钱,晚饭前用黄酒吞服,一天一次。

[0134] 2. 劳伤脱力:根茎五钱至一两,水煎冲黄酒服,或用猪肉炖服。

[0135] 及己:又名四叶对、四天王。

[0136] 形态特征:多年生草本,高约9寸,主根横生,粗短,密生须状侧根。茎单独或数枝从根部抽出,有明显的节,光滑无毛。叶对生,常4片生于茎端,叶片椭圆形或卵状椭圆形,顶端渐尖,基部楔形,边缘有锐而密的锯齿。穗状花序1个到3个生于茎顶;花小,外有微小鳞片状苞片,雄蕊药隔扩张呈花被状,长宽相等,乳白色。4到5月开花,7到8月果熟。

[0137] 分布和生长环境:生在较阴湿的山坡林下,溪谷边、水沟边。

[0138] 采集处理:春季至秋季可采。

[0139] 功效和主治:散瘀活血,抗菌消炎。有毒。

[0140] 1. 跌伤、扭伤、骨折:鲜根加食盐少许捣烂,烘热,敷伤处;另取根二至三分,水煎冲黄酒服。

[0141] 2. 闭经:根一至三分,水煎冲黄酒服。

[0142] 附注:本植物有毒,不宜长期服用;对开放性骨折,不作外敷应用,以防大量吸收中毒。

[0143] 蒴藋:又名落得打。

[0144] 形态特征:多年生灌木状草本,高3尺到6尺。茎直立,粗壮,皮上有突起的条纹。叶

对生,羽状复叶,每一张;复叶有小叶5到9片,长椭圆状披针形,长约3寸,叶边有锯齿,叶脉上有毛。花白色,集成复繖房花序生在顶端。浆果球形,黄色,后变红色、黑色。6到8月开花,9到10月结果。

[0145] 分布和生活环境:生在山坡、山谷、路边、村旁或池塘边。

[0146] 采集处理:根全年可采,茎和叶夏季和秋季可采。

[0147] 功效:性温,味苦。活血,散瘀,消肿,散结。

[0148] 1. 治跌打损伤:鲜根二两(干的用五钱),伤在上半身加活血丹二到三钱,伤在下半身加牛膝二到三钱,水煎服;或者研细末,每天早、晚饭后用黄酒吞服三到四分。

[0149] 2. 治打伤吐血:根三钱,侧柏叶三钱,地榆(中药)四钱,水煎服。

[0150] 3. 治关节脱臼:鲜根皮捣烂,包贴患处。

[0151] 红茴香:又名木蟹柴、大茴、铁苦散、山桂花、野茴香、香蟹、闷痛香大香树。

[0152] 形态特征:常绿乔木,高可达2丈。树皮灰色或红褐色嫩时绿色或灰白色。叶互生,倒披针形或椭圆形长约1寸半到3寸半,表面深绿色,背面淡绿色。花红色,1朵或3朵生在叶腋;有柄。果实由9个或13个,荚排列成星状。5到6月开花,8到10月结果。

[0153] 分布和生活环境:生在阴湿的溪谷两旁的杂林中。

[0154] 采集:根全年可采。

[0155] 功效:行血,祛瘀,杀虫。有毒。

[0156] 1. 治跌打损伤、行气镇痛:根皮一到二钱,水煎,,黄酒、红糖,早、晚饭后各服一次。

[0157] 2. 治内伤腰痛:根皮研细末,每次二到三钱,早、晚用黄酒冲服。

[0158] 3. 治疯气痛:根切细,蒸三次,晒三次,每次用三钱,水煎,冲红糖、黄酒服。身体虚弱的人用量减半。

[0159] 紫花景天:又名石蝴蝶、脚趾叶、五里香、岩竹。

[0160] 形态特征:多年生肉质草本,茎直立,高9寸1.5尺,不分枝。叶互生,上部的线形,长约6分,下部的椭圆状倒卵形,长达2.5寸,先端尖或稍钝,基部楔形,边缘有不整齐牙齿。花淡红紫色,成顶生或腋生的伞房状聚伞花序。蒴果披针形,直立。种3细小,褐色,线形。10月开花。

[0161] 分布和生长环境:常生于阴湿的岩石上和石缝内。

[0162] 采集处理:全草全年可采,鲜用。

[0163] 性味功效:性凉,味苦。活血生肌,止血解。

[0164] 应用:1. 挫伤:鲜全草适量加白糖捣烂外敷。

[0165] 2. 腰肌劳损:鲜叶二至三片,洗净切碎,用黄酒服,一天二次,连服二至三天。治疗多例有效。

[0166] 与现有技术相比,本发明具有以下优点:

[0167] 1、本发明将古老的医术为当代服务,采用十七种常见药材制作成振挺敲打液,十七种药材的药性相辅相成,可直观显示痹症(风湿病)病灶,及时诊断出肩颈腰腿痛疾病的病灶位置并对其进行治疗,用法简单,效果良好。

[0168] 2、本发明药液还可治疗头风、颈椎病,肩周炎,网球肘腰痛、脚痛、关节痛、陈伤、及各种人体躯壳不明的疼痛,跌打损伤一般需一个月以上才能显示出病灶,已显示病灶

后,继续敲打一直到病灶周围清楚,不再继续出现病灶为止,敲打约20分钟到30分钟即可为一次,如用皮肤针轻轻叩出血,再拔罐10-20 分钟将湿痰死血拔出清除效果更佳,四次为一个疗程,七天为一次,治疗后马上或第二、三天能出现病情好转现象,见效快且省力省时,一般一次至四次大部分均能治愈。如适当配合内服,外贴其效更速,治疗后的患处的皮肤第二天 出现乌青,需经五天至十二天后完全消除皮肤复原,目前尚未发现不良反映和副作用。

[0169] 3、将振挺敲打液喷到疼痛部位或相近的患处,用手或棒状物轻轻地敲几下 疼痛部位,病灶主要部位会出现不同颜色,如黑青紫红肿等情况,中医可以根据不同颜色进行对症下药,显示后病灶部位高出正常皮肤,若轻敲病灶处会特别疼痛,而没有病灶的地方就不疼痛和不出现颜色,即使长时间敲也不疼痛,本发明中的敲打液主要作用是将深处的病灶(湿痰死血)提到表面来,检查时 间只需5秒钟到2分钟之间就能显示出来,用量也很小,只要1毫升到5毫升。药材用量少,成本较低,并且可减少内服药带来的副作用。

具体实施方式

[0170] 以下是本发明的具体实施例,对本发明的技术方案作进一步的描述,但本发明并不限于这些实施例。

[0171] 一种振挺敲打液,包括下述质量份的组分:

[0172] 虎刺全草15份、兔儿伞根15份、肺筋草根35份、透骨草(剪草) 15份、白接骨根12份、牛郎花根4份、刺茎榕木根15份、树参根70份、落新妇根30 份、野蚊子草70份、柘根70根、八角枫根4份、支柱蓼根15份、及己根2份、蒴藋根15份、红茴香根7份、紫花景天全草20份,白酒2000-3000份;白酒 的度数为60-70度。

[0173] 振挺敲打液可通过喷雾或涂抹方式使用。振挺敲打液涂抹在病灶处后,可 配合棒状工具拍打或徒手拍打,以增加病灶处对振挺敲打液的吸收速率。

[0174] 一种振挺敲打液的制备方法,包括以下步骤:

[0175] S1、将虎刺全草、兔儿伞根、肺筋草根、透骨草(剪草)、白接骨根、牛郎 花根、刺茎榕木根、树参根、落新妇根、野蚊子草,柘根、八角枫根、支柱蓼 根、及己根、蒴藋根、红茴香根全部晒干;

[0176] S2、将步骤S1中晒干的药材全部打粉;

[0177] S3、将步骤S2中全部的粉状药材放入白酒中;

[0178] S4、将紫花景天全草过开水烫一下,使之体积减小;

[0179] S5、将紫花景天全草晒至半干;

[0180] S6、将紫花景天全草放入步骤S3中的白酒中;

[0181] P1、前三天每天搅拌药材1-10分钟;

[0182] S7、将所有药材在白酒中浸泡25-35天;

[0183] S8、过滤药材后得到药液。

[0184] P2、将药液静置48小时以上,去除底部残渣,取上清液。

[0185] P3、将步骤P2中的上清液用紫外线杀菌,得到杀菌后的药液。

[0186] 本发明将古老的医术为当代服务,采用十七种常见药材制作成振挺敲打液,十七种药材的药性相辅相成,可直观显示痹症(风湿病)病灶,及时诊断出肩 颈腰腿痛疾病的病

灶位置并对其进行治疗,用法简单,效果良好。

[0187] 本发明药液还可治疗头风、颈椎病,肩周炎,网球肘腰痛、脚痛、关节痛、陈伤、及各种人体躯壳不明的疼痛,跌打损伤一般需一个月以上才能显示出病灶,已显示病灶后,继续敲打一直到病灶周围清楚,不再继续出现病灶为止,敲打约20分钟到30分钟即可为一次,如用皮肤针轻轻叩出血,再拔罐10-20 分钟将湿痰死血拔出清除效果更佳,四次为一个疗程,七天为一次,治疗后马上或第二、三天能出现病情好转现象,见效快且省力省时,一般一次至四次大部分均能治愈。如适当配合内服药,加上外贴其效更速,治疗后的患处的皮肤第二天出现乌青,需经五天至十二天后完全消除乌青皮肤复原,目前尚未发现不良反映和副作用,对皮肤的湿疹及外伤出血有较好疗效。

[0188] 将振槌敲打液喷到疼痛部位或相近的患处,用手或棒状物轻轻地敲几下疼痛部位,病灶主要部位会出现不同颜色,如黑青紫红肿等情况,中医可以根据不同颜色进行对症下药,显示后病灶部位高出正常皮肤,若轻敲病灶处会特别疼痛,而没有病灶的地方就不疼痛和不出现颜色,即使长时间敲也不疼痛,本发明中的敲打液主要作用是将深处的病灶(湿痰死血)提到表面来,检查时间只需5秒钟到2分钟之间就能显示出来,用量也很小,只要1毫升到5毫升。药材用量少,成本较低,并且可减少内服药带来的副作用。

[0189] 根据上述说明书的揭示和教导,对于本领域的技术人员来说,本发明可以各种更改和变通,凡在发明精神和原则之内,所作的任何修改名称替换,中草药,原料变更,使用说明书类似或相似只要将药液喷或涂在人体病痛表面进行敲打或拍打方式治疗,保健均在保护范围之内。