



(12) 发明专利申请

(10) 申请公布号 CN 104027514 A

(43) 申请公布日 2014. 09. 10

(21) 申请号 201410294744. 9

(22) 申请日 2014. 06. 18

(66) 本国优先权数据

201410029687. 1 2014. 01. 18 CN

(71) 申请人 刘斌胜

地址 036900 山西省山阴县关岱岳村刘汉永
诊疗所

(72) 发明人 刘斌胜

(51) Int. Cl.

A61K 36/8888(2006. 01)

A61P 1/16(2006. 01)

A61K 35/37(2006. 01)

权利要求书1页 说明书2页

(54) 发明名称

一种用于治疗急性胆囊炎的中药

(57) 摘要

一种用于治疗急性胆囊炎的中药,是由以下
药物为原料制备而成的:茵陈、金银花、蒲公英、
连翘、赤芍、柴胡、鸡内金、大黄、姜半夏、甘草,将
上述药物第一剂加700毫升水煎至200毫升,第二
剂加500毫升水煎至200毫升,每日两次,早晚空
服。

1. 一种用于治疗急性胆囊炎的中药,是由以下重量的药物制成的:

茵陈 60 克 金银花 60 克 蒲公英 30 克 连翘 30 克 赤芍 30 克 柴胡 10 克 鸡内金 10 克 大黄 10 克

姜半夏 10 克 甘草 10 克。

2. 根据权利要求 1 所述一种用于治疗急性胆囊炎的中药,其特征是将所述药物混合后煎成汤剂口服。

一种用于治疗急性胆囊炎的中药

技术领域：

[0001] 本发明涉及一种中药，特别是涉及一种治疗急性胆囊炎的中药。

背景技术：

[0002] 急性胆囊炎是由于胆汁滞留和细菌感染而引起的胆囊炎症，常因胆囊内结石阻塞胆道使胆汁滞留形成对胆囊的慢性刺激所引起，也可因肝脏的长期炎症，使肝周围组织发生炎性病变所引起。本病多发于中年女性。患病以后可有上腹疼痛及消化不良等症状。腹痛可为针刺样或刀割样，并有规律性发作。有时还会引起恶心、呕吐、发热。常因饱餐、进食高脂肪、油类或寒冷等因素诱发。

[0003] 临床上治疗急性胆囊炎较为棘手，一般的治疗是西药输液或口服消炎利胆类的药物，治标不治本，达不到治疗的目的。

发明内容：

[0004] 本发明是一种见效快，疗效好，无副作用的药物。

[0005] 本发明的药物是由以下重量的中药为原料制备而成的。

[0006] 茵陈 60 克 金银花 60 克 蒲公英 30 克 连翘 30 克 赤芍 30 克 柴胡 10 克 鸡内金 10 克 大黄 10 克

[0007] 姜半夏 10 克 甘草 10 克

[0008] 可以将上述药物制成药剂学上的任何一种内服剂型，本发明优选的剂型是汤剂。

[0009] 本发明是将上述药物第一剂加 700 毫升水煎至 200 毫升，第二剂加 500 毫升水煎至 200 毫升。

[0010] 使用方法是煎好的汤剂口服，每日两次，早晚空腹。

[0011] 中医认为，治疗急性胆囊炎应以清热解毒、利湿消肿为治疗原则。方中以金银花、蒲公英、连翘清热解毒；茵陈、赤芍、柴胡、鸡内金、大黄、姜半夏、甘草利湿消肿；诸药相得，协调作用，从而达到治疗的目的。

[0012] 本发明的药物见效快，疗效好，对急性胆囊炎有很好的治疗效果。

[0013] 为进一步证明本发明的药物的临床疗效和安全性。选择 90 位患者进行临床观察，90 例患者中女性 70 例，男性 20 例。全部使用本发明药物进行治疗，每日两次，早晚空腹。

[0014] 疗效标准：显效：腹痛为针刺样或刀割样、消化不良症状消失；有效：腹痛为针刺样或刀割样、消化不良症状减轻或消失；无效：治疗前后无明显变化。

[0015] 表 1 治疗后疗效统计结果

[0016]

| 患者 | 例数 | 显效 (%) | 有效 (%) | 无效 (%) | 总有效率 (%) |
|----|----|--------|--------|--------|----------|
| 男性 | 20 | 5(25) | 15(75) | 5(25) | 15(75) |

| | | | | | |
|----|----|----------|----------|--------|----------|
| 女性 | 70 | 35(50) | 67(95.8) | 3(4.2) | 67(95.8) |
| 总计 | 90 | 40(44.4) | 82(91.1) | 8(8.9) | 82(91.1) |

具体实施方式：

[0017] 茵陈 60 克 金银花 60 克 蒲公英 30 克 连翘 30 克 赤芍 30 克 柴胡 10 克 鸡内金 10 克 大黄 10 克

[0018] 姜半夏 10 克 甘草 10 克

[0019] 本发明是将上述药物第一剂用 700 毫升水煎至 200 毫升,第二剂用 500 毫升水煎至 200 毫升,每日两次,早晚空服。