



(12) 发明专利

(10) 授权公告号 CN 103341004 B

(45) 授权公告日 2015.04.01

(21) 申请号 201310262421.7

审查员 陈蕾

(22) 申请日 2013.06.27

(73) 专利权人 付海英

地址 264309 山东省威海市荣成市石岛新城
区双榜东路 199 号

(72) 发明人 付海英 柳晖

(51) Int. Cl.

A61K 36/8905(2006.01)

A61P 15/00(2006.01)

(56) 对比文件

中华人民共和国卫生部药典委员会. 宁坤养血丸. 《中华人民共和国卫生部药品标准, 中药成方制剂第一册》. 1989, 58.

沈世林等. 时吉萍教授辨证治疗月经病思维过程撷英. 《吉林中医药》. 2013, 第 33 卷 (第 3 期), 221-222.

权利要求书1页 说明书3页

(54) 发明名称

一种治疗月经后期的中药组合物

(57) 摘要

本发明涉及一种治疗月经后期的中药组合物, 其中药原料及重量份配比为: 当归 10-30 份、白芍 10-40 份、肉桂 5-20 份、川芎 10-30 份、艾叶 5-20 份、巴戟天 5-20 份、淫羊藿 10-40 份、丹参 10-40 份、元胡 10-30 份、桃仁 5-20 份、红花 5-20 份、益母草 5-20 份、熟地 10-40 份、云苓 10-30 份、香附 5-20 份、小茴香 5-20 份、党参 10-40 份、白术 10-30 份、甘草 5-15 份。本发明的中药组合物具有补肾助阳、温经散寒、补血调经、行气活血的功效, 其治月经后期疗效显著, 作用可靠。

1. 一种治疗月经后期的中药组合物,其特征在于:其中药原料及重量配比为:当归 20g、白芍 30g、肉桂 10g、川芎 20g、艾叶 10g、巴戟天 10g、淫羊藿 30g、丹参 30g、元胡 20g、桃仁 10g、红花 10g、益母草 10g、熟地 30g、云苓 20g、香附 10g、小茴香 10g、党参 30g、白术 20g、甘草 6g。

一种治疗月经后期的中药组合物

技术领域

[0001] 本发明涉及一种传统草药的未确定结构的医药配制品,尤其是一种治疗月经后期的中药组合物。

背景技术

[0002] 月经后期是女性在临床中的一种常见病症。祖国医学认为是在月经周期后 7 天以上,同时连续三个月鉴定为月经后期,又称“经行后期”、“月经延后”、“月经落后”、“经迟”等。一般认为需连续出现两个周期以上,若每次仅延后三五天,或偶然延后一次,下次仍如期来潮者,均不作月经后期论。本病的发病机理有虚实之别。虚者多因肾虚、血虚、虚寒导致精血不足,冲任不充,血海不能满溢而经迟;实者多因血寒、气滞等导致血行不畅,冲任受阻,血海不能如期满盈,致使月经后期而来。主要症候小腹冷痛,经期错后,月经量少,色暗,时血块有,形寒肢冷等症。目前市场上治疗月经后期的药物很多,均有一些疗效,但效果并不十分理想,存在着治标不治本的不足。

[0003] 中医认为,月经后期系由营血亏损、阳虚、寒凝、气滞、冲任不畅导致。故宜温经散寒、补血调经、行气活血。

[0004] 根据中医理论,针对月经后期的发病机理,进行辨证配伍组方,以达到标本兼治的目的。

发明内容

[0005] 为了克服现有技术中的不足,本发明提供一种配制简便、成本低、疗效显著、无副作用的治疗月经后期的中药组合物。

[0006] 本发明解决其技术问题所采用的技术方案是:一种治疗月经后期的中药组合物,其特征在于:其中药原料及重量份配比为:当归 10-30 份、白芍 10-40 份、肉桂 5-20 份、川芎 10-30 份、艾叶 5-20 份、巴戟天 5-20 份、淫羊藿 10-40 份、丹参 10-40 份、元胡 10-30 份、桃仁 5-20 份、红花 5-20 份、益母草 5-20 份、熟地 10-40 份、云苓 10-30 份、香附 5-20 份、小茴香 5-20 份、党参 10-40 份、白术 10-30 份、甘草 5-15 份。

[0007] 本发明的优选技术方案是:一种治疗月经后期的中药组合物,其特征在于:其中药原料及重量份配比为:当归 20 份、白芍 30 份、肉桂 10 份、川芎 20 份、艾叶 10 份、巴戟天 10 份、淫羊藿 30 份、丹参 30 份、元胡 20 份、桃仁 10 份、红花 10 份、益母草 10 份、熟地 30 份、云苓 20 份、香附 10 份、小茴香 10 份、党参 30 份、白术 20 份、甘草 6 份。

[0008] 本发明中药组合物是在传统中医理论和临床经验指导下,精选药物组方。本发明中药组合物中:当归具有补血活血、调经止痛、润肠通便的功效;白芍具有通顺血脉、养血柔肝、缓中敛汗的功效;肉桂具有补火助阳、散寒止痛、活血通经的功效;川芎具有活血祛瘀、行气开郁、祛风止痛的功效;艾叶具有温经止血、散寒止痛、降湿杀虫的功效;巴戟天具有补肾助阳、强筋壮骨、祛风除湿的功效;淫羊藿具有补肾阳、强筋骨、祛风湿的功效;丹参具有活血调经、祛瘀消痈、清心除烦、养血安神的功效;元胡具有活血散瘀、利气止痛的功

效；桃仁具有活血祛瘀、润肠通便的功效；红花具有活血通经、散瘀止痛的功效；益母草具有活血调经、利尿消肿的功效；熟地具有补血养阴、填精益髓的功效；云苓具有益气安神、健脾和胃、祛除湿热、行水止泄的功效；香附具有理气解郁、调经止痛的功效；小茴香具有散寒止痛、理气和胃的功效；党参具有补中益气、健脾益肺的功效；白术具有燥湿行水、益气、健脾胃的功效；甘草具有补脾益气、清热解毒、祛痰止咳、调和诸药的功效。本发明精选药物组方，其药物组分经辩证配伍，在作用上相互佐助，共奏补肾助阳、温经散寒、补血调经、行气活血的功效，对月经后期的治疗达到标本兼治。

[0009] 本发明组合物的组分均采用天然的中药原料，其配制简便、药源广、成本低。本发明遵循中医的处方用药原则，各种组分药物采用水煎服用。经临床应用验证，其疗效显著可靠，药性平和，未出现毒副作用，有效率达 95%，治愈率 72.5%。

具体实施方式

[0010] 下面结合实施例对本发明作进一步说明。

[0011] 实施例 1

[0012] 一种治疗月经后期的中药组合物，其中药原料及重量配比为：当归 20g、白芍 30g、肉桂 10g、川芎 20g、艾叶 10g、巴戟天 10g、淫羊藿 30g、丹参 30g、元胡 20g、桃仁 10g、红花 10g、益母草 10g、熟地 30g、云苓 20g、香附 10g、小茴香 10g、党参 30g、白术 20g、甘草 6g。

[0013] 实施例 2

[0014] 一种治疗月经后期的中药组合物，其中药原料及重量配比为：当归 10g、白芍 25g、肉桂 5g、川芎 10g、艾叶 5g、巴戟天 15g、淫羊藿 10g、丹参 10g、元胡 15g、桃仁 12g、红花 5g、益母草 15g、熟地 10g、云苓 15g、香附 5g、小茴香 12g、党参 15g、白术 25g、甘草 5g。

[0015] 实施例 3

[0016] 一种治疗月经后期的中药组合物，其中药原料及重量配比为：当归 30g、白芍 10g、肉桂 20g、川芎 30g、艾叶 20g、巴戟天 12g、淫羊藿 35g、丹参 15g、元胡 30g、桃仁 5g、红花 20g、益母草 5g、熟地 40g、云苓 30g、香附 15g、小茴香 5g、党参 40g、白术 30g、甘草 15g。

[0017] 实施例 4

[0018] 一种治疗月经后期的中药组合物，其中药原料及重量配比为：当归 25g、白芍 15g、肉桂 15g、川芎 25g、艾叶 15g、巴戟天 20g、淫羊藿 40g、丹参 25g、元胡 20g、桃仁 15g、红花 12g、益母草 20g、熟地 35g、云苓 25g、香附 20g、小茴香 20g、党参 10g、白术 15g、甘草 12g。

[0019] 实施例 5

[0020] 一种治疗月经后期的中药组合物，其中药原料及重量配比为：当归 15g、白芍 40g、肉桂 12g、川芎 15g、艾叶 12g、巴戟天 5g、淫羊藿 25g、丹参 40g、元胡 10g、桃仁 20g、红花 15g、益母草 12g、熟地 25g、云苓 10g、香附 12g、小茴香 15g、党参 20g、白术 10g、甘草 9g。

[0021] 本发明实施例中的中药组合物按常规的水煎法制取药剂。具体方法如下：将组方的中药原料放入容器中，加冷水漫过药面，浸泡 15～20 分钟，再加水没过药面约 6 厘米，进行第一次煎煮，未沸前采用武火煎煮，沸后用文火煎煮 20～30 分钟；第二煎煮，加水没过药面约 4 厘米，进行煎煮，水沸后煎煮 15～20 分钟。两次煎煮取汁，合并。

[0022] 本发明以实施例 1 所给出的一种治疗月经后期的中药组合物，做临床疗效总结如下：

[0023] 一、一般性资料：本中药组合物应用于临床观察病例 80 例，年龄 15 ~ 50 岁。

[0024] 二、诊断依据：参照中华人民共和国中医药行业标准《中医病证诊断疗效标准》中月经后期的诊断标准：

[0025] 1、月经周期超过 35 天，连续 2 个月经周期以上；

[0026] 2、育龄妇女周期延后，应与妊娠、青青期、更年期月经后期相鉴别；

[0027] 3、妇科检查，B 超或气腹造影，以排除子宫及卵巢器质性疾病。

[0028] 三、用法用量：临床应用时，组合物中的组分用量根据患者的体重和年龄酌情增减。一日一剂，水煎两遍取汁约 300ml，分早、晚两次服用。五天为一疗程。

[0029] 四、疗效标准：参照中华人民共和国中医药行业标准《中医病证诊断疗效标准》中的月经后期疗效评定标准：

[0030] (1) 痊愈：月经周期恢复正常，维持 3 个月以上；

[0031] (2) 有效：月经周期恢复正常，但不能维持 3 个月以上；

[0032] (3) 无效：月经周期未见好转。

[0033] 五、治疗效果：该临床观察病例中，服药 2-6 个疗程，痊愈 58 例，随访未见复发；有效 18 例，无效 4 例。治疗期间未发生毒副作用。

[0034] 六、典型病例：

[0035] 病例 1：

[0036] 李某，18 岁。主诉：月经后期近一年。一般 2 至 3 个月来潮一次，经期 3-4 天，经期伴下腹空坠隐痛，头昏眼花，疲乏无力。诊见：面色黄无华，舌淡，脉细。服用本发明中药组合物制备的药剂 1 个疗程，头昏眼花，疲乏无力症状明显减轻；继续服 2 个疗程，症状及体征均消失，下月月经正常，治愈。随访半年无复发。

[0037] 病例 2：

[0038] 华某，女，27 岁。主诉：月经后期多年。月经常延后 10 余天，且量中有血块。末次月经延后 15 天，经行 3 天，量少色暗，伴腰酸痛。诊见：面部色斑明显，苔薄白，脉细弦。服用本发明中药组合物制备的药剂 2 个疗程，面色好转；继续服用 2 个疗程，下月月经正常，治愈。3 个月后随访月经周期正常。

[0039] 病例 3：

[0040] 刘某，32 岁。患者近半年月经不正常，经期延后 10 天左右，量少，色黯红有小血块，伴有小腹胀痛、乳房胀痛。诊见：苔白，脉沉紧。服用本发明中药组合物制备的药剂 2 个疗程，小腹胀痛、乳房胀痛均减轻；继续服用 3 个疗程，诸症消失，次月月经正常，治愈。随访半年月经正常。