

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

(12) ЗАЯВКА НА ИЗОБРЕТЕНИЕ

(21)(22) Заявка: 2012106467/15, 30.07.2010

Приоритет(ы):

(30) Конвенционный приоритет:
31.07.2009 GB 0913427.1;
31.03.2010 GB 1005495.5;
24.06.2010 GB 1010671.4


(43) Дата публикации заявки: 10.09.2013 Бюл. № 25

(85) Дата начала рассмотрения заявки РСТ на
национальной фазе: 29.02.2012(86) Заявка РСТ:
GB 2010/001457 (30.07.2010)(87) Публикация заявки РСТ:
WO 2011/012868 (03.02.2011)Адрес для переписки:
191036, Санкт-Петербург, а/я 24, "НЕВИНПАТ"(71) Заявитель(и):
АНАМАР АБ (SE)(72) Автор(ы):
ПАЛЬМКВИСТ Никлас (SE),
СҮЁДИН Андерс (SE),
ВЕНГЛЕН Кристина (SE),
ФЛООД Кристофер (SE),
ЛУНДБЕРГ Леннарт (SE),
СЕЙФЕРТ Элизабет (SE),
ЛЕК Пер (SE),
БОМАН Арне (SE)

(54) СОЕДИНЕНИЯ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ВОСПАЛЕНИЯ

(57) Формула изобретения

1. Применение соединения формулы (I)

где R₁ представляет собой Cl, MeO или HR₂ представляет собой Cl, MeO или HR₃ представляет собой Cl или MeOR₄ представляет собой Cl, H или NO₂,при условии что по меньшей мере один из R₁-R₃ должен представлять собой Clи по меньшей мере один из R₁-R₃ должен представлять собой MeO,


или его фармацевтически приемлемой соли

в изготовлении лекарственного средства для лечения ревматоидного артрита,
остеоартрита или боли.

RU 2012106467 A

RU 2012106467 A

2. Применение по п.1, где R₁ представляет собой Cl.
3. Применение по п.1, где R₂ представляет собой MeO.
4. Применение п.1, где R₃ представляет собой MeO.
5. Применение по п.1, где R₄ представляет собой H.
6. Применение по п.1, где соединение представляет собой соединение формулы II



где R₁ представляет собой Cl или MeO, предпочтительно Cl,
 R₂ представляет собой Cl или MeO, предпочтительно MeO,
 R₄ представляет собой Cl или H, предпочтительно H,
 при условии что по меньшей мере один из R₁ и R₂ должен представлять собой Cl,
 или его фармацевтически приемлемую соль.

7. Применение по п.1, где соединение представляет собой N-(2-хлор-3,4-диметоксибензилиденамино)гуанидин или его фармацевтически приемлемую соль.
8. Применение по любому из пп.1-7, где боль представляет собой ноцицептивную боль.