

[19] 中华人民共和国国家知识产权局



[12] 发明专利申请公布说明书

[21] 申请号 200810141083.0

[51] Int. Cl.

A61K 36/896 (2006.01)

A61P 25/04 (2006.01)

A61P 29/00 (2006.01)

A61K 35/60 (2006.01)

A61K 35/64 (2006.01)

[43] 公开日 2009 年 1 月 7 日

[11] 公开号 CN 101337019A

[22] 申请日 2008.8.19

[21] 申请号 200810141083.0

[71] 申请人 牛德兴

地址 450002 河南省郑州市金水区东二街 14
号楼 17 号

[72] 发明人 牛德兴

权利要求书 1 页 说明书 2 页

[54] 发明名称

一种治疗带状疱疹后遗症神经痛的口服中药的
配方及其制备方法

[57] 摘要

本发明涉及一种治疗带状疱疹后遗症神经痛的口服中药及其制备方法。配方包括：酒白芍 16%，甘草 8%，土白术 6%，板蓝根 12%，土茯苓 12%，酒当归 6%，丹参 6%，制乳香 6%，制没药 6%，全蝎 7%，蜈蚣 5%，鳝鱼血 6%，丝瓜络 4%。制备方法包括：酒白芍，酒当归，制乳香，制没药按传统方法炮制；全蝎，蜈蚣，鳝鱼血，制乳香，制没药共粉碎，过 120 目筛，待用；酒白芍，甘草，土白术，板蓝根，土茯苓，酒当归，丹参，丝瓜络，分别加水煎煮两次，每次 1 小时，磨成细粉；分装为胶囊。本发明主要是养阴益气、通络止痛，无副作用，疗效显著，极具推广和应用价值。

1、一种治疗带状疱疹后遗症神经痛的內服中药的配方，其特征在于：酒白芍 16%，甘草 8%，土白术 6%，板蓝根 12%，土茯苓 12%，酒当归 6%，丹参 6%，制乳香 6%，制没药 6%，全蝎 7%，蜈蚣 5%，鳝鱼血 6%，丝瓜络 4%。

2、一种治疗带状疱疹后遗症神经痛的內服中药的制备方法：其特征在于包括以下步骤：

(1)、酒白芍，酒当归，制乳香，制没药按传统方法炮制；

(2)、全蝎，蜈蚣，鳝鱼血，制乳香，制没药共粉碎，过 120 目筛，待用；

(3)、酒白芍，甘草，土白术，板蓝根，土茯苓，酒当归，丹参，丝瓜络，分别加水煎煮两次，每次 1 小时，合并上述滤液，浓缩至稠膏状，高温干燥，磨成细粉；

(4)、以上药粉混合均匀，辐照杀菌，然后分装为胶囊。

一种治疗带状疱疹后遗症神经痛的內服中药的配方及其制备方法

技术领域

本发明具体涉及一种治疗带状疱疹后遗症神经痛的內服中药的配方及其制备方法。

背景技术

带状疱疹后遗症神经痛是带状疱疹后遗症，即水疱结痂后疼痛延续超过一个月者，其剧烈疼痛令患者痛苦不堪，病程一般 2-5 年，少数病程可达 10 年以上，目前在临床治疗上是很棘手的世界级难题，一般是选用药物止痛和营养神经，但治标不治本。个别采用神经阻滞，但是副作用大且无效率高，导致患者加重痛苦，病程长，费用高，疗效不理想。

发明内容

本发明是提供一种纯中草药为原料、治疗周期短、副作用小且治疗效果好的內服中药及其制备方法。

本发明内容是：一种治疗带状疱疹后遗症神经痛的內服中药的配方包括：酒白芍 16%，甘草 8%，土白术 6%，板蓝根 12%，土茯苓 12%，酒当归 6%，丹参 6%，制乳香 6%，制没药 6%，全蝎 7%，蜈蚣 5%，鳝鱼血 6%，丝瓜络 4%。

一种治疗带状疱疹后遗症神经痛的內服中药的制备方法，包括以下步骤：

- (1)、酒白芍，酒当归，制乳香，制没药按传统方法炮制；
- (2)、全蝎，蜈蚣，鳝鱼血，制乳香，制没药共粉碎，过 120 目筛，待用；
- (3)、酒白芍，甘草，土白术，板蓝根，土茯苓，酒当归，丹参，丝瓜络，分别加水煎煮两次，每次 1 小时，合并上述滤液，浓缩至稠膏状，高温干燥，磨成细粉；

(4)、以上药粉混合均匀，辐照杀菌，然后分装为胶囊。

使用方法是：每天3次，每次6粒，饭后温开水送服。

禁忌事宜：用药期间，禁饮食酒类和海产品，少食辛辣。

本发明的有益效果：本发明主要是采用了纯中草药作为原料，养阴益气、活血搜毒、通络止痛。可以修复神经，疏通微循环，逐步祛除疼痛且用药方便，无副作用，疗效显著，极具推广和应用价值。

具体实施方式：

取酒白芍 80 克，甘草 40 克，土白术 30 克，板蓝根 60 克，土茯苓 60 克，酒当归 30 克，丹参 30 克，制乳香 30 克，制没药 30 克，全蝎 60 克，蜈蚣 10 条，鳝鱼血 30 克，丝瓜络 20 克，然后把酒白芍，酒当归，制乳香，制没药按传统方法炮制；全蝎，蜈蚣，鳝鱼血，制乳香，制没药共粉碎，过 120 目筛，待用；把酒白芍，甘草，土白术，板蓝根，土茯苓，酒当归，丹参，丝瓜络分别加水 1500 毫升和 800 毫升煎煮两次，每次 1 小时；合并上述滤液，浓缩至稠膏状，高温干燥，磨成细粉；把以上药粉混合均匀，辐照杀菌，然后分装为胶囊。