(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)发明专利申请

(10)申请公布号 CN 105169155 A
(43)申请公布日 2015.12.23

(21)申请号 201510558291.0

(22)申请日 2015.09.06

(71)申请人 崔红霞
地址 264400 山东省威海市文登区米山东路西3号威海市文登中心医院

(72)发明人 崔红霞 张曙光 刘永帅

(74)专利代理机构 威海科星专利事务所 37202
代理人 鲍光明

(51)Int.Cl.
A61K 36/904(2006.01)
A61P 13/00(2006.01)

权利要求书1页 说明书3页

(54)发明名称

治疗小儿遗尿症的中药

(57)摘要

本发明涉及药物配方领域，具体地说是一种治疗小儿遗尿症的中药，其特征在于由如下重量份的原料药制成：覆盆子17～22、背扁黄耆13～17、菟丝子17～22、乌药3～7、金樱子13～17、防风17～22、棒棒草17～22、双肾藤13～17、茯神17～22、柴胡22～28、白术13～17、百部3～7、白茅根13～17、续断8～12、葶藶8～12、羌活5～10、仙茅13～17、长冬草8～12、败酱草8～12、麦冬17～22，将上述原料用水浸泡，煎熬后去渣得滤液。本发明具有补肾纳气、益气养血之功效，对治疗小儿遗尿症具有显著的疗效，疗程短，见效快，治愈后不复发，安全无毒副作用。

CN 105169155 A

1.一种治疗小儿遗尿症的中药，其特征在于由如下重量份的原料药制成：覆盆子17～22、背扁黄耆13～17、菟丝子17～22、乌药3～7、金樱子13～17、防风17～22、棒棒草17～22、双肾藤13～17、茯神17～22、柴胡22～28、白术13～17、百部3～7、白茅根13～17、续断8～12、葶藶8～12、羌活5～10、仙茅13～17、长冬草8～12、败酱草8～12、麦冬17～22，将上述原料用水浸泡，煎熬后去渣得滤液。

治疗小儿遗尿症的中药

技术领域

[0001] 本发明涉及一种中成药制剂，具体地说是一种治疗小儿遗尿症的中药。

[0002]

背景技术

[0003] 众所周知，小儿遗尿症是一个普遍的现象，长期以来多数家长和一些医生并不认为尿床是一种疾病，也无需特殊治疗。而专门从事小儿遗尿症的专家却认为，儿童尿床不应忽视。小儿神经性尿频，指非感染性尿频、尿急、是儿科一独立性疾病特点，尿频，每 3 ～ 19 分钟一次，多数患儿每小时约 4 ～ 6 次。尿急，说要小便不能忍耐片刻。临床可分为原发性遗尿和继发性遗尿两种，前者是指持续的或持久的遗尿，其间控制排尿的时期从未超过 1 年；后者是指小儿控制排尿至少 1 年，但继后又出现遗尿。

[0004] 随着神经系统发育的不断完善，正常婴儿及幼童的膀胱对排尿的控制会自然形成，不需要特别的指导和训练。但如果 5 岁或 5 岁以上的儿童多次发生入睡后无意识排尿，每周达 2 次以上并且持续至少 6 个月，而清醒状态下则无此现象，则应被视为异常，临床上称之为原发性夜遗尿症。尿床后患儿受湿受冻，晚上睡不好，白天活动易疲劳，学习无精神，有时受别人责备，受朋友嘲笑久而久之，内心受到严重伤害，使从小活泼爱动，爱说话的儿童变得性格内向，变得烦躁易怒，性格古怪；变得胆小怕事，遗尿虽不是什么要命的大病，但他能影响儿童间交往，影响患儿睡眠学习生活，影响儿童大脑智力发展，它是一种隐性杀手。

[0005] 尿床的儿童多数都具有体质虚弱、上课时不能注意听讲、学习成绩差的特点，但家长都不会重视，而会影响儿童的身心健康。目前西药治疗小儿遗尿症的药物较多，但治疗效果不理想，易复发，很难做到根治小儿遗尿症的目的。

[0006]

发明内容

[0007] 本发明的目的就是为了克服上述现有的技术不足，提供一种治疗小儿遗尿症的中药，具有补肾纳气、益气养血之功效，对治疗小儿遗尿症具有显著的疗效，疗程短，见效快，治愈后不复发，安全无毒副作用。

[0008] 本发明解决上述技术问题采用的技术方案是：一种治疗小儿遗尿症的中药，其特征在于由如下重量份的原料药制成：覆盆子 17 ～ 22、背扁黄耆 13 ～ 17、菟丝子 17 ～ 22、乌药 3 ～ 7、金樱子 13 ～ 17、防风 17 ～ 22、棒棒草 17 ～ 22、双肾藤 13 ～ 17、茯神 17 ～ 22、柴胡 22 ～ 28、白术 13 ～ 17、百部 3 ～ 7、白茅根 13 ～ 17、续断 8 ～ 12、蕲蘚 8 ～ 12、羌活 5 ～ 10、仙茅 13 ～ 17、长冬草 8 ～ 12、败酱草 8 ～ 12、麦冬 17 ～ 22，将上述原料用水浸泡，煎熬后去渣得滤液。

[0009] 本发明的有益效果是，具有补肾纳气、益气养血之功效，对治疗小儿遗尿症具有显著的疗效，疗程短，见效快，治愈后不复发，安全无毒副作用。

[0010]

具体实施方式

[0011] 下面结合实施例对本发明作进一步的描述：

实施例 1：

由如下重量份的原料药制备而成，覆盆子 20、背扁黄耆 15、菟丝子 20、乌药 5、金樱子 15、防风 20、棒棒草 20、双肾藤 15、茯神 20、柴胡 25、白术 15、百部 5、白茅根 15、续断 10、萆薢 10、羌活 8、仙茅 15、长冬草 10、败酱草 10、麦冬 20。取上述 20 味中草药原料，总重量为 200 克加净化水 800 毫升，浸泡 6 小时，然后用武火煮沸文火煎熬 120 分钟，去渣得滤液约 150 毫升，药渣再加水 200 毫升，煎熬 30 分钟，去渣得滤液约 30 毫升，共得约 180 毫升药汁，每日分早中晚 3 次口服，每次约 60 毫升温药汤空腹服用。

[0012] 本发明覆盆子具有益肾固精缩尿，养肝明目之功效。常用于遗精滑精，遗尿尿频，阳痿早泄，目暗昏花；背扁黄耆有补肾固精、清肝明目之效，主治腰膝酸痛、遗精早泄、遗尿、尿频；菟丝子滋补肝肾、固精缩尿，安胎，明目，止泻。用于阳痿遗精、尿有余沥、遗尿尿频、腰膝酸软；乌药用于寒凝气滞，胸腹胀痛，气逆喘急，膀胱虚冷，遗尿尿频；金樱子具有固精缩尿，固崩止带，涩肠止泻之功效。常用于遗精滑精，遗尿尿频；防风有祛风解表，胜湿止痛，止痉的功效；棒棒草主治肺虚咳嗽，脾虚食少，心悸自汗，疲惫乏力，口干；双肾藤清热利湿，消肿止痛。用于防治痢疾，睾丸肿痛，阴囊湿疹；茯神有渗湿、健脾、宁心等功能。用于痰饮、水肿、小便不利、泄泻、心悸、眩晕；柴胡有和解表里，疏肝升阳之功效；白术具有健脾益气，燥湿利水，止汗，安胎的功效，用于脾虚食少，腹胀泄泻；百部止咳化痰、温润肺气、散热解表；白茅根凉血止血，清热利尿；续断补肝肾，续筋骨，调血脉。治腰背酸痛，足膝无力；萆薢用于膏淋，白浊，白带过多，风湿痹痛，关节不利，腰膝疼痛；羌活祛寒湿，用于外感风寒、头痛无汗、寒湿痹、上肢风湿疼痛；仙茅具有补肾助阳、益精血、强筋骨和行血消肿的作用；长冬草清热利湿，消食除积，祛痰止咳，利尿通淋；败酱草有清热解毒，祛瘀排脓等功效；麦冬养阴清热治疗阴虚内热或热病病伤津、心烦口渴。

[0013] 本发明各原料还可按下表所列重量比例混合的实施例来实现。其加工工艺与实施例 1 相同。（单位：重量份）

实施例	覆盆子	背扁黄耆	菟丝子	乌药	金樱子	防风	棒棒草	双肾藤	茯神	柴胡	白术	百部	白茅根	续断	萆薢	羌活	仙茅	长冬草	败酱草	麦冬
二	17	17	17	7	13	22	17	17	17	28	13	7	13	12	8	10	13	12	8	22
三	22	13	22	3	17	17	22	13	22	22	17	3	17	8	12	5	17	8	12	17

下面结合我院进行的临床试验对本发明作进一步、详细地描述：

1、病例选择：

选择确诊的小儿遗尿症患儿 236 例临床观察，病人随机分成治疗组和对照组两组，治疗组 118 例，其中男童 59 例，女童 59 例，年龄 2 ～ 11 岁，平均年龄 6.5 岁，平均病程 1 年；对照组 118 例，其中男童 59 例，女童 59 例，年龄 3 ～ 10 岁，平均年龄 6.5 岁，平均病程 1 年。

[0014] 治疗组和对照组两组病例的病程、症状轻重程度基本一致，无显著差异，具有可比性。

[0015] 2、药物选择：

治疗组服用本发明实施例一药剂，每日分早中晚 3 次口服，每次约 60 毫升温药汤空腹服用；5 天为 1 个疗程，治疗 1 ～ 3 个疗程。

[0016] 对照组服用阿托品，口服，按体重0.01mg/kg，每4～6小时一次，疗程视病情而定。

[0017] 3、疗效判定：

(1) 治愈：上述症状全部消失，身体恢复正常。

[0018] (2) 显效：上述症状明显减轻，身体有所好转。

[0019] (3) 有效：上述症状有所减轻，身体明显好转。

[0020] (4) 无效：通过治疗后上述症状无减轻或加重。

[0021] 4、结果：

组别	例数	治愈	显效	有效	无效	治愈率	总有效率
治疗组	118	59	32	25	2	50%	98.3%
对照组	118	34	26	17	41	28.8%	65.3%

以上结果显示，治疗组的治愈率和总有效率明显高于对照组。

[0022] 典型病例举例：

1、党某，男，7岁。患儿畏寒，脸色发白，上课爱动，注意力不集中，学习成绩偏下，自记事以来，尿床一直困扰着患儿，经过多方治疗无效，后来我院就诊，诊断为小儿遗尿症，服用本发明中药治疗，服用1个疗程后，症状减轻，继续服用1个疗程后，症状消失，痊愈。

[0023] 2、江某，女，8岁。患儿从小一直尿床，父母看着孩子有这个毛病心里焦虑不安，去年来我院就诊，诊断为小儿遗尿症，给予本发明中药治疗，服用1个疗程后，症状明显好转，继续服用2个疗程后，症状全部消失，痊愈，1年后随访无复发。