



(12) 发明专利申请

(10) 申请公布号 CN 105106756 A

(43) 申请公布日 2015. 12. 02

(21) 申请号 201510612840. 8

(22) 申请日 2015. 09. 23

(71) 申请人 谢桂斌

地址 541001 广西壮族自治区桂林市叠彩区
胜利路东一里 3 栋 2 单元 601 室

(72) 发明人 谢桂斌

(74) 专利代理机构 桂林市持衡专利商标事务所
有限公司 45107

代理人 石晓玲

(51) Int. Cl.

A61K 36/8994(2006. 01)

A61P 17/00(2006. 01)

权利要求书1页 说明书3页

(54) 发明名称

用于治疗老年斑的中药复合物

(57) 摘要

本发明公开了一种用于治疗老年斑的中药复合物,由下述重量份配比的原料制成:黄芪 15-21 份,薏苡 12-18 份,丝瓜络 9-15 份,红花 3-9 份、川芎 3-9 份、当归 8-12 份、大黄 8-12 份,生地 6-12 份、丹皮 6-12 份、郁金香 6-12 份、骨碎补 6-12 份、麦冬 6-12 份。本发明用于治疗老年斑的药物,选取 12 种天然中药科学配伍,配方简单,各原料药协同作用起到清热解毒、淡化色素、祛斑的效果,见效快,标本兼治,无毒副作用,而且其制备方法简单、服用方便,成本低,有效率达到 95% 以上。

1. 一种用于治疗老年斑的中药复合物,其特征是:由下述重量份配比的原料制成:

黄芪 15-21 份,薏苡 12-18 份,丝瓜络 9-15 份,红花 3-9 份、川芎 3-9 份、当归 8-12 份、大黄 8-12 份,生地 6-12 份、丹皮 6-12 份、郁金香 6-12 份、骨碎补 6-12 份、麦冬 6-12 份。

2. 根据权利要求 1 所述的用于治疗老年斑的中药复合物,其特征是:各原料的最佳重量份配比为:

黄芪 18 份,薏苡 15 份,丝瓜络 12 份,红花 6 份、川芎 6 份、当归 10 份、大黄 10 份,生地 9 份、丹皮 9 份、郁金香 9 份、骨碎补 9 份、麦冬 9 份。

3. 根据权利要求 1 所述的用于治疗老年斑的中药复合物,其特征是:

制备方法如下:按重量配比称取各原料药,加入混合置于容器中,再加原料量重量 10-20 倍的水煎煮 3 次,每次煎煮 25-35min,合并煎煮液,过滤去渣,滤液浓缩至 55-60℃下相对密度为 1.20-1.30 的浸膏,加入辅料,制成相应的剂型,即得。

用于治疗老年斑的中药复合物

技术领域

[0001] 本发明涉及中药,具体是一种用于治疗老年斑的中药复合物。

背景技术

[0002] 老年斑呈褐黑色,直径大多在 1 毫米至 10 毫米之间,大小不等,大的斑点直径可达 2-3 厘米,多数不高出皮肤,有的大斑(痣)也可以高出皮肤,呈扁平状,它由脂褐质色素构成,好发于老年人的面部、手背,小腿、足背、躯干等平常裸露的皮肤上,人们习惯称之为“寿斑”,医学上则称为老年性色素斑(痣)。老年斑不仅存在于皮肤,而且可出现于心脏、血管、肝脏和内分泌腺等处,影响着各脏器正常功能。因此,对于老年斑,医生建议对此切不可掉以轻心。

[0003] 一般情况下,老年斑不会对身体产生什么危害,未见老年斑相关并发症的报道,但是,如果发现在短时间内身上广泛出现老年斑,或发现脂溢性角化的皮疹,触之较硬,有角化性痂或有出血,瘙痒症状,应及时去医院检查以排除恶性皮肤病或其他疾病的可能。不仅影响美观,还有癌变的可能性。

[0004] 很多人处于美观角度出发,都会选择激光和手术去除,但是风险较大,且容易复发,对患者经济和生理造成一定的负担。而目前的一些中药的治疗效率也不甚理想,治疗周期长,且疗效不显著。

发明内容

[0005] 本发明的目的是提供一种疗效好、成本低、无毒副作用的用于治疗老年斑的中药复合物。

[0006] 实现本发明目的的技术方案是:

[0007] 一种用于治疗老年斑的中药复合物,由下述重量份配比的原料制成:

[0008] 黄芪 15-21 份,薏苡 12-18 份,丝瓜络 9-15 份,红花 3-9 份、川芎 3-9 份、当归 8-12 份、大黄 8-12 份,生地 6-12 份、丹皮 6-12 份、郁金香 6-12 份、骨碎补 6-12 份、麦冬 6-12 份。

[0009] 上述用于治疗老年斑的中药复合物,各原料的最佳重量份配比为:

[0010] 黄芪 18 份,薏苡 15 份,丝瓜络 12 份,红花 6 份、川芎 6 份、当归 10 份、大黄 10 份,生地 9 份、丹皮 9 份、郁金香 9 份、骨碎补 9 份、麦冬 9 份。

[0011] 所述的原料药材在中药店及市场有售。

[0012] 本发明药物的制备方法如下:按重量配比称取各原料药,加入混合置于容器中,再加原料量重量 10-20 倍的水煎煮 3 次,每次煎煮 25-35min,合并煎煮液,过滤去渣,滤液浓缩至 55-60℃下相对密度为 1.20-1.30 的浸膏,加入辅料,制成相应的剂型,即得。

[0013] 本发明中,各原料药的药理、功效如下:

[0014] 黄芪:有增强机体免疫功能、保肝、利尿、抗衰老、抗应激、降压和较广泛的抗菌作用。

[0015] 薏苡:有健脾利湿、清热排脓、美容养颜功能。

[0016] 丝瓜络:有祛风,通络,活血,下乳的功效。用于治疗痹痛拘挛、胸胁胀痛、乳汁不通,乳痈肿痛。

[0017] 红花:具有活血通经,散瘀止痛之功效。用于经闭,痛经,恶露不行,症瘕痞块,胸痹心痛,瘀滞腹痛,胸胁刺痛,跌扑损伤,疮疡肿痛。

[0018] 川芎:行气开郁,祛风燥湿,活血止痛。治风冷头痛眩晕,胁痛腹疼,寒痹筋挛,经闭,难产,产后瘀阻块痛,痈疽疮疡。

[0019] 当归:具有补血和血,调经止痛,润燥滑肠之功效。

[0020] 大黄:具有攻积滞、清湿热、泻火、凉血、祛瘀、解毒等功效。

[0021] 生地:具有清热凉血、益阴生津之功效。用于温热病热入营血,壮热神昏,口干舌绛。

[0022] 丹皮:清热凉血;活血散瘀。温热病热入血分;发斑;吐衄;热泪盈眶病菌后期热伏阴分发热;阴虚骨蒸潮热;血滞经闭;痛经;痈肿疮毒;跌扑伤痛;风湿热痹。

[0023] 郁金香:化湿辟秽。主脾胃湿浊;胸脘满闷;呕逆腹痛;口臭苔腻。

[0024] 骨碎补:补肾强骨,续伤止痛。用于肾虚腰痛,耳鸣耳聋,牙齿松动,跌扑闪挫,筋骨折伤;外治斑秃,白癜风。

[0025] 麦冬:养阴生津,润肺清心。用于肺燥干咳,阴虚癆嗽,喉痹咽痛,津伤口渴,内热消渴,心烦失眠,肠燥便秘。

[0026] 本发明用于治疗老年斑的药物,选取 12 种天然中药科学配伍,配方简单,各原料药协同作用起到清热解毒、淡化色素、祛斑的效果,见效快,标本兼治,无毒副作用,而且其制备方法简单、服用方便,成本低。

具体实施方式

[0027] 下面结合实施例对本发明内容作进一步的说明,但不是对本发明的限定。

[0028] 实施例 1

[0029] 一种用于治疗老年斑的中药组合物,原料药的重量配比为:

[0030] 黄芪 15kg,薏苡 12kg,丝瓜络 9kg,红花 3kg、川芎 3kg、当归 8kg、大黄 8kg,生地 6kg、丹皮 6kg、郁金香 6kg、骨碎补 6kg、麦冬 6kg。

[0031] 制备方法如下:按上述称取各原料药混合置于容器中,再加原料量重量 10 倍的水煎煮 3 次,每次煎煮 25min,合并煎煮液,过滤去渣,滤液浓缩至 55℃ 下相对密度为 1.20 的浸膏,加入辅料,制成片剂,每片 0.1g。

[0032] 实施例 2

[0033] 一种用于治疗老年斑的中药组合物,原料药的重量配比为:

[0034] 黄芪 18kg,薏苡 15kg,丝瓜络 12kg,红花 6kg、川芎 6kg、当归 10kg、大黄 10kg,生地 9kg、丹皮 9kg、郁金香 9kg、骨碎补 9kg、麦冬 9kg。

[0035] 制备方法如下:按上述称取各原料药混合置于容器中,再加原料量重量 10 倍的水煎煮 3 次,每次煎煮 28min,合并煎煮液,过滤去渣,滤液浓缩至 55℃ 下相对密度为 1.20 的浸膏,加入辅料,制成片剂,每片 0.2g。

[0036] 实施例 3

[0037] 一种用于治疗老年斑的中药组合物,原料药的重量配比为:

[0038] 黄芪 21kg, 薏苡 18kg, 丝瓜络 15kg, 红花 9kg、川芎 9kg、当归 12kg、大黄 12kg, 生地 12kg、丹皮 12kg、郁金香 12kg、骨碎补 12kg、麦冬 12kg。

[0039] 制备方法如下:按上述称取各原料药混合置于容器中,再加原料量重量 10 倍的水煎煮 3 次,每次煎煮 33min,合并煎煮液,过滤去渣,滤液浓缩至 58℃下相对密度为 1.30 的浸膏,加入辅料,制成丸剂,每粒 0.4g。

[0040] 实施例 4

[0041] 一种用于治疗老年斑的中药组合物,原料药的重量配比为:

[0042] 黄芪 21kg, 薏苡 18kg, 丝瓜络 15kg, 红花 9kg、川芎 9kg、当归 12kg、大黄 12kg, 生地 12kg、丹皮 12kg、郁金香 12kg、骨碎补 12kg、麦冬 12kg。

[0043] 制备方法如下:按上述称取各原料药混合置于容器中,再加原料量重量 10 倍的水煎煮 3 次,每次煎煮 35min,合并煎煮液,过滤去渣,滤液浓缩至 60℃下相对密度为 1.30 的浸膏,加入辅料,制成丸剂,每粒 0.5g。

[0044] 为了进一步证明本发明中药的临床疗效,选择收治患者中的 400 例,对本发明药物的疗效进行临床观察。年龄 50-70 岁,随机分为 4 组,每组为 100 例,分别为实验组 1-4 组。

[0045] 实验组 1-4 组分别服用实施例 1-4 的药物,每日 4 次,每次内服 2 片/粒,30 天为一个疗程,连续服用 2 个疗程。其中显效 375 例,有效 380 例,治愈 370 例,无效 20 例,治愈率 92.5%,有效率 95%。