

(19) Országkód:

HU



**MAGYAR
KÖZTÁRSASÁG**

**ORSZÁGOS
TALÁLMÁNYI
HIVATAL**

SZABADALMI LEÍRÁS

(11) Lajstromszám:

209 596 B

(21) A bejelentés száma: 5649/89
(22) A bejelentés napja: 1989. 11. 02.
(30) Elsőbbségi adatok:
P 39 27 449 1989. 08. 19. DE
P 38 37 273 1988. 11. 03. DE

(51) Int. Cl.⁵

C 12 N 15/62

C 12 N 15/17

C 12 N 15/76

(40) A közzététel napja: 1990. 11. 28.
(45) A megadás meghirdetésének dátuma a Szabadalmi
Közlönyben: 1994. 08. 29. SZKV 94/08

(72) Feltalálók:

dr. Koller, Klaus Peter, Bad Soden/Taunus (DE)
dr. Uhlmann, Eugen, Glashütten/Taunus (DE)
dr. Rieb, Günther Johannes, Frankfurt/Main (DE)
dr. Wallmeier, Holger, Bad Soden/Taunus (DE)

(73) Szabadalmaz:

Hoechst Ag., Frankfurt/Main (DE)

(74) Képviselő:

Danubia Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
Budapest

(54)

Eljárás inzulin-előtermék előállítására Streptomycesben

(57) KIVONAT

A találmány tárgya eljárás inzulin előtermék előállítására fúziós fehérje formájában Streptomyces gazdasejtben, oly módon, hogy egy, adott esetben módosított tendamistat génhez az inzulin B láncát az A láncsal egy Lys-t vagy Lys-Lys-t kódoló hídtaggal összekötő proinzulin struktúrgént kapcsolnak, kívánt

esetben egy összekötő oligonukleotid hídtaggal, a kapott génszerkezetet expressziós plazmidba építik, az expressziós plazmiddal egy Streptomyces lividans gazdasejtet transzformálnak, a gazdasejtet tenyésztik, és a szekretálódó fúziós fehérjét a tenyészközegből kinyerik.

A találmány tárgya eljárás *Streptomyces*-ben inzulin előtermékek előállítására.

Ismertek olyan eljárások, amelyekben fúziós fehérjéket állítanak elő oly módon, hogy a kívánt fehérjéhez szükséges strukturgént az adott esetben módosított tendamistat-génhez kapcsolják, a strukturgént egy *Streptomyces* gazdasejtben kifejezik, majd a kiváló fúziós fehérjét a tenyészetből kinyerik, lásd pl. 3 714 866 A1 számú német szövetségi köztársaságbeli és 289 936 A2 számú európai közrebecsítási iratok. Ezen leírásokban génstruktúrákat is ismertetnek, amelyek a már említett, adott esetben módosított tendamistat gént tartalmazák, amelyek C-terminális végéhez egy másik proteinhez szükséges strukturgén van kapcsolva, ismertek továbbá vektorok, amelyek ilyen génstruktúrákat tartalmaznak, továbbá *Streptomyces* sejtek, amelyek ilyen vektorokat tartalmaznak, továbbá fúziós fehérjék, amelyeket egy adott esetben módosított tendamistat N-állású részével lehet jellemezni. A korábbi bejelentések továbbá fúziós fehérjéket írnak le, amelyekben a tendamistat aminosav-szekvenciája egy hídtagon keresztül kapcsolódik a majom-proinzulinhoz.

A fentieket továbbfejlesztve azt tapasztaltuk, hogy az ilyen eljárásokkal különlegesen előnyösen állíthatunk elő egy olyan fúziós fehérjét, amelyben a tendamistat részt egy rövidített proinzulin követ, amelynek C-lánca csupán egy vagy két lizincsoportból áll. Az ilyen előterméket különösen előnyösen és alacsony költséggel lehet humán inzulinná alakítani.

A találmány szerinti eljárás egy előnyös megvalósítási formája olyan, a gén beépítésére és kifejezésére alkalmas génstruktúrákra vonatkozik, amelyek a fúziós fehérjéket kódolják.

A találmány szerinti eljárásnál felhasznált génstruktúrák alapja egy szintetikus gén, amely a proinzulin-származékot kódolja. Célszerűen az ilyen génszerkezetek kialakításánál a *Streptomyces* speciális kodonhasználatát figyelembe vesszük, ilyenkor a fúziós fehérjék kitermelése figyelemreméltóan növekszik.

Előnyös továbbá terminátor szekvenciák beépítése az ilyen génszerkezetekben, mivel ezáltal a termelékenység fokozható.

A találmány szerinti eljárás előnye, hogy a fúziós fehérjék a 161 629 számú európai szabadalmi leírás 3. példájában, valamint a 3 536 182. számú német szövetségi köztársaságbeli közrebecsítási iratban ismertetett lemez-tesztel kimutathatók. Ezáltal nemcsak az érdekes fontos klónok szelektálhatók, hanem a feldolgozás is jelentős mértékben könnyebbé válik, mivel a különböző paramétereknek a kitermelésre kifejtett hatása igen könnyen megállapítható.

A találmány szerinti eljárással előállított fúziós fehérjék nyilvánvalóan az érett inzulinval azonos vagy legalábbis igen hasonló szerkezetűek. Ezáltal nemcsak a kapott inzulinna való továbbfeldolgozás könnyebb, hanem meglepő módon a jó kitermelést biztosító fermentációs időknél nem észrevehető, hogy a fermentációs közegben kiváló proteázok hátrányos hatása érvényesülne.

A találmány szerinti módosítása a proinzulin mole-

kulának a rövidített C-lánc révén egy egyszerű eljárást tesz lehetővé a humáninzulinna való továbbfeldolgozáshoz, amit kémiai hasítással, hidroxil-ammal és/vagy enzimikus hasítással tripsinnel vagy előnyösen lizil-endoproteinázsal végzünk. Az enzimikus hasítás az előnyös. A lizil-endoproteinázok specifikusan karboxil-terminálisan a lizin aminosav után hasítanak. A találmány szerinti eljárással előállított fúziós fehérjékben az A- és B-láncok kedvező elrendezése miatt az említett enzimek hatására olyan inzulin előtermék képződik, amelyben meglepetésszerűen a diszulfid-hidak helyesen vannak kapcsolva.

A génszerkezetekben célszerűen a tendamistat-rész és a proinzulin molekula kezdete között olyan hídtagot biztosítunk, amely a proinzulin-származéknak a tendamistat-részről való lehasítását ugyanazzal az enzimmel teszi lehetővé, amely a proinzulin-származéknak a két inzulinláncba való hasításához szolgál.

Ha a találmány szerinti fúziós fehérjét egy lizil-endopeptidázsal hasítjuk, akkor a módosított C-lánc konstrukciójától függően Dez-B³⁰-inzulint nyerünk, amely átpeptidázalással humán inzulinna alakítható, vagy B³¹-Lys-inzulint vagy B³¹-Lys-B³²-Lys-inzulint nyerünk, amelyek például karboxipeptidáz B-vel humáninzulinna alakíthatók.

Különösen jó kitermelést érünk el a kívánt fehérjére vonatkozóan, ha a génszerkezetet egy rövidített tendamistat génnel helyettesítjük. Ezen előnyös kiviteli formának az az előnye, hogy a módosított inzulin kb. a felét teszi ki a fúziós fehérjének, azaz az kevesebb ballasztot tartalmaz. A fúziós fehérje helyes hajtottságát a tendamistat-rész rövidítése nem befolyásolja, így a találmány szerint nyert kisebb fúziós fehérjék is igen előnyösen feldolgozhatók. Ugyancsak nem mutatható ki, hogy a fehérjék gazda-proteázokkal könnyebben lebonthatók lennének, sőt ezekkel szemben meglepetésszerűen nagyobb stabilitás mutatkozik.

A találmány szerinti eljárásnál számos, előnyös génszerkezet alkalmazható, amelyek mind olyan inzulin-előtermékhez vezetnek, amelyek a fúziós fehérje ballasztanyagától könnyen elválaszthatók. A könnyű feldolgozhatóság következtében a humáninzulin kihozatala tovább növelhető.

A fúziós fehérjének a tenyészközegtől való elválasztását, az inzulin előtermékké való tovább-feldolgozását, valamint a humáninzulinna való átalakítását ismert eljárások szerint végezzük. Így például a fúziós fehérjéket előnyösen adszorpciós- vagy ioncsereelő kromatográfiával és/vagy géliszűrővel izoláljuk és a proinzulin részt kémiai- vagy előnyösen enzimatikusan hasítjuk. A megfelelő hídtag konstrukciója általában ismert, például a 229 998-A számú európai szabadalmi leírásban van leírva.

A 089 007-B számú európai szabadalmi leírásban analóg pre-proinzulinok és proinzulinok vannak leírva, amelyeknél a preláncon (illetve a proinzulin N-terminálisán) Lys vagy Arg tag van (amely a találmány szerinti eljárással nyert konstrukció esetében is előnyös), amelyeknek B-lánca B²⁹-Lys-taggal végződik és amelyeknél a C-peptid Lys vagy Arg tagra rövidítve lehet úgy, hogy a proinzulinszerkezetben a legeggy-

szerűbb esetben a B²⁹-Lys után csak Lys vagy Arg következik és az A-lánc ehhez kapcsolódik. Ezek a vegyületek elővegyületként szolgálnak inzulinnak tripszinnel vagy tripszinhez hasonló endopeptidázokkal és egy adott esetben védőcsoporttal ellátott természetes aminosav-észterrel végzett előállításához.

A 195 691 A-számú európai közrebocsátási iratból olyan inzulin előtermékek ismertek, amelyek B és A láncra egy -X-Y-híddal van összekötve, amelyben X és Y azonos vagy különböző és Lys vagy Arg jelentésű. Ezen inzulin előtermékeket élesztőből nyerik ki, majd enzimátikus átalakítással humán inzulinná alakítják. Rövidített C-láncú inzulin előtermékek ismertek továbbá a 163 529 számú európai szabadalmi leírásból is. A 132 769 és 132 770 B számú európai szabadalmi leírásokban inzulinszármazékokat és ilyeneket tartalmazó gyógyszerkészítményeket ismertetnek.

A következő példával a találmány szerinti eljárást közelebbről ismertetjük. Amennyiben másképpen nem jelöljük, a százalékos adatok tömeg%-ot jelentenek. A példák szerinti géntechnológiai manipulációs módszerek pl. a következő irodalmi helyen vannak részletesen ismertetve: Moniat és társai: „Molecular cloning”. A laboratory manual. Cold Spring Harbor Laboratory, New York, 1982.

Az ábrán az 1. példa szerinti génszerkezetet mutatjuk be.

1. példa

Az 1. táblázat szerinti szintetikus gént (1) önmagában ismert módon foszfoamidit módszer szerint kémiai

Phe	Asn	Ala	Met	Ala	Thr	Gly	Asn	Ser	Asn	Gly	Lys
TTC	AAT	GCG	ATG	GCC	ACC	GGG	ATT	TCG	AAC	GGC	AAG
AAG	TTA	CGC	TAC	CGG	TGG	CCC	TAA	AGC	TTG	CCG	TTC
EcoRI											

következik, majd ezt a találmány szerint módosított proinzulinhoz szükséges gén követi. A helyes elrendezést SphI-gyel és SstI-gyel végzett hasítással lehet ellenőrizni, amikor is a kb. 3,5 kb nagyságú plazmidból egy 833 bp fragmenst nyerünk. A szekvencia helyességét a didezoxi-módszerrel végzett DNS-szekvenálással bizonyítjuk.

Olyan génszerkezeteket, amelyekben a C-peptidként működő Lys tagot egy további Lys taggal egészítjük ki, hasonlóképpen állítjuk elő, ehhez a Lys-t kódoló AAG kodont megduplázunk, amikor is a pI1 plazmidot, majd ebből a pKK600 plazmidot nyerjük.

2. példa

A 3 714 886 A1 számú NSZK-beli szabadalmi leírásban leírtakhoz hasonlóan (pGF1 vektor) a pKK500 és pKK600 vektorokból előállítjuk a pGF2 és pGF3 expressziós plazmidokat. Ehhez a pKK500 és pKK600 vektorokat kettős emésztéssel, SphI-gyel és SalI-gyel emésztjük, a 823 és 826 bp inszertumot izoláljuk és ezeket a DNS fragmenseket azonos enzimmel hasított pIJ702 expressziós plazmidba ligáljuk. A ligációs keveréket S. lividans TK 24-be (hozzáférhető: The John

úton szintetizáltuk. A kód kiválasztáshoz Streptomycesben G és C volt preferálva a 3 714 866 A1 számú NSZK-beli közrebocsátási irat 2. táblázatban ismertetett majom proinzulint kódoló génhez hasonlóan, az 1. táblázat szerinti (1) gén az 5'-végén az EcoRI restrikciós enzim hasítóhelyének szekvenciáját mutatja. A szerkezeti gén után két záró kód és egy linker-szekvencia, a SalI enzim számára felismerhető hellyel, következik. A 3'-végén van a HindIII restrikciós enzim hasítóhelyének megfelelő átnyúló szekvencia.

A kereskedelmi forgalomban beszerezhető pUC19 plazmidot az EcoRI és HindIII enzimekkel hasítjuk és az (1) szintetikus génnel ligáljuk. Ily módon nyerjük a (2) pI1 plazmidot. A beépítés után a szintetikus gént az EcoRI-gyel és SalI-gyel (3) fragmensként hasítjuk és a továbbiakban leírt szerkezeteknél alkalmazzuk.

A pUC19 plazmidot az SmaI-gyel teljesen emésztjük és a 2. táblázatban megadott (4) terminátor szekvenciával ligáljuk. Az így kapott, ezt a szekvenciát a helyes orientációban tartalmazó plazmidot pT1 (5)-ként jelöljük. Ezt az (5) plazmidot EcoRI-gyel nyitjuk és a vágási helyet DNS-polimerázzal (Klenow fragmens) kitöltjük. Ily módon nyerjük a (6) plazmidot, melyet SalI-gyel és SphI-gyel nyitunk és a (7) nagy fragmenst izoláljuk.

A pKK400 (8) plazmidot 3 714 866 A1 számú NSZK-beli közrebocsátási irat, 4. ábra (20) SphI-gyel és EcoRI-gyel nyitjuk és a (9) kis fragmenst a tendamistat génnel együtt izoláljuk.

A (3), (7) és (9) fragmensek ligálásával nyerjük a pKK500 plazmidot (10), amelyben a tendamistat szekvencia után a 12 aminosavat kódoló hídtag:

Innes Foundation, Norwich, Anglia; részletes leírása: D. A. Hapwood és társai: „Genetic Manipulation of Streptomyces”. A laboratory manual, The John Innes Foundation, Norwich, 1985.) transzformáljuk és a plazmid-DNS-t a tendamistat aktivitást mutató (lemez teszt) tiosztrepton rezisztens transzformánsokból izoláljuk. Minden pozitív klón tartalmazza az alkalmazott, pKK500-ból és pKK600-ból álló inszertumot.

A kódolt fúziós fehérje expresszióját ismert módon lehet követni. A transzformált S. lividans TK 24 törzset négy napon át 28 °C hőmérsékleten rázó lombikban inkubáljuk, a micéliumot a tenyészközegtől centrifugálással elválasztjuk és a kapott tisztá oldatból a fúziós fehérjét a következőképpen kimutatjuk:

10–100 µl oldatot 20–200 µl 15%-os triklór-ecet-sav oldattal elkeverünk, a kiváló fehérjét centrifugálással elválasztjuk, mossuk és SDS-tartalmú pufferoldattal [U. Laemmli, Nature, 227 (1970) 680–685] felvesszük. Két percig 90 °C hőmérsékleten inkubáljuk és elektroforetikus 10–17%-os SDS-poliakrilamidgélben elválasztjuk, amikor is 15 kD molkulatömegű fehérjét nyerünk, amely a tendamistatból és proinzulinból álló fúziós fehérje várt molkulatömeg tartományába esik.

A fúziós fehérje a tendamistat elleni antitestekkel, valamint az inzulin elleni antitestekkel egyaránt reagál.

3. példa

pTF2 expressziós vektort (3 714 866 A1 számú német szövetségi köztársaságbeli közrebocsátási irat 4. példa) EcoRI és SstI restrikciós enzimekkel emésztünk és a majom-proinzulint kódoló fragmenst eltávolítjuk. A kapott 5,65 kbp nagyságú fragmenst az alábbi leírt ligálási reakciónál alkalmazzuk.

Az 1. példa szerinti pKK500 plazmidból azonos restrikciós enzimmel egy 285 bp nagyságú DNS-fragmenst hasítunk, amely a rövidített proinzulin gént valamint a terminátor szekvenciát tartalmazza.

A pTF2-ből nyert 5,65 kbp nagyságú fragmens és pKK500-ból nyert 285 bp nagyságú fragmens ligálásával nyerjük a pTF3 expressziós plazmidot.

Ha *Streptomyces lividans* TK24 protoplasztokat a ligációs keverékkel transzformálunk, olyan klónokat nyerünk, amelyek tiosztrepton rezisztensek és egy fúziós fehérjét választanak ki, amely proinzulin elleni antitestekkel reagálni képes. Ez a fúziós fehérje a tendamistat első 41 aminosavjából, a

Pro-Ser-Leu-Asn-Ser-Asn-Gly-Lys
hídtaggal és a rövidített proinzulinból áll.

A találmány szerinti eljárásunk előnye a jó feldolgozhatóságon kívül – mint azt már korábban is említettük –, a jó kitermelés a kívánt fehérjére vonatkozóan. Ez esetünkben 20–100 mg/l fehérjét jelent, ami jelentős mértékben felülmúlja pl. a 195 691 számú európai szabadalmi leírás eljárása szerint nyerhető fehérje mennyiségét, ami ott az 1. táblázat No. 9. példája szerint kb. 12 mg/l, ami az ott megadott 2 µmol/l értéknek felel meg.

1. táblázat

B ¹							10								
ASN	SER	ASN	GLY	LYS	PHE	VAL	ASN	GLN	HIS	LEU	CYS	GLY	SER	HIS	
AAT	TCG	AAC	GGC	AAG	TTC	GTC	AAC	CAG	CAC	CTG	TGC	GGC	TCG	CAC	
							GC	TTG	CCG	TTC	AAG	CAG	TTG	GTC	
(EcoRI)							GTG	GTG	GAC	ACG	CCG	AGC	GTG		
							20							30	
LEU	VAL	GLU	ALA	LEU	TYR	LEU	VAL	CYS	GLY	GLU	ARG	GLY	PHE	PHE	
CTC	GTG	GAG	GCC	CTC	TAC	CTG	GTG	TGC	GGG	GAG	CGC	GGC	TTC	TTC	
GAG	CAC	CTC	CGG	GAG	ATG	GAC	CAC	ACG	CCC	CTC	GCG	CCG	AAG	AAG	
							C	A ¹	40						
TYR	THR	PRO	LYS	THR	LYS	GLY	ILE	VAL	GLU	GLN	CYS	CYS	THR	SER	
TAC	ACC	CCC	AAG	ACC	AAG	GGC	ATC	GTG	GAG	CAG	TGC	TGT	ACG	TCC	
TTG	TGG	GGG	TTC	TGG	TTC	CCG	TAG	CAC	CTC	GTC	ACG	ACA	TGC	AGG	
							50								
ILE	CYS	SER	LEU	TYR	GLN	LEU	GLU	ASN	TYR	CYS	ASN	STP	STP		
ATC	TGC	TCC	CTC	TAC	CAG	CTC	GAG	AAC	TAC	TGC	AAC	TAG	TAA		
TAG	ACG	AGG	GAG	ATG	GTC	GAG	CTC	TTG	ATG	ACG	TTG	ATC	ATT		
							GTC GAC CTG CAG CCA								
							CAG CTG GAC GTC GGT TCG A								
SalI							(HindIII)								

2. táblázat

5'-OGATAAACCGATACAATTAAAGGCTCCTTTTGGAGCCTTTTTTTTTTGGAGATTTTCAACGTGGATC
GCTATTTGGCTATGTTAATTTCCGAGGAAAACCTCGGAAAAAAAACCTCTAAAAGTTGCACCTAG-5'

SZABADALMI IGÉNYPONTOK


1. Eljárás inzulin előtermék előállítására fúziós fehérje formájában *Streptomyces* gazdasejtben, azal jellemezve, hogy egy, adott esetben módosított, tendamistat génhez az inzulin B-láncát az A láncsal egy Lys-t vagy Lys-Lys-t kódoló hídtaggal összekötő proinzulin struktúrgént kapcsolunk, kívánt esetben egy összekötő oligonukleotid hídtaggal, a kapott génszerkezetet expressziós plazmidba építjük, az expressziós plazmiddal egy *Streptomyces lividans* gazdasejtet transzformálunk, a gazdasejtet tenyésztjük, és a szekretálódó fúziós fehérjét a tenyészközegből kinyerjük.

Elsőbbsége: 1988. 11. 03.

2. Eljárás inzulin előtermék előállítására fúziós fehérje formájában *Streptomyces* gazdasejtben, azal jellemezve, hogy egy rövidített tendamistat génhez az inzulin B-láncát az A láncsal egy Lys-t vagy Lys-Lys-t kódoló hídtaggal összekötő proinzulin struktúrgént kapcsolunk, kívánt esetben egy összekötő oligonukleotid hídtaggal, a kapott génszerkezetet expressziós plazmidba építjük, az expressziós plazmiddal egy *Streptomyces lividans* gazdasejtet transzformálunk, a gazdasejtet tenyésztjük, és a szekretálódó fúziós fehérjét a tenyészközegből kinyerjük.

Elsőbbsége: 1989. 08. 19.

60



1. ábra