



(12) 发明专利

(10) 授权公告号 CN 103638257 B

(45) 授权公告日 2016.02.17

(21) 申请号 201310576160.6

(22) 申请日 2013.11.18

(73) 专利权人 武汉凌科达科技有限公司

地址 430000 湖北省武汉市东湖新技术开发区九峰街景源里社区西5栋1单元1801号

100 例疗效观察.《新中医》.2003,第35卷(第3期),21-22.

医学教育网.乌梅汤可治慢性腹泻.《医学教育网》.2008,

审查员 刘超

(72) 发明人 不公告发明人

(51) Int. Cl.

A61K 36/8945(2006.01)

A61P 1/12(2006.01)

(56) 对比文件

吴燕山.五更泄泻验案.《实用医学杂志》.1985,(第1期),41.

路小平.风热灵合剂的研制临床应用.《内蒙古中医药》.2004,(第4期),25.

陈锐.董建华慢性腹泻治验.《中国社区医师》.2012,(第43期),18.

高峰.史正刚治疗小儿慢性腹泻经验浅识.《中国民间疗法》.2006,第14卷(第10期),11.

杨银良.和胃汤加减治疗功能性消化不良

权利要求书1页 说明书2页

(54) 发明名称

防治慢性腹泻的药物的制备方法

(57) 摘要

本发明公开了一种防治慢性腹泻的药物的制备方法包括如下步骤:按重量份取原料药备用;将上述原料药混合后进行浸泡,然后分多次加水煎煮,每次煎煮后过滤掉药渣提取滤液;合并上述滤液,将滤液冷却至30度以下后装瓶密封,起到健脾和胃,止泻固肠的作用,而且简便易行,费用低,无毒副作用、不良反应小。

1. 一种防治慢性腹泻的药物的制备方法,其特征在于包括如下步骤:

第一步:按重量份取原料药破故纸 30 份、吴茱萸 30 份、肉豆蔻 20 份、五味子 10 份、炙甘草 5 份、莱菔子 10 份、白术 10 份、大枣 30 份、白芍 10 份、山药 10 份和蜀椒 20 份备用;

第二步:将上述原料药混合后进行浸泡,然后分多次加水煎煮,每次煎煮后过滤掉药渣提取滤液;

第三步:合并上述滤液,将滤液冷却至 30 度以下后装瓶密封。

2. 根据权利要求 1 所述的防治慢性腹泻的药物的制备方法,其特征在于在第二步中:第一次煎煮时,加水量为药物重量的 12 倍,浸泡时间为 1 小时,煎煮时间为 1 小时;第二次煎煮时,加水量为药物重量的 8 倍,煎煮时间为 0.5 小时;第三次煎煮时,加水量为药物重量的 4 倍,煎煮时间为 20 分钟。

## 防治慢性腹泻的药物的制备方法

### 技术领域

[0001] 本发明涉及中药技术领域,具体为一种防治慢性腹泻的药物的制备方法。

### 背景技术

[0002] 腹泻是指排便次数明显超过平日习惯的频率,粪质稀薄,每日排粪量超过 200g,或含未消化食物或脓血。慢性腹泻指病程在两个月以上的腹泻或间歇期在 2-4 周内的复发性腹泻。如果不及时治疗会产生以下后果:慢性腹泻会引起贫血:由于消化吸收的障碍,蛋白质及其他造血原料的吸收减少,可引起贫血,出现指甲、手掌、皮肤以及口唇、和睑结膜等处颜色苍白,疲倦乏力,头晕耳鸣,注意力不集中等贫血症状,甚至可出现营养不良性水肿。危害二、慢性腹泻会降低身体的抵抗力:腹泻引起的营养不良、贫血及维生素缺乏等,可使人体对传染病及各种感染的抗病能力减弱,炎症容易扩散,也可使组织再生及外伤愈合能力减弱,受伤后伤口不易愈合。危害三、慢性腹泻会引起营养不良:胃肠道是人体吸收营养物质的唯一途径,摄入的食物和其他营养物质在胃肠道消化和分解后,有用的部分被吸收,无用的残渣由粪便排出。腹泻时,人体对营养的吸收发生严重障碍,能量供给不足,使人感到头昏眼花、口干舌燥、四肢疲乏、心慌气短,甚至出现营养不良表现。危害四、慢性腹泻会导致维生素缺乏:长期腹泻可直接影响机体对维生素的吸收,引起维生素的缺乏。有些人腹泻日久后出现皮肤头发干燥,头发失去正常光泽和滋润,间有散在性脱落,产生早秃现象,此为缺乏维生素 A 所致;又如,有些人出现舌炎、口角炎、多发性神经炎,这是缺乏维生素 B 的结果。

### 发明内容

[0003] 本发明的目的是为了克服上述现有技术的不足之处,按照中医药理论提供一种防治慢性腹泻的药物的制备方法。

[0004] 本发明防治慢性腹泻的药物的制备方法包括如下步骤:

[0005] 第一步:按重量份取原料药破故纸 30 份、吴茱萸 30 份、肉豆蔻 20 份、五味子 10 份、炙甘草 5 份、莱菔子 10 份、白术 10 份、大枣 30 份、白芍 10 份、山药 10 份和蜀椒 20 份备用;

[0006] 第二步:将上述原料药混合后进行浸泡,然后分多次加水煎煮,每次煎煮后过滤掉药渣提取滤液;

[0007] 第三步:合并上述滤液,将滤液冷却至 30 度以下后装瓶密封。

[0008] 在第二步中:第一次煎煮时,加水量为药物重量的 12 倍,浸泡时间为 1 小时,煎煮时间为 1 小时;第二次煎煮时,加水量为药物重量的 8 倍,煎煮时间为 0.5 小时;第三次煎煮时,加水量为药物重量的 4 倍,煎煮时间为 20 分钟。

[0009] 本发明根据中医组方原则以破故纸、吴茱萸、肉豆蔻、五味子、炙甘草、莱菔子、白术、大枣、白芍、山药和蜀椒为原料药组方,方中各味药协同起效,起到健脾和胃,止泻固肠的作用,而且简便易行,费用低,无毒副作用、不良反应小。

### 具体实施方式

[0010] 本发明防治慢性腹泻的药物的制备方法包括如下步骤：

[0011] 第一步：按重量份取原料药破故纸 30g、吴茱萸 30g、肉豆蔻 20g、五味子 10g、炙甘草 5g、莱菔子 10g、白术 10g、大枣 30g、白芍 10g、山药 10g 和蜀椒 20g；

[0012] 第二步：将上述原料药混合后进行浸泡，然后分多次加水煎煮，每次煎煮后过滤掉药渣提取滤液；

[0013] 第三步：合并上述滤液，将滤液冷却至 30 度以下后装瓶密封。

[0014] 在第二步中：第一次煎煮时，加水量为药物重量的 12 倍，浸泡时间为 1 小时，煎煮时间为 1 小时；第二次煎煮时，加水量为药物重量的 8 倍，煎煮时间为 0.5 小时；第三次煎煮时，加水量为药物重量的 4 倍，煎煮时间为 20 分钟，以上为一剂。

[0015] 为表明本发明中药对慢性腹泻的防治效果，从武汉各医院选取 450 例已经确诊的成年慢性腹泻患者为观察对象进行系统临床观察，其中男性 270 例，女 180 例，年龄 30-60 岁，病程 6 个月至 30 年。

[0016] 服用方法：对观察对象口服实施例的口服液，每日三次，一次一剂 200ml，3 天为一疗程，观察期 6 天，共两个疗程。

[0017] 根据《中医病证诊断疗效标准》疗效评定标准如下：

[0018] 1、治愈：大便正常，腹痛肠鸣和发热等其他症状消失，临床检验正常。

[0019] 2、好转：大便次数明显减少，腹痛肠鸣和发热等其他症状改善。

[0020] 3、未愈：症状未见改善。

[0021] 服药期间临床疗效观察分析结果如下：

[0022]

| 性别 | 例数  | 治愈（占例数比）    | 好转（占例数比）    | 未愈（占例数比）  | 总有效率   |
|----|-----|-------------|-------------|-----------|--------|
| 男  | 270 | 190(70.37%) | 72 (26.67%) | 8 (0.29%) | 97.04% |
| 女  | 180 | 119(66.11%) | 55 (30.55%) | 6 (0.33%) | 96.66% |

[0023] 从上表中可以计算出本发明临床总有效率为 96.85%，并且在观察期间未发现有明显的毒副作用。