(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)发明专利

(10)授权公告号 CN 102784311 B
(45)授权公告日 2014.02.26

(21)申请号 201210309597.9

(22)申请日 2012.08.28

(73)专利权人 李山岭
地址 450000 河南省郑州市惠济区老鸦陈办事处石河村石河街9号

(72)发明人 李山岭

(74)专利代理机构 郑州联科专利事务所(普通合伙) 41104
代理人 时立新 张智伟

(51)Int.Cl.
A61K 36/8988(2006.01)
A61P 15/00(2006.01)
A61P 29/00(2006.01)

审查员 谢京晶

权利要求书1页 说明书4页

(54)发明名称

一种治疗妇女产后病的中药组合物及其制备方法

(57)摘要

本发明属于中药技术领域,具体公开了一种治疗妇女产后病的中药组合物及其制备方法。所述中药组合物由下述重量份数的原料药制成:黄连2-5份、天麻10-15份、制首乌3-6份、当归5-10份、甘草3-6份、木香1-3份、白术1-3份、荆芥1-3份、党参5-10份、苍术40-60份、桔梗4-8份、防风4-8份、川芎5-10份、白芷5-10份、桃仁1-3份、细辛1-3份、麻黄4-8份、大茴香4-8份。本发明属于纯中药制剂,无副作用,对妇女产后病有特高疗效:病程在百日之内的,治愈率为90%,总有效率为97%;病程大于百日-15年的,治愈率为65%,总有效率为81%,并且可以起到无病防病的作用。

CN 102784311 B

1. 一种治疗妇女产后病的中药组合物，其特征在于由下述重量份数的原料药制成：黄连 2-5 份、天麻 10-15 份、制首乌 3-6 份、当归 5-10 份、甘草 3-6 份、木香 1-3 份、白术 1-3 份、荆芥 1-3 份、党参 5-10 份、苍术 40-60 份、桔梗 4-8 份、防风 4-8 份、川芎 5-10 份、白芷 5-10 份、桃仁 1-3 份、细辛 1-3 份、麻黄 4-8 份、八角茴香 4-8 份，制备方法为制备方法 1 或制备方法 2，所述制备方法 1 为：将所述原料药放在一起共研细粉，然后每 7 重量份药粉加红糖 25-75 重量份、黄酒 25-75 重量份、水 50-100 重量份，隔水煎药 40-45min 即可；所述制备方法 2 为：将所述原料药放在一起加水 1000-1500 重量份，煎药 20-25min 后，过滤，在所得滤液中加黄酒、红糖各 750-1000 重量份至红糖完全溶解后即可。

2. 一种制备如权利要求 1 所述的治疗妇女产后病的中药组合物的方法，其特征在于：将所述原料药放在一起共研细粉，然后每 7 重量份药粉加红糖 25-75 重量份、黄酒 25-75 重量份、水 50-100 重量份，隔水煎药 40-45min 即可。

3. 如权利要求 2 所述的制备方法，其特征在于：将所述原料药放在一起炒干后再共研细粉。

4. 如权利要求 2 所述的制备方法，其特征在于：所述隔水煎药是指将药粉、红糖、黄酒、水一起放在盛药容器中，再将盛药容器放在装水的蒸煮容器里进行煎药。

5. 如权利要求 4 所述的制备方法，其特征在于：将盛药容器放在装水的蒸煮容器里，先用大火加热至蒸煮容器中的水沸腾之后，再改用文火煎药 40-45min。

6. 一种制备如权利要求 1 所述的治疗妇女产后病的中药组合物的方法，其特征在于：将所述原料药放在一起加水 1000-1500 重量份，煎药 20-25min 后，过滤，在所得滤液中加黄酒、红糖各 750-1000 重量份至红糖完全溶解后即可。

一种治疗妇女产后病的中药组合物及其制备方法

技术领域

[0001] 本发明属于中药技术领域，具体涉及一种治疗妇女产后病的中药组合物及其制备方法。

背景技术

[0002] 妇女产后病，是指妇女在大小产后，因身体虚弱、受风受冷加上运动量过大劳累过度、血气不畅、营养不能得到及时的补充而致使的腰疼、四肢疼、头晕头痛、全身麻木多汗等症。该病给病人带来的生活和精神痛苦是不言而喻的。但是现有医药市场，还没有直接针对治疗妇女产后病的特效药。

发明内容

[0003] 本发明的目的在于提供一种疗效显著的治疗妇女产后病的中药组合物及其制备方法。

[0004] 为实现上述目的，本发明采取的技术方案如下：

[0005] 一种治疗妇女产后病的中药组合物，由下述重量份数的原料药制成：黄连 2-5 份、天麻 10-15 份、制首乌 3-6 份、当归 5-10 份、甘草 3-6 份、木香 1-3 份、白术 1-3 份、荆芥 1-3 份、党参 5-10 份、苍术 40-60 份、桔梗 4-8 份、防风 4-8 份、川芎 5-10 份、白芷 5-10 份、桃仁 1-3 份、细辛 1-3 份、麻黄 4-8 份、大茴香 4-8 份。

[0006] 本发明提供了两种制备方法：

[0007] 制备方法 1：将所述原料药放在一起共研细粉，然后每 7 重量份药粉加红糖 25-75 重量份、黄酒 25-75 重量份、水 50-100 重量份，隔水煎药 40-45min 即可。

[0008] 较好地，优选将所述原料药放在一起炒干后再共研细粉。

[0009] 所述隔水煎药是指将药粉、红糖、黄酒、水一起放在盛药容器中，再将盛药容器放在装水的蒸煮容器里进行煎药。

[0010] 进一步，将盛药容器放在装水的蒸煮容器里，先用大火加热至蒸煮容器中的水沸腾之后，再改用文火煎药 40-45min。

[0011] 制备方法 2：将所述原料药放在一起加水 1000-1500 重量份，煎药 20-25min 后，过滤，在所得滤液中加黄酒、红糖各 750-1000 重量份至红糖完全溶解后即可。

[0012] 本发明药理：黄连，清热解毒、泻火解毒。天麻，祛风定惊、平肝熄风。制首乌，补肝肾、益精血、养心安神、润肠通便。当归，补血调经、润燥滑肠。甘草，补脾和中、缓急止痛、润肺止咳。川芎，活血行气、祛风止痛。木香，行气止痛、健脾消食。白术，健脾燥湿、和中。荆芥，发表散风。防风，发表散风、胜湿、解痉。麻黄，发汗解表、平喘止咳、利水消肿。桃仁，破血行瘀、滑肠通便。白芷，解表开窍。苍术，健脾燥湿、祛风辟秽。党参，补中益气、补肺养血、生津。细辛，散寒止痛、湿肺祛痰。桔梗，止咳化痰。大茴香(八角茴香)，散寒、理气、止痛。以上诸药合用，共奏祛风止痛、散寒胜湿之功效，从而达到治疗妇女产后病的功效。

[0013] 本发明优点：本发明属于纯中药制剂，无副作用，对妇女产后病有特高疗效：病程

在百日之内的，治愈率为 90%，总有效率为 97% ；病程大于百日 -15 年的，治愈率为 65%，总有效率为 81%，并且可以起到无病防病的作用。

具体实施方式

[0014] 实施例 1

[0015] 称取如下重量的原料药 ：黄连 4g、天麻 13g、制首乌 5g、当归 7g、甘草 4g、木香 2g、白术 2g、荆芥 2g、党参 8g、苍术 50g、桔梗 6g、防风 6g、川芎 7g、白芷 7g、桃仁 2g、细辛 2g、麻黄 6g、大茴香 6g。

[0016] 制备方法 1 ：将所述原料药放在一起用铁锅炒干（除水份）后再共研细粉，然后以每 7g 药粉为一剂药，加红糖 50g、黄酒 50g，和药均匀后放在陶瓷碗中加水 80g，再用一不锈钢锅加适量的水（水量保证浸住陶瓷碗并且使其正好不漂浮），把陶瓷碗放在不锈钢锅里，先用大火加热至不锈钢锅中的水沸腾之后，再改用文火煎药 45min，即获得药液。

[0017] 制备方法 2 ：将所述原料药放在不锈钢锅里加水 1300g，先用大火加热至沸腾之后，再改用文火煎药 25min，过滤，在所得滤液中加黄酒、红糖各 1350g，搅拌至红糖完全溶解后，把滤液均分成 20 份，每份为一剂药，即获得药液。

[0018] 以上两法获得的药液之服用方法 ：每天一剂药，每天晚上睡觉前服用，服用后及时睡觉，做到发汗为佳。

[0019] 注意事项 ：病人服药期间不能用空调、风扇乘凉。

[0020] 实施例 2

[0021] 称取如下重量的原料药 ：黄连 2g、天麻 10g、制首乌 3g、当归 5g、甘草 3g、木香 1g、白术 1g、荆芥 1g、党参 5g、苍术 40g、桔梗 4g、防风 4g、川芎 5g、白芷 5g、桃仁 1g、细辛 1g、麻黄 4g、大茴香 4g。

[0022] 制备方法 1 ：将所述原料药放在一起用铁锅炒干（除水份）后再共研细粉，然后以每 7g 药粉为一剂药，加红糖 25g、黄酒 25g，和药均匀后放在陶瓷碗中加水 50g，再用一不锈钢锅加适量的水（水量保证浸住陶瓷碗并且使其正好不漂浮），把陶瓷碗放在不锈钢锅里，先用大火加热至不锈钢锅中的水沸腾之后，再改用文火煎药 40min，即获得药液。

[0023] 制备方法 2 ：将所述原料药放在不锈钢锅里加水 1000g，先用大火加热至沸腾之后，再改用文火煎药 20min，过滤，在所得滤液中加黄酒、红糖各 750g，搅拌至红糖完全溶解后，把滤液均分成 20 份，每份为一剂药，即获得药液。

[0024] 以上两法获得的药液之服用方法 ：每天一剂药，每天晚上睡觉前服用，服用后及时睡觉，做到发汗为佳。

[0025] 注意事项 ：病人服药期间不能用空调、风扇乘凉。

[0026] 实施例 3

[0027] 称取如下重量的原料药 ：黄连 5g、天麻 15g、制首乌 6g、当归 10g、甘草 6g、木香 3g、白术 3g、荆芥 3g、党参 10g、苍术 60g、桔梗 8g、防风 8g、川芎 10g、白芷 10g、桃仁 3g、细辛 3g、麻黄 8g、大茴香 8g。

[0028] 制备方法 1 ：将所述原料药放在一起用铁锅炒干（除水份）后再共研细粉，然后以每 7g 药粉为一剂药，加红糖 75g、黄酒 75g，和药均匀后放在陶瓷碗中加水 100g，再用一不锈钢锅加适量的水（水量保证浸住陶瓷碗并且使其正好不漂浮），把陶瓷碗放在不锈钢锅里，先

用大火加热至不锈钢锅中的水沸腾之后，再改用文火煎药 45min，即获得药液。

[0029] 制备方法 2：将所述原料药放在不锈钢锅里加水 1500g，先用大火加热至沸腾之后，再改用文火煎药 25min，过滤，在所得滤液中加黄酒、红糖各 1000g，搅拌至红糖完全溶解后，把滤液均分成 20 份，每份为一剂药，即获得药液。

[0030] 以上两法获得的药液之服用方法：每天一剂药，每天晚上睡觉前服用，服用后及时睡觉，做到发汗为佳。

[0031] 注意事项：病人服药期间不能用空调、风扇乘凉。

[0032] 临床观察报告

[0033] 一、基本资料

[0034] 1991 年 -2012 年共收治患者 116 人，年龄在 24-44 岁之间，其中，病程在百日之内者 59 例，病程大于百日 -15 年者 57 例。

[0035] 二、诊断标准

[0036] 临床症状：妇女在大小产后，因身体虚弱、受风受冷加上运动量过大劳累过度、血气不畅、营养不能得到及时的补充而致使的腰疼、四肢疼、头晕头痛、全身麻木多汗等。

[0037] 三、疗效评定标准

[0038] 治愈：临床症状完全消失。

[0039] 有效：临床症状明显好转。

[0040] 无效：临床症状无变化。

[0041] 四、治疗方法

[0042] 采用实施例 1 药物组方、制备方法 1、服用方法，病程在百日之内的，连续服用 5-10 剂药，病程大于百日 -15 年的，连续服用 15-25 剂药。

[0043] 五、统计结果

[0044]

	治愈	有效	无效
病程在百日之内者 /59 例	53 例	4 例	2 例
病程大于百日 -15 年 /57 例	37 例	9 例	11 例

[0045] 从上表可知：病程在百日之内的，治愈率为 90%，总有效率为 97%；病程大于百日 -15 年的，治愈率为 65%，总有效率为 81%。

[0046] 典型病例

[0047] 病例 1

[0048] 代某某，女，1967 年出生，现住郑州市惠济区古荥镇朱庄村，1992 年生育时引发右臂病痛，不能劳动，不能正常生活，多年就医无效。2006 年 5 月来诊，采用实施例 1 药物组方、制备方法 1、服用方法，服用 16 剂药后，病情彻底痊愈，至今劳动、生活一切正常。

[0049] 病例 2

[0050] 王某，女，1964 年出生，现住郑州市惠济区老鸦陈办事处石河村，1991 年生育时引发右小腿和脚后跟疼，当时就采用实施例 2 药物组方、制备方法 2、服用方法，服用 8 剂药后，完全康复至今没有再复发。

[0051] 病例 3

[0052] 姚某某，女，1965 年出生，现住河南省孟州市西虢镇落驾头村大庄 44 号，1994 年生育时发病，当时基本每天晚上睡觉都有大汗淋漓的现象，早上起来全身无力，2009 年来诊，

采用实施例 3 药物组方、制备方法 1、服用方法，连续服用 20 剂药后，病情稳定，现在晚上休息正常。

[0053] 病例 4

[0054] 段某某，女，1988 年出生，现住郑州市高新技术开发区沟赵乡郭村 14 号，2012 年 2 月生育时因劳累引起腰部疼痛不能正常运动，同年 4 月来诊，采用实施例 2 药物组方、制备方法 1、服用方法，连续服用 10 剂药后，腰部疼痛彻底消失，身体恢复正常。

[0055] 病例 5

[0056] 伊某某，女，1969 年出生，现住河南省太康县独塘乡独塘村，2003 年因生育发病，当时两手关节疼痛、左右臂疼痛，不敢受冷，不能正常生活和工作，2007 年经朋友介绍来诊，采用实施例 3 药物组方、制备方法 2、服用方法，服用 1 剂药后，手关节明显减轻，两手十指第一关节不同，3 剂药后，手关节疼痛完全消失，等到第 4 剂药服用期间，因本人用空调乘凉病情未能再向好处发展，直到 2008 年 6 月再次连续服用 20 剂，双手和手臂疼痛基本控制。