(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)发明专利

(10)授权公告号 CN 102284026 B
(45)授权公告日 2012.11.07

(21)申请号 201110207730.5

(22)申请日 2011.07.25

(73)专利权人 谢秀莲
地址 274400 山东省菏泽市曹县曹城镇西关街健康新村 1 号

(72)发明人 林崇亭 谢秀莲

(51)Int.Cl.
A61K 36/8994(2006.01)
A61P 13/00(2006.01)
A61P 7/04(2006.01)

(56)对比文件
CN 1879823 A,2006.12.20,

审查员 翟羽

权利要求书 1 页 说明书 3 页

(54)发明名称

一种治疗尿血的中药

(57)摘要

本发明属于中药领域,特别公开了一种治疗尿血的中药。该中药以槐角、萹蓄、薏苡根、仙人掌、白茅根、墨旱莲、万年青、刘寄奴、石韦、海金沙、生地黄、侧柏叶、凤眼草、忍冬藤、榕须和豆豉草为活性成分,按一定的重量份数组成。本发明配制简单,吸收效果好,疗效显著,无副作用,安全性高,有利于病患及时减轻病状。

CN 102284026 B

1. 一种治疗尿血的中药，其特征为，其活性成分由以下重量份数的原料组成：

槐角 4 ～ 10 份、萹蓄 6 ～ 12 份、薏苡根 6 ～ 12 份、仙人掌 9 ～ 15 份、白茅根 9 ～ 15 份、墨旱莲 9 ～ 15 份、万年青 3 ～ 9 份、刘寄奴 4 ～ 8 份、石韦 6 ～ 12 份、海金沙 2 ～ 6 份、生地黄 6 ～ 12 份、侧柏叶 4 ～ 10 份、凤眼草 3 ～ 9 份、忍冬藤 6 ～ 12 份、榕须 6 ～ 12 份、豆豉草 6 ～ 12 份。

2. 根据权利要求 1 所述的治疗尿血的中药，其特征为，其活性成分由以下重量份数的原料组成：

槐角 7 份、萹蓄 9 份、薏苡根 9 份、仙人掌 12 份、白茅根 12 份、墨旱莲 12 份、万年青 6 份、刘寄奴 6 份、石韦 9 份、海金沙 4 份、生地黄 9 份、侧柏叶 7 份、凤眼草 6 份、忍冬藤 9 份、榕须 9 份、豆豉草 9 份。

3. 根据权利要求 1 或 2 所述的治疗尿血的中药，其特征在于：所述中药为粉剂或丸剂。

一种治疗尿血的中药

（一）技术领域

[0001] 本发明属于中药领域，特别涉及一种治疗尿血的中药。

（二）背景技术

[0002] 尿血又称溺血，是指小便中混有血液，或伴有血块夹杂而下，多无疼痛之苦，所谓“痛为血淋，不痛为尿血”。尿血一证，西医认为，正常人的离心尿沉渣中镜检每高倍视野≥3个红细胞时，即成为血尿；凡泌尿系统疾病、尿路邻近器官疾病，全身性或其他器官疾病，都能引起尿血。中国传统医学则认为，无论何种疾病引起的尿血都是因为热扰血分所致，常见的有心火亢盛，膀胱湿热，肝胆湿热，肾虚火旺，脾肾两亏等症。

[0003] 目前，国内外治疗尿血的方法较多，如西药治疗法，常用药有强力霉素、罗红霉素等，中药治疗法常用药有五淋丸、导赤丸、菟丝子丸等，但在治愈率、治愈手段、治疗费用等方面难以达到满意的效果。

（三）发明内容

[0004] 本发明为了弥补现有技术的不足，提供了一种配制简单、疗效显著的治疗尿血的中药。

[0005] 本发明是通过如下技术方案实现的：

[0006] 一种治疗尿血的中药，其活性成分由以下重量份数的原料组成：

[0007] 槐角 4～10 份、萹蓄 6～12 份、薏苡根 6～12 份、仙人掌 9～15 份、白茅根 9～15 份、墨旱莲 9～15 份、万年青 3～9 份、刘寄奴 4～8 份、石韦 6～12 份、海金沙 2～6 份、生地黄 6～12 份、侧柏叶 4～10 份、凤眼草 3～9 份、忍冬藤 6～12 份、榕须 6～12 份、豆豉草 6～12 份。

[0008] 其优选的各活性成分的重量配比为：

[0009] 槐角 7 份、萹蓄 9 份、薏苡根 9 份、仙人掌 12 份、白茅根 12 份、墨旱莲 12 份、万年青 6 份、刘寄奴 6 份、石韦 9 份、海金沙 4 份、生地黄 9 份、侧柏叶 7 份、凤眼草 6 份、忍冬藤 9 份、榕须 9 份、豆豉草 9 份。

[0010] 本发明所述中药为粉剂或丸剂。将各种原料清洗干净后，打粉混合，制成粉剂或丸剂，定量服用。

[0011] 本发明采用的各活性原料的药用性能为：

[0012] 槐角：凉血止血，清肝明目。主治肠风下血，血痢，崩漏，血淋，吐血，衄血，眩晕，发背，烫伤；

[0013] 萹蓄：利水通淋，杀虫止痒。主治淋证，黄疸，带下，泻痢，蛔虫病，蛲虫病，钩虫病，妇女阴蚀，皮肤湿疮，疥癣，痔疾；

[0014] 薏苡根：清热通淋，利湿杀虫。主治热淋，血淋，石淋，黄疸，水肿，白带过多，脚气，风湿痹痛，蛔虫病；

[0015] 仙人掌：行气活血，凉血止血，解毒消肿。主治胃痛，痞块，痢疾，喉痛，肺热咳嗽，肺

痨咯血，吐血，痔血；

[0016] 白茅根：清热生津，凉血止血，利尿通淋。主治热病烦渴，肺热喘咳，胃热呕逆，血热出血，小便淋沥涩痛，水肿，黄疸；

[0017] 墨旱莲：补益肝肾，凉血止血。主治肝肾不足，头晕目眩，须发早白，吐血，咯血，衄血，便血，血痢，崩漏，外伤出血；

[0018] 万年青：清热解毒，强心利尿。主治咽喉肿痛，白喉，痄腮，疮疡肿毒，乳痈，蛇虫咬伤，心力衰竭，水肿，臌胀，咯血，吐血；

[0019] 刘寄奴：破血通经，消积，止血消肿。主治血滞经闭，通经，产后瘀滞腹痛，癥瘕，食积腹痛，跌打损伤，金疮出血，尿血；

[0020] 石韦：利水通淋，清肺化痰，凉血止血。主治淋证，水肿，小便不利，痰热咳喘，咯血，吐血，衄血，崩漏及外伤出血；

[0021] 海金沙：利水通淋，清热解毒。主治热淋血淋，砂淋白浊，女子带下，水湿肿满，湿热泻痢，湿热黄疸，兼治吐血衄血，外伤出血；

[0022] 生地黄：又名干地黄，清血热，易阴血，通血脉。主治温病发热，黄疸，血热所致的吐血、衄血、崩漏、尿血、便血，消渴；

[0023] 侧柏叶：凉血止血，祛痰止咳，祛风解毒。主治吐血、衄血、尿血、血痢、肠风，崩漏，咳嗽痰多，风湿痹痛，脱发；

[0024] 凤眼草：清热燥湿，止痢，止血。主治痢疾，白浊，带下，便血，尿血，崩漏；

[0025] 忍冬藤：清热解毒，通络。主治温病发热，痈疽肿毒，肠痈，乳痈，热毒血痢，风湿热痹；

[0026] 榕须：散风热，祛风湿，活血止痛。主治流感，百日咳，麻疹不透，扁桃体炎，结膜炎，风湿骨痛，痧气腹痛；

[0027] 豆豉草：活血调经，祛风利湿，健脾消积。主治月经不调，痛经，经闭，风湿痹痛，跌打肿痛，小便不利，小儿疳积，脉管炎。

[0028] 配方中，萹蓄、薏苡根、石韦、海金沙主要用于清热解毒、利水通淋、杀虫止痒；加配白茅根、生地黄、侧柏叶、凤眼草，主要用于清热生津、凉血止血、利尿通淋；又配仙人掌、刘寄奴、忍冬藤、榕须，用于行气活血、破血通经、解毒消肿；再配槐角、墨旱莲、万年青、豆豉草，用于强心利尿、健脾消积、补益肝肾。

[0029] 本发明以凉血止血、清热利尿为治则，多种药材组合共凑清热解毒、行气活血、利尿通淋、补肝益肾之功效，针对尿血具有良好的治疗效果。

[0030] 临床观察：

[0031] (1) 临床资料

[0032] 本发明人于2005年至今，对312例尿血患者进行临床观察治疗，其中男241例，女71例。

[0033] (2) 治疗方法

[0034] 温水内服，一日三次，每次2～5g，饭后服用。根据患者病情轻重计算治疗时间，轻度患者服用3天左右，重病患者连服10天即可痊愈。

[0035] (3) 疗效判定标准

[0036] 治愈：症状全部消失；精神焕发。

[0037] 显效：全部症状消除或主要症状消除；精神很好。

[0038] 有效：主要症状基本消失；偶感有不适，但能接受。

[0039] 无效：主要理化检测指标与治疗前无变化。

[0040] (4) 临床结果

[0041] 临床治愈 256 例 (82.05％)，显效 34 例 (10.90％)，有效 19 例 (6.09％)，无效 3 例 (0.96％)，总有效率为 99.04％。

[0042] 本发明配制简单，吸收效果好，疗效显著，无副作用，安全性高，有利于病患及时减轻病状。

（四）具体实施方式

[0043] 实施例 1：

[0044] 取槐角 4g、萹蓄 6g、薏苡根 6g、仙人掌 9g、白茅根 9g、墨旱莲 9g、万年青 3g、刘寄奴 4g、石韦 6g、海金沙 2g、生地黄 6g、侧柏叶 4g、凤眼草 3g、忍冬藤 6g、榕须 6g、豆豉草 6g，将上述原料清洗干净，打粉混合，制成粉剂或丸剂，定量服用。

[0045] 用法用量：温水冲服，一日三次，每次 2 ～ 5g，饭后服用。

[0046] 实施例 2：

[0047] 取槐角 10g、萹蓄 12g、薏苡根 12g、仙人掌 15g、白茅根 15g、墨旱莲 15g、万年青 9g、刘寄奴 8g、石韦 12g、海金沙 6g、生地黄 12g、侧柏叶 10g、凤眼草 9g、忍冬藤 12g、榕须 12g、豆豉草 12g，将上述原料清洗干净，打粉混合，制成粉剂或丸剂，定量服用。

[0048] 用法用量：温水冲服，一日三次，每次 2 ～ 5g，饭后服用。

[0049] 实施例 3：

[0050] 取槐角 7g、萹蓄 9g、薏苡根 9g、仙人掌 12g、白茅根 12g、墨旱莲 12g、万年青 6g、刘寄奴 6g、石韦 9g、海金沙 4g、生地黄 9g、侧柏叶 7g、凤眼草 6g、忍冬藤 9g、榕须 9g、豆豉草 9g，将上述原料清洗干净，打粉混合，制成粉剂或丸剂，定量服用。

[0051] 用法用量：温水冲服，一日三次，每次 2 ～ 5g，饭后服用。