




(86) Date de dépôt PCT/PCT Filing Date: 2003/06/30
(87) Date publication PCT/PCT Publication Date: 2004/01/08
(45) Date de délivrance/Issue Date: 2013/04/16
(85) Entrée phase nationale/National Entry: 2004/12/29
(86) N° demande PCT/PCT Application No.: FR 2003/002028
(87) N° publication PCT/PCT Publication No.: 2004/002984
(30) Priorité/Priority: 2002/07/01 (FR02/08203)

(51) Cl.Int./Int.Cl. *C07D 401/12* (2006.01),
A61K 51/04 (2006.01), *A61K 51/08* (2006.01),
C07D 401/06 (2006.01)
(72) Inventeur/Inventor:
DOLLE, FREDERIC, FR
(73) Propriétaire/Owner:
COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE, FR
(74) Agent: GOUDREAU GAGE DUBUC

(54) Titre : COMPOSES DE MALEIMIDES MARQUES, LEUR PROCEDE DE PREPARATION ET LEUR UTILISATION
POUR LE MARQUAGE DE MACROMOLECULES
(54) Title: MARKED MALEIMIDE COMPOUNDS, METHOD FOR PREPARING SAME AND USE THEREOF FOR
MARKING MACROMOLECULES



(57) Abrégé/Abstract:

Composés de maléimide marqués par le fluor 18 de formule générale (I) : (FORMULE) dans laquelle :- m représente un nombre entier de 0 à 10 ; - n représente un nombre entier de 1 à 10 ; - Y représente un groupe choisi parmi les groupes hétérocycliques monocycliques ou bicycliques, éventuellement, substitués ; - X représente un radical de formule : $(U)_a - ((CR_1R_2)_b - (V)_c)_d - ((CR_3R_4)_e - (W)_f)_g$ - dans laquelle :- a, b, c, d, e, f, g représentent chacun indépendamment un nombre entier de 0 à 10 ; - U, V et W représentent chacun indépendamment -NR₁-, -O-, -S-, (FORMULE), éthyne, -CR₁=CR₂-, -(C=O)-, -(C=S)-, -C=NR₁-, -C=O-, -(C=S)-, -C(=NR₁)NR₂-, -CR₁R₂-, -CR₁OR₂-, -CR₁NR₂R₃-. Procédé de préparation de ces composés ; leur utilisation pour le marquage de macromolécules et complexes de ces composés avec une macromolécule. Trousse d'analyse et de détection, ou de diagnostic comprenant lesdits complexes. Utilisation des complexes dans un procédé d'imagerie médicale tel que la tomographie par émission de positons (TEP).

(12) DEMANDE INTERNATIONALE PUBLIÉE EN VERTU DU TRAITÉ DE COOPÉRATION
EN MATIÈRE DE BREVETS (PCT)(19) Organisation Mondiale de la Propriété
Intellectuelle
Bureau international(43) Date de la publication internationale
8 janvier 2004 (08.01.2004)

PCT

(10) Numéro de publication internationale
WO 2004/002984 A3(51) Classification internationale des brevets⁷ :
C07D 401/12, 401/06, A61K 51/04(74) Mandataire : **AUDIER, Philippe**; c/o BREVATOME, 3,
rue du Docteur Lancereaux, F-75008 PARIS (FR).(21) Numéro de la demande internationale :
PCT/FR2003/002028(81) États désignés (*national*) : AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ,
BA, BB, BG, BR, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ,
DE, DK, DM, DZ, EC, EE, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM,
HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK,
LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX,
MZ, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD,
SE, SG, SK, SL, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG,
US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.

(22) Date de dépôt international : 30 juin 2003 (30.06.2003)

(25) Langue de dépôt : français

(26) Langue de publication : français

(30) Données relatives à la priorité :
02/08203 1 juillet 2002 (01.07.2002) FR(84) États désignés (*régional*) : brevet ARIPO (GH, GM, KE,
LS, MW, MZ, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), brevet
eurasien (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), brevet
européen (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI,
FR, GB, GR, HU, IE, IT, LU, MC, NL, PT, RO, SE, SI, SK,
TR), brevet OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ,
GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).(71) Déposant (*pour tous les États désignés sauf US*) : **COM-
MISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE** [FR/FR];
31/33, rue de la Fédération, F-75752 PARIS 15ème (FR).

(72) Inventeur; et


(75) Inventeur/Déposant (*pour US seulement*) : **DOLLE,
Frédéric** [FR/FR]; 10, allée de Villeneuve, F-91940
GOMETZ-LE-CHATEL (FR).

Publiée :

— avec rapport de recherche internationale

(88) Date de publication du rapport de recherche
internationale: 22 avril 2004

[Suite sur la page suivante]

(54) Title: MARKED MALEIMIDE COMPOUNDS, METHOD FOR PREPARING SAME AND USE THEREOF FOR MARK-
ING MACROMOLECULES(54) Titre : COMPOSES DE MALEIMIDES MARQUES, LEUR PROCÉDE DE PREPARATION ET LEUR UTILISATION
POUR LE MARQUAGE DE MACROMOLECULES(57) Abstract: The invention concerns maleimide compounds marked
with Fluor 18 of general formula (I), wherein: m represents an integer
from 0 to 10; n represents an integer from 1 to 10; Y represents a
group selected among optionally substituted heterocyclic, monocyclic
or bicyclic groups; X represents a radical of formula $(\text{U})_a - ((\text{CR}_1\text{R}_2)_b - (\text{V})_c)_d - ((\text{CR}_3\text{R}_4)_e - (\text{W})_f)_g$, wherein: a, b, c, d, e, f, g represent
each independently an integer from 1 to 10; 0 A 10; U, V and W
represent each independently -NR₁-, -O-, -S-, formula (II), ethynyl,
-CR₁=CR₂-, -(C=O)-, -(C=S)-, -C=NR₁-, -C(=O) O-, -(C=S) S-,
-C(=NR₁)NR₂-, -CR₁R₂-, -CR₁OR₂-, -CR₁NR₂R₃-. The invention alsoconcerns a method for preparing said compounds, their use for marking macromolecules and complexes of said compounds with
a macromolecule. The invention further concerns a kit for analysis, detection, or diagnosis using said complexes. The invention
finally concerns the use of the complexes in a medical imaging method such as position emission tomography (PET).(57) Abrégé : Composés de maléimide marqués par le fluor 18 de formule générale (I) : (FORMULE) dans laquelle : - m représente un
nombre entier de 0 à 10 ; - n représente un nombre entier de 1 à 10 ; - Y représente un groupe choisi parmi les groupes hétérocycliques
monocycliques ou bicycliques, éventuellement, substitués ; - X représente un radical de formule : $(\text{U})_a - ((\text{CR}_1\text{R}_2)_b - (\text{V})_c)_d - ((\text{CR}_3\text{R}_4)_e - (\text{W})_f)_g$ - dans laquelle : - a, b, c, d, e, f, g représentent chacun indépendamment un nombre entier de 0 à 10 ; - U, V et W représentent
chacun indépendamment -NR₁-, -O-, -S-, (FORMULE), éthyne, -CR₁=CR₂-, -(C=O)-, -(C=S)-, -C=NR₁-, -C(=O) O-, -(C=S) S-,
-C(=NR₁)NR₂-, -CR₁R₂-, -CR₁OR₂-, -CR₁NR₂R₃-. Procédé de préparation de ces composés ; leur utilisation pour
le marquage de macromolécules et complexes de ces composés avec une macromolécule. Trousse d'analyse et de détection, ou de
diagnostic comprenant lesdits complexes. Utilisation des complexes dans un procédé d'imagerie médicale tel que la tomographie par
émission de positons (TEP).

WO 2004/002984 A3

WO 2004/002984 A3



En ce qui concerne les codes à deux lettres et autres abréviations, se référer aux "Notes explicatives relatives aux codes et abréviations" figurant au début de chaque numéro ordinaire de la Gazette du PCT.

COMPOSES DE MALEIMIDES MARQUES,
LEUR PROCEDE DE PREPARATION
ET LEUR UTILISATION POUR LE MARQUAGE DE MACROMOLECULES

5

DESCRIPTION

La présente invention a trait à des composés de maléimides marqués par le fluor-18.

L'invention concerne également un procédé de
10 préparation de ces composés.

L'invention est enfin relative à l'utilisation de ces composés de maléimides, en particulier marqués au fluor-18, pour le marquage de macromolécules, telles que des oligonucléotides, des
15 protéines, des anticorps et des peptides.

Le domaine technique de l'invention peut être défini, de manière générale, comme celui du marquage radioactif de macromolécules et, en particulier, de protéines et de peptides.

20 En effet, pour une utilisation dans la recherche ou le diagnostic les macromolécules, telles que les protéines ou encore les peptides peuvent être couplées à une molécule de marquage permettant leur détection, cette molécule de marquage peut être, par
25 exemple, une molécule fluorescente, des particules d'or, un composé paramagnétique ou une molécule portant un radioélément.

Les protéines ont été marquées de manière radioactives par des radioisotopes, de l'iode et divers
30 radioisotopes de métaux, tels que le technétium,

l'indium et le gallium. Plus récemment, les protéines ont été marquées avec du fluor-18.

Par exemple, les peptides couplées à des radioéléments, tels que le fluor, permettent une
5 détection « in vivo » de la localisation des zones thrombotiques lors d'accidents vasculaires de toutes sortes, en particulier des foyers apoptotiques et inflammatoires, en utilisant des systèmes d'imagerie.

Ainsi, les atomes radioactifs émetteurs de
10 positons à durée de vie courte et notamment le ^{18}F peuvent, en particulier, être détectés par les appareils de tomographie par émission de positons (TEP) (PET ou « Positon Emission Tomography »).

Le marquage radioactif par le fluor-18 pose,
15 notamment du fait de la très courte période du fluor-18 (voisine de 109,8 minutes) des problèmes spécifiques qui font que le marquage par le fluor-18 est fondamentalement différent de celui avec les autres halogènes, tels que l'iode.

20 Le couplage précité peut être réalisé par toutes les techniques classiques de chimie organique connues de l'homme du métier, et par la synthèse de marqueurs de protéines et de peptides portant un ou plusieurs atomes radioactifs à durée de vie courte en
25 particulier le ^{18}F . Ce marqueur est généralement constitué, d'une part, d'une partie capable de recevoir, par exemple, un atome de ^{18}F et, d'autre part, d'une partie comportant une fonction classique quelconque de liaison à la macromolécule, par exemple,
30 à la protéine.

Ces marqueurs doivent répondre à l'exigence d'une synthèse rapide et facile, car du fait de la courte durée de vie des radio isotopes tels que le ^{18}F , la durée de synthèse ne doit pas généralement excéder
5 quelques heures.

En outre, cette synthèse, du fait de la haute radioactivité des composés mis en œuvre, doit pouvoir être réalisée par des moyens robotisés.

Ainsi, les procédés pour le marquage de
10 protéines ou de peptides avec le fluor-18 font-ils appel à des marqueurs encore appelés « conjugués » ou « synthon » marqués, qui sont classés en trois familles principales, selon qu'ils réagissent avec les groupes amines, les groupes sulfhydryles, ou les groupes
15 carbohydrates des macromolécules, tels que les protéines et peptides.

Parmi les composés ou conjugués réagissant avec les groupes amino, on peut citer les imidates, tels que le 3- ^{18}F fluoro-5-nitrobenzoimide, qui
20 réagissent, par exemple, avec le groupe $\epsilon\text{-NH}_2$ de la lysine pour se lier à une protéine ; les esters activés, tels que le N-succinimidyl- ^{18}F fluorobenzoate ; les acides carboxyliques, tels que l'acide
25 N-(4- ^{18}F fluorobenzoïque) ; les aldéhydes, telles que la 4- ^{18}F pentafluorobenzaldéhyde et les isothiocyanates, tels que le 4-([^{18}F]fluorométhylphényl)isothiocyanate).

Les halogénures activés, tels que le bromure
30 de (4- ^{18}F fluorophénacyle), réagissent avec les groupes

amino, tels que le groupe ϵ -NH₂ de la lysine ou le groupe -SH de la cystéine.

Les amines, telles que la 1-(4-([¹⁸F]fluorométhyl)benzoyl)-aminobutane-4-amine
5 réagissent avec les groupes CO₂H, par exemple de l'acide glutamique ou de l'acide aspartique ou avec les groupes CHO des glycoprotéines.

Les nitrènes avec des centres actifs photochimiques, tels que le fluorure[¹⁸F]
10 d'azidophénacyle réagissent aussi avec les groupes amino, par exemple le groupe ϵ -NH₂ de la lysine.

Le procédé le plus efficace et le plus décrit pour marquer les protéines et peptides est celui qui met en œuvre des acides activés, mais c'est aussi le
15 procédé qui présente la non-spécificité la plus grande car tous les sites nucléophiles des aminoacides des protéines ou peptides vont réagir avec le marqueur, conjugué, ou synthon marqué.

Deux procédés plus spécifiques pour marquer
20 les peptides et les nucléotides présentent une bonne spécificité vis-à-vis des atomes de soufre, par exemple de la cystéine pour les peptides et d'une fonction phosphoro-thioate pour les nucléotides.


Il s'agit, tout d'abord, des procédés mettant
25 en œuvre des « synthons » haloacétamides, qui, bien que satisfaisants, présentent l'inconvénient d'être très lents et donc peu adaptés au ¹⁸F, du fait de la période de celui-ci.

Il s'agit ensuite des procédés mettant en jeu
30 des maléimides activés, qui peuvent se fixer sur les groupes SH avec une très bonne spécificité car la

réaction est très lente vis-à-vis, par exemple des sites ϵ -NH₂ de la lysine.

Le schéma de la réaction impliquant le groupe maléimido est le suivant, dans le cas d'une protéine :


5



dans laquelle X représente -S-.

Pour tout marquage, quel qu'en soit le type, les molécules comprenant un radical maléimide sont, actuellement considérées comme étant les meilleures, pour ce qui est de leur réactivité avec les macromolécules, telles que les peptides ou les protéines.

Le document de SHIUE C.-Y. et al., J. Label Compounds Radiopharm 26 : 287-289 (1989), décrit les composés :



Le premier de ces composés n'est pas facile à marquer avec du fluor-18 à haute activité spécifique.

En effet, seul le fluor F_2 permettrait un
5 marquage facile de (comme avec l'iode) et il se trouve précisément que F_2 est généralement un produit à basse activité spécifique.


En particulier, le F_2 ne convient pas à la fabrication de composés dits « radiotraceurs » qui
10 sont, préférentiellement, visés selon l'invention, tout simplement parce que la masse injectée de molécule marquée devient importante et que, alors, le principe de base régissant ce « traceur », à savoir l'occupation extrêmement faible (par exemple, inférieure à 5 %) des
15 sites récepteurs, n'est pas respecté.

En outre, la synthèse du premier de ces composés est difficile, elle est, en effet, réalisée en quatre étapes nécessitant une durée importante avec des rendements très faibles, et des transformations
20 chimiques relativement complexes. Ce procédé n'est donc pas susceptible d'être aisément automatisé.

Le second des composés cités dans le document de SHIUE et al. comporte une chaîne amide qui n'est pas chimiquement très solide et qui est facilement clivée,
25 rompue, in vivo.

Sa mise en œuvre pour des applications de diagnostic n'est donc pas envisageable. En outre, la synthèse de ce second composé comprend trois étapes et le rendement final est faible, voisin, par exemple, de
30 10 % (EOB : « End Of Bombardment » en anglais, c'est-à-dire fin d'irradiation).

Le document US-A-4 735 792 est relatif à des molécules de formule :



5

dans laquelle X est un halogène radioactif choisi parmi le brome-75, le brome-76, le brome -82, l'iode-123, l'iode-125, l'iode-131 et le fluor-18.

10 Toutefois, seule la molécule marquée à l'iode-125 est effectivement préparée.

La préparation d'une molécule marquée au fluor-18 n'est ni mentionnée, ni évoquée, et les remarques déjà effectuées ci-dessus, en ce qui concerne le premier composé du document de SHIUE et al.,
15 s'appliquent aussi dans le cadre du document US-A-4 735 792.

L'homme du métier, à la lecture de ce document, ne possède aucune information lui permettant de préparer spécifiquement un composé marqué au
20 fluor-18 et s'il envisage de le faire, il mettrait en œuvre du F₂ et aboutirait ainsi à un composé de faible activité spécifique, inutilisable en imagerie « PET ».

On peut en outre, considérer que la chimie mise en œuvre pour fabriquer le composé fluoré du
25 document US-A-4 735 792 est une chimie complexe et longue.


Il existe donc un besoin pour des composés de maléimides marqués au fluor-18, qui présentent une forte réactivité, une grande sélectivité ainsi qu'une bonne activité spécifique.

5 Il existe encore un besoin pour des composés de maléimide marqués au fluor-18, qui puissent être fabriqués à un haut rendement par un procédé simple, fiable, facilement automatisable, robotisable, rapide et de courte durée.

10 La présente invention concerne un composé de maléimide marqué au fluor-18 qui réponde, entre autres à ces besoins.

De plus, la présente invention concerne un composé de maléimide marqué au fluor-18, qui
15 ne présente pas les inconvénients, défauts, limitations et désavantages des composés de l'art antérieur et qui résolve les problèmes de l'art antérieur.

La présente invention fournit un composé
20 de formule générale (I) :




dans laquelle :

25 - m représente un nombre entier de 0 à 10, tel que 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ou 10 ;

- n représente un nombre entier de 1 à 10, tel que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ou 10 ;

- Y représente un groupe choisi parmi les groupes hétérocycliques monocycliques ou bicycliques choisis parmi les groupes imidazolyle, pyrazolyle, benzimidazolyle, pyridinyle, piridazinyle, pyrimidinyle, pyrazinyle, triazinyle, quinolinyle, isoquinolinyle, cinnolinyle, quinazolinyle, quinoxalinyle, purinyle, Y pouvant être, éventuellement, substitué par un ou plusieurs substituants, chacun de ces substituants étant indépendamment choisi parmi l'hydrogène, les halogènes (non radioactifs), les groupes phényle, alkyle en C₁₋₆, alcoxy en C₁₋₆, aryloxy, amino, mono- ou di(alkyle en C₁₋₆)amino, mono- ou di(aryl)amino, thio, alkyle en C₁₋₆-thio, arylthio, formyle, alkyle en C₁₋₆-carbonyle, arylcarbonyle, carbonyle, alcoxy en C₁₋₆-carbonyle, aryloxycarbonyle, alkyle en C₁₋₆-aminocarbonyle, arylaminocarbonyle, trifluorométhyle ;

- X représente un radical de formule :



dans laquelle :

- a, b, c, d, e, f, g représentent chacun indépendamment un nombre entier de 0 à 10, tel que 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ;

- U, V et W représentent chacun

indépendamment -NR₁-, -O-, -S-, $\begin{array}{c} \text{O} \\ | \\ \text{---N---} \end{array}$, éthyne, -CR₁=CR₂-, -(C=O)-, -(C=S)-, -C(=NR₁)-, -C(=O)O-,

- (C=S)S-, -C(=NR₁)NR₂-, -CR₁R₂-, -CR₁OR₂-, -CR₁NR₂R₃-, où R₁, R₂, R₃ et R₄ sont chacun indépendamment choisis parmi l'hydrogène, les halogènes, les groupes phényle, alkyle en C₁₋₆, alcoxy en C₁₋₆, aryloxy, amino, mono- ou
5 di(alkyle en C₁₋₆)amino, mono- ou di(aryl)amino, thio, alkyle en C₁₋₆-thio, arylthio, formyle, alkyle en C₁₋₆-carbonyle, arylcarbonyle, carbonyle alcoxy en C₁₋₆-carbonyle, aryloxycarbonyle, alkyle en C₁₋₆-aminocarbonyle, arylaminocarbonyle,
10 trifluorométhyle.

Généralement, dans la présente description, halogène signifie fluor, chlore, brome ou iode. C₁₋₆ alkyle correspond aux radicaux hydrocarbonés saturés à chaînes linéaires et ramifiées ayant de 1 à 6 atomes de
15 carbone, tels que méthyle, éthyle, propyle, butyle, pentyle et hexyle.


Le rattachement et la substitution des hétérocycles, groupe aryle, etc., peut se faire en une position quelconque.

20 De même, le rattachement du ¹⁸F sur Y ou X peut se faire en une position quelconque, en particulier sur une position quelconque sur un hétérocycle.

Avantageusement, dans le composé de formule
25 (I) ci-dessus, n=1, et Y est un groupe 3-pyridinyle.







Les composés de formule (I) peuvent appartenir à diverses familles, une première famille peut être définie comme celle des « éthers d'alkyle », qui répondent à la formule (II) suivante :

11



dans laquelle p est un nombre entier de 1 à 10, tel que 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ou 9.

5 Les composés préférés de formule (II) sont choisis parmi les composés suivants :


1-[(2-[¹⁸F]fluoro-pyridin-3-yloxy)-methyl]-pyrrole-2,5-dione1-[2-(2-[¹⁸F]fluoro-pyridin-3-yloxy)-ethyl]-pyrrole-2,5-dione1-[3-(2-[¹⁸F]fluoro-pyridin-3-yloxy)-propyl]-pyrrole-2,5-dione1-[4-(2-[¹⁸F]fluoro-pyridin-3-yloxy)-butyl]-pyrrole-2,5-dione1-[5-(2-[¹⁸F]fluoro-pyridin-3-yloxy)-pentyl]-pyrrole-2,5-dione1-[6-(2-[¹⁸F]fluoro-pyridin-3-yloxy)-hexyl]-pyrrole-2,5-dione

5

Une deuxième famille de composés de formule (I) peut être définie comme celles des « éthers de phénylalkyle », qui répondent à la formule (III) suivante :


10

13




dans laquelle q et r représentent indépendamment un nombre entier de 0 à 10, tels que 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.


Les composés préférés de formule (III) sont choisis parmi les composés suivants :



1-{4-[2-(2-[¹⁸F]Fluoro-pyridin-3-yloxy)-ethyl]-phenyl}-pyrrole-2,5-dione.



1-[4-(2-[¹⁸F]Fluoro-pyridin-3-yloxymethyl)-phenyl]-pyrrole-2,5-dione




1-[4-(2-[¹⁸F]Fluoro-pyridin-3-yloxymethyl)-benzyl]-pyrrole-2,5-dione

10


Une troisième famille est celle des composés qui répondent à la formule (IV) suivante :

14




dans laquelle s est un nombre entier de 1 à 10, tel que 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.

5 Un composé préféré de formule (IV) est le composé suivant :





10 Une quatrième famille est celle des composés qui répondent à la formule (V) suivante :



15 dans laquelle t est un nombre entier de 0 à 10, tel que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et T est un groupe -CH=CH- ou -C≡C-.

Des composés préférés de formule (V) sont les composés suivants :



Les composés selon l'invention n'ont jamais
5 été décrits, ni évoqués, dans l'art antérieur.

Les composés selon l'invention se distinguent fondamentalement des composés de l'art antérieur, du fait de leur structure spécifique dans laquelle la partie portant l'atome de fluor-18 est
10 constituée, selon l'invention, par un groupe Y spécifique qui est notamment un groupe pyridinyle, la partie de liaison, de couplage à une macromolécule, telle qu'une protéine ou un peptide, est constituée, selon l'invention par une fonction spécifique, à savoir
15 une fonction maléimido, et, enfin, la partie de liaison à une macromolécule et la partie portant l'atome de fluor-18 sont reliées selon l'invention par une chaîne ou bras espaceur de nouveau spécifique, par exemple de type alkyle (généralement de 2 à 6C), éther d'alkyle,
20 éthers de phénylalkyle, alcényle, qui ne sont pas fragiles et ne sont pas susceptibles de ruptures « in vivo ».

L'invention concerne l'utilisation d'un composé, tel que décrit ci-dessus pour le marquage de macromolécules.

Cette macromolécule peut être toute
5 macromolécule, en particulier biologique connue, mais elle peut être choisie, par exemple, parmi le oligonucléotides, les protéines, les anticorps et les peptides. Ladite macromolécule est avantageusement une macromolécule de reconnaissance d'un site spécifique
10 choisi, de préférence, parmi les sites présentant des molécules cibles spécifiques d'une pathologie, tels que les sites d'apoptose, de nécrose ou de zone tumorale.

L'invention a également trait à un complexe comprenant une macromolécule couplée à un composé selon
15 l'invention, tel qu'il a été décrit ci-dessus.

Ladite macromolécule est choisie, de préférence, parmi les oligonucléotides, les protéines, les anticorps et les peptides.

Ledit couplage est réalisé par réaction de
20 la double liaison du groupe maléimido du composé selon l'invention avec spécifiquement une fonction -SH(thiol) de la cystéine dans le cas d'un peptide, ou une fonction phosphoro-thioate dans le cas d'un oligonucléotide.

25 C'est là un des avantages liés à la structure spécifique des composés selon l'invention que de permettre un marquage spécifique, voire exclusif, des cystéines, alors que la plupart des autres « synthons » ne permettent qu'un marquage
30 non-spécifique des lysines et des cystéines.

Le marquage sélectif, voire exclusif, des cystéines est dû à la présence dans la molécule de l'invention d'une fonction « dédiée », à savoir la fonction maléimido, qui est une fonction dédiée pour la chemio-sélectivité envers les thiols des cystéines, ou de manière analogue envers les fonctions phosphoro-thioates.

Le marquage ou couplage, via la cystéine, peut être un marquage ou couplage direct, c'est-à-dire que la cystéine existe déjà dans la macromolécule que l'on souhaite coupler au composé selon l'invention, soit la cystéine ou une molécule (peptide) la comprenant, peut être introduite (couplée préalablement ou non aux composés de l'invention) dans la macromolécule qui ne comprenait pas de cystéine et on réalise ensuite le couplage si celui-ci n'a pas été réalisé au préalable sur la cystéine ou la molécule la comprenant.

La cystéine ou molécule la comprenant peut, par exemple, être introduite « à façon » dans la macromolécule par ingénierie des protéines/peptides dans une position qui ne rentre pas en compétition avec, ou ne perturbe pas la fonction biologique.

Ladite macromolécule est avantageusement une macromolécule de reconnaissance d'un site spécifique, telle que décrite ci-dessus. Le couplage, c'est-à-dire le marquage est, de préférence, tel qu'il n'affecte pas l'activité de reconnaissance de la cible, du site, par la macromolécule.

L'invention concerne aussi une trousse d'analyse et de détection, par exemple pour l'imagerie

médicale comprenant un composé selon l'invention et une macromolécule.

L'invention a trait également à une trousse d'analyse et de détection, par exemple pour l'imagerie
5 médicale, comprenant un composé selon l'invention couplé à une macromolécule, c'est-à-dire un complexe selon l'invention.

L'invention concerne aussi une trousse de diagnostic comprenant un composé selon l'invention et
10 une macromolécule.

L'invention a trait, en outre, à une trousse de diagnostic comprenant un complexe, tel que décrit plus haut.

L'invention concerne enfin l'utilisation du
15 complexe ou du composé, tels que décrits plus haut, dans un procédé d'imagerie médicale, tel que la tomographie par émission de positons (TEP) et l'utilisation d'un complexe ou d'un composé selon l'invention pour fabriquer un produit destiné à
20 l'imagerie médicale, par exemple à la tomographie par émission de positons (TEP).

Enfin, l'invention est relative à un produit pour l'imagerie médicale, en particulier la tomographie par émission de positons (TEP) comprenant
25 un complexe ou un composé tel que décrit plus haut et un véhicule pharmaceutiquement acceptable.


Dans leur application, dans le cadre de la « TEP », les composés et complexes, selon l'invention, comprenant un atome de fluor-18 montrent de nombreux
30 avantages par rapport aux composés avec un autre halogène radioactif, par exemple l'iode.

En effet, le seul isotope de l'iode émetteur de positons est l'iode-124, qui pourrait permettre la TEP.

Mais, il reste produit à de faibles quantités (qqes mCi contre des curies pour le F-18). Il est aussi difficile à produire. Enfin, l'iode-124 n'est pas un émetteur de positons pur (contrairement au fluor-18, 97 %) et décroît par émission beta+ à 25 % seulement et par capture électronique à 75 % ; il possède un grand nombre de raies gamma allant de 0,603 MeV (62 %) à 2,75 MeV (1 %).


L'invention est également relative à un procédé de préparation d'un composé de formule (I), tel que décrit plus haut, dans lequel :

a) on met en contact un composé précurseur de formule (Ia) :



dans laquelle PR₁ et PR₂ représentent indépendamment un atome d'hydrogène ou un groupe protecteur de la fonction amine, à la condition que PR₁ et PR₂ ne soient pas tous deux (simultanément) un atome d'hydrogène, ou bien PR₁ et PR₂ forment ensemble avec l'atome d'azote un groupe protecteur cyclique de la fonction amine, Gp représente un groupe partant susceptible d'être remplacé par un atome de fluor-18, et X, Y, m et n ont la signification déjà donnée plus haut ; avec une

source d'ions fluorure F^- marqués au $[^{18}F]$, pour donner un composé de formule (Ib) :



5

b) on élimine dans le composé (Ib), le ou les groupe(s) protecteur(s) PR_1 et/ou PR_2 de la fonction amine pour donner un composé de formule (Ic) :



10

c) on fait réagir le composé (Ic) avec un réactif susceptible de donner un groupe maléimido à partir d'un groupe amino, pour obtenir le composé final de formule (I).

15

Le procédé selon l'invention est simple, fiable, facile à mettre en œuvre et peut être aisément robotisé. Il comporte seulement trois étapes dont l'une est une étape extrêmement simple de déprotection.

20

La durée globale du procédé est faible : à titre d'exemple, elle est généralement de 60 à 120 minutes, de préférence de 75 à 85 minutes.

25

L'incorporation de l'halogène fluor-18 est réalisée de manière extrêmement efficace avec un fort rendement, par exemple 70 à 100 %, du fait, en particulier, qu'il est effectué sur un groupement hétérocyclique, tel que la pyridine.

Le rendement final de l'ensemble du procédé pour un produit purifié est extrêmement élevé, par exemple de 15 % à 25 % et les quantités potentielles de composé « synthon », en fin de synthèse, sont également
5 très importantes.

Dans le composé (Ia), les groupes PR₁ et PR₂ lorsqu'ils sont des groupes protecteurs peuvent être tout groupe protecteur connu en chimie organique. Ils sont choisis, de préférence, parmi les groupes
10 tertibutoxycarbonyle (BOC) et fluorenylmethoxy carbonyl (FMOC).

Lorsque PR₁ et PR₂ forment ensemble avec l'atome d'azote de la fonction amine, un groupe protecteur de celle-ci, ce groupe protecteur peut être,
15 par exemple, un groupe phthalimido.

Dans le composé (Ia), le groupe Gp peut être tout groupe partant susceptible d'être remplacé par un atome de fluor-18 ; Gp est choisi, de préférence, parmi les halogènes, tels que F, Cl, Br, I,
20 les groupes mésyle, tosyl et triflate, lorsque Y est un groupe alkyle ; et Gp est choisi, de préférence, parmi les halogènes, les sels d'ammonium, tel que le triméthylammonium-trifluorométhane sulfonate, et le groupe nitro, lorsque Y est un groupe aromatique ou
25 hétérocyclique.

Dans l'étape a), la source d'ions fluorure marqués au ¹⁸F comprend lesdits ions fluorure et un contre-ion, choisi parmi les cations de grande taille, tels que le rubidium, et le tétrabutylammonium, et les
30 cations de petite taille, tels que le potassium, le sodium et le lithium, lesdits cations de petite taille

étant piégés, stabilisés, par exemple, par un cryptand ou un éther couronne, etc..., ledit cryptand ou éther couronne étant adapté au cation de petite taille mis en œuvre.

5 Un exemple de cryptand est le produit KRYPTOFIX[®] K₂₂₂ : (4, 7, 13, 16, 21, 24-hexaoxa-1,10-diazabicyclo[8.8.8]hexacosane) qui piège, par exemple, l'ion potassium.

10 Le contre-ion ou cation peut être amené sous la forme d'un sel quelconque, par exemple, il peut s'agir de K₂CO₃, dans le cas du potassium.

 L'étape a) est généralement réalisée dans un solvant, qui peut être tout solvant adéquat, tel que le DMSO.

15 L'étape a) peut être réalisée dans des conditions connues de l'homme du métier, avec un chauffage généralement à une température de 50 à 200°C, par exemple, 145°C, pendant une durée généralement de 1 à 30 minutes, par exemple de 4 à 6 minutes.


20 L'étape b) d'élimination du groupe protecteur de la fonction amine, de déprotection, pour donner le composé de formule (Ic), où le groupe amino est libre, peut être réalisée par tout procédé de déprotection connu. On pourra, par exemple, mettre le
25 composé (Ib) en contact avec du TFA dans le CH₂Cl₂ pendant une durée généralement de 1 à 5, par exemple de 2 minutes. Il est à noter que le TFA est utilisé généralement uniquement si le groupe protecteur est enlevé en milieu acide, par exemple lorsque PR₁ = BOC
30 et PR₂ = H.

Dans l'étape c), le réactif susceptible de donner un groupe maléimido à partir d'un groupe amido peut être tout composé connu. Il pourra ainsi être choisi parmi la N-méthoxycarbonylmaléimide et la succinimide.

L'étape c) peut être réalisée dans des conditions connues de l'homme du métier, par exemple dans un solvant, tel que le xylène, le THF, avec un chauffage généralement à une température de 100 à 200°C, par exemple de 190°C, pendant une durée de 1 à 20 minutes, par exemple de 5 minutes.

L'étape c) peut dans un autre mode de réalisation également être réalisée dans un mélange biphasique par exemple de dioxanne et de bicarbonate de sodium aqueux, à température ambiante pendant une durée de 3 à 15 minutes, par exemple 10 minutes ; ce mode de réalisation de l'étape c) offre l'avantage de donner un meilleur rendement et d'être mis en œuvre à température ambiante, sans qu'il soit nécessaire de chauffer le mélange.


Le composé de formule (Ia) peut répondre à la formule (IIa) suivante :




25

Le composé (IIa) répond, de préférence, à la formule (IIb) suivante :


24



Le composé de formule (Ia) peut, dans un
 5 autre mode de réalisation, répondre à la formule (IIIa)
 suivante :




10 Le composé (IIIa) répond, de préférence, à
 la formule (IIIb) suivante :




15

Le composé de formule (Ia) peut, dans
 encore un autre mode de réalisation, répondre à la
 formule (IVa) suivante :


25




Le composé (IVa) répond, de préférence, à
 5 la formule (IVb) suivante :



Dans un autre mode de réalisation, le
 10 composé de formule (Ia) peut répondre à la formule (Va)
 suivante :



15 Le composé (Va) répond, de préférence, à la
 formule (Vb) suivante :



L'invention concerne également les composés précurseurs de formules (Ia), (IIa), (IIb), (IIIa), (IIIb), (IVa), (IVb), (Va), (Vb), tels qu'ils ont été
5 décrits plus haut, en tant qu'intermédiaires de synthèse pour les composés de formules (I) à (V) selon l'invention.

Les composés précurseurs peuvent être choisis, en particulier, parmi les composés finaux
10 définis, énumérés, plus haut, dans lesquels le [^{18}F] est remplacé par un halogène non radioactif, tel que ^{19}F , Cl, Br, I, un sel d'ammonium, tel que le triméthylammonium-trifluorométhanesulfonate ou un groupe NO_2 et le groupe 1-pyrrole-2,5-dione est
15 remplacé par un groupe tertbutoxycarbonylamino.

Des composés précurseurs préférés sont, par exemple le [3-(3-tert-butoxycarbonylamino-propoxy)-pyridin-2-yl]-triméthyl-ammonium trifluorométhane sulfonate ; et l'ester de tertibutyle de l'acide
20 [3-(2-nitro-pyridin-3-yloxy)-propyl]-carbamique.

L'invention va maintenant être exposée de manière plus détaillée dans la description qui suit, donnée à titre illustratif et non limitatif, en relation avec des exemples de préparation de composés
25 selon l'invention, ainsi que de complexes selon l'invention.

Conditions des expériences

Produits chimiques, chromatographie en
couche mince (CCM « TLC ») et chromatographie liquide
5 haute pression (« HPLC »).

On s'est procuré les produits chimiques
auprès de divers fournisseurs (ALDRICH, FLUKA ou SIGMA
France) et ils ont été utilisés sans purification plus
10 poussée, sauf lorsque cela est mentionné. Les CCM sont
réalisées sur des plaques revêtues, au préalable, de
gel de silice 60F₂₅₄ de chez MERCK. Les composés ont été
localisés (1) si possible à 254 nm, en utilisant une
lampe à UV et/ou (2) par coloration par l'iode et/ou
15 (3) en trempant les plaques de CCM dans une solution
éthanolique à 1 % de ninhydrine (ou une solution
aqueuse à 1 % de KMnO₄) et en chauffant sur une plaque
chauffante. Les points, taches ou « spots »,
radioactifs sont détectés en utilisant un appareil
20 d'analyse linéaire automatique BERTHOLD TRACE MASTER
20.

Spectroscopies

25 Les spectres RMN sont enregistrés sur un
appareil BRUKER AMX (300 MHz), utilisant le résidu
hydrogéné des solvants deutérés (DMSO-d₆, δ : 2,50 ppm ;
CD₂Cl₂, δ : 5,32 ppm ; CD₃OD, δ : 4,78 ; CD₃CN, δ :
1,93 ppm) et/ou le TMS en tant qu'étalons internes pour
30 la RMN ¹H, et les solvants deutérés (DMSO-d₆, δ :

39,5ppm ; CD_2Cl_2 , δ : 53,8 ppm ; CD_3OD , δ : 49,3 ppm)
et/ou le TMS, comme étalons internes pour la RMN¹³C.

Les déplacements chimiques sont donnés en ppm avec comme référence le TMS (tétraméthylsilane),
5 dont le déplacement chimique est fixé à 0. s, d, t, dd, q, q5, m, b représentent singulet, doublet, triplet, doublet de doublet, quadruplet, quintuplet, multiplet, et large respectivement). Les spectres de masse (« MS ») sont mesurés sur un appareil Quadripolair
10 Finnigan 4 600 (DCI/NH_4^+).

Production de l'isotope radioactif

Des ions fluorure [¹⁸F] aqueux ont été
15 préparés dans un cyclotron CGR-MeV 520 par irradiation d'une cible d'eau de 2 mL, en utilisant un faisceau de protons de 20 MeV sur de l'eau enrichie en [¹⁸O] à 95 % par la réaction nucléaire [¹⁸O(p, n)¹⁸F]. Les ions fluorure ont été transférés dans la cellule blindée
20 adéquate. Production typique : 550-650 mCi (20,3 à 24,0 GBq) de [¹⁸F]F⁻ à la fin du bombardement pour une irradiation de 20 μA , 30 minutes (36 000 μC).

Divers

25

Les radiosynthèses utilisant le fluor-18, y compris les purifications par HPLC semi-préparative ont été réalisées dans une cellule de 7,5 cm blindée au plomb, en utilisant un système robot ZYMATE piloté par
30 ordinateur (de chez ZYMACK CORP., USA). L'activation

aux micro-ondes est réalisée avec un four MICROWELL 10 (2,45 GHz), fourni par LABWELL AB, Suède.

La radioactivité spécifique est déterminée comme suit : la surface des pics d'absorbance UV, correspondant au produit radiomarké, est mesurée sur le chromatogramme de HPLC et comparée à une courbe étalon donnant la masse, en fonction de l'absorbance UV.

10 Exemple 1

Mode opératoire général pour le couplage de MITSUNOBU du 3-(N-tert-butylcarbonylamino) -1-propanol avec divers dérivés 3-hydroxypyridine substitués en 2.

15 A une solution de 3,0 g de triphénylphosphine (masse moléculaire : 262,69 ; 11,4 mmol) dans le THF (60 mL), on ajoute 1,8 mL d'azocarboxylate de diéthyle (DEAD, masse moléculaire : 174,16 ; d : 1,106 ; 11,4 mmol ; 1 éq). Après agitation à 0°C pendant 10 à 15 minutes, on ajoute 1,95 mL de 3-(N-tert-butoxycarbonylamino)-1-propanol (masse moléculaire : 175,23 ; d : 1,025 ; 11,4 mmol ; 1 eq) et le dérivé de 3-hydroxypyridine substitué en 2 (11,4 mmol ; 1 eq). Le mélange est agité à température ambiante pendant une nuit, puis concentré jusqu'à siccité. Le résidu est repris avec du CH₂Cl₂ et la solution obtenue est lavée avec une solution aqueuse à 10 % de NaHCO₃, de l'eau, de la saumure, et séchée avec Na₂SO₄ avant concentration jusqu'à siccité. Le résidu

est chromatographié sur gel de silice pour donner le dérivé souhaité : 3-[3-(N-tertbutyloxycarbonylamino)-1-propoxy]pyridine (ou ester de tertibutyle de l'acide [3-(pyridin-3-yloxy)-propyl]carbamique).

5

Exemple 2

Mode opératoire général pour la
déprotection par le TFA des fonctions
10 N-tertbutoxycarbonylamino.

A de 3 à 7 mmoles de l'ester de
terbiobutyle de l'acide [3-(pyridin-3-yloxy)-propyl]-
carbamique adéquat dans 5 mL de CH₂Cl₂, on ajoute 2 mL
15 de TFA. La solution est agitée pendant 45 minutes à la
température ambiante et concentrée jusqu'à siccité.

Le résidu est redissous dans 2 mL de CH₂Cl₂ et
concentré de nouveau à siccité (2 fois) pour donner le
3-(pyridine-3-yloxy)-propylamine, sous la forme d'un
20 résidu huileux.

Exemple 3

Mode opératoire général pour la formation
25 du maléimido.

A de 2 à 3 mmoles de la
3-(pyridin-3-yloxy)-propylamine adéquate dans 5 ml de
THF, on ajoute successivement 500 mg d'anhydride
30 maléique (masse moléculaire : 98,06 ; 5,1 mmoles) et
200 mg d'acide p-toluènesulfonique hydraté (masse

moléculaire : 190,22 ; 1,0 mmoles). La solution est mise à reflux pendant 24 heures et concentrée à siccité. Le résidu est chromatographié sur du gel de silice pour donner le dérivé de
5 1-[3-(pyridin-3-yloxy)-propyl]-pyrrole-2,5-dione souhaité.

Exemple 4

10 Préparation de la 2-fluoro-3-hydroxypyridine

A 100 mL d'hydrogénofluorure de pyridine (Py.(HF)_x, de chez FLUKA, 70 % de l'échantillon constitués de fluorure d'hydrogène, 30 % de
15 l'échantillon constitués de pyridine) refroidis à 0°C, on ajoute successivement et avec précaution 3,7 g de 2-amino-3-hydroxypyridine (masse moléculaire : 110,12 ; 33,6 mmol) et 3 g de NaNO₂ (masse moléculaire : 69,00 ; 43,5 mmol). Le mélange est agité à 0°C pendant 1 heure,
20 puis lentement rendu basique avec une solution aqueuse de NaOH, 10 N, transférée dans un décanteur et extrait avec EtOAc. Les phases organiques sont combinées, lavées avec de l'eau, de la saumure, séchées avec du Na₂SO₄ et concentrées à siccité. Le résidu est purifié
25 par passage à travers une colonne de gel de silice (éluant : heptane/EtOAc : 50/50) pour donner 2,5 g (65 %) de 2-fluoro-3-hydroxypyridine sous la forme d'un solide qui est utilisé sans purification plus poussée.

30 Rf (EtOAc/heptane : 80/20) : 0,65 mp : 131°C. ¹H NMR (DMSO-d₆, 298K) : δ : 10,41 (s, 1H) ; 7,64

(td, J : 1,7 & 4,7 Hz, 1H) ; 7,42 (dd, J : 1,7, 1,7 & 10,8 Hz, 1H) ; 7,17 (ddd, J : 1,3, 4,7 & 7,8 Hz, 1H).
 ^{13}C NMR (DMSO- d_6 298K) : δ : 152,8 (d, $J^1_{\text{F-C}}$: 233 Hz, C) ; 140,2 (d, $J^2_{\text{F-C}}$: 27 Hz, C) ; 135,6 (d, $J^3_{\text{F-C}}$: 13 Hz, CH) ; 126,2 (d, $J^3_{\text{F-C}}$: 5 Hz, CH) ; 122,6 (CH). MS (DCI/ NH_4^+) : $\text{C}_5\text{H}_4\text{FNO}$: 131 [M + NH_4^+] ; 114 [M+ H^+].
Anal. ($\text{C}_5\text{H}_4\text{FNO}$) C, H, N.

Exemple 5

10

Dans cet exemple, on décrit la préparation d'une molécule de référence qui est la 1-[3-(2-fluoro-pyridin-3-yloxy)-propyl]-pyrrole-2,5-dione, dans laquelle le fluor n'est pas du fluor radioactif, mais du ^{19}F .

15

a) Préparation de l'ester de tertibutyle de l'acide [3-(2-fluoro-pyridin-3-yloxy)-propyl]-carbamique.

20

Le mode opératoire décrit ci-dessus dans l'exemple 1 est utilisé avec la 2-fluoro-3-hydroxypyridine préparée dans l'exemple 4 (1,29 g ; 11,4 mmol) pour donner 1,9 g (62 %) de l'ester de tertibutyle de l'acide [3-(2-fluoro-pyridin-3-yloxy)-propyl]-carbamique sous la forme d'une huile jaune, après chromatographie « flash » (éluant : CH_2Cl_2 pur, heptane/EtOAc : 70/30 à 50/50).

30

Rf (CH₂CL₂/EtOAc : 95/5) : 0,45. ¹H NMR (CD₂Cl₂, 298K) : δ : 7,68 (dt, J : 4,8 & 1,8 Hz, 1H) ; 7,28 (td, J : 7,8 & 1,5 Hz, 1H) ; 7,10 (dd, J : 5,1 & 0,9 Hz, 1H) ; 4,96 (b, w_{1/2} : 20 Hz, 1H) ; 4,07 (t, J : 6,0 Hz, 2H) ; 3,28 (q, J : 6,0 Hz, 2H) ; 1,98 (q⁵, J : 6,0 Hz, 2H) ; 1,39 (s, 9H). ¹³C NMR (CD₂Cl₂, 298K) : δ : 156,3 (C) ; 154,1 (d, J_{1F-C} : 235 Hz, C) ; 142,5 (d, J_{2F-C} : 25 Hz, C) ; 137,5 (d, J_{3F-C} : 13 Hz, CH) ; 123,0 (CH) ; 122,2 (CH) ; 79,2 (C) ; 67,3 (CH₂) ; 38,0 (CH₂) ; 29,8 (CH₂) ; 28,5 (CH₃).

b) Préparation de la
3-(2-fluoro-pyridin-3-yloxy)-propylamine.

Le mode opératoire décrit ci-dessus dans l'exemple 2 est utilisé avec l'ester de tertibutyle de l'acide [3-(2-fluoro-pyridin-3-yloxy)-propyl]-carbamique préparée en a) (1,0 g ; masse moléculaire : 270,30 ; 3,7 mmol) pour donner 1,4 g/95 %) de 3-(2-fluoro-pyridin-3-yloxy)-propylamine.2TFA, sous la forme d'une huile jaune.

¹H NMR (CD₃OD, 298K) : δ : 7,51 (bt, J < 2,0 Hz, 1H) ; 7,36 (bt, J < 3,0 Hz, 1H) ; 7,04 (bq, J < 3,0 Hz, 1H) ; 4,03 (t, J : 6,0 Hz, 2H) ; 2,99 g (Q, J : 6,0 Hz, 2H) ; 2,01 (q⁵, J : 6,0 Hz, 2H). ¹³C NMR (CD₃OD, 298K) : δ : 159,3 (q, J_{2F-C} : 41 Hz, C, CF₃CO₂H) ; 155,3 (d, J_{1F-C} : 237 Hz, C) ; 143,5 (d, J_{2F-C} : 24 Hz, C) ; 138,5 (d, J_{3F-C} : 13 Hz, CH) ; 125,1 (CH) ; 123,8 (CH) ; 116,4 (q, J_{1F-C} : 284 Hz, C, CF₃, CO₂H) ; 67,9 (CH₂) ; 38,6 (CH₂) ; 29,4 (CH₂).

c) 1-[3-(2-fluoro-pyridin-3-yloxy)-propyl]-pyrrole-2,-5 dione.

5 Le mode opératoire, décrit ci-dessus dans l'exemple 3, est utilisé avec la 3-(2-fluoro-pyridin-3-yloxy)-propylamine.2TFA (1,0 g ; masse moléculaire : 398,23 ; 2,5 mmol) pour donner 310 mg (48 %) de 1-[3-(2-fluoro-pyridin-3-yloxy)-
10 propyl]-pyrrole-2,5-dione, sous la forme d'une poudre jaune, après chromatographie « flash » (éluant : heptane/EtOAc : 50 :50 à 30/70). A des fins d'analyse, une fraction aliquote (100 mg) a été purifiée de nouveau par HPLC préparative ou semi-préparative.

15

Rf (EtOAc) : 0,7 Rf (EtOAc/heptane : 80/20) : 0,5. ^1H NMR (CD_2Cl_2 , 298K) : δ : 7,69 (bd, J : 3,0 Hz, 1H) ; 7,27 (t, J : 6,0 Hz, 1H) ; 7,11 (dd, J : 3,0 & 6,0 Hz, 1H) ; 6,69 (s, 2H) ; 4,05 (t, J :
20 6,0 Hz, 2H) ; 3,82 (t, J : 6,0 Hz, 2H) ; 2,11 (q^5 , J : 6,0 Hz, 2H). ^{13}C NMR (CD_2Cl_2 , 298K) : δ : 171,2 (2xC) ; 154,0 (d, $J^{1\text{F}-\text{C}}$: 235 Hz, C) ; 142,4 (d, $J^{2\text{F}-\text{C}}$: 25 Hz, C) ; 137,7 (d, $J^{3\text{F}-\text{C}}$: 13 Hz, CH) ; 134,5 (2xCH) ; 123,2 (CH) ; 122,2 (CH) ; 67,5 (CH_2) ; 35,4 (CH_2) ; 28,5
25 (CH_2). MS (DCI/NHR $^+$) : $\text{C}_{12}\text{H}_{11}\text{FN}_2\text{O}_3$: 251 $[\text{M}+\text{H}^+]$.

Exemple 6

30 Préparation de l'ester de tertibutyle de l'acide [3-(2-nitro-pyridin-3-yloxy)-propyl]-carbamique.

Le mode opératoire décrit ci-dessus dans l'exemple 1 est utilisé avec la 2-nitro-3-hydroxy pyridine (1,6 g ; masse moléculaire : 140,10 ; 11,4 mmol) pour donner 2,2 g (65 %) de l'ester de tertibutyle de l'acide [3-(2-nitro-pyridin-3-yloxy)-propyl-]carbamique sous la forme d'une huile jaune, après chromatographie « flash » (éluant : heptane/EtOAc : de 60/40 à 40/60). A des fins d'analyse, une fraction aliquote (100 mg) est purifiée de nouveau sur un appareil de HPLC préparative ou semi-préparative.

Rf(EtOAc/heptane : 50/50) : 0,35. ^1H NMR (CD_2Cl_2 , 298K) : δ : 8,04 (t, J : 3,0 Hz, 1H) ; 7,53 (d, J : 3,0 Hz, 2H) ; 4,95 (b, $w_{1/2}$: 15 Hz, 1H) ; 4,18 (t, J : 6,0 Hz, 2H) ; 3,26 (q, J : 6,0 Hz, 2H) ; 1,99 (q^5 , J : 6,0 Hz, 2H) ; 1,40 (s, 9H). ^{13}C NMR (CD_2Cl_2 , 298K) : δ : 156,3 (C) ; 149,2 (C) ; 147,3 (C) ; 139,5 (CH) ; 129,2 (CH) ; 124,0 (CH) ; 79,2 (C) ; 68,3 (CH_2) ; 37,9 (CH_2) ; 29,5 (CH_2) ; 28,4 (CH_3).

Exemple 6 bis :

Préparation du trifluoromethanesulfonate de [3-(3-*tert*-butoxycarbonylamino-propoxy)-pyridin-2-yl]-trimethyl-ammonium

Le mode opératoire décrit ci-dessus dans l'exemple 1 est utilisé avec la 2-diméthylamino-3-hydroxypyridine (0,250 g ; masse moléculaire : 138,17 ;

1,8 mmol) pour donner 0,290 g de l'ester de tertibutyle de l'acide [3-(2-diméthylamino-pyridin-3-yloxy)-propyl]-carbamique (58%) sous la forme d'une huile jaune après chromatographie « flash » (éluant :
5 heptane/EtOAc : de 70/30 à 50/50).

Rf (CH₂Cl₂/EtOAc : 50/50) : 0.30. ¹H NMR (CD₂Cl₂, 298K) : δ : 7.79 (dd, J : 4.0 & 1.5 Hz, 1H) ; 7.00 (dd, J : 7.8 & 1.2 Hz, 1H) ; 6.73 (dd, J : 7.8 & 4.8 Hz, 1H) ; 5.15 (b, w_{1/2} : 15 Hz, 1H) ; 4.02 (t, J :
10 6.0 Hz, 2H) ; 3.30 (q, J : 6.0 Hz, 2H) ; 2.95 (s, 6H) ; 1.99 (q⁵, J : 6.0 Hz, 2H) ; 1.42 (s, 9H). ¹³C NMR (CD₂Cl₂, 298K) : δ : 156.2 (C) ; 153.7 (C) ; 146.2 (C) ; 139.0 (CH) ; 118.8 (CH) ; 115.9 (CH) ; 79.1 (C) ; 67.4 (CH₂) ; 41.1 (CH₃) ; 38.8 (CH₂) ; 32.3 (CH₂) ; 28.5
15 (CH₃).

L'ester de tertibutyle de l'acide [3-(2-diméthylamino-pyridin-3-yloxy)-propyl]-carbamique est ensuite dilué dans le toluène (2 mL pour 100 mg d'ester) et la solution est refroidie à 0°C (bain de
20 glace). A cette solution est ajoutée du méthane-trifluorométhanesulfonate (50 microlitres pour 100 mg d'ester) et le milieu réactionnel est agité pendant 1 heure à 0°C. Le précipité de trifluorométhanesulfonate de [3-(3-tert-
25 butoxycarbonylamino-propoxy)-pyridin-2-yl]-triméthyl-ammonium est filtré, lavé par de petites portions d'ether éthylique et séché sous vide pour conduire à une fine poudre blanche (145 mg pour 100 mg d'ester).

¹H NMR (CD₂Cl₂, 298K) : δ : 8.09 (dd, J :
30 3.3 & 1.0 Hz, 1H) ; 7.67 (bd, J : 8.0 Hz, 1H) ; 7.61 (dd, J : 7.0 & 4.2 Hz, 1H) ; 5.20 (b, w_{1/2} : 15 Hz,

1H) ; 4.31 (t, J : 6.3 Hz, 2H) ; 3.71 (s, 9H) ; 3.31 (q, J : 6.3 Hz, 2H) ; 2.12 (q⁵, J : 6.3 Hz, 2H) ; 1.38 (s, 9H). ¹³C NMR (CD₂Cl₂, 298K) : δ : 156.6 (C) ; 147.7 (C) ; 142.6 (C) ; 139.0 (CH) ; 129.0 (CH) ; 124.6 (CH) ; 121.2 (q, J : 319 Hz, CF₃) ; 79.3 (C) ; 68.1 (CH₂) ; 54.8 (CH₃) ; 37.5 (CH₂) ; 30.0 (CH₂) ; 28.4 (CH₃).

Exemple 7

10

Dans cet exemple, on décrit la préparation d'un composé selon l'invention, qui est la 1-[3-(2-[¹⁸F]fluoro-pyridin-3-yloxy)-propyl]-pyrrole-2,5-dione.

15

a) Complexe K[¹⁸F]F-K₂₂₂.

Afin de récupérer et de recycler la cible d'eau [¹⁸O], on lui fait traverser une résine échangeuse d'anions (AG1x8, de Bio-Rad, 100-200 mesh). L'ion fluorure [¹⁸F] est alors élué de la résine, en utilisant 1,0 mL d'une solution aqueuse de K₂CO₃ à 4,5 mg/mL.

Après addition de 11,0 à 15,0 mg de KRYPTOFIX[®] K₂₂₂ (4, 7, 13, 16, 21, 24-hexaoxa-1,10-diazobicyclo[8.8.8]hexacosane), la solution résultante est alors doucement concentrée jusqu'à siccité à 145-150°C, sous un courant d'azote pendant 10 minutes pour donner un complexe K[¹⁸F]F-K₂₂₂, pur, sous la forme d'un résidu blanc semi-solide.

30

b) 1-[3-(2-[¹⁸F]fluoro-pyridin-3-yloxy)-propyl]-pyrrole-2,5-dione.

Du DMSO, fraîchement distillé (600 µL),
5 contenant 4,0 à 6,0 mg du précurseur de marqueur
« nitro » (ester de tertibutyle de l'acide
[3-(2-nitro-pyridin-3-yloxy)-propyl]-carbamique) est
ajouté directement dans le tube contenant le complexe
K[¹⁸F]-K₂₂₂ séché. Le tube (non scellé) est alors placé
10 dans un bloc de chauffage (à 145°C pendant 4 minutes).
Le tube est ensuite refroidi en utilisant un bain
glace/eau et la radioactivité restante est mesurée.

85 % à 95 % de l'activité initiale placée
dans le récipient est encore présente. Le mélange
15 réactionnel obtenu de couleur sombre, est alors analysé
par radiochromatographie. Les rendements
d'incorporation sont calculés à partir du
radiochromatogramme en CCM et sont définis par le
rapport de surface du dérivé ester de tertibutyle de
20 l'acide [3-(2-[¹⁸F]fluoro-pyridin-3-yloxy)-propyl]-
carbamique sur l'activité totale du ¹⁸F fluor-18
(SiO₂-CCM ; éluant : EtOAc ; Rf : : 0,75 et Rf : ion
fluorure [¹⁸F] : 0,0). Le mélange réactionnel est dilué
avec 1 mL d'eau et transféré sur une cartouche C18
25 Sep-pak (waters). Le tube est rincé 2 fois avec 1 mL
d'eau, qui est également transférée et ajoutée au
mélange réactionnel dilué sur la cartouche.

On fait ensuite passer l'ensemble à travers
la cartouche. La cartouche est lavée avec 3 mL d'eau et
30 séchée en partie pendant 0,5 minute, en envoyant un
courant d'azote.

Le dérivé de l'ester de tertibutyle de l'acide . [3-(2-[¹⁸F]fluoro-pyridin-3-yloxy)-propyl]-carbamique est élué à partir de la cartouche avec 3 mL de dichlorométhane dans une fiole de réaction contenant
5 0,1 mL de TFA. On utilise 2 fois 1 mL de dichlorométhane pour laver la cartouche et pour transférer complètement le dérivé marqué au [¹⁸F] mentionné ci-dessus (5 % de la quantité de radioactivité totale, impliquée dans le processus de
10 fluoration, reste sur la cartouche). Le rendement d'incorporation est également confirmé après l'élution du Sep-pak par le rapport des valeurs de comptage du CH₂Cl₂ sur radioactivité totale éluée (DMSO/H₂O+CH₂Cl₂). La solution résultante CH₂Cl₂/TFA (50/1, V/V) est
15 concentrée à siccité (à 65-75°C) sous un courant d'azote modéré pendant 4 à 6 minutes). Le rendement de la déprotection est quantitatif : Aucune molécule, décrite ci-dessus, protégée par BOC ne peut être détectée par radiochromatographie. Le résidu,
20 ci-dessus, est redissous dans 2 mL de CH₂Cl₂ et concentré de nouveau à siccité pour minimiser la présence de TFA (à 65-75°C sous un courant modéré d'azote pendant 4 à 6 minutes). Le résidu est alors dilué avec 0,5 mL de xylène contenant 25 mg de
25 N-méthoxycarbonylmaléimide. Le récipient est alors hermétiquement fermé, chauffé pendant 5 minutes à 190°C (fort reflux), puis refroidi pendant 2 minutes, en utilisant un bain glace/eau. Le mélange réactionnel est alors injecté sur une colonne de HPLC semi-préparative.
30 Elution isocratique [éluant : heptane/EtOAc : 50/50 ; débit : 6,0 mL/minute] qui donne de la

1-(3-(2-[¹⁸F]fluor-pyridin-3-yloxy)-propyl)-pyrrole-2,5-dione marquée, pure, temps de rétention : 7,5 à 8,0 minutes.

Typiquement, 60 à 70 mCi de
5 1-[3-(2-[¹⁸F]fluor-pyridin-3-yloxy)-propyl]-pyrrole-2,5-dione marquée, pure, peuvent être obtenus en 75 à 85 minutes, à partir de 550-650 mCi d'un lot de production [¹⁸F]F⁻ d'un cyclotron.

10 Exemple 7 bis :

Le composé marqué au fluor-18, la 1-[3-(2-[¹⁸F]fluoro-pyridin-3-yloxy)-propyl]-pyrrole-2,5-dione peut également être préparé en répétant les étapes à)
15 et b) du procédé décrit dans l'exemple 7, toujours en utilisant comme précurseur de marquage, le composé « nitro » (ester de tertibutyle de l'acide [3-(2-nitro-pyridin-3-yloxy)-propyl]-carbamique), mais en modifiant la partie finale de la préparation (étape c))
20 de la façon suivante (variante selon laquelle l'étape c) est réalisée dans un mélange biphasique de dioxanne et de bicarbonate de sodium aqueux).

Après déprotection de la fonction amine (TFA/CH₂Cl₂), le résidu obtenu après concentration à
25 siccité est repris par 0,250 mL de dioxanne contenant 25 mg de N-méthoxycarbonylmaléimide. A cette solution, 0,750 mL d'une solution aqueuse saturée en bicarbonate de sodium sont ajoutés et la préparation est vortexée à température ambiante pendant 10 minutes. Le mélange
30 réactionnel est ensuite dilué avec 1 mL d'eau et transféré sur une cartouche C18 Sep-pak^{MC} (Waters). La

fiOLE est rincé 2 fois avec 1 mL d'eau, qui est également transféré et ajouté au mélange réactionnel dilué sur la cartouche. Enfin 8 mL d'eau sont encore ajoutés au mélange réactionnel dilué sur la cartouche.

5 On fait ensuite passer l'ensemble sur la cartouche. La cartouche est lavé avec 3 mL d'eau et séchée en partie pendant 0,5 minutes, en envoyant un courant d'azote. Le dérivé marqué au fluor-18 (1-[3-(2-[¹⁸F]fluoro-pyridin-3-yloxy)-propyl]-pyrrole-2,5-dione) est élué à partir

10 de la cartouche avec 3 mL de dichlorométhane dans une nouvelle fiole vide. On utilise deux fois 1 mL de dichlorométhane pour laver la cartouche et pour transférer complètement le dérivé marqué au [¹⁸F] mentionné ci-dessus. La solution contenant le dérivé

15 marqué au [¹⁸F] mentionné ci-dessus est concentrée (à 65-75°C, sous un courant d'azote modéré pendant 3 à 5 minutes) jusqu'à un volume d'environ 1 mL et injectée sur une colonne de HPLC semi-préparative. La purification est identique à celle décrite dans

20 l'exemple 7.

Exemple 7 ter :

Le composé marqué au fluor-18, la 1-[3-(2-

25 [¹⁸F]fluoro-pyridin-3-yloxy)-propyl]-pyrrole-2,5-dione peut également être préparé en répétant les étapes a) et b) du procédé décrit dans l'exemple 7 ou 7 bis, mais en utilisant comme précurseur de marquage, le composé

« triméthylammonium-trifluoromethane sulfonate »

30 (trifluoromethanesulfonate de [3-(3-tert-

butoxycarbonylamino-propoxy)-pyridin-2-yl]-trimethyl-ammonium).

Exemple 8

5

Dans cet exemple, on décrit le marquage d'un peptide, à savoir le peptide N-acétyl-Lys-Ala-Ala-Ala-Ala-Cys-amide, par un composé selon l'invention, qui est le

10 1-[3-(2-[¹⁸F]fluor-pyridin-3-yloxy)-propyl]-pyrrole-2,5-dione.

Le mode opératoire est le suivant :

A un équivalent de peptide (2mg/mL; 200 nmole; 36,2 µL) en solution dans du tampon Tris 50 mM, NaCl 150 mM, pH=7,4 on ajoute 1 équivalent de TCEP dans


15 tampon Tris (7,9 mg/mL; 7,3 µL; 200 nmole). L'échantillon est laissé 5mn à température ambiante puis est dilué dans 1mL de tampon Tris. Le synthon sec 1-[3-(2-[¹⁸F]fluor-pyridin-3-yloxy)-propyl]-pyrrole-2,5-

20 dione est repris dans 100µL d'un mélange heptane/acétate d'éthyle 50/50, et la solution de peptide réduit est ajoutée. L'échantillon est laissé 10 mn à température ambiante en agitant de temps en temps. Le peptide marqué est purifié par HPLC sur colonne C18

25 avec un gradient de 0 à 34% acétonitrile/0,1%TFA dans H₂O/0,1%TFA en 30 mn (colonne DeltaPak^{MC} C18, R_t-peptide=28mn).

REVENDICATIONS


1. Composé de formule générale (I) :



5

dans laquelle :

- m représente un nombre entier de 0 à 10;
- n représente un nombre entier de 1 à 10;
- Y représente un groupe hétérocyclique monocyclique ou bicyclique qui est : imidazolyle, pyrazolyle, benzimidazolyle, pyridinyle, piridazinyle, pyrimidinyle, pyrazinyle, triazinyle, quinolinyle, isoquinolinyle, cinnolinyle, quinazolinyle, quinoxalinyle, ou purinyle, Y pouvant être, éventuellement, substitué par un ou plusieurs substituants, chacun de ces substituants étant indépendamment : l'hydrogène, un halogène, un groupe phényle, alkyle en C₁₋₆, alcoxy en C₁₋₆, aryloxy, amino, mono- ou di(alkyle en C₁₋₆)amino, mono- ou di(aryl)amino, thio, alkyle en C₁₋₆-thio, arylthio, formyle, alkyle en C₁₋₆-carbonyle, arylcarbonyle, carbonyle, alcoxy en C₁₋₆-carbonyle, aryloxycarbonyle, alkyle en C₁₋₆-aminocarbonyle, arylaminocarbonyle, ou trifluorométhyle ;
- X représente un radical de formule :



dans laquelle :

- 5 - a, b, c, d, e, f, g représentent chacun
indépendamment un nombre entier de 0 à 10;
- U, V et W représentent chacun
- indépendamment $-NR_1-$, $-O-$, $-S-$, $\overset{O}{\underset{|}{-N-}}$, éthyne, $-CR_1=CR_2-$, $-(C=O)-$, $-(C=S)-$, $-C(=NR_1)-$, $-C(=O)O-$,
10 $-(C=S)S-$, $-C(=NR_1)NR_2-$, $-CR_1R_2-$, $-CR_1OR_2-$, ou $-CR_1NR_2R_3-$,
où R_1 , R_2 , R_3 et R_4 sont chacun indépendamment :
l'hydrogène, un halogène, un groupe phényle, alkyle en
 C_{1-6} , alcoxy en C_{1-6} , aryloxy, amino, mono- ou di(alkyle
en C_{1-6})amino, mono- ou di(aryl)amino, thio, alkyle en
15 C_{1-6} -thio, arylthio, formyle, alkyle en C_{1-6} -carbonyle,
arylcarbonyle, carbonyle alcoxy en C_{1-6} -carbonyle,
aryloxycarbonyle, alkyle en C_{1-6} -aminocarbonyle,
arylamino, carbonyle, ou trifluorométhyle ; ou bien R_1 et
 R_2 ou R_3 et R_4 forment un groupement phényle avec l'atome
20 de carbone auquel ils sont rattachés.


2. Composé de formule (I) selon la
revendication 1, dans laquelle n est 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9 ou 10 ; m est 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ou
10 ; et a, b, c, d, e, f, g représentent chacun
25 indépendamment un nombre entier qui est 0, 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8 ou 9.

3. Composé de formule (I) selon la
revendication 1 ou 2, dans laquelle n=1 ; et Y est un
groupe 3-pyridinyle.

B14000/PA

45

4. Composé selon la revendication 3, qui répond à la formule (II) suivante :



5


dans laquelle p est un nombre entier de 1 à 10.

5. Composé de formula (II) selon la revendication 4, dans laquelle p est un nombre entier qui est 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ou 9.

10 6. Composé de formule (II) selon la revendication 4 ou 5, qui est :

- la 1-[2-(2-[¹⁸F]fluoro-pyridin-3-yloxy)-éthyl]-pyrrole-2,5-dione ;
- la 1-[4-(2-[¹⁸F]fluoro-pyridin-3-yloxy)-butyl]-pyrrole-2,5-dione ;
- la 1-[5-(2-[¹⁸F]fluoro-pyridin-3-yloxy)-pentyl]-pyrrole-2,5-dione ;
- la 1-[6-(2-[¹⁸F]fluoro-pyridin-3-yloxy)-hexyl]-pyrrole-2,5-dione ;
- la 1-[(2-[¹⁸F]fluoro-pyridin-3-yloxy)-méthyl]-pyrrole-2,5-dione ; ou
- la 1-[3-(2-[¹⁸F]fluoro-pyridin-3-yloxy)-propyl]-pyrrole-2,5-dione.

25 7. Composé selon la revendication 3, qui répond à la formule (III) suivante :



dans laquelle q et r représentent chacun indépendamment un nombre entier de 0 à 10.

5 8. Composé de formule (III) selon la revendication 7, dans laquelle q et r représentent chacun indépendamment un nombre entier qui est 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ou 9.


10 9. Composé de formule (III) selon la revendication 7 ou 8, qui est :

- la 1-{4-[2-(2-[¹⁸F]fluoro-pyridin-3-yloxy)-ethyl]-phenyl}-pyrrole-2,5-dione ;

- la 1-[4-(2-[¹⁸F]fluoro-pyridin-3-yloxymethyl)-phenyl]-pyrrole-2,5-dione ; ou

15 - la 1-[4-(2-[¹⁸F]fluoro-pyrridin-3-yloxymethyl)-benzyl]-pyrrole-2,5-dione.

10. Composé selon la revendication 3, qui répond à la formule (IV) suivante :



20

dans laquelle s est un nombre entier de 1 à 10.


11. Composé de formule (IV) selon la revendication 10, dans laquelle s est un nombre entier qui est 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ou 9.

12. Composé de formule (IV) selon la revendication 10 ou 11, qui est :

- la 1-[3-(6-[¹⁸F]fluoro-pyridin-3-yl)-propyl]-pyrrole-2,5-dione.

13. Composé selon la revendication 3, qui répond à la formule (V) suivante :

10



dans laquelle t est un nombre entier de 0 à 10 ; et T est un groupe -CH=CH- ou -C≡C-.

14. Composé de formule (V) selon la revendication 13, dans laquelle t est un nombre entier qui est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ou 9.

15. Composé selon la revendication 13 ou 14, qui est :

- la 1-[3-(6-[¹⁸F] fluoro-pyridin-3-yl)-allyl]-pyrrole-2,5-dione ; ou

- la 1-[3-(6-[¹⁸F]fluoro-pyridin-3-yl)-prop-2-ynyl]-pyrrole-2,5-dione.

16. Utilisation d'un composé selon l'une quelconque des revendications 1 à 15, pour le marquage

d'une macromolécule, étant entendu que la macromolécule n'est pas un peptide comprenant la séquence peptidique suivante :

J¹-J²-J³-J⁴-J⁵-J⁶-Asp-U⁸-J⁹-J¹⁰-U¹¹-Arg-J¹³-Ala-U¹⁵-Lys-
 5 Gly-X¹⁸-Gly-Thr-J²¹-Glu-J²³-J²⁴-U²⁵-J²⁶-J²⁷-J²⁸-U²⁹-J³⁰-J³¹-
 Arg-J³³-J³⁴-J³⁵-J³⁶-B³⁷-Gln-J³⁹-U⁴⁰-J⁴¹-J⁴²-J⁴³-U⁴⁴-J⁴⁵-J⁴⁶-J⁴⁷-
 J⁴⁸-J⁴⁹-Arg-J⁵¹-U⁵²-J⁵³-J⁵⁴-Asp-U⁵⁶-Lys-Ser-Z⁵⁹-Leu-J⁶¹-Gly-
 J⁶³-J⁶⁴-Z⁶⁵-J⁶⁶-J⁶⁷-U⁶⁸-J⁶⁹-J⁷⁰-J⁷¹-U⁷²-J⁷³-J⁷⁴-Ser

10 dans laquelle J, Z, U, X et B représentent des acides aminés,

- les acides aminés J étant identiques ou différents les uns des autres, et représentent des acides aminés naturels, ou des dérivés de ceux-ci, de
 15 telle manière qu'au moins 50% d'entre eux sont les résidus polaires, Arg, Asn, Asp, Cys, Gln, Glu, Gly, His, Lys, Orn, Pro, Ser, Thr ou Tyr ;

- l'acide aminé X¹⁸ étant identique ou différent de l'un ou l'autre des acides aminés de la séquence
 20 peptidique, et représente Ala, Asn, Cys, Gln, Gly, His, Ile, Leu, Met, Phe, Ser, Thr, Trp, Tyr ou Val ;

- les acides aminés Z⁵⁹ et Z⁶⁵ étant identiques ou différents les uns des autres et représentent Glu, Asp, Lys ou Arg ; et

25 - les acides aminés U et B de la séquence étant choisis suivant l'un des exemples a) à l) exposés dans le tableau 1 suivant :

	U ⁸	U ¹¹	U ¹⁵	U ²⁵	U ²⁹	B ³⁷	U ⁴⁰	U ⁴⁴	U ⁵²	U ⁵⁶	U ⁶⁸	U ⁷²
Ex a)	Val	Leu	Met	Ile	Leu	Arg	Ile	Tyr	Leu	Leu	Val	Leu

Ex b)	Ala	Ile	Ile	Ile	Leu	Arg	Ile	Tyr	Leu	Leu	Ile	Leu
Ex c)	Ala	Ile	Ile	Ile	Leu	Arg	Ile	Tyr	Leu	Leu	Met	Val
Ex d)	Ala	Leu	Met	Leu	Leu	Arg	Ile	Tyr	Leu	Leu	Ile	Met
Ex e)	Ala	Leu	Met	Ile	Ile	Arg	Val	Tyr	Leu	Leu	Ile	Met
Ex f)	Ala	Leu	Met	Ile	Ile	Arg	Ile	Phe	Leu	Leu	Ile	Met
Ex g)	Ala	Leu	Met	Ile	Val	Arg	Ile	Phe	Leu	Leu	Ile	Phe
Ex h)	Val	Leu	Met	Ile	Leu	Arg	Ile	Phe	Leu	Leu	Ile	Met
Ex i)	Ala	Leu	Met	Ile	Leu	Arg	Ile	Phe	Leu	Leu	Ile	Met
Ex j)	Ala	Leu	Met	Ile	Leu	Arg	Ile	Tyr	Leu	Leu	Ala	Ala
Ex k)	Val	Leu	Met	Ile	Leu	Arg	Ile	Tyr	Leu	Leu	Val	Leu
Ex l)	Val	Leu	Met	Ile	Leu	Arg	Ile	Phe	Leu	Leu	Val	Leu

(Ex =exemple) ,

les exposants des J, Z, U, X et B représentant la position de ces acides aminés dans ladite séquence.

5 17. Utilisation selon la revendication 16, dans laquelle ladite macromolécule est un oligonucléotide, une protéine, un anticorps ou un peptide, étant entendu que ledit peptide n'est pas un peptide comprenant la séquence peptidique suivante :

10 J¹-J²-J³-J⁴-J⁵-J⁶-Asp-U⁸-J⁹-J¹⁰-U¹¹-Arg-J¹³-Ala-U¹⁵-Lys-Gly-X¹⁸-Gly-Thr-J²¹-Glu-J²³-J²⁴-U²⁵-J²⁶-J²⁷-J²⁸-U²⁹-J³⁰-J³¹-Arg-J³³-J³⁴-J³⁵-J³⁶-B³⁷-Gln-J³⁹-U⁴⁰-J⁴¹-J⁴²-J⁴³-U⁴⁴-J⁴⁵-J⁴⁶-J⁴⁷-J⁴⁸-J⁴⁹-Arg-J⁵¹-U⁵²-J⁵³-J⁵⁴-Asp-U⁵⁶-Lys-Ser-Z⁵⁹-Leu-J⁶¹-Gly-J⁶³-J⁶⁴-Z⁶⁵-J⁶⁶-J⁶⁷-U⁶⁸-J⁶⁹-J⁷⁰-J⁷¹-U⁷²-J⁷³-J⁷⁴-Ser

dans laquelle J, Z, U, X et B représentent des acides aminés,

- les acides aminés J étant identiques ou différents les uns des autres, et représentent des
5 acides aminés naturels, ou des dérivés de ceux-ci, de telle manière qu'au moins 50% d'entre eux sont les résidus polaires, Arg, Asn, Asp, Cys, Gln, Glu, Gly, His, Lys, Orn, Pro, Ser, Thr ou Tyr ;

- l'acide aminé X¹⁸ étant identique ou différent de
10 l'un ou l'autre des acides aminés de la séquence peptidique, et représente Ala, Asn, Cys, Gln, Gly, His, Ile, Leu, Met, Phe, Ser, Thr, Trp, Tyr ou Val ;

- les acides aminés Z⁵⁹ et Z⁶⁵ étant identiques ou différents les uns des autres et représentent Glu, Asp,
15 Lys ou Arg ; et

- les acides aminés U et B de la séquence étant choisis suivant l'un des exemples a) à l) exposés dans le tableau 1 suivant :

	U ⁸	U ¹¹	U ¹⁵	U ²⁵	U ²⁹	B ³⁷	U ⁴⁰	U ⁴⁴	U ⁵²	U ⁵⁶	U ⁶⁸	U ⁷²
Ex a)	Val	Leu	Met	Ile	Leu	Arg	Ile	Tyr	Leu	Leu	Val	Leu
Ex b)	Ala	Ile	Ile	Ile	Leu	Arg	Ile	Tyr	Leu	Leu	Ile	Leu
Ex c)	Ala	Ile	Ile	Ile	Leu	Arg	Ile	Tyr	Leu	Leu	Met	Val
Ex d)	Ala	Leu	Met	Leu	Leu	Arg	Ile	Tyr	Leu	Leu	Ile	Met
Ex e)	Ala	Leu	Met	Ile	Ile	Arg	Val	Tyr	Leu	Leu	Ile	Met
Ex f)	Ala	Leu	Met	Ile	Ile	Arg	Ile	Phe	Leu	Leu	Ile	Met
Ex g)	Ala	Leu	Met	Ile	Val	Arg	Ile	Phe	Leu	Leu	Ile	Phe

Ex h)	Val	Leu	Met	Ile	Leu	Arg	Ile	Phe	Leu	Leu	Ile	Met
Ex i)	Ala	Leu	Met	Ile	Leu	Arg	Ile	Phe	Leu	Leu	Ile	Met
Ex j)	Ala	Leu	Met	Ile	Leu	Arg	Ile	Tyr	Leu	Leu	Ala	Ala
Ex k)	Val	Leu	Met	Ile	Leu	Arg	Ile	Tyr	Leu	Leu	Val	Leu
Ex l)	Val	Leu	Met	Ile	Leu	Arg	Ile	Phe	Leu	Leu	Val	Leu

(Ex =exemple) ,

les exposants des J, Z, U, X et B
représentant la position de ces acides aminés dans
5 ladite séquence.

18. Utilisation selon la revendication 16 ou
17, dans laquelle la macromolécule est une macromolécule
de reconnaissance d'un site spécifique.

19. Utilisation selon la revendication 18,
10 dans laquelle ledit site spécifique est un site
présentant une molécule cible spécifique d'une
pathologie.

20. Utilisation selon la revendication 18 ou
19, dans laquelle ledit site spécifique est un site
15 d'apoptose, de nécrose, ou de zone tumorale.

21. Complexe comprenant une macromolécule
couplée à un composé selon l'une quelconque des
revendications 1 à 15, étant entendu que ladite
macromolécule n'est pas un peptide comprenant la
20 séquence peptidique suivante :

$J^1-J^2-J^3-J^4-J^5-J^6$ -Asp- $U^8-J^9-J^{10}-U^{11}$ -Arg- J^{13} -Ala- U^{15} -Lys-
Gly- X^{18} -Gly-Thr- J^{21} -Glu- $J^{23}-J^{24}-U^{25}-J^{26}-J^{27}-J^{28}-U^{29}-J^{30}-J^{31}$ -
Arg- $J^{33}-J^{34}-J^{35}-J^{36}$ -B³⁷-Gln- $J^{39}-U^{40}-J^{41}-J^{42}-J^{43}-U^{44}-J^{45}-J^{46}-J^{47}$ -

J⁴⁸-J⁴⁹-Arg-J⁵¹-U⁵²-J⁵³-J⁵⁴-Asp-U⁵⁶-Lys-Ser-Z⁵⁹-Leu-J⁶¹-Gly-
J⁶³-J⁶⁴-Z⁶⁵-J⁶⁶-J⁶⁷-U⁶⁸-J⁶⁹-J⁷⁰-J⁷¹-U⁷²-J⁷³-J⁷⁴-Ser

dans laquelle J, Z, U, X et B représentent des
5 acides aminés,

- les acides aminés J étant identiques ou
différents les uns des autres, et représentent des
acides aminés naturels, ou des dérivés de ceux-ci, de
telle manière qu'au moins 50% d'entre eux sont les
10 résidus polaires, Arg, Asn, Asp, Cys, Gln, Glu, Gly,
His, Lys, Orn, Pro, Ser, Thr ou Tyr ;

- l'acide aminé X¹⁸ étant identique ou différent de
l'un ou l'autre des acides aminés de la séquence
peptidique, et représente Ala, Asn, Cys, Gln, Gly, His,
15 Ile, Leu, Met, Phe, Ser, Thr, Trp, Tyr ou Val ;

- les acides aminés Z⁵⁹ et Z⁶⁵ étant identiques ou
différents les uns des autres et représentent Glu, Asp,
Lys ou Arg ; et

- les acides aminés U et B de la séquence étant
20 choisis suivant l'un des exemples a) à l) exposés dans
le tableau 1 suivant :

	U ⁸	U ¹¹	U ¹⁵	U ²⁵	U ²⁹	B ³⁷	U ⁴⁰	U ⁴⁴	U ⁵²	U ⁵⁶	U ⁶⁸	U ⁷²
Ex a)	Val	Leu	Met	Ile	Leu	Arg	Ile	Tyr	Leu	Leu	Val	Leu
Ex b)	Ala	Ile	Ile	Ile	Leu	Arg	Ile	Tyr	Leu	Leu	Ile	Leu
Ex c)	Ala	Ile	Ile	Ile	Leu	Arg	Ile	Tyr	Leu	Leu	Met	Val
Ex d)	Ala	Leu	Met	Leu	Leu	Arg	Ile	Tyr	Leu	Leu	Ile	Met
Ex e)	Ala	Leu	Met	Ile	Ile	Arg	Val	Tyr	Leu	Leu	Ile	Met

B14000/PA

53

Ex f)	Ala	Leu	Met	Ile	Ile	Arg	Ile	Phe	Leu	Leu	Ile	Met
Ex g)	Ala	Leu	Met	Ile	Val	Arg	Ile	Phe	Leu	Leu	Ile	Phe
Ex h)	Val	Leu	Met	Ile	Leu	Arg	Ile	Phe	Leu	Leu	Ile	Met
Ex i)	Ala	Leu	Met	Ile	Leu	Arg	Ile	Phe	Leu	Leu	Ile	Met
Ex j)	Ala	Leu	Met	Ile	Leu	Arg	Ile	Tyr	Leu	Leu	Ala	Ala
Ex k)	Val	Leu	Met	Ile	Leu	Arg	Ile	Tyr	Leu	Leu	Val	Leu
Ex l)	Val	Leu	Met	Ile	Leu	Arg	Ile	Phe	Leu	Leu	Val	Leu

(Ex =exemple) ,

les exposants des J, Z, U, X et B
représentant la position de ces acides aminés dans
5 ladite séquence.

22. Complexe selon la revendication 21, dans
lequel ladite macromolécule est un oligonucléotide, une
protéine, un anticorps ou un peptide, étant entendu que
ledit peptide n'est pas un peptide comprenant la
10 séquence peptidique suivante :

J¹-J²-J³-J⁴-J⁵-J⁶-Asp-U⁸-J⁹-J¹⁰-U¹¹-Arg-J¹³-Ala-U¹⁵-Lys-
Gly-X¹⁸-Gly-Thr-J²¹-Glu-J²³-J²⁴-U²⁵-J²⁶-J²⁷-J²⁸-U²⁹-J³⁰-J³¹-
Arg-J³³-J³⁴-J³⁵-J³⁶-B³⁷-Gln-J³⁹-U⁴⁰-J⁴¹-J⁴²-J⁴³-U⁴⁴-J⁴⁵-J⁴⁶-J⁴⁷-
J⁴⁸-J⁴⁹-Arg-J⁵¹-U⁵²-J⁵³-J⁵⁴-Asp-U⁵⁶-Lys-Ser-Z⁵⁹-Leu-J⁶¹-Gly-
15 J⁶³-J⁶⁴-Z⁶⁵-J⁶⁶-J⁶⁷-U⁶⁸-J⁶⁹-J⁷⁰-J⁷¹-U⁷²-J⁷³-J⁷⁴-Ser

dans laquelle J, Z, U, X et B représentent des
acides aminés,

- les acides aminés J étant identiques ou
20 différents les uns des autres, et représentent des
acides aminés naturels, ou des dérivés de ceux-ci, de

telle manière qu'au moins 50% d'entre eux sont les résidus polaires, Arg, Asn, Asp, Cys, Gln, Glu, Gly, His, Lys, Orn, Pro, Ser, Thr ou Tyr ;

- l'acide aminé X¹⁸ étant identique ou différent de l'un ou l'autre des acides aminés de la séquence peptidique, et représente Ala, Asn, Cys, Gln, Gly, His, Ile, Leu, Met, Phe, Ser, Thr, Trp, Tyr ou Val ;

- les acides aminés Z⁵⁹ et Z⁶⁵ étant identiques ou différents les uns des autres et représentent Glu, Asp, Lys ou Arg ; et

- les acides aminés U et B de la séquence étant choisis suivant l'un des exemples a) à l) exposés dans le tableau 1 suivant :

	U ⁸	U ¹¹	U ¹⁵	U ²⁵	U ²⁹	B ³⁷	U ⁴⁰	U ⁴⁴	U ⁵²	U ⁵⁶	U ⁶⁸	U ⁷²
Ex a)	Val	Leu	Met	Ile	Leu	Arg	Ile	Tyr	Leu	Leu	Val	Leu
Ex b)	Ala	Ile	Ile	Ile	Leu	Arg	Ile	Tyr	Leu	Leu	Ile	Leu
Ex c)	Ala	Ile	Ile	Ile	Leu	Arg	Ile	Tyr	Leu	Leu	Met	Val
Ex d)	Ala	Leu	Met	Leu	Leu	Arg	Ile	Tyr	Leu	Leu	Ile	Met
Ex e)	Ala	Leu	Met	Ile	Ile	Arg	Val	Tyr	Leu	Leu	Ile	Met
Ex f)	Ala	Leu	Met	Ile	Ile	Arg	Ile	Phe	Leu	Leu	Ile	Met
Ex g)	Ala	Leu	Met	Ile	Val	Arg	Ile	Phe	Leu	Leu	Ile	Phe
Ex h)	Val	Leu	Met	Ile	Leu	Arg	Ile	Phe	Leu	Leu	Ile	Met
Ex i)	Ala	Leu	Met	Ile	Leu	Arg	Ile	Phe	Leu	Leu	Ile	Met
Ex j)	Ala	Leu	Met	Ile	Leu	Arg	Ile	Tyr	Leu	Leu	Ala	Ala
Ex k)	Val	Leu	Met	Ile	Leu	Arg	Ile	Tyr	Leu	Leu	Val	Leu

B14000/PA

55

Ex 1)	Val	Leu	Met	Ile	Leu	Arg	Ile	Phe	Leu	Leu	Val	Leu
-------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

(Ex =exemple) ,

les exposants des J, Z, U, X et B
représentant la position de ces acides aminés dans
5 ladite séquence.

23. Complexe selon la revendication 22, dans
lequel ledit couplage est réalisé par réaction de la
double liaison du groupe maléimido avec une fonction -SH
de la cystéine dans le cas d'un peptide, ou une fonction
10 phosphoro-thioate dans le cas d'un oligonucléotide.

24. Complexe selon l'une quelconque des
revendications 21 à 23, dans lequel la macromolécule est
une macromolécule de reconnaissance d'un site
spécifique.

15 25. Complexe selon la revendication 24, dans
lequel ledit site spécifique est un site présentant une
molécule cible spécifique d'une pathologie.

26. Complexe selon la revendication 24 ou
25, dans lequel ledit site spécifique est le site
20 d'apoptose, de nécrose, ou de zone tumorale.

27. Trousse d'analyse et de détection
comprenant un composé selon l'une quelconque des
revendications 1 à 15 et une macromolécule, ladite
trousse comprenant en outre un document en décrivant le
25 mode d'emploi, étant entendu que ladite macromolécule
n'est pas un peptide comprenant la séquence peptidique
suivante :

30 J¹-J²-J³-J⁴-J⁵-J⁶-Asp-U⁸-J⁹-J¹⁰-U¹¹-Arg-J¹³-Ala-U¹⁵-Lys-
Gly-X¹⁸-Gly-Thr-J²¹-Glu-J²³-J²⁴-U²⁵-J²⁶-J²⁷-J²⁸-U²⁹-J³⁰-J³¹-
Arg-J³³-J³⁴-J³⁵-J³⁶-B³⁷-Gln-J³⁹-U⁴⁰-J⁴¹-J⁴²-J⁴³-U⁴⁴-J⁴⁵-J⁴⁶-J⁴⁷-

B14000/PA

56

J⁴⁸-J⁴⁹-Arg-J⁵¹-U⁵²-J⁵³-J⁵⁴-Asp-U⁵⁶-Lys-Ser-Z⁵⁹-Leu-J⁶¹-Gly-
J⁶³-J⁶⁴-Z⁶⁵-J⁶⁶-J⁶⁷-U⁶⁸-J⁶⁹-J⁷⁰-J⁷¹-U⁷²-J⁷³-J⁷⁴-Ser

dans laquelle J, Z, U, X et B représentent des
5 acides aminés,

- les acides aminés J étant identiques ou
différents les uns des autres, et représentent des
acides aminés naturels, ou des dérivés de ceux-ci, de
telle manière qu'au moins 50% d'entre eux sont les
10 résidus polaires, Arg, Asn, Asp, Cys, Gln, Glu, Gly,
His, Lys, Orn, Pro, Ser, Thr ou Tyr ;

- l'acide aminé X¹⁸ étant identique ou différent de
l'un ou l'autre des acides aminés de la séquence
peptidique, et représente Ala, Asn, Cys, Gln, Gly, His,
15 Ile, Leu, Met, Phe, Ser, Thr, Trp, Tyr ou Val ;

- les acides aminés Z⁵⁹ et Z⁶⁵ étant identiques ou
différents les uns des autres et représentent Glu, Asp,
Lys ou Arg ; et

- les acides aminés U et B de la séquence étant
20 choisis suivant l'un des exemples a) à l) exposés dans
le tableau 1 suivant :

	U ⁸	U ¹¹	U ¹⁵	U ²⁵	U ²⁹	B ³⁷	U ⁴⁰	U ⁴⁴	U ⁵²	U ⁵⁶	U ⁶⁸	U ⁷²
Ex a)	Val	Leu	Met	Ile	Leu	Arg	Ile	Tyr	Leu	Leu	Val	Leu
Ex b)	Ala	Ile	Ile	Ile	Leu	Arg	Ile	Tyr	Leu	Leu	Ile	Leu
Ex c)	Ala	Ile	Ile	Ile	Leu	Arg	Ile	Tyr	Leu	Leu	Met	Val
Ex d)	Ala	Leu	Met	Leu	Leu	Arg	Ile	Tyr	Leu	Leu	Ile	Met
Ex e)	Ala	Leu	Met	Ile	Ile	Arg	Val	Tyr	Leu	Leu	Ile	Met

Ex f)	Ala	Leu	Met	Ile	Ile	Arg	Ile	Phe	Leu	Leu	Ile	Met
Ex g)	Ala	Leu	Met	Ile	Val	Arg	Ile	Phe	Leu	Leu	Ile	Phe
Ex h)	Val	Leu	Met	Ile	Leu	Arg	Ile	Phe	Leu	Leu	Ile	Met
Ex i)	Ala	Leu	Met	Ile	Leu	Arg	Ile	Phe	Leu	Leu	Ile	Met
Ex j)	Ala	Leu	Met	Ile	Leu	Arg	Ile	Tyr	Leu	Leu	Ala	Ala
Ex k)	Val	Leu	Met	Ile	Leu	Arg	Ile	Tyr	Leu	Leu	Val	Leu
Ex l)	Val	Leu	Met	Ile	Leu	Arg	Ile	Phe	Leu	Leu	Val	Leu

(Ex =exemple) ,

les exposants des J, Z, U, X et B
représentant la position de ces acides aminés dans
5 ladite séquence.

28. Trousse d'analyse et de détection
comprenant un complexe selon l'une quelconque des
revendications 21 à 26, ladite trousse comprenant en
outre un document en décrivant le mode d'emploi.

10 29. Trousse d'analyse et de détection selon
la revendication 27 ou 28, utilisée pour l'imagerie
médicale.

30. Trousse de diagnostic comprenant un
composé selon l'une quelconque des revendications 1 à 15
15 et une macromolécule, ladite trousse comprenant en outre
un document en décrivant le mode d'emploi, étant entendu
que ladite macromolécule n'est pas un peptide comprenant
la séquence peptidique suivante :

20 J¹-J²-J³-J⁴-J⁵-J⁶-Asp-U⁸-J⁹-J¹⁰-U¹¹-Arg-J¹³-Ala-U¹⁵-Lys-
Gly-X¹⁸-Gly-Thr-J²¹-Glu-J²³-J²⁴-U²⁵-J²⁶-J²⁷-J²⁸-U²⁹-J³⁰-J³¹-
Arg-J³³-J³⁴-J³⁵-J³⁶-B³⁷-Gln-J³⁹-U⁴⁰-J⁴¹-J⁴²-J⁴³-U⁴⁴-J⁴⁵-J⁴⁶-J⁴⁷-

B14000/PA

58

J⁴⁸-J⁴⁹-Arg-J⁵¹-U⁵²-J⁵³-J⁵⁴-Asp-U⁵⁶-Lys-Ser-Z⁵⁹-Leu-J⁶¹-Gly-
J⁶³-J⁶⁴-Z⁶⁵-J⁶⁶-J⁶⁷-U⁶⁸-J⁶⁹-J⁷⁰-J⁷¹-U⁷²-J⁷³-J⁷⁴-Ser

dans laquelle J, Z, U, X et B représentent des
5 acides aminés,

- les acides aminés J étant identiques ou
différents les uns des autres, et représentent des
acides aminés naturels, ou des dérivés de ceux-ci, de
telle manière qu'au moins 50% d'entre eux sont les
10 résidus polaires, Arg, Asn, Asp, Cys, Gln, Glu, Gly,
His, Lys, Orn, Pro, Ser, Thr ou Tyr ;

- l'acide aminé X¹⁸ étant identique ou différent de
l'un ou l'autre des acides aminés de la séquence
peptidique, et représente Ala, Asn, Cys, Gln, Gly, His,
15 Ile, Leu, Met, Phe, Ser, Thr, Trp, Tyr ou Val ;

- les acides aminés Z⁵⁹ et Z⁶⁵ étant identiques ou
différents les uns des autres et représentent Glu, Asp,
Lys ou Arg ; et

- les acides aminés U et B de la séquence étant
20 choisis suivant l'un des exemples a) à l) exposés dans
le tableau 1 suivant :

	U ⁸	U ¹¹	U ¹⁵	U ²⁵	U ²⁹	B ³⁷	U ⁴⁰	U ⁴⁴	U ⁵²	U ⁵⁶	U ⁶⁸	U ⁷²
Ex a)	Val	Leu	Met	Ile	Leu	Arg	Ile	Tyr	Leu	Leu	Val	Leu
Ex b)	Ala	Ile	Ile	Ile	Leu	Arg	Ile	Tyr	Leu	Leu	Ile	Leu
Ex c)	Ala	Ile	Ile	Ile	Leu	Arg	Ile	Tyr	Leu	Leu	Met	Val
Ex d)	Ala	Leu	Met	Leu	Leu	Arg	Ile	Tyr	Leu	Leu	Ile	Met
Ex e)	Ala	Leu	Met	Ile	Ile	Arg	Val	Tyr	Leu	Leu	Ile	Met

Ex f)	Ala	Leu	Met	Ile	Ile	Arg	Ile	Phe	Leu	Leu	Ile	Met
Ex g)	Ala	Leu	Met	Ile	Val	Arg	Ile	Phe	Leu	Leu	Ile	Phe
Ex h)	Val	Leu	Met	Ile	Leu	Arg	Ile	Phe	Leu	Leu	Ile	Met
Ex i)	Ala	Leu	Met	Ile	Leu	Arg	Ile	Phe	Leu	Leu	Ile	Met
Ex j)	Ala	Leu	Met	Ile	Leu	Arg	Ile	Tyr	Leu	Leu	Ala	Ala
Ex k)	Val	Leu	Met	Ile	Leu	Arg	Ile	Tyr	Leu	Leu	Val	Leu
Ex l)	Val	Leu	Met	Ile	Leu	Arg	Ile	Phe	Leu	Leu	Val	Leu

(Ex =exemple) ,

les exposants des J, Z, U, X et B
représentant la position de ces acides aminés dans
5 ladite séquence.

31. Trousse de diagnostic comprenant un
complexe selon l'une quelconque des revendications 21 à
26, ladite trousse comprenant en outre un document en
décrivant le mode d'emploi.

10 32. Utilisation d'un complexe selon l'une
quelconque des revendications 21 à 26 dans une technique
d'imagerie médicale.

15 33. Utilisation d'un composé selon l'une
quelconque des revendications 1 à 15 dans une technique
d'imagerie médicale.

34. Utilisation d'un complexe selon l'une
quelconque des revendications 21 à 26 pour fabriquer un
produit destiné à l'imagerie médicale.

20 35. Utilisation d'un composé selon l'une
quelconque des revendications 1 à 15 pour fabriquer un
produit destiné à l'imagerie médicale.

36. Utilisation selon l'une quelconque des revendications 32 à 35, dans laquelle l'imagerie médicale est la tomographie par émission de positons (TEP).


5 37. Produit pour l'imagerie médicale, comprenant un complexe selon l'une quelconque des revendications 21 à 26 avec un véhicule pharmaceutiquement acceptable.

10 38. Produit pour l'imagerie médicale, comprenant un composé selon l'une quelconque des revendications 1 à 15 avec un véhicule pharmaceutiquement acceptable.

15 39. Produit selon la revendication 37 ou 38, dans lequel l'imagerie médicale est la tomographie par émission de positons (TEP).

40. Procédé de préparation d'un composé de formule (I) selon l'une quelconque des revendications 1 à 15, dans lequel :

20 a) on met en contact un composé précurseur de formule (Ia) :




25 dans laquelle PR_1 et PR_2 représentent chacun indépendamment un atome d'hydrogène ou un groupe protecteur de la fonction amine, à la condition que PR_1 et PR_2 ne soient pas tous deux un atome d'hydrogène, ou bien PR_1 et PR_2 forment ensemble avec l'atome d'azote un groupe protecteur cyclique de la fonction amine, Gp


B14000/PA

61

représente un groupe partant remplaçable par un atome de fluor-18, et X, Y, m et n ont la signification déjà donnée dans la revendication 1, avec une source d'ions fluorure F^- marqués au $[^{18}F]$ pour donner un composé de formule (Ib) :



b) on élimine dans le composé (Ib), le ou les groupe(s) protecteur(s) PR_1 et/ou PR_2 de la fonction amine, pour donner un composé de formule (Ic) :



c) on fait réagir le composé (Ic) avec un réactif donnant un groupe maléimido à partir d'un groupe amino, pour obtenir le composé final de formule (I).

41. Procédé selon la revendication 40, dans lequel les groupes PR_1 et PR_2 lorsqu'ils sont des groupes protecteurs sont chacun indépendamment un groupe tertibutoxycarbonyle (BOC) ou le groupe fluorenylmethoxy carbonyle (Fmoc), ou bien PR_1 et PR_2 forment ensemble avec l'atome d'azote de la fonction amine un groupe phthalamido.

42. Procédé selon la revendication 40 ou 41, dans lequel le groupe Gp est un halogène, un groupe mésyle, un groupe tosyle ou un groupe triflate, lorsque Y est un groupe alkyle ; ou bien Gp est un halogène, un

sel d'ammonium ou le groupe nitro, lorsque Y est un groupe aromatique ou hétérocyclique.

43. Procédé selon la revendication 42, dans lequel l'halogène est F, Cl, Br, ou I ; et le sel d'ammonium est le triméthylammonium-trifluorométhane sulfonate.

44. Procédé selon l'une quelconque des revendications 40 à 43, dans lequel, dans l'étape a), la source d'ions fluorure marqués au ^{18}F comprend lesdits ions fluorure et un contre-ion qui est un cation de grande taille, ou un cation de petite taille, ledit cation de petite taille étant stabilisé par un cryptand ou un éther couronne adapté audit cation de petite taille.

45. Procédé selon la revendication 44, dans lequel ledit cation de grande taille est le rubidium ou le tétrabutyl-ammonium, et ledit cation de petite taille est le potassium, le sodium ou le lithium.

46. Procédé selon l'une quelconque des revendications 40 à 45, dans lequel l'étape b) est réalisée par mise en contact au composé (Ib) avec du TFA dans le CH_2Cl_2 pendant une durée de 1 à 5 minutes.

47. Procédé selon l'une quelconque des revendications 40 à 46, dans lequel le réactif donnant un groupe maléimido à partir d'un groupe amino, dans l'étape c) est la N-méthoxycarbonylmaléimide ou la succinimide.

48. Procédé selon l'une quelconque des revendications 40 à 47, dans lequel l'étape c) est réalisée dans un solvant qui est le xylène ou le THF,

avec un chauffage à une température de 100 à 200°C, pendant une durée de 1 à 20 minutes.


49. Procédé selon la revendication 48, dans lequel la température est 190°C, et la durée est 5 minutes.

50. Procédé selon l'une quelconque des revendications 40 à 47, dans lequel l'étape c) est réalisée dans un mélange biphasique, à température ambiante, pendant une durée de 3 à 15 minutes.

51. Procédé selon la revendication 50, dans lequel le mélange biphasique est un mélange de dioxanne et de bicarbonate de sodium aqueux, et la durée est 10 minutes.

52. Procédé de préparation d'un composé de formule (I) selon l'une quelconque des revendications 1 à 3, dans lequel :

a) on met en contact un composé précurseur de formule (Ia) :



20


dans laquelle PR₁ et PR₂ représentent chacun indépendamment un atome d'hydrogène ou un groupe protecteur de la fonction amine, à la condition que PR₁ et PR₂ ne soient pas tous deux un atome d'hydrogène, ou bien PR₁ et PR₂ forment ensemble avec l'atome d'azote un groupe protecteur cyclique de la fonction amine, Gp représente un groupe partant remplaçable par un atome de fluor-18, et X, Y, m et n ont la signification déjà

25

B14000/PA

64

donnée dans la revendication 1, avec une source d'ions fluorure F^- marqués au $[^{18}F]$ pour donner un composé de formule (Ib) :



5

b) on élimine dans le composé (Ib), le ou les groupe(s) protecteur(s) PR_1 et/ou PR_2 de la fonction amine, pour donner un composé de formule (Ic) :


10



15

c) on fait réagir le composé (Ic) avec un réactif donnant un groupe maléimido à partir d'un groupe amino, pour obtenir le composé final de formule (I).

53. Procédé selon la revendication 52, dans lequel le composé de formule (Ia) répond à la formule (IIa) suivante :




20

dans laquelle p a la signification déjà donnée dans la revendication 4 ou 5.

B14000/PA


65

54. Procédé selon la revendication 53, dans laquelle le composé de formule (IIa) répond à la formule (IIb) suivante :



5


55. Procédé selon la revendication 52, dans lequel le composé de formule (Ia) répond à la formule (IIIa) suivante :



10

dans laquelle q et r ont la signification déjà donnée dans la revendication 7 ou 8.

56. Procédé selon la revendication 55, dans lequel le composé de formule (IIIa) répond à la formule (IIIb) suivante :




15

B14000/PA

66


57. Procédé selon la revendication 52, dans lequel le composé de formule (Ia) répond à la formule (IVa) suivante :




5

dans laquelle s a la signification déjà donnée dans la revendication 10 ou 11.

58. Procédé selon la revendication 57, dans lequel le composé de formule (IVa) répond à la formule (IVb) suivante :



59. Procédé selon la revendication 52, dans lequel le composé de formule (Ia) répond à la formule (Va) suivante :




dans laquelle t et T ont la signification déjà donnée dans la revendication 13 ou 14.

B14000/PA

67


60. Procédé selon la revendication 59, dans lequel le composé de formule (Va) répond à la formule (Vb) suivante :



5

61. Procédé de préparation d'un composé de formule (I) selon l'une quelconque des revendications 4 à 6, dans lequel :


10 a) on met en contact un composé précurseur de formule (Ia) :




15 dans laquelle PR_1 et PR_2 représentent chacun indépendamment un atome d'hydrogène ou un groupe protecteur de la fonction amine, à la condition que PR_1 et PR_2 ne soient pas tous deux un atome d'hydrogène, ou bien PR_1 et PR_2 forment ensemble avec l'atome d'azote un
20 groupe protecteur cyclique de la fonction amine, Gp représente un groupe partant remplaçable par un atome de fluor-18, et X, Y, m et n ont la signification déjà donnée dans la revendication 1, avec une source d'ions fluorure F^- marqués au $[^{18}\text{F}]$ pour donner un composé de
25 formule (Ib) :

B14000/PA

68




b) on élimine dans le composé (Ib), le ou
 5 les groupe(s) protecteur(s) PR_1 et/ou PR_2 de la fonction
 amine, pour donner un composé de formule (Ic) :



10 c) on fait réagir le composé (Ic) avec un
 réactif donnant un groupe maléimido à partir d'un groupe
 amino, pour obtenir le composé final de formule (I).


62. Procédé selon la revendication 61, dans
 lequel le composé de formule (Ia) répond à la formule
 15 (IIa) suivante :



dans laquelle p a la signification déjà
 20 donnée dans la revendication 4 ou 5.

63. Procédé selon la revendication 62, dans
 laquelle le composé de formule (IIa) répond à la formule
 (IIb) suivante :

5 a) on met en contact un composé précurseur
de formule (Ia) :



$$\text{PR}_1 - \overset{\text{PR}_2}{\underset{|}{\text{N}}} - (\text{X})_m - (\text{Y})_n - {}^{18}\text{F} \quad (\text{Ib})$$

b) on élimine dans le composé (Ib), le ou les groupe(s) protecteur(s) PR_1 et/ou PR_2 de la fonction amine, pour donner un composé de formule (Ic) :



c) on fait réagir le composé (Ic) avec un réactif donnant un groupe maléimido à partir d'un groupe amino, pour obtenir le composé final de formule (I).

65. Procédé selon la revendication 64, dans lequel le composé de formule (Ia) répond à la formule (IIIa) suivante :




dans laquelle q et r ont la signification déjà donnée dans la revendication 7 ou 8.

66. Procédé selon la revendication 65, dans lequel le composé de formule (IIIa) répond à la formule (IIIb) suivante :


E14000/PA

71



67. Procédé de préparation d'un composé de formule (I) selon l'une quelconque des revendications 10 à 12, dans lequel :


- 5 a) on met en contact un composé précurseur de formule (Ia) :



10 dans laquelle PR_1 et PR_2 représentent chacun indépendamment un atome d'hydrogène ou un groupe protecteur de la fonction amine, à la condition que PR_1 et PR_2 ne soient pas tous deux un atome d'hydrogène, ou bien PR_1 et PR_2 forment ensemble avec l'atome d'azote un

15 groupe protecteur cyclique de la fonction amine, Gp représente un groupe partant remplaçable par un atome de fluor-18, et X , Y , m et n ont la signification déjà donnée dans la revendication 1, avec une source d'ions fluorure F^- marqués au $[^{18}F]$ pour donner un composé de

20 formule (Ib) :




b) on élimine dans le composé (Ib), le ou les groupe(s) protecteur(s) PR_1 et/ou PR_2 de la fonction
 5 amine, pour donner un composé de formule (Ic) :



c) on fait réagir le composé (Ic) avec un
 10 réactif donnant un groupe maléimido à partir d'un groupe amino, pour obtenir le composé final de formule (I).

68. Procédé selon la revendication 67, dans lequel le composé de formule (Ia) répond à la formule (IVa) suivante :


15



dans laquelle s a la signification déjà donnée dans la revendication 10 ou 11.

69. Procédé selon la revendication 68, dans lequel le composé de formule (IVa) répond à la formule (IVb) suivante :

20




B14000/PA

73


70. Procédé de préparation d'un composé de formule (I) selon l'une quelconque des revendications 13 à 15, dans lequel :

a) on met en contact un composé précurseur
5 de formule (Ia) :




dans laquelle PR_1 et PR_2 représentent chacun
10 indépendamment un atome d'hydrogène ou un groupe protecteur de la fonction amine, à la condition que PR_1 et PR_2 ne soient pas tous deux un atome d'hydrogène, ou bien PR_1 et PR_2 forment ensemble avec l'atome d'azote un groupe protecteur cyclique de la fonction amine, Gp
15 représente un groupe partant remplaçable par un atome de fluor-18, et X, Y, m et n ont la signification déjà donnée dans la revendication 1, avec une source d'ions fluorure F^- marqués au $[^{18}\text{F}]$ pour donner un composé de formule (Ib) :

20




b) on élimine dans le composé (Ib), le ou les groupe(s) protecteur(s) PR_1 et/ou PR_2 de la fonction
25 amine, pour donner un composé de formule (Ic) :



c) on fait réagir le composé (Ic) avec un réactif donnant un groupe maléimido à partir d'un groupe
5 amino, pour obtenir le composé final de formule (I).


71. Procédé selon la revendication 70, dans lequel le composé de formule (Ia) répond à la formule (Va) suivante :



10

dans laquelle t et T ont la signification déjà donnée dans la revendication 13 ou 14.

72. Procédé selon la revendication 71, dans lequel le composé de formule (Va) répond à la formule
15 (Vb) suivante :



73. Composé précurseur de formule (Ia), tel
20 que défini dans l'une quelconque des revendications 40 à 43.

74. Composé précurseur de formule (IIa), (IIb), (IIIa), (IIIb), (IVa), (IVb), (Va), (Vb) tel que

défini, respectivement, dans les revendications 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 et 60.

75. Composé, précurseur d'un composé de formule générale (I), qui est un composé tel que défini à la revendication 6, 9, 12 ou 15, dans lesquels le $[^{18}\text{F}]$ est remplacé par un halogène non radioactif, un sel d'ammonium, ou le groupe $-\text{NO}_2$, et le groupe 1-pyrrole-2,5-dione est remplacé par un groupe tert-butoxycarbonylamino.

76. Composé selon la revendication 75, dans lesquels l'halogène non radioactif est ^{19}F , Cl, Br ou I ; et le sel d'ammonium est le triméthylammonium-trifluorométhanesulfonate.

77. Composé précurseur selon la revendication 75 ou 76, qui est le [3-(3-tert-butoxycarbonylamino-propoxy)-pyridin-2-yl]-triméthyl-ammonium trifluorométhanesulfonate ; ou l'ester de tertibutyle de l'acide [3-(2-nitro-pyridin-3-yloxy)-propyl]-carbamique.

