

①9 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
INSTITUT NATIONAL
DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE
PARIS

①1 N° de publication : **2 735 367**

(à n'utiliser que pour les
commandes de reproduction)

②1 N° d'enregistrement national : **95 07300**

⑤1 Int Cl[®] : A 61 K 31/59, 31/38, 7/48(A 61 K 31/59, 31:19)(A 61 K
31/38, 31:19)

①2

DEMANDE DE BREVET D'INVENTION

A1

②2 Date de dépôt : 19.06.95.

③0 Priorité :

④3 Date de la mise à disposition du public de la
demande : 20.12.96 Bulletin 96/51.

⑤6 Liste des documents cités dans le rapport de
recherche préliminaire : *Se reporter à la fin du
présent fascicule.*

⑥0 Références à d'autres documents nationaux
apparentés :

⑦1 Demandeur(s) : CENTRE INTERNATIONAL DE
RECHERCHES DERMATOLOGIQUES GALDERMA
CIRD GALDERMA GROUPEMENT D'INTERET
ECONOMIQUE — FR.

⑦2 Inventeur(s) : DEMARCHEZ MICHEL et JOMARD
ANDRE.

⑦3 Titulaire(s) :

⑦4 Mandataire : L'OREAL.

⑤4 UTILISATION DE LIGANDS SPECIFIQUES DES RECEPTEURS RXRS.

⑤7 La présente invention a pour objet l'utilisation d'au
moins un ligand spécifique des récepteurs RXRs dans la
préparation d'une composition pharmaceutique à adminis-
trer par voie systémique et destinée à augmenter l'activité
modulatrice de prolifération et/ou de différenciation cellu-
laire d'un ligand d'au moins un récepteur de la superfamille
des récepteurs stéroïdiens/thyroïdiens, autre qu'un ligand
spécifique des récepteurs RXRs, et pouvant s'hétérodimé-
riser avec les RXRs, appliqué de manière topique.

FR 2 735 367 - A1



L'invention a trait à l'utilisation d'au moins un ligand spécifique des récepteurs RXRs
5 dans la préparation d'une composition pharmaceutique à administrer par voie systémique.

On sait que l'acide rétinoïque *tout-trans* est un puissant modulateur (i.e. un inhibiteur ou, au contraire, un stimulateur, selon la nature des cellules traitées) de la différenciation et
10 de la prolifération de nombreux types cellulaires normaux ou transformés. Par exemple, il inhibe la différenciation des cellules épithéliales, tels que les kératinocytes de l'épiderme. Il inhibe aussi la prolifération de nombreuses cellules transformées telles que les cellules de mélanomes.

15 On sait, d'une manière générale, que l'acide rétinoïque *tout-trans* (*all-trans* retinoic acid) agit sur la différenciation et la prolifération des cellules en interagissant avec des récepteurs nucléaires appelés RARs (Retinoic Acid Receptors) contenus dans le noyau cellulaire. Il existe, à ce jour, trois sous-types identifiés de récepteurs RAR appelés respectivement RAR- α , RAR- β et RAR- γ . Ces récepteurs, après fixation du ligand (i.e. de
20 l'acide rétinoïque), interagissent avec la région promotrice de gènes régulés par l'acide rétinoïque au niveau d'éléments de réponses spécifiques. Pour se fixer sur les éléments de réponse, les RARs s'hétérodimérisent avec un autre type de récepteurs connus sous le nom de RXRs. Le ligand naturel des RXRs est l'acide 9-*cis*-rétinoïque. Les RXRs sont considérés comme des "master regulatory proteins" car ils interagissent avec d'autres
25 membres de la superfamille des récepteurs stéroïdiens/thyroïdiens pour former des hétérodimères, comme avec les RARs, tels que le récepteur de la vitamine D3 (VDR), le récepteur de la triiodothyroxine (TR) et les PPARs (Peroxisome Proliferator Activated Receptors). De plus, les RXRs peuvent interagir avec des éléments de réponse spécifiques sous forme d'homodimères.

30

De nombreux analogues structuraux synthétiques de l'acide rétinoïque *tout-trans* ou de l'acide 9-*cis*-rétinoïque, couramment dénommés "rétinoïdes", ont été décrits à ce jour dans la littérature. Certaines de ces molécules sont capables de se fixer et d'activer
35 spécifiquement les RARs ou, au contraire, les RXRs. De plus, certains analogues peuvent se fixer et activer un sous-type de récepteur RAR (α , β ou γ) particulier. D'autres

analogues, enfin, ne présentent aucune activité sélective particulière vis-à-vis de ces différents récepteurs. A cet égard, et par exemple, l'acide 9-*cis* rétinoïque active à la fois les RARs et les RXRs, sans sélectivité notable pour l'un ou l'autre de ces récepteurs (ligand non spécifique), alors que l'acide rétinoïque *tout-trans* active, quant à lui, 5. sélectivement les RARs (ligand spécifique RARs), tous sous-types confondus. D'une manière générale et qualitativement, une substance donnée (ou ligand) est dite spécifique d'une famille de récepteurs donnée (respectivement vis-à-vis d'un récepteur particulier de cette famille) lorsque ladite substance présente une forte affinité pour l'ensemble des récepteurs de cette famille (respectivement pour le récepteur particulier 10 de cette famille) et qu'elle présente par ailleurs une faible affinité pour tous les récepteurs de toute autre famille (respectivement pour tous les autres récepteurs, de cette même famille ou pas).

Du fait des activités mentionnées ci-dessus, il est également bien connu que l'acide 15 rétinoïque, la vitamine D ou leurs analogues sont utilisés pour le traitement topique de diverses maladies dermatologiques ou dans le domaine cosmétique.

Cependant, leur utilisation peut entraîner des effets secondaires importants, tels que la tératogénicité et/ou l'irritation pour les ligands sélectifs des récepteurs RARs, et 20 l'hypercalcémie pour la vitamine D ou ses analogues. Les ligands sélectifs pour les récepteurs RXRs sont connus, quant à eux, pour présenter une activité faible, voire nulle, tératogène, irritante et/ou hypercalcémiant.

La Demanderesse vient de découvrir, de manière tout à fait surprenante, que lorsque l'on 25 applique, de manière topique, un ligand d'au moins un récepteur de la superfamille des récepteurs stéroïdiens/thyroïdiens, autre qu'un ligand spécifique des récepteurs RXRs, et pouvant s'hétérodimériser avec les RXRs, son activité peut être synergisée par l'administration par voie systémique (autre que topique : parentérale, entérale, dont la voie orale) d'au moins un ligand spécifique des récepteurs RXRs. Ce résultat est 30 inattendu dans la mesure où un ligand spécifique des RXRs, lorsqu'il est utilisé seul et à des doses comparables, ne présente aucune ou substantiellement aucune activité. Il est d'autant plus surprenant d'observer cette synergie que les deux types de composés utilisés sont administrés par des voies différentes.

Ainsi, la présente invention a pour objet l'utilisation d'au moins un ligand spécifique des récepteurs RXRs dans la préparation d'une composition pharmaceutique à administrer par voie systémique et destinée à augmenter l'activité modulatrice de prolifération et/ou de différenciation cellulaire d'un ligand d'au moins un récepteur de la superfamille des récepteurs stéroïdiens/thyroïdiens, autre qu'un ligand spécifique des récepteurs RXRs, et pouvant s'hétérodimériser avec les RXRs, appliqué de manière topique.

La présente invention présente l'avantage de pouvoir diminuer les doses administrées topiquement des ligands d'au moins un récepteur de la superfamille des récepteurs stéroïdiens/thyroïdiens, autre qu'un ligand spécifique des récepteurs RXRs, et pouvant s'hétérodimériser avec les RXRs, tout en présentant la même activité et donc la même efficacité, mais en diminuant leurs effets secondaires, notamment tératogènes ou hypercalcémiant de certains de ces ligands, tels que respectivement les ligands spécifiques des récepteurs RARs ou du VDR.

15

D'autres caractéristiques, aspects, objets et avantages de l'invention apparaîtront encore plus clairement à la lecture de la description qui va suivre, ainsi que des divers exemples concrets, mais nullement limitatifs, destinés à l'illustrer.

20 Le ligand d'au moins un récepteur de la superfamille des récepteurs stéroïdiens/thyroïdiens, autre qu'un ligand spécifique des récepteurs RXRs, et pouvant s'hétérodimériser avec les RXRs, est de préférence choisi parmi les ligands des RARs (Retinoic Acid Receptors), du VDR (Vitamine D3 Receptor), des PPARs (Peroxisome Proliferator Activated Receptors) ou du TR (récepteur de la triiodothyroxine). De manière encore plus préférentielle, ce ligand est choisi parmi les ligands des RARs et les ligands du VDR.

De préférence, le ligand d'au moins un récepteur de la superfamille des récepteurs stéroïdiens/thyroïdiens, autre qu'un ligand spécifique des récepteurs RXRs, et pouvant s'hétérodimériser avec les RXRs, est spécifique de l'un de ces récepteurs. La spécificité de ce ligand est déterminée selon les méthodes indiquées ci-dessous.

Le caractère spécifique ou non d'une substance donnée vis-à-vis d'un ou plusieurs récepteurs nucléaires ou cytosoliques donnés peut être déterminé au moyen de tests classiques pour l'homme de l'art. Ces tests sont notamment décrits dans les références

35

suivantes : (1) "Selective Synthetic Ligands for Nuclear Retinoic Acid Receptor Subtypes" in RETINOIDS, Progress in Research and Clinical Applications, Chapitre 19 (pp 261-267), Marcel Dekker Inc, édité par Maria A. Livrea et Lester Packer ; (2) "Synthetic Retinoids : Receptor Selectivity and Biological Activity" in Pharmacol Skin, 5. Basel, Karger, 1993, Volume. 5, pp 117-127 ; (3) "Selective Synthetic Ligands for Human Nuclear Retinoic Acid Receptors" in Skin Pharmacology, 1992, Vol. 5, pp 57-65 ; (4) "Identification of Synthetic Retinoids with Selectivity for Human Nuclear Retinoic Acid Receptor- γ " in Biochemical and Biophysical Research Communications, Vol. 186, N° 2, Juillet 1992, pp 977-983 ; (5) "Selective High Affinity RAR- α or RAR- β Retinoic Acid Receptor Ligands" in Mol. Pharmacol., Vol 40, pp 556-562. Quantitativement, on admet de 10 manière générale que toute substance qui, à l'égard d'un premier récepteur donné, présente une constante de dissociation (Kd) d'au moins 10 fois inférieur, et de préférence d'au moins 15 fois inférieur, au Kd qu'elle présente à l'égard d'un deuxième récepteur donné, peut être qualifiée de substance spécifique de ce premier récepteur par 15 rapport à ce deuxième récepteur.

A titre d'exemples de ligands spécifiques de RARs utilisables dans le cadre de la présente invention, on peut notamment citer :

- l'acide rétinoïque *tout-trans*,
- 20 - l'acide 2-(5,6,7,8-tetrahydro-5,5,8,8-tétraméthyl-2-naphtyl)-6-benzo[b]thiophen carboxylique,
- l'acide 4-[(5,6,7,8-tétrahydro-5,5,8,8-tétraméthyl-2-naphtyl) carboxamido] benzoïque,
- l'acide 4-[(5,6,7,8-tétrahydro-5,5,8,8-tétraméthyl-2-naphtyl) carbamoyl] 25 benzoïque,

Comme exemples de composés spécifiques du récepteur VDR, on peut citer les dérivés de la vitamine D suivants :

- 1 α ,25-dihydroxyvitamine D3,
- 30 - 1 α -hydroxyvitamine D3,
- 25-hydroxyvitamine D3,
- 1 α ,25-dihydroxyvitamine D2,
- 1 α ,24-dihydroxyvitamine D2.

..

Parmi les ligands spécifiques des récepteurs PPARs, on peut notamment citer l'acide bromopalmitique et ses analogues.

Enfin, comme exemples de ligands spécifiques des RXRs convenant bien à l'invention,

5 on peut ici citer plus particulièrement :

- l'acide 4-[(5,6,7,8-tétrahydro-5,5,8,8-tétraméthyl-2-naphtyl)carbonyl-éthylèneacétal]benzoïque,

- l'acide (E)-2-[2-(3,5,5,8,8-pentaméthyl-5,6,7,8-tétrahydro-2-naphtyl)-1-propényl]-4-thiophénecarboxylique,

10 - l'acide 4-[(3,5,5,8,8-pentaméthyl-5,6,7,8-tétrahydro-2-naphtyl)carbonyl]benzoïque.

Dans ce qui suit ou ce qui précède, on entend par voie topique, toute technique d'administration d'un produit par application directe de ce dernier sur une partie
15 superficielle (ou externe) du corps, telle que la peau, le cuir chevelu, les ongles ou les muqueuses, et par voie systémique, toute technique d'administration d'un produit par une voie autre que topique, par exemple entérale et/ou parentérale. Dans le cas de la voie systémique, on préfère utiliser la voie orale.

20 Par voie entérale, et plus particulièrement orale, les compositions contenant le ou les ligand spécifique des RXRs peuvent se présenter sous forme de comprimés, de gélules, de dragées, de sirops, de suspensions, de solutions, de poudres, de granulés, d'émulsions, de microsphères ou de nanosphères ou de vésicules lipidiques ou polymériques permettant une libération contrôlée. Par voie parentérale, ces
25 compositions peuvent se présenter sous forme de solutions ou de suspensions pour perfusion ou pour injection.

Le ou les ligands spécifiques des RXRs conformes à l'invention sont généralement administrés à des doses journalières d'environ 0,01 mg/kg à 100 mg/kg en poids
30 corporel, et ceci à raison de 1 à 3 prises/jour, de préférence de 10 à 50 mg/kg.

Par voie topique, les compositions contenant le ou les ligands d'au moins un récepteur de la superfamille des récepteurs stéroïdiens/thyroïdiens, autre qu'un ligand spécifique des récepteurs RXRs, et pouvant s'hétérodimériser avec les RXRs, qui sont donc plus
35 particulièrement destinées au traitement de la peau ou des muqueuses, peuvent se

présenter sous forme d'onguents, de crèmes, de laits, de pommades, de poudres, de tampons imbibés, de solutions, de gels, de sprays, de lotions ou de suspensions. Elles peuvent également se présenter sous forme de microsphères ou nanosphères ou vésicules lipidiques ou polymériques ou de patches polymériques et d'hydrogels permettant une libération contrôlée des actifs. Ces compositions par voie topique peuvent par ailleurs se présenter soit sous forme anhydre, soit sous une forme aqueuse, selon l'indication clinique.

10 Les compositions à usage topique conformes à l'invention contiennent le ou les ligands d'au moins un récepteur de la superfamille des récepteurs stéroïdiens/thyroïdiens, autre qu'un ligand spécifique des récepteurs RXRs, et pouvant s'hétérodimériser avec les RXRs, à une concentration généralement comprise entre 0,001 % et 10 % en poids, de préférence entre 0,01 et 1 % en poids, par rapport au poids total de la composition.

15 Les compositions destinées à un usage topique contenant le ou les ligands d'au moins un récepteur de la superfamille des récepteurs stéroïdiens/thyroïdiens, autre qu'un ligand spécifique des récepteurs RXRs, et pouvant s'hétérodimériser avec les RXRs, ou les compositions destinées à un usage systémique contenant le ou les ligands spécifiques des RXRs peuvent bien entendu en outre contenir des additifs inertes ou même
20 pharmacodynamiquement actifs ou des combinaisons de ces additifs, et notamment : des agents mouillants; des agents dépigmentants tels que l'hydroquinone, l'acide azélaïque, l'acide caféïque ou l'acide kojique; des émoullissants; des agents hydratants comme le glycérol, le PEG 400, la thiamorpholinone, et ses dérivés ou bien encore l'urée; des agents antiséborrhéiques ou antiacnéiques, tels que la S-
25 carboxyméthylcystéine, la S-benzyl-cystéamine, leurs sels ou leurs dérivés, ou le peroxyde de benzoyle; des agents antifongiques tels que le kétoconazole ou les polyméthylène-4,5 isothiazolidones-3; des antibactériens, des caroténoïdes et, notamment, le β -carotène; des agents anti-psoriatiques tels que l'anthraline et ses dérivés; et enfin les acides eicosa-5,8,11,14-tétraynoïque et eicosa-5,8,11-trynoïque,
30 leurs esters et amides.

Les compositions selon l'invention peuvent également contenir des agents d'amélioration de la saveur, des agents conservateurs tels que les esters de l'acide parahydroxybenzoïque, les agents stabilisants, des agents régulateurs d'humidité, des
35 agents régulateurs de pH, des agents modificateurs de pression osmotique, des agents

émulsionnants, des filtres UV-A et UV-B, des antioxydants, tels que l'a-tocophérol, le butylhydroxyanisole ou le butylhydroxytoluène.

- Bien entendu, l'homme du métier veillera à choisir le ou les éventuels composés à
5. ajouter à ces compositions de telle manière que les propriétés avantageuses attachées intrinsèquement à la présente invention ne soient pas ou substantiellement pas altérées par l'addition envisagée.

L'activité modulatrice de prolifération et/ou de différenciation cellulaire des ligands d'au

10 moins un récepteur de la superfamille des récepteurs stéroïdiens/thyroïdiens, autre qu'un ligand spécifique des récepteurs RXRs, et pouvant s'hétérodimériser avec les RXRs, leur permet donc d'être utilisés dans les domaines de traitement suivants :

- 1) Pour traiter les affections dermatologiques liées à un désordre de la kératinisation

15 portant sur la différenciation et sur la prolifération notamment pour traiter les acnés vulgaires, comédoniennes, polymorphes, rosacées, les acnés nodulokystiques, conglobata, les acnés séniles, les acnés secondaires telles que l'acné solaire, médicamenteuse ou professionnelle.

- 20 2) Pour traiter d'autres types de trouble de la kératinisation, notamment les ichtyoses, les états ichtyosiformes, la maladie de Darier, les kératodermies palmoplantaires, les leucoplasies et les états leucoplasiformes, le lichen cutané ou muqueux (buccal).
- 3) Pour traiter d'autres affections dermatologiques liées à un trouble de la

25 kératinisation avec une composante inflammatoire et/ou immuno-allergique et, notamment, toutes les formes de psoriasis qu'il soit cutané, muqueux ou unguéal, et même le rhumatisme psoriasique, ou encore l'atopie cutanée, telle que l'eczéma ou l'atopie respiratoire ou encore l'hypertrophie gingivale; les composés peuvent également être utilisés dans certaines affections inflammatoires ne présentant pas de trouble de la

30 kératinisation.

- 4) Pour traiter toutes les proliférations dermiques ou épidermiques qu'elles soient bénignes ou malignes, qu'elles soient ou non d'origine virale telles que verrues vulgaires, les verrues planes et l'épidermodysplasie verruciforme, les papillomatoses orales ou

florides et les proliférations pouvant être induites par les ultra-violets notamment dans le cas des épithélioma baso et spinocellulaires.

- 5) Pour traiter d'autres désordres dermatologiques tels que les dermatoses bulleuses et les maladies du collagène.
- 6) Pour traiter certains troubles ophtalmologiques, notamment les cornéopathies.
- 7) Pour réparer ou lutter contre le vieillissement de la peau, qu'il soit photo-induit ou chronologique ou pour réduire les pigmentations et les kératoses actiniques, ou toutes pathologies associées au vieillissement chronologique ou actinique.
- 8) Pour prévenir ou guérir les stigmates de l'atrophie épidermique et/ou dermique induite par les corticostéroïdes locaux ou systémiques, ou tout autre forme d'atrophie cutanée.
- 9) Pour prévenir ou traiter les troubles de la cicatrisation ou pour prévenir ou réparer les vergetures ou encore pour améliorer la cicatrisation.
- 10) Pour lutter contre les troubles de la fonction sébacée tels que l'hyperséborrhée de l'acné ou la séborrhée simple.
- 11) Dans le traitement ou la prévention des états cancéreux ou précancéreux.
- 12) Dans le traitement d'affections inflammatoires telles que l'arthrite.
- 13) Dans le traitement de toute affection d'origine virale au niveau cutané ou général.
- 14) Dans la prévention ou le traitement de l'alopecie.
- 15) Dans le traitement d'affections dermatologiques ou générales à composante immunologique.
- 16) Dans le traitement d'affections du système cardiovasculaire telles que l'artériosclérose.

17) Dans le traitement ou la prévention de la cellulite, de l'obésité ou du diabète.

18) Dans le traitement des mycoses, telles que l'onychomycose.

5.

Les ligands d'au moins un récepteur de la superfamille des récepteurs stéroïdiens/thyroïdiens, autre qu'un ligand spécifique des récepteurs RXRs, et pouvant s'hétérodimériser avec les RXRs, trouvent également une application dans le domaine cosmétique, en particulier dans l'hygiène corporelle et capillaire et notamment pour le
10 traitement des peaux à tendance acnéique, pour la repousse des cheveux, l'anti-chute, pour lutter contre l'aspect gras de la peau ou des cheveux, dans la protection contre les effets néfastes du soleil ou dans le traitement des peaux physiologiquement sèches, pour prévenir et/ou lutter contre le vieillissement photo-induit ou chronologique.

15 Ainsi, la présente invention a également pour objet un procédé cosmétique pour augmenter l'activité modulatrice de prolifération et/ou de différenciation cellulaire d'un ligand d'au moins un récepteur de la superfamille des récepteurs stéroïdiens/thyroïdiens, autre qu'un ligand spécifique des récepteurs RXRs, et pouvant s'hétérodimériser avec les RXRs, appliqué de manière topique, caractérisé en ce que l'on utilise, par voie
20 systémique, au moins un ligand spécifique des récepteurs RXRs.

Dans le domaine cosmétique, comme dans le domaine pharmaceutique, les ligands d'au moins un récepteur de la superfamille des récepteurs stéroïdiens/thyroïdiens, autre qu'un ligand spécifique des récepteurs RXRs, et pouvant s'hétérodimériser avec les RXRs, ou
25 les ligands spécifiques des RXRs peuvent être employés en combinaison avec d'autres rétinoïdes, avec d'autres vitamines D ou leurs dérivés, avec des corticostéroïdes, ou encore en association avec des anti-radicaux libres, avec des hydroxy ou céto acides ou leurs dérivés, ou encore avec des bloqueurs de canaux ioniques.

30 On va maintenant donner, à titre nullement limitatif, plusieurs exemples destinés d'une part à démontrer les effets attachés à la présente invention, et, d'autre part, à illustrer diverses formulations concrètes conformes à l'invention.

35

EXEMPLE 1

Cet exemple a pour but de mettre en évidence l'effet de synergie apporté par un ligand spécifique de RXRs donné par voie orale *in vivo* sur l'activité d'un ligand spécifique RARs appliqué par voie topique sur l'oreille de souris.

Il a en effet été montré que l'acide rétinoïque, qui est utilisé pour le traitement topique de diverses maladies dermatologiques, en administration unique par voie topique sur l'oreille de la souris induit une prolifération de l'épiderme (Arch. Dermatol. Res. 1992, 284:418-423), un érythème et un oedème de cette oreille, ces réponses étant dépendantes de la dose administrée. Ces signes cliniques sont également classiquement observés lors de l'application topique de l'acide rétinoïque chez l'homme.

De plus, il a été montré que ces effets peuvent être inhibés spécifiquement par un antagoniste des récepteurs RARs, ce qui est en faveur d'un lien mécanistique entre l'interaction du ligand avec ses récepteurs et les effets cliniques induits.

Le test utilisé pour évaluer cet effet de synergie est donc celui de l'oedème de l'oreille de souris induit par application topique de l'acide 2-(5,6,7,8-tetrahydro-5,5,8,8-tetraméthyl-2-naphtyl)-6-benzo[b]thiophen carboxylique (analogue de l'acide rétinoïque) à 0,003% en poids par volume. Selon ce modèle, une application topique de l'acide 2-(5,6,7,8-tetrahydro-5,5,8,8-tetraméthyl-2naphtyl)-6-benzo[b]thiophen carboxylique sur l'oreille provoque une inflammation qui se caractérise par une augmentation de l'épaisseur de l'oreille, ce dernier devenant maximal au bout de 5 jours après l'application. Cette réponse peut donc être quantifiée par une mesure de l'épaisseur de l'oreille par un oditest.

Le protocole opératoire exact est le suivant : 10 souris sont tout d'abord traitées avec l'acide 2-(5,6,7,8-tetrahydro-5,5,8,8-tetraméthyl-2-naphtyl)-6-benzo[b]thiophen carboxylique (composé A), en procédant sur l'une de leur oreille à une application topique à un temps t=0 avec 20 µl d'une solution d'acétone comprenant 0,003 % en poids par volume d'acide carboxylique 2-(5,6,7,8-tetrahydro-5,5,8,8-tetraméthyl-2naphtyl)-6-benzo[b]thiophen. On fait absorber par voie orale à 5 (= groupe 2) sur 10 des souris ainsi traitées de l'acide 4-[(3,5,5,8,8-pentaméthyl-5,6,7,8-tétrahydro-2-naphtyl)carbonyl] benzoïque (composé B) dans de l'huile de type cremophor (EL 25%) à

partir de t=0 et ceci une fois par jour pendant 11 jours. Les 5 souris n'ayant pas absorbé le composé B constituent le groupe 1. La réponse oedémateuse est quantifiée par une mesure de l'épaisseur de l'oreille à t = 5 ou 6 jours. Les résultats sont ensuite exprimés en % de l'effet de synergie calculé de la façon suivante :

$$5. \quad \frac{\text{épaisseur oreille souris (Groupe 2)} - \text{épaisseur oreille souris (Groupe 1)}}{\text{épaisseur oreille souris (Groupe 1)}} \times 100$$

Les résultats obtenus sont rassemblés dans le tableau 1 suivant.

voie topique	dose (%P/V)	voie orale	dose (mg/kg)	effet de synergie (%)
composé A	0,003	composé B	0	0
composé A	0,003	composé B	10	73
composé A	0,003	composé B	30	118

10

tableau 1

P/V signifie poids par volume.

De plus, l'application de manière analogue par voie orale d'un ligand spécifique des RXRs seul, tel que le composé B, n'induit pas de réponse sur la souris.

- 15 Ainsi, on démontre clairement grâce à ce test que l'association d'un ligand d'au moins un récepteur de la superfamille des récepteurs stéroïdiens/thyroïdiens, autre qu'un ligand spécifique des récepteurs RXRs, et pouvant s'hétérodimériser avec les RXRs avec un ligand spécifique RXRs augmente de manière importante la réponse de l'oreille de souris comparativement à la réponse induite par une application topique unique d'un ligand d'au
- 20 moins un récepteur de la superfamille des récepteurs stéroïdiens/thyroïdiens, autre qu'un ligand spécifique des récepteurs RXRs, et pouvant s'hétérodimériser avec les RXRs.

EXEMPLE 2

- 25 Dans cet exemple, on a illustré diverses formulations concrètes (les composés A et B sont ceux définis ci-avant dans l'exemple 1). Les formulations comprenant le composé A sont destinées à une administration par voie topique et les formulations comprenant le composé B sont destinées à une administration par voie orale, les deux formulations devant être prises en association lors d'un traitement. Ainsi, les formulations comprenant

le composé B peuvent être administrées oralement avant, pendant ou après l'application topique des formulations comprenant le composé A.

5. A- VOIE ORALE

(a) Comprimé de 0,2 g

	- Composé B	0,002 g
10	- Amidon	0,113 g
	- Phosphate bicalcique	0,020 g
	- Silice	0,020 g
	- Lactose	0,030 g
	- Talc	0,010 g
15	- Stéarate de magnésium	0,005 g

(b) Suspension buvable en ampoules de 10 ml

20	- Composé B	0,1 g
	- Glycérine	1,000g
	- Sorbitol à 70%	1,000g
	- Saccharinate de sodium	0,010 g
	- Parahydroxybenzoate de méthyle	0,080 g
25	- Arôme qs	
	- Eau purifiée qsp	10 ml

B- VOIE TOPIQUE

30 (a) Onguent

	- Composé A	0,2 g
	- Myristate d'isopropyle	81,520 g
	- Huile de vaseline fluide	9,100 g
35	- Silice ("Aérosil 200" vendue par DEGUSSA)	9,180 g

(b) Crème Eau-dans-Huile non ionique

5	- Composé A		0,100 g
	- Mélange d'alcools de lanoline émulsifs, de cires et d'huiles ("Eucerine anhydre" vendu par BDF)	39,900 g	
	- Parahydroxybenzoate de méthyle		0,075 g
	- Parahydroxybenzoate de propyle		0,075 g
10	- Eau déminéralisée stérile	qsp	100 g

(c) Lotion

15	- Composé A		0,200 g
	- Polyéthylène glycol (PEG 400)		69,800 g
	- Ethanol à 95%		30,000 g

20 (d) Onguent hydrophobe

	- Composé A		0,600 g
	- Myristate d'isopropyle		36,400 g
	- Huile de silicone ("Rhodorsil 47 V 300" vendu par RHONE-POULENC)		36,400 g
25	- Cire d'abeille		13,600 g
	- Huile de silicone ("Abil 300.000 cst" vendu par GOLDSCHMIDT)	qsp	100g

30

35

(e) Crème Huile-dans-Eau non ionique

	- Composé A	1,000 g
5	- Alcool cétylique	4,000 g
	- Monostéarate de glycérole	2,500 g
	- Stéarate de PEG 50	2,500 g
	- Beurre de karité	9,200 g
	- Propylène glycol	2,000 g
10	- Parahydroxybenzoate de méthyle	0,075 g
	- Parahydroxybenzoate de propyle	0,075 g
	- Eau déminéralisée stérile qsp	100 g

REVENDEICATIONS

- 1- Utilisation d'au moins un ligand spécifique des récepteurs RXRs dans la
5. préparation d'une composition pharmaceutique à administrer par voie systémique et
destinée à augmenter l'activité modulatrice de prolifération et/ou de différenciation
cellulaire d'un ligand d'au moins un récepteur de la superfamille des récepteurs
stéroïdiens/thyroïdiens, autre qu'un ligand spécifique des récepteurs RXRs, et pouvant
s'hétérodimériser avec les RXRs, appliqué de manière topique.
- 10
- 2- Utilisation selon la revendication précédente, caractérisée en ce que le ligand d'au
moins un récepteur de la superfamille des récepteurs stéroïdiens/thyroïdiens, autre qu'un
ligand spécifique des récepteurs RXRs, et pouvant s'hétérodimériser avec les RXRs, à
activité modulatrice de prolifération et/ou de différenciation cellulaire est utilisé dans les
15 domaines de traitements choisis parmi :
- le traitement des affections ou désordres dermatologiques,
 - le traitement de certains troubles ophtalmologiques,
 - la réparation ou la lutte contre le vieillissement de la peau ou la réduction des
pigmentations et des kératoses actiniques, ou pour traiter toutes pathologies associées
20 au vieillissement chronologique ou actinique,
 - la prévention ou la guérison des stigmates de l'atrophie épidermique et/ou dermique,
 - la prévention ou le traitement des troubles de la cicatrisation ou la prévention ou la
réparation des vergetures, ou encore pour améliorer la cicatrisation,
 - la lutte contre les troubles de la fonction sébacée,
 - 25 - le traitement ou la prévention des états cancéreux ou précancéreux,
 - le traitement d'affections inflammatoires,
 - le traitement de toute affection d'origine virale au niveau cutané ou général,
 - la prévention ou le traitement de l'alopecie,
 - le traitement d'affections dermatologiques ou générales à composante immunologique,
 - 30 - le traitement d'affections du système cardiovasculaire telles que l'artériosclérose,
 - le traitement ou la prévention de la cellulite, de l'obésité et du diabète,
 - le traitement de mycoses.
- 3- Utilisation selon l'une des revendications précédentes, caractérisé en ce que le
35 ligand d'au moins un récepteur de la superfamille des récepteurs stéroïdiens/thyroïdiens,

autre qu'un ligand spécifique des récepteurs RXRs, et pouvant s'hétérodimériser avec les RXRs, est choisi parmi les ligands des RARs, du VDR, des PPARs, du TR.

4- Utilisation selon la revendication précédente, caractérisé en ce que le ligand d'au moins un récepteur de la superfamille des récepteurs stéroïdiens/thyroïdiens, autre qu'un ligand spécifique des récepteurs RXRs, et pouvant s'hétérodimériser avec les RXRs, est choisi parmi les ligands des RARs et les ligands du VDR.

5- Utilisation selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisé en ce que le ligand d'au moins un récepteur de la superfamille des récepteurs stéroïdiens/thyroïdiens, autre qu'un ligand spécifique des récepteurs RXRs, et pouvant s'hétérodimériser avec les RXRs, est spécifique de l'un de ces récepteurs.

6- Utilisation selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisé en ce que le ligand spécifique des RARs est choisi parmi :

- l'acide rétinoïque *tout-trans*,
- l'acide 2-(5,6,7,8-tetrahydro-5,5,8,8-tétraméthyl-2-naphtyl)-6-benzo[b]thiophen carboxylique,
- l'acide 4-[(5,6,7,8-tétrahydro-5,5,8,8-tétraméthyl-2-naphtyl) carboxamido] benzoïque,
- l'acide 4-[(5,6,7,8-tétrahydro-5,5,8,8-tétraméthyl-2-naphtyl) carbamoyl] benzoïque.

7- Utilisation selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisé en ce que le ligand spécifique des RXRs est choisi parmi :

- l'acide 4-[(5,6,7,8-tétrahydro-5,5,8,8-tétraméthyl-2-naphtyl)carbonyl-éthylèneacétal]benzoïque,
- l'acide (E)-2-[2-(3,5,5,8,8-pentaméthyl-5,6,7,8-tétrahydro-2-naphtyl)-1-propényl]-4-thiophèncarboxylique,
- l'acide 4-[(3,5,5,8,8-pentaméthyl-5,6,7,8-tétrahydro-2-naphtyl)carbonyl] benzoïque.

8- Utilisation selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisé en ce que le ligand spécifique du récepteur VDR est choisi parmi :

- 1 α ,25-dihydroxyvitamine D3,

- 1 α -hydroxyvitamine D3,
- 25-hydroxyvitamine D3,
- 1 α ,25-dihydroxyvitamine D2,
- 1 α ,24-dihydroxyvitamine D2.

5.

9- Utilisation selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisé en ce que la composition pharmaceutique comprenant au moins un ligand spécifique d'au moins un récepteur RXR est administrée par voie orale.

10 10- Utilisation selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisé en ce que le ligand spécifique d'au moins un récepteur RXR est administré à des doses journalières d'environ 0,01 à 100 mg/kg en poids corporel.

11- Utilisation selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisé en ce que le ligand d'au moins un récepteur de la superfamille des récepteurs stéroïdiens/thyroïdiens, autre qu'un ligand spécifique des récepteurs RXRs, et pouvant s'hétérodimériser avec les RXRs, est administré à une concentration généralement comprise entre 0,001 % et 10 % en poids, de préférence entre 0,01 et 1 % en poids, par rapport au poids total de la composition.

20

12- Procédé cosmétique pour augmenter l'activité modulatrice de prolifération et/ou de différenciation cellulaire d'un ligand d'au moins un récepteur de la superfamille des récepteurs stéroïdiens/thyroïdiens, autre qu'un ligand spécifique des récepteurs RXRs, et pouvant s'hétérodimériser avec les RXRs, appliqué de manière topique, caractérisé en ce que l'on utilise, par voie systémique, au moins un ligand spécifique des récepteurs RXRs.

25

DOCUMENTS CONSIDERES COMME PERTINENTS		Revendications concernées de la demande examinée
Catégorie	Citation du document avec indication, en cas de besoin, des parties pertinentes	
E	MOL. CELL. BIOL., vol. 15, no. 12, 1995 pages 6481-6487, XP 000565384 B. ROY ET AL. 'Synergistic activation of retinoic acid-responsive genes and induction of ebrional carcinoma cell differentiation by an RA receptor alpha , RARbeta or RARgamma-selective ligand in combination with a retinoid X receptor-specific ligand.' * le document en entier * ---	1-12
A	J.BIOL. CHEM., vol. 267, no. 31, 1992 pages 22010-22013, XP 000565364 E.D. ROSEN ET AL. 'Ligand-dependent synergy of thyroid hormone and retinoid receptors.' ---	
A	WO-A-94 17796 (ALLERGAN INC.) 18 Août 1994 ---	
A	WO-A-94 15901 (LIGAND PHARMACEUTICALS INC) 21 Juillet 1994 -----	
		DOMAINES TECHNIQUES RECHERCHES (Int.CL.6)
		A61K
Date d'achèvement de la recherche		Examineur
20 Mars 1996		Klaver, T
<p>CATEGORIE DES DOCUMENTS CITES</p> <p>X : particulièrement pertinent à lui seul Y : particulièrement pertinent en combinaison avec un autre document de la même catégorie A : pertinent à l'encontre d'au moins une revendication ou arrière-plan technologique général O : divulgation non-écrite P : document intercalaire</p> <p>T : théorie ou principe à la base de l'invention E : document de brevet bénéficiant d'une date antérieure à la date de dépôt et qui n'a été publié qu'à cette date de dépôt ou qu'à une date postérieure. D : cité dans la demande L : cité pour d'autres raisons & : membre de la même famille, document correspondant</p>		