

(12) NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES
PATENTWESENS (PCT) VERÖFFENTLICHTE INTERNATIONALE ANMELDUNG

(19) Weltorganisation für geistiges Eigentum
Internationales Büro

(43) Internationales Veröffentlichungsdatum
02. November 2017 (02.11.2017)



(10) Internationale Veröffentlichungsnummer
WO 2017/186536 A1

(51) Internationale Patentklassifikation:

C07D 401/12 (2006.01) A01N 43/56 (2006.01)
C07D 401/14 (2006.01) A01N 43/647 (2006.01)
A01N 43/50 (2006.01) A01P 7/04 (2006.01)
A01N 43/54 (2006.01)

(21) Internationales Aktenzeichen: PCT/EP2017/059228

(22) Internationales Anmeldedatum:
19. April 2017 (19.04.2017)

(25) Einreichungssprache: Deutsch

(26) Veröffentlichungssprache: Deutsch

(30) Angaben zur Priorität:
EP16166786.0 25. April 2016 (25.04.2016) EP

(71) Anmelder: BAYER CROPSCIENCE AKTIENGESELLSCHAFT [DE/DE]; Alfred-Nobel-Str. 50, 40789 Monheim am Rhein (DE).

(72) Erfinder: WILLOT, Matthieu; Jahnstr. 15, 40215 Düsseldorf (DE). FISCHER, Reiner; Nelly-Sachs-Str. 23, 40789 Monheim (DE). HEIL, Markus; Am weißen Stein 43 a, 42799 Leichlingen (DE). JANSEN, Johannes-Rudolf; Knipprather Str. 47, 40789 Monheim (DE). WILCKE, David; Friedenstr. 39, 40219 Düsseldorf (DE). KÜBBELER, Susanne; Pastor-Dörr-Ring 52, 40589 Düsseldorf (DE). ILG, Kerstin; Neusser Wall 32, 50670 Köln (DE). EILMUS, Sascha; Neuenkamp 9a, 42799 Leichlingen (DE). LÖSEL, Peter; Am Schokker 5, 51371 Leverkusen (DE). ANDERSCH, Wolfram; Schlodderdicher Weg 77, 51469 Bergisch Gladbach (DE).

(74) Anwalt: BIP PATENTS; Alfred-Nobel-Str. 10, 40789 Monheim am Rhein NRW (DE).

(81) Bestimmungsstaaten (soweit nicht anders angegeben, für jede verfügbare nationale Schutzrechtsart): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BN, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DJ, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT,

HN, HR, HU, ID, IL, IN, IR, IS, JP, KE, KG, KH, KN, KP, KR, KW, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LU, LY, MA, MD, ME, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH, PL, PT, QA, RO, RS, RU, RW, SA, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, ZA, ZM, ZW.

(84) Bestimmungsstaaten (soweit nicht anders angegeben, für jede verfügbare regionale Schutzrechtsart): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SD, SL, ST, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), eurasisches (AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM), europäisches (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, KM, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

Erklärungen gemäß Regel 4.17:

— hinsichtlich der Berechtigung des Anmelders, ein Patent zu beantragen und zu erhalten (Regel 4.17 Ziffer ii)

Veröffentlicht:


— mit internationalem Recherchenbericht (Artikel 21 Absatz 3)

(54) Title: SUBSTITUTED 2-ALKYLIMIDAZOLYL-CARBOXAMIDES AS PEST CONTROL AGENTS

(54) Bezeichnung: SUBSTITUIERTE 2-ALKYLIMIDAZOLYL-CARBOXAMIDE ALS SCHÄDLINGSBEKÄMPFUNGSMITTEL

(57) Abstract: The invention relates to compounds of general formula (I), where Q, V, T, W, Y, L¹, L², L³ and A have the meanings given in the description, and also to a method for producing same and to the use of same for controlling animal pests.

(57) Zusammenfassung: Die vorliegende Erfindung betrifft Verbindungen der allgemeinen Formel (I), in welcher Q, V, T, W, Y, L¹, L², L³ und A die in der Beschreibung angegebenen Bedeutungen haben – sowie ein Verfahren zu ihrer Herstellung und ihre Verwendung zur Bekämpfung von tierischen Schädlingen.



(I)



WO 2017/186536 A1

Substituierte 2-Alkylimidazolyl-carboxamide als Schädlingsbekämpfungsmittel


Die vorliegende Anmeldung betrifft neue heterocyclische Verbindungen, Verfahren und Zwischenprodukte zu Ihrer Herstellung und ihre Verwendung zur Bekämpfung von tierischen Schädlingen.

- 5 In WO 2011/009804 A2 sind heterocyclische Verbindungen unter anderem auch Imidazolyl-carboxamide beschrieben, die als Insektizide verwendet werden können.

- Moderne Insektizide müssen vielen Anforderungen genügen, beispielsweise in Bezug auf Höhe, Dauer und Breite ihrer Wirkung und möglichen Verwendung. Es spielen Fragen der Toxizität, der Nützlich- und Bestäuberschonung, der Umwelteigenschaften, der Aufwandmengen, der Kombinierbarkeit mit
 10 anderen Wirkstoffen oder Formulierungsmitteln eine Rolle sowie die Frage des Aufwands, der für die Synthese eines Wirkstoffs betrieben werden muss, ferner können Resistenzen auftreten, um nur einige Parameter zu nennen. Schon aus all diesen Gründen kann die Suche nach neuen Pflanzenschutzmitteln nicht als abgeschlossen betrachtet werden und es besteht ständig Bedarf an neuen Verbindungen mit gegenüber den bekannten Verbindungen zumindest in Bezug auf einzelne Aspekte verbesserten
 15 Eigenschaften.

Aufgabe der vorliegenden Erfindung war es, Verbindungen bereitzustellen, durch die das Spektrum der Schädlingsbekämpfungsmittel unter verschiedenen Aspekten ergänzt wird.

- Gelöst wird die Aufgabe, sowie weitere nicht explizit genannte Aufgaben, die aus den hierin diskutierten Zusammenhängen ableitbar oder erschließbar sind, durch die Bereitstellung von Verbindungen der
 20 Formel (I)



in welcher (Ausgestaltung 0-2)

Q für Sauerstoff oder Schwefel steht,

- V für einen Rest aus der Reihe Wasserstoff, Halogen, Alkyl, Halogenalkyl, Alkoxy, Halogenalkoxy und Cyano steht,
- W für einen Rest aus der Reihe Wasserstoff, Halogen, Alkyl, Halogenalkyl, Alkoxy, Halogenalkoxy und Cyano steht,
- 5 Y für einen Rest aus der Reihe Wasserstoff, gegebenenfalls substituiertes Alkyl, Alkenyl und Alkynyl, gegebenenfalls durch Heteroatome unterbrochenes, gegebenenfalls substituiertes Cycloalkyl, gegebenenfalls durch Heteroatome unterbrochenes, gegebenenfalls substituiertes Cycloalkylalkyl, Arylalkyl, Hetarylalkyl und Cyano steht,
- 10 A für einen Rest aus der Reihe Wasserstoff, gegebenenfalls substituiertes Alkyl, Alkenyl und Alkynyl, gegebenenfalls durch Heteroatome unterbrochenes, gegebenenfalls substituiertes Cycloalkyl und Cycloalkyl-alkyl steht,
- T für Sauerstoff oder ein Elektronenpaar steht,
- 15 L¹ für einen Rest aus der Reihe Wasserstoff, Cyano, gegebenenfalls substituiertes Alkyl, Alkenyl und Alkynyl, gegebenenfalls durch Heteroatome unterbrochenes, gegebenenfalls substituiertes Cycloalkyl und Cycloalkenyl, gegebenenfalls durch Heteroatome unterbrochenes, gegebenenfalls substituiertes Cycloalkylalkyl, gegebenenfalls substituiertes Aryl und Hetaryl, gegebenenfalls substituiertes Arylalkyl und Hetarylalkyl steht,
- L² für einen Rest aus der Reihe Wasserstoff und gegebenenfalls substituiertes Alkyl steht,
- oder
- 20 L¹ und L² zusammen mit dem Kohlenstoffatom, an das sie gebunden sind, für einen gegebenenfalls substituierten drei- bis achtegliedrigen aliphatischen Ring stehen, der gegebenenfalls durch Heteroatome unterbrochen sein kann,
- oder
- L¹ und L² zusammen für gegebenenfalls substituiertes Alkenyl stehen,
- 25 L³ für einen Rest aus der Reihe Wasserstoff, S(O)_nR^{1a}, OR^{1b} und N(R²)(R³) steht, wobei für den Fall, dass L¹ und/oder L² für Wasserstoff oder gegebenenfalls substituiertes Alkyl steht, L³ für einen Rest aus der Reihe S(O)_nR^{1a}, OR^{1b} und N(R²)(R³) steht,
- R^{1a} für einen Rest aus der Reihe gegebenenfalls substituiertes Alkyl, Alkenyl und Alkynyl, gegebenenfalls durch Heteroatome unterbrochenes, gegebenenfalls substituiertes Cycloalkyl und Cycloalkenyl, gegebenenfalls durch Heteroatome unterbrochenes,
- 30

gegebenenfalls substituiertes Cycloalkylalkyl und Cycloalkenylalkyl, gegebenenfalls substituiertes Aryl und Hetaryl, gegebenenfalls substituiertes Arylalkyl und Hetarylalkyl steht,

- 5 R^{1b} für einen Rest aus der Reihe Wasserstoff, gegebenenfalls substituiertes Alkyl, Alkenyl und Alkynyl, gegebenenfalls durch Heteroatome unterbrochenes, gegebenenfalls substituiertes Cycloalkyl und Cycloalkenyl, gegebenenfalls durch Heteroatome unterbrochenes, gegebenenfalls substituiertes Cycloalkylalkyl und Cycloalkenylalkyl, gegebenenfalls substituiertes Aryl und Hetaryl und gegebenenfalls substituiertes Arylalkyl und Hetarylalkyl steht,
- 10 R^2 für einen Rest aus der Reihe Wasserstoff, gegebenenfalls substituiertes Alkyl, Alkenyl und Alkynyl, gegebenenfalls durch Heteroatome unterbrochenes, gegebenenfalls substituiertes Cycloalkyl und Cycloalkenyl, gegebenenfalls durch Heteroatome unterbrochenes, gegebenenfalls substituiertes Cycloalkylalkyl und Cycloalkenylalkyl, gegebenenfalls substituiertes Aryl und Hetaryl und gegebenenfalls substituiertes Arylalkyl und
- 15 Hetarylalkyl steht,
- R^3 für einen Rest aus der Reihe Wasserstoff, gegebenenfalls substituiertes Alkyl, Alkenyl und Alkynyl oder für die Reste $C(O)N(R^5)(R^6)$, $C(O)R^7$, $C(O)OR^8$ und SO_2R^9 steht,
- oder
- 20 R^2 und R^3 zusammen mit dem Stickstoffatom, an das sie gebunden sind, für einen gegebenenfalls substituierten gesättigten, teilweise gesättigten oder aromatischen Heterocyclus mit 3 bis 9 Ringatomen stehen, der gegebenenfalls durch weitere Heteroatome und/oder durch ein oder zwei CO-Gruppen unterbrochen sein kann,
- 25 R^5 und R^6 unabhängig voneinander für einen Rest aus der Reihe Wasserstoff, gegebenenfalls substituiertes Alkyl, Alkenyl und Alkynyl, gegebenenfalls durch Heteroatome unterbrochenes, gegebenenfalls substituiertes Cycloalkyl und Cycloalkenyl, gegebenenfalls durch Heteroatome unterbrochenes, gegebenenfalls substituiertes Cycloalkylalkyl, gegebenenfalls substituiertes Aryl und Hetaryl und gegebenenfalls substituiertes Arylalkyl und Hetarylalkyl stehen,
- oder
- 30 R^5 und R^6 zusammen mit dem Stickstoffatom, an das sie gebunden sind, für einen gegebenenfalls substituierten drei- bis achtgliedrigen aliphatischen Ring stehen, der gegebenenfalls durch Heteroatome unterbrochen sein kann,

- R⁷ für einen Rest aus der Reihe Wasserstoff, gegebenenfalls substituiertes Alkyl, Alkenyl und Alkynyl, gegebenenfalls durch Heteroatome unterbrochenes, gegebenenfalls substituiertes Cycloalkyl und Cycloalkenyl, gegebenenfalls durch Heteroatome unterbrochenes, gegebenenfalls substituiertes Cycloalkylalkyl und Cycloalkenylalkyl, gegebenenfalls substituiertes Aryl und Hetaryl und gegebenenfalls substituiertes Arylalkyl und Hetarylalkyl steht,
- R⁸ für einen Rest aus der Reihe Wasserstoff, gegebenenfalls substituiertes Alkyl, Alkenyl und Alkynyl, gegebenenfalls durch Heteroatome unterbrochenes, gegebenenfalls substituiertes Cycloalkyl und Cycloalkenyl, gegebenenfalls durch Heteroatome unterbrochenes, gegebenenfalls substituiertes Cycloalkylalkyl und Cycloalkenylalkyl, gegebenenfalls substituiertes Aryl und Hetaryl und gegebenenfalls substituiertes Arylalkyl und Hetarylalkyl steht,
- R⁹ für einen Rest aus der Reihe gegebenenfalls substituiertes Alkyl, Alkenyl und Alkynyl, gegebenenfalls durch Heteroatome unterbrochenes, gegebenenfalls substituiertes Cycloalkyl und Cycloalkenyl, gegebenenfalls durch Heteroatome unterbrochenes, gegebenenfalls substituiertes Cycloalkylalkyl und Cycloalkenylalkyl, gegebenenfalls substituiertes Aryl und Hetaryl und gegebenenfalls substituiertes Arylalkyl und Hetarylalkyl steht,
- n für eine Zahl 0, 1 oder 2 steht,
- und deren Salze.

Bevorzugte Substituenten bzw. Bereiche der in den Verbindungen der Formel (I) aufgeführten Reste werden im Folgenden erläutert. Ihre Kombination bildet den Vorzugsbereich (1-2), wobei

- Q für Sauerstoff oder Schwefel steht,
- V für einen Rest aus der Reihe Wasserstoff, Halogen, C₁-C₄-Alkyl, C₁-C₄-Halogenalkyl, C₁-C₄-Alkoxy, C₁-C₄-Halogenalkoxy und Cyano steht,
- W für einen Rest aus der Reihe Wasserstoff, Halogen, C₁-C₄-Alkyl, C₁-C₄-Halogenalkyl, C₁-C₄-Alkoxy, C₁-C₄-Halogenalkoxy und Cyano steht,
- Y für einen Rest aus der Reihe Wasserstoff, gegebenenfalls einfach bis mehrfach unabhängig voneinander durch Halogen, C₁-C₄-Alkoxy, C₁-C₄-Alkyl-S(O)_n- und Cyano substituiertes C₁-C₆-Alkyl, C₃-C₆-Alkenyl und C₃-C₆-Alkynyl, gegebenenfalls einfach bis vierfach

- unabhängig voneinander durch Halogen, C₁-C₄-Alkyl, C₁-C₄-Halogenalkyl, C₁-C₄-Alkoxy und Cyano substituiertes C₃-C₈-Cycloalkyl, gegebenenfalls einfach bis zweifach unabhängig voneinander durch O, S(O)_n und NR⁴ unterbrochenes, gegebenenfalls einfach bis vierfach unabhängig voneinander durch Halogen, C₁-C₄-Alkyl, C₁-C₄-Halogenalkyl, C₁-C₄-Alkoxy und Cyano substituiertes, geradkettiges oder verzweigtes C₃-C₈-Cycloalkyl-C₁-C₄-alkyl und gegebenenfalls einfach bis dreifach unabhängig voneinander durch Halogen, C₁-C₄-Alkyl, C₁-C₄-Halogenalkyl, C₁-C₄-Alkoxy, C₁-C₄-Alkyl-S(O)_n-, C₁-C₄-Halogenalkoxy, C₁-C₄-Halogenalkyl-S(O)_n-, Nitro und Cyano substituiertes Aryl-C₁-C₄-alkyl und Hetaryl-C₁-C₄-alkyl steht,
- 10 A für einen Rest aus der Reihe Wasserstoff, gegebenenfalls einfach bis mehrfach unabhängig voneinander durch Halogen, C₁-C₄-Alkoxy, C₁-C₄-Alkyl-S(O)_n- und Cyano substituiertes C₁-C₆-Alkyl, C₃-C₆-Alkenyl und C₃-C₆-Alkynyl, gegebenenfalls einfach bis zweifach unabhängig voneinander durch Halogen, C₁-C₄-Alkyl, C₁-C₄-Halogenalkyl, C₁-C₄-Alkoxy und Cyano substituiertes C₃-C₆-Cycloalkyl, welches gegebenenfalls durch O, S(O)_n, NR⁴ unterbrochen sein kann und gegebenenfalls einfach bis zweifach unabhängig voneinander durch Halogen, C₁-C₄-Alkyl, C₁-C₄-Halogenalkyl, C₁-C₄-Alkoxy und Cyano substituiertes, geradkettiges oder verzweigtes C₃-C₈-Cycloalkyl-C₁-C₄-alkyl, welches gegebenenfalls durch O, S(O)_n oder NR⁴ unterbrochen sein kann, steht,
- 15 T für Sauerstoff oder ein Elektronenpaar steht,
- 20 L¹ für einen Rest aus der Reihe Wasserstoff, gegebenenfalls unabhängig voneinander einfach bis fünffach durch Halogen und einfach bis zweifach durch C₁-C₄-Alkoxy, C₁-C₄-Alkyl-S(O)_n- und Cyano substituiertes C₁-C₈-Alkyl, C₂-C₈-Alkenyl und C₂-C₈-Alkynyl, gegebenenfalls unabhängig voneinander einfach bis fünffach durch Halogen und einfach bis zweifach durch C₁-C₄-Alkyl, C₁-C₄-Halogenalkyl, C₁-C₄-Alkoxy und Cyano substituiertes C₃-C₈-Cycloalkyl und C₅-C₈-Cycloalkenyl, welche gegebenenfalls einfach bis zweifach unabhängig voneinander durch O, S(O)_n, CO und NR⁴ unterbrochen sein können, gegebenenfalls unabhängig voneinander einfach bis fünffach durch Halogen und einfach bis zweifach durch C₁-C₄-Alkyl, C₁-C₄-Halogenalkyl, C₁-C₄-Alkoxy und Cyano substituiertes, geradkettiges oder verzweigtes C₃-C₈-Cycloalkyl-C₁-C₄-alkyl und C₅-C₈-Cycloalkenyl-C₁-C₄-alkyl, welche gegebenenfalls einfach bis zweifach unabhängig voneinander durch O, S(O)_n, CO und NR⁴ unterbrochen sein können und gegebenenfalls einfach bis dreifach unabhängig voneinander durch Halogen, C₁-C₄-Alkyl, C₁-C₄-Halogenalkyl, C₁-C₄-Alkoxy, C₁-C₄-Alkyl-S(O)_n-, C₁-C₄-Halogenalkoxy, C₁-C₄-Halogenalkyl-S(O)_n-, Nitro und Cyano substituiertes Aryl, Hetaryl, Arylalkyl und Hetarylalkyl steht,
- 35


- L^2 für einen Rest aus der Reihe Wasserstoff, gegebenenfalls unabhängig voneinander einfach bis fünffach durch Halogen und einfach bis zweifach durch C_1 - C_4 -Alkoxy, C_1 - C_4 -Alkyl- $S(O)_n$ - und Cyano substituiertes C_1 - C_4 -Alkyl steht,
- oder
- 5 L^1 und L^2 zusammen mit dem Kohlenstoffatom, an das sie gebunden sind, für gegebenenfalls einfach bis dreifach unabhängig voneinander durch Halogen, C_1 - C_4 -Alkoxy, C_1 - C_4 -Alkyl- $S(O)_n$ - und Cyano substituiertes C_3 - C_8 -Cycloalkyl stehen,
- oder
- 10 L^1 und L^2 zusammen für gegebenenfalls einfach bis dreifach unabhängig voneinander durch Halogen, C_1 - C_4 -Alkoxy, C_1 - C_4 -Alkyl- $S(O)_n$ - und Cyano substituiertes C_2 - C_6 -Alkenyl stehen,
- L^3 für einen Rest aus der Reihe Wasserstoff, $S(O)_nR^{1a}$, OR^{1b} und $N(R^2)(R^3)$ steht, wobei für den Fall, dass L^1 und/oder L^2 für Wasserstoff oder gegebenenfalls substituiertes Alkyl steht, L^3 für einen Rest aus der Reihe $S(O)_nR^{1a}$, OR^{1b} und $N(R^2)(R^3)$ steht,
- 15 R^{1a} für einen Rest aus der Reihe gegebenenfalls unabhängig voneinander einfach bis fünffach durch Halogen und einfach bis zweifach durch C_1 - C_4 -Alkoxy, C_1 - C_4 -Alkyl- $S(O)_n$ -, Cyano, $C(O)N(R^5)(R^6)$, $C(G)R^7$ und $C(O)OR^8$ substituiertes C_1 - C_8 -Alkyl, C_3 - C_8 -Alkenyl und C_3 - C_8 -Alkinyl, gegebenenfalls einfach bis vierfach unabhängig voneinander durch Halogen, C_1 - C_4 -Alkyl, C_1 - C_4 -Halogenalkyl, C_1 - C_4 -Alkoxy und Cyano substituiertes C_3 - C_8 -Cycloalkyl und C_5 - C_8 -Cycloalkenyl, welche gegebenenfalls einfach bis zweifach
- 20 unabhängig voneinander durch O, $S(O)_n$, CO und NR^4 unterbrochen sein können, gegebenenfalls einfach bis vierfach unabhängig voneinander durch Halogen, C_1 - C_4 -Alkyl, C_1 - C_4 -Halogenalkyl, C_1 - C_4 -Alkoxy und Cyano substituiertes, geradkettiges oder verzweigtes C_3 - C_8 -Cycloalkyl- C_1 - C_4 -alkyl und C_5 - C_8 -Cycloalkenyl- C_1 - C_4 -alkyl, welche gegebenenfalls einfach bis zweifach unabhängig voneinander durch O, $S(O)_n$, CO und NR^4
- 25 unterbrochen sein können, gegebenenfalls einfach bis dreifach unabhängig voneinander durch Halogen, C_1 - C_4 -Alkyl, C_1 - C_4 -Halogenalkyl, C_1 - C_4 -Alkoxy, C_1 - C_4 -Alkyl- $S(O)_n$ -, C_1 - C_4 -Halogenalkoxy, C_1 - C_4 -Halogenalkyl- $S(O)_n$ -, Nitro und Cyano substituiertes Aryl und Hetaryl und gegebenenfalls einfach bis dreifach unabhängig voneinander durch Halogen, C_1 - C_4 -Alkyl, C_1 - C_4 -Halogenalkyl, C_1 - C_4 -Alkoxy, C_1 - C_4 -Alkyl- $S(O)_n$ -, C_1 - C_4 -Halogenalkoxy, C_1 - C_4 -Halogenalkyl- $S(O)_n$ -, Nitro und Cyano substituiertes, geradkettiges
- 30 oder verzweigtes Aryl- C_1 - C_4 -alkyl und Hetaryl- C_1 - C_4 -alkyl steht,
- R^{1b} für einen Rest aus der Reihe Wasserstoff, gegebenenfalls unabhängig voneinander einfach bis fünffach durch Halogen und einfach bis zweifach durch C_1 - C_4 -Alkoxy, C_1 - C_4 -Alkyl-

- 5 S(O)_n-, Cyano, C(O)N(R⁵)(R⁶), C(G)R⁷ und C(O)OR⁸ substituiertes C₁-C₈-Alkyl, C₃-C₈-Alkenyl und C₃-C₈-Alkinyl, gegebenenfalls einfach bis vierfach unabhängig voneinander durch Halogen, C₁-C₄-Alkyl, C₁-C₄-Halogenalkyl, C₁-C₄-Alkoxy und Cyano substituiertes C₃-C₈-Cycloalkyl und C₅-C₈-Cycloalkenyl, welche gegebenenfalls einfach bis zweifach
- 10 unabhängig voneinander durch O, S(O)_n, CO und NR⁴ unterbrochen sein können, gegebenenfalls einfach bis vierfach unabhängig voneinander durch Halogen, C₁-C₄-Alkyl, C₁-C₄-Halogenalkyl, C₁-C₄-Alkoxy und Cyano substituiertes, geradkettiges oder verzweigtes C₃-C₈-Cycloalkyl-C₁-C₄-alkyl und C₅-C₈-Cycloalkenyl-C₁-C₄-alkyl, welche
- 15 gegebenenfalls einfach bis zweifach unabhängig voneinander durch O, S(O)_n, CO und NR⁴ unterbrochen sein können, gegebenenfalls einfach bis dreifach unabhängig voneinander durch Halogen, C₁-C₄-Alkyl, C₁-C₄-Halogenalkyl, C₁-C₄-Alkoxy, C₁-C₄-Alkyl-S(O)_n-, C₁-C₄-Halogenalkoxy, C₁-C₄-Halogenalkyl-S(O)_n-, Nitro und Cyano substituiertes Aryl und Hetaryl und gegebenenfalls einfach bis dreifach unabhängig voneinander durch Halogen, C₁-C₄-Alkyl, C₁-C₄-Halogenalkyl, C₁-C₄-Alkoxy, C₁-C₄-Alkyl-S(O)_n-, C₁-C₄-Halogenalkoxy, C₁-C₄-Halogenalkyl-S(O)_n-, Nitro und Cyano substituiertes, geradkettiges oder verzweigtes Aryl-C₁-C₄-alkyl und Hetaryl-C₁-C₄-alkyl steht,
- G für O, N-CN oder N-OR⁸ steht,
- R² für einen Rest aus der Reihe Wasserstoff, gegebenenfalls unabhängig voneinander einfach bis fünffach durch Halogen und einfach bis zweifach durch C₁-C₄-Alkoxy, C₁-C₄-Alkyl-
- 20 S(O)_n- und Cyano substituiertes C₁-C₈-Alkyl, C₃-C₈-Alkenyl und C₃-C₈-Alkinyl, gegebenenfalls einfach bis zweifach unabhängig voneinander durch Halogen, C₁-C₄-Alkyl, C₁-C₄-Halogenalkyl, C₁-C₄-Alkoxy und Cyano substituiertes C₃-C₈-Cycloalkyl und C₅-C₈-Cycloalkenyl, welche gegebenenfalls einfach bis zweifach unabhängig voneinander durch O, S(O)_n, CO und NR⁴ unterbrochen sein können, gegebenenfalls einfach bis zweifach
- 25 unabhängig voneinander durch Halogen, C₁-C₄-Alkyl, C₁-C₄-Halogenalkyl, C₁-C₄-Alkoxy und Cyano substituiertes, geradkettiges oder verzweigtes C₃-C₈-Cycloalkyl-C₁-C₄-alkyl und C₅-C₈-Cycloalkenyl-C₁-C₄-alkyl, welche gegebenenfalls einfach bis zweifach unabhängig voneinander durch O, S(O)_n, CO und NR⁴ unterbrochen sein können, gegebenenfalls einfach bis dreifach unabhängig voneinander durch Halogen, C₁-C₄-Alkyl, C₁-C₄-Halogenalkyl, C₁-C₄-Alkoxy, C₁-C₄-Alkyl-S(O)_n-, C₁-C₄-Halogenalkoxy, C₁-C₄-Halogenalkyl-S(O)_n-, Nitro und Cyano substituiertes Aryl und Hetaryl und gegebenenfalls
- 30 einfach bis dreifach unabhängig voneinander durch Halogen, C₁-C₄-Alkyl, C₁-C₄-Halogenalkyl, C₁-C₄-Alkoxy, C₁-C₄-Alkyl-S(O)_n-, C₁-C₄-Halogenalkoxy, C₁-C₄-Halogenalkyl-S(O)_n-, Nitro und Cyano substituiertes, geradkettiges oder verzweigtes Aryl-C₁-C₄-alkyl und Hetaryl-C₁-C₄-alkyl steht,
- 35

R^3 für einen Rest aus der Reihe Wasserstoff, gegebenenfalls einfach bis dreifach unabhängig voneinander durch Halogen, C_1 - C_4 -Alkoxy, C_1 - C_4 -Alkyl-S(O)_n- und Cyano substituiertes C_1 - C_8 -Alkyl, C_3 - C_8 -Alkenyl und C_3 - C_8 -Alkynyl oder für die Reste $C(O)N(R^5)(R^6)$, $C(O)R^7$, $C(O)OR^8$ und SO_2R^9 steht,

5 oder

R^2 und R^3 zusammen mit dem Stickstoffatom, an das sie gebunden sind, für einen Heterocyclus der Reihe U-1 bis U-36 stehen,

R⁴

für einen Rest aus der Reihe Wasserstoff, gegebenenfalls einfach bis dreifach unabhängig voneinander durch Halogen, C₁-C₄-Alkoxy und C₁-C₄-Alkyl-S(O)_n-substituiertes C₁-C₈-Alkyl, C₃-C₈-Alkenyl und C₃-C₈-Alkynyl, gegebenenfalls einfach bis zweifach unabhängig voneinander durch Halogen, C₁-C₄-Alkyl, C₁-C₄-Halogenalkyl, C₁-C₄-Alkoxy und Cyano

substituiertes C₃-C₈-Cycloalkyl und C₃-C₈-Cycloalkyl-C₁-C₄-alkyl, gegebenenfalls einfach bis dreifach unabhängig voneinander durch Halogen, C₁-C₄-Alkyl, C₁-C₄-Halogenalkyl, C₁-C₄-Alkoxy, C₁-C₄-Alkyl-S(O)_n-, C₁-C₄-Halogenalkoxy, C₁-C₄-Halogenalkyl-S(O)_n-, Nitro und Cyano substituiertes Aryl und Hetaryl und gegebenenfalls einfach bis dreifach unabhängig voneinander durch Halogen, C₁-C₄-Alkyl, C₁-C₄-Halogenalkyl, C₁-C₄-Alkoxy, C₁-C₄-Alkyl-S(O)_n-, C₁-C₄-Halogenalkoxy, C₁-C₄-Halogenalkyl-S(O)_n-, Nitro und Cyano substituiertes, geradkettiges oder verzweigtes Aryl-C₁-C₄-alkyl und Hetaryl-C₁-C₄-alkyl steht,

R⁵ und R⁶ unabhängig voneinander für einen Rest aus der Reihe Wasserstoff, gegebenenfalls unabhängig voneinander einfach bis fünffach durch Halogen und einfach bis zweifach durch C₁-C₄-Alkoxy und C₁-C₄-Alkyl-S(O)_n- substituiertes C₁-C₈-Alkyl, C₃-C₈-Alkenyl und C₃-C₈-Alkynyl, gegebenenfalls einfach bis zweifach unabhängig voneinander durch Halogen, C₁-C₄-Alkyl, C₁-C₄-Halogenalkyl, C₁-C₄-Alkoxy und Cyano substituiertes C₃-C₈-Cycloalkyl, C₃-C₈-Cycloalkenyl und C₃-C₈-Cycloalkyl-C₁-C₄-alkyl, gegebenenfalls einfach bis dreifach unabhängig voneinander durch Halogen, C₁-C₄-Alkyl, C₁-C₄-Halogenalkyl, C₁-C₄-Alkoxy, C₁-C₄-Alkyl-S(O)_n-, C₁-C₄-Halogenalkoxy, C₁-C₄-Halogenalkyl-S(O)_n-, Nitro und Cyano substituiertes Aryl und Hetaryl und gegebenenfalls einfach bis dreifach unabhängig voneinander durch Halogen, C₁-C₄-Alkyl, C₁-C₄-Halogenalkyl, C₁-C₄-Alkoxy, C₁-C₄-Alkyl-S(O)_n-, C₁-C₄-Halogenalkoxy, C₁-C₄-Halogenalkyl-S(O)_n-, Nitro und Cyano substituiertes, geradkettiges oder verzweigtes Aryl-C₁-C₄-alkyl und Hetaryl-C₁-C₄-alkyl stehen,

oder

R⁵ und R⁶ zusammen mit dem Stickstoffatom, an das sie gebunden sind, für einen drei- bis achtegliedrigen aliphatischen Ring stehen, der gegebenenfalls durch C₁-C₂-Alkyl, C₁-C₂-Haloalkyl und C₁-C₂-Alkoxy substituiert und gegebenenfalls durch O oder S(O)_n unterbrochen sein kann,

R⁷ für einen Rest aus der Reihe Wasserstoff, gegebenenfalls unabhängig voneinander einfach bis fünffach durch Halogen und einfach bis zweifach durch C₁-C₄-Alkoxy, C₁-C₄-Alkyl-S(O)_n- und Cyano substituiertes C₁-C₈-Alkyl, C₃-C₈-Alkenyl und C₃-C₈-Alkynyl, gegebenenfalls einfach bis zweifach unabhängig voneinander durch Halogen, C₁-C₄-Alkyl, C₁-C₄-Halogenalkyl, C₁-C₄-Alkoxy und Cyano substituiertes C₃-C₈-Cycloalkyl und C₃-C₈-Cycloalkenyl, welche gegebenenfalls durch O, S(O)_n, CO oder NR⁴ unterbrochen sein können, gegebenenfalls einfach bis zweifach unabhängig voneinander durch Halogen, C₁-C₄-Alkyl, C₁-C₄-Halogenalkyl, C₁-C₄-Alkoxy und Cyano substituiertes, geradkettiges oder verzweigtes C₃-C₈-Cycloalkyl-C₁-C₄-alkyl und C₃-C₈-Cycloalkenyl-C₁-C₄-alkyl, welche

gegebenenfalls durch O, S(O)_n, CO oder NR⁴ unterbrochen sein können, gegebenenfalls einfach bis dreifach unabhängig voneinander durch Halogen, C₁-C₄-Alkyl, C₁-C₄-Halogenalkyl, C₁-C₄-Alkoxy, C₁-C₄-Alkyl-S(O)_n-, C₁-C₄-Halogenalkoxy, C₁-C₄-Halogenalkyl-S(O)_n-, Nitro und Cyano substituiertes Aryl und Hetaryl und gegebenenfalls

5 einfach bis dreifach unabhängig voneinander durch Halogen, C₁-C₄-Alkyl, C₁-C₄-Halogenalkyl, C₁-C₄-Alkoxy, C₁-C₄-Alkyl-S(O)_n-, C₁-C₄-Halogenalkoxy, C₁-C₄-Halogenalkyl-S(O)_n-, Nitro und Cyano substituiertes, geradkettiges oder verzweigtes Aryl-C₁-C₄-alkyl und Hetaryl-C₁-C₄-alkyl steht,

R⁸ für einen Rest aus der Reihe Wasserstoff, gegebenenfalls unabhängig voneinander einfach

10 bis fünffach durch Halogen und einfach bis zweifach durch C₁-C₄-Alkoxy, C₁-C₄-Alkyl-S(O)_n- und Cyano substituiertes C₁-C₈-Alkyl, C₃-C₈-Alkenyl und C₃-C₈-Alkynyl, gegebenenfalls einfach bis zweifach unabhängig voneinander durch Halogen, C₁-C₄-Alkyl, C₁-C₄-Halogenalkyl, C₁-C₄-Alkoxy und Cyano substituiertes C₃-C₈-Cycloalkyl und C₅-C₈-Cycloalkenyl, welche gegebenenfalls durch O, S(O)_n, CO, NR⁴ unterbrochen sein können,

15 gegebenenfalls einfach bis zweifach unabhängig voneinander durch Halogen, C₁-C₄-Alkyl, C₁-C₄-Halogenalkyl, C₁-C₄-Alkoxy, Cyano substituiertes, geradkettiges oder verzweigtes C₃-C₈-Cycloalkyl-C₁-C₄-alkyl und C₅-C₈-Cycloalkenyl-C₁-C₄-alkyl, welche gegebenenfalls durch O, S(O)_n, CO, NR⁴ unterbrochen sein können, gegebenenfalls einfach bis dreifach unabhängig voneinander durch Halogen, C₁-C₄-Alkyl, C₁-C₄-Halogenalkyl, C₁-C₄-Alkoxy,

20 C₁-C₄-Alkyl-S(O)_n-, C₁-C₄-Halogenalkoxy, C₁-C₄-Halogenalkyl-S(O)_n-, Nitro und Cyano substituiertes Aryl und Hetaryl und gegebenenfalls einfach bis dreifach unabhängig voneinander durch Halogen, C₁-C₄-Alkyl, C₁-C₄-Halogenalkyl, C₁-C₄-Alkoxy, C₁-C₄-Alkyl-S(O)_n-, C₁-C₄-Halogenalkoxy, C₁-C₄-Halogenalkyl-S(O)_n-, Nitro und Cyano substituiertes, geradkettiges oder verzweigtes Aryl-C₁-C₄-alkyl und Hetaryl-C₁-C₄-alkyl

25 steht,

R⁹ für einen Rest aus der Reihe gegebenenfalls unabhängig voneinander einfach bis fünffach

30 durch Halogen und einfach bis zweifach durch C₁-C₄-Alkoxy, C₁-C₄-Alkyl-S(O)_n- und Cyano substituiertes C₁-C₈-Alkyl, C₃-C₈-Alkenyl und C₃-C₈-Alkynyl, gegebenenfalls einfach bis zweifach unabhängig voneinander durch Halogen, C₁-C₄-Alkyl, C₁-C₄-Halogenalkyl, C₁-C₄-Alkoxy und Cyano substituiertes C₃-C₈-Cycloalkyl und C₅-C₈-Cycloalkenyl, welche gegebenenfalls durch O, S(O)_n, CO, NR⁴ unterbrochen sein können, gegebenenfalls einfach bis zweifach unabhängig voneinander durch Halogen, C₁-C₄-Alkyl, C₁-C₄-Halogenalkyl, C₁-C₄-Alkoxy und Cyano substituiertes, geradkettiges oder verzweigtes C₃-C₈-Cycloalkyl-C₁-C₄-alkyl und C₅-C₈-Cycloalkenyl-C₁-C₄-alkyl, welche

35 gegebenenfalls durch O, S(O)_n, CO, NR⁴ unterbrochen sein können und gegebenenfalls einfach bis dreifach unabhängig voneinander durch Halogen, C₁-C₄-Alkyl, C₁-C₄-

- Halogenalkyl, C₁-C₄-Alkoxy, C₁-C₄-Alkyl-S(O)_n-, C₁-C₄-Halogenalkoxy, C₁-C₄-Halogenalkyl-S(O)_n-, Nitro und Cyano substituiertes Aryl und Hetaryl, gegebenenfalls einfach bis dreifach unabhängig voneinander durch Halogen, C₁-C₄-Alkyl, C₁-C₄-Halogenalkyl, C₁-C₄-Alkoxy, C₁-C₄-Alkyl-S(O)_n-, C₁-C₄-Halogenalkoxy, C₁-C₄-Halogenalkyl-S(O)_n-, Nitro und Cyano substituiertes, geradkettiges oder verzweigtes Aryl-C₁-C₄-alkyl und Hetaryl-C₁-C₄-alkyl steht,
- 5
- X^b für einen Rest aus der Reihe Halogen, Nitro, Cyano, C₁-C₄-Alkyl, C₁-C₄-Halogenalkyl, C₁-C₄-Alkoxy, C₁-C₄-Alkyl-S(O)_n-, C₁-C₄-Halogenalkoxy, C₁-C₄-Halogenalkyl-S(O)_n-, C₁-C₄-Alkoxy-C₁-C₄-alkyl, Cyano-C₁-C₄-alkyl, gegebenenfalls einfach bis vierfach durch
- 10 Halogen, C₁-C₄-Alkyl, C₁-C₄-Halogenalkyl, C₁-C₄-Alkoxy und C₁-C₄-Alkyl-S(O)_n-substituiertes C₃-C₆-Cycloalkyl und C₃-C₆-Cycloalkyl-C₁-C₄-alkyl, welche gegebenenfalls durch O oder S(O)_n unterbrochen sein können, C₂-C₆-Alkenyl, C₂-C₆-Alkynyl, C₁-C₄-Alkylcarbonyl, C₁-C₄-Halogenalkylcarbonyl, C₁-C₆-Alkoxycarbonyl, C₁-C₆-Alkylaminocarbonyl, Di-(C₁-C₆)-alkylaminocarbonyl, C₁-C₆-Alkylcarbonylamino, Aryl
- 15 und Hetaryl steht, wobei die Substituenten Aryl und Hetaryl gegebenenfalls einfach oder mehrfach, gleich oder verschieden durch Halogen, Cyano, Nitro, C₁-C₆-Alkyl, C₂-C₆-Alkenyl, C₂-C₆-Alkynyl, C₁-C₄-Alkoxy, C₁-C₄-Halogenalkyl, C₁-C₆-Halogenalkoxy, C₁-C₄-Alkyl-S(O)_n-, C₁-C₄-Halogenalkyl-S(O)_n-, Nitro und Cyano substituiert sein können und wobei die Ring N-Atome in U-13, U-14, U-16, U-28 und U-35 nicht durch Halogen, Nitro,
- 20 Cyano, C₁-C₄-Alkoxy, C₁-C₄-Halogenalkoxy und C₁-C₄-Alkoxy-C₁-C₄-alkyloxy substituiert sind,
- m für eine Zahl 0, 1 oder 2 steht, wobei im Falle von m = 2 die Reste X^b gegebenenfalls unabhängig voneinander sein können,
- n für eine Zahl 0, 1 oder 2 steht,
- 25 und deren Salze.

Besonders bevorzugte Substituenten bzw. Bereiche der in den Verbindungen der Formel (I) aufgeführten Reste werden im Folgenden erläutert. Ihre Kombination bildet den Vorzugsbereich (2-2), wobei

- 30 Q für Sauerstoff oder Schwefel steht,
- V für einen Rest aus der Reihe Wasserstoff, Fluor, Chlor, Brom, Methyl, Ethyl, Difluormethyl, Trifluormethyl, Methoxy, Ethoxy, Difluormethoxy, Trifluormethoxy und Cyano steht,

- W für einen Rest aus der Reihe Wasserstoff, Fluor, Chlor, Brom, Methyl, Ethyl, Difluormethyl, Trifluormethyl, Methoxy, Ethoxy, Difluormethoxy, Trifluormethoxy und Cyano steht,
- Y für einen Rest aus der Reihe Wasserstoff, gegebenenfalls einfach bis fünffach unabhängig voneinander durch Fluor, Chlor, Brom, Methoxy, Ethoxy, Methyl-S(O)_n-, Ethyl-S(O)_n und Cyano substituiertes C₁-C₄-Alkyl, C₃-C₄-Alkenyl und C₃-C₄-Alkynyl, gegebenenfalls einfach bis zweifach unabhängig voneinander durch Fluor, Chlor, Brom, Methyl, Ethyl, Trifluormethyl, Methoxy, Ethoxy, Cyano substituiertes C₃-C₆-Cycloalkyl und gegebenenfalls einfach bis zweifach unabhängig voneinander durch O, S(O)_n, NR⁴ unterbrochenes, gegebenenfalls einfach bis vierfach unabhängig voneinander durch Fluor, Chlor, Brom, Methyl, Ethyl, Trifluormethyl, Methoxy, Ethoxy, Cyano substituiertes, geradkettiges oder verzweigtes C₃-C₆-Cycloalkyl-C₁-C₂-alkyl und Cyano steht,
- A für einen Rest aus der Reihe Wasserstoff, gegebenenfalls einfach bis fünffach unabhängig voneinander durch Fluor, Chlor, Brom, Methoxy, Ethoxy, Methyl-S(O)_n-, Ethyl-S(O)_n- und Cyano substituiertes C₁-C₆-Alkyl, C₃-C₆-Alkenyl und C₃-C₆-Alkynyl, gegebenenfalls einfach bis zweifach unabhängig voneinander durch Fluor, Chlor, Brom, Methyl, Ethyl, Trifluormethyl, Methoxy, Ethoxy, Cyano substituiertes C₃-C₆-Cycloalkyl, gegebenenfalls einfach bis zweifach unabhängig voneinander durch Fluor, Chlor, Brom, Methyl, Ethyl, Trifluormethyl, Methoxy, Ethoxy, Cyano substituiertes, geradkettiges oder verzweigtes C₃-C₆-Cycloalkyl-C₁-C₂-alkyl steht,
- T für Sauerstoff oder ein Elektronenpaar steht,
- L¹ für einen Rest aus der Reihe Wasserstoff, gegebenenfalls unabhängig voneinander einfach bis fünffach durch Fluor, Chlor und Brom und einfach bis dreifach durch Methoxy, Ethoxy, Methyl-S(O)_n-, Ethyl-S(O)_n- und Cyano substituiertes C₁-C₆-Alkyl, C₂-C₆-Alkenyl und C₂-C₆-Alkynyl, gegebenenfalls einfach bis zweifach unabhängig voneinander durch O, S(O)_n, CO und NR⁴ unterbrochenes, gegebenenfalls einfach bis zweifach unabhängig voneinander durch Fluor, Chlor, Brom, Methyl, Ethyl, Trifluormethyl, Methoxy, Ethoxy und Cyano substituiertes C₃-C₆-Cycloalkyl, gegebenenfalls einfach bis zweifach unabhängig voneinander durch O, S(O)_n, CO und NR⁴ unterbrochenes, gegebenenfalls einfach bis zweifach unabhängig voneinander durch Fluor, Chlor, Brom, Methyl, Ethyl, Trifluormethyl, Methoxy, Ethoxy und Cyano substituiertes, geradkettiges oder verzweigtes C₃-C₆-Cycloalkyl-C₁-C₂-alkyl, gegebenenfalls einfach bis zweifach unabhängig voneinander durch Fluor, Chlor, Brom, Methyl, Ethyl, Difluormethyl, Trifluormethyl, Methoxy, Ethoxy, Methyl-S(O)_n-, Ethyl-S(O)_n-, Difluormethoxy, Trifluormethoxy, Trifluormethyl-S(O)_n-, Difluorethyl-S(O)_n-, Trifluorethyl-S(O)_n-, Nitro und Cyano

- substituiertes Phenyl, Naphthyl, Pyridyl, Pyrimidyl, Pyridazinyl, Pyrazinyl, Triazinyl, Furanyl, Thienyl, Oxazolyl, Isoxazolyl, Thiazolyl, Isothiazolyl, Pyrazolyl, Imidazolyl, Ox Diazolyl und Thiadiazolyl und gegebenenfalls einfach bis zweifach unabhängig voneinander durch Fluor, Chlor, Brom, Methyl, Ethyl, Difluormethyl, Trifluormethyl, Methoxy, Ethoxy, Methyl-S(O)_n-, Ethyl-S(O)_n-, Difluormethoxy, Trifluormethoxy, Trifluormethyl-S(O)_n-, Difluorethyl-S(O)_n-, Trifluorethyl-S(O)_n-, Nitro und Cyano substituiertes, geradkettiges oder verzweigtes Phenyl-C₁-C₂-alkyl, Pyridyl-C₁-C₂-alkyl, Pyrimidyl-C₁-C₂-alkyl, Thiazolyl-C₁-C₂-alkyl und Pyrazolyl-C₁-C₂-alkyl steht,
- 5
- L² für einen Rest aus der Reihe Wasserstoff, gegebenenfalls unabhängig voneinander einfach bis fünffach durch Fluor, Chlor und Brom und einfach bis zweifach durch Methoxy, Ethoxy, Methyl-S(O)_n-, Ethyl-S(O)_n- und Cyano substituiertes C₁-C₄-Alkyl steht,
- 10
- oder
- L¹ und L² zusammen mit dem Kohlenstoffatom, an das sie gebunden sind, für gegebenenfalls einfach bis dreifach unabhängig voneinander durch Fluor, Chlor, Brom, Methyl-S(O)_n-, Ethyl-S(O)_n- und Cyano substituiertes C₃-C₈-Cycloalkyl stehen,
- 15
- oder
- L¹ und L² zusammen für gegebenenfalls einfach bis dreifach unabhängig voneinander durch Fluor, Chlor, Brom, Methyl-S(O)_n-, Ethyl-S(O)_n- und Cyano substituiertes C₂-C₆-Alkenyl stehen,
- L³ für einen Rest aus der Reihe Wasserstoff, S(O)_nR^{1a}, OR^{1b} und N(R²)(R³) steht, wobei für den Fall, dass L¹ und/oder L² für Wasserstoff oder gegebenenfalls substituiertes Alkyl steht, L³ für einen Rest aus der Reihe S(O)_nR^{1a}, OR^{1b} und N(R²)(R³) steht,
- 20
- R^{1a} für einen Rest aus der Reihe gegebenenfalls unabhängig voneinander einfach bis fünffach durch Fluor, Chlor und Brom und einfach bis zweifach durch Methoxy, Ethoxy, Methyl-S(O)_n-, Ethyl-S(O)_n-, Cyano, C(O)N(R⁵)(R⁶), C(G)R⁷ und C(O)OR⁸ substituiertes C₁-C₆-Alkyl, C₃-C₆-Alkenyl und C₃-C₆-Alkynyl, gegebenenfalls einfach bis zweifach unabhängig voneinander durch O, S(O)_n, CO und NR⁴ unterbrochenes, gegebenenfalls einfach bis zweifach unabhängig voneinander durch Fluor, Chlor, Brom, Methyl, Ethyl, Trifluormethyl, Methoxy, Ethoxy und Cyano substituiertes C₃-C₆-Cycloalkyl, gegebenenfalls einfach bis zweifach unabhängig voneinander durch O, S(O)_n, CO und NR⁴ unterbrochenes, gegebenenfalls einfach bis zweifach unabhängig voneinander durch Fluor, Chlor, Brom, Methyl, Ethyl, Trifluormethyl, Methoxy, Ethoxy und Cyano substituiertes, geradkettiges oder verzweigtes C₃-C₆-Cycloalkyl-C₁-C₂-alkyl, gegebenenfalls einfach bis zweifach unabhängig voneinander durch Fluor, Chlor, Brom, Methyl, Ethyl, Difluormethyl,
- 25
- 30

5 Trifluormethyl, Methoxy, Ethoxy, Methyl-S(O)_n-, Ethyl-S(O)_n-, Difluormethoxy, Trifluormethoxy, Trifluormethyl-S(O)_n-, Difluorethyl-S(O)_n-, Trifluorethyl-S(O)_n-, Nitro und Cyano substituiertes Phenyl, Naphthyl, Pyridyl, Pyrimidyl, Pyridazinyl, Pyrazinyl, Triazinyl, Furanyl, Thienyl, Oxazolyl, Isoxazolyl, Thiazolyl, Isothiazolyl, Pyrazolyl, Imidazolyl, Oxidazolyl und Thiadiazolyl und gegebenenfalls einfach bis zweifach unabhängig voneinander durch Fluor, Chlor, Brom, Methyl, Ethyl, Difluormethyl, Trifluormethyl, Methoxy, Ethoxy, Methyl-S(O)_n-, Ethyl-S(O)_n-, Difluormethoxy, Trifluormethoxy, Trifluormethyl-S(O)_n-, Difluorethyl-S(O)_n-, Trifluorethyl-S(O)_n-, Nitro und Cyano substituiertes, geradkettiges oder verzweigtes Phenyl-C₁-C₂-alkyl, Pyridyl-C₁-C₂-alkyl, Pyrimidyl-C₁-C₂-alkyl, Thiazolyl-C₁-C₂-alkyl und Pyrazolyl-C₁-C₂-alkyl steht,

10 R^{1b} für einen Rest aus der Reihe Wasserstoff, gegebenenfalls unabhängig voneinander einfach bis fünffach durch Fluor, Chlor und Brom und einfach bis zweifach durch Methoxy, Ethoxy, Methyl-S(O)_n-, Ethyl-S(O)_n-, Cyano, C(O)N(R⁵)(R⁶), C(G)R⁷ und C(O)OR⁸ substituiertes C₁-C₆-Alkyl, C₃-C₆-Alkenyl und C₃-C₆-Alkynyl, gegebenenfalls einfach bis zweifach unabhängig voneinander durch O, S(O)_n, CO und NR⁴ unterbrochenes, gegebenenfalls einfach bis zweifach unabhängig voneinander durch Fluor, Chlor, Brom, Methyl, Ethyl, Trifluormethyl, Methoxy, Ethoxy und Cyano substituiertes C₃-C₆-Cycloalkyl, gegebenenfalls einfach bis zweifach unabhängig voneinander durch O, S(O)_n, CO und NR⁴ unterbrochenes, gegebenenfalls einfach bis zweifach unabhängig voneinander durch Fluor, Chlor, Brom, Methyl, Ethyl, Trifluormethyl, Methoxy, Ethoxy und Cyano substituiertes, geradkettiges oder verzweigtes C₃-C₆-Cycloalkyl-C₁-C₂-alkyl, gegebenenfalls einfach bis zweifach unabhängig voneinander durch Fluor, Chlor, Brom, Methyl, Ethyl, Difluormethyl, Trifluormethyl, Methoxy, Ethoxy, Methyl-S(O)_n-, Ethyl-S(O)_n-, Difluormethoxy, Trifluormethoxy, Trifluormethyl-S(O)_n-, Difluorethyl-S(O)_n-, Trifluorethyl-S(O)_n-, Nitro und Cyano substituiertes Phenyl, Naphthyl, Pyridyl, Pyrimidyl, Pyridazinyl, Pyrazinyl, Triazinyl, Furanyl, Thienyl, Oxazolyl, Isoxazolyl, Thiazolyl, Isothiazolyl, Pyrazolyl, Imidazolyl, Oxidazolyl und Thiadiazolyl und gegebenenfalls einfach bis zweifach unabhängig voneinander durch Fluor, Chlor, Brom, Methyl, Ethyl, Difluormethyl, Trifluormethyl, Methoxy, Ethoxy, Methyl-S(O)_n-, Ethyl-S(O)_n-, Difluormethoxy, Trifluormethoxy, Trifluormethyl-S(O)_n-, Difluorethyl-S(O)_n-, Trifluorethyl-S(O)_n-, Nitro und Cyano substituiertes, geradkettiges oder verzweigtes Phenyl-C₁-C₂-alkyl, Pyridyl-C₁-C₂-alkyl, Pyrimidyl-C₁-C₂-alkyl, Thiazolyl-C₁-C₂-alkyl und Pyrazolyl-C₁-C₂-alkyl steht,

G für O oder N-OR⁸ steht,

35 R² für einen Rest aus der Reihe Wasserstoff, gegebenenfalls unabhängig voneinander einfach bis fünffach durch Fluor, Chlor und Brom und einfach bis zweifach durch Methoxy,

- 5 Ethoxy, Methyl-S(O)_n-, Ethyl-S(O)_n- und Cyano substituiertes C₁-C₆-Alkyl, C₃-C₆-Alkenyl und C₃-C₆-Alkynyl, gegebenenfalls einfach bis zweifach unabhängig voneinander durch O, S(O)_n, CO und NR⁴ unterbrochenes, gegebenenfalls einfach bis zweifach unabhängig voneinander durch Fluor, Chlor, Brom, Methyl, Ethyl, Trifluormethyl, Methoxy, Ethoxy und Cyano substituiertes C₃-C₆-Cycloalkyl, gegebenenfalls einfach bis zweifach unabhängig voneinander durch O, S(O)_n, CO und NR⁴ unterbrochenes, gegebenenfalls einfach bis zweifach unabhängig voneinander durch Fluor, Chlor, Brom, Methyl, Ethyl, Trifluormethyl, Methoxy, Ethoxy und Cyano substituiertes, geradkettiges oder verzweigtes C₃-C₆-Cycloalkyl-C₁-C₂-alkyl, gegebenenfalls einfach bis zweifach unabhängig voneinander durch Fluor, Chlor, Brom, Methyl, Ethyl, Difluormethyl, Trifluormethyl, Methoxy, Ethoxy, Methyl-S(O)_n-, Ethyl-S(O)_n-, Difluormethoxy, Trifluormethoxy, Trifluormethyl-S(O)_n-, Difluorethyl-S(O)_n-, Trifluorethyl-S(O)_n-, Nitro und Cyano substituiertes Phenyl, Naphthyl, Pyridyl, Pyrimidyl, Pyridazinyl, Pyrazinyl, Triazinyl, Furanyl, Thienyl, Oxazolyl, Isoxazolyl, Thiazolyl, Isothiazolyl, Pyrazolyl, Imidazolyl, Oxidiazolyl und Thiadiazolyl und gegebenenfalls einfach bis zweifach unabhängig voneinander durch Fluor, Chlor, Brom, Methyl, Ethyl, Difluormethyl, Trifluormethyl, Methoxy, Ethoxy, Methyl-S(O)_n-, Ethyl-S(O)_n-, Difluormethoxy, Trifluormethoxy, Trifluormethyl-S(O)_n-, Difluorethyl-S(O)_n-, Trifluorethyl-S(O)_n-, Nitro und Cyano substituiertes, geradkettiges oder verzweigtes Phenyl-C₁-C₂-alkyl, Pyridyl-C₁-C₂-alkyl, Pyrimidyl-C₁-C₂-alkyl, Thiazolyl-C₁-C₂-alkyl und Pyrazolyl-C₁-C₂-alkyl steht,
- 10
- 15
- 20
- R³ für einen Rest aus der Reihe Wasserstoff, gegebenenfalls einfach bis dreifach unabhängig voneinander durch Fluor, Chlor, Brom, Methoxy, Ethoxy, Methyl-S(O)_n-, Ethyl-S(O)_n- und Cyano substituiertes C₁-C₆-Alkyl, C₃-C₆-Alkenyl und C₃-C₆-Alkynyl oder für die Reste, C(O)N(R⁵)(R⁶), C(O)R⁷, C(O)OR⁸ und SO₂R⁹ steht,
- 25 oder
- R² und R³ zusammen mit N für einen Heterocyclus der Reihe U-1, U-2, U-3, U-4, U-5, U-6, U-7, U-10, U-13, U-14, U-24, U-25, U-26, U-27, U-29, U-30, U-31, U-32, U-33, U-34, U-35 und U-36 stehen,
- 30
- R⁴ für einen Rest aus der Reihe Wasserstoff, gegebenenfalls einfach bis dreifach unabhängig voneinander durch Fluor, Chlor, Brom, Methoxy, Ethoxy, Methyl-S(O)_n-, Ethyl-S(O)_n- und Cyano substituiertes C₁-C₆-Alkyl, C₃-C₆-Alkenyl und C₃-C₆-Alkynyl, gegebenenfalls einfach bis zweifach unabhängig voneinander durch Fluor, Chlor, Brom, Methyl, Ethyl, Trifluormethyl, Methoxy, Ethoxy und Cyano substituiertes C₃-C₆-Cycloalkyl, gegebenenfalls einfach bis zweifach unabhängig voneinander durch Fluor, Chlor, Brom, Methyl, Ethyl, Trifluormethyl, Methoxy, Ethoxy und Cyano substituiertes, geradkettiges
- 35

oder verzweigtes C₃-C₆-Cycloalkyl-C₁-C₂-alkyl, gegebenenfalls einfach bis zweifach unabhängig voneinander durch Fluor, Chlor, Brom, Methyl, Ethyl, Difluormethyl, Trifluormethyl, Methoxy, Ethoxy, Methyl-S(O)_n-, Ethyl-S(O)_n-, Difluormethoxy, Trifluormethoxy, Trifluormethyl-S(O)_n-, Difluorethyl-S(O)_n-, Trifluorethyl-S(O)_n-, Nitro und Cyano substituiertes Phenyl, Naphthyl, Pyridyl, Pyrimidyl, Pyridazinyl, Pyrazinyl, Triazinyl, Furanyl, Thienyl, Oxazolyl, Isoxazolyl, Thiazolyl, Isothiazolyl, Pyrazolyl, Imidazolyl, Oxidiazolyl und Thiadiazolyl und gegebenenfalls einfach bis zweifach unabhängig voneinander durch Fluor, Chlor, Brom, Methyl, Ethyl, Difluormethyl, Trifluormethyl, Methoxy, Ethoxy, Methyl-S(O)_n-, Ethyl-S(O)_n-, Difluormethoxy, Trifluormethoxy, Trifluormethyl-S(O)_n-, Difluorethyl-S(O)_n-, Trifluorethyl-S(O)_n-, Nitro und Cyano substituiertes, geradkettiges oder verzweigtes Phenyl-C₁-C₂-alkyl, Pyridyl-C₁-C₂-alkyl, Pyrimidyl-C₁-C₂-alkyl, Thiazolyl-C₁-C₂-alkyl und Pyrazolyl-C₁-C₂-alkyl steht,

R⁵ und R⁶ unabhängig voneinander für einen Rest aus der Reihe Wasserstoff, gegebenenfalls unabhängig voneinander einfach bis fünffach durch Fluor, Chlor und Brom und einfach bis zweifach durch Methoxy, Ethoxy, Methyl-S(O)_n-, Ethyl-S(O)_n- und Cyano substituiertes C₁-C₆-Alkyl, C₃-C₆-Alkenyl und C₃-C₆-Alkynyl, gegebenenfalls einfach bis zweifach unabhängig voneinander durch Fluor, Chlor, Brom, Methyl, Ethyl, Trifluormethyl, Methoxy, Ethoxy und Cyano substituiertes C₃-C₆-Cycloalkyl, gegebenenfalls einfach bis zweifach unabhängig voneinander durch Fluor, Chlor, Brom, Methyl, Ethyl, Trifluormethyl, Methoxy, Ethoxy und Cyano substituiertes, geradkettiges oder verzweigtes C₃-C₆-Cycloalkyl-C₁-C₂-alkyl, gegebenenfalls einfach bis zweifach unabhängig voneinander durch Fluor, Chlor, Brom, Methyl, Ethyl, Difluormethyl, Trifluormethyl, Methoxy, Ethoxy, Methyl-S(O)_n-, Ethyl-S(O)_n-, Difluormethoxy, Trifluormethoxy, Trifluormethyl-S(O)_n-, Difluorethyl-S(O)_n-, Trifluorethyl-S(O)_n-, Nitro und Cyano substituiertes Phenyl, Naphthyl, Pyridyl, Pyrimidyl, Pyridazinyl, Pyrazinyl, Triazinyl, Furanyl, Thienyl, Oxazolyl, Isoxazolyl, Thiazolyl, Isothiazolyl, Pyrazolyl, Imidazolyl, Oxidiazolyl und Thiadiazolyl, gegebenenfalls einfach bis zweifach unabhängig voneinander durch Fluor, Chlor, Brom, Methyl, Ethyl, Difluormethyl, Trifluormethyl, Methoxy, Ethoxy, Methyl-S(O)_n-, Ethyl-S(O)_n-, Difluormethoxy, Trifluormethoxy, Trifluormethyl-S(O)_n-, Difluorethyl-S(O)_n-, Trifluorethyl-S(O)_n-, Nitro und Cyano substituiertes, geradkettiges oder verzweigtes Phenyl-C₁-C₂-alkyl, Pyridyl-C₁-C₂-alkyl, Pyrimidyl-C₁-C₂-alkyl, Thiazolyl-C₁-C₂-alkyl und Pyrazolyl-C₁-C₂-alkyl stehen,

oder

R⁵ und R⁶ zusammen mit dem Stickstoffatom, an das sie gebunden sind, für einen drei- bis sechsgliedrigen aliphatischen Ring stehen, der gegebenenfalls durch C₁-C₂-Alkyl, C₁-C₂-

Haloalkyl und C₁-C₂-Alkoxy substituiert und gegebenenfalls durch O oder S(O)_n unterbrochen sein kann,

R⁷ für einen Rest aus der Reihe Wasserstoff, gegebenenfalls unabhängig voneinander einfach bis fünffach durch Fluor, Chlor und Brom und einfach bis zweifach durch Methoxy, Ethoxy, Methyl-S(O)_n-, Ethyl-S(O)_n- und Cyano substituiertes C₁-C₆-Alkyl, C₃-C₆-Alkenyl und C₃-C₆-Alkynyl, gegebenenfalls einfach bis zweifach unabhängig voneinander durch Fluor, Chlor, Brom, Methyl, Ethyl, Trifluormethyl, Methoxy, Ethoxy und Cyano substituiertes C₃-C₆-Cycloalkyl, gegebenenfalls einfach bis zweifach unabhängig voneinander durch Fluor, Chlor, Brom, Methyl, Ethyl, Trifluormethyl, Methoxy, Ethoxy und Cyano substituiertes, geradkettiges oder verzweigtes C₃-C₆-Cycloalkyl-C₁-C₂-alkyl, gegebenenfalls einfach bis zweifach unabhängig voneinander durch Fluor, Chlor, Brom, Methyl, Ethyl, Difluormethyl, Trifluormethyl, Methoxy, Ethoxy, Methyl-S(O)_n-, Ethyl-S(O)_n-, Difluormethoxy, Trifluormethoxy, Trifluormethyl-S(O)_n-, Difluorethyl-S(O)_n-, Trifluorethyl-S(O)_n-, Nitro und Cyano substituiertes Phenyl, Naphthyl, Pyridyl, Pyrimidyl, Pyridazinyl, Pyrazinyl, Triazinyl, Furanyl, Thienyl, Oxazolyl, Isoxazolyl, Thiazolyl, Isothiazolyl, Pyrazolyl, Imidazolyl, Oxdiazolyl und Thiadiazolyl und gegebenenfalls einfach bis zweifach unabhängig voneinander durch Fluor, Chlor, Brom, Methyl, Ethyl, Difluormethyl, Trifluormethyl, Methoxy, Ethoxy, Methyl-S(O)_n-, Ethyl-S(O)_n-, Difluormethoxy, Trifluormethoxy, Trifluormethyl-S(O)_n-, Difluorethyl-S(O)_n-, Trifluorethyl-S(O)_n-, Nitro und Cyano substituiertes, geradkettiges oder verzweigtes Phenyl-C₁-C₂-alkyl, Pyridyl-C₁-C₂-alkyl, Pyrimidyl-C₁-C₂-alkyl, Thiazolyl-C₁-C₂-alkyl und Pyrazolyl-C₁-C₂-alkyl steht,

R⁸ für einen Rest aus der Reihe Wasserstoff, gegebenenfalls unabhängig voneinander einfach bis fünffach durch Fluor, Chlor und Brom und einfach bis zweifach durch Methoxy, Ethoxy, Methyl-S(O)_n-, Ethyl-S(O)_n- und Cyano substituiertes C₁-C₆-Alkyl, C₃-C₆-Alkenyl und C₃-C₆-Alkynyl, gegebenenfalls einfach bis zweifach unabhängig voneinander durch Fluor, Chlor, Brom, Methyl, Ethyl, Trifluormethyl, Methoxy, Ethoxy und Cyano substituiertes C₃-C₆-Cycloalkyl, gegebenenfalls einfach bis zweifach unabhängig voneinander durch Fluor, Chlor, Brom, Methyl, Ethyl, Trifluormethyl, Methoxy, Ethoxy und Cyano substituiertes, geradkettiges oder verzweigtes C₃-C₆-Cycloalkyl-C₁-C₂-alkyl, gegebenenfalls einfach bis zweifach unabhängig voneinander durch Fluor, Chlor, Brom, Methyl, Ethyl, Difluormethyl, Trifluormethyl, Methoxy, Ethoxy, Methyl-S(O)_n-, Ethyl-S(O)_n-, Difluormethoxy, Trifluormethoxy, Trifluormethyl-S(O)_n-, Difluorethyl-S(O)_n-, Trifluorethyl-S(O)_n-, Nitro und Cyano substituiertes Phenyl, Naphthyl, Pyridyl, Pyrimidyl, Pyridazinyl, Pyrazinyl, Triazinyl, Furanyl, Thienyl, Oxazolyl, Isoxazolyl, Thiazolyl, Isothiazolyl, Pyrazolyl, Imidazolyl, Oxdiazolyl und Thiadiazolyl und gegebenenfalls

einfach bis zweifach unabhängig voneinander durch Fluor, Chlor, Brom, Methyl, Ethyl, Difluormethyl, Trifluormethyl, Methoxy, Ethoxy, Methyl-S(O)_n-, Ethyl-S(O)_n-, Difluormethoxy, Trifluormethoxy, Trifluormethyl-S(O)_n-, Difluorethyl-S(O)_n-, Trifluorethyl-S(O)_n-, Nitro und Cyano substituiertes, geradkettiges oder verzweigtes Phenyl-C₁-C₂-alkyl, Pyridyl-C₁-C₂-alkyl, Pyrimidyl-C₁-C₂-alkyl, Thiazolyl-C₁-C₂-alkyl und Pyrazolyl-C₁-C₂-alkyl steht,


X^b für einen Rest aus der Reihe Halogen, Nitro, Cyano, C₁-C₄-Alkyl, C₃-C₆-Cycloalkyl, C₁-C₂-Halogenalkyl, C₁-C₄-Alkoxy, C₁-C₄-Alkyl-S(O)_n-, C₁-C₄-Halogenalkoxy, C₁-C₄-Halogenalkyl-S(O)_n-, C₃-C₆-Halogenocycloalkyl, C₁-C₄-Alkoxy-C₁-C₄-alkyl, C₁-C₄-Alkoxycarbonyl, C₁-C₄-Alkylaminocarbonyl, C₁-C₆-Alkylsulfonyl, C₁-C₆-Alkylcarbonylamino und Phenyl steht, wobei das Phenyl gegebenenfalls einfach bis dreifach durch Fluor, Chlor, Brom, Methyl, Ethyl, Difluormethyl, Trifluormethyl, Methoxy, Ethoxy, Methyl-S(O)_n-, Ethyl-S(O)_n-, Difluormethoxy, Trifluormethoxy, Trifluormethyl-S(O)_n-, Difluorethyl-S(O)_n-, Trifluorethyl-S(O)_n-, Nitro und Cyano substituiert sein kann,

m für eine Zahl 0, 1 oder 2 steht, wobei im Falle von m = 2 die Reste X^b gegebenenfalls unabhängig voneinander sein können,

n für eine Zahl 0, 1 oder 2 steht,

und deren Salze.

Aus Formel (I) ergibt sich unter Berücksichtigung der Position der Carboxamidgruppe am Imidazolrest die ganz besonders bevorzugte Struktur (I-1). Ganz besonders bevorzugte Substituenten bzw. Bereiche der in den Verbindungen der Formel (I-1) aufgeführten Reste werden im Folgenden erläutert. Ihre Kombination bildet den Vorzugsbereich (3-2), wobei



(I-1)

- V für einen Rest aus der Reihe Wasserstoff, Fluor, Chlor, Methyl und Cyano steht,
- W für einen Rest aus der Reihe Wasserstoff, Fluor, Chlor, Brom, Methyl, Ethyl und Cyano steht,
- Y für einen Rest aus der Reihe Wasserstoff, gegebenenfalls einfach bis dreifach unabhängig
5 voneinander durch Fluor, Methoxy, Ethoxy und Cyano substituiertes Methyl, Ethyl, Propyl, Allyl und Propargyl steht,
- A für einen Rest aus der Reihe Wasserstoff, gegebenenfalls einfach bis dreifach unabhängig voneinander durch Fluor, Methoxy, Ethoxy und Cyano substituiertes Methyl, Ethyl, Propyl, Allyl, Propargyl, Cyclopropyl und Cylopropylmethyl steht,
- 10 T für ein Elektronenpaar oder Sauerstoff steht,
- L¹ für einen Rest aus der Reihe Wasserstoff, gegebenenfalls einfach bis dreifach unabhängig voneinander durch Fluor, Chlor und Brom und einfach durch Methoxy, Ethoxy, Methylsulfanyl, Ethylsulfanyl, Methylsulfinyl, Ethylsulfinyl, Methylsulfonyl, Ethylsulfonyl oder Cyano substituiertes Methyl, Ethyl, Propyl, Isopropyl, n-Butyl, Isobutyl, sec-Butyl,
15 tert-Butyl, Pentyl, Isopentyl, 2,2-Dimethyl-propyl, Hexyl, neo-Hexyl, Vinyl, Allyl, Methallyl, 2-Butenyl, Propargyl, Ethinyl und 2-Butinyl, gegebenenfalls einfach bis zweifach unabhängig voneinander durch Fluor, Chlor, Methyl, Ethyl, Trifluormethyl, Methoxy und Cyano substituiertes Cyclopropyl, Cyclobutyl, Cyclopentyl und Cyclohexyl, gegebenenfalls einfach bis zweifach unabhängig voneinander durch Fluor, Chlor, Methyl,
20 Ethyl, Trifluormethyl, Methoxy und Cyano substituiertes Cyclopropylmethyl, Cyclobutylmethyl, Cyclopentylmethyl und Cyclohexylmethyl, gegebenenfalls einfach bis zweifach unabhängig voneinander durch Fluor, Chlor, Brom, Methyl, Ethyl, Difluormethyl, Trifluormethyl, Methoxy, Ethoxy, Methylsulfanyl, Ethylsulfanyl, Methylsulfinyl, Ethylsulfinyl, Methylsulfonyl, Ethylsulfonyl, Difluormethoxy, Trifluormethoxy, Trifluormethylsulfanyl, Trifluormethylsulfinyl, Trifluormethylsulfonyl,
25 Difluormethylsulfanyl, Difluormethylsulfinyl, Difluormethylsulfonyl, Trifluorethylsulfanyl, Trifluorethylsulfinyl Trifluorethylsulfonyl, Nitro und Cyano substituiertes Phenyl, Pyridyl, Pyrimidyl, Thienyl und Thiazolyl, gegebenenfalls einfach bis zweifach unabhängig voneinander durch Fluor, Chlor, Brom, Methyl, Ethyl, Difluormethyl, Trifluormethyl, Methoxy, Ethoxy, Methylsulfanyl, Ethylsulfanyl, Methylsulfinyl, Ethylsulfinyl, Methylsulfonyl, Ethylsulfonyl, Difluormethoxy, Trifluormethoxy, Trifluormethylsulfanyl, Trifluormethylsulfinyl, Trifluormethylsulfonyl,
30 Difluormethylsulfanyl, Difluormethylsulfinyl, Difluormethylsulfonyl, Trifluorethylsulfanyl, Trifluorethylsulfinyl Trifluorethylsulfonyl, Nitro und Cyano

substituiertes Benzyl, Pyridylmethyl, Pyrimidylmethyl, Thiazolylmethyl und Pyrazolylmethyl steht,

L^2 für einen Rest aus der Reihe Wasserstoff, gegebenenfalls einfach bis dreifach unabhängig voneinander durch Fluor, Methoxy, Ethoxy und Cyano substituiertes Methyl, Ethyl und Propyl steht,

oder

L^1 und L^2 zusammen mit dem Kohlenstoffatom, an das sie gebunden sind, für gegebenenfalls einfach bis dreifach unabhängig voneinander durch Fluor, Chlor, Brom, Methyl-S(O)_n-, Ethyl-S(O)_n- und Cyano substituiertes Cyclopropyl, Cyclobutyl, Cyclopentyl oder Cyclohexyl stehen,

oder

L^1 und L^2 zusammen für gegebenenfalls einfach bis dreifach unabhängig voneinander durch Fluor, Chlor, Brom, Methyl-S(O)_n-, Ethyl-S(O)_n- und Cyano substituiertes Ethenyl, Propenyl oder Butenyl stehen,

L^3 für einen Rest aus der Reihe Wasserstoff, S(O)_nR^{1a}, OR^{1b} und N(R²)(R³) steht, wobei für den Fall, dass L^1 und/oder L^2 für Wasserstoff oder gegebenenfalls substituiertes Alkyl steht, L^3 für einen Rest aus der Reihe S(O)_nR^{1a}, OR^{1b} und N(R²)(R³) steht,

R^{1a} für einen Rest aus der Reihe gegebenenfalls einfach bis fünffach unabhängig voneinander durch Fluor, Chlor und Brom, und einfach durch Methoxy, Ethoxy, Methylsulfanyl, Ethylsulfanyl, Methylsulfinyl, Ethylsulfinyl, Methylsulfonyl, Ethylsulfonyl, Cyano, C(O)N(R⁵)(R⁶) oder C(O)OR⁸ substituiertes Methyl, Ethyl, Propyl, Isopropyl, n-Butyl, Isobutyl, sec-Butyl, tert-Butyl, Pentyl, Isopentyl, 2,2-Dimethyl-propyl, Hexyl, neo-Hexyl, Allyl, Methallyl, 2-Butenyl, Propargyl und 2-Butinyl, gegebenenfalls einfach bis zweifach unabhängig voneinander durch Fluor, Chlor, Methyl, Ethyl, Trifluormethyl, Methoxy und Cyano substituiertes Cyclopropyl, Cyclobutyl, Cyclopentyl und Cyclohexyl, gegebenenfalls einfach bis zweifach unabhängig voneinander durch Fluor, Chlor, Methyl, Ethyl, Trifluormethyl, Methoxy und Cyano substituiertes Tetrahydrofuranyl, Tetrahydropyranyl, Pyrrolidyl, N-Methylpyrrolidyl, Piperidyl und N-Methylpiperidyl, gegebenenfalls einfach bis zweifach unabhängig voneinander durch Fluor, Chlor, Methyl, Ethyl, Trifluormethyl, Methoxy und Cyano substituiertes Cyclopropylmethyl, Cyclobutylmethyl, Cyclopentylmethyl und Cyclohexylmethyl, gegebenenfalls einfach bis zweifach unabhängig voneinander durch Fluor, Chlor, Brom, Methyl, Ethyl, Difluormethyl, Trifluormethyl, Methoxy, Ethoxy, Methylsulfanyl, Ethylsulfanyl, Methylsulfinyl,

- 5 Ethylsulfanyl, Methylsulfonyl, Ethylsulfanyl, Difluormethoxy, Trifluormethoxy, Trifluormethylsulfanyl, Trifluormethylsulfanyl, Trifluormethylsulfonyl, Difluormethylsulfanyl, Difluormethylsulfanyl, Difluormethylsulfonyl, Trifluorethylsulfanyl, Trifluorethylsulfanyl Trifluorethylsulfonyl, Nitro und Cyano substituier-
 10 tes Phenyl, Pyridyl, Pyrimidyl, Thienyl und Thiazolyl und gegebenenfalls einfach bis zweifach unabhängig voneinander durch Fluor, Chlor, Brom, Methyl, Ethyl, Difluormethyl, Trifluormethyl, Methoxy, Ethoxy, Methylsulfanyl, Ethylsulfanyl, Methylsulfanyl, Ethylsulfanyl, Methylsulfonyl, Ethylsulfonyl, Difluormethoxy, Trifluormethoxy, Trifluormethylsulfanyl, Trifluormethylsulfanyl, Trifluormethylsulfonyl, Difluormethylsulfanyl, Difluormethylsulfanyl, Difluormethylsulfonyl, Trifluorethylsulfanyl, Trifluorethylsulfanyl Trifluorethylsulfonyl, Nitro und Cyano substituier-
 15 tes Benzyl, Pyridylmethyl, Pyrimidylmethyl, Thiazolylmethyl und Pyrazolyl-methyl steht,
- R^{1b} für einen Rest aus der Reihe Wasserstoff, gegebenenfalls einfach bis fünffach unabhängig
 20 voneinander durch Fluor, Chlor, Brom oder einfach durch Methoxy, Ethoxy, Methylsulfanyl, Ethylsulfanyl, Methylsulfanyl, Ethylsulfanyl, Methylsulfonyl, Ethylsulfonyl, Cyano, C(O)N(R⁵)(R⁶) oder C(O)OR⁸ substituier-
 25 tes Methyl, Ethyl, Propyl, Isopropyl, n-Butyl, Isobutyl, sec-Butyl, tert-Butyl, Pentyl, Isopentyl, 2,2-Dimethyl-propyl, Hexyl, neo-Hexyl, Allyl, Methallyl, 2-Butenyl, Propargyl und 2-Butinyl, gegebenenfalls
 30 einfach bis zweifach unabhängig voneinander durch Fluor, Chlor, Methyl, Ethyl, Trifluormethyl, Methoxy und Cyano substituier-
 25 tes Cyclopropyl, Cyclobutyl, Cyclopentyl und Cyclohexyl, gegebenenfalls einfach bis zweifach unabhängig voneinander durch Fluor, Chlor, Methyl, Ethyl, Trifluormethyl, Methoxy und Cyano substituier-
 30 tes Tetrahydrofuranyl, Tetrahydropyranyl, Pyrrolidyl, N-Methylpyrrolidyl, Piperidyl und N-Methylpiperidyl, gegebenenfalls einfach bis zweifach unabhängig voneinander durch Fluor, Chlor, Methyl, Ethyl, Trifluormethyl, Methoxy und Cyano substituier-
 35 tes Cyclopropylmethyl, Cyclobutylmethyl, Cyclopentylmethyl und Cyclohexylmethyl, gegebenenfalls einfach bis zweifach unabhängig voneinander durch Fluor, Chlor, Brom, Methyl, Ethyl, Difluormethyl, Trifluormethyl, Methoxy, Ethoxy, Methylsulfanyl, Ethylsulfanyl, Methylsulfanyl, Ethylsulfanyl, Methylsulfonyl, Ethylsulfonyl, Difluormethoxy, Trifluormethoxy, Trifluormethylsulfanyl, Trifluormethylsulfanyl, Trifluormethylsulfonyl, Difluormethylsulfanyl, Difluormethylsulfanyl, Difluormethylsulfonyl, Trifluorethylsulfanyl, Trifluorethylsulfanyl Trifluorethylsulfonyl, Nitro und Cyano substituier-
 35 tes Phenyl, Pyridyl, Pyrimidyl, Thienyl und Thiazolyl und gegebenenfalls einfach bis zweifach unabhängig voneinander durch Fluor, Chlor, Brom, Methyl, Ethyl, Difluormethyl, Trifluormethyl, Methoxy, Ethoxy, Methylsulfanyl, Ethylsulfanyl, Methylsulfanyl, Ethylsulfanyl, Methylsulfonyl, Ethylsulfonyl,

Difluormethoxy, Trifluormethoxy, Trifluormethylsulfanyl, Trifluormethylsulfinyl, Trifluormethylsulfonyl, Difluormethylsulfanyl, Difluormethylsulfinyl, Difluormethylsulfonyl, Trifluorethylsulfanyl, Trifluorethylsulfinyl, Trifluorethylsulfonyl, Nitro und Cyano substituiertes Benzyl, Pyridylmethyl, Pyrimidylmethyl, Thiazolylmethyl und Pyrazolyl-methyl steht,

R^2 und R^3 zusammen mit N für einen Heterocyclus der Reihe U-1, U-2, U-3, U-4, U-5, U-6, U-7, U-13, U-25, U-26, U-27, U-29, U-30, U-31, U-32, U-33, U-34, U-35 und U-36 stehen,


R^5 und R^6 unabhängig voneinander für einen Rest aus der Reihe Wasserstoff, gegebenenfalls einfach bis dreifach unabhängig voneinander durch Fluor, Chlor und Brom oder einfach durch Methoxy, Ethoxy, Methylsulfanyl, Ethylsulfanyl, Methylsulfinyl, Ethylsulfinyl, Methylsulfonyl, Ethylsulfonyl oder Cyano substituiertes Methyl, Ethyl, Propyl, Isopropyl, n-Butyl, Isobutyl, sec-Butyl, tert-Butyl, Pentyl, Isopentyl, 2,2-Dimethyl-propyl, Hexyl, neo-Hexyl, Allyl, Methallyl, 2-Butenyl, Propargyl und 2-Butinyl, gegebenenfalls einfach bis zweifach unabhängig voneinander durch Fluor, Chlor, Methyl, Ethyl, Trifluormethyl, Methoxy und Cyano substituiertes Cyclopropyl, Cyclobutyl, Cyclopentyl und Cyclohexyl, gegebenenfalls einfach bis zweifach unabhängig voneinander durch Fluor, Chlor, Methyl, Ethyl, Trifluormethyl, Methoxy und Cyano substituiertes Cyclopropylmethyl, Cyclobutylmethyl, Cyclopentylmethyl und Cyclohexylmethyl, gegebenenfalls einfach bis zweifach unabhängig voneinander durch Fluor, Chlor, Brom, Methyl, Ethyl, Difluormethyl, Trifluormethyl, Methoxy, Ethoxy, Methylsulfanyl, Ethylsulfanyl, Methylsulfinyl, Ethylsulfinyl, Methylsulfonyl, Ethylsulfonyl, Difluormethoxy, Trifluormethoxy, Trifluormethylsulfanyl, Trifluormethylsulfinyl, Trifluormethylsulfonyl, Difluormethylsulfanyl, Difluormethylsulfinyl, Difluormethylsulfonyl, Trifluorethylsulfanyl, Trifluorethylsulfinyl, Trifluorethylsulfonyl, Nitro und Cyano substituiertes Phenyl, Pyridyl, Pyrimidyl, Thienyl und Thiazolyl und gegebenenfalls einfach bis zweifach unabhängig voneinander durch Fluor, Chlor, Brom, Methyl, Ethyl, Difluormethyl, Trifluormethyl, Methoxy, Ethoxy, Methylsulfanyl, Ethylsulfanyl, Methylsulfinyl, Ethylsulfinyl, Methylsulfonyl, Ethylsulfonyl, Difluormethoxy, Trifluormethoxy, Trifluormethylsulfanyl, Trifluormethylsulfinyl, Trifluormethylsulfonyl, Difluormethylsulfanyl, Difluormethylsulfinyl, Difluormethylsulfonyl, Trifluorethylsulfanyl, Trifluorethylsulfinyl, Trifluorethylsulfonyl, Nitro und Cyano substituiertes Benzyl, Pyridylmethyl, Pyrimidylmethyl, Thiazolylmethyl und Pyrazolyl-methyl stehen,

R^8 für einen Rest aus der Reihe Wasserstoff, gegebenenfalls einfach bis dreifach unabhängig voneinander durch Fluor, Chlor und Brom oder einfach durch Methoxy, Ethoxy, Methylsulfanyl, Ethylsulfanyl, Methylsulfinyl, Ethylsulfinyl, Methylsulfonyl, Ethylsulfonyl

- oder Cyano substituiertes Methyl, Ethyl, Propyl, Isopropyl, n-Butyl, Isobutyl, sec-Butyl, tert-Butyl, Pentyl, Isopentyl, 2,2-Dimethyl-propyl, Hexyl, neo-Hexyl, Allyl, Methallyl, 2-Butenyl, Propargyl und 2-Butinyl, gegebenenfalls einfach bis zweifach unabhängig voneinander durch Fluor, Chlor, Methyl, Ethyl, Trifluormethyl, Methoxy und Cyano substituiertes Cyclopropyl, Cyclobutyl, Cyclopentyl und Cyclohexyl, gegebenenfalls einfach bis zweifach unabhängig voneinander durch Fluor, Chlor, Methyl, Ethyl, Trifluormethyl, Methoxy und Cyano substituiertes Cyclopropylmethyl, Cyclobutylmethyl, Cyclopentylmethyl und Cyclohexylmethyl, gegebenenfalls einfach bis zweifach unabhängig voneinander durch Fluor, Chlor, Brom, Methyl, Ethyl, Difluormethyl, Trifluormethyl, Methoxy, Ethoxy, Methylsulfanyl, Ethylsulfanyl, Methylsulfinyl, Ethylsulfinyl, Methylsulfonyl, Ethylsulfonyl, Difluormethoxy, Trifluormethoxy, Trifluormethylsulfanyl, Trifluormethylsulfinyl, Trifluormethylsulfonyl, Difluormethylsulfanyl, Difluormethylsulfinyl, Difluormethylsulfonyl, Trifluorethylsulfanyl, Trifluorethylsulfinyl, Trifluorethylsulfonyl, Nitro und Cyano substituiertes Phenyl, Pyridyl, Pyrimidyl, Thienyl und Thiazolyl und gegebenenfalls einfach bis zweifach unabhängig voneinander durch Fluor, Chlor, Brom, Methyl, Ethyl, Difluormethyl, Trifluormethyl, Methoxy, Ethoxy, Methylsulfanyl, Ethylsulfanyl, Methylsulfinyl, Ethylsulfinyl, Methylsulfonyl, Ethylsulfonyl, Difluormethoxy, Trifluormethoxy, Trifluormethylsulfanyl, Trifluormethylsulfinyl, Trifluormethylsulfonyl, Difluormethylsulfanyl, Difluormethylsulfinyl, Difluormethylsulfonyl, Trifluorethylsulfanyl, Trifluorethylsulfinyl, Trifluorethylsulfonyl, Nitro und Cyano substituiertes Benzyl, Pyridylmethyl, Pyrimidylmethyl, Thiazolylmethyl und Pyrazolylmethyl steht,
- X^b für einen Rest aus der Reihe Fluor, Chlor, Brom, Cyano, Methyl, Ethyl, n-Propyl, Isopropyl, Cyclopropyl, Trifluormethyl, Difluormethyl, Trifluorethyl, Methoxy, Ethoxy, n-Propoxy, Isopropoxy, Trifluormethoxy, Methoxymethyl, Ethoxymethyl, Methoxyethyl, Ethoxyethyl, Methyl-S(O)_n-, Ethyl-S(O)_n- und Phenyl steht, wobei das Phenyl gegebenenfalls einfach bis dreifach durch Fluor, Chlor, Brom, Methyl, Ethyl, Difluormethyl, Trifluormethyl, Methoxy, Ethoxy, Nitro und Cyano substituiert sein kann,
- m für eine Zahl 0, 1 oder 2 steht, wobei im Falle von $m = 2$ die Reste X^b gegebenenfalls unabhängig voneinander sein können,
- n für eine Zahl 0, 1 oder 2 steht,

und deren Salze.

Insbesondere bevorzugte Substituenten bzw. Bereiche der in den Verbindungen der Formel (I-1) aufgeführten Reste werden im Folgenden erläutert. Ihre Kombination bildet den Vorzugsbereich (4-2), wobei



- 5 V für Wasserstoff steht,
- W für Wasserstoff steht,
- Y für Methyl steht,
- A für Methyl, Ethyl oder Cyclopropyl steht,
- T für ein Elektronenpaar oder Sauerstoff steht,
- 10 L¹ für einen Rest aus der Reihe Wasserstoff, Methyl, Trifluormethyl, Trichlormethyl, Isopropyl, Isobutyl, Isopentyl, Phenyl, 2-Chlorphenyl, 3-Chlorphenyl, 4-Chlorphenyl, 3,4-Dichlorphenyl, 2-Pyridinyl, 3-Pyridinyl, 4-Pyridinyl, 4-Chlorpyridin-3-yl, 2-Pyrimidyl und Benzyl steht,
- L² für Wasserstoff oder Methyl steht,
- 15 oder
- L¹ und L² zusammen für Vinyl, Prop-1-en-2-yl, (1E)-Prop-1-en-1-yl, (1Z)-Prop-1-en-1-yl oder Cyclopropyl stehen,
- L³ für einen Rest aus der Reihe Wasserstoff, S(O)_nR^{1a}, OR^{1b} und N(R²)(R³) steht, wobei für den Fall, dass L¹ und/oder L² für Wasserstoff oder gegebenenfalls substituiertes Alkyl steht,
- 20 L³ für einen Rest aus der Reihe S(O)_nR^{1a}, OR^{1b} und N(R²)(R³) steht,

R^{1a} für einen Rest aus der Reihe Methyl, Ethyl, Isopropyl, Isobutyl, tert-Butyl, Cyclopropylmethyl, 2,2-Dimethylpropyl, 2-Methoxy-2-oxoethyl, Phenyl, 2-Chlorphenyl, 3-Chlorphenyl, 4-Chlorphenyl und 2-Pyrimidyl steht,

R^{1b} für einen Rest aus der Reihe Wasserstoff, Methyl, Ethyl, 2,2,2-Trifluorethyl, Isopropyl, Cyclopropylmethyl, Benzyl, 3-Chlorphenyl und 4-Chlorphenyl steht,

R^2 und R^3 zusammen mit N für einen Heterocyclus der Reihe U-2, U-4, U-5 und U-13 stehen,

X^b für Trifluormethyl, Methyl oder Cyclopropyl steht,


m für eine Zahl 0 oder 1 steht,

n für eine Zahl 0 oder 2 steht,

und deren Salze.

Weitere Vorzugsbereiche der Erfindung sind im Folgenden aufgeführt:

Verbindungen der Formel (I)



in welcher (Ausgestaltung (0-1))

Q für Sauerstoff oder Schwefel steht,

V für einen Rest aus der Reihe Wasserstoff, Halogen, Alkyl, Halogenalkyl, Alkoxy, Halogenalkoxy und Cyano steht,

- W für einen Rest aus der Reihe Wasserstoff, Halogen, Alkyl, Halogenalkyl, Alkoxy, Halogenalkoxy und Cyano steht,
- Y für einen Rest aus der Reihe Wasserstoff, gegebenenfalls substituiertes Alkyl, Alkenyl und Alkynyl, gegebenenfalls durch Heteroatome unterbrochenes, gegebenenfalls substituiertes Cycloalkyl, gegebenenfalls durch Heteroatome unterbrochenes, gegebenenfalls substituiertes Cycloalkylalkyl, Arylalkyl, Hetarylalkyl und Cyano steht,
- 5 A für einen Rest aus der Reihe Wasserstoff, gegebenenfalls substituiertes Alkyl, Alkenyl und Alkynyl, gegebenenfalls durch Heteroatome unterbrochenes, gegebenenfalls substituiertes Cycloalkyl und Cycloalkyl-alkyl steht,
- 10 T für Sauerstoff oder ein Elektronenpaar steht,
- L¹ für einen Rest aus der Reihe Wasserstoff, Cyano, gegebenenfalls substituiertes Alkyl, Alkenyl und Alkynyl, gegebenenfalls durch Heteroatome unterbrochenes, gegebenenfalls substituiertes Cycloalkyl und Cycloalkenyl, gegebenenfalls durch Heteroatome unterbrochenes, gegebenenfalls substituiertes Cycloalkylalkyl, gegebenenfalls substituiertes Aryl und Hetaryl, gegebenenfalls substituiertes Arylalkyl und Hetarylalkyl steht,
- 15 L² für einen Rest aus der Reihe Wasserstoff und gegebenenfalls substituiertes Alkyl steht,
- oder
- L¹ und L² zusammen mit dem Kohlenstoffatom, an das sie gebunden sind, für einen gegebenenfalls substituierten drei- bis achtgliedrigen aliphatischen Ring stehen, der gegebenenfalls durch Heteroatome unterbrochen sein kann,
- 20 oder
- L¹ und L² zusammen für gegebenenfalls substituiertes Alkenyl stehen,
- L³ für einen Rest aus der Reihe Wasserstoff, S(O)_nR^{1a}, OR^{1b} und N(R²)(R³) steht,
- R^{1a} für einen Rest aus der Reihe gegebenenfalls substituiertes Alkyl, Alkenyl und Alkynyl, gegebenenfalls durch Heteroatome unterbrochenes, gegebenenfalls substituiertes Cycloalkyl und Cycloalkenyl, gegebenenfalls durch Heteroatome unterbrochenes, gegebenenfalls substituiertes Cycloalkylalkyl und Cycloalkenylalkyl, gegebenenfalls substituiertes Aryl und Hetaryl, gegebenenfalls substituiertes Arylalkyl und Hetarylalkyl steht,
- 25

- 5 R^{1b} für einen Rest aus der Reihe Wasserstoff, gegebenenfalls substituiertes Alkyl, Alkenyl und Alkynyl, gegebenenfalls durch Heteroatome unterbrochenes, gegebenenfalls substituiertes Cycloalkyl und Cycloalkenyl, gegebenenfalls durch Heteroatome unterbrochenes, gegebenenfalls substituiertes Cycloalkylalkyl und Cycloalkenylalkyl, gegebenenfalls substituiertes Aryl und Hetaryl, gegebenenfalls substituiertes Arylalkyl und Hetarylalkyl steht,
- 10 R^2 für einen Rest aus der Reihe Wasserstoff, gegebenenfalls substituiertes Alkyl, Alkenyl und Alkynyl, gegebenenfalls durch Heteroatome unterbrochenes, gegebenenfalls substituiertes Cycloalkyl und Cycloalkenyl, gegebenenfalls durch Heteroatome unterbrochenes, gegebenenfalls substituiertes Cycloalkylalkyl und Cycloalkenylalkyl, gegebenenfalls substituiertes Aryl und Hetaryl, gegebenenfalls substituiertes Arylalkyl und Hetarylalkyl steht,
- 15 R^3 für einen Rest aus der Reihe Wasserstoff, gegebenenfalls substituiertes Alkyl, Alkenyl und Alkynyl oder für die Reste $C(O)N(R^5)(R^6)$, $C(O)R^7$, $C(O)OR^8$ und SO_2R^9 steht,
- 15 oder
- 20 R^2 und R^3 zusammen mit dem Stickstoffatom, an das sie gebunden sind, für einen gegebenenfalls substituierten gesättigten, teilweise gesättigten oder aromatischen Heterocyclus mit 3 bis 9 Ringatomen stehen, der gegebenenfalls durch weitere Heteroatome und/oder durch ein oder zwei CO-Gruppen unterbrochen sein kann,
- 25 R^5 und R^6 unabhängig voneinander für einen Rest aus der Reihe Wasserstoff, gegebenenfalls substituiertes Alkyl, Alkenyl und Alkynyl, gegebenenfalls durch Heteroatome unterbrochenes, gegebenenfalls substituiertes Cycloalkyl und Cycloalkenyl, gegebenenfalls durch Heteroatome unterbrochenes, gegebenenfalls substituiertes Cycloalkylalkyl, gegebenenfalls substituiertes Aryl und Hetaryl, gegebenenfalls substituiertes Arylalkyl und Hetarylalkyl stehen,
- 25 oder
- 30 R^5 und R^6 zusammen mit dem Stickstoffatom, an das sie gebunden sind, für einen gegebenenfalls substituierten drei- bis achtegliedrigen aliphatischen Ring stehen, der gegebenenfalls durch Heteroatome unterbrochen sein kann,
- 30 R^7 für einen Rest aus der Reihe Wasserstoff, gegebenenfalls substituiertes Alkyl, Alkenyl und Alkynyl, gegebenenfalls durch Heteroatome unterbrochenes, gegebenenfalls substituiertes Cycloalkyl und Cycloalkenyl, gegebenenfalls durch Heteroatome unterbrochenes, gegebenenfalls substituiertes Cycloalkylalkyl und Cycloalkenylalkyl, gegebenenfalls

substituiertes Aryl und Hetaryl, gegebenenfalls substituiertes Arylalkyl und Hetarylalkyl steht,

5 R^8 für einen Rest aus der Reihe Wasserstoff, gegebenenfalls substituiertes Alkyl, Alkenyl und Alkynyl, gegebenenfalls durch Heteroatome unterbrochenes, gegebenenfalls substituiertes Cycloalkyl und Cycloalkenyl, gegebenenfalls durch Heteroatome unterbrochenes, gegebenenfalls substituiertes Cycloalkylalkyl und Cycloalkenylalkyl, gegebenenfalls substituiertes Aryl und Hetaryl, gegebenenfalls substituiertes Arylalkyl und Hetarylalkyl steht,

10 R^9 für einen Rest aus der Reihe gegebenenfalls substituiertes Alkyl, Alkenyl und Alkynyl, gegebenenfalls durch Heteroatome unterbrochenes, gegebenenfalls substituiertes Cycloalkyl und Cycloalkenyl, gegebenenfalls durch Heteroatome unterbrochenes, gegebenenfalls substituiertes Cycloalkylalkyl und Cycloalkenylalkyl, gegebenenfalls substituiertes Aryl und Hetaryl, gegebenenfalls substituiertes Arylalkyl und Hetarylalkyl steht,

15 n für eine Zahl 0, 1 oder 2 steht,

und deren Salze.

Bevorzugte Substituenten bzw. Bereiche der in den Verbindungen der Formel (I) aufgeführten Reste werden im Folgenden erläutert. Ihre Kombination bildet den Vorzugsbereich (1-1).

Q für Sauerstoff oder Schwefel steht,

20 V für einen Rest aus der Reihe Wasserstoff, Halogen, C_1 - C_4 -Alkyl, C_1 - C_4 -Halogenalkyl, C_1 - C_4 -Alkoxy, C_1 - C_4 -Halogenalkoxy und Cyano steht,

W für einen Rest aus der Reihe Wasserstoff, Halogen, C_1 - C_4 -Alkyl, C_1 - C_4 -Halogenalkyl, C_1 - C_4 -Alkoxy, C_1 - C_4 -Halogenalkoxy und Cyano steht,

25 Y für einen Rest aus der Reihe Wasserstoff, gegebenenfalls einfach bis mehrfach unabhängig voneinander durch Halogen, C_1 - C_4 -Alkoxy, C_1 - C_4 -Alkyl- $S(O)_n$ - und Cyano substituiertes C_1 - C_6 -Alkyl, C_3 - C_6 -Alkenyl und C_3 - C_6 -Alkynyl, gegebenenfalls einfach bis vierfach unabhängig voneinander durch Halogen, C_1 - C_4 -Alkyl, C_1 - C_4 -Halogenalkyl, C_1 - C_4 -Alkoxy und Cyano substituiertes C_3 - C_8 -Cycloalkyl, gegebenenfalls einfach bis zweifach unabhängig voneinander durch O, $S(O)_n$ und NR^4 unterbrochenes, gegebenenfalls einfach
30 bis vierfach unabhängig voneinander durch Halogen, C_1 - C_4 -Alkyl, C_1 - C_4 -Halogenalkyl, C_1 - C_4 -Alkoxy und Cyano substituiertes, geradkettiges oder verzweigtes C_3 - C_8 -Cycloalkyl- C_1 - C_4 -alkyl, gegebenenfalls einfach bis dreifach unabhängig voneinander durch Halogen, C_1 -

C₄-Alkyl, C₁-C₄-Halogenalkyl, C₁-C₄-Alkoxy, C₁-C₄-Alkyl-S(O)_n-, C₁-C₄-Halogenalkoxy, C₁-C₄-Halogenalkyl-S(O)_n-, Nitro und Cyano substituiertes Aryl-C₁-C₄-alkyl und Hetaryl-C₁-C₄-alkyl steht,

- 5 A für einen Rest aus der Reihe Wasserstoff, gegebenenfalls einfach bis mehrfach unabhängig voneinander durch Halogen, C₁-C₄-Alkoxy, C₁-C₄-Alkyl-S(O)_n- und Cyano substituiertes C₁-C₆-Alkyl, C₃-C₆-Alkenyl und C₃-C₆-Alkynyl, gegebenenfalls einfach bis zweifach unabhängig voneinander durch Halogen, C₁-C₄-Alkyl, C₁-C₄-Halogenalkyl, C₁-C₄-Alkoxy und Cyano substituiertes C₃-C₆-Cycloalkyl, welches gegebenenfalls durch O, S(O)_n, NR⁴ unterbrochen sein kann, gegebenenfalls einfach bis zweifach unabhängig voneinander durch Halogen, C₁-C₄-Alkyl, C₁-C₄-Halogenalkyl, C₁-C₄-Alkoxy und Cyano substituiertes, geradkettiges oder verzweigtes C₃-C₈-Cycloalkyl-C₁-C₄-alkyl, welches gegebenenfalls durch O, S(O)_n oder NR⁴ unterbrochen sein kann, steht,
- 10 T für Sauerstoff oder ein Elektronenpaar steht,
- 15 L¹ für einen Rest aus der Reihe Wasserstoff, gegebenenfalls unabhängig voneinander einfach bis fünffach durch Halogen und einfach bis zweifach durch C₁-C₄-Alkoxy, C₁-C₄-Alkyl-S(O)_n- und Cyano substituiertes C₁-C₈-Alkyl, C₂-C₈-Alkenyl und C₂-C₈-Alkynyl, gegebenenfalls unabhängig voneinander einfach bis fünffach durch Halogen und einfach bis zweifach durch C₁-C₄-Alkyl, C₁-C₄-Halogenalkyl, C₁-C₄-Alkoxy und Cyano substituiertes C₃-C₈-Cycloalkyl und C₅-C₈-Cycloalkenyl, welche gegebenenfalls einfach bis zweifach unabhängig voneinander durch O, S(O)_n, CO und NR⁴ unterbrochen sein können, gegebenenfalls unabhängig voneinander einfach bis fünffach durch Halogen und einfach bis zweifach durch C₁-C₄-Alkyl, C₁-C₄-Halogenalkyl, C₁-C₄-Alkoxy und Cyano substituiertes, geradkettiges oder verzweigtes C₃-C₈-Cycloalkyl-C₁-C₄-alkyl und C₅-C₈-Cycloalkenyl-C₁-C₄-alkyl, welche gegebenenfalls einfach bis zweifach unabhängig voneinander durch O, S(O)_n, CO und NR⁴ unterbrochen sein können, gegebenenfalls einfach bis dreifach unabhängig voneinander durch Halogen, C₁-C₄-Alkyl, C₁-C₄-Halogenalkyl, C₁-C₄-Alkoxy, C₁-C₄-Alkyl-S(O)_n-, C₁-C₄-Halogenalkoxy, C₁-C₄-Halogenalkyl-S(O)_n-, Nitro und Cyano substituiertes Aryl, Hetaryl, Arylalkyl und Hetarylalkyl steht,
- 20
- 25
- 30 L² für einen Rest aus der Reihe Wasserstoff, gegebenenfalls unabhängig voneinander einfach bis fünffach durch Halogen und einfach bis zweifach durch C₁-C₄-Alkoxy, C₁-C₄-Alkyl-S(O)_n- und Cyano substituiertes C₁-C₄-Alkyl steht,

oder

L^1 und L^2 zusammen mit dem Kohlenstoffatom, an das sie gebunden sind, für einfach bis dreifach unabhängig voneinander durch Halogen, C_1 - C_4 -Alkoxy, C_1 - C_4 -Alkyl- $S(O)_n$ - und Cyano substituiertes C_3 - C_8 -Cycloalkyl stehen,

oder


5 L^1 und L^2 zusammen für einfach bis dreifach unabhängig voneinander durch Halogen, C_1 - C_4 -Alkoxy, C_1 - C_4 -Alkyl- $S(O)_n$ - und Cyano substituiertes C_2 - C_6 -Alkenyl stehen,

L^3 für einen Rest aus der Reihe Wasserstoff, $S(O)_nR^{1a}$, OR^{1b} und $N(R^2)(R^3)$ steht,

R^{1a} für einen Rest aus der Reihe gegebenenfalls unabhängig voneinander einfach bis fünffach durch Halogen und einfach bis zweifach durch C_1 - C_4 -Alkoxy, C_1 - C_4 -Alkyl- $S(O)_n$ -, Cyano, $C(O)N(R^5)(R^6)$, $C(G)R^7$ und $C(O)OR^8$ substituiertes C_1 - C_8 -Alkyl, C_3 - C_8 -Alkenyl und C_3 - C_8 -Alkynyl, gegebenenfalls einfach bis vierfach unabhängig voneinander durch Halogen, C_1 - C_4 -Alkyl, C_1 - C_4 -Halogenalkyl, C_1 - C_4 -Alkoxy und Cyano substituiertes C_3 - C_8 -Cycloalkyl und C_5 - C_8 -Cycloalkenyl, welche gegebenenfalls einfach bis zweifach unabhängig voneinander durch O, $S(O)_n$, CO und NR^4 unterbrochen sein können, gegebenenfalls einfach bis vierfach unabhängig voneinander durch Halogen, C_1 - C_4 -Alkyl, C_1 - C_4 -Halogenalkyl, C_1 - C_4 -Alkoxy und Cyano substituiertes, geradkettiges oder verzweigtes C_3 - C_8 -Cycloalkyl- C_1 - C_4 -alkyl und C_5 - C_8 -Cycloalkenyl- C_1 - C_4 -alkyl, welche gegebenenfalls einfach bis zweifach unabhängig voneinander durch O, $S(O)_n$, CO und NR^4 unterbrochen sein können, gegebenenfalls einfach bis dreifach unabhängig voneinander durch Halogen, C_1 - C_4 -Alkyl, C_1 - C_4 -Halogenalkyl, C_1 - C_4 -Alkoxy, C_1 - C_4 -Alkyl- $S(O)_n$ -, C_1 - C_4 -Halogenalkoxy, C_1 - C_4 -Halogenalkyl- $S(O)_n$ -, Nitro und Cyano substituiertes Aryl und Hetaryl, gegebenenfalls einfach bis dreifach unabhängig voneinander durch Halogen, C_1 - C_4 -Alkyl, C_1 - C_4 -Halogenalkyl, C_1 - C_4 -Alkoxy, C_1 - C_4 -Alkyl- $S(O)_n$ -, C_1 - C_4 -Halogenalkoxy, C_1 - C_4 -Halogenalkyl- $S(O)_n$ -, Nitro und Cyano substituiertes, geradkettiges oder verzweigtes Aryl- C_1 - C_4 -alkyl und Hetaryl- C_1 - C_4 -alkyl steht,

R^{1b} für einen Rest aus der Reihe Wasserstoff, gegebenenfalls unabhängig voneinander einfach bis fünffach durch Halogen und einfach bis zweifach durch C_1 - C_4 -Alkoxy, C_1 - C_4 -Alkyl- $S(O)_n$ -, Cyano, $C(O)N(R^5)(R^6)$, $C(G)R^7$ und $C(O)OR^8$ substituiertes C_1 - C_8 -Alkyl, C_3 - C_8 -Alkenyl und C_3 - C_8 -Alkynyl, gegebenenfalls einfach bis vierfach unabhängig voneinander durch Halogen, C_1 - C_4 -Alkyl, C_1 - C_4 -Halogenalkyl, C_1 - C_4 -Alkoxy und Cyano substituiertes C_3 - C_8 -Cycloalkyl und C_5 - C_8 -Cycloalkenyl, welche gegebenenfalls einfach bis zweifach unabhängig voneinander durch O, $S(O)_n$, CO und NR^4 unterbrochen sein können, gegebenenfalls einfach bis vierfach unabhängig voneinander durch Halogen, C_1 - C_4 -Alkyl, C_1 - C_4 -Halogenalkyl, C_1 - C_4 -Alkoxy und Cyano substituiertes, geradkettiges oder verzweigtes C_3 - C_8 -Cycloalkyl- C_1 - C_4 -alkyl und C_5 - C_8 -Cycloalkenyl- C_1 - C_4 -alkyl, welche

- gegebenenfalls einfach bis zweifach unabhängig voneinander durch O, S(O)_n, CO und NR⁴ unterbrochen sein können, gegebenenfalls einfach bis dreifach unabhängig voneinander durch Halogen, C₁-C₄-Alkyl, C₁-C₄-Halogenalkyl, C₁-C₄-Alkoxy, C₁-C₄-Alkyl-S(O)_n-, C₁-C₄-Halogenalkoxy, C₁-C₄-Halogenalkyl-S(O)_n-, Nitro und Cyano substituiertes Aryl und Hetaryl, gegebenenfalls einfach bis dreifach unabhängig voneinander durch Halogen, C₁-C₄-Alkyl, C₁-C₄-Halogenalkyl, C₁-C₄-Alkoxy, C₁-C₄-Alkyl-S(O)_n-, C₁-C₄-Halogenalkoxy, C₁-C₄-Halogenalkyl-S(O)_n-, Nitro und Cyano substituiertes, geradkettiges oder verzweigtes Aryl-C₁-C₄-alkyl und Hetaryl-C₁-C₄-alkyl steht,
- 5
- G für O, N-CN oder N-OR⁸ steht,
- 10 R² für einen Rest aus der Reihe Wasserstoff, gegebenenfalls unabhängig voneinander einfach bis fünffach durch Halogen und einfach bis zweifach durch C₁-C₄-Alkoxy, C₁-C₄-Alkyl-S(O)_n- und Cyano substituiertes C₁-C₈-Alkyl, C₃-C₈-Alkenyl und C₃-C₈-Alkynyl, gegebenenfalls einfach bis zweifach unabhängig voneinander durch Halogen, C₁-C₄-Alkyl, C₁-C₄-Halogenalkyl, C₁-C₄-Alkoxy und Cyano substituiertes C₃-C₈-Cycloalkyl und C₅-C₈-Cycloalkenyl, welche gegebenenfalls einfach bis zweifach unabhängig voneinander durch O, S(O)_n, CO und NR⁴ unterbrochen sein können, gegebenenfalls einfach bis zweifach unabhängig voneinander durch Halogen, C₁-C₄-Alkyl, C₁-C₄-Halogenalkyl, C₁-C₄-Alkoxy und Cyano substituiertes, geradkettiges oder verzweigtes C₃-C₈-Cycloalkyl-C₁-C₄-alkyl und C₅-C₈-Cycloalkenyl-C₁-C₄-alkyl, welche gegebenenfalls einfach bis zweifach unabhängig voneinander durch O, S(O)_n, CO und NR⁴ unterbrochen sein können, gegebenenfalls einfach bis dreifach unabhängig voneinander durch Halogen, C₁-C₄-Alkyl, C₁-C₄-Halogenalkyl, C₁-C₄-Alkoxy, C₁-C₄-Alkyl-S(O)_n-, C₁-C₄-Halogenalkoxy, C₁-C₄-Halogenalkyl-S(O)_n-, Nitro und Cyano substituiertes Aryl und Hetaryl, gegebenenfalls einfach bis dreifach unabhängig voneinander durch Halogen, C₁-C₄-Alkyl, C₁-C₄-Halogenalkyl, C₁-C₄-Alkoxy, C₁-C₄-Alkyl-S(O)_n-, C₁-C₄-Halogenalkoxy, C₁-C₄-Halogenalkyl-S(O)_n-, Nitro und Cyano substituiertes, geradkettiges oder verzweigtes Aryl-C₁-C₄-alkyl und Hetaryl-C₁-C₄-alkyl steht,
- 15
- 20
- 25
- R³ für einen Rest aus der Reihe Wasserstoff, gegebenenfalls einfach bis dreifach unabhängig voneinander durch Halogen, C₁-C₄-Alkoxy, C₁-C₄-Alkyl-S(O)_n- und Cyano substituiertes C₁-C₈-Alkyl, C₃-C₈-Alkenyl und C₃-C₈-Alkynyl oder für die Reste C(O)N(R⁵)(R⁶), C(O)R⁷, C(O)OR⁸ und SO₂R⁹ steht,
- 30
- oder
- R² und R³ zusammen mit dem Stickstoffatom, an das sie gebunden sind, für einen Heterocyclus der Reihe U-1 bis U-36 stehen,

R⁴

für einen Rest aus der Reihe Wasserstoff, gegebenenfalls einfach bis dreifach unabhängig voneinander durch Halogen, C₁-C₄-Alkoxy und C₁-C₄-Alkyl-S(O)_n-substituiertes C₁-C₈-Alkyl, C₃-C₈-Alkenyl und C₃-C₈-Alkynyl, gegebenenfalls einfach bis zweifach unabhängig voneinander durch Halogen, C₁-C₄-Alkyl, C₁-C₄-Halogenalkyl, C₁-C₄-Alkoxy und Cyano

- substituiertes C₃-C₈-Cycloalkyl und C₃-C₈-Cycloalkyl-C₁-C₄-alkyl, gegebenenfalls einfach bis dreifach unabhängig voneinander durch Halogen, C₁-C₄-Alkyl, C₁-C₄-Halogenalkyl, C₁-C₄-Alkoxy, C₁-C₄-Alkyl-S(O)_n⁻, C₁-C₄-Halogenalkoxy, C₁-C₄-Halogenalkyl-S(O)_n⁻, Nitro und Cyano substituiertes Aryl und Hetaryl, gegebenenfalls einfach bis dreifach unabhängig voneinander durch Halogen, C₁-C₄-Alkyl, C₁-C₄-Halogenalkyl, C₁-C₄-Alkoxy, C₁-C₄-Alkyl-S(O)_n⁻, C₁-C₄-Halogenalkoxy, C₁-C₄-Halogenalkyl-S(O)_n⁻, Nitro und Cyano substituiertes, geradkettiges oder verzweigtes Aryl-C₁-C₄-alkyl und Hetaryl-C₁-C₄-alkyl steht,
- 5
- R⁵ und R⁶ unabhängig voneinander für einen Rest aus der Reihe Wasserstoff, gegebenenfalls unabhängig voneinander einfach bis fünffach durch Halogen und einfach bis zweifach durch C₁-C₄-Alkoxy und C₁-C₄-Alkyl-S(O)_n⁻ substituiertes C₁-C₈-Alkyl, C₃-C₈-Alkenyl und C₃-C₈-Alkynyl, gegebenenfalls einfach bis zweifach unabhängig voneinander durch Halogen, C₁-C₄-Alkyl, C₁-C₄-Halogenalkyl, C₁-C₄-Alkoxy und Cyano substituiertes C₃-C₈-Cycloalkyl, C₃-C₈-Cycloalkenyl und C₃-C₈-Cycloalkyl-C₁-C₄-alkyl, gegebenenfalls einfach bis dreifach unabhängig voneinander durch Halogen, C₁-C₄-Alkyl, C₁-C₄-Halogenalkyl, C₁-C₄-Alkoxy, C₁-C₄-Alkyl-S(O)_n⁻, C₁-C₄-Halogenalkoxy, C₁-C₄-Halogenalkyl-S(O)_n⁻, Nitro und Cyano substituiertes Aryl und Hetaryl, gegebenenfalls einfach bis dreifach unabhängig voneinander durch Halogen, C₁-C₄-Alkyl, C₁-C₄-Halogenalkyl, C₁-C₄-Alkoxy, C₁-C₄-Alkyl-S(O)_n⁻, C₁-C₄-Halogenalkoxy, C₁-C₄-Halogenalkyl-S(O)_n⁻, Nitro und Cyano substituiertes, geradkettiges oder verzweigtes Aryl-C₁-C₄-alkyl und Hetaryl-C₁-C₄-alkyl stehen,
- 10
- 15
- 20
- oder
- R⁵ und R⁶ zusammen mit dem Stickstoffatom, an das sie gebunden sind, für einen drei- bis achtegliedrigen aliphatischen Ring stehen, der gegebenenfalls durch C₁-C₂-Alkyl, C₁-C₂-Haloalkyl und C₁-C₂-Alkoxy substituiert und gegebenenfalls durch O oder S(O)_n unterbrochen sein kann,
- 25
- R⁷ für einen Rest aus der Reihe Wasserstoff, gegebenenfalls unabhängig voneinander einfach bis fünffach durch Halogen und einfach bis zweifach durch C₁-C₄-Alkoxy, C₁-C₄-Alkyl-S(O)_n⁻ und Cyano substituiertes C₁-C₈-Alkyl, C₃-C₈-Alkenyl und C₃-C₈-Alkynyl, gegebenenfalls einfach bis zweifach unabhängig voneinander durch Halogen, C₁-C₄-Alkyl, C₁-C₄-Halogenalkyl, C₁-C₄-Alkoxy und Cyano substituiertes C₃-C₈-Cycloalkyl und C₃-C₈-Cycloalkenyl, welche gegebenenfalls durch O, S(O)_n, CO oder NR⁴ unterbrochen sein können, gegebenenfalls einfach bis zweifach unabhängig voneinander durch Halogen, C₁-C₄-Alkyl, C₁-C₄-Halogenalkyl, C₁-C₄-Alkoxy und Cyano substituiertes, geradkettiges oder verzweigtes C₃-C₈-Cycloalkyl-C₁-C₄-alkyl und C₃-C₈-Cycloalkenyl-C₁-C₄-alkyl, welche
- 30
- 35

gegebenenfalls durch O, S(O)_n, CO oder NR⁴ unterbrochen sein können, gegebenenfalls einfach bis dreifach unabhängig voneinander durch Halogen, C₁-C₄-Alkyl, C₁-C₄-Halogenalkyl, C₁-C₄-Alkoxy, C₁-C₄-Alkyl-S(O)_n-, C₁-C₄-Halogenalkoxy, C₁-C₄-Halogenalkyl-S(O)_n-, Nitro und Cyano substituiertes Aryl und Hetaryl, gegebenenfalls

5 einfach bis dreifach unabhängig voneinander durch Halogen, C₁-C₄-Alkyl, C₁-C₄-Halogenalkyl, C₁-C₄-Alkoxy, C₁-C₄-Alkyl-S(O)_n-, C₁-C₄-Halogenalkoxy, C₁-C₄-Halogenalkyl-S(O)_n-, Nitro und Cyano substituiertes, geradkettiges oder verzweigtes Aryl-C₁-C₄-alkyl und Hetaryl-C₁-C₄-alkyl steht,

R⁸ für einen Rest aus der Reihe Wasserstoff, gegebenenfalls unabhängig voneinander einfach

10 bis fünffach durch Halogen und einfach bis zweifach durch C₁-C₄-Alkoxy, C₁-C₄-Alkyl-S(O)_n- und Cyano substituiertes C₁-C₈-Alkyl, C₃-C₈-Alkenyl und C₃-C₈-Alkynyl, gegebenenfalls einfach bis zweifach unabhängig voneinander durch Halogen, C₁-C₄-Alkyl, C₁-C₄-Halogenalkyl, C₁-C₄-Alkoxy und Cyano substituiertes C₃-C₈-Cycloalkyl und C₅-C₈-Cycloalkenyl, welche gegebenenfalls durch O, S(O)_n, CO, NR⁴ unterbrochen sein können,

15 gegebenenfalls einfach bis zweifach unabhängig voneinander durch Halogen, C₁-C₄-Alkyl, C₁-C₄-Halogenalkyl, C₁-C₄-Alkoxy, Cyano substituiertes, geradkettiges oder verzweigtes C₃-C₈-Cycloalkyl-C₁-C₄-alkyl und C₅-C₈-Cycloalkenyl-C₁-C₄-alkyl, welche gegebenenfalls durch O, S(O)_n, CO, NR⁴ unterbrochen sein können, gegebenenfalls einfach bis dreifach unabhängig voneinander durch Halogen, C₁-C₄-Alkyl, C₁-C₄-Halogenalkyl, C₁-C₄-Alkoxy,

20 C₁-C₄-Alkyl-S(O)_n-, C₁-C₄-Halogenalkoxy, C₁-C₄-Halogenalkyl-S(O)_n-, Nitro und Cyano substituiertes Aryl und Hetaryl, gegebenenfalls einfach bis dreifach unabhängig voneinander durch Halogen, C₁-C₄-Alkyl, C₁-C₄-Halogenalkyl, C₁-C₄-Alkoxy, C₁-C₄-Alkyl-S(O)_n-, C₁-C₄-Halogenalkoxy, C₁-C₄-Halogenalkyl-S(O)_n-, Nitro und Cyano substituiertes, geradkettiges oder verzweigtes Aryl-C₁-C₄-alkyl und Hetaryl-C₁-C₄-alkyl

25 steht,

R⁹ für einen Rest aus der Reihe gegebenenfalls unabhängig voneinander einfach bis fünffach

30 durch Halogen und einfach bis zweifach durch C₁-C₄-Alkoxy, C₁-C₄-Alkyl-S(O)_n- und Cyano substituiertes C₁-C₈-Alkyl, C₃-C₈-Alkenyl und C₃-C₈-Alkynyl, gegebenenfalls einfach bis zweifach unabhängig voneinander durch Halogen, C₁-C₄-Alkyl, C₁-C₄-Halogenalkyl, C₁-C₄-Alkoxy und Cyano substituiertes C₃-C₈-Cycloalkyl und C₅-C₈-Cycloalkenyl, welche gegebenenfalls durch O, S(O)_n, CO, NR⁴ unterbrochen sein können, gegebenenfalls einfach bis zweifach unabhängig voneinander durch Halogen, C₁-C₄-Alkyl, C₁-C₄-Halogenalkyl, C₁-C₄-Alkoxy und Cyano substituiertes, geradkettiges oder verzweigtes C₃-C₈-Cycloalkyl-C₁-C₄-alkyl und C₅-C₈-Cycloalkenyl-C₁-C₄-alkyl, welche

35 gegebenenfalls durch O, S(O)_n, CO, NR⁴ unterbrochen sein können, gegebenenfalls einfach bis dreifach unabhängig voneinander durch Halogen, C₁-C₄-Alkyl, C₁-C₄-Halogenalkyl, C₁-

C₄-Alkoxy, C₁-C₄-Alkyl-S(O)_n-, C₁-C₄-Halogenalkoxy, C₁-C₄-Halogenalkyl-S(O)_n-, Nitro und Cyano substituiertes Aryl und Hetaryl, gegebenenfalls einfach bis dreifach unabhängig voneinander durch Halogen, C₁-C₄-Alkyl, C₁-C₄-Halogenalkyl, C₁-C₄-Alkoxy, C₁-C₄-Alkyl-S(O)_n-, C₁-C₄-Halogenalkoxy, C₁-C₄-Halogenalkyl-S(O)_n-, Nitro und Cyano substituiertes, geradkettiges oder verzweigtes Aryl-C₁-C₄-alkyl und Hetaryl-C₁-C₄-alkyl steht,

X^b für einen Rest aus der Reihe Halogen, Nitro, Cyano, C₁-C₄-Alkyl, C₁-C₄-Halogenalkyl, C₁-C₄-Alkoxy, C₁-C₄-Alkyl-S(O)_n-, C₁-C₄-Halogenalkoxy, C₁-C₄-Halogenalkyl-S(O)_n-, C₁-C₄-Alkoxy-C₁-C₄-alkyl, Cyano-C₁-C₄-alkyl, gegebenenfalls einfach bis vierfach durch Halogen, C₁-C₄-Alkyl, C₁-C₄-Halogenalkyl, C₁-C₄-Alkoxy und C₁-C₄-Alkyl-S(O)_n-substituiertes C₃-C₆-Cycloalkyl und C₃-C₆-Cycloalkyl-C₁-C₄-alkyl, welche gegebenenfalls durch O oder S(O)_n unterbrochen sein können, C₂-C₆-Alkenyl, C₂-C₆-Alkynyl, C₁-C₄-Alkylcarbonyl, C₁-C₄-Halogenalkylcarbonyl, C₁-C₆-Alkoxycarbonyl, C₁-C₆-Alkylaminocarbonyl, Di-(C₁-C₆)-alkylaminocarbonyl, C₁-C₆-Alkylcarbonylamino, Aryl und Hetaryl steht, wobei die Substituenten Aryl und Hetaryl gegebenenfalls einfach oder mehrfach, gleich oder verschieden durch Halogen, Cyano, Nitro, C₁-C₆-Alkyl, C₂-C₆-Alkenyl, C₂-C₆-Alkynyl, C₁-C₄-Alkoxy, C₁-C₄-Halogenalkyl, C₁-C₆-Halogenalkoxy, C₁-C₄-Alkyl-S(O)_n-, C₁-C₄-Halogenalkyl-S(O)_n-, Nitro und Cyano substituiert sein können und wobei die Ring N-Atome in U-13, U-14, U-16, U-28 und U-35 nicht durch Halogen, Nitro, Cyano, C₁-C₄-Alkoxy, C₁-C₄-Halogenalkoxy und C₁-C₄-Alkoxy-C₁-C₄-alkyloxy substituiert sind,

m für eine Zahl 0, 1 oder 2 steht, wobei im Falle von m = 2 die Reste X^b gegebenenfalls unabhängig voneinander sein können,

n für eine Zahl 0, 1 oder 2 steht,

und deren Salze.

Besonders bevorzugte Substituenten bzw. Bereiche der in den Verbindungen der Formel (I) aufgeführten Reste werden im Folgenden erläutert. Ihre Kombination bildet den Vorzugsbereich (2-1).

Q für Sauerstoff oder Schwefel steht,

V für einen Rest aus der Reihe Wasserstoff, Fluor, Chlor, Brom, Methyl, Ethyl, Difluormethyl, Trifluormethyl, Methoxy, Ethoxy, Difluormethoxy, Trifluormethoxy und Cyano steht,

- W für einen Rest aus der Reihe Wasserstoff, Fluor, Chlor, Brom, Methyl, Ethyl, Difluormethyl, Trifluormethyl, Methoxy, Ethoxy, Difluormethoxy, Trifluormethoxy und Cyano steht,
- Y für einen Rest aus der Reihe Wasserstoff, gegebenenfalls einfach bis fünffach unabhängig voneinander durch Fluor, Chlor, Brom, Methoxy, Ethoxy, Methyl-S(O)_n-, Ethyl-S(O)_n und Cyano substituiertes C₁-C₄-Alkyl, C₃-C₄-Alkenyl und C₃-C₄-Alkynyl, gegebenenfalls einfach bis zweifach unabhängig voneinander durch Fluor, Chlor, Brom, Methyl, Ethyl, Trifluormethyl, Methoxy, Ethoxy, Cyano substituiertes C₃-C₆-Cycloalkyl, gegebenenfalls einfach bis zweifach unabhängig voneinander durch O, S(O)_n, NR⁴ unterbrochenes, 5
10 gegebenfalls einfach bis vierfach unabhängig voneinander durch Fluor, Chlor, Brom, Methyl, Ethyl, Trifluormethyl, Methoxy, Ethoxy, Cyano substituiertes, geradkettiges oder verzweigtes C₃-C₆-Cycloalkyl-C₁-C₂-alkyl und Cyano steht,
- A für einen Rest aus der Reihe Wasserstoff, gegebenenfalls einfach bis fünffach unabhängig voneinander durch Fluor, Chlor, Brom, Methoxy, Ethoxy, Methyl-S(O)_n-, Ethyl-S(O)_n- und 15
Cyano substituiertes C₁-C₆-Alkyl, C₃-C₆-Alkenyl und C₃-C₆-Alkynyl, gegebenenfalls einfach bis zweifach unabhängig voneinander durch Fluor, Chlor, Brom, Methyl, Ethyl, Trifluormethyl, Methoxy, Ethoxy, Cyano substituiertes C₃-C₆-Cycloalkyl, gegebenenfalls einfach bis zweifach unabhängig voneinander durch Fluor, Chlor, Brom, Methyl, Ethyl, 20
Trifluormethyl, Methoxy, Ethoxy, Cyano substituiertes, geradkettiges oder verzweigtes C₃-C₆-Cycloalkyl-C₁-C₂-alkyl steht,
- T für Sauerstoff oder ein Elektronenpaar steht,
- L¹ für einen Rest aus der Reihe Wasserstoff, gegebenenfalls unabhängig voneinander einfach bis fünffach durch Fluor, Chlor und Brom und einfach bis dreifach durch Methoxy, Ethoxy, Methyl-S(O)_n-, Ethyl-S(O)_n- und Cyano substituiertes C₁-C₆-Alkyl, C₂-C₆-Alkenyl und C₂- 25
C₆-Alkynyl, gegebenenfalls einfach bis zweifach unabhängig voneinander durch O, S(O)_n, CO und NR⁴ unterbrochenes, gegebenenfalls einfach bis zweifach unabhängig voneinander durch Fluor, Chlor, Brom, Methyl, Ethyl, Trifluormethyl, Methoxy, Ethoxy und Cyano substituiertes C₃-C₆-Cycloalkyl, gegebenenfalls einfach bis zweifach unabhängig voneinander durch O, S(O)_n, CO und NR⁴ unterbrochenes, gegebenenfalls einfach bis 30
zweifach unabhängig voneinander durch Fluor, Chlor, Brom, Methyl, Ethyl, Trifluormethyl, Methoxy, Ethoxy und Cyano substituiertes, geradkettiges oder verzweigtes C₃-C₆-Cycloalkyl-C₁-C₂-alkyl, gegebenenfalls einfach bis zweifach unabhängig voneinander durch Fluor, Chlor, Brom, Methyl, Ethyl, Difluormethyl, Trifluormethyl, Methoxy, Ethoxy, Methyl-S(O)_n-, Ethyl-S(O)_n-, Difluormethoxy, Trifluormethoxy, 35
Trifluormethyl-S(O)_n-, Difluorethyl-S(O)_n-, Trifluorethyl-S(O)_n-, Nitro und Cyano

- substituiertes Phenyl, Naphthyl, Pyridyl, Pyrimidyl, Pyridazinyl, Pyrazinyl, Triazinyl, Furanyl, Thienyl, Oxazolyl, Isoxazolyl, Thiazolyl, Isothiazolyl, Pyrazolyl, Imidazolyl, Ox Diazolyl und Thiadiazolyl, gegebenenfalls einfach bis zweifach unabhängig voneinander durch Fluor, Chlor, Brom, Methyl, Ethyl, Difluormethyl, Trifluormethyl, Methoxy, Ethoxy, Methyl-S(O)_n-, Ethyl-S(O)_n-, Difluormethoxy, Trifluormethoxy, Trifluormethyl-S(O)_n-, Difluorethyl-S(O)_n-, Trifluorethyl-S(O)_n-, Nitro und Cyano substituiertes, geradkettiges oder verzweigtes Phenyl-C₁-C₂-alkyl, Pyridyl-C₁-C₂-alkyl, Pyrimidyl-C₁-C₂-alkyl, Thiazolyl-C₁-C₂-alkyl und Pyrazolyl-C₁-C₂-alkyl steht,
- 5
- L² für einen Rest aus der Reihe Wasserstoff, gegebenenfalls unabhängig voneinander einfach bis fünffach durch Fluor, Chlor und Brom und einfach bis zweifach durch Methoxy, Ethoxy, Methyl-S(O)_n-, Ethyl-S(O)_n- und Cyano substituiertes C₁-C₄-Alkyl steht,
- 10
- oder
- L¹ und L² zusammen mit dem Kohlenstoffatom, an das sie gebunden sind, für einfach bis dreifach unabhängig voneinander durch Fluor, Chlor, Brom, Methyl-S(O)_n-, Ethyl-S(O)_n- und Cyano substituiertes C₃-C₈-Cycloalkyl stehen,
- 15
- oder
- L¹ und L² zusammen für einfach bis dreifach unabhängig voneinander durch Fluor, Chlor, Brom, Methyl-S(O)_n-, Ethyl-S(O)_n- und Cyano substituiertes C₂-C₆-Alkenyl stehen,
- L³ für einen Rest aus der Reihe Wasserstoff, S(O)_nR^{1a}, OR^{1b} und N(R²)(R³) steht,
- 20
- R^{1a} für einen Rest aus der Reihe gegebenenfalls unabhängig voneinander einfach bis fünffach durch Fluor, Chlor und Brom und einfach bis zweifach durch Methoxy, Ethoxy, Methyl-S(O)_n-, Ethyl-S(O)_n-, Cyano, C(O)N(R⁵)(R⁶), C(G)R⁷ und C(O)OR⁸ substituiertes C₁-C₆-Alkyl, C₃-C₆-Alkenyl und C₃-C₆-Alkynyl, gegebenenfalls einfach bis zweifach unabhängig voneinander durch O, S(O)_n, CO und NR⁴ unterbrochenes, gegebenenfalls einfach bis zweifach unabhängig voneinander durch Fluor, Chlor, Brom, Methyl, Ethyl, Trifluormethyl, Methoxy, Ethoxy und Cyano substituiertes C₃-C₆-Cycloalkyl, gegebenenfalls einfach bis zweifach unabhängig voneinander durch O, S(O)_n, CO und NR⁴ unterbrochenes, gegebenenfalls einfach bis zweifach unabhängig voneinander durch Fluor, Chlor, Brom, Methyl, Ethyl, Trifluormethyl, Methoxy, Ethoxy und Cyano substituiertes, geradkettiges oder verzweigtes C₃-C₆-Cycloalkyl-C₁-C₂-alkyl, gegebenenfalls einfach bis zweifach unabhängig voneinander durch Fluor, Chlor, Brom, Methyl, Ethyl, Difluormethyl, Trifluormethyl, Methoxy, Ethoxy, Methyl-S(O)_n-, Ethyl-S(O)_n-, Difluormethoxy, Trifluormethoxy, Trifluormethyl-S(O)_n-, Difluorethyl-S(O)_n-, Trifluorethyl-S(O)_n-, Nitro
- 25
- 30

und Cyano substituiertes Phenyl, Naphthyl, Pyridyl, Pyrimidyl, Pyridazinyl, Pyrazinyl, Triazinyl, Furanyl, Thienyl, Oxazolyl, Isoxazolyl, Thiazolyl, Isothiazolyl, Pyrazolyl, Imidazolyl, Oxdiazolyl und Thiadiazolyl, gegebenenfalls einfach bis zweifach unabhängig voneinander durch Fluor, Chlor, Brom, Methyl, Ethyl, Difluormethyl, Trifluormethyl, Methoxy, Ethoxy, Methyl-S(O)_n-, Ethyl-S(O)_n-, Difluormethoxy, Trifluormethoxy, Trifluormethyl-S(O)_n-, Difluorethyl-S(O)_n-, Trifluorethyl-S(O)_n-, Nitro und Cyano substituiertes, geradkettiges oder verzweigtes Phenyl-C₁-C₂-alkyl, Pyridyl-C₁-C₂-alkyl, Pyrimidyl-C₁-C₂-alkyl, Thiazolyl-C₁-C₂-alkyl und Pyrazolyl-C₁-C₂-alkyl steht,

R^{1b} für einen Rest aus der Reihe Wasserstoff, gegebenenfalls unabhängig voneinander einfach bis fünffach durch Fluor, Chlor und Brom und einfach bis zweifach durch Methoxy, Ethoxy, Methyl-S(O)_n-, Ethyl-S(O)_n-, Cyano, C(O)N(R⁵)(R⁶), C(G)R⁷ und C(O)OR⁸ substituiertes C₁-C₆-Alkyl, C₃-C₆-Alkenyl und C₃-C₆-Alkynyl, gegebenenfalls einfach bis zweifach unabhängig voneinander durch O, S(O)_n, CO und NR⁴ unterbrochenes, gegebenenfalls einfach bis zweifach unabhängig voneinander durch Fluor, Chlor, Brom, Methyl, Ethyl, Trifluormethyl, Methoxy, Ethoxy und Cyano substituiertes C₃-C₆-Cycloalkyl, gegebenenfalls einfach bis zweifach unabhängig voneinander durch O, S(O)_n, CO und NR⁴ unterbrochenes, gegebenenfalls einfach bis zweifach unabhängig voneinander durch Fluor, Chlor, Brom, Methyl, Ethyl, Trifluormethyl, Methoxy, Ethoxy und Cyano substituiertes, geradkettiges oder verzweigtes C₃-C₆-Cycloalkyl-C₁-C₂-alkyl, gegebenenfalls einfach bis zweifach unabhängig voneinander durch Fluor, Chlor, Brom, Methyl, Ethyl, Difluormethyl, Trifluormethyl, Methoxy, Ethoxy, Methyl-S(O)_n-, Ethyl-S(O)_n-, Difluormethoxy, Trifluormethoxy, Trifluormethyl-S(O)_n-, Difluorethyl-S(O)_n-, Trifluorethyl-S(O)_n-, Nitro und Cyano substituiertes Phenyl, Naphthyl, Pyridyl, Pyrimidyl, Pyridazinyl, Pyrazinyl, Triazinyl, Furanyl, Thienyl, Oxazolyl, Isoxazolyl, Thiazolyl, Isothiazolyl, Pyrazolyl, Imidazolyl, Oxdiazolyl und Thiadiazolyl, gegebenenfalls einfach bis zweifach unabhängig voneinander durch Fluor, Chlor, Brom, Methyl, Ethyl, Difluormethyl, Trifluormethyl, Methoxy, Ethoxy, Methyl-S(O)_n-, Ethyl-S(O)_n-, Difluormethoxy, Trifluormethoxy, Trifluormethyl-S(O)_n-, Difluorethyl-S(O)_n-, Trifluorethyl-S(O)_n-, Nitro und Cyano substituiertes, geradkettiges oder verzweigtes Phenyl-C₁-C₂-alkyl, Pyridyl-C₁-C₂-alkyl, Pyrimidyl-C₁-C₂-alkyl, Thiazolyl-C₁-C₂-alkyl und Pyrazolyl-C₁-C₂-alkyl steht,

G für O oder N-OR⁸ steht,

R² für einen Rest aus der Reihe Wasserstoff, gegebenenfalls unabhängig voneinander einfach bis fünffach durch Fluor, Chlor und Brom und einfach bis zweifach durch Methoxy, Ethoxy, Methyl-S(O)_n-, Ethyl-S(O)_n- und Cyano substituiertes C₁-C₆-Alkyl, C₃-C₆-Alkenyl und C₃-C₆-Alkynyl, gegebenenfalls einfach bis zweifach unabhängig voneinander durch O,

- 5 S(O)_n, CO und NR⁴ unterbrochenes, gegebenenfalls einfach bis zweifach unabhängig voneinander durch Fluor, Chlor, Brom, Methyl, Ethyl, Trifluormethyl, Methoxy, Ethoxy und Cyano substituiertes C₃-C₆-Cycloalkyl, gegebenenfalls einfach bis zweifach unabhängig voneinander durch O, S(O)_n, CO und NR⁴ unterbrochenes, gegebenenfalls
- 10 einfach bis zweifach unabhängig voneinander durch Fluor, Chlor, Brom, Methyl, Ethyl, Trifluormethyl, Methoxy, Ethoxy und Cyano substituiertes, geradkettiges oder verzweigtes C₃-C₆-Cycloalkyl-C₁-C₂-alkyl, gegebenenfalls einfach bis zweifach unabhängig voneinander durch Fluor, Chlor, Brom, Methyl, Ethyl, Difluormethyl, Trifluormethyl, Methoxy, Ethoxy, Methyl-S(O)_n-, Ethyl-S(O)_n-, Difluormethoxy, Trifluormethoxy, Trifluormethyl-S(O)_n-, Difluorethyl-S(O)_n-, Trifluorethyl-S(O)_n-, Nitro und Cyano substituiertes Phenyl, Naphthyl, Pyridyl, Pyrimidyl, Pyridazinyl, Pyrazinyl, Triazinyl, Furanyl, Thienyl, Oxazolyl, Isoxazolyl, Thiazolyl, Isothiazolyl, Pyrazolyl, Imidazolyl, Oxidiazolyl und Thiadiazolyl, gegebenenfalls einfach bis zweifach unabhängig voneinander durch Fluor, Chlor, Brom, Methyl, Ethyl, Difluormethyl, Trifluormethyl, Methoxy, Ethoxy, Methyl-S(O)_n-, Ethyl-S(O)_n-, Difluormethoxy, Trifluormethoxy, Trifluormethyl-S(O)_n-, Difluorethyl-S(O)_n-, Trifluorethyl-S(O)_n-, Nitro und Cyano substituiertes, geradkettiges oder verzweigtes Phenyl-C₁-C₂-alkyl, Pyridyl-C₁-C₂-alkyl, Pyrimidyl-C₁-C₂-alkyl, Thiazolyl-C₁-C₂-alkyl und Pyrazolyl-C₁-C₂-alkyl steht,
- 15
- 20 R³ für einen Rest aus der Reihe Wasserstoff, gegebenenfalls einfach bis dreifach unabhängig voneinander durch Fluor, Chlor, Brom, Methoxy, Ethoxy, Methyl-S(O)_n-, Ethyl-S(O)_n- und Cyano substituiertes C₁-C₆-Alkyl, C₃-C₆-Alkenyl und C₃-C₆-Alkynyl oder für die Reste, C(O)N(R⁵)(R⁶), C(O)R⁷, C(O)OR⁸ und SO₂R⁹ steht,
- oder
- 25 R² und R³ zusammen mit N für einen Heterocyclus der Reihe U-1, U-2, U-3, U-4, U-5, U-6, U-7, U-10, U-13, U-14, U-24, U-25, U-26, U-27, U-29, U-30, U-31, U-32, U-33, U-34, U-35 und U-36 stehen,
- 30 R⁴ für einen Rest aus der Reihe Wasserstoff, gegebenenfalls einfach bis dreifach unabhängig voneinander durch Fluor, Chlor, Brom, Methoxy, Ethoxy, Methyl-S(O)_n-, Ethyl-S(O)_n- und Cyano substituiertes C₁-C₆-Alkyl, C₃-C₆-Alkenyl und C₃-C₆-Alkynyl, gegebenenfalls einfach bis zweifach unabhängig voneinander durch Fluor, Chlor, Brom, Methyl, Ethyl, Trifluormethyl, Methoxy, Ethoxy und Cyano substituiertes C₃-C₆-Cycloalkyl, gegebenenfalls einfach bis zweifach unabhängig voneinander durch Fluor, Chlor, Brom, Methyl, Ethyl, Trifluormethyl, Methoxy, Ethoxy und Cyano substituiertes, geradkettiges oder verzweigtes C₃-C₆-Cycloalkyl-C₁-C₂-alkyl, gegebenenfalls einfach bis zweifach unabhängig voneinander durch Fluor, Chlor, Brom, Methyl, Ethyl, Difluormethyl,
- 35

Trifluormethyl, Methoxy, Ethoxy, Methyl-S(O)_n-, Ethyl-S(O)_n-, Difluormethoxy, Trifluormethoxy, Trifluormethyl-S(O)_n-, Difluorethyl-S(O)_n-, Trifluorethyl-S(O)_n-, Nitro und Cyano substituiertes Phenyl, Naphthyl, Pyridyl, Pyrimidyl, Pyridazinyl, Pyrazinyl, Triazinyl, Furanyl, Thienyl, Oxazolyl, Isoxazolyl, Thiazolyl, Isothiazolyl, Pyrazolyl, Imidazolyl, Oxdiazolyl und Thiadiazolyl, gegebenenfalls einfach bis zweifach unabhängig voneinander durch Fluor, Chlor, Brom, Methyl, Ethyl, Difluormethyl, Trifluormethyl, Methoxy, Ethoxy, Methyl-S(O)_n-, Ethyl-S(O)_n-, Difluormethoxy, Trifluormethoxy, Trifluormethyl-S(O)_n-, Difluorethyl-S(O)_n-, Trifluorethyl-S(O)_n-, Nitro und Cyano substituiertes, geradkettiges oder verzweigtes Phenyl-C₁-C₂-alkyl, Pyridyl-C₁-C₂-alkyl, Pyrimidyl-C₁-C₂-alkyl, Thiazolyl-C₁-C₂-alkyl und Pyrazolyl-C₁-C₂-alkyl steht,

R⁵ und R⁶ unabhängig voneinander für einen Rest aus der Reihe Wasserstoff, gegebenenfalls unabhängig voneinander einfach bis fünffach durch Fluor, Chlor und Brom und einfach bis zweifach durch Methoxy, Ethoxy, Methyl-S(O)_n-, Ethyl-S(O)_n- und Cyano substituiertes C₁-C₆-Alkyl, C₃-C₆-Alkenyl und C₃-C₆-Alkynyl, gegebenenfalls einfach bis zweifach unabhängig voneinander durch Fluor, Chlor, Brom, Methyl, Ethyl, Trifluormethyl, Methoxy, Ethoxy und Cyano substituiertes C₃-C₆-Cycloalkyl, gegebenenfalls einfach bis zweifach unabhängig voneinander durch Fluor, Chlor, Brom, Methyl, Ethyl, Trifluormethyl, Methoxy, Ethoxy und Cyano substituiertes, geradkettiges oder verzweigtes C₃-C₆-Cycloalkyl-C₁-C₂-alkyl, gegebenenfalls einfach bis zweifach unabhängig voneinander durch Fluor, Chlor, Brom, Methyl, Ethyl, Difluormethyl, Trifluormethyl, Methoxy, Ethoxy, Methyl-S(O)_n-, Ethyl-S(O)_n-, Difluormethoxy, Trifluormethoxy, Trifluormethyl-S(O)_n-, Difluorethyl-S(O)_n-, Trifluorethyl-S(O)_n-, Nitro und Cyano substituiertes Phenyl, Naphthyl, Pyridyl, Pyrimidyl, Pyridazinyl, Pyrazinyl, Triazinyl, Furanyl, Thienyl, Oxazolyl, Isoxazolyl, Thiazolyl, Isothiazolyl, Pyrazolyl, Imidazolyl, Oxdiazolyl und Thiadiazolyl, gegebenenfalls einfach bis zweifach unabhängig voneinander durch Fluor, Chlor, Brom, Methyl, Ethyl, Difluormethyl, Trifluormethyl, Methoxy, Ethoxy, Methyl-S(O)_n-, Ethyl-S(O)_n-, Difluormethoxy, Trifluormethoxy, Trifluormethyl-S(O)_n-, Difluorethyl-S(O)_n-, Trifluorethyl-S(O)_n-, Nitro und Cyano substituiertes, geradkettiges oder verzweigtes Phenyl-C₁-C₂-alkyl, Pyridyl-C₁-C₂-alkyl, Pyrimidyl-C₁-C₂-alkyl, Thiazolyl-C₁-C₂-alkyl und Pyrazolyl-C₁-C₂-alkyl stehen,

oder


R⁵ und R⁶ zusammen mit dem Stickstoffatom, an das sie gebunden sind, für einen drei- bis sechsgliedrigen aliphatischen Ring stehen, der gegebenenfalls durch C₁-C₂-Alkyl, C₁-C₂-Haloalkyl und C₁-C₂-Alkoxy substituiert und gegebenenfalls durch O oder S(O)_n unterbrochen sein kann,

- R⁷ für einen Rest aus der Reihe Wasserstoff, gegebenenfalls unabhängig voneinander einfach bis fünffach durch Fluor, Chlor und Brom und einfach bis zweifach durch Methoxy, Ethoxy, Methyl-S(O)_n-, Ethyl-S(O)_n- und Cyano substituiertes C₁-C₆-Alkyl, C₃-C₆-Alkenyl und C₃-C₆-Alkynyl, gegebenenfalls einfach bis zweifach unabhängig voneinander durch Fluor, Chlor, Brom, Methyl, Ethyl, Trifluormethyl, Methoxy, Ethoxy und Cyano substituiertes C₃-C₆-Cycloalkyl, gegebenenfalls einfach bis zweifach unabhängig voneinander durch Fluor, Chlor, Brom, Methyl, Ethyl, Trifluormethyl, Methoxy, Ethoxy und Cyano substituiertes, geradkettiges oder verzweigtes C₃-C₆-Cycloalkyl-C₁-C₂-alkyl, gegebenenfalls einfach bis zweifach unabhängig voneinander durch Fluor, Chlor, Brom, Methyl, Ethyl, Difluormethyl, Trifluormethyl, Methoxy, Ethoxy, Methyl-S(O)_n-, Ethyl-S(O)_n-, Difluormethoxy, Trifluormethoxy, Trifluormethyl-S(O)_n-, Difluorethyl-S(O)_n-, Trifluorethyl-S(O)_n-, Nitro und Cyano substituiertes Phenyl, Naphthyl, Pyridyl, Pyrimidyl, Pyridaziny, Pyraziny, Triaziny, Furanyl, Thienyl, Oxazolyl, Isoxazolyl, Thiazolyl, Isothiazolyl, Pyrazolyl, Imidazolyl, Oxdiazolyl und Thiadiazolyl, gegebenenfalls einfach bis zweifach unabhängig voneinander durch Fluor, Chlor, Brom, Methyl, Ethyl, Difluormethyl, Trifluormethyl, Methoxy, Ethoxy, Methyl-S(O)_n-, Ethyl-S(O)_n-, Difluormethoxy, Trifluormethoxy, Trifluormethyl-S(O)_n-, Difluorethyl-S(O)_n-, Trifluorethyl-S(O)_n-, Nitro und Cyano substituiertes, geradkettiges oder verzweigtes Phenyl-C₁-C₂-alkyl, Pyridyl-C₁-C₂-alkyl, Pyrimidyl-C₁-C₂-alkyl, Thiazolyl-C₁-C₂-alkyl und Pyrazolyl-C₁-C₂-alkyl steht,
- R⁸ für einen Rest aus der Reihe Wasserstoff, gegebenenfalls unabhängig voneinander einfach bis fünffach durch Fluor, Chlor und Brom und einfach bis zweifach durch Methoxy, Ethoxy, Methyl-S(O)_n-, Ethyl-S(O)_n- und Cyano substituiertes C₁-C₆-Alkyl, C₃-C₆-Alkenyl und C₃-C₆-Alkynyl, gegebenenfalls einfach bis zweifach unabhängig voneinander durch Fluor, Chlor, Brom, Methyl, Ethyl, Trifluormethyl, Methoxy, Ethoxy und Cyano substituiertes C₃-C₆-Cycloalkyl, gegebenenfalls einfach bis zweifach unabhängig voneinander durch Fluor, Chlor, Brom, Methyl, Ethyl, Trifluormethyl, Methoxy, Ethoxy und Cyano substituiertes, geradkettiges oder verzweigtes C₃-C₆-Cycloalkyl-C₁-C₂-alkyl, gegebenenfalls einfach bis zweifach unabhängig voneinander durch Fluor, Chlor, Brom, Methyl, Ethyl, Difluormethyl, Trifluormethyl, Methoxy, Ethoxy, Methyl-S(O)_n-, Ethyl-S(O)_n-, Difluormethoxy, Trifluormethoxy, Trifluormethyl-S(O)_n-, Difluorethyl-S(O)_n-, Trifluorethyl-S(O)_n-, Nitro und Cyano substituiertes Phenyl, Naphthyl, Pyridyl, Pyrimidyl, Pyridaziny, Pyraziny, Triaziny, Furanyl, Thienyl, Oxazolyl, Isoxazolyl, Thiazolyl, Isothiazolyl, Pyrazolyl, Imidazolyl, Oxdiazolyl und Thiadiazolyl, gegebenenfalls einfach bis zweifach unabhängig voneinander durch Fluor, Chlor, Brom, Methyl, Ethyl, Difluormethyl, Trifluormethyl, Methoxy, Ethoxy, Methyl-S(O)_n-, Ethyl-S(O)_n-, Difluormethoxy, Trifluormethoxy, Trifluormethyl-S(O)_n-, Difluorethyl-S(O)_n-,

Trifluorethyl-S(O)_n-, Nitro und Cyano substituiertes, geradkettiges oder verzweigtes Phenyl-C₁-C₂-alkyl, Pyridyl-C₁-C₂-alkyl, Pyrimidyl-C₁-C₂-alkyl, Thiazolyl-C₁-C₂-alkyl und Pyrazolyl-C₁-C₂-alkyl steht,

- 5 X^b für einen Rest aus der Reihe Halogen, Nitro, Cyano, C₁-C₄-Alkyl, C₃-C₆-Cycloalkyl, C₁-C₂-Halogenalkyl, C₁-C₄-Alkoxy, C₁-C₄-Alkyl-S(O)_n-, C₁-C₄-Halogenalkoxy, C₁-C₄-Halogenalkyl-S(O)_n-, C₃-C₆-Halogencycloalkyl, C₁-C₄-Alkoxy-C₁-C₄-alkyl, C₁-C₄-Alkoxycarbonyl, C₁-C₄-Alkylaminocarbonyl, C₁-C₆-Alkylsulfonyl, C₁-C₆-Alkylcarbonylamino und Phenyl steht, das gegebenenfalls einfach bis dreifach durch Fluor, Chlor, Brom, Methyl, Ethyl, Difluormethyl, Trifluormethyl, Methoxy, Ethoxy, Methyl-
- 10 S(O)_n-, Ethyl-S(O)_n-, Difluormethoxy, Trifluormethoxy, Trifluormethyl-S(O)_n-, Difluorethyl-S(O)_n-, Trifluorethyl-S(O)_n-, Nitro und Cyano substituiert sein kann,
- m für eine Zahl 0, 1 oder 2 steht, wobei im Falle von $m = 2$ die Reste X^b gegebenenfalls unabhängig voneinander sein können,
- n für eine Zahl 0, 1 oder 2 steht,
- 15 und deren Salze.

Ganz besonders bevorzugte Substituenten bzw. Bereiche der in den Verbindungen der Formel (I) aufgeführten Reste werden im Folgenden erläutert. Unter Berücksichtigung der Position der Carboxamidgruppe am Imidazolrest ergibt sich die ganz besonders bevorzugte Struktur (I-1). Ihre Kombination bildet den Vorzugsbereich (3-1).



(I-1)

- V für einen Rest aus der Reihe Wasserstoff, Fluor, Chlor, Methyl und Cyano steht,
- W für einen Rest aus der Reihe Wasserstoff, Fluor, Chlor, Brom, Methyl, Ethyl und Cyano steht,

- Y für einen Rest aus der Reihe Wasserstoff, gegebenenfalls einfach bis dreifach unabhängig voneinander durch Fluor, Methoxy, Ethoxy und Cyano substituiertes Methyl, Ethyl, Propyl, Allyl und Propargyl steht,
- A für einen Rest aus der Reihe Wasserstoff, gegebenenfalls einfach bis dreifach unabhängig voneinander durch Fluor, Methoxy, Ethoxy und Cyano substituiertes Methyl, Ethyl, Propyl, Allyl, Propargyl, Cyclopropyl und Cyclopropylmethyl steht,
- 5 T für ein Elektronenpaar steht,
- L¹ für einen Rest aus der Reihe Wasserstoff, gegebenenfalls einfach bis dreifach unabhängig voneinander durch Fluor, Chlor und Brom und einfach durch Methoxy, Ethoxy, 10 Methylsulfanyl, Ethylsulfanyl, Methylsulfinyl, Ethylsulfinyl, Methylsulfonyl, Ethylsulfonyl oder Cyano substituiertes Methyl, Ethyl, Propyl, Isopropyl, n-Butyl, Isobutyl, sec-Butyl, tert-Butyl, Pentyl, Isopentyl, 2,2-Dimethyl-propyl, Hexyl, neo-Hexyl, Vinyl, Allyl, Methallyl, 2-Butenyl, Propargyl, Ethinyl und 2-Butinyl, gegebenenfalls einfach bis zweifach unabhängig voneinander durch Fluor, Chlor, Methyl, Ethyl, Trifluormethyl, 15 Methoxy und Cyano substituiertes Cyclopropyl, Cyclobutyl, Cyclopentyl und Cyclohexyl, gegebenenfalls einfach bis zweifach unabhängig voneinander durch Fluor, Chlor, Methyl, Ethyl, Trifluormethyl, Methoxy und Cyano substituiertes Cyclopropylmethyl, Cyclobutylmethyl, Cyclopentylmethyl und Cyclohexylmethyl, gegebenenfalls einfach bis zweifach unabhängig voneinander durch Fluor, Chlor, Brom, Methyl, Ethyl, Difluormethyl, 20 Trifluormethyl, Methoxy, Ethoxy, Methylsulfanyl, Ethylsulfanyl, Methylsulfinyl, Ethylsulfinyl, Methylsulfonyl, Ethylsulfonyl, Difluormethoxy, Trifluormethoxy, Trifluormethylsulfanyl, Trifluormethylsulfinyl, Trifluormethylsulfonyl, Difluormethylsulfanyl, Difluormethylsulfinyl, Difluormethylsulfonyl, Trifluorethylsulfanyl, Trifluorethylsulfinyl Trifluorethylsulfonyl, Nitro und Cyano 25 substituiertes Phenyl, Pyridyl, Pyrimidyl, Thienyl und Thiazolyl, gegebenenfalls einfach bis zweifach unabhängig voneinander durch Fluor, Chlor, Brom, Methyl, Ethyl, Difluormethyl, Trifluormethyl, Methoxy, Ethoxy, Methylsulfanyl, Ethylsulfanyl, Methylsulfinyl, Ethylsulfinyl, Methylsulfonyl, Ethylsulfonyl, Difluormethoxy, Trifluormethoxy, Trifluormethylsulfanyl, Trifluormethylsulfinyl, Trifluormethylsulfonyl, 30 Difluormethylsulfanyl, Difluormethylsulfinyl, Difluormethylsulfonyl, Trifluorethylsulfanyl, Trifluorethylsulfinyl Trifluorethylsulfonyl, Nitro und Cyano substituiertes Benzyl, Pyridylmethyl, Pyrimidylmethyl, Thiazolylmethyl und Pyrazolylmethyl steht,

- L² für einen Rest aus der Reihe Wasserstoff, gegebenenfalls einfach bis dreifach unabhängig voneinander durch Fluor, Methoxy, Ethoxy und Cyano substituiertes Methyl, Ethyl und Propyl steht,
- oder
- 5 L¹ und L² zusammen mit dem Kohlenstoffatom, an das sie gebunden sind, für einfach bis dreifach unabhängig voneinander durch Fluor, Chlor, Brom, Methyl-S(O)_n-, Ethyl-S(O)_n- und Cyano substituiertes Cyclopropyl, Cyclobutyl, Cyclopentyl oder Cyclohexyl stehen,
- oder
- 10 L¹ und L² zusammen für einfach bis dreifach unabhängig voneinander durch Fluor, Chlor, Brom, Methyl-S(O)_n-, Ethyl-S(O)_n- und Cyano substituiertes Ethenyl, Propenyl oder Butenyl stehen,
- L³ für einen Rest aus der Reihe Wasserstoff, S(O)_nR^{1a}, OR^{1b} und N(R²)(R³) steht,
- R^{1a} für einen Rest aus der Reihe gegebenenfalls einfach bis fünffach unabhängig voneinander durch Fluor, Chlor und Brom, und einfach durch Methoxy, Ethoxy, Methylsulfanyl, Ethylsulfanyl, Methylsulfinyl, Ethylsulfinyl, Methylsulfonyl, Ethylsulfonyl, Cyano, C(O)N(R⁵)(R⁶) oder C(O)OR⁸ substituiertes Methyl, Ethyl, Propyl, Isopropyl, n-Butyl, Isobutyl, sec-Butyl, tert-Butyl, Pentyl, Isopentyl, 2,2-Dimethyl-propyl, Hexyl, neo-Hexyl, Allyl, Methallyl, 2-Butenyl, Propargyl und 2-Butinyl, gegebenenfalls einfach bis zweifach unabhängig voneinander durch Fluor, Chlor, Methyl, Ethyl, Trifluormethyl, Methoxy und Cyano substituiertes Cyclopropyl, Cyclobutyl, Cyclopentyl und Cyclohexyl, gegebenenfalls einfach bis zweifach unabhängig voneinander durch Fluor, Chlor, Methyl, Ethyl, Trifluormethyl, Methoxy und Cyano substituiertes Tetrahydrofuranyl, Tetrahydropyranyl, Pyrrolidyl, N-Methylpyrrolidyl, Piperidyl und N-Methylpiperidyl, gegebenenfalls einfach bis zweifach unabhängig voneinander durch Fluor, Chlor, Methyl, Ethyl, Trifluormethyl, Methoxy und Cyano substituiertes Cyclopropylmethyl, Cyclobutylmethyl, Cyclopentylmethyl und Cyclohexylmethyl, gegebenenfalls einfach bis zweifach unabhängig voneinander durch Fluor, Chlor, Brom, Methyl, Ethyl, Difluormethyl, Trifluormethyl, Methoxy, Ethoxy, Methylsulfanyl, Ethylsulfanyl, Methylsulfinyl, Ethylsulfinyl, Methylsulfonyl, Ethylsulfonyl, Difluormethoxy, Trifluormethoxy, Trifluormethylsulfanyl, Trifluormethylsulfinyl, Trifluormethylsulfonyl, Difluormethylsulfanyl, Difluormethylsulfinyl, Difluormethylsulfonyl, Trifluorethylsulfanyl, Trifluorethylsulfinyl, Trifluorethylsulfonyl, Nitro und Cyano substituiertes Phenyl, Pyridyl, Pyrimidyl, Thienyl und Thiazolyl, gegebenenfalls einfach bis zweifach unabhängig voneinander durch Fluor, Chlor, Brom, Methyl, Ethyl, Difluormethyl,

Trifluormethyl, Methoxy, Ethoxy, Methylsulfanyl, Ethylsulfanyl, Methylsulfinyl, Ethylsulfinyl, Methylsulfonyl, Ethylsulfonyl, Difluormethoxy, Trifluormethoxy, Trifluormethylsulfanyl, Trifluormethylsulfinyl, Trifluormethylsulfonyl, Difluormethylsulfanyl, Difluormethylsulfinyl, Difluormethylsulfonyl, Trifluorethylsulfanyl, Trifluorethylsulfinyl, Trifluorethylsulfonyl, Nitro und Cyano substituiertes Benzyl, Pyridylmethyl, Pyrimidylmethyl, Thiazolylmethyl und Pyrazolyl-methyl steht,

R^{1b}

für einen Rest aus der Reihe Wasserstoff, gegebenenfalls einfach bis fünffach unabhängig voneinander durch Fluor, Chlor, Brom oder einfach durch Methoxy, Ethoxy, Methylsulfanyl, Ethylsulfanyl, Methylsulfinyl, Ethylsulfinyl, Methylsulfonyl, Ethylsulfonyl, Cyano, C(O)N(R⁵)(R⁶) oder C(O)OR⁸ substituiertes Methyl, Ethyl, Propyl, Isopropyl, n-Butyl, Isobutyl, sec-Butyl, tert-Butyl, Pentyl, Isopentyl, 2,2-Dimethyl-propyl, Hexyl, neo-Hexyl, Allyl, Methallyl, 2-Butenyl, Propargyl und 2-Butinyl, gegebenenfalls einfach bis zweifach unabhängig voneinander durch Fluor, Chlor, Methyl, Ethyl, Trifluormethyl, Methoxy und Cyano substituiertes Cyclopropyl, Cyclobutyl, Cyclopentyl und Cyclohexyl, gegebenenfalls einfach bis zweifach unabhängig voneinander durch Fluor, Chlor, Methyl, Ethyl, Trifluormethyl, Methoxy und Cyano substituiertes Tetrahydrofuranyl, Tetrahydropyranyl, Pyrrolidyl, N-Methylpyrrolidyl, Piperidyl und N-Methylpiperidyl, gegebenenfalls einfach bis zweifach unabhängig voneinander durch Fluor, Chlor, Methyl, Ethyl, Trifluormethyl, Methoxy und Cyano substituiertes Cyclopropylmethyl, Cyclobutylmethyl, Cyclopentylmethyl und Cyclohexylmethyl, gegebenenfalls einfach bis zweifach unabhängig voneinander durch Fluor, Chlor, Brom, Methyl, Ethyl, Difluormethyl, Trifluormethyl, Methoxy, Ethoxy, Methylsulfanyl, Ethylsulfanyl, Methylsulfinyl, Ethylsulfinyl, Methylsulfonyl, Ethylsulfonyl, Difluormethoxy, Trifluormethoxy, Trifluormethylsulfanyl, Trifluormethylsulfinyl, Trifluormethylsulfonyl, Difluormethylsulfanyl, Difluormethylsulfinyl, Difluormethylsulfonyl, Trifluorethylsulfanyl, Trifluorethylsulfinyl, Trifluorethylsulfonyl, Nitro und Cyano substituiertes Phenyl, Pyridyl, Pyrimidyl, Thienyl und Thiazolyl, gegebenenfalls einfach bis zweifach unabhängig voneinander durch Fluor, Chlor, Brom, Methyl, Ethyl, Difluormethyl, Trifluormethyl, Methoxy, Ethoxy, Methylsulfanyl, Ethylsulfanyl, Methylsulfinyl, Ethylsulfinyl, Methylsulfonyl, Ethylsulfonyl, Difluormethoxy, Trifluormethoxy, Trifluormethylsulfanyl, Trifluormethylsulfinyl, Trifluormethylsulfonyl, Difluormethylsulfanyl, Difluormethylsulfinyl, Difluormethylsulfonyl, Trifluorethylsulfanyl, Trifluorethylsulfinyl, Trifluorethylsulfonyl, Nitro und Cyano substituiertes Benzyl, Pyridylmethyl, Pyrimidylmethyl, Thiazolylmethyl und Pyrazolyl-methyl steht,

R² und R³ zusammen mit N für einen Heterocyclus der Reihe U-1, U-2, U-3, U-4, U-5, U-6, U-7, U-25, U-26, U-27, U-29, U-30, U-31, U-32, U-33, U-34, U-35 und U-36 stehen,


R⁵ und R⁶ unabhängig voneinander für einen Rest aus der Reihe Wasserstoff, einfach bis dreifach unabhängig voneinander durch Fluor, Chlor und Brom oder einfach durch Methoxy, Ethoxy, Methylsulfanyl, Ethylsulfanyl, Methylsulfinyl, Ethylsulfinyl, Methylsulfonyl, Ethylsulfonyl oder Cyano substituiertes Methyl, Ethyl, Propyl, Isopropyl, n-Butyl, Isobutyl, sec-Butyl, tert-Butyl, Pentyl, Isopentyl, 2,2-Dimethyl-propyl, Hexyl, neo-Hexyl, Allyl, Methallyl, 2-Butenyl, Propargyl und 2-Butinyl, gegebenenfalls einfach bis zweifach unabhängig voneinander durch Fluor, Chlor, Methyl, Ethyl, Trifluormethyl, Methoxy und Cyano substituiertes Cyclopropyl, Cyclobutyl, Cyclopentyl und Cyclohexyl, gegebenenfalls einfach bis zweifach unabhängig voneinander durch Fluor, Chlor, Methyl, Ethyl, Trifluormethyl, Methoxy und Cyano substituiertes Cyclopropylmethyl, Cyclobutylmethyl, Cyclopentylmethyl und Cyclohexylmethyl, gegebenenfalls einfach bis zweifach unabhängig voneinander durch Fluor, Chlor, Brom, Methyl, Ethyl, Difluormethyl, Trifluormethyl, Methoxy, Ethoxy, Methylsulfanyl, Ethylsulfanyl, Methylsulfinyl, Ethylsulfinyl, Methylsulfonyl, Ethylsulfonyl, Difluormethoxy, Trifluormethoxy, Trifluormethylsulfanyl, Trifluormethylsulfinyl, Trifluormethylsulfonyl, Difluormethylsulfanyl, Difluormethylsulfinyl, Difluormethylsulfonyl, Trifluorethylsulfanyl, Trifluorethylsulfinyl, Trifluorethylsulfonyl, Nitro und Cyano substituiertes Phenyl, Pyridyl, Pyrimidyl, Thienyl und Thiazolyl, gegebenenfalls einfach bis zweifach unabhängig voneinander durch Fluor, Chlor, Brom, Methyl, Ethyl, Difluormethyl, Trifluormethyl, Methoxy, Ethoxy, Methylsulfanyl, Ethylsulfanyl, Methylsulfinyl, Ethylsulfinyl, Methylsulfonyl, Ethylsulfonyl, Difluormethoxy, Trifluormethoxy, Trifluormethylsulfanyl, Trifluormethylsulfinyl, Trifluormethylsulfonyl, Difluormethylsulfanyl, Difluormethylsulfinyl, Difluormethylsulfonyl, Trifluorethylsulfanyl, Trifluorethylsulfinyl, Trifluorethylsulfonyl, Nitro und Cyano substituiertes Benzyl, Pyridylmethyl, Pyrimidylmethyl, Thiazolylmethyl und Pyrazolylmethyl stehen,

R⁸ für einen Rest aus der Reihe Wasserstoff, einfach bis dreifach unabhängig voneinander durch Fluor, Chlor und Brom oder einfach durch Methoxy, Ethoxy, Methylsulfanyl, Ethylsulfanyl, Methylsulfinyl, Ethylsulfinyl, Methylsulfonyl, Ethylsulfonyl oder Cyano substituiertes Methyl, Ethyl, Propyl, Isopropyl, n-Butyl, Isobutyl, sec-Butyl, tert-Butyl, Pentyl, Isopentyl, 2,2-Dimethyl-propyl, Hexyl, neo-Hexyl, Allyl, Methallyl, 2-Butenyl, Propargyl und 2-Butinyl, gegebenenfalls einfach bis zweifach unabhängig voneinander durch Fluor, Chlor, Methyl, Ethyl, Trifluormethyl, Methoxy und Cyano substituiertes Cyclopropyl, Cyclobutyl, Cyclopentyl und Cyclohexyl, gegebenenfalls einfach bis

- zweifach unabhängig voneinander durch Fluor, Chlor, Methyl, Ethyl, Trifluormethyl, Methoxy und Cyano substituiertes Cyclopropylmethyl, Cyclobutylmethyl, Cyclopentylmethyl und Cyclohexylmethyl, gegebenenfalls einfach bis zweifach unabhängig voneinander durch Fluor, Chlor, Brom, Methyl, Ethyl, Difluormethyl, Trifluormethyl, Methoxy, Ethoxy, Methylsulfanyl, Ethylsulfanyl, Methylsulfinyl, Ethylsulfinyl, Methylsulfonyl, Ethylsulfonyl, Difluormethoxy, Trifluormethoxy, Trifluormethylsulfanyl, Trifluormethylsulfinyl, Trifluormethylsulfonyl, Difluormethylsulfanyl, Difluormethylsulfinyl, Difluormethylsulfonyl, Trifluorethylsulfanyl, Trifluorethylsulfinyl, Trifluorethylsulfonyl, Nitro und Cyano substituiertes Phenyl, Pyridyl, Pyrimidyl, Thienyl und Thiazolyl, gegebenenfalls einfach bis zweifach unabhängig voneinander durch Fluor, Chlor, Brom, Methyl, Ethyl, Difluormethyl, Trifluormethyl, Methoxy, Ethoxy, Methylsulfanyl, Ethylsulfanyl, Methylsulfinyl, Ethylsulfinyl, Methylsulfonyl, Ethylsulfonyl, Difluormethoxy, Trifluormethoxy, Trifluormethylsulfanyl, Trifluormethylsulfinyl, Trifluormethylsulfonyl, Difluormethylsulfanyl, Difluormethylsulfinyl, Difluormethylsulfonyl, Trifluorethylsulfanyl, Trifluorethylsulfinyl, Trifluorethylsulfonyl, Nitro und Cyano substituiertes Benzyl, Pyridylmethyl, Pyrimidylmethyl, Thiazolylmethyl und Pyrazolylmethyl steht,
- X^b für einen Rest aus der Reihe Fluor, Chlor, Brom, Cyano, Methyl, Ethyl, n-Propyl, Isopropyl, Cyclopropyl, Trifluormethyl, Difluormethyl, Trifluorethyl, Methoxy, Ethoxy, n-Propoxy, Isopropoxy, Trifluormethoxy, Methoxymethyl, Ethoxymethyl, Methoxyethyl, Ethoxyethyl, Methyl-S(O)_n-, Ethyl-S(O)_n- und Phenyl steht, das gegebenenfalls einfach bis dreifach durch Fluor, Chlor, Brom, Methyl, Ethyl, Difluormethyl, Trifluormethyl, Methoxy, Ethoxy, Nitro und Cyano substituiert sein kann,
- m für eine Zahl 0,1 oder 2 steht, wobei im Falle von m = 2 die Reste X^b gegebenenfalls unabhängig voneinander sein können,
- n für eine Zahl 0,1 oder 2 steht,

und deren Salze.

- Insbesondere bevorzugte Substituenten bzw. Bereiche der in den Verbindungen der Formel (I) aufgeführten Reste werden im Folgenden erläutert. Unter Berücksichtigung der Position der Carboxamidgruppe am Imidazolrest ergibt sich die ganz besonders bevorzugte Struktur (I-1). Ihre Kombination bildet den Vorzugsbereich (4-1).



(I-1),

V für Wasserstoff steht,

W für Wasserstoff steht,

Y für Methyl steht,

5 A für Wasserstoff oder Methyl steht,

T für ein Elektronenpaar steht,

L^1 für einen Rest aus der Reihe Wasserstoff, Methyl, Isopropyl, Phenyl, 2-Chlorphenyl, 3-Chlorphenyl, 4-Chlorphenyl, 3,4-Dichlorphenyl, 2-Pyridinyl, 3-Pyridinyl, 4-Pyridinyl, 4-Chlorpyridin-3-yl, 2-Pyrimidyl und Benzyl steht,

10 L^2 für Wasserstoff oder Methyl steht,

oder

L^1 und L^2 zusammen für Vinyl stehen,

L^3 für einen Rest aus der Reihe Wasserstoff, $S(O)_nR^{1a}$, OR^{1b} und $N(R^2)(R^3)$ steht,

15 R^{1a} für einen Rest aus der Reihe Methyl, Ethyl, Isopropyl, Isobutyl, tert-Butyl, Cyclopropylmethyl, 2,2-Dimethylpropyl, 2-Methoxy-2-oxoethyl, Phenyl, Benzyl, 2-Chlorphenyl, 3-Chlorphenyl, 4-Chlorphenyl und 2-Pyrimidyl steht,

R^{1b} für einen Rest aus der Reihe Wasserstoff, Methyl, Cyclopropylmethyl, Benzyl und 3-Chlorphenyl steht,

R^2 und R^3 zusammen mit N für einen Heterocyclus der Reihe U-2, U-4 und U-5 stehen,

20 X^b für Trifluormethyl steht,

m für eine Zahl 0 oder 1 steht,

n für eine Zahl 0 oder 2 steht,

und deren Salze.

5

Im Folgenden steht *Ausgestaltung (0)* gleichbedeutend mit *Ausgestaltung (0-1) oder (0-2)* und *Vorzugsbereich (x)* mit *Vorzugsbereich (x-1) oder (x-2)* mit $x = 1, 2, 3$ oder 4 .

Besonders bevorzugt sind weiterhin Verbindungen der Formel (I) bzw. (I-1) in welchen Q, V, W, Y, A, T, L₁, L₂, R^{1a}, R^{1b}, R², R³, R⁴, R⁵, R⁶, R⁷, R⁸, R⁹, m, n, G und X_b die Bedeutung gemäß der Ausgestaltung (0) oder des Vorzugsbereichs (1) oder des Vorzugsbereichs (2) oder des Vorzugsbereichs (3) oder des Vorzugsbereichs (4) haben und L³ für einen Rest aus der Reihe S(O)_nR^{1a}, OR^{1b} und N(R²)(R³) steht.

10

Ganz besonders bevorzugt sind weiterhin Verbindungen der Formel (I) bzw. (I-1) in welchen Q, V, W, Y, A, T, L₁, L₂, R^{1a}, R^{1b}, R², R³, R⁴, R⁵, R⁶, R⁷, R⁸, R⁹, m, n, G und X_b die Bedeutung gemäß der Ausgestaltung (0) oder des Vorzugsbereichs (1) oder des Vorzugsbereichs (2) oder des Vorzugsbereichs (3) oder des Vorzugsbereichs (4) haben und L³ für einen Rest aus der Reihe S(O)_nR^{1a} und N(R²)(R³) steht.


15

Insbesondere bevorzugt sind weiterhin Verbindungen der Formel (I) bzw. (I-1) in welchen Q, V, W, Y, A, T, L₁, L₂, R^{1a}, R^{1b}, R², R³, R⁴, R⁵, R⁶, R⁷, R⁸, R⁹, m, n, G und X_b die Bedeutung gemäß der Ausgestaltung (0) oder des Vorzugsbereichs (1) oder des Vorzugsbereichs (2) oder des Vorzugsbereichs (3) oder des Vorzugsbereichs (4) haben und L³ für S(O)_nR^{1a} steht.


20

In den folgenden bevorzugten Ausführungsformen (I-1a) bis (I-1d) haben alle Gruppen, Reste und Substituenten die oben in Ausgestaltung (0) oder in Vorzugsbereich (1) oder in Vorzugsbereich (2) oder in Vorzugsbereich (3) oder in Vorzugsbereich (4) beschriebene Bedeutung.


25 In einer bevorzugten Ausführungsform betrifft die Erfindung die Verbindungen der Formel (I-1a).



In einer weiteren bevorzugten Ausführungsform betrifft die Erfindung die Verbindungen der Formel (I-1c).



- 5 In einer weiteren bevorzugten Ausführungsform betrifft die Erfindung die Verbindungen der Formel (I-1d).



Besonders bevorzugt sind die Verbindungen der Formel (I-1c) oder (I-1d) und ganz besonders bevorzugt der Formel (I-1c).

Im Vorzugsbereich (1) ist, sofern nichts anderes angegeben ist,

- Halogen ausgewählt aus der Reihe Fluor, Chlor, Brom und Iod, bevorzugt wiederum aus der Reihe
5 Fluor, Chlor und Brom,

- Hetaryl (gleichbedeutend mit Heteroaryl, auch als Teil einer größeren Einheit, wie beispielsweise Hetarylalkyl) ausgewählt aus der Reihe Furyl, Thienyl, Pyrrolyl, Pyrazolyl, Imidazolyl, 1,2,3-Triazolyl, 1,2,4-Triazolyl, Oxazolyl, Isoxazolyl, Thiazolyl, Isothiazolyl, 1,2,3-Oxadiazolyl, 1,2,4-Oxadiazolyl, 1,3,4-Oxadiazolyl, 1,2,5-Oxadiazolyl, 1,2,3-Thiadiazolyl, 1,2,4-Thiadiazolyl, 1,3,4-Thiadiazolyl, 1,2,5-
10 Thiadiazolyl, Pyridyl, Pyrimidinyl, Pyridazinyl, Pyrazinyl, 1,2,3-Triazinyl, 1,2,4-Triazinyl, 1,3,5-Triazinyl, Benzofuryl, Benzisofuryl, Benzothienyl, Benzisothienyl, Indolyl, Isoindolyl, Indazolyl, Benzothiazolyl, Benzisothiazolyl, Benzoxazolyl, Benzisoxazolyl, Benzimidazolyl, 2,1,3-Benzoxadiazole, Chinoliny, Isochinoliny, Cinnoliny, Phthalazinyl, Chinazoliny, Chinoxaliny, Naphthyridiny, Benzotriazinyl, Puriny, Pteridiny und Indoliziny,
- 15 Heterocyclyl für einen gesättigten 3-, 4-, 5- oder 6-Ring, der 1 oder 2 Stickstoffatome und/oder ein Sauerstoffatom und/oder ein Schwefelatom enthält, wobei jedoch nicht 2 Stickstoffatome direkt benachbart sein sollen, beispielsweise für Aziridiny, Azetidiny, Azolidiny, Azinany, Oxirany, Oxetany, Oxolany, Oxany, Dioxany, Thiirany, Thietany, Thiolany, Thianyl, Tetrahydrofuryl.

Im Vorzugsbereich (2) steht, sofern nichts anderes angegeben ist,

- 20 Halogen für Fluor, Chlor, Brom und Iod, bevorzugt für Fluor, Chlor und Brom,

Hetaryl (auch als Teil einer größeren Einheit, wie Hetarylalkyl) für Pyridyl, Pyrimidyl, Thiazolyl, Oxazolyl, Pyrazolyl, Thienyl, Furany, Benzyl, Pyridinylmethyl und Thiazolylmethyl sowie

- Heterocyclyl (auch als Teil einer größeren Einheit, wie Heterocyclylalkyl) für einen gesättigten oder ungesättigten 3-, 4- oder 5-Ring, der 1 oder 2 Stickstoffatome und/oder ein Sauerstoffatom und/oder ein
25 Schwefelatom enthält, wobei jedoch nicht 2 Stickstoffatome direkt benachbart sein sollen, beispielsweise für 1- oder 2-Aziridiny, 2-Oxirany, 2-Thiirany, 1- oder 2-Azetidiny, 2- oder 3-Oxetany, 2- oder 3-Thietany, 1,3-Dioxetan-2-yl, 1-, 2- oder 3-Pyrrolidiny.

Im Vorzugsbereich (3) steht, sofern nichts anderes angegeben ist,

Halogen für Fluor, Chlor, Brom und Iod, bevorzugt für Fluor, Chlor und Brom,

- 30 Heterocyclyl (auch als Teil einer größeren Einheit, wie Heterocyclylalkyl) für einen gesättigten oder ungesättigten 3- oder 4-Ring, der 1 oder 2 Stickstoffatome und/oder ein Sauerstoffatom und/oder ein

Schwefelatom enthält, wobei jedoch nicht 2 Stickstoffatome direkt benachbart sein sollen, beispielsweise für 1- oder 2-Aziridiny, 2-Oxirany, 2-Thiirany, 1- oder 2-Azetidinyl, 2- oder 3-Oxetany, 2- oder 3-Thietany oder 1,3-Dioxetan-2-yl. Durch Halogen substituierte Reste, z.B. Halogenalkyl (= Haloalkyl), sind, sofern nichts anderes gesagt ist, einfach oder mehrfach bis zur maximal möglichen Substituentenzahl halogeniert. Bei mehrfacher Halogenierung können die Halogenatome gleich oder verschieden sein. Halogen steht dabei für Fluor, Chlor, Brom oder Iod, insbesondere für Fluor, Chlor oder Brom.

Gesättigte oder ungesättigte Kohlenwasserstoffreste wie Alkyl oder Alkenyl können, auch in Verbindung mit Heteroatomen, wie z.B. in Alkoxy, soweit möglich, jeweils geradkettig oder verzweigt sein.

Gegebenenfalls substituierte Reste können, wenn nichts anderes erwähnt ist, einfach oder mehrfach substituiert sein, wobei bei Mehrfachsubstitutionen die Substituenten gleich oder verschieden sein können.

Wenn T in den Verbindungen der Formel (I) für Sauerstoff steht, liegen diese Verbindungen als N-Oxide vor.

Wenn T in den Verbindungen der Formel (I) für ein Elektronenpaar steht, liegen diese Verbindungen als Pyridine vor.

Die oben aufgeführten allgemeinen oder in Vorzugsbereichen aufgeführten Restdefinitionen bzw. Erläuterungen gelten für die Endprodukte und für die Ausgangsprodukte und Zwischenprodukte entsprechend. Diese Restdefinitionen können untereinander, also auch zwischen den jeweiligen

Vorzugsbereichen, beliebig kombiniert werden.


Erfindungsgemäß bevorzugt verwendet werden Verbindungen der Formel (I), in welchen eine Kombination der vorstehend als bevorzugt aufgeführten Bedeutungen vorliegt (Vorzugsbereich (1)).

Erfindungsgemäß besonders bevorzugt verwendet werden Verbindungen der Formel (I), in welchen eine Kombination der vorstehend als besonders bevorzugt aufgeführten Bedeutungen vorliegt (Vorzugsbereich (2)).

Erfindungsgemäß ganz besonders bevorzugt verwendet werden Verbindungen der Formel (I), in welchen eine Kombination der vorstehend als ganz besonders bevorzugt aufgeführten Bedeutungen vorliegt (Vorzugsbereich (3)).

Erfindungsgemäß insbesondere bevorzugt verwendet werden Verbindungen der Formel (I), in welchen eine Kombination der vorstehend als ganz besonders bevorzugt aufgeführten Bedeutungen vorliegt (Vorzugsbereich (4)).

Ein weiterer Gegenstand der Erfindung sind die Zwischenprodukte der Formeln (II) und (III)




wobei die vorhandenen Reste die Bedeutungen gemäß der erfindungsgemäßen Verbindung (I) oder gemäß einem der Vorzugsbereiche (1) bis (4) und bevorzugt gemäß dem Vorzugsbereich (4) haben.

- 5 Die Verbindungen der Formel (I) können in Abhängigkeit von der Art der Substituenten als geometrische und/oder als optisch aktive Isomere oder entsprechende Isomerengemische in unterschiedlicher Zusammensetzung vorliegen. Diese Stereoisomere sind beispielsweise Enantiomere, Diastereomere, Atropisomere oder geometrische Isomere. Die Erfindung umfasst somit sowohl reine Stereoisomere als auch beliebige Gemische dieser Isomere.


10

Die Verbindungen der Formel (I-1) können beispielsweise nach Verfahren A bis F wie in den folgenden Schemata dargestellt synthetisiert werden.


Verfahren A




Verfahren B-1 und B-2



Verfahren B-2, wenn L^3 für SR^{1a} steht




5 Verfahren C




BuLi= n-Butyllithium

Verfahren D




BuLi = n-Butyllithium

5 Verfahren E



Verfahren F



BuLi= n-Butyllithium

5

Die für das Verfahren A benötigten Imidazolyl-carbonsäuren der Formel (IV-1) sind kommerziell erhältlich oder können beispielweise nach literaturbekannten Verfahren hergestellt werden, z. B., HOFFMANN-LAROCHE INC. Patent: US2006/0019949 A1, 2006.

Die für das Verfahren B benötigten Imidazolyl-carbonsäuren der Formel (VII-1) sind kommerziell
 10 erhältlich oder können beispielweise nach literaturbekannten Verfahren hergestellt werden, z. B., O'Connell, John F.; Parquette, Jonathan; Yelle, William E.; Wang, Wilhelm; Rapoport, Henry, Synthesis 1988, 767-771, BASF Aktiengesellschaft Patent: US4864030 A1, 1989, Takeda Pharmaceutical Company Limited Patent: EP2530078 A1, 2012, TAISHO PHARMACEUTICAL CO., LTD. Patent: US2012/10414 A1, 2012, Subrayan, Ramachandran P.; Thurber, Ernest L.; Rasmussen,
 15 Paul G., Tetrahedron, 1994, 50, 2641 – 2656.

Die für die Verfahren A und B benötigten 3-Amino-pyridine der Formel (VI) sind kommerziell erhältlich oder können beispielweise nach literaturbekannten Verfahren hergestellt werden, z. B., Liu, Zhen-Jiang; Vors, Jean-Pierre; Gesing, Ernst R. F.; Bolm, Carsten, Advanced Synthesis and Catalysis, 2010, 352, 3158 – 3162, BAYER CROPSOURCE AG Patent: US2010/305124 A1, 2010, Shafir,
 20 Alexandr; Buchwald, Stephen L., Journal of the American Chemical Society, 2006, 128, 8742 – 8743.

Die für das Verfahren B benötigten L³H (z. B. Thiole, Alkohole, Pyrazole, Triazole etc.) der Formel (IX) sind kommerziell verfügbar oder lassen sich nach allgemeinen in der Organischen Chemie bekannten Verfahren herstellen.

Die für das Verfahren D benötigten Metallorganyle (z. B. Vinyl-boronsäure/ester, etc.), sowie die
 25 benötigten Katalysatoren sind größtenteils Kaufprodukte oder lassen sich nach allgemein in der organischen Chemie bekannten Verfahren herstellen.

Die für das Verfahren E benötigten Alkyne (z. B. Phenylacetylen, etc.), sowie die benötigten Katalysatoren sind größtenteils Kaufprodukte oder lassen sich nach allgemein in der organischen Chemie bekannten Verfahren herstellen.

Die für das Verfahren F benötigten Trifluormethansulfonate sind größtenteils Kaufprodukte oder lassen
5 sich nach allgemein in der organischen Chemie bekannten Verfahren herstellen.

Für das Lithiierungs-Kupplungsverfahren (Verfahren C, D und F) sind zahlreiche Reaktionsbedingungen beschrieben worden, z. B., Hoechst Aktiengesellschaft Patent: US4764624 A1, 1988. Ohta, Shunsaku; Yamamoto, Tetsuya; Kawasaki, Ikuo; Yamashita, Masayuki; Katsuma, Hideo; Nasako, Rieko; Kobayashi, Kazuhiro; Ogawa, Kazuo, Chemical and Pharmaceutical Bulletin, 1992, 40,
10 2681 – 2685. Hara, Kenji; Iwahashi, Keiji; Kanamori, Yoshikazu; Naito, Satoshi; Takakusagi, Satoru; Uosaki, Kohei; Sawamura, Masaya, Chemistry Letters, 2006, 35, 870 – 871.

Als Lösungsmittel seien beispielhaft genannt: Diethylether, Tetrahydrofuran.

Als Lithiierungsmittel seien beispielhaft genannt: n-Butyllithium, Lithium-di-isopropylamin, Lithium-tert-butylat.

15 Die Reaktionstemperatur liegt gegebenenfalls zwischen -100 und -75 °C für den initialen Lithiierungsschritt.

Amidierungsverfahren

Die Verbindungen der Formel (I-1) und die Intermediate der Formel (IX-1) in dem erfindungsgemäßen
20 Verfahren lassen sich mit Hilfe von literaturbekannten Amidierungsreaktion oder analog den explizit genannten Beispielen synthetisieren.

Für den Amidierungsschritt sind zahlreiche Reaktionsbedingungen beschrieben worden, z.B., G. Benz in Comprehensive Organic Synthesis, 1st Ed., Pergamon Press, Oxford, 1991, Vol. 6, S. 381-417; P.D. Bailey et al. in Comprehensive Organic Functional Group Transformation, 1st Ed., Elsevier Science Ltd.,
25 Oxford, 1995, Vol. 5, S. 257-308 und R.C. Larock in Comprehensive Organic Transformations, 2nd Ed., Wiley-VCH, New York, Weinheim, 1999, S. 1929-1994. Einige dieser Reaktionen verlaufen über intermediäre Carbonsäurechloride, die isoliert oder in situ erzeugt eingesetzt werden können.

Die Amidierungsreaktionen erfolgen gegebenenfalls in Gegenwart eines Kondensationsmittels, gegebenenfalls in Gegenwart eines Säureakzeptors und gegebenenfalls in Gegenwart eines
30 Lösungsmittels.

Als Kondensationsmittel kommen alle üblicherweise für derartige Amidierungsreaktionen verwendbaren Kondensationsmittel infrage. Beispielhaft genannt seien Aktivierungsreagenzien wie Phosgen, Phosphortrichlorid, Phosphoroxychlorid, Oxalylchlorid, Oxalylbromid oder Thionylchlorid; Carbodiimide, wie *N,N'*-Dicyclohexylcarbodiimid (DCC) und 1-(3-Dimethylaminopropyl)-3-ethyl-
 5 carbodiimid (EDCI), oder andere übliche Kondensationsmittel, wie Phosphorpentoxid, Polyphosphorsäure, *N,N'*-Carbonyldiimidazol, 2-Chlorpyridin 1-Methiodid (Mukaiyamas Reagenz), 2-Ethoxy-N-ethoxycarbonyl-1,2-dihydrochinolin (EEDQ), Triphenylphosphin/Tetrachlorkohlenstoff, Brom-tripyrrolidino-phosphonium-hexafluorphosphat (BROP), O-(1*H*-Benzotriazol-1-
 10 yloxy)tris(dimethylamino)phosphonium-hexafluorphosphat (BOP), *N,N,N',N'*-Bis(tetramethylen)cloruronium-tetrafluorborat, O-(1*H*-Benzotriazol-1-yl)-*N,N,N',N'*-tetramethyluronium-hexafluorphosphat (HBTU), O-(1*H*-Benzotriazol-1-yl)-*N,N,N',N'*-bis(tetramethylen)uronium-hexafluorphosphat, O-(1*H*-Benzotriazol-1-yl)-*N,N,N',N'*-tetramethyluronium-tetrafluorborat (TBTU), O-(1*H*-Benzotriazol-1-yl)-*N,N,N',N'*-bis(tetramethylen)uronium-tetrafluorborat, O-(7-Azabenzotriazol-1-yl)-*N,N,N',N'*-tetramethyluronium-
 15 hexafluorphosphat (HATU), 1-Hydroxybenzotriazol (HOBt) und 4-(4,6-Dimethoxy-1,3,5-triazin-2-yl)-4-methylmorpholiniumsalz (DMT.MM), meistens als Chlorid verfügbar. Diese Reagenzien können separat oder in Kombination eingesetzt werden.

Als Säureakzeptor kommen alle üblichen anorganischen oder organischen Basen infrage, beispielsweise organische Amine wie Triethylamin, Diisopropylethylamin, *N*-Methylmorpholin, Pyridin oder *N,N*-
 20 Dimethylaminopyridin, Alkali- und Erdalkalicarbonate wie Lithiumcarbonat Natriumcarbonat, Kaliumcarbonat oder Caesiumcarbonat; Alkalyhydrogencarbonate wie Natriumhydrogencarbonat oder Kaliumhydrogencarbonat. Die Amidierungsreaktion in den erfindungsgemäßen Verfahren wird gegebenenfalls in Gegenwart eines geeigneten Reaktionshilfstoffes wie beispielsweise *N,N*-Dimethylformamid oder *N,N*-Dimethylaminopyridin durchgeführt. Als Lösungs- oder
 25 Verdünnungsmittel kommen alle interten organischen Lösungsmittel in Betracht, beispielsweise aliphatische oder aromatische Kohlenwasserstoffe (wie Petrolether, Toluol, Cyclohexan), halogenierte Kohlenwasserstoffe (wie Chlortoluol, Dichlorbenzol, Dichlormethan, Chloroform, 1,2-Dichlorethan), Ether (wie Diethylether, Dioxan, Tetrahydrofuran, 1,2-Dimethoxyethan), Ester (wie Essigsäureethylester- oder -methylester), Nitrokohlenwasserstoffe (wie Nitromethan, Nitroethan,
 30 Nitrobenzol), Nitrile (wie Acetonitril, Propionitril, Butyronitril, Benzonitril), Amide (wie *N,N*-Dimethylformamid, *N,N*-Dimethylacetamide, *N*-Methylformanilid, *N*-Methylpyrrolidon, Hexamethylphosphorsäuretriamid) sowie Dimethylsulfoxid, Sulfolan oder Wasser oder Gemische der genannten Lösungsmittel.

Es können auch gemischte Anhydride zur Darstellung von Verbindungen der Formel (I-1) verwendet
 35 werden (vgl. Anderson, George W.; Zimmerman, Joan E.; Callahan, Francis M., J. Am. Chem. Soc. 1967, 89, 5012-5017). Bei diesem Verfahren können Chlorameisensäureester zum Einsatz kommen, wie

z.B. Chlorameisensäuremethylester, Chlorameisensäureethylester, Chlorameisensäureisobutylester und Chlorameisensäureisopropylester. Ebenfalls können dafür Diethylacetylchlorid, Trimethylacetylchlorid und ähnliche Verbindungen verwendet werden.

Im Folgenden betreffen die Ausführungen zu den Verbindungen der Formel (I) selbstverständlich auch die Verbindungen der Formel (I-1) und (I-1a bis (I-1d), welche in Formel (I) umfasst sind.

Verfahren und Verwendungen

Die Erfindung betrifft auch Verfahren zur Bekämpfung von tierischen Schädlingen, bei dem man Verbindungen der Formel (I) auf tierische Schädlinge und/oder ihren Lebensraum einwirken lässt. Bevorzugt wird die Bekämpfung der tierischen Schädlinge in der Land- und Forstwirtschaft und im Materialschutz durchgeführt. Hierunter vorzugsweise ausgeschlossen sind Verfahren zur chirurgischen oder therapeutischen Behandlung des menschlichen oder tierischen Körpers und Diagnostizierverfahren, die am menschlichen oder tierischen Körper vorgenommen werden.

Die Erfindung betrifft ferner die Verwendung der Verbindungen der Formel (I) als Schädlingsbekämpfungsmittel, insbesondere Pflanzenschutzmittel.

Im Rahmen der vorliegenden Anmeldung umfasst der Begriff Schädlingsbekämpfungsmittel jeweils immer auch den Begriff Pflanzenschutzmittel.

Die Verbindungen der Formel (I) eignen sich bei guter Pflanzenverträglichkeit, günstiger Warmblüttoxizität und guter Umweltverträglichkeit zum Schutz von Pflanzen und Pflanzenorganen vor biotischen und abiotischen Stressfaktoren, zur Steigerung der Ernteerträge, Verbesserung der Qualität des Erntegutes und zur Bekämpfung von tierischen Schädlingen, insbesondere Insekten, Spinnentieren, Helminthen, insbesondere Nematoden, und Mollusken, die in der Landwirtschaft, im Gartenbau, bei der Tierzucht, in Aquakulturen, in Forsten, in Gärten und Freizeiteinrichtungen, im Vorrats- und Materialschutz sowie auf dem Hygienesektor vorkommen.

Im Rahmen der vorliegenden Patentanmeldung ist der Begriff „Hygiene“ so zu verstehen, dass damit jegliche und alle Maßnahmen, Vorschriften und Verfahrensweisen gemeint sind, deren Ziel es ist, Krankheiten, insbesondere Infektionskrankheiten, zu verhindern, und die dazu dienen, die Gesundheit von Menschen und Tieren zu schützen und/oder die Umwelt zu schützen, und/oder die Sauberkeit aufrechterhalten. Erfindungsgemäß schließt dies insbesondere Maßnahmen zur Reinigung, Desinfektion und Sterilisation beispielsweise von Textilien oder harten Oberflächen, insbesondere Oberflächen aus Glas, Holz, Zement, Porzellan, Keramik, Kunststoff oder auch Metall(en) ein, um sicherzustellen, dass diese frei von Hygieneschädlingen und/oder ihren Ausscheidungen sind. Vorzugsweise ausgeschlossen

vom Schutzbereich der Erfindung sind in dieser Hinsicht chirurgische oder therapeutische, auf den menschlichen Körper oder die Körper von Tieren anzuwendende Behandlungsvorschriften und diagnostische Vorschriften, die am menschlichen Körper oder den Körpern von Tieren durchgeführt werden.

- 5 Der Begriff „Hygienesektor“ deckt alle Gebiete, technischen Felder und industriellen Anwendungen ab, bei denen diese Hygienemaßnahmen, -vorschriften und -verfahrensweisen wichtig sind, zum Beispiel im Hinblick auf Hygiene in Küchen, Bäckereien, Flughäfen, Badezimmern, Schwimmbecken, Kaufhäusern, Hotels, Krankenhäusern, Ställen, Tierhaltungen usw.

- Der Begriff „Hygieneschädling“ ist daher so zu verstehen, dass damit ein oder mehrere Tierschädlinge gemeint sind, deren Gegenwart im Hygienesektor problematisch ist, insbesondere aus Gesundheitsgründen. Es ist daher ein Hauptziel, das Vorhandensein von Hygieneschädlingen und/oder das Ausgesetztsein ihnen gegenüber im Hygienesektor zu vermeiden oder auf ein Mindestmaß zu begrenzen. Dies lässt sich insbesondere durch die Anwendung eines Pestizids erreichen, das sich sowohl zum Verhindern eines Befalls als auch zum Verhindern eines bereits vorhandenen Befalls einsetzen lässt. Man kann auch Zubereitungen verwenden, die eine Exposition gegenüber Schädlingen verhindern oder reduzieren. Hygieneschädlinge schließen zum Beispiel die unten erwähnten Organismen ein.
- 10
15

Der Begriff „Hygieneschutz“ deckt somit alle Handlungen ab, mit denen diese Hygienemaßnahmen, -vorschriften und -verfahrensweisen aufrechterhalten und/oder verbessert werden.

- Die Verbindungen der Formel (I) können vorzugsweise als Schädlingsbekämpfungsmittel eingesetzt werden. Sie sind gegen normal sensible und resistente Arten sowie gegen alle oder einzelne Entwicklungsstadien wirksam. Zu den oben erwähnten Schädlingen gehören:
- 20

- Schädlinge aus dem Stamm der Arthropoda, insbesondere aus der Klasse der Arachnida z. B. *Acarus* spp., z. B. *Acarus siro*, *Aceria kuko*, *Aceria sheldoni*, *Aculops* spp., *Aculus* spp., z. B. *Aculus fockeui*, *Aculus schlechtendali*, *Amblyomma* spp., *Amphitetranychus viennensis*, *Argas* spp., *Boophilus* spp.,
25 *Brevipalpus* spp., z. B. *Brevipalpus phoenicis*, *Bryobia graminum*, *Bryobia praetiosa*, *Centruroides* spp., *Choriotptes* spp., *Dermanyssus gallinae*, *Dermatophagoides pteronyssinus*, *Dermatophagoides farinae*, *Dermacentor* spp., *Eotetranychus* spp., z. B. *Eotetranychus hicoriae*, *Epitrimerus pyri*, *Eutetranychus* spp., z. B. *Eutetranychus banksi*, *Eriophyes* spp., z. B. *Eriophyes pyri*, *Glycyphagus domesticus*, *Halotydeus destructor*, *Hemitarsonemus* spp., z. B. *Hemitarsonemus latus* (=Polyphagotarsonemus
30 *latus*), *Hyalomma* spp., *Ixodes* spp., *Latrodectus* spp., *Loxosceles* spp., *Neutrombicula autumnalis*, *Nuphersa* spp., *Oligonychus* spp., z. B. *Oligonychus coffeae*, *Oligonychus coniferarum*, *Oligonychus ilicis*, *Oligonychus indicus*, *Oligonychus mangiferus*, *Oligonychus pratensis*, *Oligonychus punicae*, *Oligonychus yothersi*, *Ornithodoros* spp., *Ornithonyssus* spp., *Panonychus* spp., z. B. *Panonychus citri* (=Metatetranychus *citri*), *Panonychus ulmi* (=Metatetranychus *ulmi*), *Phyllocoptruta oleivora*,
35 *Platytetranychus multidigituli*, *Polyphagotarsonemus latus*, *Psoroptes* spp., *Rhipicephalus* spp.,

Rhizoglyphus spp., Sarcoptes spp., Scorpio maurus, Steneotarsonemus spp., Steneotarsonemus spinki, Tarsonemus spp., z. B. Tarsonemus confusus, Tarsonemus pallidus, Tetranychus spp., z. B. Tetranychus canadensis, Tetranychus cinnabarinus, Tetranychus turkestani, Tetranychus urticae, Trombicula alfreddugesi, Vaejovis spp., Vasates lycopersici;

5 aus der Klasse der Chilopoda z. B. Geophilus spp., Scutigera spp.;

aus der Ordnung oder der Klasse der Collembola z. B. Onychiurus armatus; Sminthurus viridis;

aus der Klasse der Diplopoda z. B. Blaniulus guttulatus;

aus der Klasse der Insecta, z. B. aus der Ordnung der Blattodea z. B. Blatta orientalis, Blattella asahinai, Blattella germanica, Leucophaea maderae, Loboptera decipiens, Neostylopyga rhombifolia, Panchlora spp., Parcoblatta spp., Periplaneta spp., z. B. Periplaneta americana, Periplaneta australasiae, Pycnoscelus surinamensis, Supella longipalpa;

aus der Ordnung der Coleoptera z. B. Acalymma vittatum, Acanthoscelides obtectus, Adoretus spp., Aethina tumida, Agelastica alni, Agriotes spp., z. B. Agriotes linneatus, Agriotes mancus, Alphitobius diaperinus, Amphimallon solstitialis, Anobium punctatum, Anoplophora spp., Anthonomus spp., z. B.

15 Anthonomus grandis, Anthrenus spp., Apion spp., Apogonia spp., Atomaria spp., z. B. Atomaria linearis, Attagenus spp., Baris caerulescens, Bruchidius obtectus, Bruchus spp., z. B. Bruchus pisorum, Bruchus rufimanus, Cassida spp., Cerotoma trifurcata, Ceutorrhynchus spp., z. B. Ceutorrhynchus assimilis, Ceutorrhynchus quadridens, Ceutorrhynchus rapae, Chaetocnema spp., z. B. Chaetocnema confinis, Chaetocnema denticulata, Chaetocnema ectypa, Cleonus mendicus, Conoderus spp.,

20 Cosmopolites spp., z. B. Cosmopolites sordidus, Costelytra zealandica, Ctenicera spp., Curculio spp., z. B. Curculio caryae, Curculio caryatipes, Curculio obtusus, Curculio sayi, Cryptolestes ferrugineus, Cryptolestes pusillus, Cryptorhynchus lapathi, Cryptorhynchus mangiferae, Cylindrocopturus spp., Cylindrocopturus adpersus, Cylindrocopturus furnissi, Dermestes spp., Diabrotica spp., z. B. Diabrotica balteata, Diabrotica barberi, Diabrotica undecimpunctata howardi, Diabrotica undecimpunctata

25 undecimpunctata, Diabrotica virgifera virgifera, Diabrotica virgifera zea, Dichocrocis spp., Dieladisma armigera, Diloboderus spp., Epicaerus spp., Epilachna spp., z. B. Epilachna borealis, Epilachna varivestis, Epitrix spp., z. B. Epitrix cucumeris, Epitrix fuscata, Epitrix hirtipennis, Epitrix subcrinita, Epitrix tuberis, Faustinus spp., Gibbium psyllodes, Gnathocerus cornutus, Hellula undalis, Heteronychus arator, Heteronyx spp., Hylamorpha elegans, Hylotrupes bajulus, Hypera postica,

30 Hypomeces squamosus, Hypothenemus spp., z. B. Hypothenemus hampei, Hypothenemus obscurus, Hypothenemus pubescens, Lachnosterna consanguinea, Lasioderma serricorne, Latheticus oryzae, Lathridius spp., Lema spp., Leptinotarsa decemlineata, Leucoptera spp., z. B. Leucoptera coffeella, Lissorhoptrus oryzophilus, Listronotus (=Hyperodes) spp., Lixus spp., Luperodes spp., Luperomorpha xanthodera, Lyctus spp., Megascelis spp., Melanotus spp., z. B. Melanotus longulus oregonensis,

35 Meligethes aeneus, Melolontha spp., z. B. Melolontha melolontha, Migdolus spp., Monochamus spp.,

- Naupactus xanthographus, Necrobia spp., Neogalerucella spp., Niptus hololeucus, Oryctes rhinoceros, Oryzaephilus surinamensis, Oryzaphagus oryzae, Otiorhynchus spp., z. B. Otiorhynchus cribricollis, Otiorhynchus ligustici, Otiorhynchus ovatus, Otiorhynchus rugosostriatus, Otiorhynchus sulcatus, Oulema spp., z. B. Oulema melanopus, Oulema oryzae, Oxycetonia jucunda, Phaedon cochleariae,
- 5 Phyllophaga spp., Phyllophaga helleri, Phyllotreta spp., z. B. Phyllotreta armoraciae, Phyllotreta pusilla, Phyllotreta ramosa, Phyllotreta striolata, Popillia japonica, Premnotypes spp., Prostephanus truncatus, Psylliodes spp., z. B. Psylliodes affinis, Psylliodes chrysocephala, Psylliodes punctulata, Ptinus spp., Rhizobius ventralis, Rhizopertha dominica, Rhynchophorus spp., Rhynchophorus ferrugineus, Rhynchophorus palmarum, Sinoxylon perforans, Sitophilus spp., z. B. Sitophilus granarius, Sitophilus
- 10 linearis, Sitophilus oryzae, Sitophilus zeamais, Sphenophorus spp., Stegobium paniceum, Sternechus spp., z. B. Sternechus paludatus, Symphyletes spp., Tanymecus spp., z. B. Tanymecus dilaticollis, Tanymecus indicus, Tanymecus palliatus, Tenebrio molitor, Tenebrioides mauretanicus, Tribolium spp., z. B. Tribolium audax, Tribolium castaneum, Tribolium confusum, Trogoderma spp., Tychius spp., Xylotrechus spp., Zabrus spp., z. B. Zabrus tenebrioides;
- 15 aus der Ordnung der Dermaptera z. B. Anisolabis maritime, Forficula auricularia, Labidura riparia;
- aus der Ordnung der Diptera z. B. Aedes spp., z. B. Aedes aegypti, Aedes albopictus, Aedes sticticus, Aedes vexans, Agromyza spp., z. B. Agromyza frontella, Agromyza parvicornis, Anastrepha spp., Anopheles spp., z. B. Anopheles quadrimaculatus, Anopheles gambiae, Asphondylia spp., Bactrocera spp., z. B. Bactrocera cucurbitae, Bactrocera dorsalis, Bactrocera oleae, Bibio hortulanus, Calliphora
- 20 erythrocephala, Calliphora vicina, Ceratitis capitata, Chironomus spp., Chrysomya spp., Chrysops spp., Chrysosoma pluvialis, Cochliomya spp., Contarinia spp., z. B. Contarinia johnsoni, Contarinia nasturtii, Contarinia pyrivora, Contarinia schulzi, Contarinia sorghicola, Contarinia tritici, Cordylobia anthropophaga, Cricotopus sylvestris, Culex spp., z. B. Culex pipiens, Culex quinquefasciatus, Culicoides spp., Culiceta spp., Cuterebra spp., Dacus oleae, Dasineura spp., z. B. Dasineura brassicae,
- 25 Delia spp., z. B. Delia antiqua, Delia coarctata, Delia florilega, Delia platura, Delia radicum, Dermatobia hominis, Drosophila spp., z. B. Drosophila melanogaster, Drosophila suzukii, Echinocnemus spp., Euleia heraclei, Fannia spp., Gasterophilus spp., Glossina spp., Haematopota spp., Hydrellia spp., Hydrellia griseola, Hylemya spp., Hippobosca spp., Hypoderma spp., Liriomyza spp., z. B. Liriomyza brassicae, Liriomyza huidobrensis, Liriomyza sativae, Lucilia spp., z. B. Lucilia cuprina, Lutzomyia spp.,
- 30 Mansonia spp., Musca spp., z. B. Musca domestica, Musca domestica vicina, Oestrus spp., Oscinella frit, Paratanytarsus spp., Paralauterborniella subcincta, Pegomya oder Pegomyia spp., z. B. Pegomya betae, Pegomya hyoscyami, Pegomya rubivora, Phlebotomus spp., Phorbia spp., Phormia spp., Piophilidae casei, Platyparea poeciloptera, Prodiptosis spp., Psila rosae, Rhagoletis spp., z. B. Rhagoletis cingulata, Rhagoletis completa, Rhagoletis fausta, Rhagoletis indifferens, Rhagoletis mendax, Rhagoletis
- 35 pomonella, Sarcophaga spp., Simulium spp., z. B. Simulium meridionale, Stomoxys spp., Tabanus spp., Tetanops spp., Tipula spp., z. B. Tipula paludosa, Tipula simplex, Toxotrypana curvicauda;

aus der Ordnung der Hemiptera z. B. *Acizzia acaciaebaileyanae*, *Acizzia dodonaeae*, *Acizzia uncatoides*,
Acrida turrita, *Acyrtosiphon* spp., z. B. *Acyrtosiphon pisum*, *Acrogonia* spp., *Aeneolamia* spp.,
Agonosцена spp., *Aleurocanthus* spp., *Aleyrodes proletella*, *Aleurolobus barodensis*, *Aleurothrixus*
floccosus, *Allocaridara malayensis*, *Amrasca* spp., z. B. *Amrasca bigutulla*, *Amrasca devastans*,
5 *Anuraphis cardui*, *Aonidiella* spp., z. B. *Aonidiella aurantii*, *Aonidiella citrina*, *Aonidiella inornata*,
Aphanostigma piri, *Aphis* spp., z. B. *Aphis citricola*, *Aphis craccivora*, *Aphis fabae*, *Aphis forbesi*,
Aphis glycines, *Aphis gossypii*, *Aphis hederæ*, *Aphis illinoisensis*, *Aphis middletoni*, *Aphis nasturtii*,
Aphis nerii, *Aphis pomi*, *Aphis spiraeicola*, *Aphis viburniphila*, *Arboridia apicalis*, *Arytainilla* spp.,
Aspidiella spp., *Aspidiotus* spp., z. B. *Aspidiotus nerii*, *Atanus* spp., *Aulacorthum solani*, *Bemisia*
10 *tabaci*, *Blastopsylla occidentalis*, *Boreioglycaspis melaleucæ*, *Brachycaudus helichrysi*, *Brachycolus*
spp., *Brevicoryne brassicae*, *Cacopsylla* spp., z. B. *Cacopsylla pyricola*, *Calligypona marginata*,
Capulinia spp., *Carneocephala fulgida*, *Ceratovacuna lanigera*, *Cercopidae*, *Ceroplastes* spp.,
Chaetosiphon fragaefolii, *Chionaspis tegalensis*, *Chlorita onukii*, *Chondracris rosea*, *Chromaphis*
juglandicola, *Chrysomphalus aonidum*, *Chrysomphalus ficus*, *Cicadulina mbila*, *Coccoxymylus halli*,
15 *Coccus* spp., z. B. *Coccus hesperidum*, *Coccus longulus*, *Coccus pseudomagnoliarum*, *Coccus viridis*,
Cryptomyzus ribis, *Cryptoneossa* spp., *Ctenarytaina* spp., *Dalbulus* spp., *Dialeurodes chittendeni*,
Dialeurodes citri, *Diaphorina citri*, *Diaspis* spp., *Diuraphis* spp., *Doralis* spp., *Drosicha* spp., *Dysaphis*
spp., z. B. *Dysaphis apiifolia*, *Dysaphis plantaginea*, *Dysaphis tulipæ*, *Dysmicoccus* spp., *Empoasca*
spp., z. B. *Empoasca abrupta*, *Empoasca fabae*, *Empoasca maligna*, *Empoasca solana*, *Empoasca*
20 *stevensi*, *Eriosoma* spp., z. B. *Eriosoma americanum*, *Eriosoma lanigerum*, *Eriosoma pyricola*,
Erythroneura spp., *Eucalyptolyma* spp., *Euphyllura* spp., *Euscelis bilobatus*, *Ferrisia* spp., *Fiorinia* spp.,
Furcaspis oceanica, *Geococcus coffeae*, *Glycaspis* spp., *Heteropsylla cubana*, *Heteropsylla spinulosa*,
Homalodisca coagulata, *Hyalopterus arundinis*, *Hyalopterus pruni*, *Icerya* spp., z. B. *Icerya purchasi*,
Idiocerus spp., *Idioscopus* spp., *Laodelphax striatellus*, *Lecanium* spp., z. B. *Lecanium corni*
25 (= *Parthenolecanium corni*), *Lepidosaphes* spp., z. B. *Lepidosaphes ulmi*, *Lipaphis erysimi*,
Lopholeucaspis japonica, *Lycorma delicatula*, *Macrosiphum* spp., z. B. *Macrosiphum euphorbiae*,
Macrosiphum lillii, *Macrosiphum rosae*, *Macrosteles facifrons*, *Mahanarva* spp., *Melanaphis sacchari*,
Metcalfiella spp., *Metcalfa pruinosa*, *Metopolophium dirhodum*, *Monellia costalis*, *Monelliopsis*
pecanis, *Myzus* spp., z. B. *Myzus ascalonicus*, *Myzus cerasi*, *Myzus ligustri*, *Myzus ornatus*, *Myzus*
30 *persicae*, *Myzus nicotianae*, *Nasonovia ribisnigri*, *Neomaskellia* spp., *Nephotettix* spp., z. B. *Nephotettix*
cincticeps, *Nephotettix nigropictus*, *Nettigoniella spectra*, *Nilaparvata lugens*, *Oncometopia* spp.,
Orthezia praelonga, *Oxya chinensis*, *Pachypsylla* spp., *Parabemisia myricæ*, *Paratrioza* spp., z. B.
Paratrioza cockerelli, *Parlatoria* spp., *Pemphigus* spp., z. B. *Pemphigus bursarius*, *Pemphigus*
populivænae, *Peregrinus maidis*, *Perkinsiella* spp., *Phenacoccus* spp., z. B. *Phenacoccus madeirensis*,
35 *Phloeomyzus passerinii*, *Phorodon humuli*, *Phylloxera* spp., z. B. *Phylloxera devastatrix*, *Phylloxera*
notabilis, *Pinnaspis aspidistrae*, *Planococcus* spp., z. B. *Planococcus citri*, *Prosopidopsylla flava*,
Protopulvinaria pyriformis, *Pseudaulacaspis pentagona*, *Pseudococcus* spp., z. B. *Pseudococcus*
calceolariae, *Pseudococcus comstocki*, *Pseudococcus longispinus*, *Pseudococcus maritimus*,

Pseudococcus viburni, Psyllopsis spp., Psylla spp., z. B. Psylla buxi, Psylla mali, Psylla pyri, Pteromalus spp., Pulvinaria spp., Pyrilla spp., Quadraspidiotus spp., z. B. Quadraspidiotus juglansregiae, Quadraspidiotus ostreaeformis, Quadraspidiotus perniciosus, Quesada gigas, Rastrococcus spp., Rhopalosiphum spp., z. B. Rhopalosiphum maidis, Rhopalosiphum oxyacanthae, Rhopalosiphum padi, 5 Rhopalosiphum rufiabdominale, Saissetia spp., z. B. Saissetia coffeae, Saissetia miranda, Saissetia neglecta, Saissetia oleae, Scaphoideus titanus, Schizaphis graminum, Selenaspidus articulatus, Siphia flava, Sitobion avenae, Sogata spp., Sogatella furcifera, Sogatodes spp., Stictocephala festina, Siphoninus phillyrae, Tenalaphara malayensis, Tetragonocephala spp., Tinocallis caryaefoliae, Tomaspis spp., Toxoptera spp., z. B. Toxoptera aurantii, Toxoptera citricidus, Trialeurodes 10 vaporariorum, Trioza spp., z. B. Trioza diospyri, Typhlocyba spp., Unaspis spp., Viteus vitifolii, Zygina spp.;

aus der Unterordnung der Heteroptera z. B. Aelia spp., Anasa tristis, Antestiopsis spp., Boisea spp., Blissus spp., Calocoris spp., Campylomma livida, Cavelerius spp., Cimex spp., z. B. Cimex adjunctus, Cimex hemipterus, Cimex lectularius, Cimex pilosellus, Collaria spp., Creontiades dilutus, Dasynus 15 piperis, Dichelops furcatus, Diconocoris hewetti, Dysdercus spp., Euschistus spp., z. B. Euschistus heros, Euschistus servus, Euschistus tristigmus, Euschistus variolarius, Eurydema spp., Eurygaster spp., Halyomorpha halys, Heliopeltis spp., Horcias nobilellus, Leptocoris spp., Leptocoris varicornis, Leptoglossus occidentalis, Leptoglossus phyllopus, Lygocoris spp., z. B. Lygocoris pabulinus, Lygus spp., z. B. Lygus elisus, Lygus hesperus, Lygus lineolaris, Macropes excavatus, Megacopta cribraria, 20 Miridae, Monalonion atratum, Nezara spp., z. B. Nezara viridula, Nysius spp., Oebalus spp., Pentomidae, Piesma quadrata, Piezodorus spp., z. B. Piezodorus guildinii, Psallus spp., Pseudacysta persea, Rhodnius spp., Sahlbergella singularis, Scaptocoris castanea, Scotinophora spp., Stephanitis nashi, Tibraca spp., Triatoma spp.;

aus der Ordnung der Hymenoptera z. B. Acromyrmex spp., Athalia spp., z. B. Athalia rosae, Atta spp., 25 Camponotus spp., Dolichovespula spp., Diprion spp., z. B. Diprion similis, Hoplocampa spp., z. B. Hoplocampa cookei, Hoplocampa testudinea, Lasius spp., Linepithema (Iridomyrmex) humile, Monomorium pharaonis, Paratrechina spp., Paravespula spp., Plagiolepis spp., Sirex spp., Solenopsis invicta, Tapinoma spp., Technomyrmex albipes, Urocerus spp., Vespa spp., z. B. Vespa crabro, Wasmannia auropunctata, Xeris spp.;

30 aus der Ordnung der Isopoda z. B. Armadillidium vulgare, Oniscus asellus, Porcellio scaber;

aus der Ordnung der Isoptera z. B. Coptotermes spp., z. B. Coptotermes formosanus, Cornitermes cumulans, Cryptotermes spp., Incisitermes spp., Kalotermites spp., Microtermes obesi, Nasutitermis spp., Odontotermes spp., Porotermes spp., Reticulitermes spp., z. B. Reticulitermes flavipes, Reticulitermes hesperus;

- aus der Ordnung der Lepidoptera z. B. *Achroia grisella*, *Acronicta major*, *Adoxophyes* spp., z. B. *Adoxophyes orana*, *Aedia leucomelas*, *Agrotis* spp., z. B. *Agrotis segetum*, *Agrotis ipsilon*, *Alabama* spp., z. B. *Alabama argillacea*, *Amyelois transitella*, *Anarsia* spp., *Anticarsia* spp., z. B. *Anticarsia gemmatalis*, *Argyroplote* spp., *Autographa* spp., *Barathra brassicae*, *Blastodacna atra*, *Borbo cinnara*,
- 5 *Bucculatrix thurberiella*, *Bupalus piniarius*, *Busseola* spp., *Cacoecia* spp., *Caloptilia theivora*, *Capua reticulana*, *Carpocapsa pomonella*, *Carposina niponensis*, *Cheimatobia brumata*, *Chilo* spp., z. B. *Chilo plejadellus*, *Chilo suppressalis*, *Choreutis pariana*, *Choristoneura* spp., *Chrysodeixis chalcites*, *Clysia ambiguella*, *Cnaphalocerus* spp., *Cnaphalocrocis medinalis*, *Cnephasia* spp., *Conopomorpha* spp., *Conotrachelus* spp., *Copitarsia* spp., *Cydia* spp., z. B. *Cydia nigricana*, *Cydia pomonella*, *Dalaca*
- 10 *noctuides*, *Diaphania* spp., *Diparopsis* spp., *Diatraea saccharalis*, *Earias* spp., *Ecdytolopha aurantium*, *Elasmopalpus lignosellus*, *Eldana saccharina*, *Ephestia* spp., z. B. *Ephestia elutella*, *Ephestia kuehniella*, *Epinotia* spp., *Epiphyas postvittana*, *Erannis* spp., *Erschoviella musculana*, *Etiella* spp., *Eudocima* spp., *Eulia* spp., *Eupoecilia ambiguella*, *Euproctis* spp., z. B. *Euproctis chrysorrhoea*, *Euxoa* spp., *Feltia* spp., *Galleria mellonella*, *Gracillaria* spp., *Grapholitha* spp., z. B. *Grapholitha molesta*, *Grapholitha prunivora*,
- 15 *Hedylepta* spp., *Helicoverpa* spp., z. B. *Helicoverpa armigera*, *Helicoverpa zea*, *Heliethis* spp., z. B. *Heliethis virescens*, *Hofmannophila pseudospretella*, *Homoeosoma* spp., *Homona* spp., *Hyponomeuta padella*, *Kakivoria flavofasciata*, *Lampides* spp., *Laphygma* spp., *Laspeyresia molesta*, *Leucinodes orbonalis*, *Leucoptera* spp., z. B. *Leucoptera coffeella*, *Lithocolletis* spp., z. B. *Lithocolletis blancardella*, *Lithophane antennata*, *Lobesia* spp., z. B. *Lobesia botrana*, *Loxagrotis albicosta*, *Lymantria* spp., z. B.
- 20 *Lymantria dispar*, *Lyonetia* spp., z. B. *Lyonetia clerkella*, *Malacosoma neustria*, *Maruca testulalis*, *Mamestra brassicae*, *Melanitis leda*, *Mocis* spp., *Monopis obviella*, *Mythimna separata*, *Nemapogon cloacellus*, *Nymphula* spp., *Oiketicus* spp., *Omphisa* spp., *Operophtera* spp., *Oria* spp., *Orthaga* spp., *Ostrinia* spp., z. B. *Ostrinia nubilalis*, *Panolis flammea*, *Parnara* spp., *Pectinophora* spp., z. B. *Pectinophora gossypiella*, *Perileucoptera* spp., *Phthorimaea* spp., z. B. *Phthorimaea operculella*,
- 25 *Phyllocnistis citrella*, *Phyllonorycter* spp., z. B. *Phyllonorycter blancardella*, *Phyllonorycter crataegella*, *Pieris* spp., z. B. *Pieris rapae*, *Platynota stultana*, *Plodia interpunctella*, *Plusia* spp., *Plutella xylostella* (= *Plutella maculipennis*), *Prays* spp., *Prodenia* spp., *Protoparce* spp., *Pseudaletia* spp., z. B. *Pseudaletia unipuncta*, *Pseudoplusia includens*, *Pyrausta nubilalis*, *Rachiplusia nu*, *Schoenobius* spp., z. B. *Schoenobius bipunctifer*, *Scirpophaga* spp., z. B. *Scirpophaga innotata*, *Scotia segetum*, *Sesamia* spp., z.
- 30 *B. Sesamia inferens*, *Sparganothis* spp., *Spodoptera* spp., z. B. *Spodoptera eradiana*, *Spodoptera exigua*, *Spodoptera frugiperda*, *Spodoptera praefica*, *Stathmopoda* spp., *Stenoma* spp., *Stomopteryx subsecivella*, *Synanthedon* spp., *Tecia solanivora*, *Thaumetopoea* spp., *Thermesia gemmatalis*, *Tinea cloacella*, *Tinea pellionella*, *Tineola bisselliella*, *Tortrix* spp., *Trichophaga tapetzella*, *Trichoplusia* spp., z. B. *Trichoplusia ni*, *Tryporyza incertulas*, *Tuta absoluta*, *Virachola* spp.;
- 35 aus der Ordnung der Orthoptera oder Saltatoria z. B. *Acheta domesticus*, *Dichroplus* spp., *Gryllotalpa* spp., z. B. *Gryllotalpa gryllotalpa*, *Hieroglyphus* spp., *Locusta* spp., z. B. *Locusta migratoria*, *Melanoplus* spp., z. B. *Melanoplus devastator*, *Paratlanticus ussuriensis*, *Schistocerca gregaria*;

aus der Ordnung der Phthiraptera z. B. *Damalinia* spp., *Haematopinus* spp., *Linognathus* spp., *Pediculus* spp., *Phylloxera vastatrix*, *Phthirus pubis*, *Trichodectes* spp.;

aus der Ordnung der Psocoptera z. B. *Lepinotus* spp., *Liposcelis* spp.;

aus der Ordnung der Siphonaptera z. B. *Ceratophyllus* spp., *Ctenocephalides* spp., z. B. *Ctenocephalides* 5 *canis*, *Ctenocephalides felis*, *Pulex irritans*, *Tunga penetrans*, *Xenopsylla cheopis*;

aus der Ordnung der Thysanoptera z. B. *Anaphothrips obscurus*, *Baliothrips biformis*, *Chaetanaphothrips leeuweni*, *Drepanothrips reuteri*, *Enneothrips flavens*, *Frankliniella* spp., z. B. *Frankliniella fusca*, *Frankliniella occidentalis*, *Frankliniella schultzei*, *Frankliniella tritici*, *Frankliniella* 10 *vaccinii*, *Frankliniella williamsi*, *Haplothrips* spp., *Heliothrips* spp., *Hercinothrips femoralis*, *Kakothrips* spp., *Rhipiphorothrips cruentatus*, *Scirtothrips* spp., *Taeniothrips cardamomi*, *Thrips* spp., z. B. *Thrips palmi*, *Thrips tabaci*;

aus der Ordnung der Zygentoma (= Thysanura), z. B. *Ctenolepisma* spp., *Lepisma saccharina*, *Lepismodes inquilinus*, *Thermobia domestica*;

aus der Klasse der Symphyla z. B. *Scutigera* spp., z. B. *Scutigera immaculata*;

15 Schädlinge aus dem Stamm der Mollusca, z. B. aus der Klasse der Bivalvia, z. B. *Dreissena* spp.;

sowie aus der Klasse der Gastropoda z. B. *Arion* spp., z. B. *Arion ater rufus*, *Biomphalaria* spp., *Bulinus* spp., *Deroceras* spp., z. B. *Deroceras laeve*, *Galba* spp., *Lymnaea* spp., *Oncomelania* spp., *Pomacea* spp., *Succinea* spp.;

Pflanzenschädlinge aus dem Stamm der Nematoda, d. h. pflanzenparasitäre Nematoden, insbesondere 20 *Aglenchus* spp., z. B. *Aglenchus agricola*, *Anguina* spp., z. B. *Anguina tritici*, *Aphelenchoides* spp., z. B. *Aphelenchoides arachidis*, *Aphelenchoides fragariae*, *Belonolaimus* spp., z. B. *Belonolaimus gracilis*, *Belonolaimus longicaudatus*, *Belonolaimus nortoni*, *Bursaphelenchus* spp., z. B. *Bursaphelenchus cocophilus*, *Bursaphelenchus eremus*, *Bursaphelenchus xylophilus*, *Cacopaurus* spp., z. B. *Cacopaurus pestis*, *Criconemella* spp., z. B. *Criconemella curvata*, *Criconemella onoensis*, *Criconemella ornata*, 25 *Criconemella rusium*, *Criconemella xenoplax* (= *Mesocriconema xenoplax*), *Criconemoides* spp., z. B. *Criconemoides ferniae*, *Criconemoides onoense*, *Criconemoides ornatum*, *Ditylenchus* spp., z. B. *Ditylenchus dipsaci*, *Dolichodorus* spp., *Globodera* spp., z. B. *Globodera pallida*, *Globodera rostochiensis*, *Helicotylenchus* spp., z. B. *Helicotylenchus dihystra*, *Hemicriconemoides* spp., *Hemicycliophora* spp., *Heterodera* spp., z. B. *Heterodera avenae*, *Heterodera glycines*, *Heterodera* 30 *schachtii*, *Hirschmaniella* spp., *Hoplolaimus* spp., *Longidorus* spp., z. B. *Longidorus africanus*, *Meloidogyne* spp., z. B. *Meloidogyne chitwoodi*, *Meloidogyne fallax*, *Meloidogyne hapla*, *Meloidogyne incognita*, *Meloinema* spp., *Nacobbus* spp., *Neotylenchus* spp., *Paralongidorus* spp., *Paraphelenchus* spp., *Paratrichodorus* spp., z. B. *Paratrichodorus minor*, *Paratylenchus* spp., *Pratylenchus* spp., z. B.

- Pratylenchus penetrans, Pseudohalenchus spp., Psilenchus spp., Punctodera spp., Quinisulcius spp., Radopholus spp., z. B. Radopholus citrophilus, Radopholus similis, Rotylenchulus spp., Rotylenchus spp., Scutellonema spp., Subanguina spp., Trichodorus spp., z. B. Trichodorus obtusus, Trichodorus primitivus, Tylenchorhynchus spp., z. B. Tylenchorhynchus annulatus, Tylenchulus spp., z. B. Tylenchulus semipenetrans, Xiphinema spp., z. B. Xiphinema index.

- Die Verbindungen der Formel (I) können gegebenenfalls in bestimmten Konzentrationen bzw. Aufwandmengen auch als Herbizide, Safener, Wachstumsregulatoren oder Mittel zur Verbesserung der Pflanzeigenschaften, als Mikrobizide oder Gametozide, beispielsweise als Fungizide, Antimykotika, Bakterizide, Virizide (einschließlich Mittel gegen Viroide) oder als Mittel gegen MLO (Mycoplasma-like-organism) und RLO (Rickettsia-like-organism) verwendet werden. Sie lassen sich gegebenenfalls auch als Zwischen- oder Vorprodukte für die Synthese weiterer Wirkstoffe einsetzen.

Formulierungen

- Die vorliegende Erfindung betrifft weiterhin Formulierungen und daraus bereitete Anwendungsformen als Schädlingsbekämpfungsmittel wie z. B. Drench-, Drip- und Spritzbrühen, umfassend mindestens eine Verbindung der Formel (I). Gegebenenfalls enthalten die Anwendungsformen weitere Schädlingsbekämpfungsmittel und/oder die Wirkung verbessernde Adjuvantien wie Penetrationsförderer, z. B. pflanzliche Öle wie beispielsweise Rapsöl, Sonnenblumenöl, Mineralöle wie beispielsweise Paraffinöle, Alkylester pflanzlicher Fettsäuren wie beispielsweise Rapsöl- oder Sojaölmethylester oder Alkanol-alkoxylate und/oder Spreitmittel wie beispielsweise Alkylsiloxane und/oder Salze, z. B. organische oder anorganische Ammonium- oder Phosphoniumsalze wie beispielsweise Ammoniumsulfat oder Diammonium-hydrogenphosphat und/oder die Retention fördernde Mittel wie z. B. Dioctylsulfosuccinat oder Hydroxypropyl-guar-Polymere und/oder Humectants wie z. B. Glycerin und/oder Dünger wie beispielsweise Ammonium, Kalium oder Phosphor enthaltende Dünger.
- Übliche Formulierungen sind beispielsweise wasserlösliche Flüssigkeiten (SL), Emulsionskonzentrate (EC), Emulsionen in Wasser (EW), Suspensionskonzentrate (SC, SE, FS, OD), in Wasser dispergierbare Granulate (WG), Granulate (GR) und Kapselkonzentrate (CS); diese und weitere mögliche Formuliertypen sind beispielsweise durch Crop Life International und in Pesticide Specifications, Manual on development and use of FAO and WHO specifications for pesticides, FAO Plant Production and Protection Papers – 173, prepared by the FAO/WHO Joint Meeting on Pesticide Specifications, 2004, ISBN: 9251048576 beschrieben. Gegebenenfalls enthalten die Formulierungen neben einer oder mehreren Verbindungen der Formel (I) weitere agrochemische Wirkstoffe.

- Vorzugsweise handelt es sich um Formulierungen oder Anwendungsformen, welche Hilfsstoffe wie beispielsweise Streckmittel, Lösemittel, Spontanitätsförderer, Trägerstoffe, Emulgiermittel, Dispergiermittel, Frostschutzmittel, Biozide, Verdicker und/oder weitere Hilfsstoffe wie beispielsweise

Adjuvantien enthalten. Ein Adjuvant in diesem Kontext ist eine Komponente, die die biologische Wirkung der Formulierung verbessert, ohne dass die Komponente selbst eine biologische Wirkung hat. Beispiele für Adjuvantien sind Mittel, die die Retention, das Spreitverhalten, das Anhaften an der Blattoberfläche oder die Penetration fördern.

- 5 Diese Formulierungen werden in bekannter Weise hergestellt, z. B. durch Vermischen der Verbindungen der Formel (I) mit Hilfsstoffen wie beispielsweise Streckmitteln, Lösemitteln und/oder festen Trägerstoffen und/oder weiteren Hilfsstoffen wie beispielsweise oberflächenaktiven Stoffen. Die Herstellung der Formulierungen erfolgt entweder in geeigneten Anlagen oder auch vor oder während der Anwendung.
- 10 Als Hilfsstoffe können solche Stoffe Verwendung finden, die geeignet sind, der Formulierung der Verbindungen der Formel (I) oder den aus diesen Formulierungen bereiteten Anwendungsformen (wie z. B. gebrauchsfähigen Schädlingsbekämpfungsmitteln wie Spritzbrühen oder Saatgutbeizen) besondere Eigenschaften, wie bestimmte physikalische, technische und/oder biologische Eigenschaften zu verleihen.
- 15 Als Streckmittel eignen sich z. B. Wasser, polare und unpolare organische chemische Flüssigkeiten z. B. aus den Klassen der aromatischen und nicht-aromatischen Kohlenwasserstoffe (wie Paraffine, Alkylbenzole, Alkyl-naphthaline, Chlorbenzole), der Alkohole und Polyole (die ggf. auch substituiert, verethert und/oder verestert sein können), der Ketone (wie Aceton, Cyclohexanon), Ester (auch Fette und Öle) und (Poly-)Ether, der einfachen und substituierten Amine, Amide, Lactame (wie N-
- 20 Alkylpyrrolidone) und Lactone, der Sulfone und Sulfoxide (wie Dimethylsulfoxid).

- Im Falle der Benutzung von Wasser als Streckmittel können z. B. auch organische Lösemittel als Hilfslösemittel verwendet werden. Als flüssige Lösemittel kommen im Wesentlichen infrage: Aromaten wie Xylol, Toluol oder Alkyl-naphthaline, chlorierte Aromaten oder chlorierte aliphatische Kohlenwasserstoffe wie Chlorbenzole, Chlorethylene oder Methylenchlorid, aliphatische
- 25 Kohlenwasserstoffe, wie Cyclohexan oder Paraffine, z. B. Erdölfractionen, mineralische und pflanzliche Öle, Alkohole wie Butanol oder Glykol sowie deren Ether und Ester, Ketone wie Aceton, Methylethylketon, Methylisobutylketon oder Cyclohexanon, stark polare Lösemittel wie Dimethylformamid und Dimethylsulfoxid sowie Wasser.

- Grundsätzlich können alle geeigneten Lösemittel verwendet werden. Geeignete Lösemittel sind
- 30 beispielsweise aromatische Kohlenwasserstoffe wie z. B. Xylol, Toluol oder Alkyl-naphthaline, chlorierte aromatische oder chlorierte aliphatische Kohlenwasserstoffe wie z. B. Chlorbenzol, Chlorethylen, oder Methylenchlorid, aliphatische Kohlenwasserstoffe wie z. B. Cyclohexan, Paraffine, Erdölfractionen, mineralische und pflanzliche Öle, Alkohole wie z. B. Methanol, Ethanol, iso-Propanol, Butanol oder Glykol sowie deren Ether und Ester, Ketone wie z. B. Aceton, Methylethylketon,
- 35 Methylisobutylketon oder Cyclohexanon, stark polare Lösemittel wie Dimethylsulfoxid sowie Wasser.

Grundsätzlich können alle geeigneten Trägerstoffe eingesetzt werden. Als Trägerstoffe kommen insbesondere infrage: z. B. Ammoniumsalze und natürliche Gesteinsmehle wie Kaoline, Tonerden, Talkum, Kreide, Quarz, Attapulgit, Montmorillonit oder Diatomeenerde und synthetische Gesteinsmehle, wie hochdisperse Kieselsäure, Aluminiumoxid und natürliche oder synthetische Silikate, Harze, Wachse und/oder feste Düngemittel. Mischungen solcher Trägerstoffe können ebenfalls verwendet werden. Als Trägerstoffe für Granulate kommen infrage: z. B. gebrochene und fraktionierte natürliche Gesteine wie Calcit, Marmor, Bims, Sepiolith, Dolomit sowie synthetische Granulate aus anorganischen und organischen Mehlen sowie Granulate aus organischem Material wie Sägemehl, Papier, Kokosnussschalen, Maiskolben und Tabakstängel.

- 10 Auch verflüssigte gasförmige Streckmittel oder Lösemittel können eingesetzt werden. Insbesondere eignen sich solche Streckmittel oder Trägerstoffe, welche bei normaler Temperatur und unter Normaldruck gasförmig sind, z. B. Aerosol-Treibgase wie Halogenkohlenwasserstoffe sowie Butan, Propan, Stickstoff und Kohlendioxid.

- Beispiele für Emulgier- und/oder Schaum erzeugende Mittel, Dispergiermittel oder Benetzungsmittel mit ionischen oder nicht-ionischen Eigenschaften oder Mischungen dieser oberflächenaktiven Stoffe sind Salze von Polyacrylsäure, Salze von Lignosulfonsäure, Salze von Phenolsulfonsäure oder Naphthalinsulfonsäure, Polykondensate von Ethylenoxid mit Fettalkoholen oder mit Fettsäuren oder mit Fettaminen, mit substituierten Phenolen (vorzugsweise Alkylphenole oder Arylphenole), Salze von Sulfobernsteinsäureestern, Taurinderivate (vorzugsweise Alkyltaurate), Phosphorsäureester von polyethoxylierten Alkoholen oder Phenolen, Fettsäureester von Polyolen und Derivate der Verbindungen enthaltend Sulfate, Sulfonate und Phosphate, z. B. Alkylarylpolyglycolether, Alkylsulfonate, Alkylsulfate, Arylsulfonate, Eiweißhydrolysate, Lignin-Sulfitablaugen und Methylcellulose. Die Anwesenheit einer oberflächenaktiven Substanz ist vorteilhaft, wenn eine der Verbindungen der Formel (I) und/oder einer der inerten Trägerstoffe nicht in Wasser löslich ist und wenn die Anwendung in Wasser erfolgt.

Als weitere Hilfsstoffe können in den Formulierungen und den daraus abgeleiteten Anwendungsformen Farbstoffe wie anorganische Pigmente, z. B. Eisenoxid, Titanoxid, Ferrocyanblau und organische Farbstoffe wie Alizarin-, Azo- und Metallphthalocyaninfarbstoffe und Nähr- und Spurennährstoffe wie Salze von Eisen, Mangan, Bor, Kupfer, Kobalt, Molybdän und Zink vorhanden sein.

- 30 Weiterhin enthalten sein können Stabilisatoren wie Kältestabilisatoren, Konservierungsmittel, Oxidationsschutzmittel, Lichtschutzmittel oder andere die chemische und/oder physikalische Stabilität verbessernde Mittel. Weiterhin enthalten sein können schaum erzeugende Mittel oder Entschäumer.

- Ferner können die Formulierungen und daraus abgeleiteten Anwendungsformen als zusätzliche Hilfsstoffe auch Haftmittel wie Carboxymethylcellulose, natürliche und synthetische pulverige, körnige oder latexförmige Polymere enthalten wie Gummiarabikum, Polyvinylalkohol, Polyvinylacetat sowie

natürliche Phospholipide wie Kephalline und Lecithine und synthetische Phospholipide. Weitere Hilfsstoffe können mineralische und pflanzliche Öle sein.

Gegebenenfalls können noch weitere Hilfsstoffe in den Formulierungen und den daraus abgeleiteten Anwendungsformen enthalten sein. Solche Zusatzstoffe sind beispielsweise Duftstoffe, schützende Kolloide, Bindemittel, Klebstoffe, Verdicker, thixotrope Stoffe, Penetrationsförderer, Retentionsförderer, Stabilisatoren, Sequestermittel, Komplexbildner, Feuchthaltemittel, Spreitmittel. Im Allgemeinen können die Verbindungen der Formel (I) mit jedem festen oder flüssigen Zusatzstoff, welcher für Formulierungszwecke gewöhnlich verwendet wird, kombiniert werden.

Als Retentionsförderer kommen alle diejenigen Substanzen in Betracht, die die dynamische Oberflächenspannung verringern wie beispielsweise Dioctylsulfosuccinat oder die die Visko-Elastizität erhöhen wie beispielsweise Hydroxypropyl-guar-Polymere.

Als Penetrationsförderer kommen im vorliegenden Zusammenhang alle diejenigen Substanzen in Betracht, die üblicherweise eingesetzt werden, um das Eindringen von agrochemischen Wirkstoffen in Pflanzen zu verbessern. Penetrationsförderer werden in diesem Zusammenhang dadurch definiert, dass sie aus der (in der Regel wässrigen) Applikationsbrühe und/oder aus dem Spritzbelag in die Kutikula der Pflanze eindringen und dadurch die Beweglichkeit der Wirkstoffe in der Kutikula erhöhen können. Die in der Literatur (Baur et al., 1997, Pesticide Science 51, 131-152) beschriebene Methode kann zur Bestimmung dieser Eigenschaft eingesetzt werden. Beispielhaft werden genannt Alkoholalkoxylate wie beispielsweise Kokosfettethoxylat (10) oder Isotridecylethoxylat (12), Fettsäureester wie beispielsweise Rapsöl- oder Sojaölmethylester, Fettaminalkoxylate wie beispielsweise Tallowamine-ethoxylat (15) oder Ammonium- und/oder Phosphonium-Salze wie beispielsweise Ammoniumsulfat oder Diammonium-hydrogenphosphat.

Die Formulierungen enthalten bevorzugt zwischen 0,00000001 und 98 Gew.-% der Verbindung der Formel (I), besonders bevorzugt zwischen 0,01 und 95 Gew.-% der Verbindung der Formel (I), ganz besonders bevorzugt zwischen 0,5 und 90 Gew.-% der Verbindung der Formel (I), bezogen auf das Gewicht der Formulierung.

Der Gehalt an der Verbindung der Formel (I) in den aus den Formulierungen bereiteten Anwendungsformen (insbesondere Schädlingsbekämpfungsmittel) kann in weiten Bereichen variieren. Die Konzentration der Verbindung der Formel (I) in den Anwendungsformen kann üblicherweise zwischen 0,00000001 und 95 Gew.-% der Verbindung der Formel (I), vorzugsweise zwischen 0,00001 und 1 Gew.-%, bezogen auf das Gewicht der Anwendungsform, liegen. Die Anwendung geschieht in einer den Anwendungsformen angepaßten üblichen Weise.

Mischungen

Die Verbindungen der Formel (I) können auch in Mischung mit einem oder mehreren geeigneten Fungiziden, Bakteriziden, Akariziden, Molluskiziden, Nematiziden, Insektiziden, Mikrobiologika, Nützlingen, Herbiziden, Düngemitteln, Vogelrepellentien, Phytotonics, Sterilantien, Safenern, Semiochemicals und/oder Pflanzenwachstumsregulatoren verwendet werden, um so z. B. das Wirkungsspektrum zu verbreitern, die Wirkdauer zu verlängern, die Wirkgeschwindigkeit zu steigern, Repellenz zu verhindern oder Resistenzentwicklungen vorzubeugen. Des Weiteren können solche Wirkstoffkombinationen das Pflanzenwachstum und/oder die Toleranz gegenüber abiotischen Faktoren wie z. B. hohen oder niedrigen Temperaturen, gegen Trockenheit oder gegen erhöhten Wasser- bzw. Bodensalzgehalt verbessern. Auch lässt sich das Blüh- und Fruchtverhalten verbessern, die Keimfähigkeit und Bewurzelung optimieren, die Ernte erleichtern und Ernteertrag steigern, die Reife beeinflussen, die Qualität und/oder der Ernährungswert der Ernteprodukte steigern, die Lagerfähigkeit verlängern und/oder die Bearbeitbarkeit der Ernteprodukte verbessern.

Weiterhin können die Verbindungen der Formel (I) in Mischung mit weiteren Wirkstoffen oder Semiochemicals, wie Lockstoffen und/oder Vogelrepellentien und/oder Pflanzenaktivatoren und/oder Wachstumsregulatoren und/oder Düngemitteln vorliegen. Gleichfalls können die Verbindungen der Formel (I) zur Verbesserung der Pflanzeigenschaften wie zum Beispiel Wuchs, Ertrag und Qualität des Erntegutes eingesetzt werden.

In einer besonderen erfindungsgemäßen Ausführungsform liegen die Verbindungen der Formel (I) in Formulierungen bzw. in den aus diesen Formulierungen bereiteten Anwendungsformen in Mischung mit weiteren Verbindungen vor, vorzugsweise solchen wie nachstehend beschrieben.

Wenn eine der im Folgenden genannten Verbindungen in verschiedenen tautomeren Formen vorkommen kann, sind auch diese Formen mit umfasst, auch wenn sie sie nicht in jedem Fall explizit genannt wurden. Alle genannten Mischungspartner können außerdem, wenn sie auf Grund ihrer funktionellen Gruppen dazu imstande sind, gegebenenfalls mit geeigneten Basen oder Säuren Salze bilden.

Insektizide/Akarizide/Nematizide

Die hier mit ihrem „Common Name“ genannten Wirkstoffe sind bekannt und beispielsweise im Pestizidhandbuch („The Pesticide Manual“ 16th Ed., British Crop Protection Council 2012) beschrieben oder im Internet recherchierbar (z. B. <http://www.alanwood.net/pesticides>). Die Klassifizierung basiert auf dem zum Zeitpunkt der Einreichung dieser Patentanmeldung gültigen IRAC Mode of Action Classification Scheme.

(1) Acetylcholinesterase(AChE)-Inhibitoren, wie beispielsweise Carbamate, z. B. Alanycarb, Aldicarb, Bendiocarb, Benfuracarb, Butocarboxim, Butoxycarboxim, Carbaryl, Carbofuran, Carbosulfan,

Ethiofencarb, Fenobucarb, Formetanate, Furathiocarb, Isoprocarb, Methiocarb, Methomyl, Metolcarb, Oxamyl, Pirimicarb, Propoxur, Thiodicarb, Thiofanox, Triazamate, Trimethacarb, XMC und Xylylcarb oder Organophosphate, z. B. Acephat, Azamethiphos, Azinphos-ethyl, Azinphos-methyl, Cadusafos, Chlorethoxyfos, Chlorfenvinphos, Chlormephos, Chlorpyrifos-methyl, Coumaphos, Cyanophos, Demeton-S-methyl, Diazinon, Dichlorvos/DDVP, Dicrotophos, Dimethoat, Dimethylvinphos, Disulfoton, EPN, Ethion, Ethoprophos, Famphur, Fenamiphos, Fenitrothion, Fenthion, Fosthiazat, Heptenophos, Imicyafos, Isafenphos, Isopropyl-O-(methoxyaminothio-phosphoryl)salicylat, Isoxathion, Malathion, Mecarbam, Methamidophos, Methidathion, Mevinphos, Monocrotophos, Naled, Omethoate, Oxydemeton-methyl, Parathion-methyl, Phenthoat, Phorat, Phosalon, Phosmet, Phosphamidon, Phoxim, Pirimiphos-methyl, Profenofos, Propetamphos, Prothiofos, Pyraclofos, Pyridaphenthion, Quinalphos, Sulfotep, Tebupirimfos, Temephos, Terbufos, Tetrachlorvinphos, Thiometon, Triazophos, Triclorfon und Vamidothion.

(2) GABA-gesteuerte Chlorid-Kanal-Blocker, wie beispielsweise Cyclodien-organochlorine, z. B. Chlordan und Endosulfan oder Phenylpyrazole (Fiprole), z. B. Ethiprol und Fipronil.

(3) Natrium-Kanal-Modulatoren, wie beispielsweise Pyrethroide, z. B. Acrinathrin, Allethrin, d-cis-trans-Allethrin, d-trans-Allethrin, Bifenthrin, Bioallethrin, Bioallethrin-S-cyclopentenyl-Isomer, Bioresmethrin, Cycloprothrin, Cyfluthrin, beta-Cyfluthrin, Cyhalothrin, lambda-Cyhalothrin, gamma-Cyhalothrin, Cypermethrin, alpha-Cypermethrin, beta-Cypermethrin, theta-Cypermethrin, zeta-Cypermethrin, Cyphenothrin [(1R)-trans-Isomer], Deltamethrin, Empenthrin [(EZ)-(1R)-Isomer], Esfenvalerat, Etofenprox, Fenpropathrin, Fenvalerat, Flucythrinat, Flumethrin, tau-Fluvalinat, Halfenprox, Imiprothrin, Kadethrin, Momfluorthrin, Permethrin, Phenothrin [(1R)-trans-Isomer], Prallethrin, Pyrethrine (pyrethrum), Resmethrin, Silafluofen, Tefluthrin, Tetramethrin, Tetramethrin [(1R)-Isomer], Tralomethrin und Transfluthrin oder DDT oder Methoxychlor.

(4) Kompetitive Modulatoren des nicotinischen Acetylcholin-Rezeptors (nAChR), wie beispielsweise Neonicotinoide, z. B. Acetamiprid, Clothianidin, Dinotefuran, Imidacloprid, Nitenpyram, Thiacloprid und Thiamethoxam oder Nicotin oder Sulfoxaflor oder Flupyradifurone.

(5) Allosterische Modulatoren des nicotinischen Acetylcholin-Rezeptors (nAChR), wie beispielsweise Spinosyne, z. B. Spinetoram und Spinosad.

(6) Allosterische Modulatoren des Glutamat-abhängigen Chloridkanals(GluCl), wie beispielsweise Avermectine/Milbemycine, z. B. Abamectin, Eamectin-benzoat, Lepimectin und Milbemectin.

(7) Juvenilhormon-Mimetika, wie beispielsweise Juvenilhormon-Analoga, z. B. Hydropren, Kinopren und Methopren oder Fenoxycarb oder Pyriproxyfen.

- (8) Verschiedene nicht spezifische (multi-site) Inhibitoren, wie beispielsweise Alkylhalogenide, z. B. Methylbromid und andere Alkylhalogenide; oder Chloropicrin oder Sulfurylfluorid oder Borax oder Brechweinstein oder Methylisocyanaterzeuger, z. B. Diazomet und Metam.
- (9) Modulatoren chordotonaler Organe, z. B. Pymetrozin oder Flonicamid.
- 5 (10) Milbenwachstumsinhibitoren, wie z. B. Clofentezin, Hexythiazox und Diflovidazin oder Etoxazol.
- (11) Mikrobielle Disruptoren der Insektendarmmembran, wie z. B. *Bacillus thuringiensis* Subspezies *israelensis*, *Bacillus sphaericus*, *Bacillus thuringiensis* Subspezies *aizawai*, *Bacillus thuringiensis* Subspezies *kurstaki*, *Bacillus thuringiensis* Subspezies *tenebrionis* und *B.t.*-Pflanzenproteine: Cry1Ab, Cry1Ac, Cry1Fa, Cry1A.105, Cry2Ab, VIP3A, mCry3A, Cry3Ab, Cry3Bb, Cry34Ab1/35Ab1.
- 10 (12) Inhibitoren der mitochondrialen ATP-Synthase, wie ATP-Disruptoren, wie beispielsweise Diafenthiuron oder Organozinnverbindungen, z. B. Azocyclotin, Cyhexatin und Fenbutatin-oxid oder Propargit oder Tetradifon.
- (13) Entkoppler der oxidativen Phosphorylierung durch Störung des Protonengradienten, wie beispielsweise Chlorfenapyr, DNOC und Sulfluramid.
- 15 (14) Blocker des nicotinischen Acetylcholinrezeptorkanals, wie beispielsweise Bensultap, Cartap-hydrochlorid, Thiocyclam und Thiosultap-Natrium.
- (15) Inhibitoren der Chitinbiosynthese, Typ 0, wie beispielsweise Bistrifluron, Chlorfluazuron, Diflubenzuron, Flucycloxuron, Flufenoxuron, Hexaflumuron, Lufenuron, Novaluron, Noviflumuron, Teflubenzuron und Triflumuron.
- 20 (16) Inhibitoren der Chitinbiosynthese, Typ 1, wie beispielsweise Buprofezin.
- (17) Häutungsdisruptor (insbesondere bei Dipteren, d. h. Zweiflüglern), wie beispielsweise Cyromazin.
- (18) Ecdyson-Rezeptor-Agonisten, wie beispielsweise Chromafenozid, Halofenozid, Methoxyfenozid und Tebufenozid.
- (19) Oktopamin-Rezeptor-Agonisten, wie beispielsweise Amitraz.
- 25 (20) Mitochondriale Komplex-III-Elektronentransportinhibitoren, wie beispielsweise Hydramethylnon oder Acequinocyl oder Fluacrypyrim.
- (21) Mitochondriale Komplex-I-Elektronentransportinhibitoren, wie beispielsweise METI-Akarizide, z. B. Fenazaquin, Fenpyroximat, Pyrimidifen, Pyridaben, Tebufenpyrad und Tolfenpyrad oder Rotenon (Derris).

(22) Blocker des spannungsabhängigen Natriumkanals, wie z. B. Indoxacarb oder Metaflumizone.

(23) Inhibitoren der Acetyl-CoA-Carboxylase, wie beispielsweise Tetron- und Tetramsäurederivate, z. B. Spirodiclofen, Spiromesifen und Spirotetramat.

(24) Inhibitoren des mitochondrialen Komplex-IV-Elektronentransports, wie beispielsweise Phosphine, z. B. Aluminiumphosphid, Calciumphosphid, Phosphin und Zinkphosphid oder Cyanide, Calciumcyanid, Kaliumcyanid und Natriumcyanid.

(25) Inhibitoren des mitochondrialen Komplex-II-Elektronentransports, wie beispielsweise beta-Ketonitrilderivate, z. B. Cyenopyrafen und Cyflumetofen und Carboxanilide, wie beispielsweise Pyflubumid.

(28) Ryanodinrezeptor-Modulatoren, wie beispielsweise Diamide, z. B. Chlorantraniliprol, Cyantraniliprol und Flubendiamid,

weitere Wirkstoffe wie beispielsweise Afidopyropen, Afoxolaner, Azadirachtin, Benclothiaz, Benzoximat, Bifenazat, Broflanilid, Bromopropylat, Chinomethionat, Chloroprallethrin, Cryolit, Cyclaniliprol, Cycloxaprid, Cyhalodiamid, Dicloromezotiaz, Dicofol, epsilon-Metofluthrin, epsilon-Momfluthrin, Flometoquin, Fluazaindolin, Fluensulfon, Flufenerim, Flufenoxystrobin, Flufiprol, Fluhexafon, Fluopyram, Fluralaner, Fluxametamid, Fufenozid, Guadipyr, Heptafluthrin, Imidaclothiz, Iprodione, kappa-Bifenthrin, kappa-Tefluthrin, Lotilaner, Meperfluthrin, Paichongding, Pyridalyl, Pyrifluquinazon, Pyriminostrobin, Spirobudiclofen, Tetramethylfluthrin, Tetraniliprol, Tetrachlorantraniliprol, Tioxazafen, Thiofluoximat, Triflumezopyrim und Iodmethan; des Weiteren

Präparate auf Basis von *Bacillus firmus* (I-1582, BioNeem, Votivo), sowie folgende Verbindungen: 1-{2-Fluor-4-methyl-5-[(2,2,2-trifluorethyl)sulfinyl]phenyl}-3-(trifluormethyl)-1H-1,2,4-triazol-5-amin (bekannt aus WO2006/043635) (CAS 885026-50-6), {1'-[(2E)-3-(4-Chlorphenyl)prop-2-en-1-yl]-5-fluorspiro[indol-3,4'-piperidin]-1(2H)-yl}(2-chlorpyridin-4-yl)methanon (bekannt aus WO2003/106457) (CAS 637360-23-7), 2-Chlor-N-[2-{1'-[(2E)-3-(4-chlorphenyl)prop-2-en-1-yl]piperidin-4-yl}-4-(trifluormethyl)phenyl]isonicotinamid (bekannt aus WO2006/003494) (CAS 872999-66-1), 3-(4-Chlor-2,6-dimethylphenyl)-4-hydroxy-8-methoxy-1,8-diazaspiro[4.5]dec-3-en-2-on (bekannt aus WO 2010052161) (CAS 1225292-17-0), 3-(4-Chlor-2, 6-dimethylphenyl)-8-methoxy-2-oxo-1,8-diazaspiro[4.5]dec-3-en-4-yl-ethylcarbonat (bekannt aus EP 2647626) (CAS-1440516-42-6), 4-(But-2-in-1-yloxy)-6-(3,5-dimethylpiperidin-1-yl)-5-fluorpyrimidin (bekannt aus WO2004/099160) (CAS 792914-58-0), PF1364 (bekannt aus JP2010/018586) (CAS-Reg.No. 1204776-60-2), N-[(2E)-1-[(6-Chlorpyridin-3-yl)methyl]pyridin-2(1H)-yliden]-2,2,2-trifluoracetamid (bekannt aus WO2012/029672) (CAS 1363400-41-2), (3E)-3-[1-[(6-Chlor-3-pyridyl)methyl]-2-pyridyliden]-1,1,1-trifluorpropan-2-on (bekannt aus WO2013/144213) (CAS 1461743-15-6), N-[3-(Benzylcarbamoyl)-4-chlorphenyl]-1-methyl-3-(pentafluorethyl)-4-(trifluormethyl)-1H-pyrazol-5-carboxamid (bekannt aus WO2010/051926) (CAS 1226889-14-0), 5-Brom-4-chlor-N-[4-chlor-2-methyl-6-(methylcarbamoyl)phenyl]-2-(3-chlor-2-

pyridyl)pyrazol-3-carboxamid (bekannt aus CN103232431) (CAS 1449220-44-3), 4-[5-(3,5-Dichlorphenyl)-4,5-dihydro-5-(trifluormethyl)-3-isoxazolyl]-2-methyl-N-(cis-1-oxido-3-thietanyl)benzamid, 4-[5-(3,5-Dichlorphenyl)-4,5-dihydro-5-(trifluormethyl)-3-isoxazolyl]-2-methyl-N-(trans-1-oxido-3-thietanyl)benzamid und 4-[(5S)-5-(3,5-Dichlorphenyl)-4,5-dihydro-5-(trifluormethyl)-3-isoxazolyl]-2-methyl-N-(cis-1-oxido-3-thietanyl)benzamid (bekannt aus WO 2013/050317 A1) (CAS 1332628-83-7),

5 N-[3-Chlor-1-(3-pyridinyl)-1H-pyrazol-4-yl]-N-ethyl-3-[(3,3,3-trifluorpropyl)sulfinyl]propanamid, (+)-N-[3-Chlor-1-(3-pyridinyl)-1H-pyrazol-4-yl]-N-ethyl-3-[(3,3,3-trifluorpropyl)sulfinyl]propanamid und (-)-N-[3-Chlor-1-(3-pyridinyl)-1H-pyrazol-4-yl]-N-ethyl-3-[(3,3,3-trifluorpropyl)sulfinyl]propanamid (bekannt aus WO 2013/162715 A2, WO 2013/162716 A2, US 2014/0213448 A1) (CAS 1477923-37-7), 5-[[2-(2E)-3-Chlor-2-propen-1-yl]amino]-1-[2,6-dichlor-4-(trifluormethyl)phenyl]-4-[(trifluormethyl)sulfinyl]-1H-pyrazol-3-carbonitril (bekannt aus CN 101337937 A) (CAS 1105672-77-2), 3-Brom-N-[4-chlor-2-methyl-6-[(methylamino)thioxomethyl]phenyl]-1-(3-chlor-2-pyridinyl)-1H-pyrazol-5-carboxamid,

(Liudaibenjiaxuanan, bekannt aus CN 103109816 A) (CAS 1232543-85-9); N-[4-Chlor-2-[[1,1-dimethylethyl)amino]carbonyl]-6-methylphenyl]-1-(3-chlor-2-pyridinyl)-3-(fluormethoxy)-1H-pyrazol-5-carboxamid (bekannt aus WO 2012/034403 A1) (CAS 1268277-22-0), N-[2-(5-Amino-1,3,4-thiadiazol-2-yl)-4-chlor-6-methylphenyl]-3-brom-1-(3-chlor-2-pyridinyl)-1H-pyrazol-5-carboxamid (bekannt aus WO 2011/085575 A1) (CAS 1233882-22-8), 4-[3-[2,6-Dichlor-4-[(3,3-dichlor-2-propen-1-yl)oxy]phenoxy]propoxy]-2-methoxy-6-(trifluormethyl)pyrimidin (bekannt aus CN 101337940 A) (CAS 1108184-52-6); (2E)- und 2(Z)-2-[2-(4-Cyanophenyl)-1-[3-(trifluormethyl)phenyl]ethyliden]-N-[4-(difluormethoxy)phenyl]hydrazincarboxamid (bekannt aus CN 101715774 A) (CAS 1232543-85-9); Cyclopropan-carbonsäure-3-(2,2-dichlorethenyl)-2,2-dimethyl-4-(1H-benzimidazol-2-yl)phenylester (bekannt aus CN 103524422 A) (CAS 1542271-46-4); (4aS)-7-Chlor-2,5-dihydro-2-[[[(methoxycarbonyl)4-[(trifluormethyl)thio]phenyl]amino]carbonyl]indeno[1,2-e][1,3,4]oxadiazin-

25 4a(3H)-carbonsäuremethylester (bekannt aus CN 102391261 A) (CAS 1370358-69-2); 6-Desoxy-3-O-ethyl-2,4-di-O-methyl-1-[N-[4-[1-[4-(1,1,2,2,2-pentafluorethoxy)phenyl]-1H-1,2,4-triazol-3-yl]phenyl]carbamat]- α -L-mannopyranose (bekannt aus US 2014/0275503 A1) (CAS 1181213-14-8); 8-(2-Cyclopropylmethoxy-4-trifluormethylphenoxy)-3-(6-trifluormethylpyridazin-3-yl)-3-azabicyclo[3.2.1]octan (CAS 1253850-56-4), (8-anti)-8-(2-Cyclopropylmethoxy-4-trifluormethylphenoxy)-3-(6-trifluormethylpyridazin-3-yl)-3-azabicyclo[3.2.1]octan (CAS 933798-27-7), (8-syn)-8-(2-Cyclopropylmethoxy-4-trifluormethylphenoxy)-3-(6-trifluormethylpyridazin-3-yl)-3-azabicyclo[3.2.1]octan (bekannt aus WO 2007040280 A1, WO 2007040282 A1) (CAS 934001-66-8) und N-[3-Chlor-1-(3-pyridinyl)-1H-pyrazol-4-yl]-N-ethyl-3-[(3,3,3-trifluorpropyl)thio]-propanamid (bekannt aus WO 2015/058021 A1, WO 2015/058028 A1) (CAS 1477919-27-9).

30

Fungizide

Die hier mit ihrem "Common Name" spezifizierten Wirkstoffe sind bekannt und beispielsweise im "Pesticide Manual" (16. Aufl. British Crop Protection Council) oder im Internet recherchierbar (beispielsweise: <http://www.alanwood.net/pesticides>) beschrieben.

- 5 Alle genannten Mischungspartner der Klassen (1) bis (15) können, wenn sie auf Grund ihrer funktionellen Gruppen dazu imstande sind, gegebenenfalls mit geeigneten Basen oder Säuren Salze bilden. Alle genannten fungiziden Mischungspartner der Klassen (1) bis (15) können gegebenenfalls tautomere Formen einschließen.

- 1) Inhibitoren der Ergosterol-Biosynthese, beispielsweise (1.001) Cyproconazol, (1.002) Difenconazol, (1.003) Epoxiconazol, (1.004) Fenhexamid, (1.005) Fenpropidin, (1.006) Fenpropimorph, (1.007) Fenpyrazamin, (1.008) Fluquinconazol, (1.009) Flutriafol, (1.010) Imazalil, (1.011) Imazalil Sulfat, (1.012) Ipconazol, (1.013) Metconazol, (1.014) Myclobutanil, (1.015) Paclobutrazol, (1.016) Prochloraz, (1.017) Propiconazol, (1.018) Prothioconazol, (1.019) Pyrisoxazol, (1.020) Spiroxamin, (1.021) Tebuconazol, (1.022) Tetraconazol, (1.023) Triadimenol, (1.024) Tridemorph, (1.025) Triticonazol, (1.026) (1R,2S,5S)-5-(4-Chlorbenzyl)-2-(chloromethyl)-2-methyl-1-(1H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl)cyclopentanol, (1.027) (1S,2R,5R)-5-(4-Chlorbenzyl)-2-(chloromethyl)-2-methyl-1-(1H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl)cyclopentanol, (1.028) (2R)-2-(1-Chlorcyclopropyl)-4-[(1R)-2,2-dichlorcyclopropyl]-1-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)butan-2-ol (1.029) (2R)-2-(1-Chlorcyclopropyl)-4-[(1S)-2,2-dichlorcyclopropyl]-1-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)butan-2-ol, (1.030) (2R)-2-[4-(4-Chlorphenoxy)-2-(trifluormethyl)phenyl]-1-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)propan-2-ol, (1.031) (2S)-2-(1-Chlorcyclopropyl)-4-[(1R)-2,2-dichlorcyclopropyl]-1-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)butan-2-ol, (1.032) (2S)-2-(1-Chlorcyclopropyl)-4-[(1S)-2,2-dichlorcyclopropyl]-1-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)butan-2-ol, (1.033) (2S)-2-[4-(4-Chlorphenoxy)-2-(trifluormethyl)phenyl]-1-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)propan-2-ol, (1.034) (R)-[3-(4-Chlor-2-fluorphenyl)-5-(2,4-difluorphenyl)-1,2-oxazol-4-yl](pyridin-3-yl)methanol, (1.035) (S)-[3-(4-Chlor-2-fluorphenyl)-5-(2,4-difluorphenyl)-1,2-oxazol-4-yl](pyridin-3-yl)methanol, (1.036) [3-(4-Chlor-2-fluorphenyl)-5-(2,4-difluorphenyl)-1,2-oxazol-4-yl](pyridin-3-yl)methanol, (1.037) 1-({(2R,4S)-2-[2-Chlor-4-(4-chlorphenoxy)phenyl]-4-methyl-1,3-dioxolan-2-yl}methyl)-1H-1,2,4-triazol, (1.038) 1-({(2S,4S)-2-[2-Chlor-4-(4-chlorphenoxy)phenyl]-4-methyl-1,3-dioxolan-2-yl}methyl)-1H-1,2,4-triazol, (1.039) 1-{{[3-(2-Chlorphenyl)-2-(2,4-difluorphenyl)oxiran-2-yl]methyl}-1H-1,2,4-triazol-5-yl}thiocyanat, (1.040) 1-{{[rel(2R,3R)-3-(2-Chlorphenyl)-2-(2,4-difluorphenyl)oxiran-2-yl]methyl}-1H-1,2,4-triazol-5-yl}thiocyanat, (1.041) 1-{{[rel(2R,3S)-3-(2-Chlorphenyl)-2-(2,4-difluorphenyl)oxiran-2-yl]methyl}-1H-1,2,4-triazol-5-yl}thiocyanat, (1.042) 2-[(2R,4R,5R)-1-(2,4-Dichlorphenyl)-5-hydroxy-2,6,6-trimethylheptan-4-yl]-2,4-dihydro-3H-1,2,4-triazol-3-thion, (1.043) 2-[(2R,4R,5S)-1-(2,4-Dichlorphenyl)-5-hydroxy-2,6,6-trimethylheptan-4-yl]-2,4-dihydro-3H-1,2,4-triazol-3-thion, (1.044) 2-[(2R,4S,5R)-1-(2,4-Dichlorphenyl)-5-hydroxy-2,6,6-trimethylheptan-4-yl]-2,4-dihydro-3H-1,2,4-triazol-3-thion, (1.045) 2-[(2R,4S,5S)-1-(2,4-Dichlorphenyl)-5-hydroxy-2,6,6-trimethylheptan-4-yl]-2,4-

dihydro-3H-1,2,4-triazol-3-thion, (1.046) 2-[(2S,4R,5R)-1-(2,4-Dichlorophenyl)-5-hydroxy-2,6,6-trimethylheptan-4-yl]-2,4-dihydro-3H-1,2,4-triazol-3-thion, (1.047) 2-[(2S,4R,5S)-1-(2,4-Dichlorophenyl)-5-hydroxy-2,6,6-trimethylheptan-4-yl]-2,4-dihydro-3H-1,2,4-triazol-3-thion, (1.048) 2-[(2S,4S,5R)-1-(2,4-Dichlorophenyl)-5-hydroxy-2,6,6-trimethylheptan-4-yl]-2,4-dihydro-3H-1,2,4-triazol-3-thion, (1.049) 2-[(2S,4S,5S)-1-(2,4-Dichlorophenyl)-5-hydroxy-2,6,6-trimethylheptan-4-yl]-2,4-dihydro-3H-1,2,4-triazol-3-thion, (1.050) 2-[1-(2,4-Dichlorophenyl)-5-hydroxy-2,6,6-trimethylheptan-4-yl]-2,4-dihydro-3H-1,2,4-triazol-3-thion, (1.051) 2-[2-Chlor-4-(2,4-dichlorophenoxy)phenyl]-1-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)propan-2-ol, (1.052) 2-[2-Chlor-4-(4-chlorphenoxy)phenyl]-1-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)butan-2-ol, (1.053) 2-[4-(4-Chlorphenoxy)-2-(trifluormethyl)phenyl]-1-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)butan-2-ol, (1.054) 2-[4-(4-Chlorphenoxy)-2-(trifluormethyl)phenyl]-1-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)pentan-2-ol, (1.055) 2-[4-(4-Chlorphenoxy)-2-(trifluormethyl)phenyl]-1-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)propan-2-ol, (1.056) 2-{[3-(2-Chlorphenyl)-2-(2,4-difluorphenyl)oxiran-2-yl]methyl}-2,4-dihydro-3H-1,2,4-triazol-3-thion, (1.057) 2-{[rel(2R,3R)-3-(2-Chlorphenyl)-2-(2,4-difluorphenyl)oxiran-2-yl]methyl}-2,4-dihydro-3H-1,2,4-triazol-3-thion, (1.058) 2-{[rel(2R,3S)-3-(2-Chlorphenyl)-2-(2,4-difluorphenyl)oxiran-2-yl]methyl}-2,4-dihydro-3H-1,2,4-triazol-3-thion, (1.059) 5-(4-Chlorbenzyl)-2-(chloromethyl)-2-methyl-1-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)methylcyclopentanol, (1.060) 5-(Allylsulfanyl)-1-{[3-(2-chlorophenyl)-2-(2,4-difluorphenyl)oxiran-2-yl]methyl}-1H-1,2,4-triazol, (1.061) 5-(Allylsulfanyl)-1-{[rel(2R,3R)-3-(2-chlorophenyl)-2-(2,4-difluorphenyl)oxiran-2-yl]methyl}-1H-1,2,4-triazol, (1.062) 5-(Allylsulfanyl)-1-{[rel(2R,3S)-3-(2-chlorophenyl)-2-(2,4-difluorphenyl)oxiran-2-yl]methyl}-1H-1,2,4-triazol, (1.063) N'-(2,5-Dimethyl-4-{[3-(1,1,2,2-tetrafluoroethoxy)phenyl]sulfanyl}phenyl)-N-ethyl-N-methylimidofornamid, (1.064) N'-(2,5-Dimethyl-4-{[3-(2,2,2-trifluoroethoxy)phenyl]sulfanyl}phenyl)-N-ethyl-N-methylimidofornamid, (1.065) N'-(2,5-Dimethyl-4-{[3-(2,2,3,3-tetrafluorpropoxy)phenyl]sulfanyl}phenyl)-N-ethyl-N-methylimidofornamid, (1.066) N'-(2,5-Dimethyl-4-{[3-(pentafluoroethoxy)phenyl]sulfanyl}phenyl)-N-ethyl-N-methylimidofornamid, (1.067) N'-(2,5-Dimethyl-4-{3-[(1,1,2,2-tetrafluoroethyl)sulfanyl]phenoxy}phenyl)-N-ethyl-N-methylimidofornamid, (1.068) N'-(2,5-Dimethyl-4-{3-[(2,2,2-trifluoroethyl)sulfanyl]phenoxy}phenyl)-N-ethyl-N-methylimidofornamid, (1.069) N'-(2,5-Dimethyl-4-{3-[(2,2,3,3-tetrafluorpropyl)sulfanyl]phenoxy}phenyl)-N-ethyl-N-methylimidofornamid, (1.070) N'-(2,5-Dimethyl-4-{3-[(pentafluoroethyl)sulfanyl]phenoxy}phenyl)-N-ethyl-N-methylimidofornamid, (1.071) N'-(2,5-Dimethyl-4-phenoxyphenyl)-N-ethyl-N-methylimidofornamid, (1.072) N'-(4-{[3-(Difluormethoxy)phenyl]sulfanyl}-2,5-dimethylphenyl)-N-ethyl-N-methylimidofornamid, (1.073) N'-(4-{3-[(Difluormethyl)sulfanyl]phenoxy}-2,5-dimethylphenyl)-N-ethyl-N-methylimidofornamid, (1.074) N'-[5-Brom-6-(2,3-dihydro-1H-inden-2-yloxy)-2-methylpyridin-3-yl]-N-ethyl-N-methylimidofornamid, (1.075) N'-{4-[(4,5-Dichlor-1,3-thiazol-2-yl)oxy]-2,5-dimethylphenyl}-N-ethyl-N-methylimidofornamid, (1.076) N'-{5-Brom-6-[(1R)-1-(3,5-difluorphenyl)ethoxy]-2-methylpyridin-3-yl}-N-ethyl-N-methylimidofornamid, (1.077) N'-{5-Brom-6-[(1S)-1-(3,5-difluorphenyl)ethoxy]-2-methylpyridin-3-yl}-N-ethyl-N-methylimidofornamid, (1.078) N'-{5-Brom-6-[(cis-4-isopropylcyclohexyl)oxy]-2-methylpyridin-3-yl}-N-ethyl-N-methylimidofornamid, (1.079) N'-{5-

Brom-6-[(trans-4-isopropylcyclohexyl)oxy]-2-methylpyridin-3-yl}-N-ethyl-N-methylimidofornamid,
(1.080) N'-{5-Bromo-6-[1-(3,5-difluorphenyl)ethoxy]-2-methylpyridin-3-yl}-N-ethyl-N-methylimidofornamid.

- 2) Inhibitoren der Atmungskette am Komplex I oder II beispielsweise (2.001) Benzovindiflupyr, (2.002) Bixafen, (2.003) Boscalid, (2.004) Carboxin, (2.005) Fluopyram, (2.006) Flutolanil, (2.007) Fluxapyroxad, (2.008) Furametpyr, (2.009) Isofetamid, (2.010) Isopyrazam (anti-epimeres Enantiomer 1R,4S,9S), (2.011) Isopyrazam (anti-epimeres Enantiomer 1S,4R,9R), (2.012) Isopyrazam (anti-epimeres Racemat 1RS,4SR,9SR), (2.013) Isopyrazam (Mischung des syn-epimeren Razemates 1RS,4SR,9RS und des anti-epimeren Razemates 1RS,4SR,9SR), (2.014) Isopyrazam (syn-epimeres Enantiomer 1R,4S,9R), (2.015) Isopyrazam (syn-epimeres Enantiomer 1S,4R,9S), (2.016) Isopyrazam (syn-epimeres Racemat 1RS,4SR,9RS), (2.017) Penflufen, (2.018) Penthioopyrad, (2.019) Pydiflumetofen, (2.020) Pyraziflumid, (2.021) Sedaxane, (2.022) 1,3-Dimethyl-N-(1,1,3-trimethyl-2,3-dihydro-1H-inden-4-yl)-1H-pyrazol-4-carboxamid, (2.023) 1,3-Dimethyl-N-[(3R)-1,1,3-trimethyl-2,3-dihydro-1H-inden-4-yl]-1H-pyrazol-4-carboxamid, (2.024) 1,3-Dimethyl-N-[(3S)-1,1,3-trimethyl-2,3-dihydro-1H-inden-4-yl]-1H-pyrazol-4-carboxamid, (2.025) 1-Methyl-3-(trifluormethyl)-N-[2'-(trifluormethyl)biphenyl-2-yl]-1H-pyrazol-4-carboxamid, (2.026) 2-Fluor-6-(trifluormethyl)-N-(1,1,3-trimethyl-2,3-dihydro-1H-inden-4-yl)benzamid, (2.027) 3-(Difluormethyl)-1-methyl-N-(1,1,3-trimethyl-2,3-dihydro-1H-inden-4-yl)-1H-pyrazol-4-carboxamid, (2.028) 3-(Difluormethyl)-1-methyl-N-[(3R)-1,1,3-trimethyl-2,3-dihydro-1H-inden-4-yl]-1H-pyrazol-4-carboxamid, (2.029) 3-(Difluormethyl)-1-methyl-N-[(3S)-1,1,3-trimethyl-2,3-dihydro-1H-inden-4-yl]-1H-pyrazol-4-carboxamid, (2.030) 3-(Difluormethyl)-N-(7-fluor-1,1,3-trimethyl-2,3-dihydro-1H-inden-4-yl)-1-methyl-1H-pyrazol-4-carboxamid, (2.031) 3-(Difluormethyl)-N-[(3R)-7-fluor-1,1,3-trimethyl-2,3-dihydro-1H-inden-4-yl]-1-methyl-1H-pyrazol-4-carboxamid, (2.032) 3-(Difluormethyl)-N-[(3S)-7-fluor-1,1,3-trimethyl-2,3-dihydro-1H-inden-4-yl]-1-methyl-1H-pyrazol-4-carboxamid, (2.033) 5,8-Difluor-N-[2-(2-fluor-4-{[4-(trifluormethyl)pyridin-2-yl]oxy}phenyl)ethyl]quinazolin-4-amin, (2.034) N-(2-Cyclopentyl-5-fluorbenzyl)-N-cyclopropyl-3-(difluormethyl)-5-fluor-1-methyl-1H-pyrazol-4-carboxamid, (2.035) N-(2-tert-Butyl-5-methylbenzyl)-N-cyclopropyl-3-(difluormethyl)-5-fluor-1-methyl-1H-pyrazol-4-carboxamid, (2.036) N-(2-tert-Butylbenzyl)-N-cyclopropyl-3-(difluormethyl)-5-fluor-1-methyl-1H-pyrazol-4-carboxamid, (2.037) N-(5-Chlor-2-ethylbenzyl)-N-cyclopropyl-3-(difluormethyl)-5-fluor-1-methyl-1H-pyrazol-4-carboxamid, (2.038) N-(5-Chlor-2-isopropylbenzyl)-N-cyclopropyl-3-(difluormethyl)-5-fluor-1-methyl-1H-pyrazol-4-carboxamid, (2.039) N-[(1R,4S)-9-(Dichlormethylen)-1,2,3,4-tetrahydro-1,4-methanonaphthalen-5-yl]-3-(difluormethyl)-1-methyl-1H-pyrazol-4-carboxamid, (2.040) N-[(1S,4R)-9-(Dichlormethylen)-1,2,3,4-tetrahydro-1,4-methanonaphthalen-5-yl]-3-(difluormethyl)-1-methyl-1H-pyrazol-4-carboxamid, (2.041) N-[1-(2,4-Dichlorphenyl)-1-methoxypropan-2-yl]-3-(difluormethyl)-1-methyl-1H-pyrazol-4-carboxamid, (2.042) N-[2-Chlor-6-(trifluormethyl)benzyl]-N-cyclopropyl-3-(difluormethyl)-5-fluor-1-methyl-1H-pyrazol-4-carboxamid, (2.043) N-[3-Chlor-2-fluor-6-(trifluormethyl)benzyl]-N-cyclopropyl-3-(difluormethyl)-5-fluor-1-

methyl-1H-pyrazol-4-carboxamid, (2.044) N-[5-Chlor-2-(trifluormethyl)benzyl]-N-cyclopropyl-3-(difluormethyl)-5-fluor-1-methyl-1H-pyrazol-4-carboxamid, (2.045) N-Cyclopropyl-3-(difluormethyl)-5-fluor-1-methyl-N-[5-methyl-2-(trifluormethyl)benzyl]-1H-pyrazol-4-carboxamid, (2.046) N-Cyclopropyl-3-(difluormethyl)-5-fluor-N-(2-fluor-6-isopropylbenzyl)-1-methyl-1H-pyrazol-4-carboxamid, (2.047) N-Cyclopropyl-3-(difluormethyl)-5-fluor-N-(2-isopropyl-5-methylbenzyl)-1-methyl-1H-pyrazol-4-carboxamid, (2.048) N-Cyclopropyl-3-(difluormethyl)-5-fluor-N-(2-isopropylbenzyl)-1-methyl-1H-pyrazol-4-carbothioamid, (2.049) N-Cyclopropyl-3-(difluormethyl)-5-fluor-N-(2-isopropylbenzyl)-1-methyl-1H-pyrazol-4-carboxamid, (2.050) N-Cyclopropyl-3-(difluormethyl)-5-fluor-N-(5-fluor-2-isopropylbenzyl)-1-methyl-1H-pyrazol-4-carboxamid, (2.051) N-Cyclopropyl-3-(difluormethyl)-N-(2-ethyl-4,5-dimethylbenzyl)-5-fluor-1-methyl-1H-pyrazol-4-carboxamid, (2.052) N-Cyclopropyl-3-(difluormethyl)-N-(2-ethyl-5-fluorbenzyl)-5-fluor-1-methyl-1H-pyrazol-4-carboxamid, (2.053) N-Cyclopropyl-3-(difluormethyl)-N-(2-ethyl-5-methylbenzyl)-5-fluor-1-methyl-1H-pyrazol-4-carboxamid, (2.054) N-Cyclopropyl-N-(2-cyclopropyl-5-fluorbenzyl)-3-(difluormethyl)-5-fluor-1-methyl-1H-pyrazol-4-carboxamid, (2.055) N-Cyclopropyl-N-(2-cyclopropyl-5-methylbenzyl)-3-(difluormethyl)-5-fluor-1-methyl-1H-pyrazol-4-carboxamid, (2.056) N-Cyclopropyl-N-(2-cyclopropylbenzyl)-3-(difluormethyl)-5-fluor-1-methyl-1H-pyrazol-4-carboxamid.

3) Inhibitoren der Atmungskette am Komplex III, beispielsweise (3.001) Ametocetradin, (3.002) Amisulbrom, (3.003) Azoxystrobin, (3.004) Coumethoxystrobin, (3.005) Coumoxystrobin, (3.006) Cyazofamid, (3.007) Dimoxystrobin, (3.008) Enoxastrobin, (3.009) Famoxadon, (3.010) Fenamidon, (3.011) Flufenoxystrobin, (3.012) Fluoxastrobin, (3.013) Kresoxim-Methyl, (3.014) Metominostrobin, (3.015) Orysastrobin, (3.016) Picoxystrobin, (3.017) Pyraclostrobin, (3.018) Pyrametostrobin, (3.019) Pyraoxystrobin, (3.020) Trifloxystrobin (3.021) (2E)-2-{2-[(1E)-1-(3-[(E)-1-Fluor-2-phenylvinyl]oxy)phenyl]ethylidenamino}oxy)methyl]phenyl}-2-(methoxyimino)-N-methylacetamid, (3.022) (2E,3Z)-5-{[1-(4-Chlorphenyl)-1H-pyrazol-3-yl]oxy}-2-(methoxyimino)-N,3-dimethylpent-3-enamid, (3.023) (2R)-2-{2-[(2,5-Dimethylphenoxy)methyl]phenyl}-2-methoxy-N-methylacetamid, (3.024) (2S)-2-{2-[(2,5-Dimethylphenoxy)methyl]phenyl}-2-methoxy-N-methylacetamid, (3.025) (3S,6S,7R,8R)-8-Benzyl-3-[(3-[(isobutyryloxy)methoxy]-4-methoxypyridin-2-yl)carbonyl]amino]-6-methyl-4,9-dioxo-1,5-dioxonan-7-yl-2-methylpropanoat, (3.026) 2-{2-[(2,5-Dimethylphenoxy)methyl]phenyl}-2-methoxy-N-methylacetamid, (3.027) N-(3-Ethyl-3,5,5-trimethylcyclohexyl)-3-formamido-2-hydroxybenzamid, (3.028) (2E,3Z)-5-{[1-(4-Chlor-2-fluorphenyl)-1H-pyrazol-3-yl]oxy}-2-(methoxyimino)-N,3-dimethylpent-3-enamid.

4) Inhibitoren der Mitose und Zellteilung, beispielsweise (4.001) Carbendazim, (4.002) Diethofencarb, (4.003) Ethaboxam, (4.004) Fluopicolid, (4.005) Pencycuron, (4.006) Thiabendazol, (4.007) Thiophanat-Methyl, (4.008) Zoxamid, (4.009) 3-Chlor-4-(2,6-difluorphenyl)-6-methyl-5-phenylpyridazin, (4.010) 3-Chlor-5-(4-chlorphenyl)-4-(2,6-difluorphenyl)-6-methylpyridazin, (4.011) 3-Chlor-5-(6-chlorpyridin-3-yl)-6-methyl-4-(2,4,6-trifluorphenyl)pyridazin, (4.012) 4-(2-Brom-4-

fluorphenyl)-N-(2,6-difluorphenyl)-1,3-dimethyl-1H-pyrazol-5-amin, (4.013) 4-(2-Brom-4-fluorphenyl)-N-(2-brom-6-fluorphenyl)-1,3-dimethyl-1H-pyrazol-5-amin, (4.014) 4-(2-Brom-4-fluorphenyl)-N-(2-bromphenyl)-1,3-dimethyl-1H-pyrazol-5-amin, (4.015) 4-(2-Brom-4-fluorphenyl)-N-(2-chlor-6-fluorphenyl)-1,3-dimethyl-1H-pyrazol-5-amin, (4.016) 4-(2-Brom-4-fluorphenyl)-N-(2-chlorphenyl)-1,3-dimethyl-1H-pyrazol-5-amin, (4.017) 4-(2-Brom-4-fluorphenyl)-N-(2-fluorphenyl)-1,3-dimethyl-1H-pyrazol-5-amin, (4.018) 4-(2-Chlor-4-fluorphenyl)-N-(2,6-difluorphenyl)-1,3-dimethyl-1H-pyrazol-5-amin, (4.019) 4-(2-Chlor-4-fluorphenyl)-N-(2-chlor-6-fluorphenyl)-1,3-dimethyl-1H-pyrazol-5-amin, (4.020) 4-(2-Chlor-4-fluorphenyl)-N-(2-chlorphenyl)-1,3-dimethyl-1H-pyrazol-5-amin, (4.021) 4-(2-Chlor-4-fluorphenyl)-N-(2-fluorphenyl)-1,3-dimethyl-1H-pyrazol-5-amin, (4.022) 4-(4-Chlorphenyl)-5-(2,6-difluorphenyl)-3,6-dimethylpyridazin, (4.023) N-(2-Brom-6-fluorphenyl)-4-(2-chlor-4-fluorphenyl)-1,3-dimethyl-1H-pyrazol-5-amin, (4.024) N-(2-Bromphenyl)-4-(2-chlor-4-fluorphenyl)-1,3-dimethyl-1H-pyrazol-5-amin, (4.025) N-(4-Chlor-2,6-difluorphenyl)-4-(2-chlor-4-fluorphenyl)-1,3-dimethyl-1H-pyrazol-5-amin.

5) Verbindungen mit Befähigung zu Multisite-Aktivität, beispielsweise (5.001) Bordeauxmischung, (5.002) Captafol, (5.003) Captan, (5.004) Chlorthalonil, (5.005) Kupferhydroxid, (5.006) Kupfernaphthenat, (5.007) Kupferoxid, (5.008) Kupferoxychlorid, (5.009) Kupfer(2+)-sulfat, (5.010) Dithianon, (5.011) Dodin, (5.012) Folpet, (5.013) Mancozeb, (5.014) Maneb, (5.015) Metiram, (5.016) Zinkmetiram, (5.017) Kupfer-Oxin, (5.018) Propineb, (5.019) Schwefel und Schwefelzubereitungen einschließlich Calciumpolysulfid, (5.020) Thiram, (5.021) Zineb, (5.022) Ziram.

6) Verbindungen, die zum Auslösen einer Wirtsabwehr befähigt sind, beispielsweise (6.001) Acibenzolar-S-Methyl, (6.002) Isotianil, (6.003) Probenazol, (6.004) Tiadinil.

7) Inhibitoren der Aminosäure- und/oder Protein-Biosynthese, beispielsweise (7.001) Cyprodinil, (7.002) Kasugamycin, (7.003) Kasugamycinhydrochlorid-hydrat, (7.004) Oxytetracyclin (7.005) Pyrimethanil, (7.006) 3-(5-Fluor-3,3,4,4-tetramethyl-3,4-dihydroisochinolin-1-yl)chinolin.

(8) Inhibitoren der ATP-Produktion, beispielsweise (8.001) Silthiofam.

9) Inhibitoren der Zellwandsynthese, beispielsweise (9.001) Bentiavalicarb, (9.002) Dimethomorph, (9.003) Flumorph, (9.004) Iprovalicarb, (9.005) Mandipropamid, (9.006) Pyrimorph, (9.007) Valifenalat, (9.008) (2E)-3-(4-tert.-Butylphenyl)-3-(2-chlorpyridin-4-yl)-1-(morpholin-4-yl)prop-2-en-1-on, (9.009) (2Z)-3-(4-tert.-Butylphenyl)-3-(2-chlorpyridin-4-yl)-1-(morpholin-4-yl)prop-2-en-1-on.

10) Inhibitoren der Lipid- und Membran-Synthese, beispielsweise (10.001) Propamocarb, (10.002) Propamocarbhydrochlorid, (10.003) Tolclofos-Methyl.

11) Inhibitoren der Melanin-Biosynthese, beispielsweise (11.001) Tricyclazol, (11.002) 2,2,2-Trifluorethyl-{3-methyl-1-[(4-methylbenzoyl)amino]butan-2-yl}carbamat.

12) Inhibitoren der Nukleinsäuresynthese, beispielsweise (12.001) Benalaxyl, (12.002) Benalaxyl-M (Kiralaxyl), (12.003) Metalaxyl, (12.004) Metalaxyl-M (Mefenoxam).

13) Inhibitoren der Signaltransduktion, beispielsweise (13.001) Fludioxonil, (13.002) Iprodion, (13.003) Procymidon, (13.004) Proquinazid, (13.005) Quinoxifen, (13.006) Vinclozolin.

5 14) Verbindungen, die als Entkoppler wirken können, beispielsweise (14.001) Fluazinam, (14.002) Meptyldinocap.

15) Weitere Verbindungen, beispielsweise (15.001) Abscisinsäure, (15.002) Benthiazol, (15.003) Bethoxazin, (15.004) Capsimycin, (15.005) Carvon, (15.006) Chinomethionat, (15.007) Cufraneb, (15.008) Cyflufenamid, (15.009) Cymoxanil, (15.010) Cyprosulfamid, (15.011) Flutianil, (15.012) Fosetyl-Aluminium, (15.013) Fosetyl-Calcium, (15.014) Fosetyl-Natrium, (15.015) Methylisothiocyanat, (15.016) Metrafenon, (15.017) Mildiomycin, (15.018) Natamycin, (15.019) Nickel-Dimethyldithiocarbamat, (15.020) Nitrothal-Isopropyl, (15.021) Oxamocarb, (15.022) Oxathiapirolin, (15.023) Oxyfenthiin, (15.024) Pentachlorphenol und Salze, (15.025) Phosphonsäure und deren Salze, (15.026) Propamocarb-fosetyl, (15.027) Pyriofenone (Chlazafenone) (15.028)

15 Tebufloquin, (15.029) Tecloftalam, (15.030) Tolnifanide, (15.031) 1-(4-{4-[(5R)-5-(2,6-Difluorphenyl)-4,5-dihydro-1,2-oxazol-3-yl]-1,3-thiazol-2-yl}piperidin-1-yl)-2-[5-methyl-3-(trifluormethyl)-1H-pyrazol-1-yl]ethanon, (15.032) 1-(4-{4-[(5S)-5-(2,6-Difluorphenyl)-4,5-dihydro-1,2-oxazol-3-yl]-1,3-thiazol-2-yl}piperidin-1-yl)-2-[5-methyl-3-(trifluormethyl)-1H-pyrazol-1-yl]ethanon, (15.033) 2-(6-Benzylpyridin-2-yl)quinazolin, (15.034) 2,6-Dimethyl-1H,5H-[1,4]dithiino[2,3-c:5,6-c']dipyrrol-20 1,3,5,7(2H,6H)-tetron, (15.035) 2-[3,5-Bis(difluormethyl)-1H-pyrazol-1-yl]-1-[4-(4-{5-[2-(prop-2-in-1-yloxy)phenyl]-4,5-dihydro-1,2-oxazol-3-yl}-1,3-thiazol-2-yl)piperidin-1-yl]ethanon, (15.036) 2-[3,5-Bis(difluormethyl)-1H-pyrazol-1-yl]-1-[4-(4-{5-[2-chlor-6-(prop-2-in-1-yloxy)phenyl]-4,5-dihydro-1,2-oxazol-3-yl}-1,3-thiazol-2-yl)piperidin-1-yl]ethanon, (15.037) 2-[3,5-Bis(difluormethyl)-1H-pyrazol-1-yl]-1-[4-(4-{5-[2-fluor-6-(prop-2-in-1-yloxy)phenyl]-4,5-dihydro-1,2-oxazol-3-yl}-1,3-thiazol-2-yl)piperidin-1-yl]ethanon, (15.038) 2-[6-(3-Fluor-4-methoxyphenyl)-5-methylpyridin-2-yl]quinazolin, (15.039) 2-[(5R)-3-[2-(1-{[3,5-Bis(difluormethyl)-1H-pyrazol-1-yl]acetyl}piperidin-4-yl)-1,3-thiazol-4-yl]-4,5-dihydro-1,2-oxazol-5-yl]-3-chlorphenyl methanesulfonat, (15.040) 2-[(5S)-3-[2-(1-{[3,5-Bis(difluormethyl)-1H-pyrazol-1-yl]acetyl}piperidin-4-yl)-1,3-thiazol-4-yl]-4,5-dihydro-1,2-oxazol-5-yl]-3-chlorphenyl methanesulfonat, (15.041) 2-{2-[(7,8-Difluor-2-methylquinolin-3-yl)oxy]-6-30 fluorphenyl}propan-2-ol, (15.042) 2-{2-Fluor-6-[(8-fluor-2-methylquinolin-3-yl)oxy]phenyl}propan-2-ol, (15.043) 2-{3-[2-(1-{[3,5-Bis(difluormethyl)-1H-pyrazol-1-yl]acetyl}piperidin-4-yl)-1,3-thiazol-4-yl]-4,5-dihydro-1,2-oxazol-5-yl]-3-chlorphenyl-methansulfonat, (15.044) 2-{3-[2-(1-{[3,5-Bis(difluormethyl)-1H-pyrazol-1-yl]acetyl}piperidin-4-yl)-1,3-thiazol-4-yl]-4,5-dihydro-1,2-oxazol-5-yl}phenyl methanesulfonat, (15.045) 2-Phenylphenol und deren Salze, (15.046) 3-(4,4,5-Trifluor-3,3-dimethyl-3,4-dihydroisoquinolin-1-yl)quinolin, (15.047) 3-(4,4-Difluor-3,3-dimethyl-3,4-dihydroisoquinolin-1-yl)quinolin, (15.048) 4-Amino-5-fluorpyrimidin-2-ol (Tautomere Form: 4-Amino-

5-fluorpyrimidin-2(1H)-on), (15.049) 4-Oxo-4-[(2-phenylethyl)amino]buttersäure, (15.050) 5-Amino-1,3,4-thiadiazol-2-thiol, (15.051) 5-Chlor-N'-phenyl-N'-(prop-2-yn-1-yl)thiophen-2-sulfonohydrazid, (15.052) 5-Fluor-2-[(4-fluorbenzyl)oxy]pyrimidin-4-amin, (15.053) 5-Fluor-2-[(4-methylbenzyl)oxy]pyrimidin-4-amin, (15.054) 9-Fluor-2,2-dimethyl-5-(quinolin-3-yl)-2,3-dihydro-1,4-benzoxazepin, (15.055) But-3-yn-1-yl {6-[(Z)-(1-methyl-1H-tetrazol-5-yl)(phenyl)methylen]amino}oxy)methyl]pyridin-2-yl} carbamat, (15.056) Ethyl (2Z)-3-amino-2-cyano-3-phenylacrylat, (15.057) Phenazin-1-carbonsäure, (15.058) Propyl 3,4,5-trihydroxybenzoat, (15.059) Quinolin-8-ol, (15.060) Quinolin-8-ol sulfat (2:1), (15.061) tert-Butyl {6-[(1-methyl-1H-tetrazol-5-yl)(phenyl)methylene]amino}oxy)methyl]pyridin-2-yl} carbamat.

10 Biologische Schädlingsbekämpfungsmittel als Mischungskomponenten

Die Verbindungen der Formel (I) können mit biologischen Schädlingsbekämpfungsmitteln kombiniert werden.

Biologische Schädlingsbekämpfungsmittel umfassen insbesondere Bakterien, Pilze, Hefen, Pflanzenextrakte und solche Produkte, die von Mikroorganismen gebildet wurden inklusive Proteine und sekundäre Stoffwechselprodukte.

Biologische Schädlingsbekämpfungsmittel umfassen Bakterien wie sporenbildende Bakterien, wurzelbesiedelnde Bakterien und Bakterien, die als biologische Insektizide, Fungizide oder Nematizide wirken.

Beispiele für solche Bakterien, die als biologische Schädlingsbekämpfungsmittel eingesetzt werden bzw. verwendet werden können, sind:

Bacillus amyloliquefaciens, Stamm FZB42 (DSM 231179), oder *Bacillus cereus*, insbesondere *B. cereus* Stamm CNCM I-1562 oder *Bacillus firmus*, Stamm I-1582 (Accession number CNCM I-1582) oder *Bacillus pumilus*, insbesondere Stamm GB34 (Accession No. ATCC 700814) und Stamm QST2808 (Accession No. NRRL B-30087), oder *Bacillus subtilis*, insbesondere Stamm GB03 (Accession No. ATCC SD-1397), oder *Bacillus subtilis* Stamm QST713 (Accession No. NRRL B-21661) oder *Bacillus subtilis* Stamm OST 30002 (Accession No. NRRL B-50421), *Bacillus thuringiensis*, insbesondere *B. thuringiensis* Subspezies *israelensis* (Serotyp H-14), Stamm AM65-52 (Accession No. ATCC 1276), oder *B. thuringiensis subsp. aizawai*, insbesondere Stamm ABTS-1857 (SD-1372), oder *B. thuringiensis subsp. kurstaki* Stamm HD-1, oder *B. thuringiensis subsp. tenebrionis* Stamm NB 176 (SD-5428), *Pasteuria penetrans*, *Pasteuria spp.* (Rotylenchulus reniformis nematode)-PR3 (Accession Number ATCC SD-5834), *Streptomyces microflavus* Stamm AQ6121 (= QRD 31.013, NRRL B-50550), *Streptomyces galbus* Stamm AQ 6047 (Accession Number NRRL 30232).

Beispiele für Pilze und Hefen, die als biologische Schädlingsbekämpfungsmittel eingesetzt werden bzw. verwendet werden können, sind:

5 *Beauveria bassiana*, insbesondere Stamm ATCC 74040, *Coniothyrium minitans*, insbesondere Stamm CON/M/91-8 (Accession No. DSM-9660), *Lecanicillium spp.*, insbesondere Stamm HRO LEC 12, *Lecanicillium lecanii* (ehemals bekannt als *Verticillium lecanii*), insbesondere Stamm KV01, *Metarhizium anisopliae*, insbesondere Stamm F52 (DSM3884/ ATCC 90448), *Metschnikowia fructicola*, insbesondere Stamm NRRL Y-30752, *Paecilomyces fumosoroseus* (neu: *Isaria fumosorosea*), insbesondere Stamm IFPC 200613, oder Stamm Apopka 97 (Accession No. ATCC 10 20874), *Paecilomyces lilacinus*, insbesondere *P. lilacinus* Stamm 251 (AGAL 89/030550), *Talaromyces flavus*, insbesondere Stamm V117b, *Trichoderma atroviride*, insbesondere Stamm SC1 (Accession Number CBS 122089), *Trichoderma harzianum*, insbesondere *T. harzianum rifai T39*. (Accession Number CNCM I-952).

15 Beispiele für Viren, die als biologische Schädlingsbekämpfungsmittel eingesetzt werden bzw. verwendet werden können, sind:

Adoxophyes orana (Apfelschalenwickler) Granulosevirus (GV), *Cydia pomonella* (Apfelwickler) Granulosevirus (GV), *Helicoverpa armigera* (Baumwollkapselwurm) Nuklear Polyhedrosis Virus (NPV), *Spodoptera exigua* (Zuckerrübenmotte) mNPV, *Spodoptera frugiperda* (Heerwurm) mNPV, *Spodoptera littoralis* (Afrikanischer Baumwollwurm) NPV.

20 Es sind auch Bakterien und Pilze umfasst, die als „Inokulant“ Pflanzen oder Pflanzenteilen oder Pflanzenorganen beigegeben werden und durch ihre besonderen Eigenschaften das Pflanzenwachstum und die Pflanzengesundheit fördern. Als Beispiele sind genannt:

25 *Agrobacterium spp.*, *Azorhizobium caulinodans*, *Azospirillum spp.*, *Azotobacter spp.*, *Bradyrhizobium spp.*, *Burkholderia spp.*, insbesondere *Burkholderia cepacia* (ehemals bekannt als *Pseudomonas cepacia*), *Gigaspora spp.*, oder *Gigaspora monosporum*, *Glomus spp.*, *Laccaria spp.*, *Lactobacillus buchneri*, *Paraglomus spp.*, *Pisolithus tinctorius*, *Pseudomonas spp.*, *Rhizobium spp.*, insbesondere *Rhizobium trifolii*, *Rhizopogon spp.*, *Scleroderma spp.*, *Suillus spp.*, *Streptomyces spp.*.

30 Beispiele für Pflanzenextrakte und solche Produkte, die von Mikroorganismen gebildet wurden inklusive Proteine und sekundäre Stoffwechselprodukte, die als biologische Schädlingsbekämpfungsmittel eingesetzt werden bzw. verwendet werden können, sind:

Allium sativum, *Artemisia absinthium*, Azadirachtin, Biokeeper WP, *Cassia nigricans*, *Celastrus angulatus*, *Chenopodium anthelminticum*, Chitin, Armour-Zen, *Dryopteris filix-mas*, *Equisetum arvense*, Fortune Aza, Fungastop, Heads Up (*Chenopodium quinoa*-Saponinextrakt),

Pyrethrum/Pyrethrine, Quassia amara, Quercus, Quillaja, Regalia, „Requiem™ Insecticide“, Rotenon, Ryania/Ryanodine, Symphytum officinale, Tanacetum vulgare, Thymol, Triact 70, TriCon, Tropaeolum majus, Urtica dioica, Veratrin, Viscum album, Brassicaceen-Extrakt, insbesondere Raps- oder Senfpulver.

5 Safener als Mischungskomponenten

Die Verbindungen der Formel (I) können mit Safenern kombiniert werden, wie zum Beispiel Benoxacor, Cloquintocet (-mexyl), Cyometrinil, Cyprosulfamide, Dichlormid, Fenchlorazole (-ethyl), Fencloirim, Flurazole, Fluxofenim, Furilazole, Isoxadifen (-ethyl), Mefenpyr (-diethyl), Naphthalic anhydride, Oxabetrinil, 2-Methoxy-N-({4-[(methylcarbamoyl)amino]phenyl}sulfonyl)benzamid (CAS 129531-12-0), 4-(Dichloracetyl)-1-oxa-4-azaspiro[4.5]decan (CAS 71526-07-3), 2,2,5-Trimethyl-3-(dichloracetyl)-1,3-oxazolidin (CAS 52836-31-4).

Pflanzen und Pflanzenteile

Erfindungsgemäß können alle Pflanzen und Pflanzenteile behandelt werden. Unter Pflanzen werden
15 hierbei alle Pflanzen und Pflanzenpopulationen verstanden wie erwünschte und unerwünschte Wildpflanzen oder Kulturpflanzen (einschließlich natürlich vorkommender Kulturpflanzen), beispielsweise Getreide (Weizen, Reis, Triticale, Gerste, Roggen, Hafer), Mais, Soja, Kartoffel, Zuckerrüben, Zuckerrohr, Tomaten, Paprika, Gurke, Melone, Möhre, Wassermelone, Zwiebel, Salat, Spinat, Porree, Bohnen, *Brassica oleracea* (z. B. Kohl) und andere Gemüsesorten, Baumwolle, Tabak,
20 Raps, sowie Obstpflanzen (mit den Früchten Äpfel, Birnen, Zitrusfrüchte und Weintrauben). Kulturpflanzen können Pflanzen sein, die durch konventionelle Züchtungs- und Optimierungsmethoden oder durch biotechnologische und gentechnologische Methoden oder Kombinationen dieser Methoden erhalten werden können, einschließlich der transgenen Pflanzen und einschließlich der durch Sortenschutzrechte schützba- ren oder nicht schützba- ren Pflanzensorten. Unter Pflanzen sollen alle
25 Entwicklungsstadien wie Saatgut, Stecklinge, junge (unausgereifte) Pflanzen bis hin zu ausgereiften Pflanzen verstanden werden. Unter Pflanzenteilen sollen alle oberirdischen und unterirdischen Teile und Organe der Pflanzen wie Spross, Blatt, Blüte und Wurzel verstanden werden, wobei beispielhaft Blätter, Nadeln, Stängel, Stämme, Blüten, Fruchtkörper, Früchte und Samen sowie Wurzeln, Knollen und Rhizome aufgeführt werden. Zu den Pflanzenteilen gehören auch geerntete Pflanzen oder geerntete
30 Pflanzenteile sowie vegetatives und generatives Vermehrungsmaterial, beispielsweise Stecklinge, Knollen, Rhizome, Ableger und Samen.

Die erfindungsgemäße Behandlung der Pflanzen und Pflanzenteile mit den Verbindungen der Formel (I) erfolgt direkt oder durch Einwirkung der Verbindungen auf die Umgebung, den Lebensraum oder den Lagerraum nach den üblichen Behandlungsmethoden, z. B. durch Eintauchen, Spritzen, Verdampfen,

Vernebeln, Streuen, Aufstreichen, Injizieren und bei Vermehrungsmaterial, insbesondere bei Saatgut, weiterhin durch ein- oder mehrschichtiges Umhüllen.

Wie bereits oben erwähnt, können erfindungsgemäß alle Pflanzen und deren Teile behandelt werden. In einer bevorzugten Ausführungsform werden wild vorkommende oder durch konventionelle biologische Zuchtmethoden wie Kreuzung oder Protoplastenfusion erhaltene Pflanzenarten und Pflanzensorten sowie deren Teile behandelt. In einer weiteren bevorzugten Ausführungsform werden transgene Pflanzen und Pflanzensorten, die durch gentechnologische Methoden gegebenenfalls in Kombination mit konventionellen Methoden erhalten wurden (Genetically Modified Organisms) und deren Teile behandelt. Der Begriff „Teile“ bzw. „Teile von Pflanzen“ oder „Pflanzenteile“ wurde oben erläutert.

Besonders bevorzugt werden erfindungsgemäß Pflanzen der jeweils handelsüblichen oder in Gebrauch befindlichen Pflanzensorten behandelt. Unter Pflanzensorten versteht man Pflanzen mit neuen Eigenschaften („Traits“), die durch konventionelle Züchtung, durch Mutagenese oder durch rekombinante DNA-Techniken erhalten worden sind. Dies können Sorten, Rassen, Bio- und Genotypen sein.

Transgene Pflanze, Saatgutbehandlung und Integrationsereignisse

Zu den bevorzugten erfindungsgemäß zu behandelnden transgenen (gentechnologisch erhaltenen) Pflanzen bzw. Pflanzensorten gehören alle Pflanzen, die durch die gentechnologische Modifikation genetisches Material erhielten, welches diesen Pflanzen besondere vorteilhafte wertvolle Eigenschaften ("Traits") verleiht. Beispiele für solche Eigenschaften sind besseres Pflanzenwachstum, erhöhte Toleranz gegenüber hohen oder niedrigen Temperaturen, erhöhte Toleranz gegen Trockenheit oder gegen Wasser- bzw. Bodensalzgehalt, erhöhte Blühleistung, erleichterte Ernte, Beschleunigung der Reife, höhere Ernteerträge, höhere Qualität und/oder höherer Ernährungswert der Ernteprodukte, höhere Lagerfähigkeit und/oder Bearbeitbarkeit der Ernteprodukte. Weitere und besonders hervorgehobene Beispiele für solche Eigenschaften sind eine erhöhte Abwehrfähigkeit der Pflanzen gegen tierische und mikrobielle Schädlinge, wie Insekten, Spinnentiere, Nematoden, Milben, Schnecken, bewirkt z. B. durch in den Pflanzen entstehende Toxine, insbesondere solche, die durch das genetische Material aus *Bacillus Thuringiensis* (z. B. durch die Gene CryIA(a), CryIA(b), CryIA(c), CryIIA, CryIIIA, CryIIIB2, Cry9c Cry2Ab, Cry3Bb und CryIF sowie deren Kombinationen) in den Pflanzen erzeugt werden, ferner eine erhöhte Abwehrfähigkeit der Pflanzen gegen pflanzenpathogene Pilze, Bakterien und/oder Viren, bewirkt z. B. durch Systemisch Akquirierte Resistenz (SAR), Systemin, Phytoalexine, Elicitoren sowie Resistenzgene und entsprechend exprimierte Proteine und Toxine, sowie eine erhöhte Toleranz der Pflanzen gegen bestimmte herbizide Wirkstoffe, beispielsweise Imidazolinone, Sulfonylharnstoffe, Glyphosat oder Phosphinotricin (z. B. "PAT"-Gen). Die jeweils die gewünschten Eigenschaften ("Traits") verleihenden Gene können auch in Kombinationen miteinander in den transgenen Pflanzen vorkommen. Als Beispiele transgener Pflanzen werden die wichtigen Kulturpflanzen, wie Getreide (Weizen, Reis, Triticale, Gerste, Roggen, Hafer), Mais, Soja, Kartoffel, Zuckerrüben, Zuckerrohr,

Tomaten, Erbsen und andere Gemüsesorten, Baumwolle, Tabak, Raps, sowie Obstpflanzen (mit den Früchten Äpfel, Birnen, Zitrusfrüchte und Weintrauben) erwähnt, wobei Mais, Soja, Weizen, Reis, Kartoffel, Baumwolle, Zuckerrohr, Tabak und Raps besonders hervorgehoben werden. Als Eigenschaften ("Traits") werden besonders hervorgehoben die erhöhte Abwehrfähigkeit der Pflanzen
5 gegen Insekten, Spinnentiere, Nematoden und Schnecken.

Pflanzenschutz – Behandlungsarten

Die Behandlung der Pflanzen und Pflanzenteile mit den Verbindungen der Formel (I) erfolgt direkt oder durch Einwirkung auf deren Umgebung, Lebensraum oder Lagerraum nach den üblichen Behandlungsmethoden, z. B. durch Tauchen, Spritzen, Sprühen, Berieseln, Verdampfen, Zerstäuben,
10 Vernebeln, Verstreuen, Verschäumen, Bestreichen, Verstreichen, Injizieren, Gießen (drenchen), Tröpfchenbewässerung und bei Vermehrungsmaterial, insbesondere bei Saatgut, weiterhin durch Trockenbeizen, Nassbeizen, Schlammbeizen, Inkrustieren, ein- oder mehrschichtiges Umhüllen, usw. Es ist ferner möglich, die Verbindungen der Formel (I) nach dem Ultra-Low-Volume-Verfahren auszubringen oder die Anwendungsform oder die Verbindung der Formel (I) selbst in den Boden zu
15 injizieren.

Eine bevorzugte direkte Behandlung der Pflanzen ist die Blattapplikation, d. h. die Verbindungen der Formel (I) werden auf das Blattwerk aufgebracht, wobei die Behandlungsfrequenz und die Aufwandmenge auf den Befallsdruck des jeweiligen Schädlings abgestimmt sein sollte.

Bei systemisch wirksamen Wirkstoffen gelangen die Verbindungen der Formel (I) auch über das
20 Wurzelwerk in die Pflanzen. Die Behandlung der Pflanzen erfolgt dann durch Einwirkung der Verbindungen der Formel (I) auf den Lebensraum der Pflanze. Das kann beispielsweise durch Drenchen, Einmischen in den Boden oder die Nährlösung sein, d. h. der Standort der Pflanze (z. B. Boden oder hydroponische Systeme) wird mit einer flüssigen Form der Verbindungen der Formel (I) getränkt, oder durch die Bodenapplikation, d. h. die erfindungsgemäßen Verbindungen der Formel (I)
25 werden in fester Form (z. B. in Form eines Granulats) in den Standort der Pflanzen eingebracht. Bei Wasserreiskulturen kann das auch durch Zudosieren der Verbindung der Formel (I) in einer festen Anwendungsform (z. B. als Granulat) in ein überflutetes Reisfeld sein.

Saatgutbehandlung

Die Bekämpfung von tierischen Schädlingen durch die Behandlung des Saatguts von Pflanzen ist seit
30 langem bekannt und ist Gegenstand ständiger Verbesserungen. Dennoch ergeben sich bei der Behandlung von Saatgut eine Reihe von Problemen, die nicht immer zufriedenstellend gelöst werden können. So ist es erstrebenswert, Verfahren zum Schutz des Saatguts und der keimenden Pflanze zu entwickeln, die das zusätzliche Ausbringen von Schädlingsbekämpfungsmitteln bei der Lagerung, nach der Saat oder nach dem Auflaufen der Pflanzen überflüssig machen oder zumindest deutlich verringern.

Es ist weiterhin erstrebenswert, die Menge des eingesetzten Wirkstoffs dahingehend zu optimieren, dass das Saatgut und die keimende Pflanze vor dem Befall durch tierische Schädlinge bestmöglich geschützt werden, ohne jedoch die Pflanze selbst durch den eingesetzten Wirkstoff zu schädigen. Insbesondere sollten Verfahren zur Behandlung von Saatgut auch die intrinsischen insektiziden bzw. nematiziden

5 Eigenschaften schädlingsresistenter bzw. -toleranter transgener Pflanzen einbeziehen, um einen optimalen Schutz des Saatguts und auch der keimenden Pflanze bei einem minimalen Aufwand an Schädlingsbekämpfungsmitteln zu erreichen.

Die vorliegende Erfindung bezieht sich daher insbesondere auch auf ein Verfahren zum Schutz von Saatgut und keimenden Pflanzen vor dem Befall von Schädlingen, indem das Saatgut mit einer der

10 Verbindungen der Formel (I) behandelt wird. Das erfindungsgemäße Verfahren zum Schutz von Saatgut und keimenden Pflanzen vor dem Befall von Schädlingen umfasst ferner ein Verfahren, in dem das Saatgut gleichzeitig in einem Vorgang oder sequentiell mit einer Verbindung der Formel (I) und einer Mischungskomponente behandelt wird. Es umfasst ferner auch ein Verfahren, in dem das Saatgut zu unterschiedlichen Zeiten mit einer Verbindung der Formel (I) und einer Mischungskomponente

15 behandelt wird.

Die Erfindung bezieht sich ebenfalls auf die Verwendung der Verbindungen der Formel (I) zur Behandlung von Saatgut zum Schutz des Saatguts und der daraus entstehenden Pflanze vor tierischen Schädlingen.

Weiterhin bezieht sich die Erfindung auf Saatgut, welches zum Schutz vor tierischen Schädlingen mit

20 einer erfindungsgemäßen Verbindung der Formel (I) behandelt wurde. Die Erfindung bezieht sich auch auf Saatgut, welches zur gleichen Zeit mit einer Verbindung der Formel (I) und einer Mischungskomponente behandelt wurde. Die Erfindung bezieht sich weiterhin auf Saatgut, welches zu unterschiedlichen Zeiten mit einer Verbindung der Formel (I) und einer Mischungskomponente behandelt wurde. Bei Saatgut, welches zu unterschiedlichen Zeiten mit einer Verbindung der Formel (I)

25 und einer Mischungskomponente behandelt wurde, können die einzelnen Substanzen in unterschiedlichen Schichten auf dem Saatgut vorhanden sein. Dabei können die Schichten, die eine Verbindung der Formel (I) und Mischungskomponenten enthalten, gegebenenfalls durch eine Zwischenschicht getrennt sein. Die Erfindung bezieht sich auch auf Saatgut, bei dem eine Verbindung der Formel (I) und eine Mischungskomponente als Bestandteil einer Umhüllung oder als weitere Schicht

30 oder weitere Schichten zusätzlich zu einer Umhüllung aufgebracht sind.

Des Weiteren bezieht sich die Erfindung auf Saatgut, welches nach der Behandlung mit einer Verbindung der Formel (I) einem Filmcoating-Verfahren unterzogen wird, um Staubabrieb am Saatgut zu vermeiden.

Einer der auftretenden Vorteile, wenn eine Verbindung der Formel (I) systemisch wirkt, ist es, dass die

35 Behandlung des Saatguts nicht nur das Saatgut selbst, sondern auch die daraus hervorgehenden Pflanzen

nach dem Auflaufen vor tierischen Schädlingen schützt. Auf diese Weise kann die unmittelbare Behandlung der Kultur zum Zeitpunkt der Aussaat oder kurz danach entfallen.

Ein weiterer Vorteil ist darin zu sehen, dass durch die Behandlung des Saatguts mit einer Verbindung der Formel (I) Keimung und Auflauf des behandelten Saatguts gefördert werden können.

- 5 Ebenso ist es als vorteilhaft anzusehen, dass Verbindungen der Formel (I) insbesondere auch bei transgenem Saatgut eingesetzt werden können.

Verbindungen der Formel (I) können ferner in Kombination mit Mitteln der Signaltechnologie eingesetzt werden, wodurch eine bessere Besiedlung mit Symbionten, wie zum Beispiel Rhizobien, Mycorrhiza und/oder endophytischen Bakterien oder Pilzen, stattfindet und/oder es zu einer optimierten

- 10 Stickstofffixierung kommt.

Die Verbindungen der Formel (I) eignen sich zum Schutz von Saatgut jeglicher Pflanzensorte, die in der Landwirtschaft, im Gewächshaus, in Forsten oder im Gartenbau eingesetzt wird. Insbesondere handelt es sich dabei um Saatgut von Getreide (z. B. Weizen, Gerste, Roggen, Hirse und Hafer), Mais, Baumwolle, Soja, Reis, Kartoffeln, Sonnenblume, Kaffee, Tabak, Canola, Raps, Rübe (z. B. Zuckerrübe und Futterrübe), Erdnuss, Gemüse (z. B. Tomate, Gurke, Bohne, Kohlgewächse, Zwiebeln und Salat), Obstpflanzen, Rasen und Zierpflanzen. Besondere Bedeutung kommt der Behandlung des Saatguts von Getreide (wie Weizen, Gerste, Roggen und Hafer), Mais, Soja, Baumwolle, Canola, Raps, Gemüse und Reis zu.

- Wie vorstehend bereits erwähnt, kommt auch der Behandlung von transgenem Saatgut mit einer Verbindung der Formel (I) eine besondere Bedeutung zu. Dabei handelt es sich um das Saatgut von Pflanzen, die in der Regel zumindest ein heterologes Gen enthalten, das die Expression eines Polypeptids mit insbesondere insektiziden bzw. nematiziden Eigenschaften steuert. Die heterologen Gene in transgenem Saatgut können dabei aus Mikroorganismen wie *Bacillus*, *Rhizobium*, *Pseudomonas*, *Serratia*, *Trichoderma*, *Clavibacter*, *Glomus* oder *Gliocladium* stammen. Die vorliegende Erfindung eignet sich besonders für die Behandlung von transgenem Saatgut, das zumindest ein heterologes Gen enthält, das aus *Bacillus* sp. stammt. Besonders bevorzugt handelt es sich dabei um ein heterologes Gen, das aus *Bacillus thuringiensis* stammt.
- 20
25

- Im Rahmen der vorliegenden Erfindung wird die Verbindung der Formel (I) auf das Saatgut aufgebracht. Vorzugsweise wird das Saatgut in einem Zustand behandelt, in dem es so stabil ist, dass keine Schäden bei der Behandlung auftreten. Im Allgemeinen kann die Behandlung des Saatguts zu jedem Zeitpunkt zwischen der Ernte und der Aussaat erfolgen. Üblicherweise wird Saatgut verwendet, das von der Pflanze getrennt und von Kolben, Schalen, Stängeln, Hüllen, Wolle oder Fruchtfleisch befreit wurde. So kann zum Beispiel Saatgut verwendet werden, das geerntet, gereinigt und bis zu einem lagerfähigen Feuchtigkeitsgehalt getrocknet wurde. Alternativ kann auch Saatgut verwendet werden, das
- 30

nach dem Trocknen z. B. mit Wasser behandelt und dann erneut getrocknet wurde, zum Beispiel Priming. Im Fall von Reis-Saatgut ist es auch möglich, Saatgut zu verwenden, das getränkt wurde, zum Beispiel in Wasser bis zu einem bestimmten Stadium des Reiseumbrs („Pigeon Breast Stage“), wodurch die Keimung und ein einheitlicheres Auflaufen stimuliert wird.

- 5 Im Allgemeinen muss bei der Behandlung des Saatguts darauf geachtet werden, dass die Menge der auf das Saatgut aufgetragenen Verbindung der Formel (I) und/oder weiterer Zusatzstoffe so gewählt wird, dass die Keimung des Saatguts nicht beeinträchtigt bzw. die daraus hervorgehende Pflanze nicht geschädigt wird. Dies ist vor allem bei Wirkstoffen zu beachten, die in bestimmten Aufwandmengen phytotoxische Effekte zeigen können.
- 10 Die Verbindungen der Formel (I) werden in der Regel in Form einer geeigneten Formulierung auf das Saatgut aufgetragt. Geeignete Formulierungen und Verfahren für die Saatgutbehandlung sind dem Fachmann bekannt.

Die Verbindungen der Formel (I) können in die üblichen Beizmittel-Formulierungen überführt werden, wie Lösungen, Emulsionen, Suspensionen, Pulver, Schäume, Slurries oder andere Hüllmassen für

- 15 Saatgut, sowie ULV-Formulierungen.

Diese Formulierungen werden in bekannter Weise hergestellt, indem man die Verbindungen der Formel (I) mit üblichen Zusatzstoffen vermischt, wie zum Beispiel übliche Streckmittel sowie Lösungs- oder Verdünnungsmittel, Farbstoffe, Netzmittel, Dispergiermittel, Emulgatoren, Entschäumer, Konservierungsmittel, sekundäre Verdickungsmittel, Kleber, Gibberelline und auch Wasser.

- 20 Als Farbstoffe, die in den erfindungsgemäß verwendbaren Beizmittel-Formulierungen enthalten sein können, kommen alle für derartige Zwecke üblichen Farbstoffe in Betracht. Dabei sind sowohl in Wasser wenig lösliche Pigmente als auch in Wasser lösliche Farbstoffe verwendbar. Als Beispiele genannt seien die unter den Bezeichnungen Rhodamin B, C.I. Pigment Red 112 und C.I. Solvent Red 1 bekannten Farbstoffe.
- 25 Als Netzmittel, die in den erfindungsgemäß verwendbaren Beizmittel-Formulierungen enthalten sein können, kommen alle zur Formulierung von agrochemischen Wirkstoffen üblichen, die Benetzung fördernden Stoffe in Frage. Vorzugsweise verwendbar sind Alkyl-naphthalinsulfonate, wie Diisopropyl- oder Diisobutyl-naphthalinsulfonate.

- Als Dispergiermittel und/oder Emulgatoren, die in den erfindungsgemäß verwendbaren Beizmittel-
- 30 Formulierungen enthalten sein können, kommen alle zur Formulierung von agrochemischen Wirkstoffen üblichen nichtionischen, anionischen und kationischen Dispergiermittel in Betracht. Vorzugsweise verwendbar sind nichtionische oder anionische Dispergiermittel oder Gemische von nichtionischen oder anionischen Dispergiermitteln. Als geeignete nichtionische Dispergiermittel sind insbesondere

Ethylenoxid-Propylenoxid-Blockpolymere, Alkylphenolpolyglykolether sowie Tri-stryrylphenolpolyglykolether und deren phosphatierte oder sulfatierte Derivate zu nennen. Geeignete anionische Dispergiermittel sind insbesondere Ligninsulfonate, Polyacrylsäuresalze und Arylsulfonat-Formaldehydkondensate.

- 5 Als Entschäumer können in den erfindungsgemäß verwendbaren Beizmittel-Formulierungen alle zur Formulierung von agrochemischen Wirkstoffen üblichen schaumhemmenden Stoffe enthalten sein. Vorzugsweise verwendbar sind Silikonentschäumer und Magnesiumstearat.

- Als Konservierungsmittel können in den erfindungsgemäß verwendbaren Beizmittel-Formulierungen alle für derartige Zwecke in agrochemischen Mitteln einsetzbaren Stoffe vorhanden sein. Beispielhaft
10 genannt seien Dichlorophen und Benzylalkoholhemiformal.

Als sekundäre Verdickungsmittel, die in den erfindungsgemäß verwendbaren Beizmittel-Formulierungen enthalten sein können, kommen alle für derartige Zwecke in agrochemischen Mitteln einsetzbaren Stoffe in Frage. Vorzugsweise in Betracht kommen Cellulosederivate, Acrylsäurederivate, Xanthan, modifizierte Tone und hochdisperse Kieselsäure.

- 15 Als Kleber, die in den erfindungsgemäß verwendbaren Beizmittel-Formulierungen enthalten sein können, kommen alle üblichen in Beizmitteln einsetzbaren Bindemittel in Frage. Vorzugsweise genannt seien Polyvinylpyrrolidon, Polyvinylacetat, Polyvinylalkohol und Tylose.

- Als Gibberelline, die in den erfindungsgemäß verwendbaren Beizmittel-Formulierungen enthalten sein können, kommen vorzugsweise die Gibberelline A1, A3 (= Gibberellinsäure), A4 und A7 infrage, be-
20 sonders bevorzugt verwendet man die Gibberellinsäure. Die Gibberelline sind bekannt (vgl. R. Wegler „Chemie der Pflanzenschutz- und Schädlingsbekämpfungsmittel“, Bd. 2, Springer Verlag, 1970, S. 401-412).

- Die erfindungsgemäß verwendbaren Beizmittel-Formulierungen können entweder direkt oder nach vorherigem Verdünnen mit Wasser zur Behandlung von Saatgut der verschiedensten Art eingesetzt
25 werden. So lassen sich die Konzentrate oder die daraus durch Verdünnen mit Wasser erhältlichen Zubereitungen einsetzen zur Beizung des Saatgutes von Getreide, wie Weizen, Gerste, Roggen, Hafer und Triticale, sowie des Saatgutes von Mais, Reis, Raps, Erbsen, Bohnen, Baumwolle, Sonnenblumen, Soja und Rüben oder auch von Gemüsesaatgut der verschiedensten Natur. Die erfindungsgemäß verwendbaren Beizmittel-Formulierungen oder deren verdünnte Anwendungsformen können auch zum
30 Beizen von Saatgut transgener Pflanzen eingesetzt werden.

Zur Behandlung von Saatgut mit den erfindungsgemäß verwendbaren Beizmittel-Formulierungen oder dem daraus durch Zugabe von Wasser hergestellten Anwendungsformen kommen alle üblicherweise für die Beizung einsetzbaren Mischgeräte in Betracht. Im Einzelnen geht man bei der Beizung so vor, dass

man das Saatgut in einen Mischer im diskontinuierlichen oder kontinuierlichen Betrieb gibt, die jeweils gewünschte Menge an Beizmittel-Formulierungen entweder als solche oder nach vorherigem Verdünnen mit Wasser hinzufügt und bis zur gleichmäßigen Verteilung der Formulierung auf dem Saatgut mischt. Gegebenenfalls schließt sich ein Trocknungsvorgang an.

- 5 Die Aufwandmenge an den erfindungsgemäß verwendbaren Beizmittel-Formulierungen kann innerhalb eines größeren Bereiches variiert werden. Sie richtet sich nach dem jeweiligen Gehalt der Verbindungen der Formel (I) in den Formulierungen und nach dem Saatgut. Die Aufwandmengen bei der Verbindung der Formel (I) liegen im Allgemeinen zwischen 0,001 und 50 g pro Kilogramm Saatgut, vorzugsweise zwischen 0,01 und 15 g pro Kilogramm Saatgut.

10 Tiergesundheit

Auf dem Gebiet der Tiergesundheit, d. h. dem Gebiet der Tiermedizin, sind die Verbindungen der Formel (I) gegen Tierparasiten, insbesondere Ektoparasiten oder Endoparasiten, wirksam. Der Begriff Endoparasit umfasst insbesondere Helminthen und Protozoen wie Kokzidien. Ektoparasiten sind typischerweise und bevorzugt Arthropoden, insbesondere Insekten oder Akariden.

- 15 Auf dem Gebiet der Tiermedizin eignen sich die Verbindungen der Formel (I), die eine günstige Toxizität gegenüber Warmblütern aufweisen, für die Bekämpfung von Parasiten, die in der Tierzucht und Tierhaltung bei Nutztieren, Zuchttieren, Zootieren, Laboratoriumstieren, Versuchstieren und Haustieren auftreten. Sie sind gegen alle oder einzelne Entwicklungsstadien der Parasiten wirksam.

- 20 Zu den landwirtschaftlichen Nutztieren zählen zum Beispiel Säugetiere wie Schafe, Ziegen, Pferde, Esel, Kamele, Büffel, Kaninchen, Rentiere, Damhirsche und insbesondere Rinder und Schweine; oder Geflügel wie Truthähne, Enten, Gänse und insbesondere Hühner; oder Fische oder Krustentiere, z. B. in der Aquakultur, oder gegebenenfalls Insekten wie Bienen.

- 25 Zu den Haustieren zählen zum Beispiel Säugetiere wie Hamster, Meerschweinchen, Ratten, Mäuse, Chinchillas, Frettchen und insbesondere Hunde, Katzen, Stubenvögel; Reptilien, Amphibien oder Aquariumfische.

Gemäß einer bestimmten Ausführungsform werden die Verbindungen der Formel (I) an Säugetiere verabreicht.

Gemäß einer weiteren bestimmten Ausführungsform werden die Verbindungen der Formel (I) an Vögel, nämlich Stubenvögel oder insbesondere Geflügel, verabreicht.

- 30 Durch Verwendung der Verbindungen der Formel (I) für die Bekämpfung von Tierparasiten sollen Krankheit, Todesfälle und Leistungsminderungen (bei Fleisch, Milch, Wolle, Häuten, Eiern, Honig und

dergleichen) verringert bzw. vorgebeugt werden, so dass eine wirtschaftlichere und einfachere Tierhaltung ermöglicht wird und ein besseres Wohlbefinden der Tiere erzielbar ist.

In Bezug auf das Gebiet der Tiergesundheit bedeutet der Begriff "Bekämpfung" oder "bekämpfen" im vorliegenden Zusammenhang, dass durch die Verbindungen der Formel (I) wirksam das Auftreten des jeweiligen Parasiten in einem Tier, das mit solchen Parasiten in einem harmlosen Ausmaß infiziert ist, reduziert wird. Genauer gesagt bedeutet "bekämpfen" im vorliegenden Zusammenhang, dass die Verbindungen der Formel (I) den jeweiligen Parasiten abtöten, sein Wachstum verhindern oder seine Vermehrung verhindern.

Zu den Arthropoden zählen beispielsweise, ohne hierauf beschränkt zu sein,

10 aus der Ordnung Anoplurida zum Beispiel *Haematopinus* spp., *Linognathus* spp., *Pediculus* spp., *Phthirus* spp., *Solenopotes* spp.;

aus der Ordnung Mallophagida und den Unterordnungen Amblycerina und Ischnocerina, zum Beispiel *Bovicola* spp., *Damalina* spp., *Felicola* spp.; *Lepikentron* spp., *Menopon* spp., *Trichodectes* spp., *Trimenopon* spp., *Trinoton* spp., *Werneckiella* spp.;

15 aus der Ordnung Diptera und den Unterordnungen Nematocera und Brachycera, zum Beispiel *Aedes* spp., *Anopheles* spp., *Atylotus* spp., *Braula* spp., *Calliphora* spp., *Chrysomya* spp., *Chrysops* spp., *Culex* spp., *Culicoides* spp., *Eusimulium* spp., *Fannia* spp., *Gasterophilus* spp., *Glossina* spp., *Haematobia* spp., *Haematopota* spp., *Hippobosca* spp., *Hybomitra* spp., *Hydrotaea* spp., *Hypoderma* spp., *Lipoptena* spp., *Lucilia* spp., *Lutzomyia* spp., *Melophagus* spp., *Morellia* spp., *Musca* spp.,
20 *Odagmia* spp., *Oestrus* spp., *Philipomyia* spp., *Phlebotomus* spp., *Rhinoestrus* spp., *Sarcophaga* spp., *Simulium* spp., *Stomoxys* spp., *Tabanus* spp., *Tipula* spp., *Wilhelmia* spp., *Wohlfahrtia* spp.;

aus der Ordnung Siphonaptera, zum Beispiel *Ceratophyllus* spp., *Ctenocephalides* spp., *Pulex* spp., *Tunga* spp., *Xenopsylla* spp.;

aus der Ordnung Heteroptera, zum Beispiel *Cimex* spp., *Panstrongylus* spp., *Rhodnius* spp., *Triatoma* spp.; sowie Lästlinge und Hygieneschädlinge aus der Ordnung Blattaria.

Weiterhin sind bei den Arthropoden beispielhaft, ohne hierauf beschränkt zu sein, die folgenden Akari zu nennen:

Aus der Unterklasse Akari (Acarina) und der Ordnung Metastigmata, zum Beispiel aus der Familie Argasidae, wie *Argas* spp., *Ornithodoros* spp., *Otobius* spp., aus der Familie Ixodidae, wie *Amblyomma* spp., *Dermacentor* spp., *Haemaphysalis* spp., *Hyalomma* spp., *Ixodes* spp., *Rhipicephalus* (*Boophilus*) spp., *Rhipicephalus* spp. (die ursprüngliche Gattung der mehrwirtigen Zecken); aus der Ordnung Mesostigmata, wie *Dermanyssus* spp., *Ornithonyssus* spp., *Pneumonyssus* spp., *Raillietia* spp.,

- Sternostoma spp., Tropilaelaps spp., Varroa spp.; aus der Ordnung Actinedida (Prostigmata), zum Beispiel Acarapis spp., Cheyletiella spp., Demodex spp., Listrophorus spp., Myobia spp., Neotrombicula spp., Ornithocheyletia spp., Psorergates spp., Trombicula spp.; und aus der Ordnung der Acaridida (Astigmata), zum Beispiel Acarus spp., Caloglyphus spp., Chorioptes spp., Cytodites spp., Hypodectes spp., Knemidocoptes spp., Laminosioptes spp., Notoedres spp., Otodectes spp., Psoroptes spp., Pterolichus spp., Sarcoptes spp., Trixacarus spp., Tyrophagus spp.

Zu Beispielen für parasitäre Protozoen zählen, ohne hierauf beschränkt zu sein:

Mastigophora (Flagellata), wie:

Metamonada: aus der Ordnung Diplomonadida zum Beispiel Giardia spp., Spironucleus spp.

- 10 Parabasala: aus der Ordnung Trichomonadida zum Beispiel Histomonas spp., Pentatrichomonas spp., Tetratrichomonas spp., Trichomonas spp., Tritrichomonas spp.

Euglenozoa: aus der Ordnung Trypanosomatida zum Beispiel Leishmania spp., Trypanosoma spp.

Sarcomastigophora (Rhizopoda), wie Entamoebidae, zum Beispiel Entamoeba spp., Centramoebidae, zum Beispiel Acanthamoeba sp., Euamoebidae, z. B. Hartmanella sp.

- 15 Alveolata wie Apicomplexa (Sporozoa): z. B. Cryptosporidium spp.; aus der Ordnung Eimeriida zum Beispiel Besnoitia spp., Cystoisospora spp., Eimeria spp., Hammondia spp., Isospora spp., Neospora spp., Sarcocystis spp., Toxoplasma spp.; aus der Ordnung Adeleida z. B. Hepatozoon spp., Klossiella spp.; aus der Ordnung Haemosporida z. B. Leucocytozoon spp., Plasmodium spp.; aus der Ordnung Piroplasmida z. B. Babesia spp., Ciliophora spp., Echinozoon spp., Theileria spp.; aus der Ordnung
- 20 Vesiculiferida z. B. Balantidium spp., Buxtonella spp.

Microspora wie Encephalitozoon spp., Enterocytozoon spp., Globidium spp., Nosema spp., und außerdem z. B. Myxozoa spp.

Zu den für Menschen oder Tiere pathogenen Helminthen zählen zum Beispiel Acanthocephala, Nematoden, Pentastoma und Platyhelminthen (z.B. Monogenea, Cestodes und Trematodes).

- 25 Zu beispielhaften Helminthen zählen, ohne hierauf beschränkt zu sein:

Monogenea: z. B.: Dactylogyrus spp., Gyrodactylus spp., Microbothrium spp., Polystoma spp., Troglecephalus spp.;

Cestodes: aus der Ordnung Pseudophyllidea zum Beispiel: Bothridium spp., Diphyllbothrium spp., Diplogonoporus spp. Ichthyobothrium spp., Ligula spp., Schistocephalus spp., Spirometra spp.

Aus der Ordnung Cyclophyllida zum Beispiel: *Andyra* spp., *Anoplocephala* spp., *Avitellina* spp., *Bertiella* spp., *Cittotaenia* spp., *Davainea* spp., *Diorchis* spp., *Diplopylidium* spp., *Dipylidium* spp., *Echinococcus* spp., *Echinocotyle* spp., *Echinolepis* spp., *Hydatigera* spp., *Hymenolepis* spp., *Joyeuxiella* spp., *Mesocestoides* spp., *Moniezia* spp., *Paranoplocephala* spp., *Railletina* spp., *Stilesia* spp., *Taenia* spp., *Thysaniezia* spp., *Thysanosoma* spp.

Trematodes: aus der Klasse Digenea zum Beispiel: *Austroilharzia* spp., *Brachylaima* spp., *Calicophoron* spp., *Catatropis* spp., *Clonorchis* spp., *Collyriclum* spp., *Cotylophoron* spp., *Cyclocoelum* spp., *Dicrocoelium* spp., *Diplostomum* spp., *Echinochasmus* spp., *Echinoparyphium* spp., *Echinostoma* spp., *Eurytrema* spp., *Fasciola* spp., *Fasciolides* spp., *Fasciolopsis* spp., *Fiscoederius* spp., *Gastrothylacus* spp., *Gigantobilharzia* spp., *Gigantocotyle* spp., *Heterophyes* spp., *Hypoderaeum* spp., *Leucochloridium* spp., *Metagonimus* spp., *Metorchis* spp., *Nanophyetus* spp., *Notocotylus* spp., *Opisthorchis* spp., *Ornithobilharzia* spp., *Paragonimus* spp., *Paramphistomum* spp., *Plagiorchis* spp., *Posthodiplostomum* spp., *Prosthogonimus* spp., *Schistosoma* spp., *Trichobilharzia* spp., *Troglostrongylus* spp., *Typhlocoelum* spp.

Nematoden: aus der Ordnung Trichinellida zum Beispiel: *Capillaria* spp., *Trichinella* spp., *Trichomosoides* spp., *Trichuris* spp.

Aus der Ordnung Tylenchida zum Beispiel: *Micronema* spp., *Parastrongylus* spp., *Strongylus* spp.

Aus der Ordnung Rhabditina zum Beispiel: *Aelurostrongylus* spp., *Amidostomum* spp., *Ancylostoma* spp., *Angiostrongylus* spp., *Bronchonema* spp., *Bunostomum* spp., *Chabertia* spp., *Cooperia* spp., *Cooperioides* spp., *Crenosoma* spp., *Cyathostomum* spp., *Cyclocercus* spp., *Cyclodontostomum* spp., *Cylicocycylus* spp., *Cylicostephanus* spp., *Cylindropharynx* spp., *Cystocaulus* spp., *Dictyocaulus* spp., *Elaphostrongylus* spp., *Filaroides* spp., *Globocephalus* spp., *Graphidium* spp., *Gyalocephalus* spp., *Haemonchus* spp., *Heligmosomoides* spp., *Hyostrongylus* spp., *Marshallagia* spp., *Metastrongylus* spp., *Muellerius* spp., *Necator* spp., *Nematodirus* spp., *Neoststrongylus* spp., *Nippostrongylus* spp., *Obeliscoides* spp., *Oesophagodontus* spp., *Oesophagostomum* spp., *Ollulanus* spp., *Ornithostrongylus* spp., *Oslerus* spp., *Ostertagia* spp., *Paracooperia* spp., *Paracrenosoma* spp., *Parafilaroides* spp., *Parelaphostrongylus* spp., *Pneumocaulus* spp., *Pneumoststrongylus* spp., *Poteriostomum* spp., *Protostrongylus* spp., *Spicocaulus* spp., *Stephanurus* spp., *Strongylus* spp., *Syngamus* spp., *Teladorsagia* spp., *Trichonema* spp., *Trichostrongylus* spp., *Triodontophorus* spp., *Troglostrongylus* spp., *Uncinaria* spp.

Aus der Ordnung Spirurida zum Beispiel: *Acanthocheilonema* spp., *Anisakis* spp., *Ascaridia* spp., *Ascaris* spp., *Ascarops* spp., *Aspicularis* spp., *Baylisascaris* spp., *Brugia* spp., *Cercopithifilaria* spp., *Crassicauda* spp., *Dipetalonema* spp., *Dirofilaria* spp., *Dracunculus* spp., *Draschia* spp., *Enterobius* spp., *Filaria* spp., *Gnathostoma* spp., *Gongylonema* spp., *Habronema* spp., *Heterakis* spp., *Litomosoides* spp., *Loa* spp., *Onchocerca* spp., *Oxyuris* spp., *Parabronema* spp., *Parafilaria* spp., *Parascaris* spp., *Passalurus*

spp., Physaloptera spp., Probstmayria spp., Pseudofilaria spp., Setaria spp., Skjrabinema spp., Spirocercia spp., Stephanofilaria spp., Strongyluris spp., Syphacia spp., Thelazia spp., Toxascaris spp., Toxocara spp., Wuchereria spp.

- 5 Acanthocephala: aus der Ordnung Oligacanthorhynchida z.B: Macracanthorhynchus spp., Prosthenorchis spp.; aus der Ordnung Moniliformida zum Beispiel: Moniliformis spp.,

Aus der Ordnung Polymorphida zum Beispiel: Filicollis spp.; aus der Ordnung Echinorhynchida zum Beispiel Acanthocephalus spp., Echinorhynchus spp., Leptorhynchoides spp.

Pentastoma: aus der Ordnung Porocephalida zum Beispiel Linguatula spp.

- 10 Auf dem Gebiet der Tiermedizin und der Tierhaltung erfolgt die Verabreichung der Verbindungen der Formel (I) nach allgemein fachbekannten Verfahren, wie enteral, parenteral, dermal oder nasal in Form von geeigneten Präparaten. Die Verabreichung kann prophylaktisch; metaphylaktisch oder therapeutisch erfolgen.

So bezieht sich eine Ausführungsform der vorliegenden Erfindung auf die Verbindungen der Formel (I) zur Verwendung als Arzneimittel.

- 15 Ein weiterer Aspekt bezieht sich auf die Verbindungen der Formel (I) zur Verwendung als Antiendoparasitikum.

Ein weiterer spezieller Aspekt der Erfindung betrifft die Verbindungen der Formel (I) zur Verwendung als Antihelminthikum, insbesondere zur Verwendung als Nematizid, Platymelminthizid, Acanthocephalizid oder Pentastomizid.

- 20 Ein weiterer spezieller Aspekt der Erfindung betrifft die Verbindungen der Formel (I) zur Verwendung als Antiprotozoikum.

Ein weiterer Aspekt betrifft die Verbindungen der Formel (I) zur Verwendung als Antiektoparasitikum, insbesondere ein Arthropodizid, ganz besonders ein Insektizid oder ein Akarizid.

- 25 Weitere Aspekte der Erfindung sind veterinärmedizinische Formulierungen, die eine wirksame Menge mindestens einer Verbindung der Formel (I) und mindestens einen der folgenden umfassen: einen pharmazeutisch unbedenklichen Exzipienten (z.B. feste oder flüssige Verdünnungsmittel), ein pharmazeutisch unbedenkliches Hilfsmittel (z.B. Tenside), insbesondere einen herkömmlicherweise in veterinärmedizinischen Formulierungen verwendeten pharmazeutisch unbedenklichen Exzipienten und/oder ein herkömmlicherweise in veterinärmedizinischen Formulierungen verwendetes
30 pharmazeutisch unbedenkliches Hilfsmittel.

Ein verwandter Aspekt der Erfindung ist ein Verfahren zur Herstellung einer wie hier beschriebenen veterinärmedizinischen Formulierung, welches den Schritt des Mischens mindestens einer Verbindung der Formel (I) mit pharmazeutisch unbedenklichen Exzipienten und/oder Hilfsmitteln, insbesondere mit herkömmlicherweise in veterinärmedizinischen Formulierungen verwendeten pharmazeutisch unbedenklichen Exzipienten und/oder herkömmlicherweise in veterinärmedizinischen Formulierungen verwendeten Hilfsmitteln umfasst.

Ein anderer spezieller Aspekt der Erfindung sind veterinärmedizinische Formulierungen ausgewählt aus der Gruppe ektoparasitizider und endoparasitizider Formulierungen, insbesondere ausgewählt aus der Gruppe anthelmintischer, antiprotozoalischer und arthropodizider Formulierungen, ganz besonders ausgewählt aus der Gruppe nematizider, platyhelminthizider, acanthocephalizider, pentastomizider, insektizider und akkarizider Formulierungen, gemäß den erwähnten Aspekten, sowie Verfahren zu ihrer Herstellung.

Ein anderer Aspekt bezieht sich auf ein Verfahren zur Behandlung einer parasitischen Infektion, insbesondere einer Infektion durch einen Parasiten ausgewählt aus der Gruppe der hier erwähnten Ektoparasiten und Endoparasiten, durch Anwendung einer wirksamen Menge einer Verbindung der Formel (I) bei einem Tier, insbesondere einem nichthumanen Tier, das dessen bedarf.

Ein anderer Aspekt bezieht sich auf ein Verfahren zur Behandlung einer parasitischen Infektion, insbesondere einer Infektion durch einen Parasiten ausgewählt aus der Gruppe der hier erwähnten Ektoparasiten und Endoparasiten, durch Anwendung einer wie hier definierten veterinärmedizinischen Formulierung bei einem Tier, insbesondere einem nichthumanen Tier, das dessen bedarf.

Ein anderer Aspekt bezieht sich auf die Verwendung der Verbindungen der Formel (I) bei der Behandlung einer Parasiteninfektion, insbesondere einer Infektion durch einen Parasiten ausgewählt aus der Gruppe der hier erwähnten Ektoparasiten und Endoparasiten, bei einem Tier, insbesondere einem nichthumanen Tier.

Im vorliegenden tiergesundheitlichen oder veterinärmedizinischen Zusammenhang schließt der Begriff „Behandlung“ die prophylaktische, die metaphylaktische und die therapeutische Behandlung ein.

Bei einer bestimmten Ausführungsform werden hiermit Mischungen mindestens einer Verbindung der Formel (I) mit anderen Wirkstoffen, insbesondere mit Endo- und Ektoparasitiziden, für das veterinärmedizinische Gebiet bereitgestellt.

Auf dem Gebiet der Tiergesundheit bedeutet „Mischung“ nicht nur, dass zwei (oder mehr) verschiedene Wirkstoffe in einer gemeinsamen Formulierung formuliert werden und entsprechend zusammen angewendet werden, sondern bezieht sich auch auf Produkte, die für jeden Wirkstoff getrennte Formulierungen umfassen. Dementsprechend können, wenn mehr als zwei Wirkstoffe angewendet

werden sollen, alle Wirkstoffe in einer gemeinsamen Formulierung formuliert werden oder alle Wirkstoffe in getrennten Formulierungen formuliert werden; ebenfalls denkbar sind gemischte Formen, bei denen einige der Wirkstoffe gemeinsam formuliert und einige der Wirkstoffe getrennt formuliert sind. Getrennte Formulierungen erlauben die getrennte oder aufeinanderfolgende Anwendung der in
5 Rede stehenden Wirkstoffe.

Die hier mit ihrem „Common Name“ spezifizierten Wirkstoffe sind bekannt und beispielsweise im „Pesticide Manual“ (siehe oben) beschrieben oder im Internet recherchierbar (z.B. <http://www.alanwood.net/pesticides>).

Beispielhafte Wirkstoffe aus der Gruppe der Ektoparasitizide als Mischungspartner schließen, ohne dass dies eine Einschränkung darstellen soll, die oben ausführlich aufgelisteten Insektizide und Akkarizide ein. Weitere verwendbare Wirkstoffe sind unten gemäß der oben erwähnten Klassifikation, die auf dem aktuellen IRAC Mode of Action Classification Scheme beruht, aufgeführt: (1) Acetylcholinesterase (AChE)-Inhibitoren; (2) GABA-gesteuerte Chlorid-Kanal-Blocker; (3) Natrium-Kanal-Modulatoren; (4) kompetitive Modulatoren des nicotinischen Acetylcholin-Rezeptors (nAChR); (5) allosterische
15 Modulatoren des nicotinischen Acetylcholin-Rezeptors (nAChR); (6) allosterische Modulatoren des Glutamat-abhängigen Chloridkanals (GluCl); (7) Juvenilhormon-Mimetika; (8) verschiedene nichtspezifische (Multi-Site) Inhibitoren; (9) Modulatoren Chordotonaler Organe; (10) Milbenwachstumsinhibitoren; (12) Inhibitoren der mitochondrialen ATP-Synthase, wie ATP-Disruptoren; (13) Entkoppler der oxidativen Phosphorylierung durch Störung des Protonengradienten;
20 (14) Blocker des nicotinischen Acetylcholinrezeptorkanals; (15) Inhibitoren der Chitinbiosynthese, Typ 0; (16) Inhibitoren der Chitinbiosynthese, Typ 1; (17) Häutungsdisruptor (insbesondere bei Dipteren, d.h. Zweiflüglern); (18) Ecdyson-Rezeptor-Agonisten; (19) Octopamin-Rezeptor-Agonisten; (21) mitochondriale Komplex-I-Elektronentransportinhibitoren; (25) mitochondriale Komplex-II-Elektronentransportinhibitoren; (20) mitochondriale Komplex-III-Elektronentransportinhibitoren; (22)
25 Blocker des spannungsabhängigen Natriumkanals; (23) Inhibitoren der Acetyl-CoA-Carboxylase; (28) Ryanodinrezeptor-Modulatoren;

Wirkstoffe mit unbekannten oder nicht spezifischen Wirkmechanismen, z. B. Fentrifanil, Fenoxacrim, Cyclopren, Chlorobenzilat, Chlordimeform, Flubenzimin, Dicyclanil, Amidoflomet, Quinomethionat, Triarathen, Clothiazoben, Tetrasul, Kaliumoleat, Petroleum, Metoxadiazon, Gossyplur, Flutenzin,
30 Brompropylat, Cryolit;

Verbindungen aus anderen Klassen, z.B. Butacarb, Dimetilan, Cloethocarb, Phosphocarb, Pirimiphos(-ethyl), Parathion(-ethyl), Methacrifos, Isopropyl-o-salicylat, Trichlorfon, Sulprofos, Propaphos, Sebufos, Pyridathion, Prothoat, Dichlofenthion, Demeton-S-methylsulfon, Isazofos, Cyanofenphos, Dialifos, Carbophenothion, Autathiofos, Aromfenvinfos(-methyl), Azinphos(-ethyl), Chlorpyrifos(-

ethyl), Fosmethilan, Iodofenphos, Dioxabenzofos, Formothion, Fonofos, Flupyrazofos, Fensulfothion, Etrimfos;

- Organochlorverbindungen, z. B. Camphechlor, Lindan, Heptachlor; oder Phenylpyrazole, z. B. Acetoprol, Pyrafluprol, Pyriprol, Vaniliprol, Sisapronil; oder Isoxazoline, z. B. Sarolaner, Afoxolaner,
- 5 Lotilaner, Fluralaner;

Pyrethroide, z. B. (cis-, trans-)Metofluthrin, Profluthrin, Flufenprox, Flubrocycythrinate, Fubfenprox, Fenfluthrin, Protrifenbut, Pyresmethrin, RU15525, Terallethrin, cis-Resmethrin, Heptafluthrin, Bioethanomethrin, Biopermethrin, Fenpyrithrin, cis-Cypermethrin, cis-Permethrin, Clopythrin, Cyhalothrin (lambda-), Chlovaorthrin, oder halogenierte Kohlenwasserstoffverbindungen (HCHs),

- 10 Neonicotinoide, z. B. Nithiazin

Dicloromezotiaz, Triflumezopyrim

makrocyclische Lactone, z. B. Nemadectin, Ivermectin, Latidectin, Moxidectin, Selamectin, Eprinomectin, Doramectin, Emamectinbenzoat; Milbemycinoxim

Tripren, Epofenonan, Diofenolan;

- 15 Biologicals, Hormone oder Pheromone, zum Beispiel natürliche Produkte, z.B. Thuringiensin, Codlemone oder Neem-Komponenten

Dinitrophenole, z. B. Dinocap, Dinobuton, Binapacryl;

Benzoylharnstoffe, z. B. Fluazuron, Penfluron,

Amidinderivate, z. B. Chlormebuform, Cymiazol, Demiditraz

- 20 Bienenstockvarroa-Akarizide, zum Beispiel organische Säuren, z.B. Ameisensäure, Oxalsäure.

Zu beispielhaften Wirkstoffen aus der Gruppe der Endoparasitizide, als Mischungspartner, zählen, ohne hierauf beschränkt zu sein, anthelmintische Wirkstoffe und antiprotozoische Wirkstoffe.

Zu den anthelmintischen Wirkstoffen zählen, ohne hierauf beschränkt zu sein, die folgenden nematiziden, trematiziden und/oder cestoziden Wirkstoffe:

- 25 aus der Klasse der makrocyclischen Lactone zum Beispiel: Eprinomectin, Abamectin, Nemadectin, Moxidectin, Doramectin, Selamectin, Lepimectin, Latidectin, Milbemectin, Ivermectin, Emamectin, Milbemycin;

aus der Klasse der Benzimidazole und Probenzimidazole zum Beispiel: Oxibendazol, Mebendazol, Triclabendazol, Thiophanat, Parbendazol, Oxfendazol, Netobimin, Fenbendazol, Febantel, Thiabendazol, Cyclobendazol, Cambendazol, Albendazol-sulfoxid, Albendazol, Flubendazol;

5 aus der Klasse der Depsipeptide, vorzugsweise cyclischen Depsipeptide, insbesondere 24-gliedrigen cyclischen Depsipeptide, zum Beispiel: Emodepsid, PF1022A;

aus der Klasse der Tetrahydropyrimidine zum Beispiel: Morantel, Pyrantel, Oxantel;

aus der Klasse der Imidazothiazole zum Beispiel: Butamisol, Levamisol, Tetramisol;

aus der Klasse der Aminophenylamidine zum Beispiel: Amidantel, deacyliertes Amidantel (dAMD), Tribendimidin;

10 aus der Klasse der Aminoacetonitrile zum Beispiel: Monepantel;

aus der Klasse der Paraherquamide zum Beispiel: Paraherquamid, Derquantel;

aus der Klasse der Salicylanilide zum Beispiel: Tribromsalan, Bromoxanid, Brotianid, Clioanid, Closantel, Niclosamid, Oxyclozanid, Rafoxanid;

15 aus der Klasse der substituierten Phenole zum Beispiel: Nitroxynil, Bithionol, Disophenol, Hexachlorophen, Niclofolan, Meniclopholan;

aus der Klasse der Organophosphate zum Beispiel: Trichlorfon, Naphthalofos, Dichlorvos/DDVP, Cruformat, Coumaphos, Haloxon;

aus der Klasse der Piperazinone/Chinoline zum Beispiel: Praziquantel, Epsiprantel;

aus der Klasse der Piperazine zum Beispiel: Piperazin, Hydroxyzin;

20 aus der Klasse der Tetracycline zum Beispiel: Tetracyclin, Chlorotetracyclin, Doxycyclin, Oxytetracyclin, Rolitetracyclin;

aus diversen anderen Klassen zum Beispiel: Bunamidin, Niridazol, Resorantel, Omphalotin, Oltipraz, Nitroscanat, Nitroxynil, Oxamniquin, Mirasan, Miracil, Lucanthon, Hycanthon, Hetolin, Emetin, Diethylcarbamazin, Dichlorophen, Diamfenetid, Clonazepam, Bephenium, Amoscanat, Clorsulon.

25 Antiprotozoische Wirkstoffe, darunter, ohne hierauf beschränkt zu sein, die folgenden Wirkstoffe:

aus der Klasse der Triazine zum Beispiel: Diclazuril, Ponazuril, Letrazuril, Toltrazuril;

aus der Klasse Polyletherionophor zum Beispiel: Monensin, Salinomycin, Maduramicin, Narasin;

aus der Klasse der makrocyclischen Lactone zum Beispiel: Milbemycin, Erythromycin;

aus der Klasse der Chinolone zum Beispiel: Enrofloxacin, Pradofloxacin;

aus der Klasse der Chinine zum Beispiel: Chloroquin;

aus der Klasse der Pyrimidine zum Beispiel: Pyrimethamin;

5 aus der Klasse der Sulfonamide zum Beispiel: Sulfachinoxalin, Trimethoprim, Sulfaclozin;

aus der Klasse der Thiamine zum Beispiel: Amprolium;

aus der Klasse der Lincosamide zum Beispiel: Clindamycin;

aus der Klasse der Carbanilide zum Beispiel: Imidocarb;

aus der Klasse der Nitrofurane zum Beispiel: Nifurtimox;

10 aus der Klasse der Chinazolinonalkaloide zum Beispiel: Halofuginon;

aus diversen anderen Klassen zum Beispiel: Oxamniquin, Paromomycin;

aus der Klasse der Vakzine oder Antigene aus Mikroorganismen zum Beispiel: Babesia canis rossi, Eimeria tenella, Eimeria praecox, Eimeria necatrix, Eimeria mitis, Eimeria maxima, Eimeria brunetti, Eimeria acervulina, Babesia canis vogeli, Leishmania infantum, Babesia canis canis, Dictyocaulus
15 viviparus.

Alle genannten Mischungspartner können außerdem, wenn sie auf Grund ihrer funktionellen Gruppen dazu imstande sind, gegebenenfalls mit geeigneten Basen oder Säuren Salze bilden.

Vektorbekämpfung

Die Verbindungen der Formel (I) können auch in der Vektorbekämpfung eingesetzt werden. Ein Vektor
20 im Sinne der vorliegenden Erfindung ist ein Arthropode, insbesondere ein Insekt oder Arachnide, der in der Lage ist, Krankheitserreger wie z. B. Viren, Würmer, Einzeller und Bakterien aus einem Reservoir (Pflanze, Tier, Mensch, etc.) auf einen Wirt zu übertragen. Die Krankheitserreger können entweder mechanisch (z. B. Trachoma durch nicht-stechende Fliegen) auf einem Wirt, oder nach Injektion (z. B. Malaria-Parasiten durch Mücken) in einen Wirt übertragen werden.

25 Beispiele für Vektoren und die von ihnen übertragenen Krankheiten bzw. Krankheitserreger sind:

1) Mücken

- Anopheles: Malaria, Filariose;

- Culex: Japanische Encephalitis, Filariasis, weitere virale Erkrankungen, Übertragung von anderen Würmern;
- Aedes: Gelbfieber, Dengue-Fieber, weitere virale Erkrankungen, Filariasis;
- Simulien: Übertragung von Würmern, insbesondere Onchocerca volvulus;
- 5 - Psychodidae: Übertragung von Leishmaniose
- 2) Läuse: Hautinfektionen, epidemisches Fleckfieber;
- 3) Flöhe: Pest, endemisches Fleckfieber, Bandwürmer;
- 4) Fliegen: Schlafkrankheit (Trypanosomiasis); Cholera, weitere bakterielle Erkrankungen;
- 5) Milben: Acariose, epidemisches Fleckfieber, Rickettsipocken, Tularämie, Saint-Louis-
10 Enzephalitis, Frühsommer-Meningoenzephalitis (FSME), Krim-Kongo-Fieber, Borreliose;
- 6) Zecken: Borelliosen wie Borrelia burgdorferi sensu lato., Borrelia duttoni, Frühsommer-Meningoenzephalitis, Q-Fieber (Coxiella burnetii), Babesien (Babesia canis canis), Ehrlichiose.

Beispiele für Vektoren im Sinne der vorliegenden Erfindung sind Insekten, zum Beispiel Aphiden, Fliegen, Zikaden oder Thripse, die Pflanzenviren auf Pflanzen übertragen können. Weitere Vektoren, die
15 Pflanzenviren übertragen können, sind Spinnmilben, Läuse, Käfer und Nematoden.

Weitere Beispiele für Vektoren im Sinne der vorliegenden Erfindung sind Insekten und Arachniden wie Mücken, insbesondere der Gattungen Aedes, Anopheles, z. B. A. gambiae, A. arabiensis, A. funestus, A. dirus (Malaria) und Culex, Psychodide wie Phlebotomus, Lutzomyia, Läuse, Flöhe, Fliegen, Milben und Zecken, die Krankheitserreger auf Tiere und/oder Menschen übertragen können.

- 20 Eine Vektorbekämpfung ist auch möglich, wenn die Verbindungen der Formel (I) Resistenz-brechend sind.

Verbindungen der Formel (I) sind zur Verwendung in der Prävention von Krankheiten und/oder Krankheitserregern, die durch Vektoren übertragen werden, geeignet. Somit ist ein weiterer Aspekt der vorliegenden Erfindung die Verwendung von Verbindungen der Formel (I) zur Vektorbekämpfung, z. B.
25 in der Landwirtschaft, im Gartenbau, in Forsten, in Gärten und Freizeiteinrichtungen sowie im Vorrats- und Materialschutz.

Schutz von technischen Materialien

Die Verbindungen der Formel (I) eignen sich zum Schutz von technischen Materialien gegen Befall oder Zerstörung durch Insekten, z. B. aus den Ordnungen Coleoptera, Hymenoptera, Isoptera, Lepidoptera, Psocoptera und Zygentoma.

- 5 Unter technischen Materialien sind im vorliegenden Zusammenhang nicht lebende Materialien zu verstehen, wie vorzugsweise Kunststoffe, Klebstoffe, Leime, Papiere und Kartone, Leder, Holz, Holzverarbeitungsprodukte und Anstrichmittel. Die Anwendung der Erfindung zum Schutz von Holz ist besonders bevorzugt.

- In einer weiteren Ausführungsform werden die Verbindungen der Formel (I) zusammen mit mindestens
10 einem weiteren Insektizid und/oder mindestens einem Fungizid eingesetzt.

In einer weiteren Ausführungsform liegen die Verbindungen der Formel (I) als ein anwendungsfertiges (ready-to-use) Schädlingsbekämpfungsmittel vor, d. h., sie können ohne weitere Änderungen auf das entsprechende Material aufgebracht werden. Als weitere Insektizide oder Fungizide kommen insbesondere die oben genannten in Frage.

- 15 Überraschenderweise wurde auch gefunden, dass die Verbindungen der Formel (I) zum Schutz vor Bewuchs von Gegenständen, insbesondere von Schiffskörpern, Sieben, Netzen, Bauwerken, Kaianlagen und Signalanlagen, welche mit See- oder Brackwasser in Verbindung kommen, verwendet werden können. Gleichfalls können die Verbindungen der Formel (I) allein oder in Kombinationen mit anderen Wirkstoffen als Antifouling-Mittel eingesetzt werden.

20 Bekämpfung von tierischen Schädlingen auf dem Hygienesektor

- Die Verbindungen der Formel (I) eignen sich zur Bekämpfung von tierischen Schädlingen auf dem Hygienesektor. Insbesondere kann die Erfindung im Haushalts-, Hygiene- und Vorratsschutz verwendet werden, vor allem zur Bekämpfung von Insekten, Spinnentieren, Zecken und Milben, die in geschlossenen Räumen, wie beispielsweise Wohnungen, Fabrikhallen, Büros, Fahrzeugkabinen,
25 Tierzuchtanlagen vorkommen. Zur Bekämpfung der tierischen Schädlinge werden die Verbindungen der Formel (I) allein oder in Kombination mit anderen Wirk- und/oder Hilfsstoffen verwendet. Bevorzugt werden sie in Haushaltsinsektizid-Produkten verwendet. Die Verbindungen der Formel (I) sind gegen sensible und resistente Arten sowie gegen alle Entwicklungsstadien wirksam.

- Zu diesen Schädlingen gehören beispielsweise Schädlinge aus der Klasse Arachnida, aus den
30 Ordnungen Scorpiones, Araneae und Opiliones, aus den Klassen Chilopoda und Diplopoda, aus der Klasse Insecta die Ordnung Blattodea, aus den Ordnungen Coleoptera, Dermaptera, Diptera, Heteroptera, Hymenoptera, Isoptera, Lepidoptera, Phthiraptera, Psocoptera, Saltatoria oder Orthoptera, Siphonaptera und Zygentoma und aus der Klasse Malacostraca die Ordnung Isopoda.

- Die Anwendung erfolgt beispielsweise in Aerosolen, drucklosen Sprühmitteln, z. B. Pump- und Zerstäubersprays, Nebelautomaten, Foggern, Schäumen, Gelen, Verdampferprodukten mit Verdampferplättchen aus Cellulose oder Kunststoff, Flüssigverdampfern, Gel- und Membranverdampfern, propellergetriebenen Verdampfern, energielosen bzw. passiven
- 5 Verdampfungssystemen, Mottenpapieren, Mottensäckchen und Mottengelen, als Granulate oder Stäube, in Streuködern oder Köderstationen.

Herstellbeispiele

Die folgenden Herstellungs- und Verwendungsbeispiele illustrieren die Erfindung, ohne sie zu beschränken. Die Produkte wurden mittels ¹H-NMR Spektroskopie und/oder LC/MS (Liquid Chromatography Mass Spectrometry) charakterisiert.

- 5 Die Bestimmung der logP Werte erfolgte gemäß OECD Guideline 117 (EC Directive 92/69/EEC) durch HPLC (High Performance Liquid Chromatography) an reversed-phase (RP) Säulen (C18), mit nachfolgenden Methoden:

[a] Die Bestimmung mit der LC-MS im sauren Bereich erfolgte bei pH 2.7 mit 0,1 % wässriger Ameisensäure und Acetonitril (enthält 0,1% Ameisensäure) als Eluenten; linearer Gradient von 10%

10 Acetonitril bis 95% Acetonitril.

[b] Die Bestimmung mit der LC-MS im neutralen Bereich erfolgte bei pH 7.8 mit 0,001 molarer wässriger Ammoniumhydrogencarbonat-Lösung und Acetonitril als Eluenten; linearer Gradient von 10% Acetonitril bis 95% Acetonitril.

- Die Eichung erfolgte mit unverzweigten Alkan-2-onen (mit 3 bis 16 Kohlenstoffatomen), deren logP-
15 Werte bekannt sind (Bestimmung der logP-Werte anhand der Retentionszeiten durch lineare Interpolation zwischen zwei aufeinander folgenden Alkanonen).


Die NMR-Spektren wurden mit einem Bruker Avance 400, ausgestattet mit einem Durchflussprobenkopf (60 µl Volumen), bestimmt. In Einzelfällen wurden die NMR Spektren mit einem Bruker Avance II 600 gemessen.

- 20 Die NMR-Daten ausgewählter Beispiele werden in klassischer Form (δ-Werte, Multiplettaufspaltung, Anzahl der H-Atome) aufgeführt. Die Aufspaltung der Signale wurde wie folgt beschrieben: s (Singulett), d (Duplett), t (Triplett), q (Quartett), quint (Quintuplett), m (Multipllett), br (für breite Signale). Als Lösungsmittel wurden CD₃CN, CDCl₃ oder d₆-DMSO verwendet, wobei als Referenz Tetramethylsilan (0.00 ppm) eingesetzt wurde.

25

Verfahren A

Beispiel: 2-(Methoxymethyl)-N,1-dimethyl-N-(pyridin-3-yl)-1H-imidazol-5-carboxamid (I-1-22)




0.20 g (1.2 mmol) 2-(Methoxymethyl)-1-methyl-1H-imidazol-5-carbonsäure (V-1-22, Bsp. 29, US2006/0019949 A1) wurden in 5 mL Thionylchlorid bis zum Ende der Gasentwicklung bei 80 °C gerührt, eingeengt, zweimal mit je 10 mL Toluol angelöst, eingeengt, in wenig Tetrahydrofuran gelöst und zu einer Lösung von 0.14 g (1.3 mmol) 3-Methylamino-pyridin (VI-1) in 10 mL Pyridin bei 0 °C getropft. Anschließend wurde 18 Stunden bei Raumtemperatur weiter gerührt. Der Ansatz wurde im Vakuum eingeengt und der Rückstand mittels RP-Mitteldrucksäulenchromatographie mit Wasser/Acetonitril gereinigt. Nach Aufreinigung wurden 159 mg (51.9% d. Theorie) erhalten.

logP[n]: 0.63;

¹H-NMR (CD₃CN, 400MHz); δ = 3.26 (s, 3H), 3.39 (s, 3H), 3.78 (s, 3H), 4.40 (s, 2H), 6.20 (s, 1H), 7.34-7.37 (m, 1H), 7.65-7.69 (m, 1H), 8.39-8.40 (d, 1H), 8.44-8.46 (m, 1H) ppm.

Verfahren B-1

Beispiel: N,1-Dimethyl-N-(pyridin-3-yl)-1H-imidazol-5-carboxamid (IX-1-1)




Eine Suspension von 12.0 g (95.2 mmol) 1-Methyl-imidazol-5-carbonsäure (VII-1-1) in 72 mL Toluol wurde mit 12.7 g (105 mmol) Thionylchlorid versetzt und über Nacht bei 130 °C gerührt. Das Reaktionsgemisch wurde im Vakuum eingeengt. Der Rückstand wurde mit einer Lösung von 10.3 g (95.2 mmol) 3-Methylamino-pyridin (VI-1) in 72 mL Pyridin versetzt und die resultierende Reaktionsmischung 4 Stunden bei 115 °C gerührt. Anschließend wurde erneut im Vakuum eingeengt. Der Rückstand wurde an Kieselgel durch MPLC mit Acetonitril/Methanol als Laufmittel gereinigt. Nach Aufreinigung wurden 8.1 g (39.3% d. Theorie) erhalten.

logP[n] = 0.44;

$^1\text{H-NMR}$ (CD_3CN , 400MHz); δ = 3.39 (s, 3H), 3.81 (s, 3H), 6.17 (s, 1H), 7.36-7.40 (m, 2H), 7.67-7.70 (m, 1H), 8.41 (m, 1H), 8.47 (m, 1H) ppm.

Beispiel: 2-(Hydroxymethyl)-N,1-dimethyl-N-(pyridin-3-yl)-1H-imidazol-5-carboxamid (I-1-7)



5


4.33 g (20 mmol) N,1-Dimethyl-N-(pyridin-3-yl)-1H-imidazol-5-carboxamid (IX-1-1) und 1.8 g (60 mmol) Paraformaldehyd in 20 mL Acetonitril wurden zusammen in einem 50 mL Autoklaven bei 10 bar Argondruck und 120 °C für 48 Stunden gerührt. Das Lösungsmittel wurde abgedampft. Der Rückstand wurde an Kieselgel durch MPLC mit Dichlormethan/Methanol als Laufmittel gereinigt. Nach

10 Aufreinigung wurden 2.7 g (54% d. Theorie) erhalten.

$\log P[n] = 0.28$;

$^1\text{H-NMR}$ (CD_3CN , 400MHz); δ = 3.39 (s 3H), 3.80 (s, 3H), 4.51 (s, 2H), 6.17 (s, 1H), 7.35-7.38 (m, 1H), 7.67-7.70 (m, 1H), 8.396-8.402 (d, 1H), 8.44-8.46 (m, 1H) ppm.

15 **Beispiel: 2-(Chlormethyl)-N,1-dimethyl-N-(pyridin-3-yl)-1H-imidazol-5-carboxamid (III-1-1)**




20

2.3 g (9.34 mmol) 2-(Hydroxymethyl)-N,1-dimethyl-N-(pyridin-3-yl)-1H-imidazol-5-carboxamid (I-1-7) wurden in 2000 ml Methylenchlorid vorgelegt, mit 1.48 g (18.7 mmol) Pyridin versetzt, 3.33 g (28 mmol) Thionylchlorid bei 0 °C zugetropft und über Nacht bei Raumtemperatur gerührt. Der Ansatz wird im Vakuum einrotiert, der Rückstand mit 10 mL Natriumhydrogencarbonatlösung und 20 mL Methanol aufgenommen und erneut einrotiert. Der Rückstand wurde an Kieselgel durch MPLC mit Acetonitril/Methanol als Laufmittel gereinigt. Nach Aufreinigung wurden 1.7 g (67% d. Theorie) erhalten.

$\log P[n] = 0.89$;

$^1\text{H-NMR}$ (CD_3CN , 400MHz); $\delta = 3.50$ (s, 3H), 3.94 (s, 3H), 5.10 (s, 2H), 7.18 (s, 1H), 7.91-7.95 (m, 1H), 8.36-8.38 (m, 1H), 8.585-8.598 (d, 1H), 8.79-8.80 (d, 1H) ppm.

5 **Beispiel: 2-[(Isopropylsulfanyl)methyl]-N,1-dimethyl-N-(pyridin-3-yl)-1H-imidazol-5-carboxamid**
(I-1-29)




114 mg (1.5 mmol) 2-Propanthiol (IX-29) und 0.185 mg (1.65 mmol) Kalium-tert-butylat wurden in 5 mL Acetonitril vorgelegt, kurz verrührt und bei Raumtemperatur 265 mg (1.0 mmol) 2-(Chlormethyl)-N,1-dimethyl-N-(pyridin-3-yl)-1H-imidazol-5-carboxamid (III-1-1) hinzugegeben. Es wurde ca. 5 Minuten nachgerührt, der Ansatz im Vakuum eingedampft und der Rückstand mittels RP-Mitteldrucksäulenchromatographie mit Wasser/Acetonitril gereinigt. Nach Aufreinigung wurden 26 mg (8.5% d. Theorie) erhalten.

$\log P[a] = 0.76$; $\log P[n] = 1.50$;

15 $^1\text{H-NMR}$ (CD_3CN , 400MHz); $\delta = 1.17$ (6H, d), 2.79 (m, 1H), 3.39 (s, 3H), 3.76 (s, 2H), 3.79 (s, 3H), 6.17 (s, 1H), 7.33-7.36 (m, 1H), 7.64-7.67 (m, 1H), 8.387-8.393 (d, 1H), 8.43-8.45 (m, 1H) ppm.

Verfahren B-2

20 **Beispiel: 2-[(Isopropylsulfonyl)methyl]-N,1-dimethyl-N-(pyridin-3-yl)-1H-imidazol-5-carboxamid**
(I-1-30)




0.127 g (0.42 mmol) 2-[(Isopropylsulfanyl)methyl]-N,1-dimethyl-N-(pyridin-3-yl)-1H-imidazol-5-carboxamid (I-1-29) wurden in 5 mL Methylenchlorid vorgelegt, 0.16 mL (2.1 mmol) Trifluoressigsäure hinzugegeben, kurz verrührt und bei 0 °C 0.257 g (1.04 mmol) meta-Chlorperbenzoesäure (ca. 70%-ig) hinzugegeben und unter DC-Kontrolle weiter gerührt. Nachdem kein Edukt mehr nachweisbar war wurde überschüssiges Peroxid vernichtet, der Ansatz im Vakuum eingedampft und der Rückstand mittels RP-Mitteldrucksäulenchromatographie mit Wasser/Acetonitril gereinigt. Nach Aufreinigung wurden 0.108 g (77% d. Theorie) erhalten.

logP[a]: 0.56; logP[n]: 0.88;

¹H-NMR (CD₃CN, 400MHz): siehe Tabelle 2.

10

Beispiel: 2-[(Isobutylsulfonyl)methyl]-N,1-dimethyl-N-(1-oxidopyridin-3-yl)-1H-imidazol-5-carboxamid (I-1-55)




2.90 g (9.11 mmol) 2-[(Isobutylsulfanyl)methyl]-N,1-dimethyl-N-(pyridin-3-yl)-1H-imidazol-5-carboxamid (I-1-31) wurden in 79.1 mL Methylenchlorid vorgelegt, 3.51 mL (45.5 mmol) Trifluoressigsäure hinzugegeben, kurz verrührt und bei 0 °C 5.61 g (22.8 mmol) meta-Chlorperbenzoesäure (ca. 70%-ig) hinzugegeben und unter DC-Kontrolle weiter gerührt. Nachdem kein Edukt mehr nachweisbar war wurde überschüssiges Peroxid vernichtet, der Ansatz im Vakuum eingedampft und der Rückstand mittels RP-Mitteldrucksäulenchromatographie mit Wasser/Acetonitril gereinigt. Nach Aufreinigung wurden 0.21 g (5.5% d. Theorie) erhalten.

logP[a]: 0.68; logP[n]: 0.77;

¹H-NMR (CD₃CN, 400MHz): siehe Tabelle 2.

25

Beispiel: N,1-Dimethyl-2-(1H-pyrazol-1-ylmethyl)-N-(pyridin-3-yl)-1H-imidazol-5-carboxamid (I-1-43)




5 Eine Lösung von 84.9 mg (1.25 mmol) 1H-Pyrazol (X-43) und 49.9 mg (1.25 mmol) Natriumhydrid in 11.3 mL N,N-Dimethylformamid wurde 10 Minuten bei 30 °C gerührt. 300 mg (1.13 mmol) 2-(Chlormethyl)-N,1-dimethyl-N-(pyridin-3-yl)-1H-imidazol-5-carboxamid (III-1-1) wurden hinzugefügt und die Lösung wurde 18 Stunden bei 60 °C gerührt. Der Ansatz wurde mit 2 mL konzentrierter Ammoniumchloridlösung gequenchet und eingengt. Der Rückstand wurde an Kieselgel durch MPLC mit Acetonitril/Methanol als Laufmittel gereinigt. Nach Aufreinigung wurden 210 mg (62.5% d. Theorie) erhalten.

logP[a]: 0.35; logP[n]: 0.81;

¹H-NMR (d₆-DMSO, 400MHz); δ = 3.36 (s, 3H), 3.77 (s, 3H), 5.42 (s, 2H), 6.23-6.25 (m, 2H), 7.42-7.44 (m, 2H), 7.70-7.71 (m, 1H), 7.825-7.845 (m, 1H), 8.46-8.47 (m, 1H), 8.480-8.484 (m, 1H) ppm.

15 Verfahren C

Beispiel: 2-(2-Hydroxypropan-2-yl)-N,1-dimethyl-N-(pyridin-3-yl)-1H-imidazol-5-carboxamid (I-1-10)



20 0.300 g (1.39 mmol) N,1-Dimethyl-N-(pyridin-3-yl)-1H-imidazol-5-carboxamid (IX-1-1) wurden in 10 mL THF gelöst und auf -90 °C abgekühlt. Die Temperatur wurde während der Reaktion zwischen -85 °C und -90 °C gehalten. 0.58 mL (1.45 mmol) 2.5 molare n-BuLi-Lösung in n-Hexan wurden innerhalb von 5 Minuten bei -90 °C zugetropft und 5 Minuten nachgerührt. Anschließend wurden innerhalb von 5 Minuten 0.242 g Aceton (4.16 mmol), in 3 mL THF gelöst, zugetropft. Es wurden weitere 30 Minuten


bei -80 °C nachgerührt und dann innerhalb von 1 h auf Raumtemperatur erwärmt. Der Ansatz wurde mit halbkonzentrierter Natriumhydrogencarbonatlösung/Dichlormethan extrahiert. Die wässrige Phase wurde nochmals dreimal mit Dichlormethan extrahiert. Die organischen Phasen wurden vereinigt, mit wenig Wasser gewaschen, mit Natriumsulfat getrocknet, filtriert und eingeeengt. Der Rückstand wurde an Kieselgel durch MPLC mit Essigsäureethylester/Methanol als Laufmittel gereinigt. Nach Aufreinigung wurden 33.0 mg (8.7% d. Theorie) erhalten.

logP[n]: 0.57;

¹H-NMR (CD₃CN, 400MHz); δ = 1.51 (s, 6H), 3.39 (s, 3H), 3.96 (s, 3H), 6.20 (s, 1H), 7.33-7.37 (m, 1H), 7.65-7.68 (m, 1H), 8.367-8.374 (m, 1H), 8.42-8.43 (m, 1H) ppm.

10


Beispiel: 2-[Hydroxy(phenyl)methyl]-N,1-dimethyl-N-(pyridin-3-yl)-1H-imidazol-5-carboxamid (I-1-12)



0.300 g (1.39 mmol) N,1-Dimethyl-N-(pyridin-3-yl)-1H-imidazol-5-carboxamid (IX-1-1) wurden in 5 mL THF gelöst und auf -90 °C abgekühlt. Die Temperatur wurde während der Reaktion zwischen -85 °C und -90 °C gehalten. 0.58 mL (1.45 mmol) 2.5 molare *n*-BuLi-Lösung in *n*-Hexan wurden innerhalb von 5 Minuten bei -90 °C zugetropft und 5 Minuten nachgerührt. Anschließend wurden innerhalb von 5 Minuten 0.423 mL Benzaldehyd (4.16 mmol) innerhalb von 30 Minuten zugetropft und es wurde auf Raumtemperatur erwärmt. Der Ansatz wurde mit halbkonzentrierter Natriumhydrogencarbonatlösung/Dichlormethan extrahiert. Die wässrige Phase wurde nochmals dreimal mit Dichlormethan extrahiert. Die organischen Phasen wurden vereinigt, mit wenig Wasser gewaschen, mit Natriumsulfat getrocknet, filtriert und eingeeengt. Der Rückstand wurde an Kieselgel durch MPLC mit Essigsäureethylester/Methanol als Laufmittel gereinigt. Nach Aufreinigung wurden 227 mg (50.8% d. Theorie) erhalten.

logP[a]: 0.52; logP[n]: 1.23;


¹H-NMR (CD₃CN, 400MHz); δ = 3.38 (s, 3H), 3.64 (s, 3H), 4.28-4.30 (d, 1H), 5.84-5.85 (d, 1H), 6.25 (s, 1H), 7.26-7.37 (m, 6H), 7.64-7.67 (m, 1H), 8.378-8.385 (m, 1H), 8.44-8.47 (m, 1H) ppm.

Beispiel: 2-Benzyl-N,1-dimethyl-N-(pyridin-3-yl)-1H-imidazol-5-carboxamid (I-1-3)

Eine Suspension von 50.0 mg (0.152 mmol) 2-[Hydroxy(phenyl)methyl]-N,1-dimethyl-N-(pyridin-3-yl)-1H-imidazol-5-carboxamid (I-1-12) und 170 mg (0.298 mmol) Tetraioddiphosphan in 2 mL Dichlormethan wurde 48 Stunden bei 40 °C gerührt. Der Ansatz wurde mit halbkonzentrierter Natriumhydrogencarbonatlösung/Dichlormethan extrahiert. Die wässrige Phase wurde nochmals dreimal mit Dichlormethan extrahiert. Die organischen Phasen wurden vereinigt, mit Natriumsulfat getrocknet, filtriert und eingeeengt. Der Rückstand wurde an Kieselgel durch MPLC mit Essigsäureethylester/Methanol als Laufmittel gereinigt. Nach Aufreinigung wurden 12.0 mg (24.5% d. Theorie) erhalten.

logP[a]: 0.64; logP[n]: 1.48;

¹H-NMR (CD₃CN, 400MHz); δ = 3.38 (s, 3H), 3.63 (s, 3H), 4.02 (s, 2H), 6.23 (s, 1H), 7.10-7.12 (m, 2H), 7.20-7.24 (m, 1H), 7.27-7.31 (m, 2H), 7.34-7.37 (m, 1H), 7.64-7.67 (m, 1H), 8.39-8.40 (m, 1H), 8.44-8.45 (m, 1H) ppm.

Verfahren D**Beispiel: 2-Iod-N,1-dimethyl-N-(pyridin-3-yl)-1H-imidazol-5-carboxamid (X-1-1)**


5.00 g (23.1 mmol) N,1-Dimethyl-N-(pyridin-3-yl)-1H-imidazol-5-carboxamid (IX-1-1) wurden in 150 mL THF gelöst und auf -90 °C abgekühlt. Die Temperatur wurde während der Reaktion zwischen -85 °C und -90 °C gehalten. 9.68 mL (24.2 mmol) 2.5 molare *n*-BuLi-Lösung in *n*-Hexan wurden innerhalb

von 30 Minuten bei -90 °C zugetropft und 5 Minuten nachgerührt. Anschließend wurden innerhalb von 20 Minuten 0.242 g (69.4 mmol) Iod, in 50 mL THF gelöst, zugetropft. Es wurden weitere 30 Minuten bei -80 °C nachgerührt und dann innerhalb von 1 h auf Raumtemperatur erwärmt. Der Ansatz wurde mit halbkonzentrierter Natriumhydrogencarbonatlösung/Dichlormethan extrahiert. Die wässrige Phase wurde nochmals dreimal mit Dichlormethan extrahiert. Die organischen Phasen wurden vereinigt, mit wenig Wasser gewaschen, mit Natriumsulfat getrocknet, filtriert und eingeeengt. Der Rückstand wurde an Kieselgel durch MPLC mit Essigsäureethylester/Methanol als Laufmittel gereinigt. Nach Aufreinigung wurden 4.35 g (55.0% d. Theorie) erhalten.

logP[a]: 0.66; logP[n]: 0.97;

¹H-NMR (d₆-DMSO, 400MHz); δ = 3.37 (s, 3H), 3.74 (s, 3H), 6.27 (s, 1H), 7.42-7.45 (m, 1H), 7.82-7.85 (m, 1H), 8.465-8.495 (m, 2H) ppm.

Beispiel: N,1-Dimethyl-N-(pyridin-3-yl)-2-vinyl-1H-imidazol-5-carboxamid (I-1-6)




Eine Lösung von 400 mg (1.17 mmol) 2-Iod-N,1-dimethyl-N-(pyridin-3-yl)-1H-imidazol-5-carboxamid (X-1-1) und 535 mg (1.64 mmol) Tributyl(vinyl)stannan in 12 mL N,N-Dimethylformamid wurde mit Argon entgast. 8.2 mg (0.012 mmol) Palladium-bis(triphenylphosphin) dichlorid wurden hinzugefügt und die Lösung wurde 18 Stunden bei 70 °C gerührt. 535 mg (1.64 mmol) Tributyl(vinyl)stannan und 8.2 mg (0.012 mmol) Palladium-bis(triphenylphosphin) dichlorid wurden hinzugefügt und die Lösung wurde noch einmal 18 Stunden bei 70 °C gerührt. Der Ansatz wurde eingeeengt. Der Rückstand wurde an Kieselgel durch MPLC mit Essigsäureethylester/Methanol als Laufmittel gereinigt. Nach Aufreinigung wurden 200 mg (70.6% d. Theorie) erhalten.

logP[n]: 0.82;

¹H-NMR (CD₃CN, 400MHz); δ = 3.395 (s, 3H), 3.78 (s, 3H), 5.42-5.46 (dd, 1H), 6.06-6.11 (dd, 1H), 6.27 (s, 1H), 6.65-6.72 (dd, 1H), 7.34-7.37 (m, 1H), 7.66-7.68 (m, 1H), 8.397-8.403 (m, 1H), 8.44-8.45 (m, 1H) ppm.

Verfahren E

Beispiel: N,1-Dimethyl-2-(phenylethynyl)-N-(pyridin-3-yl)-1H-imidazol-5-carboxamid (IV-1-1)




- 5 Eine Lösung von 400 mg (1.17 mmol) 2-Iod-N,1-dimethyl-N-(pyridin-3-yl)-1H-imidazol-5-carboxamid (X-1-1) und 239 mg (2.34 mmol) Phenylacetylen in 6 mL Triethylamin wurde mit Argon entgast. 41 mg (0.058 mmol) Palladium-bis(triphenylphosphin) dichlorid und 22.3 mg Kupfer(I)-iodid (0.117 mmol) wurden hinzugefügt und die Lösung wurde 2 Stunden bei Raumtemperatur gerührt. Der Ansatz mit Essigsäureethylester extrahiert, zweimal mit Wasser und einmal mit konzentrierter Natriumchloridlösung
- 10 gewaschen, mit Natriumsulfat getrocknet, filtriert und eingeeengt. Der Rückstand wurde an Kieselgel durch MPLC mit Cyclohexan/Essigsäureethylester/Methanol als Laufmittel gereinigt. Nach Aufreinigung wurden 200 mg (54.1% d. Theorie) erhalten.

logP[a]: 1.86; logP[n]: 1.98;

- ¹H-NMR (d₆-DMSO, 400MHz); δ = 3.40 (s, 3H), 3.92 (s, 3H), 6.32 (s, 1H), 7.45-7.50 (m, 4H), 7.63-7.66 (m, 2H), 7.86-7.88 (m, 1H), 8.50-8.57 (m, 2H) ppm.
- 15

Beispiel: N,1-Dimethyl-2-(phenylethyl)-N-(pyridin-3-yl)-1H-imidazol-5-carboxamid (I-1-5)



- Eine Suspension von 40.0 mg (0.619 mmol) N,1-Dimethyl-2-(phenylethynyl)-N-(pyridin-3-yl)-1H-imidazol-5-carboxamid (IV-1-1) und 20.0 mg Palladium auf Aktivkohle 10% in 20 mL Methanol wurde
- 20 16 Stunden bei Raumtemperatur und 10 bar Wasserstoff gerührt. 20.0 mg Palladium auf Aktivkohle


10% wurden hinzugefügt und die Suspension wurde noch einmal 18 Stunden bei Raumtemperatur und 10 bar Wasserstoff gerührt. Der Ansatz wurde über Celite filtriert und eingengt. Der Rückstand wurde an Kieselgel durch MPLC mit Cyclohexan/Essigsäureethylester als Laufmittel gereinigt. Nach Aufreinigung wurden 99.0 mg (48.9% d. Theorie) erhalten.

5 logP[a]: 0.66; logP[n]: 1.58;

¹H-NMR (d₆-DMSO, 400MHz); δ = 2.89 (m, 4H), 3.35 (s, 3H), 3.565 (s, 3H), 6.15 (s, 1H), 7.14-7.21 (m, 3H), 7.25-7.29 (m, 2H), 7.43-7.46 (m, 1H), 7.80-7.83 (m, 1H), 8.44-8.45 (m, 1H), 8.46-8.48 (m, 1H) ppm.

10 Verfahren F

Beispiel: N,1-Dimethyl-N-(pyridin-3-yl)-2-[2,2,2-trifluor-1-(2,2,2-trifluorethoxy)ethyl]-1H-imidazol-5-carboxamid (I-1-67)



15 200 mg (0.925 mmol) N,1-Dimethyl-N-(pyridin-3-yl)-1H-imidazol-5-carboxamid (IX-1-1) wurden in 7.5 mL THF gelöst und auf -90 °C abgekühlt. Die Temperatur wurde während der Reaktion zwischen -85 °C und -90 °C gehalten. 0.41 mL (1.02 mmol) 2.5 molare *n*-BuLi-Lösung in *n*-Hexan wurden innerhalb von 5 Minuten bei -90 °C zugetropft und 5 Minuten nachgerührt. Anschließend wurden innerhalb von 5 Minuten 644 mg (2.77 mmol) 2,2,2-Trifluorethyl-trifluormethansulfonat, in 2.5 mL

20 THF gelöst, zugetropft. Es wurden weitere 30 Minuten bei -80 °C nachgerührt und dann innerhalb von 1 h auf Raumtemperatur erwärmt. Der Ansatz wurde mit halbkonzentrierter Natriumhydrogencarbonatlösung/Dichlormethan extrahiert. Die wässrige Phase wurde nochmals dreimal mit Dichlormethan extrahiert. Die organischen Phasen wurden vereinigt, mit wenig Wasser gewaschen, mit Natriumsulfat getrocknet, filtriert und eingengt. Der Rückstand wurde an Kieselgel durch MPLC

25 mit Essigsäureethylester/Methanol als Laufmittel gereinigt. Die gewünschte Fraktion wurde mittels RP-

Mitteldrucksäulenchromatographie mit Wasser/Acetonitril gereinigt. Nach Aufreinigung wurden 27 mg (7.2% d. Theorie) erhalten.


logP[a]: 1.72; logP[n]: 1.86;

¹H-NMR (CDCl₃, 400MHz); δ = 3.485 (s, 3H), 3.92-4.01 (m, 2H), 3.955 (s, 3H), 5.11-5.14 (q, 1H), 6.36
5 (s, 1H), 7.33-7.35 (m, 1H), 7.51-7.53 (m, 1H), 8.43-8.44 (m, 1H), 8.54-8.55 (m, 1H) ppm.

Weitere Verbindungen der Formel (I) bzw. (I-1), die analog zu den oben aufgeführten Beispiele hergestellt wurden, sind in der Tabelle 1 aufgeführt.

10 **Tabelle 1**

Verbindungen der Formel (I-1)



Bsp.- Nr.	L ¹	L ²	L ³	W	Y	A	V	T
I-1-3	Phenyl-	H	H	H	CH ₃	CH ₃	H	Elektronen paar
I-1-4	2-Pyrimidyl-	H	H	H	CH ₃	CH ₃	H	Elektronen paar
I-1-5	Benzyl-	H	H	H	CH ₃	CH ₃	H	Elektronen paar
I-1-6	Vinyl-		H	H	CH ₃	CH ₃	H	Elektronen paar
I-1-7	H	H	OH	H	CH ₃	CH ₃	H	Elektronen paar
I-1-8	H	H	OH	H	CH ₃	Ethyl	H	Elektronen paar

I-1-9	CH ₃	H	OH	H	CH ₃	CH ₃	H	Elektronen paar
I-1-10	CH ₃	CH ₃	OH	H	CH ₃	CH ₃	H	Elektronen paar
I-1-11	Isopropyl-	H	OH	H	CH ₃	CH ₃	H	Elektronen paar
I-1-12	Phenyl-	H	OH	H	CH ₃	CH ₃	H	Elektronen paar
I-1-13	2-Chlorphenyl-	H	OH	H	CH ₃	CH ₃	H	Elektronen paar
I-1-14	3-Chlorphenyl-	H	OH	H	CH ₃	CH ₃	H	Elektronen paar
I-1-15	4-Chlorphenyl-	H	OH	H	CH ₃	CH ₃	H	Elektronen paar
I-1-16	3,4-Dichlorphenyl-	H	OH	H	CH ₃	CH ₃	H	Elektronen paar
I-1-17	2-Pyridinyl-	H	OH	H	CH ₃	CH ₃	H	Elektronen paar
I-1-18	3-Pyridinyl-	H	OH	H	CH ₃	CH ₃	H	Elektronen paar
I-1-19	4-Pyridinyl-	H	OH	H	CH ₃	CH ₃	H	Elektronen paar
I-1-20	4-Chlorpyridin-3-yl-	H	OH	H	CH ₃	CH ₃	H	Elektronen paar
I-1-21	2-Pyrimidyl-	H	OH	H	CH ₃	CH ₃	H	Elektronen paar
I-1-22	H	H	Methoxy-	H	CH ₃	CH ₃	H	Elektronen paar
I-1-23	H	H	Cyclopropyl-methoxy-	H	CH ₃	CH ₃	H	Elektronen paar
I-1-24	H	H	3-Chlorphenoxy-	H	CH ₃	CH ₃	H	Elektronen paar
I-1-25	H	H	Benzyloxy-	H	CH ₃	CH ₃	H	Elektronen paar
I-1-26	H	H	Methylsulfanyl-	H	CH ₃	CH ₃	H	Elektronen paar
I-1-27	H	H	Ethylsulfanyl-	H	CH ₃	CH ₃	H	Elektronen paar
I-1-28	H	H	Ethylsulfonyl-	H	CH ₃	CH ₃	H	Elektronen paar
I-1-29	H	H	Isopropylsulfanyl-	H	CH ₃	CH ₃	H	Elektronen paar
I-1-30	H	H	Isopropylsulfonyl-	H	CH ₃	CH ₃	H	Elektronen paar
I-1-31	H	H	Isobutylsulfanyl-	H	CH ₃	CH ₃	H	Elektronen paar
I-1-32	H	H	Isobutylsulfonyl-	H	CH ₃	CH ₃	H	Elektronen paar
I-1-33	H	H	tert-Butylsulfanyl-	H	CH ₃	CH ₃	H	Elektronen paar
I-1-34	H	H	tert-Butylsulfonyl-	H	CH ₃	CH ₃	H	Elektronen paar
I-1-35	H	H	Cyclopropylmethylsulfanyl-	H	CH ₃	CH ₃	H	Elektronen paar
I-1-36	H	H	2,2-Dimethylpropyl-	H	CH ₃	CH ₃	H	Elektronen

			sulfanyl-					paar
I-1-37	H	H	2-Methoxy-2-oxoethylsulfanyl-	H	CH ₃	CH ₃	H	Elektronen paar
I-1-38	H	H	Phenylsulfanyl-	H	CH ₃	CH ₃	H	Elektronen paar
I-1-39	H	H	(2-Chlorphenyl)sulfanyl-	H	CH ₃	CH ₃	H	Elektronen paar
I-1-40	H	H	(3-Chlorphenyl)sulfanyl-	H	CH ₃	CH ₃	H	Elektronen paar
I-1-41	H	H	(4-Chlorphenyl)sulfanyl-	H	CH ₃	CH ₃	H	Elektronen paar
I-1-42	H	H	(2-Pyrimidinyl)sulfanyl-	H	CH ₃	CH ₃	H	Elektronen paar
I-1-43	H	H	1H-Pyrazol-1-yl-	H	CH ₃	H	H	Elektronen paar
I-1-44	H	H	3-(Trifluormethyl)-1H-pyrazol-1-yl-	H	CH ₃	CH ₃	H	Elektronen paar
I-1-45	H	H	4-(Trifluormethyl)-1H-pyrazol-1-yl-	H	CH ₃	CH ₃	H	Elektronen paar
I-1-46	H	H	1H-1,2,3-Triazol-1-yl-	H	CH ₃	CH ₃	H	Elektronen paar
I-1-47	H	H	2H-1,2,3-Triazol-2-yl-	H	CH ₃	CH ₃	H	Elektronen paar
I-1-48	H	H	Cyclopropylmethylsulfonyl-	H	CH ₃	CH ₃	H	Elektronen paar
I-1-49	H	H	Ethylsulfanyl-	H	CH ₃	Ethyl	H	Elektronen paar
I-1-50	H	H	Isopropylsulfanyl-	H	CH ₃	Ethyl	H	Elektronen paar
I-1-51	H	H	Isobutylsulfanyl-	H	CH ₃	Ethyl	H	Elektronen paar
I-1-52	H	H	tert-Butylsulfanyl-	H	CH ₃	Ethyl	H	Elektronen paar
I-1-53	H	H	Cyclopropylmethylsulfanyl-	H	CH ₃	Ethyl	H	Elektronen paar
I-1-54	H	H	2,2-Dimethylpropylsulfanyl-	H	CH ₃	Ethyl	H	Elektronen paar
I-1-55	H	H	Isobutylsulfonyl-	H	CH ₃	CH ₃	H	Sauerstoff
I-1-56	Vinyl-		H	H	CH ₃	Ethyl	H	Elektronen paar
I-1-57	Prop-1-en-2-yl-		H	H	CH ₃	CH ₃	H	Elektronen paar
I-1-58	(1E)-Prop-1-en-1-yl-		H	H	CH ₃	CH ₃	H	Elektronen paar
I-1-59	(1Z)-Prop-1-en-1-yl-		H	H	CH ₃	CH ₃	H	Elektronen paar
I-1-60	Isobutyl-	H	OH	H	CH ₃	CH ₃	H	Elektronen paar
I-1-61	Isopentyl-	H	OH	H	CH ₃	CH ₃	H	Elektronen paar
I-1-62	H	H	4-Chlorphenoxy-	H	CH ₃	CH ₃	H	Elektronen paar
I-1-63	H	H	2,2,2-Trifluorethoxy-	H	CH ₃	CH ₃	H	Elektronen paar
I-1-64	H	H	Ethoxy-	H	CH ₃	CH ₃	H	Elektronen

								paar
I-1-65	H	H	Isopropoxy-	H	CH ₃	CH ₃	H	Elektronen paar
I-1-66	H	H	OH	H	CH ₃	Cyclo propyl	H	Elektronen paar
I-1-67	Trifluormethyl-	H	2,2,2-Trifluorethoxy-	H	CH ₃	CH ₃	H	Elektronen paar
I-1-68	Trichlormethyl-	H	OH	H	CH ₃	CH ₃	H	Elektronen paar
I-1-69	H	H	4-Cyclopropyl-5- oxo-4,5-dihydro-1H- 1,2,4-triazol-1-yl-	H	CH ₃	CH ₃	H	Elektronen paar
I-1-70	H	H	4-Methyl-5-oxo-4,5- dihydro-1H-1,2,4- triazol-1-yl-	H	CH ₃	CH ₃	H	Elektronen paar
I-1-71	Cyclopropyl-		H	H	CH ₃	CH ₃	H	Elektronen paar

Tabelle 2

Analytische Daten zu den in der Tabelle 1 angegebenen Verbindungen

- 5 Die ¹H-NMR-Daten ausgewählter Beispiele werden in Form von ¹H-NMR-Peaklisten notiert. Zu jedem Signalpeak wird erst der δ -Wert in ppm und dann die Signalintensität in runden Klammern aufgeführt. Die δ -Wert – Signalintensitäts- Zahlenpaare von verschiedenen Signalpeaks werden durch Semikolons voneinander getrennt aufgelistet.

Die Peakliste eines Beispieles hat daher die Form:

- 10 δ_1 (Intensität₁); δ_2 (Intensität₂);.....; δ_i (Intensität_i);.....; δ_n (Intensität_n)

Die Intensität scharfer Signale korreliert mit der Höhe der Signale in einem gedruckten Beispiel eines NMR-Spektrums in cm und zeigt die wirklichen Verhältnisse der Signalintensitäten. Bei breiten Signalen können mehrere Peaks oder die Mitte des Signals und ihre relative Intensität im Vergleich zum intensivsten Signal im Spektrum gezeigt werden.

- 15 Zur Kalibrierung der chemischen Verschiebung von ¹H-NMR-Spektren benutzen wir Tetramethylsilan und/oder die chemische Verschiebung des Lösungsmittels, besonders im Falle von Spektren, die in DMSO gemessen werden. Daher kann in NMR-Peaklisten der Tetramethylsilan-Peak vorkommen, muss es aber nicht.

- 20 Die Listen der ¹H-NMR-Peaks sind ähnlich den klassischen ¹H-NMR-Ausdrucken und enthalten somit gewöhnlich alle Peaks, die bei einer klassischen NMR-Interpretation aufgeführt werden.

Darüber hinaus können sie wie klassische ^1H -NMR-Ausdrucke Lösungsmittelsignale, Signale von Stereoisomeren der Zielverbindungen, die ebenfalls Gegenstand der Erfindung sind, und/oder Peaks von Verunreinigungen zeigen.

Bei der Angabe von Verbindungssignalen im Delta-Bereich von Lösungsmitteln und/oder Wasser sind
5 in unseren Listen von ^1H -NMR-Peaks die gewöhnlichen Lösungsmittelpeaks, zum Beispiel Peaks von DMSO in d_6 -DMSO und der Peak von Wasser, gezeigt, die gewöhnlich im Durchschnitt eine hohe Intensität aufweisen.

Die Peaks von Stereoisomeren der Targetverbindungen und/oder Peaks von Verunreinigungen haben
10 gewöhnlich im Durchschnitt eine geringere Intensität als die Peaks der Zielverbindungen (zum Beispiel mit einer Reinheit von $>90\%$).

Solche Stereoisomere und/oder Verunreinigungen können typisch für das jeweilige Herstellungsverfahren sein. Ihre Peaks können somit dabei helfen, die Reproduktion unseres Herstellungsverfahrens anhand von "Nebenprodukt-Fingerabdrücken" zu erkennen.

Einem Experten, der die Peaks der Zielverbindungen mit bekannten Verfahren (MestreC, ACD-Simulation, aber auch mit empirisch ausgewerteten Erwartungswerten) berechnet, kann je nach Bedarf
15 die Peaks der Zielverbindungen isolieren, wobei gegebenenfalls zusätzliche Intensitätsfilter eingesetzt werden. Diese Isolierung wäre ähnlich dem betreffenden Peak-Picking bei der klassischen ^1H -NMR-Interpretation.

Weitere Details zu ^1H -NMR-Peaklisten können der Research Disclosure Database Number 564025
20 entnommen werden.

Bsp.-Nr.	logP[n]	logP[a]	¹ H-NMR; δ (ppm)
I-1-4	0,68		Beispiel I-1-4: ¹ H-NMR(400,0 MHz, CD ₃ CN): δ = 8,664(4,0);8,651(4,1);8,452(1,2);8,448(1,3);8,440(1,3);8,436(1,3);8,406(1,7);8,400(1,7);7,689(0,8);7,685(0,8);7,683(0,8);7,679(0,8);7,669(0,9);7,665(0,9);7,662(0,9);7,658(0,8);7,377(1,0);7,375(1,0);7,365(1,0);7,363(1,0);7,356(0,9);7,355(0,9);7,344(0,9);7,343(0,9);7,262(1,1);7,250(2,1);7,237(1,0);6,198(3,2);4,321(7,9);3,719(14,3);3,389(16,0);2,170(82,6);2,107(0,4);1,964(1,6);1,958(3,6);1,952(20,3);1,946(36,9);1,940(49,6);1,934(33,7);1,927(17,1);0,080(0,4);0,000(9,0)
I-1-8	0,63	-0,16	Beispiel I-1-8: ¹ H-NMR(400,0 MHz, CD ₃ CN): δ = 8,476(1,4);8,472(1,4);8,464(1,5);8,460(1,4);8,367(1,9);8,362(1,9);7,680(0,8);7,676(0,9);7,674(0,9);7,670(0,7);7,660(0,9);7,656(1,1);7,654(1,0);7,650(0,8);7,392(1,0);7,391(1,0);7,380(1,0);7,372(1,0);7,360(0,9);6,118(2,9);4,497(8,1);4,444(0,5);3,912(1,2);3,894(3,6);3,876(3,6);3,858(1,3);3,819(0,4);3,793(16,0);3,766(1,0);2,202(10,2);2,122(0,3);1,965(0,5);1,958(1,3);1,953(8,1);1,947(15,1);1,940(21,0);1,934(14,6);1,928(7,4);1,887(0,9);1,271(0,5);1,170(3,6);1,152(7,4);1,135(3,6);0,000(1,2)
I-1-9	0,45		Beispiel I-1-9: ¹ H-NMR(400,0 MHz, CD ₃ CN): δ = 8,451(1,3);8,448(1,3);8,439(1,3);8,436(1,3);8,393(1,8);8,387(1,8);7,690(0,8);7,686(1,0);7,684(0,9);7,680(0,8);7,669(0,9);7,666(1,1);7,663(1,0);7,659(0,8);7,377(1,1);7,365(1,1);7,357(1,0);7,345(0,9);6,195(0,7);4,830(0,4);3,806(14,6);3,431(0,7);3,388(16,0);2,173(43,1);1,964(0,7);1,952(10,0);1,946(18,5);1,940(25,6);1,933(17,8);1,927(9,0);1,460(4,1);1,444(4,0);0,146(0,4);0,008(3,5);0,000(78,5);-0,008(3,4);-0,149(0,4)
I-1-11		0,18	Beispiel I-1-11: ¹ H-NMR(400,0 MHz, CD ₃ CN): δ = 8,443(1,7);8,431(1,8);8,386(2,3);8,380(2,3);7,679(1,0);7,676(1,1);7,670(0,8);7,659(1,1);7,656(1,2);7,369(1,2);7,357(1,2);7,348(1,1);7,337(1,0);6,244(3,8);4,319(1,9);4,299(1,9);3,782(15,9);3,406(0,4);3,391(16,0);2,263(0,4);2,260(0,4);2,196(109,9);2,130(0,6);2,113(1,0);2,095(1,2);2,079(1,1);2,061(0,7);1,964(0,9);1,952(11,7);1,946(21,5);1,940(29,2);1,934(20,4);1,928(10,6);1,271(0,4);0,969(7,2);0,952(7,0);0,739(7,3);0,722(7,2);0,000(17,0)
I-1-13		0,85	Beispiel I-1-13: ¹ H-NMR(400,0 MHz, d ₆ -DMSO): δ = 8,465(2,3);8,459(2,3);8,445(1,6);8,441(1,8);8,433(1,8);8,429(1,8);7,822(0,8);7,818(1,0);7,815(1,0);7,812(0,9);7,802(1,0);7,798(1,1);7,795(1,1);7,791(1,0);7,689(1,2);7,673(1,3);7,670(1,3);7,425(1,2);7,413(1,2);7,405(1,1);7,393(1,1);7,386(0,6);7,382(0,7);7,364(1,4);7,349(0,8);7,345(1,0);7,339(0,8);7,335(1,0);7,319(2,6);7,315(1,9);7,302(1,4);7,298(1,4);7,285(1,0);7,281(1,1);7,265(0,4);7,261(0,4);6,333(1,8);6,319(1,9);6,097(3,2);5,992(2,0);5,977(1,9);5,753(2,2);3,876(16,0);3,696(1,3);3,367(15,9);3,333(70,6);3,326(59,7);2,675(0,4);2,671(0,5);2,666(0,3);2,524(1,1);2,510(29,5);2,506(62,4);2,501(83,8);2,497(60,1);2,492(28,4);2,333(0,4);2,328(0,5);2,324(0,4);1,988(0,6);1,235(0,4);1,175(0,4);0,852(0,5);0,835(1,0);0,817(0,5);0,008(0,8);0,000(24,9);-0,009(0,9)
I-1-14	1,56	1,01	Beispiel I-1-14: ¹ H-NMR(400,0 MHz, CDCl ₃): δ = 8,527(1,6);8,523(1,6);8,515(1,6);8,511(1,5);8,400(2,2);8,394(2,2);7,548(0,8);7,544(0,9);7,542(0,9);7,538(0,7);7,528(1,0);7,524(1,1);7,522(1,1);7,518(0,9);7,353(1,2);7,341(1,2);7,332(1,1);7,321(1,0);7,303(2,3);7,287(0,4);7,274(3,8);7,271(3,8);7,267(9,8);7,263(1,8);7,259(2,3);7,239(0,3);7,105(0,8);7,101(0,9);7,092(1,0);7,084(0,7);7,080(0,6);6,227(3,2);5,770(3,6);5,300(5,3);4,129(1,0);4,112(1,0);4,094(0,3);3,776(0,8);3,650(16,0);3,445(15,6);2,044(4,2);1,818(0,4);1,276(1,2);1,258(2,4);1,241(1,2);0,888(0,6);0,070(1,1);0,000(6,1)
I-1-15	1,56	1,11	Beispiel I-1-15: ¹ H-NMR(400,0 MHz, CDCl ₃): δ = 8,539(1,4);8,536(1,5);8,527(1,5);8,524(1,6);8,398(2,1);8,391(2,2);7,5

			59(0,7);7,555(0,9);7,553(0,9);7,549(0,8);7,539(0,9);7,535(1,1);7,533(1,1);7,529(1,0);7,359(1,2);7,347(1,2);7,338(1,1);7,324(3,6);7,319(1,4);7,307(1,5);7,302(4,7);7,263(13,0);7,229(0,3);7,197(3,7);7,176(2,8);6,226(3,0);5,769(3,8);5,300(4,8);3,786(0,7);3,640(15,1);3,619(0,3);3,607(0,5);3,445(16,0);3,412(0,5);2,044(1,2);1,277(0,4);1,259(0,7);1,241(0,4);0,891(0,5);0,000(7,6);-0,008(0,4)
I-1-16	1,87	1,42	Beispiel I-1-16: ¹ H-NMR(400,0 MHz, CD ₃ CN): δ = 8,447(1,4);8,444(1,4);8,435(1,4);8,432(1,4);8,382(1,9);8,376(1,9);7,666(0,8);7,662(0,9);7,660(0,9);7,656(0,7);7,646(0,9);7,642(1,0);7,639(1,0);7,636(0,8);7,488(2,4);7,478(2,3);7,474(2,2);7,467(2,8);7,365(1,1);7,353(1,1);7,344(1,0);7,332(0,9);7,197(1,3);7,193(1,2);7,176(1,1);7,172(1,0);6,228(2,6);5,840(1,1);4,496(0,5);4,068(0,7);4,050(0,7);3,706(16,0);3,382(15,9);2,169(33,2);1,971(3,2);1,964(1,1);1,958(2,1);1,952(12,4);1,946(23,0);1,939(31,8);1,933(21,8);1,927(11,2);1,221(0,8);1,204(1,6);1,186(0,8);0,000(0,5)
I-1-17	0,71	0,02	Beispiel I-1-17: ¹ H-NMR(400,0 MHz, d ₆ -DMSO): δ = 8,476(2,4);8,470(2,4);8,460(1,7);8,457(1,8);8,449(1,8);8,445(1,8);8,424(1,3);8,414(1,3);8,412(1,3);7,840(0,9);7,836(1,7);7,833(1,5);7,830(1,2);7,817(2,3);7,813(2,6);7,798(0,9);7,794(0,9);7,613(1,8);7,593(1,5);7,445(1,3);7,433(1,3);7,425(1,2);7,413(1,1);7,282(0,9);7,269(1,0);7,265(0,9);7,253(0,8);6,400(1,7);6,386(1,8);6,135(3,4);5,839(1,9);5,826(1,8);3,744(16,0);3,357(15,7);3,335(39,0);2,510(7,1);2,506(14,8);2,501(20,5);2,497(15,4);2,493(7,4);0,008(0,4);0,000(9,8)
I-1-18	0,60		Beispiel I-1-18: ¹ H-NMR(400,0 MHz, d ₆ -DMSO): δ = 8,489(2,4);8,483(2,5);8,476(2,8);8,470(2,8);8,465(1,9);8,461(3,4);8,458(2,3);8,453(2,0);8,449(3,4);8,446(2,2);7,841(0,9);7,838(1,1);7,835(1,1);7,831(0,9);7,821(1,0);7,817(1,1);7,815(1,2);7,811(1,0);7,712(0,8);7,708(1,2);7,693(0,9);7,688(1,4);7,442(1,4);7,430(1,4);7,422(1,3);7,410(1,2);7,363(1,3);7,351(1,3);7,343(1,2);7,331(1,1);6,434(0,9);6,421(0,9);6,167(3,4);5,932(1,4);5,922(1,4);4,103(0,8);3,797(0,4);3,781(16,0);3,364(15,4);3,335(6,6);3,170(7,1);2,510(4,2);2,506(8,9);2,502(12,4);2,497(9,4);2,493(4,7);0,007(0,4);0,000(11,2);-0,008(0,5)
I-1-19	0,54		Beispiel I-1-19: ¹ H-NMR(400,0 MHz, d ₆ -DMSO): δ = 8,514(4,3);8,499(4,4);8,470(3,8);8,465(4,9);8,456(2,2);7,834(1,1);7,830(1,4);7,814(1,2);7,810(1,5);7,447(1,6);7,435(1,6);7,426(1,5);7,415(1,4);7,268(4,1);7,253(4,0);6,545(1,9);6,531(1,9);6,187(3,7);5,888(2,0);5,875(1,9);4,119(1,2);4,107(3,1);4,094(3,1);4,081(1,2);3,799(0,3);3,718(16,0);3,415(0,6);3,361(16,2);3,340(15,2);3,317(0,3);3,178(15,8);3,166(15,9);2,507(9,7);2,503(12,6);0,008(0,6);0,000(10,0)
I-1-20	1,07	0,59	Beispiel I-1-20: ¹ H-NMR(400,0 MHz, d ₆ -DMSO): δ = 8,474(2,4);8,467(2,5);8,459(1,7);8,456(1,8);8,447(1,8);8,444(1,8);8,331(2,3);8,325(2,3);7,843(0,9);7,840(1,0);7,837(1,0);7,833(0,9);7,823(1,0);7,819(1,1);7,817(1,1);7,813(0,9);7,789(1,3);7,783(1,3);7,768(1,4);7,762(1,4);7,485(2,7);7,465(2,4);7,442(1,3);7,430(1,3);7,422(1,2);7,410(1,1);6,487(2,7);6,472(2,8);6,144(3,3);5,961(2,0);5,947(1,9);4,042(0,3);3,812(16,0);3,365(15,5);3,319(42,8);2,524(0,7);2,510(16,5);2,506(35,1);2,501(49,3);2,497(36,7);2,492(17,5);0,008(1,4);0,000(45,6);-0,008(1,5)
I-1-21	0,40		Beispiel I-1-21: ¹ H-NMR(400,0 MHz, CD ₃ CN): δ = 8,760(4,6);8,748(4,6);8,446(1,3);8,443(1,3);8,434(1,4);8,431(1,3);8,396(1,7);8,390(1,7);7,680(0,7);7,676(0,8);7,674(0,8);7,670(0,7);7,660(0,8);7,656(0,9);7,653(0,9);7,650(0,7);7,3663(1,9);7,3655(1,9);7,354(2,9);7,347(1,0);7,345(1,0);7,342(1,1);7,335(0,9);7,333(0,8);6,167(2,8);5,924(1,0);5,910(1,0);4,774(0,6);4,759(0,6);3,788(16,0);3,383(15,8);2,214(39,1);1,965(0,3);1,958(0,7);1,953(4,6);1,947(8,5);1,940(11,6);1,934(7,9);1,928(3,9);0,008(0,5);0,000(15,0);-0,009(0,5)

I-1-23	1,29	0,67	Beispiel I-1-23: ¹ H-NMR(400,0 MHz, CD ₃ CN): δ = 8,297(0,6);8,293(0,6);8,285(0,6);8,281(0,6);8,238(0,8);8,233(0,8);7,529(0,4);7,525(0,4);7,523(0,4);7,509(0,4);7,505(0,5);7,502(0,4);7,498(0,3);7,215(0,4);7,203(0,5);7,195(0,4);7,183(0,4);6,033(1,2);4,301(3,8);3,640(6,8);3,234(6,7);3,077(1,8);3,060(1,9);2,010(16,6);1,806(0,4);1,794(6,4);1,788(11,8);1,781(16,0);1,775(11,0);1,769(5,5);1,113(0,7);0,329(0,8);0,325(0,8);0,314(0,4);0,309(0,8);0,305(0,7);0,000(0,9);-0,004(0,9);-0,012(0,9);-0,016(0,9);-0,159(0,8)
I-1-24	2,02	1,69	Beispiel I-1-24: ¹ H-NMR(400,0 MHz, CD ₃ CN): δ = 8,460(1,3);8,456(1,3);8,448(1,4);8,444(1,3);8,410(1,7);8,404(1,8);7,684(0,8);7,680(0,9);7,678(0,8);7,674(0,7);7,664(0,9);7,660(1,0);7,657(1,0);7,653(0,8);7,368(1,0);7,356(1,0);7,347(0,9);7,335(0,9);7,293(1,1);7,273(2,2);7,253(1,4);7,090(1,2);7,085(2,2);7,079(1,5);7,014(1,1);7,012(1,2);7,010(1,1);6,994(0,9);6,992(1,0);6,990(0,9);6,975(1,1);6,973(1,0);6,969(1,0);6,954(0,9);6,952(0,9);6,948(0,9);6,265(2,5);5,078(9,2);3,811(16,0);3,396(15,7);2,146(10,5);1,963(0,7);1,957(1,7);1,952(9,9);1,945(18,1);1,939(24,3);1,933(16,5);1,927(8,4);1,272(0,6);0,000(1,8)
I-1-25	1,63	1,10	Beispiel I-1-25: ¹ H-NMR(400,0 MHz, CD ₃ CN): δ = 8,451(1,3);8,448(1,3);8,439(1,4);8,436(1,3);8,404(1,8);8,398(1,8);7,686(0,7);7,682(0,9);7,680(0,8);7,676(0,7);7,666(0,8);7,662(1,0);7,659(0,9);7,656(0,8);7,379(0,6);7,370(1,2);7,369(1,2);7,361(2,0);7,358(2,4);7,357(2,4);7,350(1,5);7,348(1,4);7,344(3,3);7,338(1,6);7,327(4,4);7,310(1,7);7,305(1,6);6,213(3,1);4,505(9,6);4,466(7,3);3,785(16,0);3,392(16,0);2,173(6,3);1,963(0,4);1,957(1,1);1,951(5,9);1,945(10,8);1,939(14,5);1,932(9,8);1,926(5,0);0,008(1,3);0,000(27,5);-0,009(0,9)
I-1-26	0,98	-0,04	Beispiel I-1-26: ¹ H-NMR(400,0 MHz, CD ₃ CN): δ = 8,450(1,6);8,447(1,5);8,438(1,6);8,395(2,2);8,389(2,2);7,676(0,9);7,673(1,1);7,656(1,0);7,652(1,2);7,370(1,2);7,358(1,2);7,349(1,1);7,337(1,0);6,181(3,6);3,764(16,0);3,691(10,0);3,389(16,0);2,156(55,4);2,119(0,3);2,112(0,3);2,107(0,4);1,970(16,3);1,951(17,7);1,945(32,0);1,939(43,3);1,933(29,8);1,927(15,3);0,000(4,0)
I-1-27	1,18	0,46	Beispiel I-1-27: ¹ H-NMR(400,0 MHz, CD ₃ CN): δ = 8,478(1,5);8,476(1,6);8,466(1,6);8,464(1,6);8,426(2,4);8,419(2,4);7,705(0,8);7,701(1,1);7,695(0,8);7,685(1,0);7,680(1,2);7,675(0,9);7,397(1,3);7,385(1,4);7,377(1,2);7,365(1,1);6,206(3,8);3,798(15,4);3,797(15,8);3,763(10,3);3,418(15,5);3,417(16,0);2,478(1,2);2,460(3,7);2,441(3,8);2,423(1,3);2,242(21,0);2,222(63,0);1,994(0,9);1,988(2,0);1,982(8,9);1,977(15,5);1,976(15,8);1,970(20,9);1,969(21,0);1,964(14,5);1,958(7,5);1,174(3,9);1,156(7,5);1,137(3,6)
I-1-28	0,65	0,35	Beispiel I-1-28: ¹ H-NMR(400,0 MHz, CD ₃ CN): δ = 8,488(1,3);8,484(1,5);8,476(1,4);8,472(1,5);8,424(2,0);8,417(1,8);7,712(0,8);7,709(0,9);7,706(0,9);7,702(0,8);7,692(0,9);7,688(1,0);7,685(1,0);7,682(0,9);7,401(1,1);7,390(1,1);7,381(1,0);7,369(0,9);6,364(2,4);4,437(7,4);4,426(0,5);3,855(16,0);3,809(0,7);3,432(15,8);3,423(1,0);3,288(0,6);3,075(0,9);3,056(2,8);3,038(2,9);3,019(1,0);2,533(0,7);2,181(60,2);2,150(0,3);2,144(0,3);2,138(0,4);1,995(1,5);1,989(3,4);1,983(15,7);1,976(28,0);1,970(37,7);1,964(26,0);1,958(13,3);1,305(3,8);1,287(7,6);1,268(3,6)
I-1-30	0,88	0,56	Beispiel I-1-30: ¹ H-NMR(400,0 MHz, CD ₃ CN): δ = 8,456(1,3);8,452(1,4);8,444(1,4);8,441(1,4);8,415(0,3);8,395(1,9);8,389(1,9);7,680(0,9);7,676(0,9);7,670(0,7);7,659(0,9);7,654(1,0);7,650(0,8);7,370(1,2);7,358(1,1);7,349(1,0);7,338(0,9);6,334(2,5);5,286(0,3);4,585(1,0);4,422(8,6);3,827(15,5);3,811(2,3);3,800(0,9);3,778(0,4);3,401(16,0);3,391(0,7);3,251(0,4);3,234(1,0);3,217(1,3);3,200(1,0);3,183(0,4);2,631(0,6);2,529(0,5);2,503(1,3);2,464(0,4);2,452(0,3);2,419(0,5);2,407(1,2);2,375(0,3);2,337(0,5);2,310(0,7);2,305(0,8);2,291(0,6);2,282(0,7);2,252(0,6);2,23

			9(1,3);2,225(1,7);2,218(0,8);2,195(1,3);2,183(2,2);2,154(0,7);2,146(0,5);2,141(1,2);2,116(0,7);2,107(0,6);2,080(0,8);2,058(0,4);2,043(0,4);2,023(0,6);1,989(0,6);1,964(0,8);1,957(1,7);1,952(9,5);1,945(17,2);1,939(23,8);1,933(16,7);1,927(8,8);1,671(0,9);1,517(0,3);1,469(0,4);1,294(14,4);1,277(14,3);1,235(0,5);1,218(0,4);1,213(0,4);1,184(0,4);1,169(0,7);1,153(0,6);1,142(0,5);1,124(0,5);0,000(0,9)
I-1-31	1,84	1,18	Beispiel I-1-31: ¹ H-NMR(400,0 MHz, CD ₃ CN): δ = 8,449(1,4);8,445(1,5);8,437(1,5);8,433(1,5);8,392(2,2);8,386(2,1);7,674(0,8);7,670(0,9);7,668(1,0);7,664(0,8);7,653(0,9);7,650(1,0);7,647(1,1);7,643(0,9);7,365(1,3);7,353(1,3);7,344(1,2);7,332(1,1);6,163(3,7);3,777(15,8);3,700(10,2);3,385(16,0);2,310(5,0);2,293(5,2);2,202(35,5);1,964(0,6);1,958(1,2);1,952(5,3);1,946(9,4);1,940(12,5);1,934(8,6);1,928(4,4);1,627(0,5);1,610(0,9);1,593(1,1);1,577(0,9);1,560(0,5);0,875(15,2);0,859(14,6);0,000(1,6)
I-1-32	1,26	1,05	Beispiel I-1-32: ¹ H-NMR(400,0 MHz, CD ₃ CN): δ = 8,456(1,6);8,452(2,0);8,444(1,6);8,441(1,8);8,388(2,3);8,382(2,1);7,680(0,9);7,676(1,1);7,674(1,2);7,670(1,1);7,660(1,0);7,656(1,2);7,653(1,2);7,650(1,0);7,368(1,4);7,357(1,4);7,348(1,2);7,336(1,0);6,332(2,8);4,993(0,4);4,396(8,4);3,822(16,0);3,801(0,8);3,796(0,9);3,777(0,7);3,700(0,5);3,663(0,3);3,402(16,0);3,390(1,4);3,386(1,5);2,957(4,3);2,941(4,5);2,501(0,9);2,222(0,5);2,205(1,0);2,189(1,3);2,172(1,5);2,138(45,5);2,113(0,7);2,107(0,6);2,100(0,5);1,963(3,3);1,957(6,6);1,952(27,1);1,945(47,2);1,939(62,6);1,933(43,4);1,927(22,4);1,768(0,4);1,050(0,8);1,026(15,7);1,009(15,2);0,989(0,4);0,984(0,4);0,876(0,8);0,860(0,8);0,000(7,8)
I-1-33	1,67	0,97	Beispiel I-1-33: ¹ H-NMR(400,0 MHz, CD ₃ CN): δ = 8,444(0,5);8,440(0,5);8,432(0,5);8,428(0,5);8,389(0,6);8,383(0,6);7,643(0,3);7,641(0,3);7,358(0,4);7,346(0,5);7,345(0,5);7,338(0,4);7,326(0,5);6,162(1,1);3,804(3,5);3,788(5,9);3,595(0,5);3,381(5,9);2,199(14,4);1,958(0,5);1,953(3,2);1,946(5,9);1,940(8,0);1,934(5,5);1,928(2,9);1,422(3,2);1,309(0,3);1,253(16,0);0,000(5,3)
I-1-34	1,03	0,75	Beispiel I-1-34: ¹ H-NMR(400,0 MHz, CD ₃ CN): δ = 8,458(0,5);8,454(0,5);8,446(0,5);8,442(0,5);8,401(0,6);8,395(0,7);7,670(0,4);7,379(0,4);7,367(0,4);7,358(0,4);7,346(0,3);6,347(1,0);4,464(3,2);3,840(5,9);3,402(5,9);2,301(0,4);1,957(0,6);1,951(3,3);1,945(6,0);1,939(8,2);1,933(5,6);1,927(2,9);1,353(16,0);0,000(1,1)
I-1-35	1,57	0,96	Beispiel I-1-35: ¹ H-NMR(600,1 MHz, CD ₃ CN): δ = 8,444(0,8);8,442(0,8);8,436(0,8);8,434(0,7);8,381(1,0);8,377(1,0);7,668(0,5);7,666(0,5);7,664(0,5);7,662(0,4);7,655(0,5);7,652(0,6);7,651(0,5);7,648(0,5);7,358(0,6);7,357(0,6);7,350(0,6);7,349(0,6);7,344(0,6);7,343(0,5);7,336(0,6);7,335(0,5);6,168(1,4);3,778(16,0);3,385(10,2);2,353(2,7);2,342(2,8);2,173(0,3);1,956(0,5);1,951(0,6);1,948(3,1);1,943(5,2);1,939(7,5);1,935(5,1);1,931(2,6);0,830(0,4);0,502(0,4);0,495(1,1);0,492(1,2);0,488(0,5);0,485(0,5);0,481(1,2);0,478(1,1);0,471(0,4);0,163(0,4);0,156(1,3);0,153(1,2);0,148(1,2);0,145(1,3);0,138(0,4);0,000(1,5)
I-1-36	2,06	1,42	Beispiel I-1-36: ¹ H-NMR(400,0 MHz, CD ₃ CN): δ = 8,449(0,5);8,445(0,5);8,437(0,5);8,434(0,5);8,391(0,7);8,385(0,7);7,649(0,3);7,645(0,4);7,642(0,4);7,364(0,4);7,363(0,4);7,352(0,4);7,351(0,4);7,344(0,3);7,342(0,3);7,330(0,3);6,159(1,2);3,781(6,2);3,703(3,7);3,384(6,2);2,396(3,3);2,195(6,0);1,952(1,5);1,946(2,7);1,940(3,7);1,934(2,6);1,928(1,3);0,864(16,0)
I-1-37	1,04	0,35	Beispiel I-1-37: ¹ H-NMR(400,0 MHz, CD ₃ CN): δ = 8,454(1,5);8,451(1,5);8,442(1,5);8,439(1,5);8,402(2,2);8,396(2,2);7,681(0,9);7,678(1,1);7,675(1,0);7,671(0,8);7,661(1,0);7,657(1,1);7,655(1,1);7,651(0,9);7,375(1,2);7,363(1,2);7,354(1,1);7,343(1,0);6,186(3,4);4,307(0,4);4,281(0,4);4,038(0,4);3,830(9,5);3,797(0,9);3,770(15,6);3,756(0,9);3,701(1,1);3,6

			93(3,3);3,687(1,2);3,675(0,7);3,634(0,6);3,617(15,6);3,404(0,7);3,389(16,0);3,377(1,6);3,275(1,9);3,242(9,8);3,232(0,5);3,140(0,5);2,197(67,4);2,114(0,5);2,107(0,4);2,101(0,5);2,049(2,4);1,964(1,4);1,958(3,0);1,952(15,3);1,946(27,9);1,940(38,3);1,934(27,2);1,928(14,0);1,775(0,3);0,000(53,0)
I-1-38	1,73	1,14	Beispiel I-1-38: ¹ H-NMR(400,0 MHz, CD ₃ CN): δ = 8,458(1,5);8,454(1,5);8,446(1,5);8,443(1,5);8,389(2,2);8,383(2,2);7,665(0,8);7,662(1,0);7,660(1,0);7,656(0,8);7,645(0,9);7,641(1,1);7,639(1,1);7,636(0,9);7,366(1,2);7,354(1,2);7,346(1,1);7,333(2,3);7,313(3,4);7,302(1,3);7,298(1,6);7,293(0,7);7,282(3,3);7,263(1,8);7,255(1,7);7,246(0,5);7,238(1,2);6,125(3,5);4,133(9,8);3,732(15,8);3,660(0,4);3,376(16,0);2,173(1,4);1,963(0,7);1,951(7,6);1,945(14,0);1,939(19,2);1,933(13,3);1,927(6,7);0,146(0,3);0,008(3,3);0,000(68,6);-0,149(0,3)
I-1-39	1,99	1,41	Beispiel I-1-39: ¹ H-NMR(400,0 MHz, CD ₃ CN): δ = 8,450(1,4);8,446(1,5);8,438(1,4);8,435(1,4);8,391(2,0);8,385(2,0);7,660(0,8);7,656(0,9);7,653(0,9);7,650(0,7);7,639(0,9);7,635(1,0);7,633(1,0);7,629(0,8);7,512(1,2);7,507(1,3);7,493(1,2);7,488(1,5);7,408(1,2);7,404(1,1);7,389(1,6);7,385(1,5);7,355(1,1);7,343(1,1);7,334(1,0);7,323(0,9);7,267(0,4);7,263(0,6);7,248(1,4);7,244(1,4);7,230(1,6);7,228(1,8);7,225(1,6);7,223(1,6);7,209(1,3);7,204(1,3);7,190(0,5);7,186(0,4);6,122(3,3);4,190(9,4);3,791(16,0);3,376(16,0);2,501(0,6);2,239(0,5);1,964(0,5);1,957(0,8);1,952(4,3);1,946(7,9);1,939(10,9);1,933(7,5);1,927(3,8);0,008(1,8);0,000(37,8);-0,009(1,4)
I-1-40	2,11	1,55	Beispiel I-1-40: ¹ H-NMR(400,0 MHz, CD ₃ CN): δ = 8,452(1,6);8,448(1,5);8,440(1,7);8,437(1,5);8,403(0,6);8,391(1,9);8,385(1,8);7,660(0,8);7,657(0,9);7,654(0,9);7,650(0,7);7,640(0,8);7,636(1,0);7,634(0,9);7,630(0,8);7,437(1,3);7,434(1,9);7,432(2,2);7,358(1,3);7,348(1,4);7,347(1,3);7,340(1,1);7,338(1,1);7,328(1,0);7,326(1,0);7,256(0,5);7,241(4,6);7,240(4,3);7,237(3,7);7,231(2,2);7,227(1,2);7,223(0,6);6,144(2,9);4,516(0,6);4,186(8,8);4,123(0,4);3,884(0,9);3,819(1,6);3,792(1,9);3,763(16,0);3,409(0,5);3,390(4,0);3,378(15,7);3,274(0,5);2,171(34,0);2,120(0,4);2,113(0,4);2,107(0,4);1,972(0,3);1,964(1,1);1,958(2,3);1,952(15,8);1,946(29,5);1,940(41,8);1,933(29,1);1,927(14,9);0,146(0,7);0,008(5,6);0,000(158,3);-0,009(6,8);-0,150(0,7)
I-1-41	2,07	1,57	Beispiel I-1-41: ¹ H-NMR(400,0 MHz, CD ₃ CN): δ = 8,461(1,2);8,452(1,1);8,449(1,2);8,386(1,6);8,380(1,7);8,037(1,5);7,668(0,8);7,666(0,8);7,662(0,7);7,651(0,7);7,647(0,9);7,645(0,9);7,642(0,7);7,372(1,0);7,360(1,0);7,351(0,9);7,340(0,8);7,284(16,0);6,127(2,6);4,137(7,1);3,754(12,3);3,389(0,3);3,377(12,3);2,508(1,9);2,453(0,4);1,964(0,4);1,958(0,7);1,952(4,3);1,946(8,0);1,940(11,2);1,933(8,1);1,927(4,3);0,008(1,5);0,000(39,5)
I-1-42	1,01	0,27	Beispiel I-1-42: ¹ H-NMR(400,0 MHz, CD ₃ CN): δ = 8,579(0,4);8,567(5,0);8,555(4,9);8,443(1,8);8,440(1,5);8,431(1,8);8,428(1,4);8,395(2,4);8,389(2,4);7,940(0,7);7,934(0,8);7,833(0,6);7,821(0,7);7,676(1,0);7,673(1,2);7,670(1,1);7,667(0,8);7,656(1,1);7,652(1,4);7,650(1,2);7,646(0,9);7,361(1,3);7,349(1,3);7,341(1,2);7,329(1,1);7,240(0,5);7,227(0,5);7,219(0,5);7,207(0,5);7,130(1,4);7,120(2,1);7,118(2,7);7,108(1,0);7,106(1,3);7,085(0,4);7,082(0,4);7,078(0,4);7,061(0,3);6,209(3,5);4,452(9,7);3,908(0,4);3,829(11,4);3,826(15,9);3,386(11,5);3,384(16,0);3,057(0,5);3,032(0,4);2,777(5,3);2,313(4,0);1,964(1,0);1,952(9,6);1,948(12,7);1,946(17,4);1,942(17,8);1,940(23,2);1,936(13,8);1,933(16,4);1,930(7,8);1,927(8,5);1,282(0,3);0,000(0,6)
I-1-44	1,64	1,46	Beispiel I-1-44: ¹ H-NMR(600,1 MHz, d ₆ -DMSO): δ = 8,490(2,1);8,486(2,1);8,464(1,6);8,462(1,6);8,456(1,6);8,454(1,6);7,959(1,8);7,957(1,8);7,837(0,8);7,835(1,0);7,833(1,0);7,830(0,8);7,823(1,0);7,821(1,1);7,81

			9(1,0);7,817(0,9);7,434(1,2);7,426(1,2);7,4202(1,1);7,4195(1,1);7,412(1,1);6,737(2,0);6,733(2,0);6,240(1,4);5,562(7,2);3,796(0,5);3,786(16,0);3,368(15,8);3,333(1,0);3,169(3,1);2,507(7,1);2,505(14,8);2,502(20,2);2,499(14,6);2,496(6,9)
I-1-45	1,59	1,34	Beispiel I-1-45: ¹ H-NMR(400,0 MHz, d ₆ -DMSO): δ = 8,485(2,3);8,479(2,4);8,465(1,6);8,461(1,8);8,453(1,7);8,449(1,7);8,421(3,0);7,894(3,4);7,846(0,9);7,842(1,1);7,839(1,0);7,836(0,9);7,825(1,0);7,821(1,1);7,819(1,1);7,815(0,9);7,442(1,3);7,430(1,3);7,422(1,2);7,410(1,2);6,231(2,8);5,507(8,0);3,814(16,0);3,378(0,6);3,368(15,5);3,323(9,6);3,175(0,4);3,164(0,3);2,524(0,5);2,511(9,4);2,507(18,8);2,502(24,9);2,498(18,6);2,494(9,5);2,073(0,4);0,008(1,0);0,000(26,6);-0,008(1,1)
I-1-46	0,42	0,05	Beispiel I-1-46: ¹ H-NMR(400,0 MHz, d ₆ -DMSO): δ = 8,486(2,3);8,480(2,5);8,465(1,6);8,462(1,8);8,453(1,7);8,450(1,7);8,077(3,7);8,075(3,7);7,846(0,9);7,842(1,1);7,840(1,1);7,836(1,0);7,826(1,1);7,822(1,2);7,819(1,2);7,816(1,0);7,732(3,5);7,731(3,6);7,441(1,4);7,429(1,3);7,420(1,3);7,409(1,1);6,230(2,6);6,130(0,4);5,745(8,9);4,438(0,4);4,424(0,4);3,809(16,0);3,788(1,8);3,368(16,9);3,322(10,4);2,524(0,5);2,506(21,6);2,502(28,8);2,497(21,8);0,008(1,0);0,000(28,0)
I-1-47	0,75	0,35	Beispiel I-1-47: ¹ H-NMR(400,0 MHz, CD ₃ CN): δ = 8,454(1,0);8,450(1,1);8,442(1,1);8,438(1,1);8,384(1,2);8,383(1,3);8,378(1,2);8,376(1,3);7,680(0,7);7,676(0,8);7,674(0,8);7,670(0,8);7,659(1,6);7,656(5,4);7,649(1,0);7,370(0,8);7,368(0,8);7,358(0,8);7,356(0,9);7,349(0,7);7,348(0,8);7,338(0,7);7,336(0,8);6,249(1,7);5,647(0,5);5,622(8,6);5,446(0,9);3,860(1,1);3,771(16,0);3,384(15,5);2,787(0,5);2,776(0,5);2,138(31,4);1,963(1,1);1,957(2,2);1,951(12,9);1,945(23,9);1,939(33,1);1,933(22,8);1,926(11,5);1,271(1,2);0,000(1,2)
I-1-48	1,04	0,71	Beispiel I-1-48: ¹ H-NMR(400,0 MHz, d ₆ -DMSO): δ= 8,4757(2,8);8,4692(4,6);8,4568(2,1);8,4537(2,0);7,8413(1,0);7,8377(1,3);7,8352(1,2);7,8210(1,2);7,8173(1,5);7,8148(1,4);7,4461(1,4);7,4343(1,5);7,4258(1,4);7,4140(1,3);6,3345(3,1);5,7552(2,3);4,7070(7,8);3,8114(16,0);3,3792(15,7);3,3382(2,4);3,0669(4,2);3,0489(4,2);2,5409(3,1);2,5058(15,0);2,5017(19,1);1,0740(0,6);1,0669(0,6);1,0550(0,9);1,0432(0,6);1,0363(0,6);1,0247(0,4);0,6200(0,7);0,6085(2,3);0,6041(2,6);0,5883(2,4);0,5843(2,3);0,5735(0,9);0,4233(0,9);0,4118(3,0);0,3972(2,8);0,3855(0,7);0,0078(1,0);-0,0002(20,6)
I-1-49		0,71	Beispiel I-1-49: ¹ H-NMR(400,0 MHz, d ₆ -DMSO): δ= 8,4865(1,7);8,4831(1,7);8,4747(1,8);8,4712(1,7);8,4322(2,4);8,4264(2,5);7,8107(0,9);7,8069(1,1);7,8046(1,0);7,8008(0,9);7,7905(1,0);7,7865(1,2);7,7843(1,2);7,7805(1,0);7,4526(1,2);7,4407(1,3);7,4323(1,2);7,4205(1,1);6,0959(3,9);5,7560(1,1);3,8697(1,0);3,8519(3,1);3,8341(3,2);3,8164(1,1);3,7848(9,1);3,7459(16,0);3,3328(0,5);2,5066(11,6);2,5023(15,1);2,4979(11,0);2,4005(1,3);2,3822(4,1);2,3638(4,2);2,3455(1,4);1,9236(0,9);1,1185(3,4);1,1008(7,6);1,0913(5,0);1,0830(3,7);1,0730(9,0);1,0546(4,2);0,0078(0,8);-0,0002(17,4);-0,0083(0,9)
I-1-50	1,73	1,10	Beispiel I-1-50: ¹ H-NMR(400,0 MHz, d ₆ -DMSO): δ= 8,4833(1,4);8,4798(1,4);8,4714(1,5);8,4680(1,4);8,4275(2,0);8,4218(2,0);7,8038(0,8);7,8000(0,9);7,7976(0,9);7,7938(0,7);7,7835(0,9);7,7797(1,0);7,7773(1,0);7,7736(0,8);7,4475(1,0);7,4356(1,1);7,4272(1,0);7,4153(0,9);6,0975(3,1);3,8682(0,8);3,8504(2,5);3,8326(2,7);3,8073(7,3);3,7438(13,4);3,3263(1,5);2,7934(0,4);2,7767(0,9);2,7598(1,2);2,7431(0,9);2,7264(0,4);2,5063(17,1);2,5019(22,0);2,4976(16,0);1,1340(13,8);1,1173(16,0);1,1001(6,3);1,0823(2,8);-0,0002(10,9)
I-1-51	2,05	1,32	Beispiel I-1-51: ¹ H-NMR(400,0 MHz, d ₆ -DMSO): δ= 8,4846(1,2);8,4814(1,1);8,4728(1,2);8,4695(1,0);8,4198(1,6);8,4136(1,6);7,8078(0,6);7,8041(0,8);7,7876(0,7);7,7838(0,8);7,7814(0,7);7,45

			01(0.9);7.4383(0.9);7.4298(0.8);7.4179(0.8);6.0956(2.6);3.8671(0.6);3.8495(2.0);3.8317(2.0);3.8140(0.7);3.7488(16.0);3.3198(6.7);2.5057(31.8);2.5015(39.1);2.4972(27.2);2.2658(3.4);2.2488(3.6);1.9739(0.6);1.5820(0.3);1.5653(0.6);1.5486(0.8);1.5318(0.6);1.5150(0.3);1.2604(0.6);1.2359(0.5);1.1169(2.3);1.0991(5.0);1.0814(2.2);0.8289(11.0);0.8123(10.4);0.0079(1.0);-0.0002(24.3);-0.0084(1.0)
I-1-52	1,93	1,29	Beispiel I-1-52: ¹ H-NMR(400.0 MHz, d ₆ -DMSO): δ= 8.4769(0.6);8.4733(0.6);8.4649(0.6);8.4614(0.6);8.4187(0.8);8.4128(0.8);7.7952(0.3);7.7914(0.4);7.7888(0.4);7.7751(0.4);7.7709(0.4);7.7688(0.4);7.4370(0.4);7.4258(0.4);7.4174(0.4);7.4056(0.4);6.0898(1.4);3.8632(0.4);3.8454(1.2);3.8354(3.3);3.8278(1.3);3.8101(0.4);3.7573(6.0);3.3239(21.4);2.5060(16.0);2.5016(21.1);2.4971(15.2);2.4930(7.4);1.2872(0.4);1.2353(0.4);1.1966(16.0);1.1135(1.2);1.0957(2.7);1.0780(1.2);-0.0002(3.2)
I-1-53	1,82	1,19	Beispiel I-1-53: ¹ H-NMR(400.0 MHz, d ₆ -DMSO): δ= 8.4829(1.7);8.4795(1.7);8.4711(1.8);8.4676(1.6);8.4163(2.3);8.4101(2.3);7.8111(0.9);7.8072(1.0);7.8048(1.0);7.8011(0.8);7.7908(1.0);7.7868(1.1);7.7845(1.1);7.7808(0.8);7.4492(1.3);7.4373(1.3);7.4290(1.2);7.4171(1.1);6.0970(3.7);3.8665(1.1);3.8584(0.8);3.8489(3.2);3.8308(4.0);3.8226(8.6);3.8142(1.4);3.7508(16.0);3.3235(2.7);2.5411(1.8);2.5241(0.6);2.5063(30.5);2.5019(38.8);2.4975(27.5);2.3287(4.6);2.3110(4.5);2.0488(0.7);1.9869(3.0);1.2357(0.7);1.1164(3.7);1.1089(1.1);1.0986(7.5);1.0809(3.2);0.8195(0.5);0.8122(0.4);0.8002(0.8);0.7883(0.5);0.7816(0.5);0.5003(0.4);0.4844(0.4);0.4801(0.4);0.4707(0.9);0.4602(2.2);0.4558(2.3);0.4454(1.1);0.4400(2.2);0.4360(2.0);0.4256(0.8);0.1474(0.8);0.1369(2.5);0.1336(2.4);0.1250(2.3);0.1216(2.4);0.1106(0.6);0.0079(0.4);-0.0002(11.7);-0.0084(0.5)
I-1-54	2,34	1,68	Beispiel I-1-54: ¹ H-NMR(400.0 MHz, d ₆ -DMSO): δ= 8.4858(0.6);8.4826(0.7);8.4740(0.7);8.4708(0.7);8.4167(0.9);8.4112(0.9);7.8019(0.3);7.7982(0.4);7.7958(0.4);7.7921(0.4);7.7817(0.4);7.7779(0.5);7.7755(0.5);7.7718(0.4);7.4462(0.5);7.4344(0.5);7.4259(0.4);7.4141(0.4);6.0945(1.5);3.8657(0.4);3.8480(1.1);3.8302(1.1);3.8125(0.4);3.7531(7.4);3.3245(6.4);2.5060(7.5);2.5018(9.9);2.4976(7.5);2.3500(3.5);1.1147(1.2);1.0970(2.7);1.0792(1.2);0.8167(16.0);-0.0002(1.8)
I-1-55	0,77	0,68	Beispiel I-1-55: ¹ H-NMR(400.0 MHz, d ₆ -DMSO): δ= 8.4144(2.6);8.4126(2.6);8.1384(0.9);8.1340(1.0);8.1278(1.6);8.1222(1.2);8.1204(1.2);8.1159(0.9);7.6126(0.3);7.5203(0.4);7.3980(3.3);7.3930(2.4);7.3894(3.9);7.3870(3.6);6.6537(5.0);4.7475(7.0);3.8754(0.9);3.8679(1.0);3.8065(1.0);3.7958(15.0);3.3799(0.8);3.3636(0.8);3.3477(15.0);3.3253(6.5);3.1250(0.4);3.1088(0.4);3.0695(4.4);3.0531(4.5);2.7295(0.4);2.7180(0.4);2.5410(3.8);2.5060(21.3);2.5016(27.2);2.4973(20.2);2.1990(0.5);2.1822(1.0);2.1655(1.2);2.1489(1.0);2.1322(0.5);1.0299(1.5);1.0131(1.6);0.9978(16.0);0.9810(15.5);0.9587(0.4);-0.0002(5.2)
I-1-56	1,10	0,18	Beispiel I-1-56: ¹ H-NMR(400.0 MHz, d ₆ -DMSO): δ= 8.4882(1.6);8.4849(1.7);8.4764(1.7);8.4730(1.7);8.4461(2.3);8.4398(2.4);7.8333(0.8);7.8274(1.0);7.8233(0.9);7.8131(0.9);7.8072(1.2);7.8032(0.9);7.4617(1.2);7.4494(1.3);7.4412(1.2);7.4295(1.1);6.8077(1.1);6.7800(1.2);6.7650(1.3);6.7372(1.3);6.1965(4.1);6.0326(1.5);6.0276(1.5);5.9901(1.3);5.9850(1.4);5.4609(1.5);5.4556(1.4);5.4331(1.4);5.4281(1.4);3.8813(1.0);3.8634(3.1);3.8457(3.2);3.8279(1.1);3.7854(16.0);3.6807(0.3);3.3206(42.8);2.6703(0.7);2.5055(91.8);2.5013(121.0);2.4971(90.6);2.3278(0.7);1.2354(0.4);1.1205(3.4);1.1028(7.3);1.0850(3.3);0.0077(0.9);-0.0002(23.2)
I-1-57	1,05	0,10	Beispiel I-1-57: ¹ H-NMR(400.0 MHz, d ₆ -DMSO): δ= 8.4937(2.1);8.4875(2.2);8.4734(1.5);8.4700(1.7);8.4616(1.6);8.4581

			(1.7);7.8623(0.8);7.8585(1.0);7.8560(1.0);7.8521(0.9);7.8419(0.9);7.8382(1.0);7.8356(1.1);7.8318(0.9);7.4602(1.2);7.4484(1.2);7.4399(1.2);7.4280(1.1);6.2709(3.4);5.6691(0.3);5.6655(0.3);5.5036(2.3);5.5008(1.8);5.3168(2.8);5.0872(0.3);5.0833(0.3);3.7919(16.0);3.6841(0.5);3.3817(15.5);3.3641(0.3);3.3561(0.7);3.3424(0.4);3.3202(33.7);2.6703(0.4);2.5098(21.0);2.5057(42.1);2.5012(56.5);2.4968(43.0);2.4927(22.4);2.3277(0.3);2.0241(8.8);1.9417(0.4);1.9310(1.0);1.9272(1.8);1.9236(1.1);1.5004(0.6);1.4796(1.1);1.4607(0.9);1.4552(0.5);1.4404(0.4);1.3080(1.0);1.2893(1.5);1.2708(1.4);1.2528(0.8);1.2350(0.4);0.9063(1.5);0.8857(1.8);0.8788(3.4);0.8663(2.0);0.8605(6.0);0.8422(2.6);0.0079(1.1);-0.0002(28.6);-0.0084(1.4)
I-1-58	1,08		Beispiel I-1-58: ¹ H-NMR(400.0 MHz, d ₆ -DMSO): δ= 8.4775(2.6);8.4710(2.7);8.4621(2.3);8.4587(2.1);8.4502(2.1);8.4470(1.7);7.8355(1.0);7.8318(1.2);7.8291(1.1);7.8256(1.0);7.8153(1.2);7.8113(1.3);7.8090(1.2);7.8053(1.0);7.4458(1.6);7.4339(1.6);7.4255(1.5);7.4136(1.4);6.5818(0.6);6.5655(0.6);6.5610(0.4);6.5434(1.4);6.5272(1.5);6.5119(0.5);6.4840(2.0);6.4455(0.8);6.1944(4.2);6.1187(0.4);3.7460(16.0);3.6825(1.8);3.3772(0.8);3.3638(15.6);3.3556(2.6);3.3197(44.0);2.6747(0.5);2.6703(0.6);2.5870(0.4);2.5669(0.4);2.5055(80.8);2.5012(99.9);2.4969(73.4);2.3320(0.5);2.3280(0.6);1.8716(5.0);1.8555(5.1);1.5775(0.3);1.3154(0.4);1.2982(0.5);1.2862(0.4);1.2348(0.6);1.1068(0.3);0.8909(0.6);0.8850(0.7);0.8725(1.2);0.8665(1.2);0.8542(0.7);0.8479(0.6);0.0014(2.8);-0.0002(4.0)
I-1-59	1,11		Beispiel I-1-59: ¹ H-NMR(400.0 MHz, d ₆ -DMSO): δ= 8.4866(2.3);8.4802(2.3);8.4702(1.6);8.4669(1.6);8.4583(1.6);8.4550(1.6);7.8525(0.8);7.8483(1.0);7.8427(0.8);7.8322(0.9);7.8263(1.1);7.8223(0.9);7.4556(1.3);7.4438(1.3);7.4352(1.2);7.4234(1.1);6.3495(1.0);6.3452(1.0);6.3200(1.5);6.3140(4.7);6.0543(0.4);6.0364(1.1);6.0249(0.3);6.0185(1.2);6.0072(1.0);6.0008(0.4);5.9894(1.0);3.7345(16.0);3.3775(15.6);3.3208(23.6);2.5057(32.0);2.5014(41.9);2.4970(31.2);2.0326(4.4);2.0284(4.3);2.0147(4.3);2.0106(4.3);1.5973(0.3);1.3171(0.4);1.2989(0.4);1.2345(0.4);1.1287(0.3);1.1081(0.4);0.8921(0.7);0.8738(1.3);0.8554(0.7);-0.0002(1.6)
I-1-60	1,26	0,60	Beispiel I-1-60: ¹ H-NMR(400.0 MHz, d ₆ -DMSO): δ= 8.4672(2.2);8.4605(3.2);8.4513(1.5);8.4478(1.5);7.8376(0.7);7.8339(0.9);7.8314(0.9);7.8276(0.8);7.8173(0.8);7.8136(1.0);7.8110(1.0);7.8072(0.8);7.4458(1.0);7.4339(1.0);7.4254(1.0);7.4136(1.0);6.1536(3.1);5.7558(16.0);5.3458(2.4);5.3299(2.6);4.6615(0.4);4.6468(0.8);4.6406(0.6);4.6318(0.6);4.6258(0.7);4.6110(0.4);3.8110(12.7);3.6974(0.7);3.3650(12.2);3.3253(3.0);2.5061(7.4);2.5017(9.8);2.4973(7.3);1.9887(1.0);1.7361(0.4);1.7160(0.8);1.7052(0.5);1.6964(0.6);1.6838(0.7);1.6449(0.5);1.6281(0.6);1.6141(0.5);1.5995(0.9);1.5857(0.8);1.5684(0.7);1.5548(0.5);1.5503(0.3);1.1749(0.6);0.8752(5.2);0.8594(5.0);0.8404(5.2);0.8248(5.1)
I-1-61	1,53	0,92	Beispiel I-1-61: ¹ H-NMR(400.0 MHz, d ₆ -DMSO): δ= 8.4656(2.7);8.4607(3.7);8.4523(1.6);8.4488(1.6);7.8386(0.7);7.8347(0.9);7.8326(0.9);7.8286(0.8);7.8183(0.8);7.8144(1.0);7.8121(1.0);7.8083(0.8);7.4472(1.1);7.4348(1.2);7.4273(1.1);7.4147(1.0);6.1624(3.7);5.7557(16.0);5.3600(1.9);5.3444(2.0);4.5494(0.4);4.5330(1.0);4.5152(1.1);4.4990(0.4);3.7962(13.5);3.6992(0.9);3.3652(13.3);3.3251(1.4);2.5061(8.0);2.5017(10.6);2.4973(7.8);1.7907(0.4);1.7754(0.8);1.7603(0.9);1.7498(1.0);1.7444(0.7);1.7331(0.8);1.7187(0.7);1.6989(0.4);1.5225(0.3);1.5058(0.7);1.4891(0.9);1.4725(0.8);1.4560(0.4);1.2800(0.3);1.2622(0.5);1.2455(0.7);1.2366(0.6);1.2287(0.5);1.2210(0.5);1.2045(0.3);1.0894(0.3);1.0728(0.5);1.0649(0.4);1.0564(0.5);1.0482(0.6);1.0408(0.4);1.0312(0.5);1.0144(0.4);0.8528(0.6);0.8379(11.1);0.8214(10.1)

I-1-62	2,00	1,63	Beispiel I-1-62: ¹ H-NMR(400.0 MHz, d ₆ -DMSO): δ= 19.9882(0.4);8.5088(2.4);8.5031(2.4);8.4809(1.6);8.4778(1.7);8.4693(1.7);8.3160(0.4);7.8552(1.1);7.8344(1.2);7.4523(1.2);7.4407(1.3);7.4316(1.2);7.4198(1.2);7.3508(3.8);7.3454(1.6);7.3283(4.7);7.1959(0.5);7.0796(4.5);7.0572(3.8);6.6803(0.3);6.6561(0.5);6.2502(2.9);5.3363(0.6);5.3244(1.0);5.3127(0.7);5.1176(8.1);3.7956(16.0);3.3772(15.6);3.3178(130.2);2.6749(3.5);2.6701(4.8);2.6656(3.5);2.5054(638.3);2.5010(839.2);2.4966(614.5);2.4253(0.5);2.3322(3.7);2.3278(4.8);2.3236(3.7);2.0257(1.2);2.0080(2.1);1.9894(2.0);1.9730(1.1);1.4912(0.4);1.4555(0.8);1.2355(14.4);0.8710(1.1);0.8539(3.0);0.8365(1.2);0.1460(4.5);0.0077(45.1);-0.0001(1009.1);-0.0080(52.4);-0.1498(4.6)
I-1-63	1,36	0,84	Beispiel I-1-63: ¹ H-NMR(400.0 MHz, d ₆ -DMSO): δ= 8.4969(2.5);8.4906(2.6);8.4758(1.7);8.4727(1.7);8.4639(1.7);8.4609(1.7);7.8545(0.9);7.8498(1.1);7.8447(0.9);7.8340(1.0);7.8285(1.2);7.8244(0.9);7.4511(1.4);7.4393(1.4);7.4308(1.3);7.4190(1.2);6.2285(2.9);4.6739(8.4);4.1194(1.2);4.0961(3.8);4.0728(3.9);4.0494(1.3);3.7684(16.0);3.3772(15.9);3.3419(1.1);2.5053(40.4);2.5011(52.0);2.4968(37.3);1.2356(1.0);0.0070(0.6);-0.0002(13.5);-0.0084(0.6)
I-1-64	0,92	0,18	Beispiel I-1-64: ¹ H-NMR(400.0 MHz, d ₆ -DMSO): δ= 8.4861(2.3);8.4800(2.4);8.4723(1.8);8.4689(1.9);8.4605(1.7);8.4569(1.8);7.8480(1.0);7.8442(1.1);7.8380(0.9);7.8277(1.0);7.8239(1.1);7.8216(1.1);7.8180(0.9);7.4499(1.3);7.4381(1.3);7.4296(1.2);7.4177(1.2);6.7698(0.5);6.1773(2.9);5.9735(0.4);4.4769(0.7);4.4316(8.5);3.8383(1.5);3.7867(0.8);3.7776(0.5);3.7554(16.0);3.4852(0.4);3.4726(1.6);3.4534(0.6);3.4419(1.3);3.4244(4.0);3.4069(4.1);3.3894(1.5);3.3789(2.2);3.3707(15.4);3.3210(6.8);2.6702(0.7);2.6656(0.5);2.5054(94.5);2.5010(124.6);2.4965(90.6);2.3318(0.6);2.3279(0.8);2.3231(0.6);1.2352(1.5);1.1324(0.5);1.1148(1.1);1.1090(4.3);1.0914(8.3);1.0739(4.0);0.8539(0.4);0.0077(2.2);-0.0003(61.2);-0.0085(2.8)
I-1-65	1,20	0,42	Beispiel I-1-65: ¹ H-NMR(400.0 MHz, CD ₃ CN): δ= 8.4547(1.6);8.4517(1.6);8.4430(1.6);8.4399(1.6);8.3992(2.3);8.3933(2.2);7.6864(0.9);7.6828(1.1);7.6803(1.1);7.6765(0.9);7.6660(1.0);7.6624(1.2);7.6599(1.2);7.6562(0.9);7.3730(1.2);7.3612(1.2);7.3530(1.1);7.3421(1.0);6.1868(3.4);4.4392(9.8);3.7854(15.9);3.6263(0.5);3.6110(1.2);3.5958(1.6);3.5805(1.2);3.5651(0.5);3.3907(15.9);2.1690(38.8);1.9517(9.0);1.9456(16.3);1.9395(21.7);1.9333(15.2);1.9272(7.9);1.2712(0.9);1.1176(16.0);1.1024(15.8);-0.0003(57.8)
I-1-66	0,61		Beispiel I-1-66: ¹ H-NMR(400.0 MHz, CD ₃ CN): δ= 8.4668(1.7);8.4636(1.7);8.4550(1.8);8.4517(1.6);8.4276(2.5);8.4217(2.5);7.6842(0.9);7.6805(1.2);7.6751(0.9);7.6640(1.1);7.6601(1.4);7.6549(1.0);7.3951(1.4);7.3832(1.4);7.3749(1.3);7.3629(1.2);6.6561(3.8);5.4481(2.3);4.5848(0.4);4.5446(8.9);3.8043(0.9);3.7928(1.2);3.7821(16.0);3.2908(0.4);3.2810(0.8);3.2728(1.0);3.2634(1.5);3.2541(1.0);3.2458(0.8);3.2360(0.4);2.2039(13.2);2.1134(0.4);2.1077(0.4);1.9721(0.5);1.9642(0.6);1.9526(7.0);1.9464(12.7);1.9403(17.5);1.9342(12.3);1.9280(6.4);0.8760(0.6);0.8579(2.6);0.8442(2.7);0.8404(2.2);0.8271(0.8);0.5849(0.8);0.5717(2.3);0.5673(2.5);0.5620(2.3);0.5580(2.2);0.5444(0.6);0.0079(2.6);-0.0002(47.1)
I-1-68	1,21	1,02	Beispiel I-1-68: ¹ H-NMR(400.0 MHz, d ₆ -DMSO): δ= 8.4770(2.5);8.4710(2.6);8.4614(1.8);8.4578(1.8);8.4494(1.9);8.4460(1.7);8.3133(0.9);7.8387(1.0);7.8347(1.1);7.8323(1.1);7.8287(0.9);7.8182(1.1);7.8143(1.2);7.8118(1.2);7.8082(0.9);7.4427(1.4);7.4306(1.6);7.4229(3.0);7.4089(1.7);7.4048(2.1);6.3597(2.8);5.4071(2.4);5.3887(2.4);4.0234(0.3);3.8850(16.0);3.8220(0.5);3.4053(0.6);3.3810(16.1);3.3251(771.6);2.6752(2.1);2.6708(2.8);2.6662(2.0);2.5061(362.3);2.5017(458.9);2.4973(336.0);2.3329(2.1);2.3285(2.8);2.3241(2.0);1.9883(1.2);1.25

			91(0.4);1.2433(0.4);1.1925(0.3);1.1750(0.6);1.1572(0.3);-0.0002(15.4)
I-1-69	0,59	0,22	Beispiel I-1-69: ^1H-NMR(400.0 MHz, CD_3CN): δ= 8.4738(1.4);8.4706(1.5);8.4619(1.5);8.4585(1.5);8.4137(2.0);8.4076(2.0);7.7287(0.8);7.7249(1.0);7.7228(0.9);7.7191(0.8);7.7084(0.9);7.7045(1.0);7.7023(1.0);7.6986(0.9);7.4685(4.5);7.4115(1.2);7.3997(1.2);7.3911(1.0);7.3792(1.0);6.3373(3.0);4.9329(9.3);3.8949(0.4);3.8660(0.4);3.7943(15.7);3.4202(0.4);3.4114(0.7);3.3921(16.0);3.1813(0.3);3.0110(0.3);3.0042(0.3);3.0001(0.4);2.9738(0.4);2.9699(0.4);2.9614(0.4);2.9413(0.4);2.9102(0.7);2.9006(1.0);2.8923(1.3);2.8830(1.4);2.8791(1.1);2.8736(1.1);2.8655(1.0);2.8558(0.7);2.8268(0.4);2.5033(7.2);1.9640(0.4);1.9523(6.0);1.9461(11.4);1.9400(16.0);1.9338(11.1);1.9277(5.8);0.9241(0.4);0.9062(1.8);0.8907(2.0);0.8763(1.6);0.8597(1.2);0.8488(3.0);0.8428(2.0);0.8373(1.7);0.8178(0.5);0.0079(1.8);-0.0002(46.7);-0.0083(2.3)
I-1-70	0,37		Beispiel I-1-70: ^1H-NMR(400.0 MHz, d_6-DMSO): δ= 8.4753(2.8);8.4685(4.1);8.4563(2.0);8.4529(1.9);7.8922(5.4);7.8411(1.0);7.8375(1.2);7.8311(1.0);7.8208(1.2);7.8168(1.3);7.8108(1.0);7.4476(1.3);7.4357(1.4);7.4274(1.3);7.4154(1.2);6.1647(3.2);6.1285(0.4);4.9192(8.6);4.4368(0.3);4.4234(0.3);4.0653(0.5);3.7868(1.6);3.7667(15.7);3.3978(0.6);3.3594(15.7);3.3213(54.7);3.1626(16.0);3.1216(0.4);2.6699(0.5);2.6659(0.4);2.5405(33.6);2.5054(68.7);2.5011(89.0);2.4968(66.1);2.3280(0.6);2.3238(0.4);0.1457(0.4);-0.0002(77.3);-0.0082(3.7);-0.1497(0.4)
I-1-71	0,95		Beispiel I-1-71: ^1H-NMR(400.0 MHz, d_6-DMSO): δ= 8.4740(2.6);8.4680(3.0);8.4618(2.6);8.4500(2.0);7.8232(1.3);7.8034(1.4);7.4446(1.3);7.4331(1.4);7.4244(1.4);7.4122(1.4);6.0499(2.6);3.9530(0.4);3.9317(0.4);3.8400(0.8);3.8062(16.0);3.7625(0.4);3.6898(1.1);3.3519(16.8);3.3199(35.5);2.6701(1.8);2.6005(0.4);2.5798(0.3);2.5050(240.0);2.5011(294.6);2.4971(216.1);2.3281(1.6);2.0033(0.6);1.9942(0.7);1.9821(1.2);1.9703(0.8);1.9622(0.7);1.9504(0.4);1.2589(0.4);1.2350(0.5);0.9222(0.6);0.9128(1.8);0.9059(2.3);0.8918(1.9);0.8855(2.4);0.8769(0.9);0.8678(0.8);0.8492(0.4);0.7766(0.9);0.7677(2.4);0.7618(2.3);0.7558(2.4);0.7503(2.1);0.7388(0.6);-0.0003(52.9)

Biologische Beispiele**Myzus persicae - Sprühtest**

Lösungsmittel: 78 Gewichtsteile Aceton
1,5 Gewichtsteile Dimethylformamid

5 Emulgator: Alkylarylpolglykolether

Zur Herstellung einer zweckmäßigen Wirkstoffzubereitung löst man 1 Gewichtsteil Wirkstoff mit den angegebenen Gewichtsteilen Lösungsmittel und füllt mit Wasser, welches eine Emulgatorkonzentration von 1000 ppm enthält, bis zum Erreichen der gewünschten Konzentration auf. Zur Herstellung weiterer Testkonzentrationen wird mit emulgatorhaltigem Wasser verdünnt.

10 Chinakohlblattscheiben (*Brassica pekinensis*), die von allen Stadien der Grünen Pfirsichblattlaus (*Myzus persicae*) befallen sind, werden mit einer Wirkstoffzubereitung der gewünschten Konzentration gespritzt.

Nach 5-6 Tagen wird die Wirkung in % bestimmt. Dabei bedeutet 100 %, dass alle Blattläuse abgetötet wurden; 0 % bedeutet, dass keine Blattläuse abgetötet wurden.

15 Bei diesem Test zeigen z. B. die folgenden Verbindungen der Herstellungsbeispiele Wirkung von 100% bei einer Aufwandmenge von 500g/ha: I-1-3, I-1-4 , I-1-5, I-1-6, I-1-7, I-1-9, I-1-13, I-1-15, I-1-16, I-1-17, I-1-21, I-1-22, I-1-23, I-1-24, I-1-26, I-1-28, I-1-31, I-1-33, I-1-34, I-1-35, I-1-37, I-1-42, I-1-43, I-1-44, I-1-46, I-1-47, I-1-48, I-1-51, I-1-53, I-1-62, I-1-64

20 Bei diesem Test zeigen z. B. die folgenden Verbindungen der Herstellungsbeispiele Wirkung von 90% bei einer Aufwandmenge von 500g/ha: I-1-10, I-1-11, I-1-12, I-1-14, I-1-18, I-1-19, I-1-20, I-1-25, I-1-27, I-1-29, I-1-30, I-1-32, I-1-36, I-1-38, I-1-39, I-1-40, I-1-41, I-1-45, I-1-49, I-1-50, I-1-52, I-1-54, I-1-56, I-1-57, I-1-58, I-1-59, I-1-60, I-1-61, I-1-63, I-1-65, I-1-71

Bei diesem Test zeigen z. B. die folgenden Verbindungen der Herstellungsbeispiele Wirkung von 70% bei einer Aufwandmenge von 500g/ha: I-1-67, I-1-69

25

Myzus persicae - Oraltest

Lösungsmittel: 100 Gewichtsteile Aceton

Zur Herstellung einer zweckmäßigen Wirkstoffzubereitung löst man 1 Gewichtsteil Wirkstoff mit den angegebenen Gewichtsteilen Lösungsmittel und füllt mit Wasser bis zum Erreichen der gewünschten

30 Konzentration auf.

50 µl der Wirkstoffzubereitung werden in Mikrotiterplatten überführt und mit 150µl IPL41Insektenmedium (33% + 15% Zucker) auf eine Endvolumen von 200 µl aufgefüllt. Anschließend werden die Platten mit Parafilm verschlossen, durch den eine gemischte Population der Grünen Pfirsichblattlaus (*Myzus persicae*), die sich in einer zweiten Mikrotiterplatte befindet, hindurchstechen und die Lösung aufnehmen kann.

Nach 5 Tagen wird die Wirkung in % bestimmt. Dabei bedeutet 100 %, dass alle Blattläuse abgetötet wurden; 0 % bedeutet, dass keine Blattläuse abgetötet wurden.

Bei diesem Test zeigen z. B. die folgenden Verbindungen der Herstellungsbeispiele Wirkung von 100% bei einer Aufwandmenge von 20ppm: I-1-4, I-1-5, I-1-6, I-1-7, I-1-9, I-1-11, I-1-12, I-1-13, I-1-14, I-1-15, I-1-16, I-1-17, I-1-18, I-1-19, I-1-20, I-1-21, I-1-22, I-1-23, I-1-25, I-1-26, I-1-27, I-1-28, I-1-29, I-1-30, I-1-31, I-1-32, I-1-33, I-1-34, I-1-35, I-1-36, I-1-37, I-1-39, I-1-40, I-1-41, I-1-42, I-1-43, I-1-44, I-1-45, I-1-46, I-1-47, I-1-48, I-1-49, I-1-50, I-1-51, I-1-52, I-1-53, I-1-54, I-1-60, I-1-61, I-1-62, I-1-63, I-1-64, I-1-65, I-1-71

Bei diesem Test zeigen z. B. die folgenden Verbindungen der Herstellungsbeispiele Wirkung von 90% bei einer Aufwandmenge von 20ppm: I-1-3, I-1-8, I-1-24, I-1-38, I-1-56

Bei diesem Test zeigen z. B. die folgenden Verbindungen der Herstellungsbeispiele Wirkung von 70% bei einer Aufwandmenge von 20ppm: I-1-10, I-1-66

Absetzbeispiele**Myzus persicae - Sprühtest (MYZUPE)**

Lösungsmittel: 78,0 Gewichtsteile Aceton
1,5 Gewichtsteile Dimethylformamid

5 Emulgator: Alkylarylpolglykolether

Zur Herstellung einer zweckmäßigen Wirkstoffzubereitung löst man 1 Gewichtsteil Wirkstoff mit den angegebenen Gewichtsteilen Lösungsmittel und füllt mit Wasser, welches eine Emulgatorkonzentration von 1000 ppm enthält, bis zum Erreichen der gewünschten Konzentration auf. Zur Herstellung weiterer Testkonzentrationen wird mit emulgatorhaltigem Wasser verdünnt.

10 Chinakohlblattscheiben (*Brassica pekinensis*), die von allen Stadien der Grünen Pfirsichblattlaus (*Myzus persicae*) befallen sind, werden mit einer Wirkstoffzubereitung der gewünschten Konzentration gespritzt.

Nach der gewünschten Zeit wird die Wirkung in % bestimmt. Dabei bedeutet 100 %, dass alle Blattläuse abgetötet wurden; 0 % bedeutet, dass keine Blattläuse abgetötet wurden.

15 Bei diesem Test zeigen z. B. die folgenden Verbindungen der Herstellungsbeispiele überlegene Wirksamkeit gegenüber dem Stand der Technik: siehe Tabelle 3.

Myzus persicae – Oraltest (MYZUPE O)

Lösungsmittel: 100 Gewichtsteile Aceton

20 Zur Herstellung einer zweckmäßigen Wirkstoffzubereitung löst man 1 Gewichtsteil Wirkstoff mit den angegebenen Gewichtsteilen Lösungsmittel und füllt mit Wasser bis zum Erreichen der gewünschten Konzentration auf.

50 μ l der Wirkstoffzubereitung werden in Mikrotiterplatten überführt und mit 150 μ l IPL41 Insektenmedium (33% + 15% Zucker) auf ein Endvolumen von 200 μ l aufgefüllt. Anschließend werden die Platten mit Parafilm verschlossen, durch den eine gemischte Population der Grünen Pfirsichblattlaus (*Myzus persicae*), die sich in einer zweiten Mikrotiterplatte befindet, hindurchstechen und die Lösung aufnehmen kann.

Nach der gewünschten Zeit wird die Wirkung in % bestimmt. Dabei bedeutet 100 %, dass alle Blattläuse abgetötet wurden; 0 % bedeutet, dass keine Blattläuse abgetötet wurden.

30 Bei diesem Test zeigen z. B. die folgenden Verbindungen der Herstellungsbeispiele überlegene Wirksamkeit gegenüber dem Stand der Technik: siehe Tabelle 3.

Myzus persicae – Sprühtest (MYZUPE S)

Lösungsmittel: 14 Gewichtsteile Dimethylformamid

Emulgator: Alkylarylpolyglykolether

- 5 Zur Herstellung einer zweckmäßigen Wirkstoffzubereitung löst man 1 Gewichtsteil Wirkstoff mit den angegebenen Gewichtsteilen Lösungsmittel und füllt mit Wasser, welches eine Emulgatorkonzentration von 1000 ppm enthält, bis zum Erreichen der gewünschten Konzentration auf. Zur Herstellung weiterer Testkonzentrationen wird mit emulgatorhaltigem Wasser verdünnt. Bei erforderlicher Zugabe von Ammoniumsalzen oder/und Penetrationsförderern werden diese jeweils in einer Konzentration von
- 10 1000 ppm der Präparatelösung zugefügt.

Paprikapflanzen (*Capsicum annuum*), die stark von der Grünen Pfirsichblattlaus (*Myzus persicae*) befallen sind, werden durch Sprühen mit der Wirkstoffzubereitung in der gewünschten Konzentration behandelt.

- Nach der gewünschten Zeit wird die Abtötung in % bestimmt. Dabei bedeutet 100 %, dass alle Tiere
- 15 abgetötet wurden; 0 % bedeutet, dass keine Tiere abgetötet wurden.

Bei diesem Test zeigen z. B. die folgenden Verbindungen der Herstellungsbeispiele überlegene Wirksamkeit gegenüber dem Stand der Technik: siehe Tabelle 3.

Myzus persicae - Drenchtest (MYZUPE D)

- 20 Lösungsmittel: 7 Gewichtsteile Dimethylformamid
- Emulgator: 2 Gewichtsteile Alkylarylpolyglykolether

- Zur Herstellung einer zweckmäßigen Wirkstoffzubereitung vermischt man 1 Gewichtsteil Wirkstoff mit den angegebenen Mengen Lösungsmittel und Emulgator und verdünnt das Konzentrat mit Wasser auf die gewünschte Konzentration, wobei das Erdvolumen in das gedrencht wird, mitberücksichtigt werden
- 25 muss. Es ist darauf zu achten, dass in der Erde eine Konzentration von 40 ppm Emulgator nicht überschritten wird. Zur Herstellung weiterer Testkonzentrationen wird mit Wasser verdünnt.

Wirsingkohlpflanzen (*Brassica oleracea*) in Erdtöpfen, die von allen Stadien der Grünen Pfirsichblattlaus (*Myzus persicae*) befallen sind, werden mit einer Wirkstoffzubereitung der gewünschten Konzentration angegossen.

- 30 Nach der gewünschten Zeit wird die Wirkung in % bestimmt. Dabei bedeutet 100 %, dass alle Blattläuse abgetötet wurden; 0 % bedeutet, dass keine Blattläuse abgetötet wurden.

Bei diesem Test zeigen z. B. die folgenden Verbindungen der Herstellungsbeispiele überlegene Wirksamkeit gegenüber dem Stand der Technik: siehe Tabelle 3.

Aphis gossypii – Sprühtest (APHIGO S)

- 5 Lösungsmittel: 14 Gewichtsteile Dimethylformamid
Emulgator: Alkylarylpolyglykolether



Zur Herstellung einer zweckmäßigen Wirkstoffzubereitung löst man 1 Gewichtsteil Wirkstoff mit den angegebenen Gewichtsteilen Lösungsmittel und füllt mit Wasser, welches eine Emulgatorkonzentration von 1000 ppm enthält, bis zum Erreichen der gewünschten Konzentration auf. Zur Herstellung weiterer Testkonzentrationen wird mit emulgatorhaltigem Wasser verdünnt. Bei erforderlicher Zugabe von Ammoniumsalzen oder/und Penetrationsförderern werden diese jeweils in einer Konzentration von 1000 ppm der Präparatelösung zugefügt.







Baumwollpflanzen (*Gossypium hirsutum*), die stark von der Baumwollblattlaus (*Aphis gossypii*) befallen sind, werden mit einer Wirkstoffzubereitung der gewünschten Konzentration gespritzt.






- 15 Nach der gewünschten Zeit wird die Abtötung in % bestimmt. Dabei bedeutet 100 %, dass alle Blattläuse abgetötet wurden; 0 % bedeutet, dass keine Blattläuse abgetötet wurden.







Bei diesem Test zeigen z. B. die folgenden Verbindungen der Herstellungsbeispiele überlegene Wirksamkeit gegenüber dem Stand der Technik: siehe Tabelle 3.






20 Tabelle 3






Substanz	Struktur	Objekt	Konzentration	% Wirkung dat	
Stand der Technik <i>WO 2011/009804</i> (Bsp. 14)		MYZUPE	100 g ai/ha	0	5 dat
			20 g ai/ha	0	5 dat
		MYZUPE O	4 ppm	0	5 dat
Stand der Technik <i>WO 2011/009804</i> (Bsp. 13)		MYZUPE	100 g ai/ha	0	6 dat
			20 g ai/ha	0	6 dat
		MYZUPE O	4 ppm	0	6 dat






Stand der Technik <i>Dragovic et al., Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters, Bd. 24, Nr. 3, S. 954-962 (Tabelle 2, Verb. 20)</i>		MYZUPE	100 g ai/ha 20 g ai/ha	70 0	5 dat 5 dat
Stand der Technik <i>gemäß WO 2011/009804</i>		MYZUPE S MYZUPE D APHIGO S	0,16 ppm 0,16 ppm 4 ppm 0,8 ppm	0 30 40 0	6 dat 10 dat 6 dat 6 dat
Stand der Technik <i>gemäß WO 2011/009804</i>		MYZUPE S MYZUPE D APHIGO S	0,16 ppm 0,16 ppm 4 ppm 0,8 ppm	0 0 45 0	6 dat 10 dat 6 dat 6 dat
Beispiel-Nr. I-1-35 Erfindungsgemäß		MYZUPE MYZUPE O MYZUPE S MYZUPE D APHIGO S	100 g ai/ha 20 g ai/ha 4 ppm 0,16 ppm 0,16 ppm 4 ppm 0,8 ppm	90 90 100 100 98 100 99	5 dat 5 dat 5 dat 6 dat 10 dat 6 dat 6 dat
Beispiel-Nr. I-1-33 Erfindungsgemäß		MYZUPE MYZUPE O MYZUPE D APHIGO S	100 g ai/ha 20 g ai/ha 4 ppm 0,16 ppm 4 ppm	90 100 100 90 75	5 dat 5 dat 5 dat 10 dat 6 dat
Beispiel-Nr. I-1-42 Erfindungsgemäß		MYZUPE MYZUPE O	100 g ai/ha 4 ppm	70 90	5 dat 5 dat

Beispiel-Nr. I-1-28 Erfindungsgemäß		MYZUPE	100 g ai/ha	90	5 dat
			20 g ai/ha	100	5 dat
		MYZUPE O	4 ppm	100	5 dat
		MYZUPE S	0,16 ppm	95	6 dat
		MYZUPE D	0,16 ppm	95	10 dat
		APHIGO S	4 ppm	100	6 dat
			0,8 ppm	98	6 dat
Beispiel-Nr. I-1-27 Erfindungsgemäß		MYZUPE	100 g ai/ha	90	5 dat
			20 g ai/ha	90	5 dat
		MYZUPE O	4 ppm	100	5 dat
		MYZUPE D	0,16 ppm	98	10 dat
		APHIGO S	4 ppm	100	6 dat
			0,8 ppm	98	6 dat
Beispiel-Nr. I-1-32 Erfindungsgemäß		MYZUPE	100 g ai/ha	70	5 dat
		MYZUPE O	4 ppm	100	5 dat
		MYZUPE S	0,16 ppm	98	6 dat
		MYZUPE D	0,16 ppm	98	10 dat
		APHIGO S	4 ppm	97	6 dat
			0,8 ppm	98	6 dat
Beispiel-Nr. I-1-31 Erfindungsgemäß		MYZUPE	100 g ai/ha	90	5 dat
			20 g ai/ha	90	5 dat
		MYZUPE O	4 ppm	100	5 dat
		MYZUPE S	0,16 ppm	99	6 dat
		MYZUPE D	0,16 ppm	95	10 dat
		APHIGO S	4 ppm	100	6 dat
			0,8 ppm	100	6 dat
Beispiel-Nr. I-1-36 Erfindungsgemäß		MYZUPE	100 g ai/ha	90	5 dat
			20 g ai/ha	90	5 dat
		MYZUPE O	4 ppm	100	5 dat
		MYZUPE S	0,16 ppm	75	6 dat
		MYZUPE D	0,16 ppm	80	10 dat
		APHIGO S	4 ppm	98	6 dat
			0,8 ppm	98	6 dat

Beispiel-Nr. I-1-29 Erfindungsgemäß		MYZUPE	100 g ai/ha	90	5 dat
		MYZUPE O	4 ppm	100	5 dat
		MYZUPE S	0,16 ppm	99	6 dat
		MYZUPE D	0,16 ppm	98	10 dat
		APHIGO S	4 ppm	100	6 dat
			0,8 ppm	98	6 dat
Beispiel-Nr. I-1-30 Erfindungsgemäß		MYZUPE	100 g ai/ha	90	5 dat
			20 g ai/ha	90	5 dat
		MYZUPE O	4 ppm	100	5 dat
		MYZUPE S	0,16 ppm	98	6 dat
		MYZUPE D	0,16 ppm	98	10 dat
		APHIGO S	4 ppm	100	6 dat
Beispiel-Nr. I-1-34 Erfindungsgemäß		MYZUPE	100 g ai/ha	90	5 dat
			20 g ai/ha	90	5 dat
		MYZUPE O	4 ppm	100	5 dat
		MYZUPE S	0,16 ppm	45	6 dat
		MYZUPE D	0,16 ppm	90	10 dat
		APHIGO S	4 ppm	95	6 dat
Beispiel-Nr. I-1-37 Erfindungsgemäß		MYZUPE O	4 ppm	100	5 dat
Beispiel-Nr. I-1-26 Erfindungsgemäß		MYZUPE	100 g ai/ha	90	5 dat
			20 g ai/ha	90	5 dat
		MYZUPE O	4 ppm	100	5 dat
		MYZUPE S	0,16 ppm	95	6 dat
		MYZUPE D	0,16 ppm	90	10 dat
		APHIGO S	4 ppm	98	6 dat
Beispiel-Nr. I-1-40 Erfindungsgemäß		MYZUPE	100 g ai/ha	90	5 dat
		MYZUPE O	4 ppm	100	5 dat


Beispiel-Nr. I-1-41		MYZUPE	100 g ai/ha	90	5 dat
Erfindungsgemäß			20 g ai/ha	70	5 dat
		MYZUPE O	4 ppm	100	5 dat
		APHIGO S	4 ppm	100	6 dat
			0,8 ppm	35	6 dat
Beispiel-Nr. I-1-39		MYZUPE	100 g ai/ha	90	5 dat
Erfindungsgemäß			20 g ai/ha	90	5 dat
		MYZUPE O	4 ppm	100	5 dat
		APHIGO S	4 ppm	95	6 dat
			0,8 ppm	30	6 dat
Beispiel-Nr. I-1-38		MYZUPE O	4 ppm	100	5 dat
Erfindungsgemäß		APHIGO S	4 ppm	100	6 dat
			0,8 ppm	60	6 dat
Beispiel-Nr. I-1-51		MYZUPE	100 g ai/ha	90	5 dat
Erfindungsgemäß			20 g ai/ha	90	5 dat
		MYZUPE O	4 ppm	100	5 dat
		MYZUPE S	0,16 ppm	99	6 dat
		MYZUPE D	0,16 ppm	98	10 dat
		APHIGO S	4 ppm	99	6 dat
			0,8 ppm	99	6 dat
Beispiel-Nr. I-1-53		MYZUPE	100 g ai/ha	100	5 dat
Erfindungsgemäß			20 g ai/ha	100	5 dat
		MYZUPE O	4 ppm	100	5 dat
		MYZUPE S	0,16 ppm	99	6 dat
		MYZUPE D	0,16 ppm	90	10 dat
		APHIGO S	4 ppm	97	6 dat
			0,8 ppm	98	6 dat

Beispiel-Nr. I-1-50 Erfindungsgemäß		MYZUPE MYZUPE O MYZUPE S MYZUPE D APHIGO S	100 g ai/ha 20 g ai/ha 4 ppm 0,16 ppm 0,16 ppm 4 ppm 0,8 ppm	90 70 100 100 98 95 90 5 dat 5 dat 5 dat 6 dat 10 dat 6 dat 6 dat
Beispiel-Nr. I-1-52 Erfindungsgemäß		MYZUPE MYZUPE O MYZUPE S MYZUPE D APHIGO S	100 g ai/ha 20 g ai/ha 4 ppm 0,16 ppm 0,16 ppm 4 ppm	90 70 100 99 95 90 5 dat 5 dat 5 dat 6 dat 10 dat 6 dat
Beispiel-Nr. I-1-54 Erfindungsgemäß		MYZUPE MYZUPE O MYZUPE S MYZUPE D APHIGO S	100 g ai/ha 20 g ai/ha 4 ppm 0,16 ppm 0,16 ppm 4 ppm 0,8 ppm	90 90 100 99 90 95 90 5 dat 5 dat 5 dat 6 dat 10 dat 6 dat 6 dat
Beispiel-Nr. I-1-49 Erfindungsgemäß		MYZUPE MYZUPE O MYZUPE S MYZUPE D APHIGO S	100 g ai/ha 20 g ai/ha 4 ppm 0,16 ppm 0,16 ppm 4 ppm 0,8 ppm	70 70 100 95 95 100 98 5 dat 5 dat 5 dat 6 dat 10 dat 6 dat 6 dat
Beispiel-Nr. I-1-48 Erfindungsgemäß		MYZUPE MYZUPE O MYZUPE S MYZUPE D APHIGO S	100 g ai/ha 20 g ai/ha 4 ppm 0,16 ppm 0,16 ppm 4 ppm	100 100 100 99 90 100 5 dat 5 dat 5 dat 6 dat 10 dat 6 dat

			0,8 ppm	100	6 dat
Beispiel-Nr. I-1-43		MYZUPE	100 g ai/ha	90	4 dat
Erfindungsgemäß			20 g ai/ha	90	4 dat
		MYZUPE O	4 ppm	100	5 dat
		MYZUPE D	0,16 ppm	70	10 dat
		APHIGO S	4 ppm	98	6 dat
		0,8 ppm	30	6 dat	
Beispiel-Nr. I-1-44		MYZUPE	100 g ai/ha	90	4 dat
Erfindungsgemäß			20 g ai/ha	90	4 dat
		MYZUPE O	4 ppm	100	5 dat
		MYZUPE D	0,16 ppm	90	10 dat
		APHIGO S	4 ppm	99	6 dat
		0,8 ppm	55	6 dat	
Beispiel-Nr. I-1-45		MYZUPE	100 g ai/ha	100	4 dat
Erfindungsgemäß		MYZUPE O	4 ppm	100	5 dat
		MYZUPE D	0,16 ppm	80	10 dat
		APHIGO S	4 ppm	100	6 dat
			0,8 ppm	98	6 dat
Beispiel-Nr. I-1-46		MYZUPE	100 g ai/ha	90	6 dat
Erfindungsgemäß			20 g ai/ha	90	6 dat
		MYZUPE O	4 ppm	100	6 dat
Beispiel-Nr. I-1-47		MYZUPE	100 g ai/ha	90	6 dat
Erfindungsgemäß		MYZUPE O	4 ppm	100	6 dat
		MYZUPE S	0,16 ppm	90	6 dat
		MYZUPE D	0,16 ppm	90	10 dat
		APHIGO S	4 ppm	100	6 dat
			0,8 ppm	100	6 dat

Patentansprüche:

1. Verbindungen der Formel (I)



in welcher

- 5 Q für Sauerstoff oder Schwefel steht,
- V für einen Rest aus der Reihe Wasserstoff, Halogen, Alkyl, Halogenalkyl, Alkoxy, Halogenalkoxy und Cyano steht,
- W für einen Rest aus der Reihe Wasserstoff, Halogen, Alkyl, Halogenalkyl, Alkoxy, Halogenalkoxy und Cyano steht,
- 10 Y für einen Rest aus der Reihe Wasserstoff, gegebenenfalls substituiertes Alkyl, Alkenyl und Alkynyl, gegebenenfalls durch Heteroatome unterbrochenes, gegebenenfalls substituiertes Cycloalkyl, gegebenenfalls durch Heteroatome unterbrochenes, gegebenenfalls substituiertes Cycloalkylalkyl, Arylalkyl, Hetarylalkyl und Cyano steht,
- A für einen Rest aus der Reihe Wasserstoff, gegebenenfalls substituiertes Alkyl, Alkenyl und Alkynyl, gegebenenfalls durch Heteroatome unterbrochenes, gegebenenfalls substituiertes Cycloalkyl und Cycloalkyl-alkyl steht,
- 15 T für Sauerstoff oder ein Elektronenpaar steht,
- L¹ für einen Rest aus der Reihe Wasserstoff, Cyano, gegebenenfalls substituiertes Alkyl, Alkenyl und Alkynyl, gegebenenfalls durch Heteroatome unterbrochenes, gegebenenfalls substituiertes Cycloalkyl und Cycloalkenyl, gegebenenfalls durch Heteroatome unterbrochenes, gegebenenfalls substituiertes Cycloalkylalkyl, gegebenenfalls substituiertes Aryl und Hetaryl, gegebenenfalls substituiertes Arylalkyl und Hetarylalkyl steht,
- 20

L^2 für einen Rest aus der Reihe Wasserstoff und gegebenenfalls substituiertes Alkyl steht,
oder

L^1 und L^2 zusammen mit dem Kohlenstoffatom, an das sie gebunden sind, für einen
gegebenenfalls substituierten drei- bis achtgliedrigen aliphatischen Ring stehen, der
5 gegebenenfalls durch Heteroatome unterbrochen sein kann,

oder

L^1 und L^2 zusammen für gegebenenfalls substituiertes Alkenyl stehen,

L^3 für einen Rest aus der Reihe Wasserstoff, $S(O)_nR^{1a}$, OR^{1b} und $N(R^2)(R^3)$ steht, wobei für
den Fall, dass L^1 und/oder L^2 für Wasserstoff oder gegebenenfalls substituiertes Alkyl
steht, L^3 für einen Rest aus der Reihe $S(O)_nR^{1a}$, OR^{1b} und $N(R^2)(R^3)$ steht,
10

R^{1a} für einen Rest aus der Reihe gegebenenfalls substituiertes Alkyl, Alkenyl und Alkynyl,
gegebenenfalls durch Heteroatome unterbrochenes, gegebenenfalls substituiertes
Cycloalkyl und Cycloalkenyl, gegebenenfalls durch Heteroatome unterbrochenes,
gegebenenfalls substituiertes Cycloalkylalkyl und Cycloalkenylalkyl, gegebenenfalls
substituiertes Aryl und Hetaryl, gegebenenfalls substituiertes Arylalkyl und Hetarylalkyl
steht,
15

R^{1b} für einen Rest aus der Reihe Wasserstoff, gegebenenfalls substituiertes Alkyl, Alkenyl
und Alkynyl, gegebenenfalls durch Heteroatome unterbrochenes, gegebenenfalls
substituiertes Cycloalkyl und Cycloalkenyl, gegebenenfalls durch Heteroatome
unterbrochenes, gegebenenfalls substituiertes Cycloalkylalkyl und Cycloalkenylalkyl,
gegebenenfalls substituiertes Aryl und Hetaryl und gegebenenfalls substituiertes
Arylalkyl und Hetarylalkyl steht,
20

R^2 für einen Rest aus der Reihe Wasserstoff, gegebenenfalls substituiertes Alkyl, Alkenyl
und Alkynyl, gegebenenfalls durch Heteroatome unterbrochenes, gegebenenfalls
substituiertes Cycloalkyl und Cycloalkenyl, gegebenenfalls durch Heteroatome
unterbrochenes, gegebenenfalls substituiertes Cycloalkylalkyl und Cycloalkenylalkyl,
gegebenenfalls substituiertes Aryl und Hetaryl und gegebenenfalls substituiertes
Arylalkyl und Hetarylalkyl steht,
25

R^3 für einen Rest aus der Reihe Wasserstoff, gegebenenfalls substituiertes Alkyl, Alkenyl
und Alkynyl oder für die Reste $C(O)N(R^5)(R^6)$, $C(O)R^7$, $C(O)OR^8$ und SO_2R^9 steht,
30

oder

R^2 und R^3 zusammen mit dem Stickstoffatom, an das sie gebunden sind, für einen gegebenenfalls substituierten gesättigten, teilweise gesättigten oder aromatischen Heterocyclus mit 3 bis 9 Ringatomen stehen, der gegebenenfalls durch weitere Heteroatome und/oder durch ein oder zwei CO-Gruppen unterbrochen sein kann,

5 R^5 und R^6 unabhängig voneinander für einen Rest aus der Reihe Wasserstoff, gegebenenfalls substituiertes Alkyl, Alkenyl und Alkynyl, gegebenenfalls durch Heteroatome unterbrochenes, gegebenenfalls substituiertes Cycloalkyl und Cycloalkenyl, gegebenenfalls durch Heteroatome unterbrochenes, gegebenenfalls substituiertes Cycloalkylalkyl, gegebenenfalls substituiertes Aryl und Hetaryl und
10 gegebenenfalls substituiertes Arylalkyl und Hetarylalkyl stehen,

oder

R^5 und R^6 zusammen mit dem Stickstoffatom, an das sie gebunden sind, für einen gegebenenfalls substituierten drei- bis achtgliedrigen aliphatischen Ring stehen, der gegebenenfalls durch Heteroatome unterbrochen sein kann,

15 R^7 für einen Rest aus der Reihe Wasserstoff, gegebenenfalls substituiertes Alkyl, Alkenyl und Alkynyl, gegebenenfalls durch Heteroatome unterbrochenes, gegebenenfalls substituiertes Cycloalkyl und Cycloalkenyl, gegebenenfalls durch Heteroatome unterbrochenes, gegebenenfalls substituiertes Cycloalkylalkyl und Cycloalkenylalkyl, gegebenenfalls substituiertes Aryl und Hetaryl und gegebenenfalls substituiertes
20 Arylalkyl und Hetarylalkyl steht,

R^8 für einen Rest aus der Reihe Wasserstoff, gegebenenfalls substituiertes Alkyl, Alkenyl und Alkynyl, gegebenenfalls durch Heteroatome unterbrochenes, gegebenenfalls substituiertes Cycloalkyl und Cycloalkenyl, gegebenenfalls durch Heteroatome unterbrochenes, gegebenenfalls substituiertes Cycloalkylalkyl und Cycloalkenylalkyl,
25 gegebenenfalls substituiertes Aryl und Hetaryl und gegebenenfalls substituiertes Arylalkyl und Hetarylalkyl steht,

R^9 für einen Rest aus der Reihe gegebenenfalls substituiertes Alkyl, Alkenyl und Alkynyl, gegebenenfalls durch Heteroatome unterbrochenes, gegebenenfalls substituiertes Cycloalkyl und Cycloalkenyl, gegebenenfalls durch Heteroatome unterbrochenes,
30 gegebenenfalls substituiertes Cycloalkylalkyl und Cycloalkenylalkyl, gegebenenfalls substituiertes Aryl und Hetaryl und gegebenenfalls substituiertes Arylalkyl und Hetarylalkyl steht,

n für eine Zahl 0, 1 oder 2 steht,

und deren Salze.

2. Verbindungen nach Anspruch 1, bei denen

Q für Sauerstoff oder Schwefel steht,

V für einen Rest aus der Reihe Wasserstoff, Halogen, C₁-C₄-Alkyl, C₁-C₄-Halogenalkyl, C₁-C₄-Alkoxy, C₁-C₄-Halogenalkoxy und Cyano steht,

W für einen Rest aus der Reihe Wasserstoff, Halogen, C₁-C₄-Alkyl, C₁-C₄-Halogenalkyl, C₁-C₄-Alkoxy, C₁-C₄-Halogenalkoxy und Cyano steht,

Y für einen Rest aus der Reihe Wasserstoff, gegebenenfalls einfach bis mehrfach unabhängig voneinander durch Halogen, C₁-C₄-Alkoxy, C₁-C₄-Alkyl-S(O)_n- und Cyano substituiertes C₁-C₆-Alkyl, C₃-C₆-Alkenyl und C₃-C₆-Alkynyl, gegebenenfalls einfach bis vierfach unabhängig voneinander durch Halogen, C₁-C₄-Alkyl, C₁-C₄-Halogenalkyl, C₁-C₄-Alkoxy und Cyano substituiertes C₃-C₈-Cycloalkyl, gegebenenfalls einfach bis zweifach unabhängig voneinander durch O, S(O)_n und NR⁴ unterbrochenes, gegebenenfalls einfach bis vierfach unabhängig voneinander durch Halogen, C₁-C₄-Alkyl, C₁-C₄-Halogenalkyl, C₁-C₄-Alkoxy und Cyano substituiertes, geradkettiges oder verzweigtes C₃-C₈-Cycloalkyl-C₁-C₄-alkyl und gegebenenfalls einfach bis dreifach unabhängig voneinander durch Halogen, C₁-C₄-Alkyl, C₁-C₄-Halogenalkyl, C₁-C₄-Alkoxy, C₁-C₄-Alkyl-S(O)_n-, C₁-C₄-Halogenalkoxy, C₁-C₄-Halogenalkyl-S(O)_n-, Nitro und Cyano substituiertes Aryl-C₁-C₄-alkyl und Hetaryl-C₁-C₄-alkyl steht,

A für einen Rest aus der Reihe Wasserstoff, gegebenenfalls einfach bis mehrfach unabhängig voneinander durch Halogen, C₁-C₄-Alkoxy, C₁-C₄-Alkyl-S(O)_n- und Cyano substituiertes C₁-C₆-Alkyl, C₃-C₆-Alkenyl und C₃-C₆-Alkynyl, gegebenenfalls einfach bis zweifach unabhängig voneinander durch Halogen, C₁-C₄-Alkyl, C₁-C₄-Halogenalkyl, C₁-C₄-Alkoxy und Cyano substituiertes C₃-C₆-Cycloalkyl, welches gegebenenfalls durch O, S(O)_n, NR⁴ unterbrochen sein kann und gegebenenfalls einfach bis zweifach unabhängig voneinander durch Halogen, C₁-C₄-Alkyl, C₁-C₄-Halogenalkyl, C₁-C₄-Alkoxy und Cyano substituiertes, geradkettiges oder verzweigtes C₃-C₈-Cycloalkyl-C₁-C₄-alkyl, welches gegebenenfalls durch O, S(O)_n oder NR⁴ unterbrochen sein kann, steht,

T für Sauerstoff oder ein Elektronenpaar steht,

L¹ für einen Rest aus der Reihe Wasserstoff, gegebenenfalls unabhängig voneinander einfach bis fünffach durch Halogen und einfach bis zweifach durch C₁-C₄-Alkoxy,

5 C₁-C₄-Alkyl-S(O)_n- und Cyano substituiertes C₁-C₈-Alkyl, C₂-C₈-Alkenyl und C₂-C₈-Alkynyl, gegebenenfalls unabhängig voneinander einfach bis fünffach durch Halogen und einfach bis zweifach durch C₁-C₄-Alkyl, C₁-C₄-Halogenalkyl, C₁-C₄-Alkoxy und Cyano substituiertes C₃-C₈-Cycloalkyl und C₅-C₈-Cycloalkenyl, welche gegebenenfalls einfach bis zweifach unabhängig voneinander durch O, S(O)_n, CO und NR⁴ unterbrochen sein können, gegebenenfalls unabhängig voneinander einfach bis fünffach durch Halogen und einfach bis zweifach durch C₁-C₄-Alkyl, C₁-C₄-Halogenalkyl, C₁-C₄-Alkoxy und Cyano substituiertes, geradkettiges oder verzweigtes C₃-C₈-Cycloalkyl-C₁-C₄-alkyl und C₅-C₈-Cycloalkenyl-C₁-C₄-alkyl, welche gegebenenfalls einfach bis zweifach unabhängig voneinander durch O, S(O)_n, CO und NR⁴ unterbrochen sein können und gegebenenfalls einfach bis dreifach unabhängig voneinander durch Halogen, C₁-C₄-Alkyl, C₁-C₄-Halogenalkyl, C₁-C₄-Alkoxy, C₁-C₄-Alkyl-S(O)_n-, C₁-C₄-Halogenalkoxy, C₁-C₄-Halogenalkyl-S(O)_n-, Nitro und Cyano substituiertes Aryl, Hetaryl, Arylalkyl und Hetarylalkyl steht,

L² für einen Rest aus der Reihe Wasserstoff, gegebenenfalls unabhängig voneinander einfach bis fünffach durch Halogen und einfach bis zweifach durch C₁-C₄-Alkoxy, C₁-C₄-Alkyl-S(O)_n- und Cyano substituiertes C₁-C₄-Alkyl steht,

oder

20 L¹ und L² zusammen mit dem Kohlenstoffatom, an das sie gebunden sind, für gegebenenfalls einfach bis dreifach unabhängig voneinander durch Halogen, C₁-C₄-Alkoxy, C₁-C₄-Alkyl-S(O)_n- und Cyano substituiertes C₃-C₈-Cycloalkyl stehen,

oder

25 L¹ und L² zusammen für gegebenenfalls einfach bis dreifach unabhängig voneinander durch Halogen, C₁-C₄-Alkoxy, C₁-C₄-Alkyl-S(O)_n- und Cyano substituiertes C₂-C₆-Alkenyl stehen,

30 L³ für einen Rest aus der Reihe Wasserstoff, S(O)_nR^{1a}, OR^{1b} und N(R²)(R³) steht, wobei für den Fall, dass L¹ und/oder L² für Wasserstoff oder gegebenenfalls substituiertes Alkyl steht, L³ für einen Rest aus der Reihe S(O)_nR^{1a}, OR^{1b} und N(R²)(R³) steht,

R^{1a} für einen Rest aus der Reihe gegebenenfalls unabhängig voneinander einfach bis fünffach durch Halogen und einfach bis zweifach durch C₁-C₄-Alkoxy, C₁-C₄-Alkyl-S(O)_n-, Cyano, C(O)N(R⁵)(R⁶), C(G)R⁷ und C(O)OR⁸ substituiertes C₁-C₈-

Alkyl, C₃-C₈-Alkenyl und C₃-C₈-Alkynyl, gegebenenfalls einfach bis vierfach unabhängig voneinander durch Halogen, C₁-C₄-Alkyl, C₁-C₄-Halogenalkyl, C₁-C₄-Alkoxy und Cyano substituiertes C₃-C₈-Cycloalkyl und C₅-C₈-Cycloalkenyl, welche gegebenenfalls einfach bis zweifach unabhängig voneinander durch O, S(O)_n, CO und NR⁴ unterbrochen sein können, gegebenenfalls einfach bis vierfach unabhängig voneinander durch Halogen, C₁-C₄-Alkyl, C₁-C₄-Halogenalkyl, C₁-C₄-Alkoxy und Cyano substituiertes, geradkettiges oder verzweigtes C₃-C₈-Cycloalkyl-C₁-C₄-alkyl und C₅-C₈-Cycloalkenyl-C₁-C₄-alkyl, welche gegebenenfalls einfach bis zweifach unabhängig voneinander durch O, S(O)_n, CO und NR⁴ unterbrochen sein können, gegebenenfalls einfach bis dreifach unabhängig voneinander durch Halogen, C₁-C₄-Alkyl, C₁-C₄-Halogenalkyl, C₁-C₄-Alkoxy, C₁-C₄-Alkyl-S(O)_n-, C₁-C₄-Halogenalkoxy, C₁-C₄-Halogenalkyl-S(O)_n-, Nitro und Cyano substituiertes Aryl und Hetaryl und gegebenenfalls einfach bis dreifach unabhängig voneinander durch Halogen, C₁-C₄-Alkyl, C₁-C₄-Halogenalkyl, C₁-C₄-Alkoxy, C₁-C₄-Alkyl-S(O)_n-, C₁-C₄-Halogenalkoxy, C₁-C₄-Halogenalkyl-S(O)_n-, Nitro und Cyano substituiertes, geradkettiges oder verzweigtes Aryl-C₁-C₄-alkyl und Hetaryl-C₁-C₄-alkyl steht,

R^{1b}

für einen Rest aus der Reihe Wasserstoff, gegebenenfalls unabhängig voneinander einfach bis fünffach durch Halogen und einfach bis zweifach durch C₁-C₄-Alkoxy, C₁-C₄-Alkyl-S(O)_n-, Cyano, C(O)N(R⁵)(R⁶), C(G)R⁷ und C(O)OR⁸ substituiertes C₁-C₈-Alkyl, C₃-C₈-Alkenyl und C₃-C₈-Alkynyl, gegebenenfalls einfach bis vierfach unabhängig voneinander durch Halogen, C₁-C₄-Alkyl, C₁-C₄-Halogenalkyl, C₁-C₄-Alkoxy und Cyano substituiertes C₃-C₈-Cycloalkyl und C₅-C₈-Cycloalkenyl, welche gegebenenfalls einfach bis zweifach unabhängig voneinander durch O, S(O)_n, CO und NR⁴ unterbrochen sein können, gegebenenfalls einfach bis vierfach unabhängig voneinander durch Halogen, C₁-C₄-Alkyl, C₁-C₄-Halogenalkyl, C₁-C₄-Alkoxy und Cyano substituiertes, geradkettiges oder verzweigtes C₃-C₈-Cycloalkyl-C₁-C₄-alkyl und C₅-C₈-Cycloalkenyl-C₁-C₄-alkyl, welche gegebenenfalls einfach bis zweifach unabhängig voneinander durch O, S(O)_n, CO und NR⁴ unterbrochen sein können, gegebenenfalls einfach bis dreifach unabhängig voneinander durch Halogen, C₁-C₄-Alkyl, C₁-C₄-Halogenalkyl, C₁-C₄-Alkoxy, C₁-C₄-Alkyl-S(O)_n-, C₁-C₄-Halogenalkoxy, C₁-C₄-Halogenalkyl-S(O)_n-, Nitro und Cyano substituiertes Aryl und Hetaryl und gegebenenfalls einfach bis dreifach unabhängig voneinander durch Halogen, C₁-C₄-Alkyl, C₁-C₄-Halogenalkyl, C₁-C₄-Alkoxy, C₁-C₄-Alkyl-S(O)_n-, C₁-C₄-Halogenalkoxy, C₁-C₄-Halogenalkyl-S(O)_n-, Nitro und Cyano substituiertes, geradkettiges oder verzweigtes Aryl-C₁-C₄-alkyl und Hetaryl-C₁-C₄-alkyl steht,


G für O, N-CN oder N-OR⁸ steht,

R² für einen Rest aus der Reihe Wasserstoff, gegebenenfalls unabhängig voneinander einfach bis fünffach durch Halogen und einfach bis zweifach durch C₁-C₄-Alkoxy, C₁-C₄-Alkyl-S(O)_n- und Cyano substituiertes C₁-C₈-Alkyl, C₃-C₈-Alkenyl und C₃-C₈-Alkinyl, gegebenenfalls einfach bis zweifach unabhängig voneinander durch Halogen, C₁-C₄-Alkyl, C₁-C₄-Halogenalkyl, C₁-C₄-Alkoxy und Cyano substituiertes C₃-C₈-Cycloalkyl und C₅-C₈-Cycloalkenyl, welche gegebenenfalls einfach bis zweifach unabhängig voneinander durch O, S(O)_n, CO und NR⁴ unterbrochen sein können, gegebenenfalls einfach bis zweifach unabhängig voneinander durch Halogen, C₁-C₄-Alkyl, C₁-C₄-Halogenalkyl, C₁-C₄-Alkoxy und Cyano substituiertes, geradkettiges oder verzweigtes C₃-C₈-Cycloalkyl-C₁-C₄-alkyl und C₅-C₈-Cycloalkenyl-C₁-C₄-alkyl, welche gegebenenfalls einfach bis zweifach unabhängig voneinander durch O, S(O)_n, CO und NR⁴ unterbrochen sein können, gegebenenfalls einfach bis dreifach unabhängig voneinander durch Halogen, C₁-C₄-Alkyl, C₁-C₄-Halogenalkyl, C₁-C₄-Alkoxy, C₁-C₄-Alkyl-S(O)_n-, C₁-C₄-Halogenalkoxy, C₁-C₄-Halogenalkyl-S(O)_n-, Nitro und Cyano substituiertes Aryl und Hetaryl und gegebenenfalls einfach bis dreifach unabhängig voneinander durch Halogen, C₁-C₄-Alkyl, C₁-C₄-Halogenalkyl, C₁-C₄-Alkoxy, C₁-C₄-Alkyl-S(O)_n-, C₁-C₄-Halogenalkoxy, C₁-C₄-Halogenalkyl-S(O)_n-, Nitro und Cyano substituiertes, geradkettiges oder verzweigtes Aryl-C₁-C₄-alkyl und Hetaryl-C₁-C₄-alkyl steht,

R³ für einen Rest aus der Reihe Wasserstoff, gegebenenfalls einfach bis dreifach unabhängig voneinander durch Halogen, C₁-C₄-Alkoxy, C₁-C₄-Alkyl-S(O)_n- und Cyano substituiertes C₁-C₈-Alkyl, C₃-C₈-Alkenyl und C₃-C₈-Alkinyl oder für die Reste C(O)N(R⁵)(R⁶), C(O)R⁷, C(O)OR⁸ und SO₂R⁹ steht,

oder

R² und R³ zusammen mit dem Stickstoffatom, an das sie gebunden sind, für einen Heterocyclus der Reihe U-1 bis U-36 stehen,

R⁴

für einen Rest aus der Reihe Wasserstoff, gegebenenfalls einfach bis dreifach unabhängig voneinander durch Halogen, C₁-C₄-Alkoxy und C₁-C₄-Alkyl-S(O)_n-substituiertes C₁-C₈-Alkyl, C₃-C₈-Alkenyl und C₃-C₈-Alkynyl, gegebenenfalls einfach bis zweifach unabhängig voneinander durch Halogen, C₁-C₄-Alkyl, C₁-C₄-

- 5 Halogenalkyl, C₁-C₄-Alkoxy und Cyano substituiertes C₃-C₈-Cycloalkyl und C₃-C₈-Cycloalkyl-C₁-C₄-alkyl, gegebenenfalls einfach bis dreifach unabhängig voneinander durch Halogen, C₁-C₄-Alkyl, C₁-C₄-Halogenalkyl, C₁-C₄-Alkoxy, C₁-C₄-Alkyl-S(O)_n-, C₁-C₄-Halogenalkoxy, C₁-C₄-Halogenalkyl-S(O)_n-, Nitro und Cyano substituiertes Aryl und Hetaryl und gegebenenfalls einfach bis dreifach unabhängig voneinander durch Halogen, C₁-C₄-Alkyl, C₁-C₄-Halogenalkyl, C₁-C₄-Alkoxy, C₁-C₄-Alkyl-S(O)_n-, C₁-C₄-Halogenalkoxy, C₁-C₄-Halogenalkyl-S(O)_n-, Nitro und Cyano substituiertes, geradkettiges oder verzweigtes Aryl-C₁-C₄-alkyl und Hetaryl-C₁-C₄-alkyl steht,
- 10 R⁵ und R⁶ unabhängig voneinander für einen Rest aus der Reihe Wasserstoff, gegebenenfalls unabhängig voneinander einfach bis fünffach durch Halogen und einfach bis zweifach durch C₁-C₄-Alkoxy und C₁-C₄-Alkyl-S(O)_n- substituiertes C₁-C₈-Alkyl, C₃-C₈-Alkenyl und C₃-C₈-Alkynyl, gegebenenfalls einfach bis zweifach unabhängig voneinander durch Halogen, C₁-C₄-Alkyl, C₁-C₄-Halogenalkyl, C₁-C₄-Alkoxy und
- 15 Cyano substituiertes C₃-C₈-Cycloalkyl, C₅-C₈-Cycloalkenyl und C₃-C₈-Cycloalkyl-C₁-C₄-alkyl, gegebenenfalls einfach bis dreifach unabhängig voneinander durch Halogen, C₁-C₄-Alkyl, C₁-C₄-Halogenalkyl, C₁-C₄-Alkoxy, C₁-C₄-Alkyl-S(O)_n-, C₁-C₄-Halogenalkoxy, C₁-C₄-Halogenalkyl-S(O)_n-, Nitro und Cyano substituiertes Aryl und Hetaryl und gegebenenfalls einfach bis dreifach unabhängig voneinander
- 20 durch Halogen, C₁-C₄-Alkyl, C₁-C₄-Halogenalkyl, C₁-C₄-Alkoxy, C₁-C₄-Alkyl-S(O)_n-, C₁-C₄-Halogenalkoxy, C₁-C₄-Halogenalkyl-S(O)_n-, Nitro und Cyano substituiertes, geradkettiges oder verzweigtes Aryl-C₁-C₄-alkyl und Hetaryl-C₁-C₄-alkyl stehen,
- oder
- 25 R⁵ und R⁶ zusammen mit dem Stickstoffatom, an das sie gebunden sind, für einen drei- bis achtegliedrigen aliphatischen Ring stehen, der gegebenenfalls durch C₁-C₂-Alkyl, C₁-C₂-Haloalkyl und C₁-C₂-Alkoxy substituiert und gegebenenfalls durch O oder S(O)_n unterbrochen sein kann,
- 30 R⁷ für einen Rest aus der Reihe Wasserstoff, gegebenenfalls unabhängig voneinander einfach bis fünffach durch Halogen und einfach bis zweifach durch C₁-C₄-Alkoxy, C₁-C₄-Alkyl-S(O)_n- und Cyano substituiertes C₁-C₈-Alkyl, C₃-C₈-Alkenyl und C₃-C₈-Alkynyl, gegebenenfalls einfach bis zweifach unabhängig voneinander durch Halogen, C₁-C₄-Alkyl, C₁-C₄-Halogenalkyl, C₁-C₄-Alkoxy und Cyano substituiertes C₃-C₈-Cycloalkyl und C₅-C₈-Cycloalkenyl, welche gegebenenfalls durch O, S(O)_n, CO oder NR⁴ unterbrochen sein können, gegebenenfalls einfach bis zweifach
- 35

unabhängig voneinander durch Halogen, C₁-C₄-Alkyl, C₁-C₄-Halogenalkyl, C₁-C₄-Alkoxy und Cyano substituiertes, geradkettiges oder verzweigtes C₃-C₈-Cycloalkyl-C₁-C₄-alkyl und C₅-C₈-Cycloalkenyl-C₁-C₄-alkyl, welche gegebenenfalls durch O, S(O)_n, CO oder NR⁴ unterbrochen sein können, gegebenenfalls einfach bis dreifach unabhängig voneinander durch Halogen, C₁-C₄-Alkyl, C₁-C₄-Halogenalkyl, C₁-C₄-Alkoxy, C₁-C₄-Alkyl-S(O)_n⁻, C₁-C₄-Halogenalkoxy, C₁-C₄-Halogenalkyl-S(O)_n⁻, Nitro und Cyano substituiertes Aryl und Hetaryl und gegebenenfalls einfach bis dreifach unabhängig voneinander durch Halogen, C₁-C₄-Alkyl, C₁-C₄-Halogenalkyl, C₁-C₄-Alkoxy, C₁-C₄-Alkyl-S(O)_n⁻, C₁-C₄-Halogenalkoxy, C₁-C₄-Halogenalkyl-S(O)_n⁻, Nitro und Cyano substituiertes, geradkettiges oder verzweigtes Aryl-C₁-C₄-alkyl und Hetaryl-C₁-C₄-alkyl steht,

R⁸ für einen Rest aus der Reihe Wasserstoff, gegebenenfalls unabhängig voneinander einfach bis fünffach durch Halogen und einfach bis zweifach durch C₁-C₄-Alkoxy, C₁-C₄-Alkyl-S(O)_n⁻ und Cyano substituiertes C₁-C₈-Alkyl, C₃-C₈-Alkenyl und C₃-C₈-Alkynyl, gegebenenfalls einfach bis zweifach unabhängig voneinander durch Halogen, C₁-C₄-Alkyl, C₁-C₄-Halogenalkyl, C₁-C₄-Alkoxy und Cyano substituiertes C₃-C₈-Cycloalkyl und C₅-C₈-Cycloalkenyl, welche gegebenenfalls durch O, S(O)_n, CO, NR⁴ unterbrochen sein können, gegebenenfalls einfach bis zweifach unabhängig voneinander durch Halogen, C₁-C₄-Alkyl, C₁-C₄-Halogenalkyl, C₁-C₄-Alkoxy, Cyano substituiertes, geradkettiges oder verzweigtes C₃-C₈-Cycloalkyl-C₁-C₄-alkyl und C₅-C₈-Cycloalkenyl-C₁-C₄-alkyl, welche gegebenenfalls durch O, S(O)_n, CO, NR⁴ unterbrochen sein können, gegebenenfalls einfach bis dreifach unabhängig voneinander durch Halogen, C₁-C₄-Alkyl, C₁-C₄-Halogenalkyl, C₁-C₄-Alkoxy, C₁-C₄-Alkyl-S(O)_n⁻, C₁-C₄-Halogenalkoxy, C₁-C₄-Halogenalkyl-S(O)_n⁻, Nitro und Cyano substituiertes Aryl und Hetaryl und gegebenenfalls einfach bis dreifach unabhängig voneinander durch Halogen, C₁-C₄-Alkyl, C₁-C₄-Halogenalkyl, C₁-C₄-Alkoxy, C₁-C₄-Alkyl-S(O)_n⁻, C₁-C₄-Halogenalkoxy, C₁-C₄-Halogenalkyl-S(O)_n⁻, Nitro und Cyano substituiertes, geradkettiges oder verzweigtes Aryl-C₁-C₄-alkyl und Hetaryl-C₁-C₄-alkyl steht,

R⁹ für einen Rest aus der Reihe gegebenenfalls unabhängig voneinander einfach bis fünffach durch Halogen und einfach bis zweifach durch C₁-C₄-Alkoxy, C₁-C₄-Alkyl-S(O)_n⁻ und Cyano substituiertes C₁-C₈-Alkyl, C₃-C₈-Alkenyl und C₃-C₈-Alkynyl, gegebenenfalls einfach bis zweifach unabhängig voneinander durch Halogen, C₁-C₄-Alkyl, C₁-C₄-Halogenalkyl, C₁-C₄-Alkoxy und Cyano substituiertes C₃-C₈-Cycloalkyl und C₅-C₈-Cycloalkenyl, welche gegebenenfalls durch O, S(O)_n, CO, NR⁴ unterbrochen sein können, gegebenenfalls einfach bis zweifach

5 unabhängig voneinander durch Halogen, C₁-C₄-Alkyl, C₁-C₄-Halogenalkyl, C₁-C₄-Alkoxy und Cyano substituiertes, geradkettiges oder verzweigtes C₃-C₈-Cycloalkyl-C₁-C₄-alkyl und C₅-C₈-Cycloalkenyl-C₁-C₄-alkyl, welche
 10 gegebenenfalls durch O, S(O)_n, CO, NR⁴ unterbrochen sein können und gegebenenfalls einfach bis dreifach unabhängig voneinander durch Halogen, C₁-C₄-Alkyl, C₁-C₄-Halogenalkyl, C₁-C₄-Alkoxy, C₁-C₄-Alkyl-S(O)_n-, C₁-C₄-Halogenalkoxy, C₁-C₄-Halogenalkyl-S(O)_n-, Nitro und Cyano substituiertes Aryl und Hetaryl, gegebenenfalls einfach bis dreifach unabhängig voneinander durch
 15 Halogen, C₁-C₄-Alkyl, C₁-C₄-Halogenalkyl, C₁-C₄-Alkoxy, C₁-C₄-Alkyl-S(O)_n-, C₁-C₄-Halogenalkoxy, C₁-C₄-Halogenalkyl-S(O)_n-, Nitro und Cyano substituiertes, geradkettiges oder verzweigtes Aryl-C₁-C₄-alkyl und Hetaryl-C₁-C₄-alkyl steht,

X^b für einen Rest aus der Reihe Halogen, Nitro, Cyano, C₁-C₄-Alkyl, C₁-C₄-Halogenalkyl, C₁-C₄-Alkoxy, C₁-C₄-Alkyl-S(O)_n-, C₁-C₄-Halogenalkoxy, C₁-C₄-Halogenalkyl-S(O)_n-, C₁-C₄-Alkoxy-C₁-C₄-alkyl, Cyano-C₁-C₄-alkyl,
 15 gegebenenfalls einfach bis vierfach durch Halogen, C₁-C₄-Alkyl, C₁-C₄-Halogenalkyl, C₁-C₄-Alkoxy und C₁-C₄-Alkyl-S(O)_n- substituiertes C₃-C₆-Cycloalkyl und C₃-C₆-Cycloalkyl-C₁-C₄-alkyl, welche gegebenenfalls durch O oder S(O)_n unterbrochen sein können, C₂-C₆-Alkenyl, C₂-C₆-Alkinyl, C₁-C₄-Alkylcarbonyl, C₁-C₄-Halogenalkylcarbonyl, C₁-C₆-Alkoxycarbonyl, C₁-C₆-Alkylaminocarbonyl, Di-(C₁-C₆)-alkylaminocarbonyl, C₁-C₆-Alkylcarbonylamino,
 20 Aryl und Hetaryl steht, wobei die Substituenten Aryl und Hetaryl gegebenenfalls einfach oder mehrfach, gleich oder verschieden durch Halogen, Cyano, Nitro, C₁-C₆-Alkyl, C₂-C₆-Alkenyl, C₂-C₆-Alkinyl, C₁-C₄-Alkoxy, C₁-C₄-Halogenalkyl, C₁-C₆-Halogenalkoxy, C₁-C₄-Alkyl-S(O)_n-, C₁-C₄-Halogenalkyl-S(O)_n-, Nitro und
 25 Cyano substituiert sein können und wobei die Ring N-Atome in U-13, U-14, U-16, U-28 und U-35 nicht durch Halogen, Nitro, Cyano, C₁-C₄-Alkoxy, C₁-C₄-Halogenalkoxy und C₁-C₄-Alkoxy-C₁-C₄-alkyloxy substituiert sind,

m für eine Zahl 0, 1 oder 2 steht, wobei im Falle von m = 2 die Reste X^b gegebenenfalls unabhängig voneinander sein können,

30 n für eine Zahl 0, 1 oder 2 steht,

und deren Salze.

3. Verbindungen nach Anspruch 2, bei denen

Q für Sauerstoff oder Schwefel steht,

- V für einen Rest aus der Reihe Wasserstoff, Fluor, Chlor, Brom, Methyl, Ethyl, Difluormethyl, Trifluormethyl, Methoxy, Ethoxy, Difluormethoxy, Trifluormethoxy und Cyano steht,
- 5 W für einen Rest aus der Reihe Wasserstoff, Fluor, Chlor, Brom, Methyl, Ethyl, Difluormethyl, Trifluormethyl, Methoxy, Ethoxy, Difluormethoxy, Trifluormethoxy und Cyano steht,
- 10 Y für einen Rest aus der Reihe Wasserstoff, gegebenenfalls einfach bis fünffach unabhängig voneinander durch Fluor, Chlor, Brom, Methoxy, Ethoxy, Methyl-S(O)_n-, Ethyl-S(O)_n und Cyano substituiertes C₁-C₄-Alkyl, C₃-C₄-Alkenyl und C₃-C₄-Alkynyl, gegebenenfalls einfach bis zweifach unabhängig voneinander durch Fluor, Chlor, Brom, Methyl, Ethyl, Trifluormethyl, Methoxy, Ethoxy, Cyano substituiertes C₃-C₆-Cycloalkyl und gegebenenfalls einfach bis zweifach unabhängig voneinander durch O, S(O)_n, NR⁴ unterbrochenes, gegebenenfalls einfach bis vierfach unabhängig voneinander durch Fluor, Chlor, Brom, Methyl, Ethyl, Trifluormethyl, Methoxy, Ethoxy, Cyano substituiertes, geradkettiges oder verzweigtes C₃-C₆-Cycloalkyl-C₁-C₂-alkyl und Cyano steht,
- 15
- A für einen Rest aus der Reihe Wasserstoff, gegebenenfalls einfach bis fünffach unabhängig voneinander durch Fluor, Chlor, Brom, Methoxy, Ethoxy, Methyl-S(O)_n-, Ethyl-S(O)_n- und Cyano substituiertes C₁-C₆-Alkyl, C₃-C₆-Alkenyl und C₃-C₆-Alkynyl, gegebenenfalls einfach bis zweifach unabhängig voneinander durch Fluor, Chlor, Brom, Methyl, Ethyl, Trifluormethyl, Methoxy, Ethoxy, Cyano substituiertes C₃-C₆-Cycloalkyl, gegebenenfalls einfach bis zweifach unabhängig voneinander durch Fluor, Chlor, Brom, Methyl, Ethyl, Trifluormethyl, Methoxy, Ethoxy, Cyano substituiertes, geradkettiges oder verzweigtes C₃-C₆-Cycloalkyl-C₁-C₂-alkyl steht,
- 20
- 25
- T für Sauerstoff oder ein Elektronenpaar steht,
- L¹ für einen Rest aus der Reihe Wasserstoff, gegebenenfalls unabhängig voneinander einfach bis fünffach durch Fluor, Chlor und Brom und einfach bis dreifach durch Methoxy, Ethoxy, Methyl-S(O)_n-, Ethyl-S(O)_n- und Cyano substituiertes C₁-C₆-Alkyl, C₂-C₆-Alkenyl und C₂-C₆-Alkynyl, gegebenenfalls einfach bis zweifach unabhängig voneinander durch O, S(O)_n, CO und NR⁴ unterbrochenes, gegebenenfalls einfach bis zweifach unabhängig voneinander durch Fluor, Chlor, Brom, Methyl, Ethyl, Trifluormethyl, Methoxy, Ethoxy und Cyano substituiertes C₃-C₆-Cycloalkyl, gegebenenfalls einfach bis zweifach unabhängig voneinander durch O, S(O)_n, CO und NR⁴ unterbrochenes, gegebenenfalls einfach bis zweifach
- 30
- 35

- 5 unabhängig voneinander durch Fluor, Chlor, Brom, Methyl, Ethyl, Trifluormethyl, Methoxy, Ethoxy und Cyano substituiertes, geradkettiges oder verzweigtes C₃-C₆-Cycloalkyl-C₁-C₂-alkyl, gegebenenfalls einfach bis zweifach unabhängig voneinander durch Fluor, Chlor, Brom, Methyl, Ethyl, Difluormethyl, Trifluormethyl, Methoxy, Ethoxy, Methyl-S(O)_n-, Ethyl-S(O)_n-, Difluormethoxy, Trifluormethoxy, Trifluormethyl-S(O)_n-, Difluorethyl-S(O)_n-, Trifluorethyl-S(O)_n-, Nitro und Cyano substituiertes Phenyl, Naphthyl, Pyridyl, Pyrimidyl, Pyridazinyl, Pyrazinyl, Triazinyl, Furanyl, Thienyl, Oxazolyl, Isoxazolyl, Thiazolyl, Isothiazolyl, Pyrazolyl, Imidazolyl, Oxidazolyl und Thiadiazolyl und
- 10 gegebenenfalls einfach bis zweifach unabhängig voneinander durch Fluor, Chlor, Brom, Methyl, Ethyl, Difluormethyl, Trifluormethyl, Methoxy, Ethoxy, Methyl-S(O)_n-, Ethyl-S(O)_n-, Difluormethoxy, Trifluormethoxy, Trifluormethyl-S(O)_n-, Difluorethyl-S(O)_n-, Trifluorethyl-S(O)_n-, Nitro und Cyano substituiertes, geradkettiges oder verzweigtes Phenyl-C₁-C₂-alkyl, Pyridyl-C₁-C₂-alkyl, Pyrimidyl-C₁-C₂-alkyl, Thiazolyl-C₁-C₂-alkyl und Pyrazolyl-C₁-C₂-alkyl steht,
- 15
- L² für einen Rest aus der Reihe Wasserstoff, gegebenenfalls unabhängig voneinander einfach bis fünffach durch Fluor, Chlor und Brom und einfach bis zweifach durch Methoxy, Ethoxy, Methyl-S(O)_n-, Ethyl-S(O)_n- und Cyano substituiertes C₁-C₄-Alkyl steht,
- 20 oder
- L¹ und L² zusammen mit dem Kohlenstoffatom, an das sie gebunden sind, für gegebenenfalls einfach bis dreifach unabhängig voneinander durch Fluor, Chlor, Brom, Methyl-S(O)_n-, Ethyl-S(O)_n- und Cyano substituiertes C₃-C₈-Cycloalkyl stehen,
- oder
- 25 L¹ und L² zusammen für gegebenenfalls einfach bis dreifach unabhängig voneinander durch Fluor, Chlor, Brom, Methyl-S(O)_n-, Ethyl-S(O)_n- und Cyano substituiertes C₂-C₆-Alkenyl stehen,
- L³ für einen Rest aus der Reihe Wasserstoff, S(O)_nR^{1a}, OR^{1b} und N(R²)(R³) steht, wobei für den Fall, dass L¹ und/oder L² für Wasserstoff oder gegebenenfalls
- 30 substituiertes Alkyl steht, L³ für einen Rest aus der Reihe S(O)_nR^{1a}, OR^{1b} und N(R²)(R³) steht,
- R^{1a} für einen Rest aus der Reihe gegebenenfalls unabhängig voneinander einfach bis fünffach durch Fluor, Chlor und Brom und einfach bis zweifach durch Methoxy,

- 5 Ethoxy, Methyl-S(O)_n-, Ethyl-S(O)_n-, Cyano, C(O)N(R⁵)(R⁶), C(G)R⁷ und C(O)OR⁸ substituiertes C₁-C₆-Alkyl, C₃-C₆-Alkenyl und C₃-C₆-Alkynyl, gegebenenfalls einfach bis zweifach unabhängig voneinander durch O, S(O)_n, CO und NR⁴ unterbrochenes, gegebenenfalls einfach bis zweifach unabhängig
- 10 voneinander durch Fluor, Chlor, Brom, Methyl, Ethyl, Trifluormethyl, Methoxy, Ethoxy und Cyano substituiertes C₃-C₆-Cycloalkyl, gegebenenfalls einfach bis zweifach unabhängig voneinander durch O, S(O)_n, CO und NR⁴ unterbrochenes, gegebenenfalls einfach bis zweifach unabhängig voneinander durch Fluor, Chlor, Brom, Methyl, Ethyl, Trifluormethyl, Methoxy, Ethoxy und Cyano substituiertes, geradkettiges oder verzweigtes C₃-C₆-Cycloalkyl-C₁-C₂-alkyl, gegebenenfalls
- 15 einfach bis zweifach unabhängig voneinander durch Fluor, Chlor, Brom, Methyl, Ethyl, Difluormethyl, Trifluormethyl, Methoxy, Ethoxy, Methyl-S(O)_n-, Ethyl-S(O)_n-, Difluormethoxy, Trifluormethoxy, Trifluormethyl-S(O)_n-, Difluorethyl-S(O)_n-, Trifluorethyl-S(O)_n-, Nitro und Cyano substituiertes Phenyl, Naphthyl, Pyridyl, Pyrimidyl, Pyridazinyl, Pyrazinyl, Triazinyl, Furanyl, Thienyl, Oxazolyl, Isoxazolyl, Thiazolyl, Isothiazolyl, Pyrazolyl, Imidazolyl, Oxdiazolyl und Thiadiazolyl und gegebenenfalls einfach bis zweifach unabhängig voneinander
- 20 durch Fluor, Chlor, Brom, Methyl, Ethyl, Difluormethyl, Trifluormethyl, Methoxy, Ethoxy, Methyl-S(O)_n-, Ethyl-S(O)_n-, Difluormethoxy, Trifluormethoxy, Trifluormethyl-S(O)_n-, Difluorethyl-S(O)_n-, Trifluorethyl-S(O)_n-, Nitro und Cyano substituiertes, geradkettiges oder verzweigtes Phenyl-C₁-C₂-alkyl, Pyridyl-C₁-C₂-alkyl, Pyrimidyl-C₁-C₂-alkyl, Thiazolyl-C₁-C₂-alkyl und Pyrazolyl-C₁-C₂-alkyl steht,
- R^{1b} für einen Rest aus der Reihe Wasserstoff, gegebenenfalls unabhängig voneinander
- 25 einfach bis fünffach durch Fluor, Chlor und Brom und einfach bis zweifach durch Methoxy, Ethoxy, Methyl-S(O)_n-, Ethyl-S(O)_n-, Cyano, C(O)N(R⁵)(R⁶), C(G)R⁷ und C(O)OR⁸ substituiertes C₁-C₆-Alkyl, C₃-C₆-Alkenyl und C₃-C₆-Alkynyl, gegebenenfalls einfach bis zweifach unabhängig voneinander durch O, S(O)_n, CO und NR⁴ unterbrochenes, gegebenenfalls einfach bis zweifach unabhängig
- 30 voneinander durch Fluor, Chlor, Brom, Methyl, Ethyl, Trifluormethyl, Methoxy, Ethoxy und Cyano substituiertes C₃-C₆-Cycloalkyl, gegebenenfalls einfach bis zweifach unabhängig voneinander durch O, S(O)_n, CO und NR⁴ unterbrochenes, gegebenenfalls einfach bis zweifach unabhängig voneinander durch Fluor, Chlor, Brom, Methyl, Ethyl, Trifluormethyl, Methoxy, Ethoxy und Cyano substituiertes, geradkettiges oder verzweigtes C₃-C₆-Cycloalkyl-C₁-C₂-alkyl, gegebenenfalls
- 35 einfach bis zweifach unabhängig voneinander durch Fluor, Chlor, Brom, Methyl, Ethyl, Difluormethyl, Trifluormethyl, Methoxy, Ethoxy, Methyl-S(O)_n-, Ethyl-

- 5 S(O)_n-, Difluormethoxy, Trifluormethoxy, Trifluormethyl-S(O)_n-, Difluorethyl-S(O)_n-, Trifluorethyl-S(O)_n-, Nitro und Cyano substituiertes Phenyl, Naphthyl, Pyridyl, Pyrimidyl, Pyridazinyl, Pyrazinyl, Triazinyl, Furanyl, Thienyl, Oxazolyl, Isoxazolyl, Thiazolyl, Isothiazolyl, Pyrazolyl, Imidazolyl, Oxdiazolyl und Thiadiazolyl und gegebenenfalls einfach bis zweifach unabhängig voneinander durch Fluor, Chlor, Brom, Methyl, Ethyl, Difluormethyl, Trifluormethyl, Methoxy, Ethoxy, Methyl-S(O)_n-, Ethyl-S(O)_n-, Difluormethoxy, Trifluormethoxy, Trifluormethyl-S(O)_n-, Difluorethyl-S(O)_n-, Trifluorethyl-S(O)_n-, Nitro und Cyano substituiertes, geradkettiges oder verzweigtes Phenyl-C₁-C₂-alkyl, Pyridyl-C₁-C₂-alkyl, Pyrimidyl-C₁-C₂-alkyl, Thiazolyl-C₁-C₂-alkyl und Pyrazolyl-C₁-C₂-alkyl steht,
- 10
- G für O oder N-OR⁸ steht,
- R² für einen Rest aus der Reihe Wasserstoff, gegebenenfalls unabhängig voneinander einfach bis fünffach durch Fluor, Chlor und Brom und einfach bis zweifach durch Methoxy, Ethoxy, Methyl-S(O)_n-, Ethyl-S(O)_n- und Cyano substituiertes C₁-C₆-Alkyl, C₃-C₆-Alkenyl und C₃-C₆-Alkynyl, gegebenenfalls einfach bis zweifach unabhängig voneinander durch O, S(O)_n, CO und NR⁴ unterbrochenes, gegebenenfalls einfach bis zweifach unabhängig voneinander durch Fluor, Chlor, Brom, Methyl, Ethyl, Trifluormethyl, Methoxy, Ethoxy und Cyano substituiertes C₃-C₆-Cycloalkyl, gegebenenfalls einfach bis zweifach unabhängig voneinander durch O, S(O)_n, CO und NR⁴ unterbrochenes, gegebenenfalls einfach bis zweifach unabhängig voneinander durch Fluor, Chlor, Brom, Methyl, Ethyl, Trifluormethyl, Methoxy, Ethoxy und Cyano substituiertes, geradkettiges oder verzweigtes C₃-C₆-Cycloalkyl-C₁-C₂-alkyl, gegebenenfalls einfach bis zweifach unabhängig voneinander durch Fluor, Chlor, Brom, Methyl, Ethyl, Difluormethyl, Trifluormethyl, Methoxy, Ethoxy, Methyl-S(O)_n-, Ethyl-S(O)_n-, Difluormethoxy, Trifluormethoxy, Trifluormethyl-S(O)_n-, Difluorethyl-S(O)_n-, Trifluorethyl-S(O)_n-, Nitro und Cyano substituiertes Phenyl, Naphthyl, Pyridyl, Pyrimidyl, Pyridazinyl, Pyrazinyl, Triazinyl, Furanyl, Thienyl, Oxazolyl, Isoxazolyl, Thiazolyl, Isothiazolyl, Pyrazolyl, Imidazolyl, Oxdiazolyl und Thiadiazolyl und gegebenenfalls einfach bis zweifach unabhängig voneinander durch Fluor, Chlor, Brom, Methyl, Ethyl, Difluormethyl, Trifluormethyl, Methoxy, Ethoxy, Methyl-S(O)_n-, Ethyl-S(O)_n-, Difluormethoxy, Trifluormethoxy, Trifluormethyl-S(O)_n-, Difluorethyl-S(O)_n-, Trifluorethyl-S(O)_n-, Nitro und Cyano substituiertes, geradkettiges oder verzweigtes Phenyl-C₁-C₂-alkyl, Pyridyl-C₁-C₂-alkyl, Pyrimidyl-C₁-C₂-alkyl, Thiazolyl-C₁-C₂-alkyl und Pyrazolyl-C₁-C₂-alkyl steht,
- 15
- 20
- 25
- 30
- 35

- R^3 für einen Rest aus der Reihe Wasserstoff, gegebenenfalls einfach bis dreifach unabhängig voneinander durch Fluor, Chlor, Brom, Methoxy, Ethoxy, Methyl-S(O)_n-, Ethyl-S(O)_n- und Cyano substituiertes C₁-C₆-Alkyl, C₃-C₆-Alkenyl und C₃-C₆-Alkynyl oder für die Reste, C(O)N(R⁵)(R⁶), C(O)R⁷, C(O)OR⁸ und SO₂R⁹ steht,
- 5 oder
- R^2 und R^3 zusammen mit N für einen Heterocyclus der Reihe U-1, U-2, U-3, U-4, U-5, U-6, U-7, U-10, U-13, U-14, U-24, U-25, U-26, U-27, U-29, U-30, U-31, U-32, U-33, U-34, U-35 und U-36 stehen,
- R^4 für einen Rest aus der Reihe Wasserstoff, gegebenenfalls einfach bis dreifach unabhängig voneinander durch Fluor, Chlor, Brom, Methoxy, Ethoxy, Methyl-S(O)_n-, Ethyl-S(O)_n- und Cyano substituiertes C₁-C₆-Alkyl, C₃-C₆-Alkenyl und C₃-C₆-Alkynyl, gegebenenfalls einfach bis zweifach unabhängig voneinander durch Fluor, Chlor, Brom, Methyl, Ethyl, Trifluormethyl, Methoxy, Ethoxy und Cyano substituiertes C₃-C₆-Cycloalkyl, gegebenenfalls einfach bis zweifach unabhängig voneinander durch Fluor, Chlor, Brom, Methyl, Ethyl, Trifluormethyl, Methoxy, Ethoxy und Cyano substituiertes, geradkettiges oder verzweigtes C₃-C₆-Cycloalkyl-C₁-C₂-alkyl, gegebenenfalls einfach bis zweifach unabhängig voneinander durch Fluor, Chlor, Brom, Methyl, Ethyl, Difluormethyl, Trifluormethyl, Methoxy, Ethoxy, Methyl-S(O)_n-, Ethyl-S(O)_n-, Difluormethoxy, Trifluormethoxy, Trifluormethyl-S(O)_n-, Difluorethyl-S(O)_n-, Trifluorethyl-S(O)_n-, Nitro und Cyano substituiertes Phenyl, Naphthyl, Pyridyl, Pyrimidyl, Pyridazinyl, Pyrazinyl, Triazinyl, Furanyl, Thienyl, Oxazolyl, Isoxazolyl, Thiazolyl, Isothiazolyl, Pyrazolyl, Imidazolyl, Oxdiazolyl und Thiadiazolyl und gegebenenfalls einfach bis zweifach unabhängig voneinander durch Fluor, Chlor, Brom, Methyl, Ethyl, Difluormethyl, Trifluormethyl, Methoxy, Ethoxy, Methyl-S(O)_n-, Ethyl-S(O)_n-, Difluormethoxy, Trifluormethoxy, Trifluormethyl-S(O)_n-, Difluorethyl-S(O)_n-, Trifluorethyl-S(O)_n-, Nitro und Cyano substituiertes, geradkettiges oder verzweigtes Phenyl-C₁-C₂-alkyl, Pyridyl-C₁-C₂-alkyl, Pyrimidyl-C₁-C₂-alkyl, Thiazolyl-C₁-C₂-alkyl und Pyrazolyl-C₁-C₂-alkyl steht,
- R^5 und R^6 unabhängig voneinander für einen Rest aus der Reihe Wasserstoff, gegebenenfalls unabhängig voneinander einfach bis fünffach durch Fluor, Chlor und Brom und einfach bis zweifach durch Methoxy, Ethoxy, Methyl-S(O)_n-, Ethyl-S(O)_n- und Cyano substituiertes C₁-C₆-Alkyl, C₃-C₆-Alkenyl und C₃-C₆-Alkynyl, gegebenenfalls einfach bis zweifach unabhängig voneinander durch Fluor, Chlor, Brom, Methyl, Ethyl, Trifluormethyl, Methoxy, Ethoxy und Cyano substituiertes

5 C₃-C₆-Cycloalkyl, gegebenenfalls einfach bis zweifach unabhängig voneinander durch Fluor, Chlor, Brom, Methyl, Ethyl, Trifluormethyl, Methoxy, Ethoxy und Cyano substituiertes, geradkettiges oder verzweigtes C₃-C₆-Cycloalkyl-C₁-C₂-alkyl, gegebenenfalls einfach bis zweifach unabhängig voneinander durch Fluor, Chlor, Brom, Methyl, Ethyl, Difluormethyl, Trifluormethyl, Methoxy, Ethoxy, Methyl-S(O)_n-, Ethyl-S(O)_n-, Difluormethoxy, Trifluormethoxy, Trifluormethyl-S(O)_n-, Difluorethyl-S(O)_n-, Trifluorethyl-S(O)_n-, Nitro und Cyano substituiertes Phenyl, Naphthyl, Pyridyl, Pyrimidyl, Pyridazinyl, Pyrazinyl, Triazinyl, Furanyl, Thienyl, Oxazolyl, Isoxazolyl, Thiazolyl, Isothiazolyl, Pyrazolyl, Imidazolyl, Oxdiazolyl und Thiadiazolyl, gegebenenfalls einfach bis zweifach unabhängig voneinander durch Fluor, Chlor, Brom, Methyl, Ethyl, Difluormethyl, Trifluormethyl, Methoxy, Ethoxy, Methyl-S(O)_n-, Ethyl-S(O)_n-, Difluormethoxy, Trifluormethoxy, Trifluormethyl-S(O)_n-, Difluorethyl-S(O)_n-, Trifluorethyl-S(O)_n-, Nitro und Cyano substituiertes, geradkettiges oder verzweigtes Phenyl-C₁-C₂-alkyl, Pyridyl-C₁-C₂-alkyl, Pyrimidyl-C₁-C₂-alkyl, Thiazolyl-C₁-C₂-alkyl und Pyrazolyl-C₁-C₂-alkyl stehen,

oder

20 R⁵ und R⁶ zusammen mit dem Stickstoffatom, an das sie gebunden sind, für einen drei- bis sechsgliedrigen aliphatischen Ring stehen, der gegebenenfalls durch C₁-C₂-Alkyl, C₁-C₂-Haloalkyl und C₁-C₂-Alkoxy substituiert und gegebenenfalls durch O oder S(O)_n unterbrochen sein kann,

25 R⁷ für einen Rest aus der Reihe Wasserstoff, gegebenenfalls unabhängig voneinander einfach bis fünffach durch Fluor, Chlor und Brom und einfach bis zweifach durch Methoxy, Ethoxy, Methyl-S(O)_n-, Ethyl-S(O)_n- und Cyano substituiertes C₁-C₆-Alkyl, C₃-C₆-Alkenyl und C₃-C₆-Alkinyl, gegebenenfalls einfach bis zweifach unabhängig voneinander durch Fluor, Chlor, Brom, Methyl, Ethyl, Trifluormethyl, Methoxy, Ethoxy und Cyano substituiertes C₃-C₆-Cycloalkyl, gegebenenfalls einfach bis zweifach unabhängig voneinander durch Fluor, Chlor, Brom, Methyl, Ethyl, Trifluormethyl, Methoxy, Ethoxy und Cyano substituiertes, geradkettiges oder verzweigtes C₃-C₆-Cycloalkyl-C₁-C₂-alkyl, gegebenenfalls einfach bis zweifach unabhängig voneinander durch Fluor, Chlor, Brom, Methyl, Ethyl, Difluormethyl, Trifluormethyl, Methoxy, Ethoxy, Methyl-S(O)_n-, Ethyl-S(O)_n-, Difluormethoxy, Trifluormethoxy, Trifluormethyl-S(O)_n-, Difluorethyl-S(O)_n-, Trifluorethyl-S(O)_n-, Nitro und Cyano substituiertes Phenyl, Naphthyl, Pyridyl, Pyrimidyl, Pyridazinyl, Pyrazinyl, Triazinyl, Furanyl, Thienyl, Oxazolyl, Isoxazolyl, Thiazolyl, Isothiazolyl, Pyrazolyl, Imidazolyl, Oxdiazolyl und

Thiadiazolyl und gegebenenfalls einfach bis zweifach unabhängig voneinander durch Fluor, Chlor, Brom, Methyl, Ethyl, Difluormethyl, Trifluormethyl, Methoxy, Ethoxy, Methyl-S(O)_n-, Ethyl-S(O)_n-, Difluormethoxy, Trifluormethoxy, Trifluormethyl-S(O)_n-, Difluorethyl-S(O)_n-, Trifluorethyl-S(O)_n-, Nitro und Cyano substituiertes, geradkettiges oder verzweigtes Phenyl-C₁-C₂-alkyl, Pyridyl-C₁-C₂-alkyl, Pyrimidyl-C₁-C₂-alkyl, Thiazolyl-C₁-C₂-alkyl und Pyrazolyl-C₁-C₂-alkyl steht,

R⁸

für einen Rest aus der Reihe Wasserstoff, gegebenenfalls unabhängig voneinander einfach bis fünffach durch Fluor, Chlor und Brom und einfach bis zweifach durch Methoxy, Ethoxy, Methyl-S(O)_n-, Ethyl-S(O)_n- und Cyano substituiertes C₁-C₆-Alkyl, C₃-C₆-Alkenyl und C₃-C₆-Alkynyl, gegebenenfalls einfach bis zweifach unabhängig voneinander durch Fluor, Chlor, Brom, Methyl, Ethyl, Trifluormethyl, Methoxy, Ethoxy und Cyano substituiertes C₃-C₆-Cycloalkyl, gegebenenfalls einfach bis zweifach unabhängig voneinander durch Fluor, Chlor, Brom, Methyl, Ethyl, Trifluormethyl, Methoxy, Ethoxy und Cyano substituiertes, geradkettiges oder verzweigtes C₃-C₆-Cycloalkyl-C₁-C₂-alkyl, gegebenenfalls einfach bis zweifach unabhängig voneinander durch Fluor, Chlor, Brom, Methyl, Ethyl, Difluormethyl, Trifluormethyl, Methoxy, Ethoxy, Methyl-S(O)_n-, Ethyl-S(O)_n-, Difluormethoxy, Trifluormethoxy, Trifluormethyl-S(O)_n-, Difluorethyl-S(O)_n-, Trifluorethyl-S(O)_n-, Nitro und Cyano substituiertes Phenyl, Naphthyl, Pyridyl, Pyrimidyl, Pyridazinyl, Pyrazinyl, Triazinyl, Furanyl, Thienyl, Oxazolyl, Isoxazolyl, Thiazolyl, Isothiazolyl, Pyrazolyl, Imidazolyl, Oxdiazolyl und Thiadiazolyl und gegebenenfalls einfach bis zweifach unabhängig voneinander durch Fluor, Chlor, Brom, Methyl, Ethyl, Difluormethyl, Trifluormethyl, Methoxy, Ethoxy, Methyl-S(O)_n-, Ethyl-S(O)_n-, Difluormethoxy, Trifluormethoxy, Trifluormethyl-S(O)_n-, Difluorethyl-S(O)_n-, Trifluorethyl-S(O)_n-, Nitro und Cyano substituiertes, geradkettiges oder verzweigtes Phenyl-C₁-C₂-alkyl, Pyridyl-C₁-C₂-alkyl, Pyrimidyl-C₁-C₂-alkyl, Thiazolyl-C₁-C₂-alkyl und Pyrazolyl-C₁-C₂-alkyl steht,

X^b

für einen Rest aus der Reihe Halogen, Nitro, Cyano, C₁-C₄-Alkyl, C₃-C₆-Cycloalkyl, C₁-C₂-Halogenalkyl, C₁-C₄-Alkoxy, C₁-C₄-Alkyl-S(O)_n-, C₁-C₄-Halogenalkoxy, C₁-C₄-Halogenalkyl-S(O)_n-, C₃-C₆-Halogenocycloalkyl, C₁-C₄-Alkoxy-C₁-C₄-alkyl, C₁-C₄-Alkoxycarbonyl, C₁-C₄-Alkylaminocarbonyl, C₁-C₆-Alkylsulfonyl, C₁-C₆-Alkylcarbonylamino und Phenyl steht, wobei das Phenyl gegebenenfalls einfach bis dreifach durch Fluor, Chlor, Brom, Methyl, Ethyl, Difluormethyl, Trifluormethyl, Methoxy, Ethoxy, Methyl-S(O)_n-, Ethyl-S(O)_n-, Difluormethoxy, Trifluormethoxy,


Trifluormethyl-S(O)_n-, Difluorethyl-S(O)_n-, Trifluorethyl-S(O)_n-, Nitro und Cyano substituiert sein kann,

m für eine Zahl 0, 1 oder 2 steht, wobei im Falle von m = 2 die Reste X^b gegebenenfalls unabhängig voneinander sein können,

5 n für eine Zahl 0, 1 oder 2 steht,

und deren Salze.

4. Verbindungen nach Anspruch 2 gemäß Formel (I-1)



wobei

10 V für einen Rest aus der Reihe Wasserstoff, Fluor, Chlor, Methyl und Cyano steht,

W für einen Rest aus der Reihe Wasserstoff, Fluor, Chlor, Brom, Methyl, Ethyl und Cyano steht,

15 Y für einen Rest aus der Reihe Wasserstoff, gegebenenfalls einfach bis dreifach unabhängig voneinander durch Fluor, Methoxy, Ethoxy und Cyano substituiertes Methyl, Ethyl, Propyl, Allyl und Propargyl steht,

A für einen Rest aus der Reihe Wasserstoff, gegebenenfalls einfach bis dreifach unabhängig voneinander durch Fluor, Methoxy, Ethoxy und Cyano substituiertes Methyl, Ethyl, Propyl, Allyl, Propargyl, Cyclopropyl und Cylopropylmethyl steht,

T für ein Elektronenpaar oder Sauerstoff steht,

20 L¹ für einen Rest aus der Reihe Wasserstoff, gegebenenfalls einfach bis dreifach unabhängig voneinander durch Fluor, Chlor und Brom und einfach durch Methoxy, Ethoxy, Methylsulfanyl, Ethylsulfanyl, Methylsulfinyl, Ethylsulfinyl,

5 Methylsulfonyl, Ethylsulfonyl oder Cyano substituiertes Methyl, Ethyl, Propyl, Isopropyl, n-Butyl, Isobutyl, sec-Butyl, tert-Butyl, Pentyl, Isopentyl, 2,2-Dimethylpropyl, Hexyl, neo-Hexyl, Vinyl, Allyl, Methallyl, 2-Butenyl, Propargyl, Ethinyl und 2-Butinyl, gegebenenfalls einfach bis zweifach unabhängig voneinander durch

10 Fluor, Chlor, Methyl, Ethyl, Trifluormethyl, Methoxy und Cyano substituiertes Cyclopropyl, Cyclobutyl, Cyclopentyl und Cyclohexyl, gegebenenfalls einfach bis zweifach unabhängig voneinander durch Fluor, Chlor, Methyl, Ethyl, Trifluormethyl, Methoxy und Cyano substituiertes Cyclopropylmethyl, Cyclobutylmethyl, Cyclopentylmethyl und Cyclohexylmethyl, gegebenenfalls

15 einfach bis zweifach unabhängig voneinander durch Fluor, Chlor, Brom, Methyl, Ethyl, Difluormethyl, Trifluormethyl, Methoxy, Ethoxy, Methylsulfanyl, Ethylsulfanyl, Methylsulfinyl, Ethylsulfinyl, Methylsulfonyl, Ethylsulfonyl, Difluormethoxy, Trifluormethoxy, Trifluormethylsulfanyl, Trifluormethylsulfinyl, Trifluormethylsulfonyl, Difluormethylsulfanyl, Difluormethylsulfinyl, Difluormethylsulfonyl, Difluormethylsulfanyl, Trifluorethylsulfanyl, Trifluorethylsulfinyl, Trifluorethylsulfonyl, Nitro und Cyano substituiertes Phenyl, Pyridyl, Pyrimidyl, Thienyl und Thiazolyl, gegebenenfalls einfach bis zweifach unabhängig voneinander durch Fluor, Chlor, Brom, Methyl, Ethyl, Difluormethyl, Trifluormethyl, Methoxy, Ethoxy, Methylsulfanyl, Ethylsulfanyl, Methylsulfinyl, Ethylsulfinyl, Methylsulfonyl, Ethylsulfonyl, Difluormethoxy, Trifluormethoxy, Trifluormethylsulfanyl, Trifluormethylsulfinyl, Trifluormethylsulfonyl, Difluormethylsulfanyl, Difluormethylsulfinyl, Difluormethylsulfonyl, Trifluorethylsulfanyl, Trifluorethylsulfinyl, Trifluorethylsulfonyl, Nitro und Cyano substituiertes Benzyl, Pyridylmethyl, Pyrimidylmethyl, Thiazolylmethyl und

25 Pyrazolyl-methyl steht,

L^2 für einen Rest aus der Reihe Wasserstoff, gegebenenfalls einfach bis dreifach unabhängig voneinander durch Fluor, Methoxy, Ethoxy und Cyano substituiertes Methyl, Ethyl und Propyl steht,

oder

30 L^1 und L^2 zusammen mit dem Kohlenstoffatom, an das sie gebunden sind, für gegebenenfalls einfach bis dreifach unabhängig voneinander durch Fluor, Chlor, Brom, Methyl-S(O)_n-, Ethyl-S(O)_n- und Cyano substituiertes Cyclopropyl, Cyclobutyl, Cyclopentyl oder Cyclohexyl stehen,

oder

- L^1 und L^2 zusammen für gegebenenfalls einfach bis dreifach unabhängig voneinander durch Fluor, Chlor, Brom, Methyl-S(O)_n-, Ethyl-S(O)_n- und Cyano substituiertes Ethenyl, Propenyl oder Butenyl stehen,
- L^3 für einen Rest aus der Reihe Wasserstoff, S(O)_nR^{1a}, OR^{1b} und N(R²)(R³) steht, wobei für den Fall, dass L^1 und/oder L^2 für Wasserstoff oder gegebenenfalls substituiertes Alkyl steht, L^3 für einen Rest aus der Reihe S(O)_nR^{1a}, OR^{1b} und N(R²)(R³) steht,
- R^{1a} für einen Rest aus der Reihe gegebenenfalls einfach bis fünffach unabhängig voneinander durch Fluor, Chlor und Brom, und einfach durch Methoxy, Ethoxy, Methylsulfanyl, Ethylsulfanyl, Methylsulfinyl, Ethylsulfinyl, Methylsulfonyl, Ethylsulfonyl, Cyano, C(O)N(R⁵)(R⁶) oder C(O)OR⁸ substituiertes Methyl, Ethyl, Propyl, Isopropyl, n-Butyl, Isobutyl, sec-Butyl, tert-Butyl, Pentyl, Isopentyl, 2,2-Dimethyl-propyl, Hexyl, neo-Hexyl, Allyl, Methallyl, 2-Butenyl, Propargyl und 2-Butinyl, gegebenenfalls einfach bis zweifach unabhängig voneinander durch Fluor, Chlor, Methyl, Ethyl, Trifluormethyl, Methoxy und Cyano substituiertes Cyclopropyl, Cyclobutyl, Cyclopentyl und Cyclohexyl, gegebenenfalls einfach bis zweifach unabhängig voneinander durch Fluor, Chlor, Methyl, Ethyl, Trifluormethyl, Methoxy und Cyano substituiertes Tetrahydrofuranlyl, Tetrahydropyranlyl, Pyrrolidyl, N-Methylpyrrolidyl, Piperidyl und N-Methylpiperidyl, gegebenenfalls einfach bis zweifach unabhängig voneinander durch Fluor, Chlor, Methyl, Ethyl, Trifluormethyl, Methoxy und Cyano substituiertes Cyclopropylmethyl, Cyclobutylmethyl, Cyclopentylmethyl und Cyclohexylmethyl, gegebenenfalls einfach bis zweifach unabhängig voneinander durch Fluor, Chlor, Brom, Methyl, Ethyl, Difluormethyl, Trifluormethyl, Methoxy, Ethoxy, Methylsulfanyl, Ethylsulfanyl, Methylsulfinyl, Ethylsulfinyl, Methylsulfonyl, Ethylsulfonyl, Difluormethoxy, Trifluormethoxy, Trifluormethylsulfanyl, Trifluormethylsulfinyl, Trifluormethylsulfonyl, Difluormethylsulfanyl, Difluormethylsulfinyl, Difluormethylsulfonyl, Trifluorethylsulfanyl, Trifluorethylsulfinyl, Trifluorethylsulfonyl, Nitro und Cyano substituiertes Phenyl, Pyridyl, Pyrimidyl, Thienyl und Thiazolyl und gegebenenfalls einfach bis zweifach unabhängig voneinander durch Fluor, Chlor, Brom, Methyl, Ethyl, Difluormethyl, Trifluormethyl, Methoxy, Ethoxy, Methylsulfanyl, Ethylsulfanyl, Methylsulfinyl, Ethylsulfinyl, Methylsulfonyl, Ethylsulfonyl, Difluormethoxy, Trifluormethoxy, Trifluormethylsulfanyl, Trifluormethylsulfinyl, Trifluormethylsulfonyl, Difluormethylsulfanyl, Difluormethylsulfinyl, Difluormethylsulfonyl, Trifluorethylsulfanyl,

Trifluorethylsulfanyl Trifluorethylsulfonyl, Nitro und Cyano substituiertes Benzyl, Pyridylmethyl, Pyrimidylmethyl, Thiazolylmethyl und Pyrazolyl-methyl steht,

R^{1b}

für einen Rest aus der Reihe Wasserstoff, gegebenenfalls einfach bis fünffach unabhängig voneinander durch Fluor, Chlor, Brom oder einfach durch Methoxy, Ethoxy, Methylsulfanyl, Ethylsulfanyl, Methylsulfinyl, Ethylsulfinyl, Methylsulfonyl, Ethylsulfonyl, Cyano, C(O)N(R⁵)(R⁶) oder C(O)OR⁸ substituiertes Methyl, Ethyl, Propyl, Isopropyl, n-Butyl, Isobutyl, sec-Butyl, tert-Butyl, Pentyl, Isopentyl, 2,2-Dimethyl-propyl, Hexyl, neo-Hexyl, Allyl, Methallyl, 2-Butenyl, Propargyl und 2-Butinyl, gegebenenfalls einfach bis zweifach unabhängig voneinander durch Fluor, Chlor, Methyl, Ethyl, Trifluormethyl, Methoxy und Cyano substituiertes Cyclopropyl, Cyclobutyl, Cyclopentyl und Cyclohexyl, gegebenenfalls einfach bis zweifach unabhängig voneinander durch Fluor, Chlor, Methyl, Ethyl, Trifluormethyl, Methoxy und Cyano substituiertes Tetrahydrofuranyl, Tetrahydropyranyl, Pyrrolidyl, N-Methylpyrrolidyl, Piperidyl und N-Methylpiperidyl, gegebenenfalls einfach bis zweifach unabhängig voneinander durch Fluor, Chlor, Methyl, Ethyl, Trifluormethyl, Methoxy und Cyano substituiertes Cyclopropylmethyl, Cyclobutylmethyl, Cyclopentylmethyl und Cyclohexylmethyl, gegebenenfalls einfach bis zweifach unabhängig voneinander durch Fluor, Chlor, Brom, Methyl, Ethyl, Difluormethyl, Trifluormethyl, Methoxy, Ethoxy, Methylsulfanyl, Ethylsulfanyl, Methylsulfinyl, Ethylsulfinyl, Methylsulfonyl, Ethylsulfonyl, Difluormethoxy, Trifluormethoxy, Trifluormethylsulfanyl, Trifluormethylsulfinyl, Trifluormethylsulfonyl, Difluormethylsulfanyl, Difluormethylsulfinyl, Difluormethylsulfonyl, Trifluorethylsulfanyl, Trifluorethylsulfinyl Trifluorethylsulfonyl, Nitro und Cyano substituiertes Phenyl, Pyridyl, Pyrimidyl, Thienyl und Thiazolyl und gegebenenfalls einfach bis zweifach unabhängig voneinander durch Fluor, Chlor, Brom, Methyl, Ethyl, Difluormethyl, Trifluormethyl, Methoxy, Ethoxy, Methylsulfanyl, Ethylsulfanyl, Methylsulfinyl, Ethylsulfinyl, Methylsulfonyl, Ethylsulfonyl, Difluormethoxy, Trifluormethoxy, Trifluormethylsulfanyl, Trifluormethylsulfinyl, Trifluormethylsulfonyl, Difluormethylsulfanyl, Difluormethylsulfinyl, Difluormethylsulfonyl, Trifluorethylsulfanyl, Trifluorethylsulfinyl Trifluorethylsulfonyl, Nitro und Cyano substituiertes Benzyl, Pyridylmethyl, Pyrimidylmethyl, Thiazolylmethyl und Pyrazolyl-methyl steht,


R² und R³

zusammen mit N für einen Heterocyclus der Reihe U-1, U-2, U-3, U-4, U-5, U-6, U-7, U-13, U-25, U-26, U-27, U-29, U-30, U-31, U-32, U-33, U-34, U-35 und U-36 stehen,

- 5
 10
 15
 20
 25
 30
 35
- R^5 und R^6 unabhängig voneinander für einen Rest aus der Reihe Wasserstoff, gegebenenfalls einfach bis dreifach unabhängig voneinander durch Fluor, Chlor und Brom oder einfach durch Methoxy, Ethoxy, Methylsulfanyl, Ethylsulfanyl, Methylsulfinyl, Ethylsulfinyl, Methylsulfonyl, Ethylsulfonyl oder Cyano substituiertes Methyl, Ethyl, Propyl, Isopropyl, n-Butyl, Isobutyl, sec-Butyl, tert-Butyl, Pentyl, Isopentyl, 2,2-Dimethyl-propyl, Hexyl, neo-Hexyl, Allyl, Methallyl, 2-Butenyl, Propargyl und 2-Butinyl, gegebenenfalls einfach bis zweifach unabhängig voneinander durch Fluor, Chlor, Methyl, Ethyl, Trifluormethyl, Methoxy und Cyano substituiertes Cyclopropyl, Cyclobutyl, Cyclopentyl und Cyclohexyl, gegebenenfalls einfach bis zweifach unabhängig voneinander durch Fluor, Chlor, Methyl, Ethyl, Trifluormethyl, Methoxy und Cyano substituiertes Cyclopropylmethyl, Cyclobutylmethyl, Cyclopentylmethyl und Cyclohexylmethyl, gegebenenfalls einfach bis zweifach unabhängig voneinander durch Fluor, Chlor, Brom, Methyl, Ethyl, Difluormethyl, Trifluormethyl, Methoxy, Ethoxy, Methylsulfanyl, Ethylsulfanyl, Methylsulfinyl, Ethylsulfinyl, Methylsulfonyl, Ethylsulfonyl, Difluormethoxy, Trifluormethoxy, Trifluormethylsulfanyl, Trifluormethylsulfinyl, Trifluormethylsulfonyl, Difluormethylsulfanyl, Difluormethylsulfinyl, Difluormethylsulfonyl, Trifluorethylsulfanyl, Trifluorethylsulfinyl, Trifluorethylsulfonyl, Nitro und Cyano substituiertes Phenyl, Pyridyl, Pyrimidyl, Thienyl und Thiazolyl und gegebenenfalls einfach bis zweifach unabhängig voneinander durch Fluor, Chlor, Brom, Methyl, Ethyl, Difluormethyl, Trifluormethyl, Methoxy, Ethoxy, Methylsulfanyl, Ethylsulfanyl, Methylsulfinyl, Ethylsulfinyl, Methylsulfonyl, Ethylsulfonyl, Difluormethoxy, Trifluormethoxy, Trifluormethylsulfanyl, Trifluormethylsulfinyl, Trifluormethylsulfonyl, Difluormethylsulfanyl, Difluormethylsulfinyl, Difluormethylsulfonyl, Trifluorethylsulfanyl, Trifluorethylsulfinyl, Trifluorethylsulfonyl, Nitro und Cyano substituiertes Benzyl, Pyridylmethyl, Pyrimidylmethyl, Thiazolylmethyl und Pyrazolyl-methyl stehen,
- R^8 für einen Rest aus der Reihe Wasserstoff, gegebenenfalls einfach bis dreifach unabhängig voneinander durch Fluor, Chlor und Brom oder einfach durch Methoxy, Ethoxy, Methylsulfanyl, Ethylsulfanyl, Methylsulfinyl, Ethylsulfinyl, Methylsulfonyl, Ethylsulfonyl oder Cyano substituiertes Methyl, Ethyl, Propyl, Isopropyl, n-Butyl, Isobutyl, sec-Butyl, tert-Butyl, Pentyl, Isopentyl, 2,2-Dimethyl-propyl, Hexyl, neo-Hexyl, Allyl, Methallyl, 2-Butenyl, Propargyl und 2-Butinyl, gegebenenfalls einfach bis zweifach unabhängig voneinander durch Fluor, Chlor, Methyl, Ethyl, Trifluormethyl, Methoxy und Cyano substituiertes Cyclopropyl, Cyclobutyl, Cyclopentyl und Cyclohexyl, gegebenenfalls einfach bis zweifach

- 5 unabhängig voneinander durch Fluor, Chlor, Methyl, Ethyl, Trifluormethyl, Methoxy und Cyano substituiertes Cyclopropylmethyl, Cyclobutylmethyl, Cyclopentylmethyl und Cyclohexylmethyl, gegebenenfalls einfach bis zweifach unabhängig voneinander durch Fluor, Chlor, Brom, Methyl, Ethyl, Difluormethyl, Trifluormethyl, Methoxy, Ethoxy, Methylsulfanyl, Ethylsulfanyl, Methylsulfinyl, Ethylsulfinyl, Methylsulfonyl, Ethylsulfonyl, Difluormethoxy, Trifluormethoxy, Trifluormethylsulfanyl, Trifluormethylsulfinyl, Trifluormethylsulfonyl, Difluormethylsulfanyl, Difluormethylsulfinyl, Difluormethylsulfonyl, Trifluorethylsulfanyl, Trifluorethylsulfinyl, Trifluorethylsulfonyl, Nitro und Cyano
- 10 substituiertes Phenyl, Pyridyl, Pyrimidyl, Thienyl und Thiazolyl und gegebenenfalls einfach bis zweifach unabhängig voneinander durch Fluor, Chlor, Brom, Methyl, Ethyl, Difluormethyl, Trifluormethyl, Methoxy, Ethoxy, Methylsulfanyl, Ethylsulfanyl, Methylsulfinyl, Ethylsulfinyl, Methylsulfonyl, Ethylsulfonyl, Difluormethoxy, Trifluormethoxy, Trifluormethylsulfanyl, Trifluormethylsulfinyl, Trifluormethylsulfonyl, Difluormethylsulfanyl, Difluormethylsulfinyl, Difluormethylsulfonyl, Trifluorethylsulfanyl, Trifluorethylsulfinyl, Trifluorethylsulfonyl, Nitro und Cyano substituiertes Benzyl, Pyridylmethyl, Pyrimidylmethyl, Thiazolylmethyl und Pyrazolyl-methyl steht,
- 15
- X^b für einen Rest aus der Reihe Fluor, Chlor, Brom, Cyano, Methyl, Ethyl, n-Propyl, Isopropyl, Cyclopropyl, Trifluormethyl, Difluormethyl, Trifluorethyl, Methoxy, Ethoxy, n-Propoxy, Isopropoxy, Trifluormethoxy, Methoxymethyl, Ethoxymethyl, Methoxyethyl, Ethoxyethyl, Methyl-S(O)_n-, Ethyl-S(O)_n- und Phenyl steht, wobei das Phenyl gegebenenfalls einfach bis dreifach durch Fluor, Chlor, Brom, Methyl, Ethyl, Difluormethyl, Trifluormethyl, Methoxy, Ethoxy, Nitro und Cyano
- 20 substituiert sein kann,
- 25
- m für eine Zahl 0, 1 oder 2 steht, wobei im Falle von $m = 2$ die Reste X^b gegebenenfalls unabhängig voneinander sein können,
- n für eine Zahl 0, 1 oder 2 steht,
- und deren Salze.

30 5. Verbindungen nach Anspruch 2 gemäß Formel (I-1)



wobei

V für Wasserstoff steht,

W für Wasserstoff steht,

5 Y für Methyl steht,

A für Methyl, Ethyl oder Cyclopropyl steht,

T für ein Elektronenpaar oder Sauerstoff steht,

10 L¹ für einen Rest aus der Reihe Wasserstoff, Methyl, Trifluormethyl, Trichlormethyl, Isopropyl, Isobutyl, Isopentyl, Phenyl, 2-Chlorphenyl, 3-Chlorphenyl, 4-Chlorphenyl, 3,4-Dichlorphenyl, 2-Pyridinyl, 3-Pyridinyl, 4-Pyridinyl, 4-Chlorpyridin-3-yl, 2-Pyrimidyl und Benzyl steht,

L² für Wasserstoff oder Methyl steht,

oder

15 L¹ und L² zusammen für Vinyl, Prop-1-en-2-yl, (1E)-Prop-1-en-1-yl, (1Z)-Prop-1-en-1-yl oder Cyclopropyl stehen,

L³ für einen Rest aus der Reihe Wasserstoff, S(O)_nR^{1a}, OR^{1b} und N(R²)(R³) steht, wobei für den Fall, dass L¹ und/oder L² für Wasserstoff oder gegebenenfalls substituiertes Alkyl steht, L³ für einen Rest aus der Reihe S(O)_nR^{1a}, OR^{1b} und N(R²)(R³) steht,

20 R^{1a} für einen Rest aus der Reihe Methyl, Ethyl, Isopropyl, Isobutyl, tert-Butyl, Cyclopropylmethyl, 2,2-Dimethylpropyl, 2-Methoxy-2-oxoethyl, Phenyl, 2-Chlorphenyl, 3-Chlorphenyl, 4-Chlorphenyl und 2-Pyrimidyl steht,

R^{1b} für einen Rest aus der Reihe Wasserstoff, Methyl, Ethyl, 2,2,2-Trifluorethyl, Isopropyl, Cyclopropylmethyl, Benzyl, 3-Chlorphenyl und 4-Chlorphenyl steht,

R^2 und R^3 zusammen mit N für einen Heterocyclus der Reihe U-2, U-4, U-5 und U-13 stehen,

X^b für Trifluormethyl, Methyl oder Cyclopropyl steht,

5 m für eine Zahl 0 oder 1 steht,

n für eine Zahl 0 oder 2 steht,

und deren Salze.

6. Verbindungen nach einem der Ansprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass

L^3 für einen Rest aus der Reihe $S(O)_nR^{1a}$, OR^{1b} und $N(R^2)(R^3)$ steht.

10


7. Verbindungen nach einem der Ansprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass



L^3 für einen Rest aus der Reihe $S(O)_nR^{1a}$ und $N(R^2)(R^3)$ steht.

8. Verbindungen nach einem der Ansprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass

15 L^3 für einen Rest $S(O)_nR^{1a}$ steht.

9. Verbindungen nach einem der Ansprüche 1 bis 5 gemäß einer der Formeln (I-1a), (I-1c) oder (I-1d), bevorzugt gemäß (I-1c) steht






10. Mittel, mit einem Gehalt von mindestens einer Verbindung gemäß einem der Ansprüche 1 bis 9
5 und üblichen Streckmitteln und/oder oberflächenaktiven Substanzen insbesondere zur Bekämpfung von tierischen Schädlingen.
11. Verfahren zur Bekämpfung von tierischen Schädlingen, bei dem man wenigstens eine Verbindung gemäß einem der Ansprüche 1 bis 9 oder ein Mittel gemäß Anspruch 10 auf die tierischen Schädlinge und/oder ihren Lebensraum einwirken lässt.
12. Verwendung wenigstens einer Verbindung gemäß einem der Ansprüche 1 bis 9 oder eines
10 Mittels gemäß Anspruch 10 zur Bekämpfung von tierischen Schädlingen.
13. Verfahren gemäß Anspruch 11 oder Verwendung gemäß Anspruch 12, bei dem die chirurgische, therapeutische und diagnostische Behandlung des menschlichen oder tierischen Körpers ausgeschlossen ist.
14. Verwendung wenigstens einer Verbindung gemäß einem der Ansprüche 1 bis 9 zum Schutz des
15 Vermehrungsmaterials von Pflanzen.
15. Agrochemische Formulierung enthaltend wenigstens eine Verbindung gemäß einem der Ansprüche 1 bis 9 in biologisch wirksamen Gehalten von zwischen 0,00000001 und 98 Gew.-%,

bezogen auf das Gewicht der agrochemischen Formulierung, sowie Streckmittel und/oder oberflächenaktive Stoffe.

16. Agrochemische Formulierung gemäß Anspruch 15, zusätzlich enthaltend einen weiteren agrochemischen Wirkstoff.
17. Zwischenprodukte der Formeln (II) und (III)



wobei die Reste die Bedeutungen der Ansprüche 2 bis 5 und bevorzugt die Bedeutung gemäß Anspruch 5 haben.

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No
PCT/EP2017/059228

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER INV. C07D401/12 C07D401/14 A01N43/50 A01N43/54 A01N43/56 A01N43/647 A01P7/04 ADD. According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC											
B. FIELDS SEARCHED Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols) C07D Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practicable, search terms used) EPO-Internal, CHEM ABS Data, WPI Data											
C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;">Category*</th> <th style="width: 70%;">Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages</th> <th style="width: 20%;">Relevant to claim No.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center; vertical-align: top;">X</td> <td style="vertical-align: top;"> WO 2011/009804 A2 (BASF SE [DE]; VEZOUET RONAN LE [DE]; SOERGEL SEBASTIAN [DE]; DEFIEBER) 27 January 2011 (2011-01-27) cited in the application the whole document; in particular, claim 1 ----- </td> <td style="text-align: center; vertical-align: top;">1-17</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; vertical-align: top;">X</td> <td style="vertical-align: top;"> EP 2 236 505 A1 (BAYER CROPSCIENCE AG [DE]) 6 October 2010 (2010-10-06) cited in the application the whole document ----- </td> <td style="text-align: center; vertical-align: top;">1-17</td> </tr> </tbody> </table>			Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.	X	WO 2011/009804 A2 (BASF SE [DE]; VEZOUET RONAN LE [DE]; SOERGEL SEBASTIAN [DE]; DEFIEBER) 27 January 2011 (2011-01-27) cited in the application the whole document; in particular, claim 1 -----	1-17	X	EP 2 236 505 A1 (BAYER CROPSCIENCE AG [DE]) 6 October 2010 (2010-10-06) cited in the application the whole document -----	1-17
Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.									
X	WO 2011/009804 A2 (BASF SE [DE]; VEZOUET RONAN LE [DE]; SOERGEL SEBASTIAN [DE]; DEFIEBER) 27 January 2011 (2011-01-27) cited in the application the whole document; in particular, claim 1 -----	1-17									
X	EP 2 236 505 A1 (BAYER CROPSCIENCE AG [DE]) 6 October 2010 (2010-10-06) cited in the application the whole document -----	1-17									
☐ Further documents are listed in the continuation of Box C. ☒ See patent family annex.											
* Special categories of cited documents : "A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance "E" earlier application or patent but published on or after the international filing date "L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified) "O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means "P" document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed "T" later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention "X" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone "Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art "&" document member of the same patent family											
Date of the actual completion of the international search 19 May 2017		Date of mailing of the international search report 07/06/2017									
Name and mailing address of the ISA/ European Patent Office, P.B. 5818 Patentlaan 2 NL - 2280 HV Rijswijk Tel. (+31-70) 340-2040, Fax: (+31-70) 340-3016		Authorized officer Fink, Dieter									

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Information on patent family members

International application No

PCT/EP2017/059228

Patent document cited in search report	Publication date	Patent family member(s)	Publication date	
WO 2011009804	A2	27-01-2011	BR 112012001597 A2	01-09-2015
			CN 102469785 A	23-05-2012
			EP 2456308 A2	30-05-2012
			JP 2013500246 A	07-01-2013
			US 2012122681 A1	17-05-2012
			WO 2011009804 A2	27-01-2011

EP 2236505	A1	06-10-2010	EP 2236505 A1	06-10-2010
			US 2010305124 A1	02-12-2010
			WO 2010112177 A1	07-10-2010

A. KLASSIFIZIERUNG DES ANMELDUNGSGEGENSTANDES		
INV.	C07D401/12	C07D401/14
	A01N43/647	A01P7/04
	A01N43/50	A01N43/54
		A01N43/56
ADD.		
Nach der Internationalen Patentklassifikation (IPC) oder nach der nationalen Klassifikation und der IPC		
B. RECHERCHIERTE GEBIETE		
Recherchierter Mindestprüfstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbole)		
C07D		
Recherchierte, aber nicht zum Mindestprüfstoff gehörende Veröffentlichungen, soweit diese unter die recherchierten Gebiete fallen		
Während der internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (Name der Datenbank und evtl. verwendete Suchbegriffe)		
EPO-Internal, CHEM ABS Data, WPI Data		
C. ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN		
Kategorie*	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
X	WO 2011/009804 A2 (BASF SE [DE]; VEZOUET RONAN LE [DE]; SOERGEL SEBASTIAN [DE]; DEFIEBER) 27. Januar 2011 (2011-01-27) in der Anmeldung erwähnt the whole document; in particular, claim 1 -----	1-17
X	EP 2 236 505 A1 (BAYER CROPSCIENCE AG [DE]) 6. Oktober 2010 (2010-10-06) in der Anmeldung erwähnt das ganze Dokument -----	1-17
☐ Weitere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu entnehmen ☒ Siehe Anhang Patentfamilie		
* Besondere Kategorien von angegebenen Veröffentlichungen : "A" Veröffentlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert, aber nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist "E" frühere Anmeldung oder Patent, die bzw. das jedoch erst am oder nach dem internationalen Anmeldedatum veröffentlicht worden ist "L" Veröffentlichung, die geeignet ist, einen Prioritätsanspruch zweifelhaft erscheinen zu lassen, oder durch die das Veröffentlichungsdatum einer anderen im Recherchenbericht genannten Veröffentlichung belegt werden soll oder die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie ausgeführt) "O" Veröffentlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung, eine Benutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht "P" Veröffentlichung, die vor dem internationalen Anmeldedatum, aber nach dem beanspruchten Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist "T" Spätere Veröffentlichung, die nach dem internationalen Anmeldedatum oder dem Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist und mit der Anmeldung nicht kollidiert, sondern nur zum Verständnis des der Erfindung zugrundeliegenden Prinzips oder der ihr zugrundeliegenden Theorie angegeben ist "X" Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann allein aufgrund dieser Veröffentlichung nicht als neu oder auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden "Y" Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann nicht als auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden, wenn die Veröffentlichung mit einer oder mehreren Veröffentlichungen dieser Kategorie in Verbindung gebracht wird und diese Verbindung für einen Fachmann naheliegend ist "&" Veröffentlichung, die Mitglied derselben Patentfamilie ist		
Datum des Abschlusses der internationalen Recherche		Absendedatum des internationalen Recherchenberichts
19. Mai 2017		07/06/2017
Name und Postanschrift der Internationalen Recherchenbehörde Europäisches Patentamt, P.B. 5818 Patentlaan 2 NL - 2280 HV Rijswijk Tel. (+31-70) 340-2040, Fax: (+31-70) 340-3016		Bevollmächtigter Bediensteter Fink, Dieter

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Angaben zu Veröffentlichungen, die zur selben Patentfamilie gehören

Internationales Aktenzeichen

PCT/EP2017/059228

Im Recherchenbericht angeführtes Patentdokument	Datum der Veröffentlichung	Mitglied(er) der Patentfamilie	Datum der Veröffentlichung
WO 2011009804 A2	27-01-2011	BR 112012001597 A2	01-09-2015
		CN 102469785 A	23-05-2012
		EP 2456308 A2	30-05-2012
		JP 2013500246 A	07-01-2013
		US 2012122681 A1	17-05-2012
		WO 2011009804 A2	27-01-2011

EP 2236505 A1	06-10-2010	EP 2236505 A1	06-10-2010
		US 2010305124 A1	02-12-2010
		WO 2010112177 A1	07-10-2010
