(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)发明专利

(10)授权公告号 CN 103656038 B
(45)授权公告日 2016.02.10

(21)申请号 201310583821.8

(22)申请日 2013.11.20

(73)专利权人 界首市中医院
地址 236500 安徽省阜阳市界首市中洲路23号

(72)发明人 孙海燕

(74)专利代理机构 安徽合肥华信知识产权代理有限公司 34112
代理人 余成俊

(51)Int.Cl.
A61K 36/8905(2006.01)
A61P 15/00(2006.01)
A61P 7/06(2006.01)

(56)对比文件
王庆敏．痛经方剂配伍规律研究．《中国优秀硕士学位论文全文数据库 医药卫生科技辑》．2012，第E057-318页．

审查员 曹寅秋

权利要求书1页 说明书2页

(54)发明名称

一种治疗痛经的中药组合物

(57)摘要

本发明公开了一种治疗痛经的中药组合物，由下列重量份的原料药制成：当归11-13、川芎9-11、益母草9-11、延胡索14-16、制香附14-16、肉桂5-7、二歧根莲花根14-16、乌药9-11、制没药14-16、赤芍9-11、丰花草9-11。用水煎煮成汤剂，内服。本中药组合物具有治疗周期短，治疗效果显著的特点。

CN 103656038 B

1.一种治疗痛经的中药组合物，其特征在于，由下列重量份的原料药制成：

当归 11-13、川芎 9-11、益母草 9-11、延胡索 14-16、制香附 14-16、肉桂 5-7、二歧根莲花根 14-16、乌药 9-11、制没药 14-16、赤芍 9-11、丰花草 9-11。

2.根据权利要求 1 所述的治疗痛经的中药组合物，其特征在于，由下列重量份的原料药制成：

当归 12、川芎 10、益母草 10、延胡索 15、制香附 15、肉桂 6、二歧根莲花根 15、乌药 10、制没药 15、赤芍 10、丰花草 10。

一种治疗痛经的中药组合物

技术领域

[0001] 本发明涉及中药领域，具体涉及一种治疗痛经的中药组合物。

背景技术

[0002] 痛经是指妇女在经期及其前后，出现小腹或腰部疼痛，甚至痛及腰骶。每随月经周期而发，严重者可伴恶心呕吐、冷汗淋漓、手足厥冷，甚至昏厥，给工作及生活带来影响。目前临床常将其分为原发性和继发性两种，原发性痛经多指生殖器官无明显病变者，故又称功能性痛经，多见于青春期、未婚及已婚未育者。此种痛经在正常分娩后疼痛多可缓解或消失。继发性痛经多因生殖器官有器质性病变所致。

发明内容

[0003] 本发明公开了一种治疗痛经的中药组合物，本中药组合物具有治疗周期短，治疗效果显著的特点。

[0004] 本发明采用的技术方案如下：

[0005] 一种治疗痛经的中药组合物，其特征在于，由下列重量份的原料药制成：

[0006] 当归 11-13、川芎 9-11、益母草 9-11、延胡索 14-16、制香附 14-16、肉桂 5-7、二歧根莲花根 14-16、乌药 9-11、制没药 14-16、赤芍 9-11、丰花草 9-11。

[0007] 所述的治疗痛经的中药组合物，其特征在于，由下列重量份的原料药制成：

[0008] 当归 12、川芎 10、益母草 10、延胡索 15、制香附 15、肉桂 6、二歧根莲花根 15、乌药 10、制没药 15、赤芍 10、丰花草 10。

[0009] 制备方法及用量：水煎服，每日 1 剂，日服 2 次。以 1 个月为一个疗程，可服 1 － 2 个疗程。

[0010] 本发明的中药组合物具有补血活血，调经止痛等功效，用本药治疗痛经，无副作用，治疗效果显著。

具体实施方式

[0011] 按重量(g)称取当归 12、川芎 10、益母草 10、延胡索 15、制香附 15、肉桂 6、二歧根莲花根 15、乌药 10、制没药 15、赤芍 10、丰花草 10，用水煎煮，先后煎两次，将两次的药液合并，共 150ml，分两次服用，以 1 个月为一个疗程，可服 1 － 2 个疗程。

[0012] 典型病例

[0013] 王小姐，20 岁，有痛经 3 年病史，服用西药止痛片，只能暂时缓解疼痛，下次月经期又复发，给予本发明的中药组合物，按说明服用，连服 2 周，停药，当月月经期疼痛减轻不少，经期结束后，又服用 2 周药，停药 3 个月经周期未复发。

[0014] 李小姐 25 岁，有痛经 4 年病史，每次经期疼痛难忍，服西药多年，效果不好，后给予本发明的中药组合物，按说明服用，连服 2 周，停药，当月月经期疼痛减轻不少，经期结束后，又服用 2 周药，停药 3 个月经周期未复发痛经。

[0015] 张女士 35 岁 每次经期，疼痛难忍，需要卧床休息，大大影响了正常的生活，西药治疗多年，效果不佳，后给予本发明的中药组合物，按说明服用，连服 3 周，停药，当月月经期疼痛减轻不少，经期结束后，又服用 3 周药，停药 3 个月经周期未复发痛经现象。