

(19)日本国特許庁(JP)

(12)特許公報(B2)

(11)特許番号
特許第7541930号
(P7541930)

(45)発行日 令和6年8月29日(2024.8.29)

(24)登録日 令和6年8月21日(2024.8.21)

(51)国際特許分類		F I		
C 0 7 K	16/30 (2006.01)	C 0 7 K	16/30	
C 1 2 N	15/13 (2006.01)	C 1 2 N	15/13	Z N A
C 1 2 N	15/63 (2006.01)	C 1 2 N	15/63	Z
C 1 2 N	1/15 (2006.01)	C 1 2 N	1/15	
C 1 2 N	1/19 (2006.01)	C 1 2 N	1/19	
請求項の数 47 (全140頁) 最終頁に続く				
(21)出願番号	特願2020-573044(P2020-573044)	(73)特許権者	520145399	
(86)(22)出願日	令和1年6月28日(2019.6.28)		ジーオー セラピューティクス、インコ	
(65)公表番号	特表2021-529524(P2021-529524		ーポレイテッド	
	A)		アメリカ合衆国 マサチューセッツ州 0	
(43)公表日	令和3年11月4日(2021.11.4)		2 1 4 2, ケンブリッジ, ブロードウェ	
(86)国際出願番号	PCT/US2019/039883		イ 1	
(87)国際公開番号	WO2020/006449	(74)代理人	100092783	
(87)国際公開日	令和2年1月2日(2020.1.2)		弁理士 小林 浩	
審査請求日	令和4年6月28日(2022.6.28)	(74)代理人	100103182	
(31)優先権主張番号	62/691,887		弁理士 日野 真美	
(32)優先日	平成30年6月29日(2018.6.29)	(74)代理人	100120134	
(33)優先権主張国・地域又は機関			弁理士 大森 規雄	
	米国(US)	(74)代理人	100181168	
(31)優先権主張番号	62/802,865		弁理士 丸山 智裕	
(32)優先日	平成31年2月8日(2019.2.8)	(74)代理人	100104282	
最終頁に続く		最終頁に続く		

(54)【発明の名称】 抗グリコMUC 1抗体およびその使用

(57)【特許請求の範囲】
【請求項1】

- (a) 配列番号3の相補性決定領域(CDR)－H1、配列番号4のCDR－H2および配列番号5のCDR－H3を含むVHならびに配列番号6のCDR－L1、配列番号7のCDR－L2および配列番号8のCDR－L3(前記CDRはIMGTの定義による)を含むVL;
- (b) 配列番号9のCDR－H1、配列番号10のCDR－H2および配列番号11のCDR－H3を含むVHならびに配列番号12のCDR－L1、配列番号13のCDR－L2および配列番号14のCDR－L3(前記CDRはKabatの定義による)を含むVL;
- (c) 配列番号15のCDR－H1、配列番号16のCDR－H2および配列番号17のCDR－H3を含むVHならびに配列番号18のCDR－L1、配列番号19のCDR－L2および配列番号20のCDR－L3(前記CDRはChothiaの定義による)を含むVL;
- (d) 配列番号25のCDR－H1、配列番号26のCDR－H2および配列番号27のCDR－H3を含むVHならびに配列番号28のCDR－L1、配列番号29のCDR－L2および配列番号30のCDR－L3(前記CDRはIMGTの定義による)を含むVL;
- (e) 配列番号31のCDR－H1、配列番号32のCDR－H2および配列番号33のCDR－H3を含むVHならびに配列番号34のCDR－L1、配列番号35のCDR

－L 2 および配列番号 36 の C D R－L 3（前記 C D R は K a b a t の定義による）を含む V L；または

（f）配列番号 37 の C D R－H 1、配列番号 38 の C D R－H 2 および配列番号 39 の C D R－H 3 を含む V H ならびに配列番号 40 の C D R－L 1、配列番号 41 の C D R－L 2 および配列番号 42 の C D R－L 3（前記 C D R は C h o t h i a の定義による）を含む V L を含む、抗グリコ M U C 1 抗体。

【請求項 2】

前記 V H が、配列番号 3 の相補性決定領域（C D R）－H 1、配列番号 4 の C D R－H 2 および配列番号 5 の C D R－H 3 を含み、かつ V L が、配列番号 6 の C D R－L 1、配列番号 7 の C D R－L 2 および配列番号 8 の C D R－L 3（前記 C D R は I M G T の定義による）を含む、請求項 1 に記載の抗グリコ M U C 1 抗体。

【請求項 3】

前記 V H が、配列番号 9 の C D R－H 1、配列番号 10 の C D R－H 2 および配列番号 11 の C D R－H 3 を含み、かつ V L が、配列番号 12 の C D R－L 1、配列番号 13 の C D R－L 2 および配列番号 14 の C D R－L 3（前記 C D R は K a b a t の定義による）を含む、請求項 1 に記載の抗グリコ M U C 1 抗体。

【請求項 4】

前記 V H が、配列番号 15 の C D R－H 1、配列番号 16 の C D R－H 2 および配列番号 17 の C D R－H 3 を含み、かつ V L が、配列番号 18 の C D R－L 1、配列番号 19 の C D R－L 2 および配列番号 20 の C D R－L 3（前記 C D R は C h o t h i a の定義による）を含む、請求項 1 に記載の抗グリコ M U C 1 抗体。

【請求項 5】

（a）配列番号 1 と少なくとも 95 % の配列同一性を有するアミノ酸配列を含む V H および配列番号 2 と少なくとも 95 % の配列同一性を有するアミノ酸配列を含む V L；
（b）配列番号 1 と少なくとも 97 % の配列同一性を有するアミノ酸配列を含む V H および配列番号 2 と少なくとも 97 % の配列同一性を有するアミノ酸配列を含む V L；
（c）配列番号 1 と少なくとも 99 % の配列同一性を有するアミノ酸配列を含む V H および配列番号 2 と少なくとも 99 % の配列同一性を有するアミノ酸配列を含む V L を有する、請求項 1 に記載の抗グリコ M U C 1 抗体。

【請求項 6】

配列番号 1 のアミノ酸配列を含む V H および配列番号 2 のアミノ酸配列を含む V L を有する、請求項 1 または 5 に記載の抗グリコ M U C 1 抗体。

【請求項 7】

前記 V H が、配列番号 25 の C D R－H 1、配列番号 26 の C D R－H 2 および配列番号 27 の C D R－H 3 を含み、かつ前記 V L が、配列番号 28 の C D R－L 1、配列番号 29 の C D R－L 2 および配列番号 30 の C D R－L 3（前記 C D R は I M G T の定義による）を含む、請求項 1 に記載の抗グリコ M U C 1 抗体。

【請求項 8】

前記 V H が、配列番号 31 の C D R－H 1、配列番号 32 の C D R－H 2 および配列番号 33 の C D R－H 3 を含み、かつ V L が、配列番号 34 の C D R－L 1、配列番号 35 の C D R－L 2 および配列番号 36 の C D R－L 3（前記 C D R は K a b a t の定義による）を含む、請求項 1 に記載の抗グリコ M U C 1 抗体。

【請求項 9】

前記 V H が、配列番号 37 の C D R－H 1、配列番号 38 の C D R－H 2 および配列番号 39 の C D R－H 3 を含み、かつ V L が、配列番号 40 の C D R－L 1、配列番号 41 の C D R－L 2 および配列番号 42 の C D R－L 3（前記 C D R は C h o t h i a の定義による）を含む、請求項 1 に記載の抗グリコ M U C 1 抗体。

【請求項 10】

（a）配列番号 23 と少なくとも 95 % の配列同一性を有するアミノ酸配列を含む V H

および配列番号 24 と少なくとも 95 % の配列同一性を有するアミノ酸配列を含む V L ;

(b) 配列番号 23 と少なくとも 97 % の配列同一性を有するアミノ酸配列を含む V H
および配列番号 24 と少なくとも 97 % の配列同一性を有するアミノ酸配列を含む V L ;
または

(c) 配列番号 23 と少なくとも 99 % の配列同一性を有するアミノ酸配列を含む V H
および配列番号 24 と少なくとも 99 % の配列同一性を有するアミノ酸配列を含む V L
を有する、請求項 1 および 7 から 9 のいずれか一項に記載の抗グリコ M U C 1 抗体。

【請求項 11】

配列番号 23 のアミノ酸配列を含む V H および配列番号 24 のアミノ酸配列を含む V L
を有する、請求項 1 および 7 から 10 のいずれか一項に記載の抗グリコ M U C 1 抗体。

【請求項 12】

E L I S A によって測定した場合、ペプチド T A P P A H G V T S A P D T R P A P G
A T A P P A H G V (配列番号 113) に結合するより高い親和性で、ペプチド R P A P
G S T A P P A H G V T (配列番号 99) に結合する抗グリコ M U C 1 抗体であって、前
記ペプチドにおいて、下線の文字で示されるセリンおよびスレオニン残基は、G a l N A
c でグリコシル化された残基を示す、請求項 1 から 11 のいずれか一項に記載の抗グリコ
M U C 1 抗体。

【請求項 13】

E L I S A によって測定した場合、ペプチド T A P P A H G V T S A P D T R P A P G
S A A P P A H G V (配列番号 114) に結合するより高い親和性で、ペプチド R P A P
G S T A P P A H G V T (配列番号 99) に結合する抗グリコ M U C 1 抗体であって、前
記ペプチドにおいて、下線の文字で示されるセリンおよびスレオニン残基は、G a l N A
c でグリコシル化された残基を示す、請求項 12 に記載の抗グリコ M U C 1 抗体。

【請求項 14】

E L I S A によって測定した場合、ペプチド T A P P A H G V T S A P D T R P A P G
S T G P P A H G V (配列番号 115) に結合するより高い親和性で、ペプチド R P A P
G S T A P P A H G V T (配列番号 99) に結合する抗グリコ M U C 1 抗体であって、前
記ペプチドにおいて、下線の文字で示されるセリンおよびスレオニン残基は、G a l N A
c でグリコシル化された残基を示す、請求項 13 に記載の抗グリコ M U C 1 抗体。

【請求項 15】

E L I S A によって測定した場合、ペプチド T A P P A H G V T S A P D T R P A P G
S T A A P A H G V (配列番号 116) に結合するより高い親和性で、ペプチド R P A P
G S T A P P A H G V T (配列番号 99) に結合する抗グリコ M U C 1 抗体であって、前
記ペプチドにおいて、下線の文字で示されるセリンおよびスレオニン残基は、G a l N A
c でグリコシル化された残基を示す、請求項 14 に記載の抗グリコ M U C 1 抗体。

【請求項 16】

E L I S A によって測定した場合、ペプチド T A P P A H G V T S A P D T R P A P G
S T A P A A H G V (配列番号 117) に結合するより高い親和性で、ペプチド R P A P
G S T A P P A H G V T (配列番号 99) に結合する抗グリコ M U C 1 抗体であって、前
記ペプチドにおいて、下線の文字で示されるセリンおよびスレオニン残基は、G a l N A
c でグリコシル化された残基を示す、請求項 15 に記載の抗グリコ M U C 1 抗体。

【請求項 17】

E L I S A によって測定した場合、ペプチド T A P P A H G V T S A P D T R P A P A
S T A P P A H G V (配列番号 112) に結合するより高い親和性で、ペプチド R P A P
G S T A P P A H G V T (配列番号 99) に結合する抗グリコ M U C 1 抗体であって、前
記ペプチドにおいて、下線の文字で示されるセリンおよびスレオニン残基は、G a l N A
c でグリコシル化された残基を示す、請求項 12 に記載の抗グリコ M U C 1 抗体。

【請求項 18】

E L I S A によって測定した場合、ペプチド T A P P A H G V T S A P D T R P A A G
S T A P P A H G V (配列番号 111) に結合するより高い親和性で、ペプチド R P A P

10

20

30

40

50

G S T A P P A H G V T (配列番号 99) に結合する抗グリコ M U C 1 抗体であって、前記ペプチドにおいて、下線の文字で示されるセリンおよびスレオニン残基は、G a l N A c でグリコシル化された残基を示す、請求項 17 に記載の抗グリコ M U C 1 抗体。

【請求項 19】

E L I S A によって測定した場合、ペプチド T A P P A H G V T S A P D T R P G P G S T A P P A H G V (配列番号 110) に結合するより高い親和性で、ペプチド R P A P G S T A P P A H G V T (配列番号 99) に結合する抗グリコ M U C 1 抗体であって、前記ペプチドにおいて、下線の文字で示されるセリンおよびスレオニン残基は、G a l N A c でグリコシル化された残基を示す、請求項 18 に記載の抗グリコ M U C 1 抗体。

【請求項 20】

E L I S A によって測定した場合、ペプチド T A P P A H G V T S A P D T R A A P G S T A P P A H G V (配列番号 109) に結合するより高い親和性で、ペプチド R P A P G S T A P P A H G V T (配列番号 99) に結合する抗グリコ M U C 1 抗体であって、前記ペプチドにおいて、下線の文字で示されるセリンおよびスレオニン残基は、G a l N A c でグリコシル化された残基を示す、請求項 19 に記載の抗グリコ M U C 1 抗体。

【請求項 21】

E L I S A によって測定した場合、ペプチド T A P P A H G V T S A P D T A P A P G S T A P P A H G V (配列番号 108) に結合するより高い親和性で、ペプチド R P A P G S T A P P A H G V T (配列番号 99) に結合する抗グリコ M U C 1 抗体であって、前記ペプチドにおいて、下線の文字で示されるセリンおよびスレオニン残基は、G a l N A c でグリコシル化された残基を示す、請求項 20 に記載の抗グリコ M U C 1 抗体。

【請求項 22】

正常細胞と比較してがん細胞で過剰発現されるグリコ M U C 1 エピトープに優先的に結合する、請求項 1 から 21 のいずれか一項に記載の抗グリコ M U C 1 抗体。

【請求項 23】

- (a) 表面プラズモン共鳴によって測定した場合、1 n M から 50 n M ;
- (b) 表面プラズモン共鳴によって測定した場合、3 n M から 50 n M ;
- (c) 表面プラズモン共鳴によって測定した場合、3 n M から 40 n M ;
- (d) 表面プラズモン共鳴によって測定した場合、3 n M から 25 n M ;
- (e) 表面プラズモン共鳴によって測定した場合、5 n M から 50 n M ;
- (f) 表面プラズモン共鳴によって測定した場合、5 n M から 25 n M ;
- (g) 表面プラズモン共鳴によって測定した場合、10 n M から 50 n M ;
- (h) 表面プラズモン共鳴によって測定した場合、10 n M から 25 n M ;
- (i) 表面プラズモン共鳴によって測定した場合、15 n M から 50 n M ;
- (j) 表面プラズモン共鳴によって測定した場合、15 n M から 25 n M ;
- (k) 表面プラズモン共鳴によって測定した場合、20 n M から 50 n M ; または
- (l) 表面プラズモン共鳴によって測定した場合、25 n M から 50 n M

の結合親和性 (K_D) で、下線の文字で示されるセリンおよびスレオニン残基において G a l N A c でグリコシル化された前記 M U C 1 ペプチド R P A P G S T A P P A H G V T (配列番号 99) に結合する、請求項 1 から 22 のいずれか一項に記載の抗グリコ M U C 1 抗体。

【請求項 24】

多価である、請求項 1 から 23 のいずれか一項に記載の抗グリコ M U C 1 抗体。

【請求項 25】

請求項 1 から 24 のいずれか一項に記載の抗グリコ M U C 1 抗体の抗原結合フラグメント。

【請求項 26】

単鎖可変フラグメント (s c F v) の形態である、請求項 25 に記載の抗原結合フラグメント。

【請求項 27】

多重特異性を有する、請求項 1 から 24 のいずれか一項に記載の抗グリコ M U C 1 抗体

10

20

30

40

50

または請求項 2 5 または 2 6 に記載の抗原結合フラグメント。

【請求項 2 8】

第 1 のエピトープと異なる第 2 のエピトープに結合する二重特異性を有する、請求項 2 7 に記載の抗グリコ M U C 1 抗体または抗原結合フラグメント。

【請求項 2 9】

C r o s s M a b、F a b－アーム交換抗体、二重特異性 T 細胞エンゲージャー（B i T E）、または二重親和性リターゲティング分子（D A R T）である、請求項 2 8 に記載の抗グリコ M U C 1 抗体または抗原結合フラグメント。

【請求項 3 0】

前記第 2 のエピトープが、M U C 1 エピトープである、請求項 2 8 または 2 9 に記載の抗グリコ M U C 1 抗体または抗原結合フラグメント。

【請求項 3 1】

前記第 2 のエピトープが、正常細胞と比較してがん細胞で過剰発現される M U C 1 エピトープである、請求項 3 0 に記載の抗グリコ M U C 1 抗体または抗原結合フラグメント。

【請求項 3 2】

前記第 2 のエピトープが、T 細胞エピトープである、請求項 2 8 または 2 9 に記載の抗グリコ M U C 1 抗体または抗原結合フラグメント。

【請求項 3 3】

前記 T 細胞エピトープが、C D 3 エピトープ、C D 8 エピトープ、C D 1 6 エピトープ、C D 2 5 エピトープ、C D 2 8 エピトープ、または N K G 2 D エピトープを含む、請求項 3 2 に記載の抗グリコ M U C 1 抗体または抗原結合フラグメント。

【請求項 3 4】

前記 T 細胞エピトープが、C D 3 エピトープを含む、請求項 3 3 に記載の抗グリコ M U C 1 抗体または抗原結合フラグメント。

【請求項 3 5】

少なくとも第 2 のアミノ酸配列に作動可能に連結した、請求項 1 から 3 4 のいずれか一項に記載の抗グリコ M U C 1 抗体または抗原結合フラグメントのアミノ酸配列を含む融合タンパク質。

【請求項 3 6】

請求項 2 6 に記載の s c F v を含むキメラ抗原受容体（C A R）。

【請求項 3 7】

細胞傷害性物質にコンジュゲートした、請求項 1 から 3 4 のいずれか一項に記載の抗グリコ M U C 1 抗体または抗原結合フラグメントを含む抗体－薬物コンジュゲート（A D C）。

【請求項 3 8】

請求項 1 から 3 4 のいずれか一項に記載の抗グリコ M U C 1 抗体または抗原結合フラグメントのコード領域を含む核酸。

【請求項 3 9】

請求項 3 8 に記載の核酸を含むベクター。

【請求項 4 0】

請求項 3 8 に記載の核酸を発現するように操作された宿主細胞。

【請求項 4 1】

請求項 3 9 に記載のベクターを含む宿主細胞。

【請求項 4 2】

（a）請求項 1 から 3 4 のいずれか一項に記載の抗グリコ M U C 1 抗体または抗原結合フラグメント、請求項 3 5 に記載の融合タンパク質、請求項 3 6 に記載の C A R、請求項 3 7 に記載の A D C、請求項 3 8 に記載の核酸、請求項 3 9 に記載のベクターまたは請求項 4 0 もしくは 4 1 に記載の宿主細胞、および

（b）生理学的に好適な緩衝液、アジュバントまたは希釈剤を含む医薬組成物。

10

20

30

40

50

【請求項 4 3】

がんを処置するための医薬組成物であって、

請求項 1 から 3 4 のいずれか一項に記載の抗グリコ M U C 1 抗体または抗原結合フラグメント、請求項 3 5 に記載の融合タンパク質、請求項 3 6 に記載の C A R、請求項 3 7 に記載の A D C、請求項 3 8 に記載の核酸、請求項 3 9 に記載のベクターまたは請求項 4 0 もしくは 4 1 に記載の宿主細胞を含む、医薬組成物。

【請求項 4 4】

前記がんが、乳がん、肺がん、前立腺がん、膵臓がん、食道がん、結腸直腸がん、卵巣がん、子宮がん、子宮頸がん、膀胱がん、脳腫瘍、非ホジキンリンパ腫、子宮頸がん、胃がん、胆管細胞癌、軟骨肉腫、腎臓がん、皮膚がん、白血病、甲状腺がん、または肝臓がんである、請求項 4 3 に記載の医薬組成物。

【請求項 4 5】

生物学的サンプルにおいてがんを検出する方法であって、サンプルを、請求項 1 から 3 4 のいずれか一項に記載の抗グリコ M U C 1 抗体または抗原結合フラグメントと接触させること、および前記抗グリコ M U C 1 抗体または抗原結合フラグメントの結合を検出することを含む方法。

【請求項 4 6】

前記がんが、乳がん、肺がん、前立腺がん、膵臓がん、食道がん、結腸直腸がん、卵巣がん、子宮がん、子宮頸がん、膀胱がん、脳腫瘍、非ホジキンリンパ腫、子宮頸がん、胃がん、胆管細胞癌、軟骨肉腫、腎臓がん、皮膚がん、白血病、甲状腺がん、または肝臓がんである、請求項 4 5 に記載の方法。

【請求項 4 7】

がんを処置するための医薬の製造における、請求項 1 から 3 4 のいずれか一項に記載の抗グリコ M U C 1 抗体または抗原結合フラグメント、請求項 3 5 に記載の融合タンパク質、請求項 3 6 に記載の C A R、請求項 3 7 に記載の A D C、請求項 3 8 に記載の核酸、請求項 3 9 に記載のベクターまたは請求項 4 0 もしくは 4 1 に記載の宿主細胞の使用。

【発明の詳細な説明】

【技術分野】

【0 0 0 1】

1. 関連出願の相互参照

本出願は、2018年6月29日に出願された米国仮出願第62／691,887号、および2019年2月8日に出願された米国仮出願第62／802,865号の優先権の利益を主張し、これらそれぞれの内容は、参照によりそれらの全体が本明細書に取り込まれる。

【0 0 0 2】

2. 配列表

本出願は、A S C I I フォーマットで電子的に提出された配列表を含み、これによりその全体が参照により組み入れられる。前記 A S C I I コピーは、2019年6月26日に作成され、G O T - 0 0 2 W O _ S L と名付けられ、33,365 バイトのサイズである。

【背景技術】

【0 0 0 3】

3. 背景

ヒトムチン M U C 1 は、単層上皮および腺上皮の頂端表面上に発現される多形性の膜貫通糖タンパク質である (Taylor-Papadimitriou et al., 1999, Biochim. Biophys. Acta, 1455:301-313)。M U C 1 は、腺癌で高度に過剰発現され、異常に O - グリコシル化される。ムチンの細胞外ドメインは、5つの可能性のある O - グリコシル化のための部位を有する 20 アミノ酸残基の可変数タンデムリピート (T R) (25 ~ 125) を含有する。O - グリカン は、がん細胞中で不完全にプロセッシングされ、結果として汎癌 (pancarcinoma) 炭水化物抗原 T n (G a l N A c α 1 - O - S e r / T h r) の発現が起こる

10

20

30

40

50

(Springer, 1984, Science 224:1198-1206)。単純なムチン型Ｏ－グリカンである Tn は腺癌（乳房および卵巣がんを含む）で広く発現され、正常な成人組織では限定された分布を示す（Springer, 1984, Science 224:1198-1206）。がんにおけるこれらのＯ－グリカンの発現は、予後不良と相関しており、がん患者ではこれらの炭水化物ハプテンに対する天然抗体が増加する（Miles et al., 1995, Br. J. Cancer. 71:1074-1076 ; Soares et al., 1996, Pathol. Res. Pract. 192:1181-1186 ; Werther et al., 1996, Int. J. Cancer. 69:193-199）。当業界においてがん細胞で過剰発現されるグリコ M U C 1 エピトープを利用する治療法への必要性がある。

【発明の概要】

【 0 0 0 4 】

4. 要約

本開示は、グリコ M U C 1 のがん特異的なエピトープに選択的な抗体および抗原結合フラグメントに基づく治療剤および診断剤を提供することによって、グリコペプチドバリエーションの腫瘍特異性を獲得するものである。

【 0 0 0 5 】

本発明の開示は、M U C 1 のがん特異的なグリコシル化バリエーションに結合する抗グリコ M U C 1 抗体およびその抗原結合フラグメントを提供する。本発明の開示はさらに、抗グリコ M U C 1 抗体および抗原結合フラグメントを含む融合タンパク質および抗体－薬物コンジュゲート、ならびに抗グリコ M U C 1 抗体、抗原結合フラグメントおよび融合タンパク質をコードする核酸を提供する。

【 0 0 0 6 】

本発明の開示はさらに、がん療法のための、抗グリコ M U C 1 抗体、抗原結合フラグメント、融合タンパク質、抗体－薬物コンジュゲートおよび核酸の使用方法を提供する。

【 0 0 0 7 】

特定の態様において、本開示は、M U C 1 のがん特異的なグリコシル化バリエーションと、第 2 のエピトープとに結合する、二重特異性および他の多重特異性を有する抗グリコ M U C 1 抗体および抗原結合フラグメントを提供する。第 2 のエピトープは、M U C 1 それ自体、がん細胞上で M U C 1 と共発現される別のタンパク質、または活性化 T 細胞などの異なる細胞上に存在する別のタンパク質のいずれの上にあるものでもよい。さらに、コドン最適化されたコード領域を含む核酸、および特定の宿主細胞における発現にコドン最適化されていないコード領域を含む核酸などの抗体をコードする核酸も開示される。

【 0 0 0 8 】

抗グリコ M U C 1 抗体および結合フラグメントは、融合パートナーを含有する融合タンパク質の形態であり得る。融合パートナーは、第 2 の機能、例えば、T 細胞シグナル伝達タンパク質のシグナル伝達ドメインのシグナル伝達機能、T 細胞活性化のペプチドモジュレーター、または標識システムの酵素的な要素を提供するのに有用であり得る。例示的な T 細胞シグナル伝達タンパク質としては、4－1 B B、C O 3 C、ならびに融合ペプチド、例えば、C D 2 8－C D 3－ゼータおよび 4－1 B B－C D 3－ゼータが挙げられる。4－1 B B、または C D 1 3 7 は、T 細胞の共刺激受容体であり、C D 3－ゼータは、T 細胞抗原受容体のシグナル伝達要素である。第 2 の機能を提供する部分は、T 細胞活性化のモジュレーター、例えば I L－1 5、I L－1 5 R a、または I L－1 5 / I L－1 5 R a 融合であってもよく、またはインビボまたはインビトロでの結合の程度および／または場所をモニターするのに有用な標識システムの標識または酵素的な要素をコードしてもよい。T 細胞、例えば自己 T 細胞の状況下に置かれた、これらの予防および治療活性を有する生体分子をコードするコンストラクトは、本開示の一部の実施形態において、様々ながんを防止または処置するための、養子導入された T 細胞を補充するための強力なプラットフォームを提供する。

【 0 0 0 9 】

特定の態様において、本開示の抗グリコ M U C 1 抗体または抗原結合フラグメントは、表 1 A および表 1 B に記載の重鎖および／または軽鎖可変配列を含む（またはヌクレオチ

10

20

30

40

50

ド配列によってコードされる)。明確にするために、この文書中で用語「抗グリコMUC 1抗体」が使用される場合、それは、文脈上別段の指示がない限り、単一特異性および多重特異性(二重特異性を含む)抗グリコMUC 1抗体、単一特異性および多重特異性抗体の抗原結合フラグメント、ならびに抗体およびその抗原結合フラグメントを含有する融合タンパク質およびコンジュゲートを含むことが意図される。同様に、用語「抗グリコMUC 1抗体または抗原結合フラグメント」が使用される場合、それはまた、文脈上別段の指示がない限り、単一特異性および多重特異性(二重特異性を含む)抗グリコMUC 1抗体およびその抗原結合フラグメントに加えて、このような抗体および抗原結合フラグメントを含有する融合タンパク質およびコンジュゲートも含むことが意図される。

【0010】

他の態様において、本開示の抗グリコMUC 1抗体または抗原結合フラグメントは、表1～3に記載の重鎖および／または軽鎖CDR配列を含む(またはヌクレオチド配列によってコードされる)。表1Aおよび表1Bに記載のCDR配列は、CDRの境界を定義するための、IMGT (Lefranc et al., 2003, Dev Comparat Immunol 27:55-77), Kabat (Kabat et al., 1991, Sequences of Proteins of Immunological Interest, 5th Ed. Public Health Service, National Institutes of Health, Bethesda, Md.)、およびChothia (Al-Lazikani et al., 1997, J. Mol. Biol 273:927-948)のスキームに従って定義されるCDR配列を含む。表1C、表1D、および表1Eに記載のCDR配列は、それぞれIMGT、Kabat、およびChothiaの定義に従って表1Aおよび表1Bに記載されるCDR配列由来のコンセンサス配列である。表2Aおよび表2Bに記載のCDR配列は、それぞれ表1Aおよび表1Bに記載のCDR配列の組み合わせられたオーバーラップ領域であり、IMGT、KabatおよびChothia配列は、下線の太字で示される。表2Cに記載のCDR配列は、表1C、表1D、および表1Eに記載のコンセンサスCDR配列の組み合わせられたオーバーラップ領域である。表3Aおよび表3Bに記載のCDR配列は、それぞれ表1Aおよび表1Bに示されるCDR配列の共通のオーバーラップ領域である。表3Cに記載のCDR配列は、表1C、表1D、および表1Eに記載のCDR配列の共通のオーバーラップ領域である。このような抗グリコMUC 1抗体および抗原結合フラグメントのフレームワーク配列は、表1Aまたは表1Bに記載のVHおよびVL配列の天然マウスのフレームワーク配列であってもよいし、または非天然(例えば、ヒト化またはヒト)フレームワーク配列であってもよい。

【0011】

10

20

30

40

50

【表 1 - 1】

表 1A 1AG 配列		
説明	配列	配列番号 :
VH アミノ酸 配列 (予測された 成熟)	EVKLLESGGGLVQPGGSLKLSCAASGFDGSRDWMSWW RQAPGKGLEWIGEINPDSSTKNYTPSLKDKFIISRDNAKN TLFLQMSSVRSEDTALYYCATSHYYGLFGYWGQGTLVT VSA	1
VL アミノ酸 配列 (予測された 成熟)	DIVLTQSPASLTVSLGQRATISCRASKSVSTSGYSYMHW YQQKPGQPPKLLIYLASYLESQVQPARFSGSGSGTDFTLN IHPVEEEDAATYYCQHSRELPRTFGGGTKLEIK	2
CDR-H1アミノ 酸配列 (IMGT の定義)	GFDFSRDW	3
CDR-H2アミノ 酸配列	INPDSSTK	4

【 0 0 1 2 】

【表 1－2】

表 1A 1AG 配列		
説明	配列	配列番号：
(IMGT の定義)		
CDR-H3 アミノ酸配列 (IMGT の定義)	ATSHYYGLFGY	5
CDR-L1 アミノ酸配列 (IMGT の定義)	KSVSTSGYSY	6
CDR-L2 アミノ酸配列 (IMGT の定義)	LAS	7
CDR-L3 アミノ酸配列 (IMGT の定義)	QHSRELPRT	8
CDR-H1 アミノ酸配列 (Kabat の定義)	RDWMS	9
CDR-H2 アミノ酸配列 (Kabat の定義)	EINPDSSTKNYTPSLKD	10
CDR-H3 アミノ酸配列 (Kabat の定義)	SHYYGLFGY	11
CDR-L1 アミノ酸配列 (Kabat の定義)	RASKSVSTSGYSYMH	12
CDR-L2 アミノ酸配列 (Kabat の定義)	LASYLES	13
CDR-L3 アミノ酸配列 (Kabat の定義)	QHSRELPRT	14
CDR-H1 アミノ酸配列 (Chothia の定義)	GDFFSRD	15
CDR-H2 アミノ酸配列 (Chothia の定義)	NPDSST	16
CDR-H3 アミノ酸配列	SHYYGLFGY	17

【 0 0 1 3 】

10

20

30

40

50

【表 1 - 3】

表 1A 1AG 配列		
説明	配列	配列番号 :
(Chothia の定義)		
CDR-L1 アミノ 酸配列 (Chothia の定義)	SKSVSTSGYSY	18
CDR-L2 アミノ 酸配列 (Chothia の定義)	LAS	19
CDR-L3 アミノ 酸配列 (Chothia の定義)	SRELPRT	20
VH ヌクレオチド 配列 (シグナル配列を 含まず)	GAGGTGAAGCTTCTCGAGTCTGGAGGTGGCCTGGTG CAGCCTGGAGGATCCCTGAAATTGTCCTGTGCAGCCT CAGGATTTCGATTTTAGTAGAGACTGGATGAGTTGGGT CCGGCAGGCTCCAGGGAAAGGGCTAGAATGGATTGG AGAGATTAATCCAGATAGCAGTACGAAAACTACACG CCATCTCTAAAGGATAAATTCATCATTTCCAGAGACAA CGCCAAAAATACGCTGTTCTGCAAATGAGCAGCGTG AGATCTGAGGACACAGCCCTTTATTACTGTGCAACCT CTCATTACTACGGCCTGTTTGTTACTGGGGCCAAGG GACTCTGGTCACTGTCTCTGCAGAGGTGAAGCTTCTC GAGTCTGGAGGTGGCCTGGTGCAGCCTGGAGGATCC CTGAAATTGTCCTGTGCAGCCTCAGGATTCGATTTTAG TAGAGACTGGATGAGTTGGGTCCGGCAGGCTCCAGG GAAAGGGCTAGAATGGATTGGAGAGATTAATCCAGAT AGCAGTACGAAAACTACACGCCATCTCTAAAGGATA AATTCATCATTTCCAGAGACAACGCCAAAAATACGCTG TTCCTGCAAATGAGCAGCGTGAGATCTGAGGACACAG CCCTTTATTACTGTGCAACCTCTCATTACTACGGCCTG TTTGGTTACTGGGGCCAAGGGACTCTGGTCACTGTCT CTGCA	21
VL ヌクレオチド 配列 (シグナル配列を 含まず)	GACATTGTGCTGACACAGTCTCCTGCTTCCTTAACTGT ATCTCTGGGGCAGAGGGCCACCATCTCATGCAGGGC CAGCAAAAGTGTCAGTACATCTGGCTATAGTTATATGC ACTGGTACCAACAGAAACCAGGACAGCCACCCAACT CCTCATCTATCTTGCTTCCTACCTAGAATCTGGGGTCC CTGCCAGGTTCACTGGCAGTGGGTCTGGGACAGACT	22

【 0 0 1 4 】

10

20

30

40

50

【表 1－4】

表 1A 1AG 配列		
説明	配列	配列番号：
	TCACCCTCAACATCCATCCTGTGGAGGAGGAGGATGC TGCAACCTATTACTGTCAGCACAGTAGGGAGCTTCCT CGGACGTTCGGTGGAGGCACCAAGCTGGAAATCAAA	

10

【 0 0 1 5】

20

30

40

50

【表 2 - 1】

表 1B 4AG 配列		
説明	配列	配列番号 :
VH アミノ酸 配列 (予測された 成熟)	EVKLLESGGGLVQPGGSLKLSCVASGFDFSRYWMSWW RQAPGKGPEWIGEINPESNTMNYSPSLKEKFIISRDTAK NMLYLQMSKVRSEDTALYYCATSHHYGLFDYWGQGTL VTVSA	23
VL アミノ酸 配列 (予測された 成熟)	DIVLTQSPASLAVSLGQRATISCRASKSVSTSGYNYIHWY QQKPGQPPKLLIYLASYLESQVPAFSGSGSGTDFTLNI HPVEEEDAATYFCQHSRELPRTFGGGTKLEFK	24
CDR-H1 アミノ 酸配列 (IMGT の定義)	GFDFSRYW	25
CDR-H2 アミノ 酸配列 (IMGT の定義)	INPESNTM	26
CDR-H3 アミノ 酸配列 (IMGT の定義)	ATSHHYGLFDY	27
CDR-L1 アミノ 酸配列 (IMGT の定義)	KSVSTSGYNY	28
CDR-L2 アミノ 酸配列 (IMGT の定義)	LAS	29
CDR-L3 アミノ 酸配列 (IMGT の定義)	QHSRELPRT	30
CDR-H1 アミノ 酸配列 (Kabat の定義)	RYWMS	31

【 0 0 1 6 】

【表 2 - 2】

表 1B 4AG 配列		
説明	配列	配列番号 :
CDR-H2 アミノ酸配列 (Kabat の定義)	EINPESNTMNYSPSLKE	32
CDR-H3 アミノ酸配列 (Kabat の定義)	SHHYGLFDY	33
CDR-L1 アミノ酸配列 (Kabat の定義)	RASKSVSTSGYNYIH	34
CDR-L2 アミノ酸配列 (Kabat の定義)	LASYLES	35
CDR-L3 アミノ酸配列 (Kabat の定義)	QHSRELPR	36
CDR-H1 アミノ酸配列 (Chothia の定義)	GFDFSR	37
CDR-H2 アミノ酸配列 (Chothia の定義)	NPESNT	38
CDR-H3 アミノ酸配列 (Chothia の定義)	SHHYGLFDY	39
CDR-L1 アミノ酸配列 (Chothia の定義)	SKSVSTSGYNY	40
CDR-L2 アミノ酸配列 (Chothia の定義)	LAS	41
CDR-L3 アミノ酸配列 (Chothia の定義)	SRELPR	42
VHヌクレオチド配列 (シグナル配列を含まず)	GAGGTGAAGCTTCTCGAGTCTGGAGGTGGCCTGGTG CAGCCTGGAGGATCCCTGAAACTCTCCTGTGTAGCCT CAGGATTTCGATTTTAGTAGATACTGGATGAGTTGGGT CCGGCAGGCTCCAGGGAAAGGGCCAGAATGGATTGG AGAAATTAATCCAGAAAGCAATACGATGAACTATTCGC	43

【 0 0 1 7 】

10

20

30

40

50

【表 2 - 3】

表 1B 4AG 配列		
説明	配列	配列番号 :
	CATCTCTAAAGGAAAAATTCATCATCTCCAGAGACACC GCCAAAAATATGTTGTACCTGCAAATGAGCAAAGTGA GATCTGAGGACACAGCCCTTTATTACTGTGCAACCTC TCATCACTACGGCCTATTCGATTACTGGGGCCAAGGG ACTCTGGTCACTGTCTCTGCA	
VLヌクレオチド 配列 (シグナル配列を 含まず)	GACATTGTGCTGACACAGTCTCCTGCTTCCTTAGCTG TGTCTCTGGGGCAGAGGGCCACCATCTCATGCAGGG CCAGCAAAAGTGTCAGTACTTCTGGCTATAATTATATA CACTGGTACCAACAGAAACCAGGACAGCCACCCAAAC TCCTCATCTATCTTGCATCCTACCTAGAATCTGGGGTC CCTGCCAGGTTCACTGGCAGTGGGTCTGGGACAGAC TTCACCCTCAACATCCACCCTGTGGAGGAGGAGGATG CTGCAACCTATTTCTGTCAGCACAGTAGGGAGCTTCC TCGGACGTTCCGGTGGAGGCACCAAGCTGGAATTCAAA	44

10

20

【 0 0 1 8】

【表 3】

表 1C CDR コンセンサス配列 - IMGT の定義		
説明	配列	配列番号 :
CDR-H1 アミ ノ酸配列 (IMGT の定義)	GFDFSRX ₁ W X ₁ = D または Y	45
CDR-H2 アミ ノ酸配列 (IMGT の定義)	INPX ₁ SX ₂ TX ₃ X ₁ = D または E X ₂ = S または N X ₃ = K または M	46
CDR-H3 アミ ノ酸配列 (IMGT の定義)	ATSHX ₁ YGLFX ₂ Y X ₁ = Y または H X ₂ = G または D	47
CDR-L1 アミ ノ酸配列 (IMGT の定義)	KSVSTSGYX ₁ Y X ₁ = S または N	48
CDR-L2 アミ ノ酸配列 (IMGT の定義)	LAS	49
CDR-L3 アミ ノ酸配列 (IMGT の定義)	QHSRELPRT	50

30

40

【 0 0 1 9】

50

【表 4】

表 1D CDR コンセンサス配列 - Kabat の定義		
説明	配列	配列番号 :
CDR-H1 アミノ酸配列 (Kabat の定義)	RX ₁ WMS X ₁ = D または Y	51
CDR-H2 アミノ酸配列 (Kabat の定義)	EINPX ₁ SX ₂ TX ₃ NYX ₄ PSLKX ₅ X ₁ = D または E X ₂ = S または N X ₃ = K または M X ₄ = T または S X ₅ = D または E	52
CDR-H3 アミノ酸配列 (Kabat の定義)	SHX ₁ YGLFX ₂ Y X ₁ = Y または H X ₂ = G または D	53
CDR-L1 アミノ酸配列 (Kabat の定義)	RASKSVSTSGYX ₁ YX ₂ H X ₁ = S または N X ₂ = M または I	54
CDR-L2 アミノ酸配列 (Kabat の定義)	LASYLES	55
CDR-L3 アミノ酸配列 (Kabat の定義)	QHSRELPRT	56

【 0 0 2 0 】

【表 5】

表 1E CDR コンセンサス配列 - Chothia の定義		
説明	配列	配列番号 :
CDR-H1 アミノ酸配列 (Chothia の定義)	GFDFSRX ₁ X ₁ = D または Y	57
CDR-H2 アミノ酸配列 (Chothia の定義)	NPX ₁ SX ₂ T X ₁ = D または E X ₂ = S または N	58
CDR-H3 アミノ酸配列 (Chothia の定義)	SHX ₁ YGLFX ₂ Y X ₁ = Y または H X ₂ = G または D	59
CDR-L1 アミノ酸配列 (Chothia の定義)	SKSVSTSGYX ₁ Y X ₁ = S または N	60
CDR-L2 アミノ酸配列 (Chothia の定義)	LAS	61
CDR-L3 アミノ酸配列 (Chothia の定義)	SRELPRT	62

【 0 0 2 1 】

【表 6】

表 2A		
1AG の IMGT、Kabat、および Chothia の CDR の組み合わせられたオーバーラップ配列		
説明	配列	配列番号：
CDR-H1 アミノ酸配列 (組み合わせられたオーバーラップ)	<u>GFDFSRDWMS</u> (IMGT) GFDFSRDWMS (Kabat) <u>GFDFSRDWMS</u> (Chothia)	63
CDR-H2 アミノ酸配列 (組み合わせられたオーバーラップ)	<u>EINPDSSTK</u> NYTPSLKD (IMGT) <u>EINPDSSTKNYTPSLKD</u> (Kabat) EINPDSSTKNYTPSLKD (Chothia)	64
CDR-H3 アミノ酸配列 (組み合わせられたオーバーラップ)	<u>ATSHYYGLFGY</u> (IMGT) AT <u>SHYYGLFGY</u> (Kabat) AT <u>SHYYGLFGY</u> (Chothia)	65
CDR-L1 アミノ酸配列 (組み合わせられたオーバーラップ)	RASK <u>SVSTSGYSY</u> MH (IMGT) <u>RASKSVSTSGYSY</u> MH (Kabat) RASKSVSTSGYSYMH (Chothia)	66
CDR-L2 アミノ酸配列 (組み合わせられたオーバーラップ)	<u>LAS</u> YLES (IMGT) <u>LAS</u> YLES (Kabat) <u>LAS</u> YLES (Chothia)	67
CDR-L3 アミノ酸配列 (組み合わせられたオーバーラップ)	<u>QHSREL</u> PRT (IMGT) <u>QHSREL</u> PRT (Kabat) QHSREL <u>PRT</u> (Chothia)	68

【 0 0 2 2 】

10

20

30

40

50

【表 7】

表 2B		
4AG の IMGT、Kabat、および Chothia の CDR の組み合わせられたオーバーラップ配列		
説明	配列	配列番号 :
CDR-H1 アミノ酸配列 (組み合わせられたオーバーラップ)	<u>GFDFSR</u> YWMS (IMGT) GFDFSR <u>YWMS</u> (Kabat) <u>GFDFSR</u> YWMS (Chothia)	69
CDR-H2 アミノ酸配列 (組み合わせられたオーバーラップ)	<u>EINPESNT</u> MNYSPLKE (IMGT) <u>EINPESNT</u> MNYSPLKE (Kabat) <u>EINPESNT</u> MNYSPLKE (Chothia)	70
CDR-H3 アミノ酸配列 (組み合わせられたオーバーラップ)	<u>ATSHHYGL</u> FDY (IMGT) ATSHHYGL <u>FDY</u> (Kabat) ATSHHYGL <u>FDY</u> (Chothia)	71
CDR-L1 アミノ酸配列 (組み合わせられたオーバーラップ)	RASK <u>SVSTSGYNY</u> IH (IMGT) <u>RASKSVSTSGYNY</u> IH (Kabat) <u>RASKSVSTSGYNY</u> IH (Chothia)	72
CDR-L2 アミノ酸配列 (組み合わせられたオーバーラップ)	<u>LAS</u> YLES (IMGT) <u>LAS</u> YLES (Kabat) <u>LAS</u> YLES (Chothia)	73
CDR-L3 アミノ酸配列 (組み合わせられたオーバーラップ)	<u>QHSREL</u> PRT (IMGT) <u>QHSREL</u> PRT (Kabat) <u>QHSREL</u> PRT (Chothia)	74

【 0 0 2 3 】

10

20

30

40

50

【表 8】

表 2C コンセンサス CDR の組み合わせられたオーバーラップ配列		
説明	配列	配列番号 :
CDR-H1 アミノ酸配列 (組み合わせられたオーバーラップ)	GFDFSRX ₁ WMS X ₁ = D または Y	75
CDR-H2 アミノ酸配列 (組み合わせられたオーバーラップ)	EINPX ₁ SX ₂ TX ₃ NYX ₄ PSLKX ₅ X ₁ = D または E X ₂ = S または N X ₃ = K または M X ₄ = T または S X ₅ = D または E	76
CDR-H3 アミノ酸配列 (組み合わせられたオーバーラップ)	ATSHX ₁ YGLFX ₂ Y X ₁ = Y または H X ₂ = G または D	77
CDR-L1 アミノ酸配列 (組み合わせられたオーバーラップ)	RASKSVSTSGYX ₁ YX ₂ H X ₁ = S または N X ₂ = M または I	78
CDR-L2 アミノ酸配列 (組み合わせられたオーバーラップ)	LASYLES	79
CDR-L3 アミノ酸配列 (組み合わせられたオーバーラップ)	QHSRELPRT	80

【 0 0 2 4 】

【表 9】

表 3A 1AG の IMGT、Kabat、および Chothia の CDR の共通の配列		
説明	配列	配列番号 :
CDR-H1 アミノ酸配列 (共通の配列)	RD	81
CDR-H2 アミノ酸配列 (共通の配列)	NPDSST	82
CDR-H3 アミノ酸配列 (共通の配列)	SHYYGLFGY	83
CDR-L1 アミノ酸配列 (共通の配列)	KSVSTSGYSY	84
CDR-L2 アミノ酸配列 (共通の配列)	LAS	85
CDR-L3 アミノ酸配列 (共通の配列)	SRELPRT	86

【 0 0 2 5 】

10

20

30

40

50

【表 1 0】

表 3B 4AG の IMGT、Kabat、および Chothia の CDR の共通の配列		
説明	配列	配列番号：
CDR-H1 アミノ酸配列 (共通の配列)	RY	87
CDR-H2 アミノ酸配列 (共通の配列)	NPESNT	88
CDR-H3 アミノ酸配列 (共通の配列)	SHHYGLFDY	89
CDR-L1 アミノ酸配列 (共通の配列)	KSVSTSGYNY	90
CDR-L2 アミノ酸配列 (共通の配列)	LAS	91
CDR-L3 アミノ酸配列 (共通の配列)	SRELPRT	92

10

【0 0 2 6】

20

【表 1 1】

表 3C コンセンサス CDR の共通の配列		
説明	配列	配列番号：
CDR-H1 アミノ酸配列 (共通の配列)	RX ₁ X ₁ = D または Y	93
CDR-H2 アミノ酸配列 (共通の配列)	NPX ₁ SX ₂ T X ₁ = D または E X ₂ = S または N	94
CDR-H3 アミノ酸配列 (共通の配列)	SHX ₁ YGLFX ₂ Y X ₁ = Y または H X ₂ = G または D	95
CDR-L1 アミノ酸配列 (共通の配列)	KSVSTSGYX ₁ Y X ₁ = S または N	96
CDR-L2 アミノ酸配列 (共通の配列)	LAS	97
CDR-L3 アミノ酸配列 (共通の配列)	SRELPRT	98

30

40

【0 0 2 7】

特定の態様において、本開示の抗グリコMUC1抗体または抗原結合フラグメントは、番号付けされた実施形態3から41に記載のCDR組合せのいずれかのアミノ酸配列を含むCDRを含む。したがって、特定の実施形態において、本開示の抗グリコMUC1抗体または抗原結合フラグメントは、配列番号93のアミノ酸配列を含むCDR-H1、配列

50

番号 94 のアミノ酸配列を含む CDR-H2、配列番号 95 のアミノ酸配列を含む CDR-H3、配列番号 96 のアミノ酸配列を含む CDR-L1、配列番号 97 のアミノ酸配列を含む CDR-L2、および配列番号 98 のアミノ酸配列を含む CDR-L3 を含む。一部の実施形態において、CDR-H1 は、配列番号 3、9、15、25、31、37、45、51、57、63、69、75、81、87、または 93 のアミノ酸配列を含む。一部の実施形態において、CDR-H2 は、配列番号 4、10、16、26、32、38、46、52、58、64、70、76、82、88、または 94 のアミノ酸配列を含む。一部の実施形態において、CDR-H3 は、配列番号 5、11、17、27、33、39、47、53、59、65、71、77、83、89、または 95 のアミノ酸配列を含む。一部の実施形態において、CDR-L1 は、配列番号 6、12、18、28、34、40、48、54、60、66、72、78、84、90、または 96 のアミノ酸配列を含む。一部の実施形態において、CDR-L2 は、配列番号 7、13、19、29、35、41、49、55、61、67、73、79、85、91 または 97 のアミノ酸配列を含む。一部の実施形態において、CDR-L3 は、配列番号 8、14、20、30、36、42、50、56、62、68、74、80、86、または 92 のアミノ酸配列を含む。

【0028】

他の態様において、本開示の抗グリコム UC1 抗体または抗原結合フラグメントは、配列番号 3～5 の重鎖 CDR および配列番号 6～8 の軽鎖 CDR を含む。他の態様において、本開示の抗グリコム UC1 抗体または抗原結合フラグメントは、配列番号 9～11 の重鎖 CDR および配列番号 12～14 の軽鎖 CDR を含む。他の態様において、本開示の抗グリコム UC1 抗体または抗原結合フラグメントは、配列番号 15～17 の重鎖 CDR および配列番号 18～20 の軽鎖 CDR を含む。他の態様において、本開示の抗グリコム UC1 抗体または抗原結合フラグメントは、配列番号 25～27 の重鎖 CDR および配列番号 28～30 の軽鎖 CDR を含む。他の態様において、本開示の抗グリコム UC1 抗体または抗原結合フラグメントは、配列番号 31～33 の重鎖 CDR および配列番号 34～36 の軽鎖 CDR を含む。他の態様において、本開示の抗グリコム UC1 抗体または抗原結合フラグメントは、配列番号 37～39 の重鎖 CDR および配列番号 40～42 の軽鎖 CDR を含む。他の態様において、本開示の抗グリコム UC1 抗体または抗原結合フラグメントは、配列番号 45～47 の重鎖 CDR および配列番号 48～50 の軽鎖 CDR を含む。他の態様において、本開示の抗グリコム UC1 抗体または抗原結合フラグメントは、配列番号 51～53 の重鎖 CDR および配列番号 54～56 の軽鎖 CDR を含む。他の態様において、本開示の抗グリコム UC1 抗体または抗原結合フラグメントは、配列番号 57～59 の重鎖 CDR および配列番号 60～62 の軽鎖 CDR を含む。他の態様において、本開示の抗グリコム UC1 抗体または抗原結合フラグメントは、配列番号 63～65 の重鎖 CDR および配列番号 66～68 の軽鎖 CDR を含む。他の態様において、本開示の抗グリコム UC1 抗体または抗原結合フラグメントは、配列番号 69～71 の重鎖 CDR および配列番号 72～74 の軽鎖 CDR を含む。他の態様において、本開示の抗グリコム UC1 抗体または抗原結合フラグメントは、配列番号 75～77 の重鎖 CDR および配列番号 78～80 の軽鎖 CDR を含む。他の態様において、本開示の抗グリコム UC1 抗体または抗原結合フラグメントは、配列番号 81～83 の重鎖 CDR および配列番号 84～86 の軽鎖 CDR を含む。他の態様において、本開示の抗グリコム UC1 抗体または抗原結合フラグメントは、配列番号 87～89 の重鎖 CDR および配列番号 90～92 の軽鎖 CDR を含む。

【0029】

本開示の抗体および抗原結合フラグメントは、マウス、キメラ、ヒト化またはヒトであってもよい。

【0030】

さらなる態様において、本開示の抗グリコム UC1 抗体または抗原結合フラグメントは、それぞれ配列番号 1 および 2 の重鎖および軽鎖可変領域を含む抗体または抗原結合フラグメントと競合する。さらに他の態様において、本開示は、それぞれ配列番号 3 および 2

の少なくとも95%、98%、99%、または99.5%の配列同一性を有する重鎖および軽鎖可変領域を有する抗MUC1抗体または抗原結合フラグメントを提供する。

【0031】

さらに他の態様において、本開示の抗グリコMUC1抗体または抗原結合フラグメントは、それぞれ配列番号23および24の重鎖および軽鎖可変領域を含む抗体または抗原結合フラグメントと競合する。さらに他の態様において、本開示は、それぞれ配列番号23および24の少なくとも95%、98%、99%、または99.5%の配列同一性を有する重鎖および軽鎖可変領域を有する抗MUC1抗体または抗原結合フラグメントを提供する。

【0032】

さらに他の態様において、本開示の抗グリコMUC1抗体または抗原結合フラグメントは、単鎖可変フラグメント(s c F v)である。例示的なs c F vは、軽鎖可変フラグメントのN末端側に重鎖可変フラグメントを含む。一部の実施形態において、s c F vの重鎖可変フラグメントおよび軽鎖可変フラグメントは、4~15アミノ酸のリンカー配列に共有結合している。s c F vは、二重特異性T細胞エンゲージャーの形態であってもよいし、またはキメラ抗原受容体(CAR)内であってもよい。

【0033】

抗グリコMUC1抗体および抗原結合フラグメントは、単鎖可変フラグメントの多量体、二重特異性単鎖可変フラグメント、および二重特異性単鎖可変フラグメントの多量体の形態であってもよい。一部の実施形態において、単鎖可変フラグメントの多量体は、2価単鎖可変フラグメント、トリボディ(tribody)またはテトラボディ(tetrabody)から選択される。これらの実施形態の一部において、二重特異性単鎖可変フラグメントの多量体は、二重特異性T細胞エンゲージャーである。

【0034】

本開示の他の態様は、本開示の抗グリコMUC1抗体および抗体結合フラグメントをコードする核酸に関心を寄せている。一部の実施形態において、抗グリコMUC1抗体または抗原結合フラグメントをコードする核酸の部分は、ヒト細胞における発現のためにコドン最適化されている。特定の態様において、本開示は、配列番号21または配列番号43と少なくとも95%、98%、99%、または99.5%の配列同一性を有する重鎖ヌクレオチド配列、および配列番号22または配列番号44と少なくとも95%、98%、99%、または99.5%の配列同一性を有する軽鎖ヌクレオチド配列によってコードされた重鎖および軽鎖可変領域を有する抗グリコMUC1抗体または抗原結合フラグメントを提供する。核酸を含むベクター(例えば、レンチウイルスベクターなどのウイルスベクター)および宿主細胞も本開示の範囲内である。重鎖および軽鎖をコードする配列は、単一のベクターに存在していてもよいし、または別個のベクターに存在していてもよい。

【0035】

本開示のさらに別の態様は、抗グリコMUC1抗体、抗原結合フラグメント、核酸(または核酸の対)、ベクター(または対のベクター)または本開示による宿主細胞、および生理学的に好適な緩衝液、アジュバントまたは希釈剤を含む医薬組成物である。

【0036】

本開示のさらに別の態様は、キメラ抗原受容体を作製する方法であって、コード領域の発現に好適な条件下で、本開示による核酸またはベクターを含む細胞をインキュベートすること、およびキメラ抗原受容体を収集することを含む方法である。

【0037】

本開示の別の態様は、がんを検出する方法であって、細胞または組織サンプルを、本開示の抗グリコMUC1抗体または抗原結合フラグメントと接触させること、および抗体が細胞または組織サンプルに結合しているかどうかを検出することを含む方法である。

【0038】

本開示のさらに別の態様は、がんを検出することで使用するための本開示による抗グリコMUC1抗体または抗原結合フラグメントである。

【0039】

本開示のさらに別の態様は、がんを処置する方法であって、予防的または治療的有效量の本開示による抗グリコMUC1抗体、抗原結合フラグメント、核酸、ベクター、宿主細胞または医薬組成物を、それを必要とする対象に投与することを含む方法である。

【0040】

本開示のさらに別の態様は、がんの処置で使用するための、本開示による抗グリコMUC1抗体、抗原結合フラグメント、核酸、ベクター、宿主細胞または医薬組成物である。

【0041】

本開示のさらに別の態様は、がんの処置のための医薬を製造するための、本開示による抗グリコMUC1抗体、抗原結合フラグメント、核酸、ベクター、宿主細胞または医薬組成物の使用である。

【図面の簡単な説明】

【0042】

【図1-1】グリコシル化および非グリコシル化MUC1ペプチドに対する1AGおよび4AGの結合特異性を示すELISAアッセイの結果を示す図である。図1A：ペプチドC2；図1B：ペプチドC3。

【図1-2】グリコシル化および非グリコシル化MUC1ペプチドに対する1AGおよび4AGの結合特異性を示すELISAアッセイの結果を示す図である。図1C：ペプチドC4；図1D：ペプチド70。

【図1-3】グリコシル化および非グリコシル化MUC1ペプチドに対する1AGおよび4AGの結合特異性を示すELISAアッセイの結果を示す図である。図1E：GST；図1F：BSAでブロックされたウェル（対照）。

【図2-1】異なるグリコシル化および非グリコシル化MUC1ペプチドに対する1AG（図2A）の結合特異性を示すELISAアッセイの結果を示す図である。

【図2-2】異なるグリコシル化および非グリコシル化MUC1ペプチドに対する4AG（図2B）の結合特異性を示すELISAアッセイの結果を示す図である。

【図3】抗原GSTAに対する1AGおよび4AGを用いた抗体滴定アッセイの結果を示す図である。

【図4】腫瘍マイクロアレイBCN721aを用いた抗体1AGの免疫組織化学スクリーニングの結果を示す図である。

【図5】腫瘍マイクロアレイBCN721aを用いた抗体4AGの免疫組織化学スクリーニングの結果を示す図である。

【図6】腫瘍マイクロアレイOV241cを用いた抗体1AGの免疫組織化学スクリーニングの結果を示す図である。

【図7】腫瘍マイクロアレイOV241cを用いた抗体4AGの免疫組織化学スクリーニングの結果を示す図である。

【図8】腫瘍マイクロアレイBC000119を用いた抗体1AGの免疫組織化学スクリーニングの結果を示す図である。

【図9】腫瘍マイクロアレイBC000119を用いた抗体4AGの免疫組織化学スクリーニングの結果を示す図である。

【図10】抗体5E5を用いたアラニンスキャンニングの結果を示す図である。

【図11】抗体1AGを用いたアラニンスキャンニングの結果を示す図である。

【図12】抗体4AGを用いたアラニンスキャンニングの結果を示す図である。

【発明を実施するための形態】

【0043】

6. 詳細な説明

6.1 抗体

本開示は、腫瘍細胞上に提示されるMUC1のグリコフォームに向けられた新規の抗体を提供する。これらは、抗体1AGおよび4AGによって例示される。腫瘍細胞上に提示されるMUC1のグリコシル化パターンを模擬するように、太字と下線の文字で示される

10

20

30

40

50

セリンおよびスレオニン残基においてG a l N A cでグリコシル化された、M U C 1中に存在するグリコシル化15-merであるR P A P G S T A P P A H G V T（配列番号99）に結合する抗体のスクリーニングにおいて、1 A Gおよび4 A Gを同定した。

【0044】

本開示の抗グリコM U C 1抗体は、抗体1 A Gおよび4 A Gによって例示され、がんの診断および療法におけるツールとして有用である。

【0045】

したがって、特定の態様において、本開示は、腫瘍細胞上に提示されるM U C 1のグリコフォーム（本明細書では「グリコM U C 1」と称される）に、好ましくは、太字と下線の文字で示されるセリンおよびスレオニン残基においてG a l N A cでグリコシル化された15-merのペプチドR P A P G S T A P P A H G V T（配列番号99）に結合する抗体および抗原結合フラグメントを提供する。

【0046】

本開示の抗グリコM U C 1抗体は、ポリクローナル、モノクローナル、遺伝子操作された、および／またはそれ以外の方法で性質が改変されたものであってもよく、例えば、これらに限定されないが、キメラ抗体、ヒト化抗体、ヒト抗体、霊長類化抗体、単鎖抗体、二重特異性抗体、二重可変ドメイン抗体などが挙げられる。様々な実施形態において、抗体は、抗体の定常領域の全部または一部を含む。一部の実施形態において、定常領域は、I g A（例えば、I g A₁またはI g A₂）、I g D、I g E、I g G（例えば、I g G₁、I g G₂、I g G₃またはI g G₄）、およびI g Mから選択されるアイソタイプである。具体的な実施形態において、本開示の抗グリコM U C 1抗体は、I g G₁の定常領域のアイソタイプを含む。

【0047】

用語「モノクローナル抗体」は、本明細書で使用される場合、ハイブリドーマ技術を介して産生された抗体に限定されない。モノクローナル抗体は、あらゆる真核、原核、またはファージクローンを含み、これらは、当業界において利用可能な、または公知のあらゆる手段によって単一のクローンから誘導される。本発明の開示において有用なモノクローナル抗体は、ハイブリドーマ、組換え、およびファージディスプレイ技術、またはそれらの組合せの使用を含む当業界において公知の様々な技術を使用して調製することができる。ヒトにおける抗グリコM U C 1抗体のインビボでの使用を含む本発明の開示の多くの使用において、キメラ、霊長類化、ヒト化、またはヒト抗体を、好適に使用することができる。

【0048】

用語「キメラ」抗体は、本明細書で使用される場合、非ヒト免疫グロブリン、例えばラットまたはマウス抗体由来の可変配列と、典型的にはヒト免疫グロブリンテンプレートから選ばれるヒト免疫グロブリン定常領域とを有する抗体を指す。キメラ抗体を産生するための方法は、当業界において公知である。例えば、この参照によりそれらの全体が本明細書に組み入れられる、Morrison, 1985, Science 229(4719):1202-7; Oi et al., 1986, BioTechniques 4:214-221; Gillies et al., 1985, J. Immunol. Methods 125:191-202; 米国特許第5,807,715号明細書; 第4,816,567号明細書; および第4,816,397号明細書を参照されたい。

【0049】

非ヒト（例えば、マウス）抗体の「ヒト化された」形態は、非ヒト免疫グロブリン由来の最小配列を含有するキメラ免疫グロブリンである。一般的に、ヒト化抗体は、C D R領域の全てまたは実質的に全てが非ヒト免疫グロブリンのC D R領域に相当し、F R領域の全てまたは実質的に全てがヒト免疫グロブリン配列のF R領域である、少なくとも1つの、典型的には2つの可変ドメインの実質的に全てを含むと予想される。ヒト化抗体は、免疫グロブリン定常領域（F c）の少なくとも一部、典型的にはヒト免疫グロブリンコンセンサス配列の少なくとも一部を含んでいてもよい。抗体ヒト化の方法は、当業界において公知である。例えば、全てが参照によりそれらの全体が本明細書に組み入れられる、Riec

hmann et al., 1988, Nature 332:323-7; Queenらの米国特許第5, 530, 101号明細書; 第5, 585, 089号明細書; 第5, 693, 761号明細書; 第5, 693, 762号明細書; および第6, 180, 370号明細書; 欧州特許第239400号明細書; PCT国際公開第91/09967号パンフレット; 米国特許第5, 225, 539号明細書; 欧州特許第592106号明細書; 欧州特許第519596号明細書; Padlan, 1991, Mol. Immunol., 28:489-498; Studnicka et al., 1994, Prot. Eng. 7:805-814; Roguska et al., 1994, Proc. Natl. Acad. Sci. 91:969-973; ならびに米国特許第5, 565, 332号明細書を参照されたい。

【0050】

「ヒト抗体」は、ヒト免疫グロブリンのアミノ酸配列を有する抗体を含み、さらに、ヒト免疫グロブリンライブラリーから単離された抗体、または1つまたは複数のヒト免疫グロブリンに関してトランスジェニックであり、内因性免疫グロブリンを発現しない動物から単離された抗体を含む。ヒト抗体は、ヒト免疫グロブリン配列由来の抗体ライブラリーを使用するファージディスプレイ方法などの当業界において公知の様々な方法によって作製することができる。これらのそれぞれが参照によりその全体が本明細書に組み入れられる、米国特許第4, 444, 887号明細書および第4, 716, 111号明細書; ならびにPCT国際公開第98/46645号パンフレット; 国際公開第98/50433号パンフレット; 国際公開第98/24893号パンフレット; 国際公開第98/16654号パンフレット; 国際公開第96/34096号パンフレット; 国際公開第96/33735号パンフレット; および国際公開第91/10741号パンフレットを参照されたい。ヒト抗体はまた、機能的な内因性免疫グロブリンを発現できないが、ヒト免疫グロブリン遺伝子を発現できるトランスジェニックマウスを使用することにより産生することもできる。例えば、参照によりそれらの全体が本明細書に組み入れられる、PCT国際公開第98/24893号パンフレット; 国際公開第92/01047号パンフレット; 国際公開第96/34096号パンフレット; 国際公開第96/33735号パンフレット; 米国特許第5, 413, 923号明細書; 第5, 625, 126号明細書; 第5, 633, 425号明細書; 第5, 569, 825号明細書; 第5, 661, 016号明細書; 第5, 545, 806号明細書; 第5, 814, 318号明細書; 第5, 885, 793号明細書; 第5, 916, 771号明細書; および第5, 939, 598号明細書を参照されたい。選択されたエピトープを認識する完全ヒト抗体は、「ガイドされる選択」と称される技術を使用して生成することができる。このアプローチにおいて、選択された非ヒトモノクローナル抗体、例えばマウス抗体は、同じエピトープを認識する完全ヒト抗体の選択をガイドするのに使用される (Jespers et al., 1988, Biotechnology 12:899-903を参照)。

【0051】

「霊長類化抗体」は、サル可変領域およびヒト定常領域を含む。霊長類化抗体を産生するための方法は、当業界において公知である。例えば、参照によりそれらの全体が本明細書に組み入れられる、米国特許第5, 658, 570号明細書; 第5, 681, 722号明細書; および第5, 693, 780号明細書を参照されたい。

【0052】

本開示の抗グリコMUC1抗体は、全長(無傷)抗体分子と、グリコMUC1と結合することが可能な抗原結合フラグメントの両方を含む。抗原結合フラグメントの例としては、一例として、これらに限定されないが、Fab、Fab'、F(ab')₂、Fvフラグメント、単鎖Fvフラグメントおよび単一ドメインフラグメントが挙げられる。

【0053】

Fabフラグメントは、軽鎖(CL)の定常ドメイン、および重鎖の第1の定常ドメイン(CH1)を含有する。Fab'フラグメントは、抗体のヒンジ領域からの1つまたは複数のシステインを含む重鎖CH1ドメインのカルボキシル末端における数個の残基の付加によってFabフラグメントと異なる。F(ab')₂フラグメントは、F(ab')₂ペプシン消化生成物のヒンジシステインにおけるジスルフィド結合の切断によって産生される。

抗体フラグメントの追加の化学的カップリングは、当業者公知である。F a bおよびF (a b ')₁フラグメントは無傷抗体のF cフラグメントを欠き、無傷抗体より迅速に動物の循環から排除され、無傷抗体より少ない非特異的な組織結合を有する可能性がある（例えば、Wahl et al., 1983, J. Nucl. Med. 24:316を参照）。

【0054】

「F v」フラグメントは、完全な標的認識および結合部位を含有する抗体の最小フラグメントである。この領域は、しっかりとした非共有結合による会合での1つの重鎖および1つの軽鎖可変ドメインの二量体（V_H-V_L二量体）からなる。この立体配置で、各可変ドメインの3つのCDRが相互作用して、V_H-V_L二量体の表面上の標的結合部位が規定される。しばしば6つのCDRは、抗体に標的結合特異性を付与する。しかしながら、一部の場合において、単一の可変ドメイン（または標的に特異的な3つのCDRのみを含むF vの半分）であっても、結合部位全体より低い親和性ではあるが標的を認識してそれに結合する能力を有する場合がある。

10

【0055】

「単鎖F v」または「s c F v」抗原結合フラグメントは、抗体のV_HおよびV_Lドメインを含み、この場合、これらのドメインは単一のポリペプチド鎖中に存在する。一般的に、F vポリペプチドは、V_HドメインとV_Lドメインとの間にポリペプチドリンカーをさらに含み、これは、s c F vが標的結合にとって望ましい構造を形成することを可能にする。

【0056】

「単ドメイン抗体」は、グリコMUC1に十分な親和性を示す単一のV_HまたはV_Lドメインで構成される。具体的な実施形態において、単ドメイン抗体は、ラクダ化抗体である（例えば、Riechmann, 1999, Journal of Immunological Methods 231:25-38を参照）。

20

【0057】

また本開示の抗グリコMUC1抗体は、二重特異性および他の多重特異性抗体であってもよい。二重特異性抗体は、同一または異なる抗原上の2つの異なるエピトープに対する結合特異性を有するモノクローナル抗体、多くの場合、ヒトまたはヒト化抗体抗体である。本発明の開示において、結合特異性の一方は、グリコMUC1に向けられていてもよく、他方は、他のあらゆる抗原、例えば、細胞表面タンパク質、受容体、受容体サブユニット、組織特異的抗原、ウイルス由来のタンパク質、ウイルスによってコードされたエンベロープタンパク質、細菌由来のタンパク質、または細菌表面タンパク質などに向けられていてもよい。特定の好ましい実施形態において、二重特異性および他の多重特異性を有する抗グリコMUC1抗体および抗原結合フラグメントは、第2のMUC1エピトープ、がん細胞上でMUC1と共発現される別のタンパク質上のエピトープ、または活性化T細胞などの異なる細胞上に存在する別のタンパク質上のエピトープに特異的に結合する。本開示の二重特異性抗体は、I g G様式の二重特異性抗体および単鎖ベースの二重特異性抗体を含む。

30

【0058】

I g G様式の本開示の二重特異性抗体は、当業界において公知の様々な種類のI g G様式の二重特異性抗体のいずれか、例えば、クアドローマ二重特異性抗体、「ノブ-イン-ホール (knobs-in-hole)」二重特異性抗体、C r o s s M a b二重特異性抗体、電荷対を有する二重特異性抗体、一般的な軽鎖二重特異性抗体、1アームの単鎖F a b-免疫グロブリンガンマ二重特異性抗体、ジスルフィドで安定化されたF v二重特異性抗体、D u e t M a b、制御されたF a bアーム交換二重特異性抗体、鎖交換操作されたドメインボディの二重特異性抗体、2アームのロイシンジッパーヘテロ二量体モノクローナル二重特異性抗体、κ λ ボディの二重特異性抗体、二重可変ドメイン二重特異性抗体、および交差二重可変ドメイン二重特異性抗体であってもよい。例えば、この参照によりそれらの全体が本明細書に組み入れられる、Kohler and Milstein, 1975, Nature 256:495-497 ; Milstein and Cuello, 1983, Nature 305:537-40 ; Ridgway et al., 1996, Protein

40

50

Eng. 9:617-621 ; Schaefer et al., 2011, Proc Natl Acad Sci USA 108:11187-92 ; Gunasekaran et al., 2010, J Biol Chem 285:19637-46 ; Fischer et al., 2015 Nature Commun 6:6113 ; Schanzer et al., 2014, J Biol Chem 289:18693-706 ; Metz et al., 2012 Protein Eng Des Sel 25:571-80 ; Mazor et al., 2015 MAbs 7: 377-89 ; Labrijn et al., 2013 Proc Natl Acad Sci USA 110:5145-50 ; Davis et al., 2010 Protein Eng Des Sel 23:195-202 ; Wranik et al., 2012, J Biol Chem 287:43331-9 ; Gu et al., 2015, PLoS One 10(5):e0124135 ; Steinmetz et al., 2016, MAbs 8(5):867-78 ; Klein et al., 2016, mAbs, 8(6):1010-1020 ; Liu et al., 2017, Front. Immunol. 8:38 ; およびYang et al., 2017, Int. J. Mol. Sci. 18:48を参照されたい。

10

【0059】

一部の実施形態において、本開示の二重特異性抗体は、CrossMabである。CrossMab技術は、この参照によりそれらの全体が本明細書に組み入れられる、国際公開第2009/080251号パンフレット、国際公開第2009/080252号パンフレット、国際公開第2009/080253号パンフレット、国際公開第2009/080254号パンフレット、国際公開第2013/026833号パンフレット、国際公開第2016/020309号パンフレット、およびSchaefer et al., 2011, Proc Natl Acad Sci USA 108:11187-92で詳細に記載されている。簡単に言えば、CrossMab技術は、正しい鎖会合を促進する二重特異性IgGの1つのFabアーム内の重鎖と軽鎖との間のドメインの交差に基づく。本開示のCrossMab二重特異性抗体は、二重特異性IgG抗体の一方のアームのFab部分の重鎖および軽鎖が交換されている「CrossMab^{FAB}」抗体であってもよい。他の実施形態において、本開示のCrossMab二重特異性抗体は、二重特異性IgG抗体の一方のアームのFab部分の重鎖および軽鎖の可変ドメインのみが交換されている「CrossMab^{VH-VL}」抗体であってもよい。さらに他の実施形態において、本開示のCrossMab二重特異性抗体は、二重特異性IgG抗体の一方のアームのFab部分の重鎖および軽鎖の定常ドメインのみが交換されている「CrossMab^{CH1-CL}」抗体であってもよい。CrossMab^{CH1-CL}抗体は、CrossMab^{FAB}およびCrossMab^{VH-VL}とは対照的に、予測された副産物を有さず、それゆえに、一部の実施形態において、CrossMab^{CH1-CL}二重特異性抗体が好ましい。Klein et al., 2016, mAbs, 8(6):1010-1020を参照されたい。

20

30

【0060】

一部の実施形態において、本開示の二重特異性抗体は、制御されたFabアーム交換二重特異性抗体である。Fabアーム交換二重特異性抗体を作製するための方法は、参照によりそれらの全体が本明細書に組み入れられる、PCT国際公開第2011/131746号パンフレットおよびLabrijn et al., 2014 Nat Protoc. 9(10):2450-63に記載されている。簡単に言えば、制御されたFabアーム交換二重特異性抗体は、CH3ドメイン中に単一の一致する点突然変異を含有する2つの親IgG1を別々に発現させること、インビトロで、酸化還元条件下で親IgG1を混合して、半分の分子の組換えを可能にすること、および還元体を除去して鎖間のジスルフィド結合を再酸化し、それにより二重特異性抗体を形成することによって作製することができる。

40

【0061】

本開示の二重特異性抗体は、第1および第2のサブユニットで構成されるFcドメインを含んでもよい。一実施形態において、Fcドメインは、IgG Fcドメインである。特定の実施形態において、Fcドメインは、IgG₁ Fcドメインである。別の実施形態において、Fcドメインは、IgG₄ Fcドメインである。より具体的な実施形態において、Fcドメインは、S228位におけるアミノ酸置換、特にアミノ酸置換S228P (Kabata E Uインデックスの番号付け)を含むIgG₄ Fcドメインである。本明細書において別段の規定がない限り、Fcドメインまたは定常領域におけるアミノ酸残基の番号付けは、Kabata et al., 1991, Sequences of Proteins of Immunologica

50

l Interest, 5th Ed. Public Health Service, National Institutes of Health, Bethesda, MDに記載されたような、E Uインデックスとも称されるE U番号付けシステムに従う。このアミノ酸置換は、インビボにおいてI g G₄抗体のF a bアーム交換を低減させる(Stubenrauch et al., 2010, Drug Metabolism and Disposition 38:84-91を参照)。さらなる特定の実施形態において、F cドメインは、ヒトF cドメインである。よりさらに特定の実施形態において、F cドメインは、ヒトI g G₁ F cドメインである。ヒトI g G₁ F c領域の例示的な配列は、配列番号42に示される。

【0062】

特定の実施形態において、F cドメインは、F cドメインの第1および第2のサブユニットの会合を促進する改変を含む。ヒトI g G F cドメインの2つのサブユニット間の最も大規模なタンパク質-タンパク質相互作用の部位は、C H 3ドメイン中にある。したがって、一実施形態において、前記改変は、F cドメインのC H 3ドメイン中にある。

【0063】

具体的な実施形態において、前記F cドメインの第1および第2のサブユニットの会合を促進する改変は、いわゆる「ノブ-イントゥー-ホール(knob-into-hole)」改変であり、これは、F cドメインの2つのサブユニットの一方に「ノブ」の改変、およびF cドメインの2つのサブユニットの他方に「ホール」の改変を含む。ノブ-イントゥー-ホール技術は、例えば米国特許第5,731,168号明細書；米国特許第7,695,936号明細書；Ridgway et al., 1996, Prot Eng 9:617-621、およびCarter, J, 2001, Immunol Meth 248:7-15に記載されている。一般的に、本方法は、ヘテロ二量体形成を促進し、ホモ二量体形成を妨害するように、突起部が空洞に入ることができるように、第1のポリペプチドの境界に突起部(「ノブ」)、および第2のポリペプチドの境界に対応する空洞(「ホール」)を導入することを含む。突起部は、第1のポリペプチドの境界からの小さいアミノ酸側鎖をより大きい側鎖(例えばチロシンまたはトリプトファン)で置き換えることによって構築される。大きいアミノ酸側鎖をより小さいアミノ酸側鎖(例えばアラニンまたはスレオニン)で置き換えることによって、第2のポリペプチドの境界に、突起部と同一または類似のサイズを有するそれに見合った空洞が作り出される。

【0064】

したがって、一部の実施形態において、F cドメインの第1のサブユニットのC H 3ドメイン中のアミノ酸残基を、より大きい側鎖の体積を有するアミノ酸残基で置き換えることによって、第1のサブユニットのC H 3ドメイン内に、第2のサブユニットのC H 3ドメイン内の空洞に入ることができる突起部が生じ、F cドメインの第2のサブユニットのC H 3ドメイン中のアミノ酸残基を、より小さい側鎖の体積を有するアミノ酸残基で置き換えることによって、第2のサブユニットのC H 3ドメイン内に、第1のサブユニットのC H 3ドメイン内の突起部を入れることができる空洞が生じる。好ましくは、より大きい側鎖の体積を有する前記アミノ酸残基は、アルギニン(R)、フェニルアラニン(F)、チロシン(Y)、およびトリプトファン(W)からなる群から選択される。好ましくは、より小さい側鎖の体積を有する前記アミノ酸残基は、アラニン(A)、セリン(S)、スレオニン(T)、およびバリン(V)からなる群から選択される。突起部および空洞は、例えば部位特異的突然変異誘発によってポリペプチドをコードする核酸を変更することにより、またはペプチド合成により作製することができる。

【0065】

特定のこのような実施形態では、F cドメインの第1のサブユニットにおいて、366位におけるスレオニン残基は、トリプトファン残基で置き換えられ(T 366 W)、F cドメインの第2のサブユニットにおいて、407位におけるチロシン残基は、バリン残基で置き換えられ(Y 407 V)、任意選択で366位におけるスレオニン残基は、セリン残基で置き換えられ(T 366 S)、368位におけるロイシン残基は、アラニン残基で置き換えられている(L 368 A)(K a b a t E Uインデックスによる番号付け)。さらなる実施形態では、F cドメインの第1のサブユニットにおいて、加えて、354位におけるセリン残基は、システイン残基で置き換えられ(S 354 C)、または356位

10

20

30

40

50

におけるグルタミン酸残基は、システイン残基で置き換えられ（E 3 5 6 C）（特に3 5 4 位におけるセリン残基は、システイン残基で置き換えられている）、F cドメインの第2のサブユニットにおいて、加えて、3 4 9 位におけるチロシン残基は、システイン残基によって置き換えられている（Y 3 4 9 C）（K a b a t E Uインデックスによる番号付け）。特定の実施形態において、F cドメインの第1のサブユニットは、アミノ酸置換S 3 5 4 CおよびT 3 6 6 Wを含み、F cドメインの第2のサブユニットは、アミノ酸置換Y 3 4 9 C、T 3 6 6 S、L 3 6 8 AおよびY 4 0 7 Vを含む（K a b a t E Uインデックスによる番号付け）。

【0066】

一部の実施形態において、固定のステアリング（例えば、Gunasekaran et al., 2010, J Biol Chem 285(25):19637-46に記載される通り）を使用して、F cドメインの第1および第2のサブユニットの会合を促進することができる。

【0067】

一部の実施形態において、F cドメインは、F c受容体および／またはエフェクター機能への結合を低減する1つまたは複数のアミノ酸置換を含む。

【0068】

特定の実施形態において、F c受容体は、F cγ受容体である。一実施形態において、F c受容体は、ヒトF c受容体である。一実施形態において、F c受容体は、活性化F c受容体である。具体的な実施形態において、F c受容体は、活性化ヒトF cγ受容体であり、より具体的には、ヒトF cγRIIIa、F cγRIまたはF cγRIIIaであり、最も具体的には、ヒトF cγRIIIaである。一実施形態において、エフェクター機能は、補体依存性細胞傷害（CDC）、抗体依存性細胞媒介性細胞傷害（ADCC）、抗体依存性細胞貪食（ADCP）、およびサイトカイン分泌の群から選択される1つまたは複数である。特定の実施形態において、エフェクター機能は、ADCCである。

【0069】

典型的には、同じ1つまたは複数のアミノ酸置換は、F cドメインの2つのサブユニットのそれぞれに存在する。一実施形態において、1つまたは複数のアミノ酸置換は、F cドメインのF c受容体への結合親和性を低減する。一実施形態において、1つまたは複数のアミノ酸置換は、F cドメインのF c受容体への結合親和性を、少なくとも2分の1、少なくとも5分の1、または少なくとも10分の1にする。

【0070】

一実施形態において、F cドメインは、E 2 3 3、L 2 3 4、L 2 3 5、N 2 9 7、P 3 3 1およびP 3 2 9の群から選択される位置にアミノ酸置換を含む（K a b a t E Uインデックスによる番号付け）。より具体的な実施形態において、F cドメインは、L 2 3 4、L 2 3 5およびP 3 2 9の群から選択される位置にアミノ酸置換を含む（K a b a t E Uインデックスによる番号付け）。一部の実施形態において、F cドメインは、アミノ酸置換L 2 3 4 AおよびL 2 3 5 Aを含む（K a b a t E Uインデックスによる番号付け）。このような実施形態の一つにおいて、F cドメインは、IgG₁ F cドメイン、特にヒトIgG₁ F cドメインである。一実施形態において、F cドメインは、P 3 2 9 位にアミノ酸置換を含む。より具体的な実施形態において、アミノ酸置換は、P 3 2 9 AまたはP 3 2 9 G、特にP 3 2 9 Gである（K a b a t E Uインデックスによる番号付け）。一実施形態において、F cドメインは、P 3 2 9 位にアミノ酸置換を含み、E 2 3 3、L 2 3 4、L 2 3 5、N 2 9 7およびP 3 3 1から選択される位置にさらなるアミノ酸置換を含む（K a b a t E Uインデックスによる番号付け）。より具体的な実施形態において、さらなるアミノ酸置換は、E 2 3 3 P、L 2 3 4 A、L 2 3 5 A、L 2 3 5 E、N 2 9 7 A、N 2 9 7 DまたはP 3 3 1 Sである。特定の実施形態において、F cドメインは、P 3 2 9、L 2 3 4およびL 2 3 5の位置にアミノ酸置換を含む（K a b a t E Uインデックスによる番号付け）。より特定の実施形態において、F cドメインは、アミノ酸突然変異L 2 3 4 A、L 2 3 5 AおよびP 3 2 9 Gを含む（「P 3 2 9 G L A L A」、「P G L A L A」または「L A L A P G」）。具体的には、特定の実施形態

10

20

30

40

50

において、Fcドメインの各サブユニットは、アミノ酸置換L234A、L235AおよびP329Gを含む(Kabat EUインデックスの番号付け)、すなわち、Fcドメインの第1および第2のサブユニットのそれぞれにおいて、234位におけるロイシン残基は、アラニン残基で置き換えられ(L234A)、235位におけるロイシン残基は、アラニン残基で置き換えられ(L235A)、329位におけるプロリン残基は、グリシン残基によって置き換えられている(P329G)(Kabat EUインデックスによる番号付け)。このような実施形態の一つにおいて、Fcドメインは、IgG₁ Fcドメイン、特にヒトIgG₁ Fcドメインである。

【0071】

本開示の単鎖ベースの二重特異性抗体は、当業界において公知の様々な種類の単鎖ベースの二重特異性抗体、例えば二重特異性T細胞エンゲージャー(BiTE)、ダイアボディ、タンデムダイアボディ(tandab)、二重親和性リターゲティング分子(DART: dual-affinity retargeting molecule)、および二重特異性キラー細胞エンゲージャーのいずれかであり得る。例えば、参照によりそれらの全体が本明細書に組み入れられる、Loffler et al., 2000, Blood 95:2098-103; Holliger et al., 1993, Proc Natl Acad Sci USA, 90:6444-8; Kipriyanov et al., 1999, Mol Biol 293:41-56; Johnson et al., 2010, Mol Biol 399:436-49; Wiernik et al., 2013, Clin Cancer Res 19:3844-55; Liu et al., 2017, Front. Immunol. 8:38; およびYang et al., 2017, Int. J. Mol. Sci. 18:48を参照されたい。

【0072】

一部の実施形態において、本開示の二重特異性抗体は、二重特異性T細胞エンゲージャー(BiTE)である。BiTEは、2つの抗原結合ドメインを有する単一のポリペプチド鎖分子であり、抗原結合ドメインの一方がT細胞抗原に結合し、第2の抗原結合ドメインが標的の表面上に提示される抗原に結合する(参照によりそれらの全体が本明細書に組み入れられる、PCT国際公開第05/061547号パンフレット; Baeuerle et al., 2008, Drugs of the Future 33: 137-147; Bargou, et al., 2008, Science 321:974-977を参照)。したがって、本開示のBiTEは、T細胞抗原に結合する抗原結合ドメイン、およびグリコMUC1に向けられた第2の抗原結合ドメインを有する。

【0073】

一部の実施形態において、本開示の二重特異性抗体は、二重親和性リターゲティング分子(DART)である。DARTは、会合して(特に共有結合による相互作用を介して)少なくとも2つのエピトープ結合部位を形成する少なくとも2つのポリペプチド鎖を含み、これらのエピトープ結合部位は、同一のエピトープを認識してもよいし、または異なるエピトープを認識してもよい。DARTのポリペプチド鎖のそれぞれは、免疫グロブリン軽鎖可変領域および免疫グロブリン重鎖可変領域を含むが、これらの領域は、相互作用してエピトープ結合部位を形成しない。そうではなく、DARTポリペプチド鎖の一方の(例えば、第1の)免疫グロブリン重鎖可変領域は、異なる(例えば、第2の)DART(商標)ポリペプチド鎖の免疫グロブリン軽鎖可変領域と相互作用して、エピトープ結合部位を形成する。同様に、DARTポリペプチド鎖の一方の(例えば、第1の)免疫グロブリン軽鎖可変領域は、DARTポリペプチド鎖の異なる(例えば、第2の)免疫グロブリン重鎖可変領域と相互作用して、エピトープ結合部位を形成する。DARTは、単一特異性、二重特異性、三重特異性などであってもよく、したがって、1、2、3またはそれより多くの異なるエピトープ(これらは、同じまたは異なる抗原のものであってもよい)と同時に結合することができる。DARTは、加えて、1価、2価、3価、4価、5価、6価などであってもよく、したがって、1、2、3、4、5、6つまたはそれより多くの分子と同時に結合することができる。DARTのこれら2つの特性(すなわち、特異性の程度および原子価を組み合わせ、例えば、4価の(すなわち、エピトープの4つのセットと結合することが可能な)二重特異性抗体(すなわち、2つのエピトープと結合することが可能な)などを産生することができる。DART分子は、参照によりそれらの全体が本明細書に組み入れられる、PCT国際公開第2006/113665号パンフレット、

10

20

30

40

50

国際公開第2008/157379号パンフレット、および国際公開第2010/080538号パンフレットに開示されている。

【0074】

本開示の二重特異性抗体の一部の実施形態において、結合特異性の1つは、グリコMUC1に向けられ、他方は、免疫エフェクター細胞上で発現される抗原に向けられる。用語「免疫エフェクター細胞」または「エフェクター細胞」は、本明細書で使用される場合、活性化されて標的細胞の生存能に影響を与えることができる、哺乳類免疫系中の細胞の天然レパートリー内の細胞を指す。免疫エフェクター細胞としては、リンパ球系細胞、例えば、ナチュラルキラー（NK）細胞、細胞傷害性T細胞を含むT細胞、またはB細胞が挙げられることに加えて、単球またはマクロファージ、樹状細胞および好中性顆粒球などの骨髓系細胞も、免疫エフェクター細胞とみなすことができる。したがって、前記エフェクター細胞は、好ましくは、NK細胞、T細胞、B細胞、単球、マクロファージ、樹状細胞または好中性顆粒球である。異常な細胞へのエフェクター細胞の補充は、エフェクター細胞が、それらが補充される異常な細胞を直接致死させるか、またはその致死を間接的に開始させることができるように、免疫エフェクター細胞が、異常な標的細胞に近接して取り込まれることを意味する。非特異的な相互作用を回避するために、本開示の二重特異性抗体は、体内の他の細胞と比較して、これらの免疫エフェクター細胞によって少なくとも過剰発現される免疫エフェクター細胞上の抗原を特異的に認識することが好ましい。免疫エフェクター細胞上に提示される標的抗原としては、CD3、CD8、CD16、CD25、CD28、CD64、CD89、NKG2DおよびNKP46を挙げることができる。好ましくは、免疫エフェクター細胞上の抗原は、T細胞上で発現されるCD3である。

【0075】

「CD3」は、本明細書で使用される場合、別段の指定がない限り、霊長類（例えばヒト）、非ヒト霊長類（例えばカニクイザル）およびげっ歯類（例えばマウスおよびラット）などの哺乳動物を含むあらゆる脊椎動物源由来のあらゆる天然CD3を指す。この用語は、「全長」のプロセシングされていないCD3に加えて、細胞中でのプロセシングに起因するCD3のあらゆる形態を包含する。この用語はまた、CD3の天然に存在するバリエーション、例えば、スプライスバリエーションまたは対立遺伝子バリエーションも包含する。免疫エフェクター細胞上の最も好ましい抗原は、CD3イプシロン鎖である。この抗原は、異常な細胞へのT細胞の補充において非常に有効であることが示されている。したがって、本開示の二重特異性抗体は、好ましくは、CD3イプシロン鎖を特異的に認識する。ヒトCD3イプシロンのアミノ酸配列は、UniProt (www.uniprot.org) 受託番号P07766（バージョン144）、またはNCBI (www.ncbi.nlm.nih.gov/) RefSeq NP_000724.1で示される。カニクイザル [カニクイザル (*Macaca fascicularis*)] CD3イプシロンのアミノ酸配列は、NCBI GenBank 番号BAB71849.1で示される。ヒトの治療的使用の場合、CD3結合ドメインがヒトCD3（例えば、ヒトCD3イプシロン鎖）に特異的に結合する二重特異性抗体が使用される。非ヒト動物や細胞株における前臨床試験の場合、前臨床試験に利用される種（例えば、霊長類の試験の場合、カニクイザルCD3）においてCD3結合ドメインがCD3に特異的に結合する二重特異性抗体を使用することができる。

【0076】

本明細書で使用される場合、特定の種由来の標的抗原に「特異的に結合する」またはそれを「特異的に認識する」結合ドメインは、他の種由来の抗原への結合またはその認識を除外せず、したがって、結合ドメインの1つまたは複数が種間の交差反応性を有する抗体を包含する。例えば、ヒトCD3に「特異的に結合する」またはそれを「特異的に認識する」CD3結合ドメインはまた、カニクイザル (*cyomolgus*) CD3に結合する、またはそれを認識することもでき、逆もまた同様である。

【0077】

一部の実施形態において、本開示の二重特異性抗体は、CD3のエピトープとの結合に関して、モノクローナル抗体H2C（PCT国際公開第2008/119567号パンフ

10

20

30

40

50

レットに記載される)と競合することができる。他の実施形態において、本開示の二重特異性抗体は、CD3のエピトープとの結合に関して、モノクローナル抗体V9 (Rodriguez et al., 1992, Int J Cancer Suppl 7:45-50および米国特許第6,054,297号明細書に記載される)と競合することができる。さらに他の実施形態において、本開示の二重特異性抗体は、CD3のエピトープとの結合に関して、モノクローナル抗体FN18 (Nooij et al., 1986, Eur J Immunol 19:981-984に記載される)と競合することができる。さらに他の実施形態において、本開示の二重特異性抗体は、CD3のエピトープとの結合に関して、モノクローナル抗体SP34 (Pessano et al., 1985, EMBO J 4:337-340に記載される)と競合することができる。

【0078】

本開示の抗グリコMUC1抗体は、誘導体化された抗体を含む。例えば、ただし限定されないが、誘導体化された抗体は、典型的には、グリコシル化、アセチル化、ペグ化、リン酸化、アミド化、公知の保護／ブロック基による誘導体化、タンパク質分解による切断、細胞リガンドまたは他のタンパク質への連結によって改変される。様々な化学修飾のいずれも、これらに限定されないが、特異的な化学的切断、アセチル化、ホルミル化、ツニカマイシンの代謝合成などの公知の技術によって行うことができる。加えて、誘導体は、例えばambroxの技術を使用して、1つまたは複数の非天然アミノ酸を含有していてもよい(例えば、Wolfson, 2006, Chem. Biol. 13(10):1011-2を参照)。

【0079】

抗グリコMUC1抗体または結合フラグメントは、少なくとも1つの定常領域が媒介する生物学的なエフェクター機能を変更するようにその配列が改変されている抗体またはフラグメントであり得る。例えば、一部の実施形態において、抗グリコMUC1抗体は、改変されていない抗体と比べて、少なくとも1つの定常領域が媒介する生物学的なエフェクター機能を低減するように改変されてもよく、例えば、Fc受容体(FcγR)への結合を低減するように改変される。FcγRへの結合は、FcγR相互作用に必要な特定の領域で抗体の免疫グロブリン定常領域セグメントを突然変異させることによって低減させることができる(例えば、Canfield and Morrison, 1991, J. Exp. Med. 173:1483-1491; およびLund et al., 1991, J. Immunol. 147:2657-2662を参照)。抗体のFcγR結合能の低減はまた、FcγR相互作用を頼る他のエフェクター機能、例えばオプソニン化、貪食および抗原依存性細胞傷害(「ADCC」)も低減することができる。

【0080】

本明細書に記載される抗グリコMUC1抗体または結合フラグメントは、少なくとも1つの定常領域が媒介する生物学的なエフェクター機能を獲得するか、または改変されていない抗体に比べて改善する、例えば、FcγR相互作用を強化するように改変された抗体および／または結合フラグメントを含む(例えば、米国特許出願公開第2006/0134709号明細書を参照)。例えば、本開示の抗グリコMUC1抗体は、対応する野生型定常領域より大きい親和性でFcγRIIA、FcγRIIBおよび／またはFcγRIIAと結合する定常領域を有していてもよい。

【0081】

したがって、本開示の抗体は、オプソニン化、貪食、またはADCCの増加または減少を引き起こす生物学的活性における変更を有していてもよい。このような変更は、当業界において公知である。例えば、ADCC活性を低減する抗体における改変は、米国特許第5,834,597号明細書に記載されている。例示的なADCCを低下させるバリエーションは、残基236が欠失し、残基234、235および237(EUの番号付けを使用)がアラニンで置換された「突然変異体3」に相当する(米国特許第5,834,597号明細書の図4に示される)。別の例示的なADCCを低減するバリエーションは、アミノ酸突然変異L234A、L235AおよびP329G(「P329G LALA」)を含む。アミノ酸置換の「P329G LALA」の組合せは、参照によりその全体が本明細書に組み入れられるPCT公報WO2012/130831号に記載されたように、ヒトIgG1 FcドメインのFcγ受容体結合(同様に補体結合も)をほぼ完全に破壊する。W

10

20

30

40

50

02012/130831はまた、このような突然変異体Fcドメインの調製方法、およびその特性、例えばFc受容体結合またはエフェクター機能を決定するための方法も記載している。

【0082】

一部の実施形態において、本開示の抗グリコMUC1抗体は、低いレベルのフコースを有するか、またはフコースを欠く。フコースを欠く抗体は、特に低用量の抗体で、ADCC活性の強化との相関が示されている。Shields et al., 2002, J. Biol. Chem. 277:26733-26740; Shinkawa et al., 2003, J. Biol. Chem. 278:3466-73を参照されたい。フコースが少ない抗体を調製する方法としては、ラット骨髓腫YB2/O細胞(ATCC CRL 1662)での増殖が挙げられる。YB2/O細胞は、ポリペプチドのフコシル化に必要な酵素である α -1, 6-フコシルトランスフェラーゼをコードするFUT8 mRNAを低いレベルで発現する。

10

【0083】

一部の実施形態において、抗グリコMUC1抗体または結合フラグメントは、バイセクト型オリゴ糖を含み、例えば、Fcドメインに結合した2分岐オリゴ糖がGlcNAcによって二分されているものを含む。このようなバリエーションは、上述したように、低減されたフコシル化および/または改善されたADCC機能を有し得る。このような抗体バリエーションの例は、例えば、Umana et al., 1999, Nat Biotechnol 17:176-180; Ferrara et al., 2006, Biotechnol Bioeng 93: 851-861; WO 99/54342; WO 2004/065540; およびWO 2003/011878に記載されている。

20

【0084】

さらに別の態様において、抗グリコMUC1抗体または結合フラグメントは、例えば、FcRn相互作用に参与する特定の領域で免疫グロブリン定常領域セグメントを突然変異させることによって、胎児Fc受容体、FcRnへのその結合親和性を増加または減少させる改変を含む（例えば、国際公開第2005/123780号パンフレットを参照）。特定の実施形態において、IgGクラスの抗グリコMUC1抗体は、重鎖定常領域のアミノ酸残基250、314、および428の少なくとも1つが、例えば250および428位、または250および314位、または314および428位、または250、314、および428位で、単独で、またはそれらのいずれかの組合せで置換されるように突然変異しており、具体的な組合せは250および428位である。250位の場合、置換されるアミノ酸残基は、スレオニン以外のいずれのアミノ酸残基であってもよく、例えば、これらに限定されないが、アラニン、システイン、アスパラギン酸、グルタミン酸、フェニルアラニン、グリシン、ヒスチジン、イソロイシン、リシン、ロイシン、メチオニン、アスパラギン、プロリン、グルタミン、アルギニン、セリン、バリン、トリプトファン、またはチロシンなどであってもよい。314位の場合、置換されるアミノ酸残基は、ロイシン以外のいずれのアミノ酸残基であってもよく、例えば、これらに限定されないが、アラニン、システイン、アスパラギン酸、グルタミン酸、フェニルアラニン、グリシン、ヒスチジン、イソロイシン、リシン、メチオニン、アスパラギン、プロリン、グルタミン、アルギニン、セリン、スレオニン、バリン、トリプトファン、またはチロシンなどであってもよい。428位の場合、置換されるアミノ酸残基は、メチオニン以外のいずれのアミノ酸残基であってもよく、例えば、これらに限定されないが、アラニン、システイン、アスパラギン酸、グルタミン酸、フェニルアラニン、グリシン、ヒスチジン、イソロイシン、リシン、ロイシン、アスパラギン、プロリン、グルタミン、アルギニン、セリン、スレオニン、バリン、トリプトファン、またはチロシンなどであってもよい。好適なアミノ酸置換の具体的な組合せは、参照により本明細書に組み入れられる米国特許第7, 217, 797号明細書の表1で特定されている。このような突然変異は、FcRnへの結合を増加させ、それにより抗体を分解から保護し、その半減期を増加させる。

30

40

【0085】

さらに他の態様において、本開示の抗原結合フラグメントの抗グリコMUC1抗体は、例えばJung and Pluckthun, 1997, Protein Engineering 10:9, 959-966; Yazaki

50

et al., 2004, Protein Eng. Des. Sel. 17(5):481-9. Epub 2004 Aug. 17 ; および米国特許出願第 2 0 0 7 / 0 2 8 0 9 3 1 号明細書に記載されるように、その高度可変領域の 1 つまたは複数に挿入された 1 つまたは複数のアミノ酸を有する。

【 0 0 8 6 】

診断適用に特に有用なさらに他の態様において、本開示の抗原結合フラグメントの抗グリコMUC1抗体は、検出可能な部分に取り付けられている。検出可能な部分としては、放射性部分、比色分子、蛍光部分、化学発光部分、抗原、酵素、検出可能なビーズ（例えば磁気または高電子密度（例えば、金）ビーズ）、または別の分子に結合する分子（例えば、ビオチンまたはストレプトアビジン））が挙げられる。

【 0 0 8 7 】

放射性同位体または放射性核種は、 ^3H 、 ^{14}C 、 ^{15}N 、 ^{35}S 、 ^{90}Y 、 ^{99}Tc 、 ^{111}In 、 ^{125}I 、 ^{131}I を挙げることができる。

【 0 0 8 8 】

蛍光標識としては、ローダミン、ランタニド蛍光、フルオレセインおよびその誘導体、蛍光色素、GFP（GFPは「Green Fluorescent Protein（緑色蛍光タンパク質）」を表す）、ダンシル、ウンベリフェロン、フィコエリトリン、フィコシアニン、アロフィコシアニン、o-フタルアルデヒド（phthaldehyde）、およびフルオレサミンを挙げることができる。

【 0 0 8 9 】

酵素標識としては、ホースラディッシュペルオキシダーゼ、 β ガラクトシダーゼ、ルシフェラーゼ、アルカリホスファターゼ、グルコース-6-リン酸デヒドロゲナーゼ（「G6PDH」）、アルファーD-ガラクトシダーゼ、グルコースオキシダーゼ、グルコースアミラーゼ、炭酸脱水酵素、アセチルコリンエステラーゼ、リゾチーム、リンゴ酸デヒドロゲナーゼおよびペルオキシダーゼを挙げることができる。

【 0 0 9 0 】

化学発光標識または化学発光物質（chemiluminescer）、例えばイソルミノール、ルミノールおよびジオキセタン

【 0 0 9 1 】

他の検出可能な部分としては、ビオチン、ジゴキシゲニンまたは5-ブロモデオキシウリジンなどの分子が挙げられる。

【 0 0 9 2 】

特定の態様において、本開示の抗グリコMUC1抗体または抗原結合フラグメントは、1AGまたは1AGの重鎖および軽鎖可変領域を含む抗体もしくは抗原結合フラグメント（それぞれ配列番号1および2）と競合する。

【 0 0 9 3 】

他の態様において、本開示の抗グリコMUC1抗体または抗原結合フラグメントは、4AGまたは4AGの重鎖および軽鎖可変領域を含む抗体もしくは抗原結合フラグメント（それぞれ配列番号23および24）と競合する。

【 0 0 9 4 】

競合は、1AGまたは4AGと結合するグリコMUC1エピトープまたは1AGまたは4AGと結合するエピトープを含有するグリコシル化MUC1ペプチド、例えば、太字と下線の文字で示されるセリンおよびスレオニン残基においてGalNAcでグリコシル化された15-merのペプチドRPAPGSTAPP AHGV T（配列番号99）を発現する細胞でアッセイすることができる。対照として、エピトープまたはグリコシル化されていないペプチドを発現しない細胞を使用することができる。

【 0 0 9 5 】

競合アッセイを行うことができる細胞としては、これらに限定されないが、乳がん細胞株MCF7またはT47D、およびグリコMUC1エピトープを発現するように操作される組換え細胞が挙げられる。1つの非限定的な例において、CHO IdID細胞は、UDP-Gal/GalNAcエピメラーゼを欠き、それぞれGalNAcおよびGalの

10

20

30

40

50

外因性の付加の非存在下でGalNAcのO-グリコシル化およびガラクトシル化が不十分なものであり、これは、MUC1を発現するように操作され、GalNAcの非存在または存在下で増殖し、後者の場合、1AGおよび4AGが結合するMUC1のTnグリコフォームを発現する細胞を生じる。MUC1のグリコシル化されていない形態を発現する細胞は、陰性対照として使用することができる。

【0096】

競合に関するアッセイとしては、これらに限定されないが、放射活性物質標識によるイムノアッセイ（RIA）、酵素結合免疫吸着測定法（ELISA）、サンドイッチELISA、蛍光活性化セルソーティング（FACS）アッセイおよび表面プラズモン共鳴（例えば、Biacore）アッセイが挙げられる。

10

【0097】

参照抗体と試験抗体との間の抗体競合アッセイ（種またはアイソタイプに関わりなく）を実行することにおいて、最初に、後続の同定が可能になるように、検出可能な標識、例えばフルオロフォア、ビオチンまたは酵素標識（または放射性標識でも）で参照を標識してもよい。この場合、グリコMUC1を発現する細胞は、標識されていない試験抗体とインキュベートされ、標識された参照抗体が添加され、結合した標識の強度が測定される。試験抗体が、オーバーラップするエピトープに結合することによって標識された参照抗体と競合する場合、強度は、試験抗体なしで行われた対照反応と比較して減少すると予想される。

【0098】

20

このアッセイの具体的な実施形態において、アッセイ条件（例えば、特定された細胞密度）下における最大の結合の80%をもたらす標識された参照抗体の濃度（「 $conc_{80\%}$ 」）がまず決定され、競合アッセイは、標識されていない試験抗体の $10 \times conc_{80\%}$ および標識された参照抗体の $conc_{80\%}$ 行われる。

【0099】

阻害は、阻害定数、または K_i として表すことができ、これは、以下の式：

$$K_i = IC_{50} / (1 + [\text{参照Ab濃度}] / K_d)$$

に従って計算され、

式中、 IC_{50} は、参照抗体の結合の50%低減をもたらす試験抗体の濃度であり、 K_d は、参照抗体の解離定数であり、これは、グリコMUC1に対するその親和性の尺度である。本明細書で開示される抗グリコMUC1抗体と競合する抗体は、本明細書に記載されるアッセイ条件下で、10pMから10nMの K_i を有し得る。

30

【0100】

様々な実施形態において、使用される特定のアッセイ条件下で最大の結合の80%である参照抗体濃度、および参照抗体濃度の10倍高い試験抗体濃度で、少なくとも約20%またはそれより多く、例えば、少なくとも約20%、30%、40%、50%、60%、70%、80%、90%、95%もしくはそれよりさらに多く、または前述の値のいずれかの間の範囲のパーセンテージで、試験抗体が参照抗体の結合を減少させる場合、試験抗体は参照抗体と競合するとみなされる。

【0101】

40

競合アッセイの一例では、グリコシル化MUC1である15-merのペプチドを、プレートをペプチドの溶液と接触させることによって（例えば、PBS中 $1 \mu\text{g/mL}$ の濃度で4℃で一晩）、固体表面、例えばマイクロウェルプレート上に接着させる。プレートを洗浄し（例えば、PBS中の0.1% Tween 20）、ブロックする（例えば、Superblock、Thermo Scientific、Rockford, ILで）。ELISA緩衝液（例えば、PBS中の1% BSAおよび0.1% Tween 20）中の飽和未満の量のビオチン化1AGおよび4AG（例えば、 80 ng/mL の濃度での）および連続希釈した（例えば、 $2.8 \mu\text{g/mL}$ 、 $8.3 \mu\text{g/mL}$ 、または $25 \mu\text{g/mL}$ の濃度での）標識されていない1AGおよび4AG（「参照」抗体）または競合する抗グリコMUC1抗体（「試験」抗体）抗体の混合物をウェルに添加し、プレートを

50

穏やかに振盪しながら1時間インキュベートする。プレートを洗浄し、各ウェルにE L I S A緩衝液で希釈した $1\mu\text{g}/\text{mL}$ のHRPがコンジュゲートしたストレプトアビジンを添加し、プレートを1時間インキュベートする。プレートを洗浄し、基質（例えば、T M B、Bio f x Laboratories Inc.、Owings Mills、M D）の添加によって結合した抗体を検出した。停止緩衝液（例えば、Bio F X Stop試薬、Bio f x Laboratories Inc.、Owings Mills、M D）の添加によって反応を止め、マイクロプレートリーダー（例えば、V E R S A m a x、M o l e c u l a r D e v i c e s、S u n n y v a l e、C A）を使用して、吸光度を 650nm で測定する。

【0102】

1 A Gおよび4 A Gと別の抗グリコM U C 1抗体との競合を試験するのに、この競合アッセイにおけるバリエーションも使用することができる。例えば、特定の態様において、抗グリコM U C 1抗体は参照抗体として使用され、1 A Gおよび4 A Gは試験抗体として使用される。加えて、グリコシル化M U C 1である15-merのペプチドの代わりに、培養中に細胞表面上で（例えば上述の細胞型の1つの表面上で）発現される膜結合型グリコM U C 1を使用してもよい。一般的に、約 10^4 から 10^6 個の形質転換体、例えば、約 10^5 個の形質転換体を使用される。競合アッセイの他の様式は当業界において公知であり、採用することができる。

【0103】

様々な実施形態において、本開示の抗グリコM U C 1抗体は、抗グリコM U C 1抗体が、 $0.08\mu\text{g}/\text{mL}$ 、 $0.4\mu\text{g}/\text{mL}$ 、 $2\mu\text{g}/\text{mL}$ 、 $10\mu\text{g}/\text{mL}$ 、 $50\mu\text{g}/\text{mL}$ 、 $100\mu\text{g}/\text{mL}$ の濃度で、または前述の値のいずれかの間の範囲の濃度で（例えば、 $2\mu\text{g}/\text{mL}$ から $10\mu\text{g}/\text{mL}$ の範囲の濃度で）使用される場合、標識された1 A Gおよび4 A Gの結合を、少なくとも40%、少なくとも50%、少なくとも60%、少なくとも70%、少なくとも80%、少なくとも90%、または前述の値のいずれかの間の範囲のパーセンテージで低減させる（例えば、本開示の抗グリコM U C 1抗体は、標識された1 A Gおよび4 A Gの結合を、50%から70%低減させる）。

【0104】

他の実施形態において、1 A Gおよび4 A Gが、 $0.4\mu\text{g}/\text{mL}$ 、 $2\mu\text{g}/\text{mL}$ 、 $10\mu\text{g}/\text{mL}$ 、 $50\mu\text{g}/\text{mL}$ 、 $250\mu\text{g}/\text{mL}$ の濃度で、または前述の値のいずれかの間の範囲の濃度で（例えば、 $2\mu\text{g}/\text{mL}$ から $10\mu\text{g}/\text{mL}$ の範囲の濃度で）使用される場合、1 A Gおよび4 A Gは、本開示の標識された抗グリコM U C 1抗体の結合を、少なくとも40%、少なくとも50%、少なくとも60%、少なくとも70%、少なくとも80%、少なくとも90%、または前述の値のいずれかの間の範囲のパーセンテージで低減させる（例えば、1 A Gおよび4 A Gは、本開示の標識された抗グリコM U C 1抗体の結合を、50%から70%低減させる）。

【0105】

前述のアッセイにおいて、1 A Gおよび4 A G抗体は、1 A Gおよび4 A GのC D Rまたは重鎖および軽鎖可変領域を含むあらゆる抗体または抗原結合フラグメント、例えば1 A Gおよび4 A Gのヒト化またはキメラカウンターパートで置き換えることができる。

【0106】

特定の態様において、本開示の抗グリコM U C 1抗体または抗原結合フラグメントは、1 A Gまたは4 A Gのエピトープと同じかまたは類似したエピトープを有する。本開示の抗グリコM U C 1抗体または抗原結合フラグメントのエピトープは、例えば実施例9に記載されたように、アラニンスキャニングを実行することによって特徴付けることができる。実施例9は、それぞれM U C 1ペプチドT A P P A H G V T S A P D T R P A P G S T A P P A H G V（配列番号105）と、13~24位のうちの1つにおけるアラニン点突然変異によって（またはM U C 1ペプチドがアラニンを有する場合、グリシン点突然変異によって）異なる12種の糖ペプチド（配列番号106~117）のライブラリーを記載している。ペプチドのそれぞれへの抗体または抗原結合フラグメントの結合をE L I S A

10

20

30

40

50

で測定することによって、抗体または抗原結合フラグメントのエピトープをマッピングすることができる。

【0107】

一部の実施形態において、本開示の抗グリコMUC1抗体または抗原結合フラグメントは、ELISAによって測定した場合、ペプチドTAPP AHGV TSAPDTRPAPGAT APP AHGV（配列番号113）に結合するより高い親和性で、ペプチドRPA PG ST APP AHGV T（配列番号99）に結合し、前記ペプチドにおいて、太字と下線の文字で示されるセリンおよびスレオニン残基は、GalNAcでグリコシル化された残基を示す。

【0108】

一部の実施形態において、本開示の抗グリコMUC1抗体または抗原結合フラグメントは、ELISAによって測定した場合、ペプチドTAPP AHGV TSAPDTRPAPGAT APP AHGV（配列番号113）およびTAPP AHGV TSAPDTRPAPGSA APP AHGV（配列番号114）の両方に結合するより高い親和性で、ペプチドRPA PG ST APP AHGV T（配列番号99）に結合し、前記ペプチドにおいて、太字と下線の文字で示されるセリンおよびスレオニン残基は、GalNAcでグリコシル化された残基を示す。

【0109】

一部の実施形態において、本開示の抗グリコMUC1抗体または抗原結合フラグメントは、ELISAによって測定した場合、ペプチドTAPP AHGV TSAPDTRPAPGAT APP AHGV（配列番号113）、TAPP AHGV TSAPDTRPAPGSA APP AHGV（配列番号114）、およびTAPP AHGV TSAPDTRPAPGST GPP AHGV（配列番号115）のそれぞれに結合するより高い親和性で、ペプチドRPA PG ST APP AHGV T（配列番号99）に結合し、前記ペプチドにおいて、太字と下線の文字で示されるセリンおよびスレオニン残基は、GalNAcでグリコシル化された残基を示す。

【0110】

一部の実施形態において、本開示の抗グリコMUC1抗体または抗原結合フラグメントは、ELISAによって測定した場合、ペプチドTAPP AHGV TSAPDTRPAPGAT APP AHGV（配列番号113）、TAPP AHGV TSAPDTRPAPGSA APP AHGV（配列番号114）、TAPP AHGV TSAPDTRPAPGST GPP AHGV（配列番号115）、およびTAPP AHGV TSAPDTRPAPGST AAP AHGV（配列番号116）のそれぞれに結合するより高い親和性で、ペプチドRPA PG ST APP AHGV T（配列番号99）に結合し、前記ペプチドにおいて、太字と下線の文字で示されるセリンおよびスレオニン残基は、GalNAcでグリコシル化された残基を示す。

【0111】

一部の実施形態において、本開示の抗グリコMUC1抗体または抗原結合フラグメントは、ELISAによって測定した場合、ペプチドTAPP AHGV TSAPDTRPAPGAT APP AHGV（配列番号113）、TAPP AHGV TSAPDTRPAPGSA APP AHGV（配列番号114）、TAPP AHGV TSAPDTRPAPGST GPP AHGV（配列番号115）、TAPP AHGV TSAPDTRPAPGST AAP AHGV（配列番号116）、およびTAPP AHGV TSAPDTRPAPGST AAP AHGV（配列番号117）のそれぞれに結合するより高い親和性で、ペプチドRPA PG ST APP AHGV T（配列番号99）に結合し、前記ペプチドにおいて、太字と下線の文字で示されるセリンおよびスレオニン残基は、GalNAcでグリコシル化された残基を示す。

【0112】

一部の実施形態において、本開示の抗グリコMUC1抗体または抗原結合フラグメントは、ELISAによって測定した場合、ペプチドTAPP AHGV TSAPDTRPAP

10

20

30

40

50

A S T A P P A H G V (配列番号 112)、T A P P A H G V T S A P D T R P A G A
T A P P A H G V (配列番号 113)、および T A P P A H G V T S A P D T R P A G
S A A P P A H G V (配列番号 114) のそれぞれに結合するより高い親和性で、ペプチ
ド R P A P G S T A P P A H G V T (配列番号 99) に結合し、前記ペプチドにおいて、
太字と下線の文字で示されるセリンおよびスレオニン残基は、G a l N A c でグリコシル
化された残基を示す。

【0113】

一部の実施形態において、本開示の抗グリコMUC1抗体または抗原結合フラグメント
は、E L I S A によって測定した場合、ペプチド T A P P A H G V T S A P D T R P A A
G S T A P P A H G V (配列番号 111)、T A P P A H G V T S A P D T R P A P A S
T A P P A H G V (配列番号 112)、T A P P A H G V T S A P D T R P A P G A T A
P P A H G V (配列番号 113)、および T A P P A H G V T S A P D T R P A P G S A
A P P A H G V (配列番号 114) のそれぞれに結合するより高い親和性で、ペプチド R
P A P G S T A P P A H G V T (配列番号 99) に結合し、前記ペプチドにおいて、太字
と下線の文字で示されるセリンおよびスレオニン残基は、G a l N A c でグリコシル化され
た残基を示す。

10

【0114】

一部の実施形態において、本開示の抗グリコMUC1抗体または抗原結合フラグメント
は、E L I S A によって測定した場合、ペプチド T A P P A H G V T S A P D T R P G P
G S T A P P A H G V (配列番号 110)、T A P P A H G V T S A P D T R P A A G S
T A P P A H G V (配列番号 111)、T A P P A H G V T S A P D T R P A P A S T A
P P A H G V (配列番号 112)、T A P P A H G V T S A P D T R P A P G A T A P P
A H G V (配列番号 113)、および T A P P A H G V T S A P D T R P A P G S A A P
P A H G V (配列番号 114) のそれぞれに結合するより高い親和性で、ペプチド R P A
P G S T A P P A H G V T (配列番号 99) に結合し、前記ペプチドにおいて、太字と下
線の文字で示されるセリンおよびスレオニン残基は、G a l N A c でグリコシル化された
残基を示す。

20

【0115】

一部の実施形態において、本開示の抗グリコMUC1抗体または抗原結合フラグメント
は、E L I S A によって測定した場合、ペプチド T A P P A H G V T S A P D T R P G P
G S T A P P A H G V (配列番号 110)、T A P P A H G V T S A P D T R P A A G S
T A P P A H G V (配列番号 111)、T A P P A H G V T S A P D T R P A P A S T A
P P A H G V (配列番号 112)、T A P P A H G V T S A P D T R P A P G A T A P P
A H G V (配列番号 113)、T A P P A H G V T S A P D T R P A P G S A A P P A H
G V (配列番号 114)、および T A P P A H G V T S A P D T R P A P G S T G P P A
H G V (配列番号 115) のそれぞれに結合するより高い親和性で、ペプチド R P A P G
S T A P P A H G V T (配列番号 99) に結合し、前記ペプチドにおいて、太字と下線の
文字で示されるセリンおよびスレオニン残基は、G a l N A c でグリコシル化された残基
を示す。

30

【0116】

一部の実施形態において、本開示の抗グリコMUC1抗体または抗原結合フラグメント
は、E L I S A によって測定した場合、ペプチド T A P P A H G V T S A P D T R P G P
G S T A P P A H G V (配列番号 110)、T A P P A H G V T S A P D T R P A A G S
T A P P A H G V (配列番号 111)、T A P P A H G V T S A P D T R P A P A S T A
P P A H G V (配列番号 112)、T A P P A H G V T S A P D T R P A P G A T A P P
A H G V (配列番号 113)、T A P P A H G V T S A P D T R P A P G S A A P P A H
G V (配列番号 114)、T A P P A H G V T S A P D T R P A P G S T G P P A H G V
(配列番号 115)、および T A P P A H G V T S A P D T R P A P G S T A A P A H G
V (配列番号 116) のそれぞれに結合するより高い親和性で、ペプチド R P A P G S T
A P P A H G V T (配列番号 99) に結合し、前記ペプチドにおいて、太字と下線の文字

40

50

で示されるセリンおよびスレオニン残基は、G a l N A cでグリコシル化された残基を示す。

【0117】

一部の実施形態において、本開示の抗グリコMUC1抗体または抗原結合フラグメントは、ELISAによって測定した場合、ペプチドTAPP AHGV TSAPD TRAP GSTAPP AHGV（配列番号109）、TAPP AHGV TSAPD TRPG PGSTAPP AHGV（配列番号110）、TAPP AHGV TSAPD TRPA AGSTAPP AHGV（配列番号111）、TAPP AHGV TSAPD TRPA PASTAPP AHGV（配列番号112）、TAPP AHGV TSAPD TRPA PGATAPP AHGV（配列番号113）、およびTAPP AHGV TSAPD TRPA PGSAAPP AHGV（配列番号114）のそれぞれに結合するより高い親和性で、ペプチドRPAP GSTAPP AHGV T（配列番号99）に結合し、前記ペプチドにおいて、太字と下線の文字で示されるセリンおよびスレオニン残基は、G a l N A cでグリコシル化された残基を示す。

10

【0118】

一部の実施形態において、本開示の抗グリコMUC1抗体または抗原結合フラグメントは、ELISAによって測定した場合、ペプチドTAPP AHGV TSAPD TAPAP GSTAPP AHGV（配列番号108）、TAPP AHGV TSAPD TRAP PGSTAPP AHGV（配列番号109）、TAPP AHGV TSAPD TRPG PGSTAPP AHGV（配列番号110）、TAPP AHGV TSAPD TRPA AGSTAPP AHGV（配列番号111）、TAPP AHGV TSAPD TRPA PASTAPP AHGV（配列番号112）、TAPP AHGV TSAPD TRPA PGATAPP AHGV（配列番号113）およびTAPP AHGV TSAPD TRPA PGSAAPP AHGV（配列番号114）のそれぞれに結合するより高い親和性で、ペプチドRPAP GSTAPP AHGV T（配列番号99）に結合し、前記ペプチドにおいて、太字と下線の文字で示されるセリンおよびスレオニン残基は、G a l N A cでグリコシル化された残基を示す。

20

【0119】

特定の態様において、本開示の抗グリコMUC1抗体または抗原結合フラグメントは、表1Aまたは表1Bに記載の重鎖および／または軽鎖可変配列（またはヌクレオチド配列によってコードされたもの）を含む。他の態様において、本開示の抗グリコMUC1抗体または抗原結合フラグメントは、表1A、表1B、表1C、表1D、表1E、表2A、表2B、表2C、表3A、または表3Bに記載の重鎖および／または軽鎖CDR配列（またはヌクレオチド配列によってコードされたもの）を含む。このような抗グリコMUC1抗体および抗原結合フラグメントのフレームワーク配列は、表1Aまたは表1Bに記載のVHおよびVL配列の天然マウスのフレームワーク配列であってもよいし、または非天然（例えば、ヒト化またはヒト）フレームワーク配列であってもよい。

30

【0120】

さらに他の態様において、本開示は、それぞれ配列番号1および2と少なくとも95%、98%、99%、または99.5%の配列同一性を有する重鎖および軽鎖可変領域を有する抗MUC1抗体または抗原結合フラグメントを提供する。

40

【0121】

さらに他の態様において、本開示は、それぞれ配列番号23および24の少なくとも95%、98%、99%、または99.5%の配列同一性を有する重鎖および軽鎖可変領域を有する抗MUC1抗体または抗原結合フラグメントを提供する。

【0122】

さらに他の態様において、本開示の抗グリコMUC1抗体または抗原結合フラグメントは、単鎖可変フラグメント（scFv）である。例示的なscFvは、重鎖可変フラグメントのN末端から軽鎖可変フラグメントまでを含む。一部の実施形態において、scFv重鎖可変フラグメントおよび軽鎖可変フラグメントは、4～15アミノ酸のリンカー配列に共有結合している。scFvは、二重特異性T細胞エンゲージャーの形態であってもよい。

50

いし、またはキメラ抗原受容体（CAR）内であってもよい。

【0123】

6.2 抗体-薬物コンジュゲート

本開示の別の態様は、本開示の抗グリコMUC1抗体および抗原結合フラグメントを含む抗体薬物コンジュゲート（ADC）に関する。ADCは、一般的に、1つまたは複数のリンカーを介して1つまたは複数の細胞傷害性物質および／または細胞増殖抑制性物質がそれに連結された、本明細書に記載される抗グリコMUC1抗体および／または結合フラグメントを含む。具体的な実施形態において、ADCは、構造式（I）：

〔D-L-XY〕_n-Ab

による化合物またはその塩であり、式中、各「D」は、それぞれ独立して、細胞傷害性物質および／または細胞増殖抑制性物質（「薬物」）を表し；各「L」は、それぞれ独立して、リンカーを表し；「Ab」は、抗グリコMUC1抗原結合ドメイン、例えば本明細書に記載される抗グリコMUC1抗体または結合フラグメントを表し；各「XY」は、リンカー上の官能基R^xと抗体上の「相補的」官能基R^yとの間で形成された連結を表し、nは、ADCに連結された薬物の数、またはADCの薬物対抗体の比率（DAR）を表す。

【0124】

ADCを含み得る様々な抗体（Ab）の具体的な実施形態は、上述した抗グリコMUC1抗体および／または結合フラグメントの様々な実施形態を含む。

【0125】

構造式（I）のADCおよび／または塩の一部の具体的な実施形態において、各Dが同じであり、および／または各Lが同じである。

【0126】

本開示の抗グリコMUC1 ADCを構成し得る細胞傷害性物質および／または細胞増殖抑制性物質（D）およびリンカー（L）に加えて、ADCに連結された多数の細胞傷害性物質および／または細胞増殖抑制性物質の具体的な実施形態を、以下でより詳細に説明する。

【0127】

6.2.1. 細胞傷害性物質および／または細胞増殖抑制性物質

細胞傷害性物質および／または細胞増殖抑制性物質は、細胞、特にがんおよび／または腫瘍細胞の増殖および／または複製を阻害する、および／またはそのような細胞を致死させることがわかっているあらゆる薬剤であり得る。細胞傷害性および／または細胞増殖抑制特性を有する多数の薬剤が文献公知である。細胞傷害性物質および／または細胞増殖抑制性物質のクラスの非限定的な例としては、一例として、これらに限定されないが、放射性核種、アルキル化剤、トポイソメラーゼI阻害剤、トポイソメラーゼII阻害剤、DNA挿入剤（例えば、副溝結合剤、例えば副溝バインダー）、RNA/DNA代謝拮抗物質、細胞周期モジュレーター、キナーゼ阻害剤、タンパク質合成阻害剤、ヒストンデアセチラーゼ阻害剤、ミトコンドリア阻害剤、および抗有糸分裂剤が挙げられる。

【0128】

これらの様々なクラスのうち特定のものの範囲内の薬剤の具体的な非限定的な例を以下に示す。

【0129】

アルキル化剤：アサレー（asaley）（（L-ロイシン、N-[N-アセチル-4-[ビス（2-クロロエチル）アミノ]-DL-フェニルアラニル]-、エチルエステル；NSC167780；CAS登録番号3577897））；AZQ（（1，4-シクロヘキサジエン-1，4-ジカルバミン酸、2，5-ビス（1-アジリジニル）-3，6-ジオキソ-、ジエチルエステル；NSC182986；CAS登録番号57998682））；BCNU（（N，N'-ビス（2-クロロエチル）-N-ニトロソウレア；NSC409962；CAS登録番号154938））；ブスルファン（1，4-ブタンジオールジメタンスルホネート；NSC750；CAS登録番号55981）；（カルボキシフタラト）白金（NSC27164；CAS登録番号65296813）；CBDCA（（cis

10

20

30

40

50

ー (1, 1-シクロブタンジカルボキシラト) ジアンミン白金 (II)) ; NSC 241240 ; CAS 登録番号 41575944) ; CCNU ((N- (2-クロロエチル) -N'-シクロヘキシル-N-ニトロソウレア ; NSC 79037 ; CAS 登録番号 13010474)) ; CHIP (イプロプラチン ; NSC 256927) ; クロラムブシル (NSC 3088 ; CAS 登録番号 305033) ; クロロゾトシン ((2- [[(2-クロロエチル) ニトロソアミノ] カルボニル] アミノ] -2-デオキシ-D-グルコピラノース ; NSC 178248 ; CAS 登録番号 54749905)) ; シスプラチン (シスプラチン ; NSC 119875 ; CAS 登録番号 15663271) ; クロメソン (clo mesone) (NSC 338947 ; CAS 登録番号 88343720) ; シアノモルホリノドキシソルピシン (NSC 357704 ; CAS 登録番号 88254073) ; シクロジソン (cyclodisone) (NSC 348948 ; CAS 登録番号 99591738) ; ジアンヒドロガラクトール (5, 6-ジエポキシズルシトール ; NSC 132313 ; CAS 登録番号 23261203) ; フルオロドパン (fluorodopan) ((5- [(2-クロロエチル) - (2-フルオロエチル) アミノ] -6-メチル-ウラシル ; NSC 73754 ; CAS 登録番号 834913) ; ヘプスルファム (NSC 329680 ; CAS 登録番号 96892578) ; ヒカントン (NSC 142982 ; CAS 登録番号 23255938) ; メルファラン (NSC 8806 ; CAS 登録番号 3223072) ; メチルCCNU ((1- (2-クロロエチル) -3- (trans-4-メチルシクロヘキサン) -1-ニトロソウレア ; NSC 95441 ; 13909096) ; マイトマイシンC (NSC 26980 ; CAS 登録番号 50077) ; ミトゾロミド (mitozolamide) (NSC 353451 ; CAS 登録番号 85622953) ; ナイトロジェンマスタード ((ビス (2-クロロエチル) メチルアミンヒドロクロリド ; NSC 762 ; CAS 登録番号 55867) ; PCNU ((1- (2-クロロエチル) -3- (2, 6-ジオキソ-3-ペリジル) -1-ニトロソウレア ; NSC 95466 ; CAS 登録番号 13909029)) ; ピペラジンアルキル化薬 ((1- (2-クロロエチル) -4- (3-クロロプロピル) -ピペラジンジヒドロクロリド ; NSC 344007)) ; ピペラジンジオン (NSC 135758 ; CAS 登録番号 41109802) ; ピボプロマン ((N, N-ビス (3-ブロモプロピオニル) ピペラジン ; NSC 25154 ; CAS 登録番号 54911)) ; ポルフィロマイシン (N-メチルマイトマイシンC ; NSC 56410 ; CAS 登録番号 801525) ; スピロヒダントインマスタード (NSC 172112 ; CAS 登録番号 56605164) ; テロキシロン (teroxirone) (トリグリシジルイソシアヌレート ; NSC 296934 ; CAS 登録番号 2451629) ; テトラプラチン (NSC 363812 ; CAS 登録番号 62816982) ; チオテパ (N, N', N'-トリ-1, 2-エタンジイルチオホスホルアミド ; NSC 6396 ; CAS 登録番号 52244) ; トリエチレンメラミン (NSC 9706 ; CAS 登録番号 51183) ; ウラシルナイトロジェンマスタード (デスメチルドパン (desmethyldopan) ; NSC 34462 ; CAS 登録番号 66751) ; Yoshi-864 ((ビス (3-メシロキシプロピル) アミンヒドロクロリド ; NSC 102627 ; CAS 登録番号 3458228)) 。

【0130】

トポイソメラーゼI阻害剤：カンプトテシン (NSC 94600 ; CAS 登録番号 7689-03-4) ; 様々なカンプトテシン誘導体および類似体 (例えば、NSC 100880、NSC 603071、NSC 107124、NSC 643833、NSC 629971、NSC 295500、NSC 249910、NSC 606985、NSC 74028、NSC 176323、NSC 295501、NSC 606172、NSC 606173、NSC 610458、NSC 618939、NSC 610457、NSC 610459、NSC 606499、NSC 610456、NSC 364830、およびNSC 606497) ; モルホリンイソキシソルピシン (morpholinisoxorubicin) (NSC 354646 ; CAS 登録番号 89196043) ; SN-38 (NSC 673596 ; CAS 登録番号 86639-52-3) 。

【0131】

10

20

30

40

50

トポイソメラーゼⅡ阻害剤：ドキソルビン（NSC123127；CAS登録番号25316409）；アモナフィド（ベンゾイソキノリンジオン；NSC308847；CAS登録番号69408817）；m-AMSA（（4'-（9-アクリジニルアミノ）-3'-メトキシメタンスルホンアニリド；NSC249992；CAS登録番号51264143））；アントラピラゾール誘導体（（NSC355644）；エトポシド（VP-16；NSC141540；CAS登録番号33419420）；ピラゾロアクリジン（（ピラゾロ[3,4,5-kl]アクリジン-2（6H）-プロパンアミン、9-メトキシ-N,N-ジメチル-5-ニトロ-、モノメタンスルホネート；NSC366140；CAS登録番号99009219）；ビスアントレンヒドロクロリド（NSC337766；CAS登録番号71439684）；ダウノルビン（NSC821151；CAS登録番号23541506）；デオキシドキソルビン（NSC267469；CAS登録番号63950061）；ミトキサントロン（NSC301739；CAS登録番号70476823）；メノガリル（NSC269148；CAS登録番号71628961）；N,N-ジベンジルダウノマイシン（NSC268242；CAS登録番号70878512）；オキサントラゾール（oxanthrazole）（NSC349174；CAS登録番号105118125）；ルビダゾン（rubidazone）（NSC164011；CAS登録番号36508711）；テニポシド（VM-26；NSC122819；CAS登録番号29767202）。

【0132】

DNA挿入剤：アントラマイシン（CAS登録番号4803274）；チカマイシンA（CAS登録番号89675376）；トマイマイシン（CAS登録番号35050556）；DC-81（CAS登録番号81307246）；シビロマイシン（CAS登録番号12684332）；ピロロベンゾジアゼピン誘導体（CAS登録番号945490095）；SGD-1882（（S）-2-（4-アミノフェニル）-7-メトキシ-8-（3-4（S）-7-メトキシ-2-（4-メトキシフェニル）-5-オキソ-5,11a-ジヒドロ-1H-ベンゾ[e]ピロロ[1,2-a][1,4]ジアゼピン-8-イル）オキシ）プロポキシ-1H-ベンゾ[e]ピロロ[1,2-a][1,4]ジアゼピン-5（11aH）-オン）；SG2000（SJG-136；（11aS,11a'S）-8,8'-（プロパン-1,3-ジイルビス（オキシ））ビス（7-メトキシ-2-メチレン-2,3-ジヒドロ-1H-ベンゾ[e]ピロロ[1,2-a][1,4]ジアゼピン-5（11aH）-オン）；NSC694501；CAS登録番号232931576）。

【0133】

RNA/DNA代謝拮抗物質：L-アラノシン（NSC153353；CAS登録番号59163416）；5-アザシチジン（NSC102816；CAS登録番号320672）；5-フルオロウラシル（NSC19893；CAS登録番号51218）；アシビシン（NSC163501；CAS登録番号42228922）；アミノプテリン誘導体N-[2-クロロ-5-[[(2,4-ジアミノ-5-メチル-6-キナゾリニル)メチル]アミノ]ベンゾイル]-L-アスパラギン酸（NSC132483）；アミノプテリン誘導体N-[4-[[(2,4-ジアミノ-5-エチル-6-キナゾリニル)メチル]アミノ]ベンゾイル]-L-アスパラギン酸（NSC184692）；アミノプテリン誘導体N-[2-クロロ-4-[[(2,4-ジアミノ-6-プテリジニル)メチル]アミノ]ベンゾイル]-L-アスパラギン酸-水和物（NSC134033）；葉酸代謝拮抗薬（antifo）（（N^α-（4-アミノ-4-デオキシプテロイル）-N⁷-ヘミフタロイル-L-オルニチン；NSC623017））；ベーカー（Baker）の可溶性葉酸代謝拮抗薬（antifol）（NSC139105；CAS登録番号41191042）；ジクロロアリルローソン（lawsone）（（2-（3,3-ジクロロアリル）-3-ヒドロキシ-1,4-ナフトキノン；NSC126771；CAS登録番号36417160）；プレキナル（NSC368390；CAS登録番号96201886）；フトラフル（（プロドラッグ；5-フルオロ-1-（テトラヒドロ-2-フリル）-ウラシル；NSC148958

10

20

30

40

50

；CAS登録番号37076689)；5,6-ジヒドロ-5-アザシチジン(NSC264880；CAS登録番号62402317)；メトトレキセート(NSC740；CAS登録番号59052)；メトトレキセート誘導体(N-[4-[[(2,4-ジアミノ-6-プテリジニル)メチル]メチルアミノ]-1-ナフタレニル]カルボニル]L-グルタミン酸；NSC174121)；PALA((N-(ホスホノアセチル)-L-アスパルテート；NSC224131；CAS登録番号603425565)；ピラゾプリン(NSC143095；CAS登録番号30868305)；トリメトトレキセート(NSC352122；CAS登録番号82952645)。

【0134】

DNA代謝拮抗物質：3-HP(NSC95678；CAS登録番号3814797)；2'-デオキシ-5-フルオロウリジン(NSC27640；CAS登録番号50919)；5-HP(NSC107392；CAS登録番号19494894)； α -TGDR(α -2'-デオキシ-6-チオグアノシン；NSC71851 CAS登録番号2133815)；アフィジコリングリシネート(NSC303812；CAS登録番号92802822)；ara C(シトシンアラビノシド；NSC63878；CAS登録番号69749)；5-アザ-2'-デオキシシチジン(NSC127716；CAS登録番号2353335)； β -TGDR(β -2'-デオキシ-6-チオグアノシン；NSC71261；CAS登録番号789617)；シクロシチジン(NSC145668；CAS登録番号10212256)；グアナゾール(NSC1895；CAS登録番号1455772)；ヒドロキシ尿素(NSC32065；CAS登録番号127071)；イノシングリコジアルデヒド(NSC118994；CAS登録番号23590990)；マクベシンII(NSC330500；CAS登録番号73341738)；ピラゾロイミダゾール(NSC51143；CAS登録番号6714290)；チオグアニン(NSC752；CAS登録番号154427)；チオプリン(NSC755；CAS登録番号50442)。

【0135】

細胞周期モジュレーター：シリビニン(CAS登録番号22888-70-6)；没食子酸エピガロカテキン(EGCG；CAS登録番号989515)；プロシアニジン誘導体(例えば、プロシアニジンA1[CAS登録番号103883030]、プロシアニジンB1[CAS登録番号20315257]、プロシアニジンB4[CAS登録番号29106512]、アレカタニン(arecatannin)B1[CAS登録番号79763283])；イソフラボン(例えば、ゲニステイン[4%5,7-トリヒドロキシイソフラボン；CAS登録番号446720]、ダイゼイン[4',7-ジヒドロキシイソフラボン、CAS登録番号486668]；インドール-3-カルビノール(CAS登録番号700061)；ケルセチン(NSC9219；CAS登録番号117395)；エストラムスチン(NSC89201；CAS登録番号2998574)；ノコダゾール(CAS登録番号31430189)；ポドフィロトキシン(CAS登録番号518285)；酒石酸ビンレルビン(NSC608210；CAS登録番号125317397)；クリプトフィシン(NSC667642；CAS登録番号124689652)。

【0136】

キナーゼ阻害剤：アフアチニブ(CAS登録番号850140726)；アキシチニブ(CAS登録番号319460850)；ARRY-438162(ビニメチニブ)(CAS登録番号606143899)；ボスチニブ(CAS登録番号380843754)；カボザンチニブ(CAS登録番号1140909483)；セリチニブ(CAS登録番号1032900256)；クリゾチニブ(CAS登録番号877399525)；ダブラフェニブ(CAS登録番号1195765457)；ダサチニブ(NSC732517；CAS登録番号302962498)；エルロチニブ(NSC718781；CAS登録番号183319699)；エベロリムス(NSC733504；CAS登録番号159351696)；フォスタマチニブ(NSC745942；CAS登録番号901119355)；ゲフィチニブ(NSC715055；CAS登録番号184475352)

10

20

30

40

50

；イブルチニブ（CAS登録番号936563961）；イマチニブ（NSC716051；CAS登録番号220127571）；ラパチニブ（CAS登録番号388082788）；レンパチニブ（CAS登録番号857890392）；ムブリチニブ（CAS366017096）；ニロチニブ（CAS登録番号923288953）；ニンテダニブ（CAS登録番号656247175）；パルボシクリブ（CAS登録番号571190302）；パゾパニブ（NSC737754；CAS登録番号635702646）；ペガブタニブ（CAS登録番号222716861）；ポナチニブ（CAS登録番号1114544318）；ラパマイシン（NSC226080；CAS登録番号53123889）；レゴラフェニブ（CAS登録番号755037037）；AP23573（リダフォロリムス）（CAS登録番号572924540）；INCB018424（ルキシロチニブ）（CAS登録番号1092939177）；ARRY-142886（セルメチニブ）（NSC741078；CAS登録番号606143-52-6）；シロリムス（NSC226080；CAS登録番号53123889）；ソラフェニブ（NSC724772；CAS登録番号475207591）；スニチニブ（NSC736511；CAS登録番号341031547）；トファシチニブ（CAS登録番号477600752）；テムシロリムス（NSC683864；CAS登録番号163635043）；トラメチニブ（CAS登録番号871700173）；バンデタニブ（CAS登録番号443913733）；ベムラフェニブ（CAS登録番号918504651）；SU6656（CAS登録番号330161870）；CEP-701（レスタウルチニブ（lesaurtinib））（CAS登録番号111358884）；XL019（CAS登録番号945755566）；PD-325901（CAS登録番号391210109）；PD-98059（CAS登録番号167869218）；ATP競合TORC1／TORC2阻害剤、例えばPI-103（CAS登録番号371935749）、PP242（CAS登録番号1092351671）、PP30（CAS登録番号1092788094）、Torin1（CAS登録番号1222998368）、LY294002（CAS登録番号154447366）、XL-147（CAS登録番号934526893）、CAL-120（CAS登録番号870281348）、ETP-45658（CAS登録番号1198357797）、PX866（CAS登録番号502632668）、GDC-0941（CAS登録番号957054307）、BGT226（CAS登録番号1245537681）、BEZ235（CAS登録番号915019657）、XL-765（CAS登録番号934493762）など。

【0137】

タンパク質合成阻害剤：アクリフラビン（CAS登録番号65589700）；アミカシン（NSC177001；CAS登録番号39831555）；アルベカシン（CAS登録番号51025855）；アストロマイシン（CAS登録番号55779061）；アジスロマイシン（NSC643732；CAS登録番号83905015）；ベカナマイシン（CAS登録番号4696768）；クロルテトラサイクリン（NSC13252；CAS登録番号64722）；クラリスロマイシン（NSC643733；CAS登録番号81103119）；クリンダマイシン（CAS登録番号18323449）；クロモサイクリン（CAS登録番号1181540）；シクロヘキシミド（CAS登録番号66819）；ダクチノマイシン（NSC3053；CAS登録番号50760）；ダルホプリスチン（CAS登録番号112362502）；デメクロサイクリン（CAS登録番号127333）；ジベカシン（CAS登録番号34493986）；ジヒドロストレプトマイシン（CAS登録番号128461）；ジリスロマイシン（CAS登録番号62013041）；ドキシサイクリン（CAS登録番号17086281）；エメチン（NSC33669；CAS登録番号483181）；エリスロマイシン（NSC55929；CAS登録番号114078）；フルリスロマイシン（CAS登録番号83664208）；フラマイセチン（ネオマイシンB；CAS登録番号119040）；ゲンタマイシン（NSC82261；CAS登録番号1403663）；グリシルシクリン、例えばチゲサイクリン（CAS登録番号220620097）；ハイグロマイシンB（CAS登録番

10

20

30

40

50

号31282049) ; イセパマイシン (CAS登録番号67814760) ; ジョサマイシン (NSC122223 ; CAS登録番号16846245) ; カナマイシン (CAS登録番号8063078) ; ケトライド、例えばテリスロマイシン (CAS登録番号191114484) 、セスロマイシン (CAS登録番号205110481) 、およびソリスロマイシン (CAS登録番号760981837) ; リンコマイシン (CAS登録番号154212) ; ライムサイクリン (CAS登録番号992212) ; メクロサイクリン (NSC78502 ; CAS登録番号2013583) ; メタサイクリン (ロンドマイシン (rondomycin) ; NSC356463 ; CAS登録番号914001) ; ミデカマイシン (CAS登録番号35457808) ; ミノサイクリン (NSC141993 ; CAS登録番号10118908) ; ミオカマイシン (CAS登録番号55881077) ; ネオマイシン (CAS登録番号119040) ; ネチルマイシン (CAS登録番号56391561) ; オレアンドマイシン (CAS登録番号3922905) ; オキサゾリジノン、例えばエペレゾリド (CAS登録番号165800044) 、リネゾリド (CAS登録番号165800033) 、ポジゾリド (posizolid) (CAS登録番号252260029) 、ラデゾリド (CAS登録番号869884786) 、ランベゾリド (ranbezolid) (CAS登録番号392659380) 、ステゾリド (CAS登録番号168828588) 、テジゾリド (CAS登録番号856867555) ; オキシテトラサイクリン (NSC9169 ; CAS登録番号2058460) ; パロモマイシン (CAS登録番号7542372) ; ペニメピサイクリン (CAS登録番号4599604) ; ペプチジルトランスフェラーゼ阻害剤、例えば、クロラムフェニコール (NSC3069 ; CAS登録番号56757) ならびにアジダムフェニコール (CAS登録番号13838089) 、フロルフエニコール (CAS登録番号73231342) 、およびチアンフェニコール (CAS登録番号15318453) 、およびプロイロムチリン、例えばレタパムリン (CAS登録番号224452668) 、チアムリン (CAS登録番号55297955) 、バルネムリン (CAS登録番号101312929) などの誘導體 ; ピルリマイシン (CAS登録番号79548735) ; ピューロマイシン (NSC3055 ; CAS登録番号53792) ; キヌプリスチン (CAS登録番号120138503) ; リボスタマイシン (CAS登録番号53797356) ; ロキタマイシン (CAS登録番号74014510) ; ロリテトラサイクリン (CAS登録番号751973) ; ロキシスロマイシン (CAS登録番号80214831) ; シソマイシン (CAS登録番号32385118) ; スペクチノマイシン (CAS登録番号1695778) ; スピラマイシン (CAS登録番号8025818) ; ストレプトグラミン、例えばプリスチナマイシン (CAS登録番号270076603) 、キヌプリスチン／ダルホプリスチン (CAS登録番号126602899) 、およびバージニアマイシン (CAS登録番号11006761) ; ストレプトマイシン (CAS登録番号57921) ; テトラサイクリン (NSC108579 ; CAS登録番号60548) ; トブラマイシン (CAS登録番号32986564) ; トロレアンドマイシン (CAS登録番号2751099) ; タイロシン (CAS登録番号1401690) ; ベルダマイシン (verdamicin) (CAS登録番号49863481) 。

【0138】

ヒストンデアセチラーゼ阻害剤 : アベキシノスタット (CAS登録番号783355602) ; ベリノスタット (NSC726630 ; CAS登録番号414864009) ; チダミド (chidamide) (CAS登録番号743420022) ; エンチノスタット (CAS登録番号209783802) ; ギビノスタット (givinostat) (CAS登録番号732302997) ; モセチノスタット (CAS登録番号726169739) ; パノビノスタット (CAS登録番号404950807) ; キシノスタット (CAS登録番号875320299) ; レスミノスタット (CAS登録番号864814880) ; ロミデプシン (CAS登録番号128517077) ; スルホラファン (CAS登録番号4478937) ; チオウレイドブチロニトリル (Kevetrin (商標) ; CAS登録番号6659890) ; バルプロ酸 (NSC93819 ; CAS登録番号99661) ; ボリ

10

20

30

40

50

ノスタット (NSC 701852; CAS 登録番号 149647789); ACY-1215 (ロシリノスタット (rocilinostat); CAS 登録番号 1316214524); UDC-101 (CAS 登録番号 1012054599); CHR-2845 (テフィノスタット (tefinostat); CAS 登録番号 914382608); CHR-3996 (CAS 登録番号 1235859138); 4SC-202 (CAS 登録番号 910462430); CG200745 (CAS 登録番号 936221339); SB939 (プラシノスタット; CAS 登録番号 929016966)。

【0139】

ミトコンドリア阻害剤：パンクラチスタチン (NSC 349156; CAS 登録番号 96281311); ローダミン-123 (CAS 登録番号 63669709); エデルフォシン (edelfosine) (NSC 324368; CAS 登録番号 70641519); d-アルファ-コハク酸トコフェロール (NSC 173849; CAS 登録番号 4345033); 化合物 11 β (CAS 登録番号 865070377); アスピリン (NSC 406186; CAS 登録番号 50782); エリプチシン (CAS 登録番号 519233); ベルベリン (CAS 登録番号 633658); セルレニン (CAS 登録番号 17397896); GX015-070 (Obatoclax (登録商標)); 1H-インドール、2-(2-((3,5-ジメチル-1H-ピロール-2-イル)メチレン)-3-メトキシ-2H-ピロール-5-イル)-; NSC 729280; CAS 登録番号 803712676); セラストロール (トリプテリン; CAS 登録番号 34157830); メトホルミン (NSC 91485; CAS 登録番号 1115704); プリリアントグリーン (NSC 5011; CAS 登録番号 633034); ME-344 (CAS 登録番号 1374524556)。

【0140】

抗有糸分裂剤：アロコルヒチン (allocolchicine) (NSC 406042); オーリスタチン、例えば MMAE (モノメチルオーリスタチン E; CAS 登録番号 474645-27-7) および MMAF (モノメチルオーリスタチン F; CAS 登録番号 745017-94-1; ハリコンドリン B (NSC 609395); コルヒチン (NSC 757; CAS 登録番号 64868); コルヒチン (cholchicine) 誘導体 (N-ベンゾイル-デアセチルベンズアミド; NSC 33410; CAS 登録番号 63989753); ドラスタチン 10 (NSC 376128; CAS 登録番号 110417-88-4); メイタンシン (NSC 153858; CAS 登録番号 35846-53-8); リゾキシ (rhoxoxin) (NSC 332598; CAS 登録番号 90996546); タキソール (NSC 125973; CAS 登録番号 33069624); タキソール誘導体 ((2'-N-[3-(ジメチルアミノ)プロピル]グルタメート (glutaramate) タキソール; NSC 608832); チオコルヒチン (3-デメチルチオコルヒチン; NSC 361792); トリチルシステイン (NSC 49842; CAS 登録番号 2799077); 硫酸ビンブラスチン (NSC 49842; CAS 登録番号 143679); 硫酸ビンクリスチン (NSC 67574; CAS 登録番号 2068782)。

【0141】

これらの薬剤のうち、抗体への取り付け部位を含むか、または抗体への取り付け部位を含むように改変できるものはいずれも、本明細書で開示される ADC に含めることができる。

【0142】

具体的な実施形態において、細胞傷害性物質および／または細胞増殖抑制性物質は、抗有糸分裂剤である。

【0143】

別の具体的な実施形態において、細胞傷害性物質および／または細胞増殖抑制性物質は、オーリスタチン、例えば、モノメチルオーリスタチン E (「MMAE」) またはモノメチルオーリスタチン F (「MMAF」) である。

【0144】

10

20

30

40

50

6. 2. 2. リンカー

本開示の抗グリコムUC1 ADCにおいて、細胞傷害性物質および／または細胞増殖抑制性物質は、リンカーによって抗体に連結されている。ADCの抗体に細胞傷害性物質および／または細胞増殖抑制性物質を連結するリンカーは、短い、長い、疎水性、親水性、フレキシブルな、または硬いリンカーであってもよく、またはリンカーが異なる特性を有するセグメントを含み得るように、それぞれ独立して上述の特性の1つまたは複数を含むセグメントで構成されていてもよい。リンカーは、それらが1つより多くの薬剤を抗体上の単一の部位に共有結合で連結するように多価であってもよいし、またはそれらが単一の薬剤を抗体上の単一の部位に共有結合で連結するように1価であってもよい。

【0145】

当業者は理解していると予想されるように、リンカーは、一方の位置で細胞傷害性物質および／または細胞増殖抑制性物質への共有結合による連結を形成し、他方の位置で抗体への共有結合による連結を形成することによって、細胞傷害性物質および／または細胞増殖抑制性物質を抗体に連結する。共有結合による連結は、リンカー上の官能基と薬剤および抗体上の官能基との反応によって形成される。本明細書で使用される場合、「リンカー」という表現は、(i) リンカーを細胞傷害性物質および／または細胞増殖抑制性物質に共有結合で連結することが可能な官能基と、リンカーを抗体に共有結合で連結することが可能な官能基を含む、リンカーのコンジュゲートしていない形態；(ii) リンカーを抗体に共有結合で連結することが可能であり、細胞傷害性物質および／または細胞増殖抑制性物質に共有結合で連結されている官能基を含むか、またはその逆である、リンカーの部分的にコンジュゲートした形態；および(iii) 細胞傷害性物質ならびに／または細胞増殖抑制性物質および抗体の両方に共有結合で連結されている、リンカーの完全にコンジュゲートした形態を含むことが意図される。本開示のリンカーおよび抗グリコムUC1 ADCに加えて、リンカー-薬剤を抗体にコンジュゲートするのに使用されるシントンの一部の具体的な実施形態において、リンカー上の官能基およびリンカーと抗体との間で形成された共有結合による連結を含む部分は、それぞれR_xおよびXYとして具体的に例示される。

【0146】

リンカーは、好ましくは、ただし必ずしもそうでなくてもよいが、細胞の外側の条件に対して化学的に安定であり、細胞の内部で切断される、破壊される、および／またはそれ以外の方法で特異的に分解するように設計されていてもよい。代替として、細胞の内部で特異的に切断または分解されるように設計されていないリンカーを使用してもよい。安定なリンカーと不安定なリンカーとの選択は、細胞傷害性物質および／または細胞増殖抑制性物質の毒性によって決まる場合がある。正常細胞に対して毒性の薬剤の場合、安定なリンカーが好ましい。正常細胞に対して選択的であるかまたはそれを標的化して毒性を低める薬剤を利用してもよく、細胞外環境に対するリンカーの化学的安定性は、それほど重要ではない。ADCの状態では薬剤を抗体に連結するのに有用な様々なリンカーは、当業界において公知である。これらのリンカーのいずれか、および他のリンカーは、細胞傷害性物質および／または細胞増殖抑制性物質を、本開示の抗グリコムUC1 ADCの抗体に連結するのに使用することができる。

【0147】

多くの細胞傷害性物質および／または細胞増殖抑制性物質を単一抗体分子に連結するのに使用できる例示的な多価リンカーは、例えば、その内容が参照によりそれらの全体が本明細書に組み入れられる、国際公開第2009/073445号パンフレット；国際公開第2010/068795号パンフレット；国際公開第2010/138719号パンフレット；国際公開第2011/120053号パンフレット；国際公開第2011/171020号パンフレット；国際公開第2013/096901号パンフレット；国際公開第2014/008375号パンフレット；国際公開第2014/093379号パンフレット；国際公開第2014/093394号パンフレット；国際公開第2014/093640号パンフレットに記載されている。例えば、Mersanaらにより開発された

10

20

30

40

50

Fleximerリンカー技術は、優れた物理化学的な特性を有する高DARのADCを可能にする能力を有する。以下に示すように、Mersana技術は、エステル結合の配列を介して可溶性のポリアセタールバックボーンに薬物分子を取り込むことに基づく。この手法は、優れた物理化学的な特性を維持しながら高度にローディングされたADC（最大20のDAR）をもたらす。

【0148】

樹枝型のリンカーのさらなる例は、それぞれが参照により本明細書に組み入れられる、米国特許出願公開第2006/116422号明細書；米国特許出願公開第2005/271615号明細書；de Groot et al. (2003) Angew. Chem. Int. Ed. 42:4490-4494；Amir et al. (2003) Angew. Chem. Int. Ed. 42:4494-4499；Shamis et al. (2004) J. Am. Chem. Soc. 126:1726-1731；Sun et al. (2002) Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters 12:2213-2215；Sun et al. (2003) Bioorganic & Medicinal Chemistry 11:1761-1768；King et al. (2002) Tetrahedron Letters 43:1987-1990に見出すことができる。

【0149】

使用できる例示的な1価リンカーは、例えば、それぞれが参照により本明細書に組み入れられる、Nolting, 2013, Antibody-Drug Conjugates, Methods in Molecular Biology 1045:71-100；Kitson et al., 2013, CROs/CMOs--Chemica Oggi--Chemistry Today 31(4):30-38；Ducry et al., 2010, Bioconjugate Chem. 21:5-13；Zhao et al., 2011, J. Med. Chem. 54:3606-3623；米国特許第7, 223, 837号明細書；米国特許第8, 568, 728号明細書；米国特許第8, 535, 678号明細書；および国際公開第2004010957号パンフレットに記載されている。

【0150】

一例として、これらに限定されないが、本開示の抗グリコMUC1 ADC中に含まれる一部の切断可能および切断不可能なリンカーは、後述される。

【0151】

6. 2. 3. 切断可能なリンカー

特定の実施形態において、選択されたリンカーは、インビボで切断可能である。切断可能なリンカーは、化学的または酵素的に不安定な、または分解可能な連結を含んでいてもよい。切断可能なリンカーは、一般的に、薬物を開放する細胞の内部のプロセス、例えば細胞質内での還元、リソソーム中での酸性条件への曝露、または細胞内の特異的なプロテアーゼまたは他の酵素による切断を頼る。切断可能なリンカーは、一般的に、化学的または酵素的のいずれかで切断可能な1つまたは複数の化学結合を取り込んでおり、それと同時に、リンカーの残部は、切断不可能である。特定の実施形態において、リンカーは、化学的に不安定性の基、例えばヒドラゾンおよび／またはジスルフィド基を含む。化学的に不安定性の基を含むリンカーは、血漿と一部の細胞質内区画との間で特性が異なることを利用する。ヒドラゾンを含有するリンカーの場合の薬物放出を容易にする細胞内条件は、エンドソームおよびリソソームの酸性環境であり、一方、ジスルフィドを含有するリンカーは、高いチオール濃度、例えばグルタチオンを含有するサイトゾル中で還元される。特定の実施形態において、化学的に不安定性の基を含むリンカーの血漿安定性は、化学的に不安定性の基付近の置換基を使用して立体障害を導入することによって増加させることができる。

【0152】


酸不安定性の基、例えばヒドラゾンは、血液の中性pH環境（pH 7.3～7.5）での体循環の間は無傷のままであるが、ADCが細胞の弱酸性のエンドソーム（pH 5.0～6.5）およびリソソーム（pH 4.5～5.0）の区画に内在化されると加水分解を受けて薬物を放出する。このpH依存性の放出メカニズムは、薬物の非特異的な放出と関連付けられている。リンカーのヒドラゾン基の安定性を増加させるために、リンカーは、循環中での損失を最小化しながらもリソソーム中でのより効率的な放出を達成するように調整できる化学修飾、例えば置換によって変更してもよい。

【0153】

ヒドラゾンを含むリンカーは、追加の切断部位、例えば追加の酸不安定性の切断部位および／または酵素不安定性の切断部位を含むとしてもよい。例示的なヒドラゾンを含むリンカーを含むADCは、以下の構造を含む。

【0154】

【化1】



式中、DおよびAbは、それぞれ細胞傷害性物質および／または細胞増殖抑制性物質（薬物）およびAbを表し、nは、抗体に連結された薬物-リンカーの数を表す。特定のリンカー、例えばリンカー(Ig)において、リンカーは、2つの切断可能な基、すなわちジスルフィド部分およびヒドラゾン部分を含む。このようなリンカーの場合、改変されていない遊離の薬物の有効な放出は、酸性pHまたはジスルフィド還元および酸性pHを必要とする。(Ih)および(Ii)などのリンカーは、単一のヒドラゾン切断部位に有効であることが示されている。

【0155】

体循環の間は無傷のままであるがADCが酸性細胞区画の内部に内在化されると加水分解を受けて薬物を放出する追加のリンカーとしては、カーボネートが挙げられる。このようなリンカーは、細胞傷害性物質および／または細胞増殖抑制性物質が、酸素を介して共有結合で取り付けることができる場合、有用な可能性がある。

【0156】

リンカー中に含まれ得る他の酸不安定性の基としては、cis-アコニチルを含むリンカーが挙げられる。cis-アコニチル化学は、酸性条件下でのアミド加水分解を促進するために、アミド結合に並置されたカルボン酸を使用する。

【0157】

切断可能なリンカーはまた、ジスルフィド基も含み得る。ジスルフィドは、生理学的なpHで熱力学的に安定であり、細胞の内部に内在化されると薬物を放出するように設計さ


れ、この場合サイトゾルは、細胞外の環境と比較してより有意に高い還元性の環境を提供する。ジスルフィド結合の分離は、一般的に、ジスルフィドを含有するリンカーが循環中で適度に安定であり、サイトゾル中で薬物を選択的に放出するように、細胞質内のチオール補因子、例えば（還元された）グルタチオン（GSH）の存在を必要とする。また、細胞内酵素タンパク質であるジスルフィドイソメラーゼ、またはジスルフィド結合の切断が可能な類似の酵素も、細胞の内部におけるジスルフィド結合の優先的な切断に寄与する可能性がある。およそ5つの腫瘍細胞において、循環中でGSHまたはシステイン（これは最も豊富な低分子量チオールである）がより有意に低い濃度であることと比較して、GSHは、0.5～1.0 mMの濃度範囲で細胞中に存在することが報告されており、この場合、不規則な血流が低酸素状態を引き起こし、還元性酵素の活性が強化され、それゆえにグルタチオン濃度がより一層高くなる。特定の実施形態において、ジスルフィドを含有するリンカーのインビボでの安定性は、リンカーの化学修飾によって、例えば、ジスルフィド結合に隣接する立体障害の使用によって強化することができる。

【0158】

例示的なジスルフィドを含有するリンカーを含むADCは、以下の構造を含む。

【0159】

【化2】



式中、DおよびAbは、それぞれ薬物および抗体を表し、nは、抗体に連結された薬物-リンカーの数を表し、Rは、各出現につき、例えば水素またはアルキルから独立して選択される。特定の実施形態において、ジスルフィド結合に隣接する立体障害を増加させることは、リンカーの安定性を増加させる。(Ij)および(II)などの構造は、1つまたは複数のR基が低級アルキルから選択され、例えばメチルである場合、インビボにおける増加した安定性を示す。

【0160】

使用することができる別のタイプの切断可能なリンカーは、酵素によって特異的に切断されるリンカーである。このようなリンカーは、典型的にはペプチドベースであるか、または酵素の基質として作用するペプチド領域を含む。ペプチドベースのリンカーは、血漿

および細胞外環境中で、化学的に不安定性のリンカーより安定である傾向がある。リソソームのタンパク質分解酵素は、内因性阻害剤およびリソソームと比較して都合悪く高いpH値の血液のために、血液中で非常に低い活性を有するため、一般的に、ペプチド結合は血清中で優れた安定性を有する。抗体からの薬物の放出は、具体的にはリソソームのプロテアーゼ、例えばカテプシンおよびプラスミンの作用に起因して起こる。これらのプロテアーゼは、特定の腫瘍細胞中において高いレベルで存在する場合がある。

【0161】

例示的な実施形態において、切断可能なペプチドは、Gly-Phe-Leu-Gly (配列番号100)、Ala-Leu-Ala-Leu (配列番号101)などのテトラペプチド、またはVal-Cit、Val-Ala、Met-(D)Lys、Asn-(D)Lys、Val-(D)Asp、Phe-Lys、Ile-Val、Asp-Val、His-Val、NorVal-(D)Asp、Ala-(D)Asp5、Met-Lys、Asn-Lys、Ile-Pro、Me3Lys-Pro、フェニルGly-(D)Lys、Met-(D)Lys、Asn-(D)Lys、Pro-(D)Lys、Met-(D)Lys、Asn-(D)Lys、AM Met-(D)Lys、Asn-(D)Lys、AW Met-(D)Lys、およびAsn-(D)Lysなどのジペプチドから選択される。特定の実施形態において、より長いペプチドは疎水性であるため、ジペプチドが、より長いポリペプチドより好ましい。

【0162】

ドキシソルピシン、マイトマイシン、カンプトテシン、ピロロベンゾジアゼピン、タリソマイシン (tallysomyacin) およびオーリスタチン／オーリスタチンファミリーメンバーなどの薬物を抗体に連結するのに有用な様々なジペプチドベースの切断可能なリンカーが記載されている (それぞれが参照により本明細書に組み入れられる、Dubowchik et al., 1998, J. Org. Chem. 67:1866-1872; Dubowchik et al., 1998, Bioorg. Med. Chem. Lett. 8(21):3341-3346; Walker et al., 2002, Bioorg. Med. Chem. Lett. 12:217-219; Walker et al., 2004, Bioorg. Med. Chem. Lett. 14:4323-4327; Sutherland et al., 2013, Blood 122:1455-1463; およびFrancisco et al., 2003, Blood 102:1458-1465を参照)。これらのジペプチドリリンカー、またはこれらのジペプチドリリンカーの改変されたバージョンの全ては、本開示の抗グリコMUC1 ADCで使用する事ができる。使用できる他のジペプチドリリンカーとしては、Seattle Geneticsのブレンツキシマブベドチン (Vendotin) SGN-35 (Adcetris (商標))、Seattle GeneticsのSGN-75 (抗CD-70、Val-Cit-モノメチルオーリスタチンF (MMAF))、Seattle GeneticsのSGN-CD33A (抗CD-33、Val-Ala-(SGD-1882))、Celldex Therapeuticsのグレンバツムマブ (CDX-011) (抗NMB、Val-Cit-モノメチルオーリスタチンE (MMAE))、およびサイトジェン (Cytogen) PSMA-ADC (PSMA-ADC-1301) (抗PSMA、Val-Cit-MMAE) などのADCに見出されるものが挙げられる。

【0163】

酵素的に切断可能なリンカーとしては、酵素的切断部位から薬物を空間的に分離するための自壊性スペーサーを挙げることができる。ペプチドリリンカーへの薬物の直接の取り付けは、タンパク質分解による薬物のアミノ酸付加物の放出を引き起こすことができ、それによってその活性が損なわれる。自壊性スペーサーの使用は、アミド結合の加水分解の後、十分に活性な化学的に改変されていない薬物の脱離を可能にする。


【0164】

1つの自壊性スペーサーは、二機能性のパラアミノベンジルアルコール基であり、これは、アミノ基を介してペプチドに連結されてアミド結合を形成するが、アミンを含有する薬物は、リンカー (PABC) のベンジルのヒドロキシル基にカルバミン酸官能性を介して取り付けられていてもよい。得られたプロドラッグは、プロテアーゼ媒介の切断で活性化され、1, 6脱離反応を引き起こし、改変されていない薬物、二酸化炭素、およびリン

カー基の残部を放出する。以下のスキームは、p-アミドベンジルエーテルのフラグメント化および薬物の放出を描写する。

【0165】

【化3】



式中、X-Dは、改変されていない薬物を表す。

【0166】

この自壊性基の複素環式バリエーションも記載されている。例えば参照により本明細書に組み入れられる米国特許第7,989,434号明細書を参照されたい。

【0167】

一部の実施形態において、酵素的に切断可能なリンカーは、β-グルクロン酸ベースのリンカーである。薬物の容易な放出は、リソソーム酵素であるβ-グルクロニダーゼによるβ-グルクロニドグリコシド結合の切断を介して実現することができる。この酵素は、リソソーム内に豊富に存在し、一部の腫瘍タイプにおいて過剰発現されるが、細胞の外側での酵素活性は低い。β-グルクロン酸ベースのリンカーは、β-グルクロニドの親水性の性質のために凝集を受けるADCの傾向を回避するのに使用することができる。一部の

一部の実施形態において、β-グルクロン酸ベースのリンカーは、疎水性薬物に連結されたADCのためのリンカーとして好ましい。以下のスキームは、β-グルクロン酸ベースのリンカーを含有するADCからの薬物の放出を描写する。

【0168】

10


20

30

40

50

【化 4】



【0169】

オーリスタチン、カンプトテシンおよびドキソルビシン類似体、CBI副溝バインダー、およびプシムベリン (psymberin) などの薬物を抗体に連結するのに有用な、様々な切断可能な β -グルクロン酸ベースのリンカーが記載されている（それぞれが参照により本明細書に組み入れられる、Nolting, Chapter 5 “Linker Technology in Antibody-Drug Conjugates,” In: Antibody-Drug Conjugates: Methods in Molecular Biology, vol. 1045, pp. 71-100, Laurent Ducry (Ed.), Springer Science & Business Media, LLC, 2013; Jeffrey et al., 2006, Bioconjug. Chem. 17:831-840; Jeffrey et al., 2007, Bioorg. Med. Chem. Lett. 17:2278-2280; およびJiang et al., 2005, J. Am. Chem. Soc. 127:11254-11255を参照）。これらの β -グルクロン酸ベースのリンカーは全て、本開示の抗グリコMUC1 ADCで使用することができる。


【0170】

加えて、フェノール基を含有する細胞傷害性物質および／または細胞増殖抑制性物質は、フェノールの酸素を介してリンカーに共有結合で結合させることができる。1つのこのようなリンカーは、国際公開第2007/089149号パンフレットに記載されており、ジアミノエタン「Space Link」を、フェノールを送達するために従来の「P

「A B O」ベースの自壊性基と共に使用する手法を頼る。リンカーの切断は、以下に模式的に描写され、式中、Dは、フェノールのヒドロキシル基を有する細胞傷害性物質および／または細胞増殖抑制性物質を表す。

【0171】

【化5】



【0172】

切断可能なリンカーは、切断不可能な部分またはセグメントを含んでいてもよいし、および／または切断可能なセグメントまたは部分は、それを切断可能にするために、それ以外の切断不可能なリンカー中に含まれていてもよい。単なる例として、ポリエチレングリコール（PEG）および関連するポリマーは、ポリマーバックボーン中に切断可能な基を含んでいてもよい。例えば、ポリエチレングリコールまたはポリマーリンカーは、1つまたは複数の切断可能な基、例えばジスルフィド、ヒドラゾンまたはジペプチドを含んでいてもよい。

【0173】

リンカー中に含まれ得る他の分解可能な連結としては、PEGのカルボン酸または活性化されたPEGのカルボン酸と生物活性薬剤上のアルコール基との反応によって形成されたエステル連結が挙げられ、この場合、このようなエステル基は一般的に生理学的条件下で加水分解して生物活性薬剤を放出する。加水分解で分解可能な連結としては、これらに限定されないが、炭酸連結；アミンとアルデヒドの反応の結果生じるイミン連結；アルコールをリン酸基と反応させることによって形成されたリン酸エステル連結；アルデヒドと


アルコールの反応生成物であるアセタール連結；ギ酸塩とアルコールの反応生成物であるオルトエステル連結；ならびにこれに限定されないが、ポリマーの末端のホスホアミダイト基、およびオリゴヌクレオチドの5'ヒドロキシル基によって形成されたオリゴヌクレオチド連結が挙げられる。

【0174】


特定の実施形態において、リンカーは、酵素的に切断可能なペプチド部分、例えば、構造式(IVa)または(IVb)：

【0175】

【化6】



10



20

を含むリンカーまたはその塩を含み、式中、ペプチドは、リソソーム酵素によって切断可能なペプチド（C→Nで例示され、カルボキシおよびアミノ「末端」は示されていない）を表し；Tは、1つまたは複数のエチレングリコール単位もしくはアルキレン鎖、またはそれらの組合せを含むポリマーを表し；R^aは、水素、アルキル、スルホネートおよびメチルスルホネートから選択され；pは、0から5の範囲の整数であり；qは、0または1であり；xは、0または1であり；yは、0または1であり；

30

【0176】

【化7】

は、リンカーの細胞傷害性物質および／または細胞増殖抑制性物質への取り付け点を表し；*は、リンカーの残部への取り付け点を表す。

40

【0177】

特定の実施形態において、ペプチドは、トリペプチドまたはジペプチドから選択される。特定の実施形態において、ジペプチドは、Val-Cit；Cit-Val；Ala-Ala；Ala-Cit；Cit-Ala；Asn-Cit；Cit-Asn；Cit-Cit；Val-Glu；Glu-Val；Ser-Cit；Cit-Ser；Lys-Cit；Cit-Lys；Asp-Cit；Cit-Asp；Ala-Val；Val-Ala；Phe-Lys；Val-Lys；Ala-Lys；Phe-Cit；Leu-Cit；Ile-Cit；Phe-Arg；およびTrp-Citから選択される。特定の実施形態において、ジペプチドは、Cit-Val；およびAla-Valから選択される。


50

【 0 1 7 8 】



本開示の抗グリコムUC1 ADC中に含まれ得る構造式（IVa）によるリンカーの特定の例示的な実施形態としては、以下で例示されるリンカーが挙げられる（例示されるように、リンカーは、リンカーを抗体に共有結合で連結するのに好適な基を含む）：

【 0 1 7 9 】



【化8】





10



20



30



40

【 0 1 8 0 】

本開示の抗グリコムUC1 ADC中に含まれ得る構造式（IVb）によるリンカーの特定の例示的な実施形態としては、以下で例示されるリンカーが挙げられる（例示されるように、リンカーは、リンカーを抗体に共有結合で連結するのに好適な基を含む）：






50

【化 9 - 1】



【 0 1 8 2 】

【化 9 - 2】



【 0 1 8 3】

10

20


30

40

50


【化 9 - 3】

(IVb.11)




10

(IVb.12)




20

(IVb.13)



30

(IVb.14)




40

【 0 1 8 4】

50


【化 9 - 4】

(IVb.15)




10

(IVb.16)




(IVb.17)




20

(IVb.18)



30

(IVb.19)





40

【 0 1 8 5】

特定の実施形態において、リンカーは、酵素的に切断可能なペプチド部分、例えば、構造 (IVc) または (IVd) :

【 0 1 8 6】

【化 10】



を含むリンカーまたはその塩を含み、式中、ペプチドは、リソソーム酵素によって切断可能なペプチド（C→Nで例示され、カルボキシおよびアミノ「末端」は示されていない）を表し；Tは、1つまたは複数のエチレングリコール単位もしくはアルキレン鎖、またはそれらの組合せを含むポリマーを表し；R^aは、水素、アルキル、スルホネートおよびメチルスルホネートから選択され；pは、0から5の範囲の整数であり；qは、0または1であり；xは、0または1であり；yは、0または1であり；. x

【0187】

【化 11】



は、リンカーの細胞傷害性物質および／または細胞増殖抑制性物質への取り付け点を表し；*は、リンカーの残部への取り付け点を表す。

【0188】

本開示の抗グリコMUC1 ADC中に含まれ得る構造式（IVc）によるリンカーの特定の例示的な実施形態としては、以下で例示されるリンカーが挙げられる（例示されるように、リンカーは、リンカーを抗体に共有結合で連結するのに好適な基を含む）：

【0189】

10


20

30

40

50

【化 1 2】



【0190】

本開示の抗グリコMUC1 ADC中に含まれ得る構造式(IVd)によるリンカーの特定の例示的な実施形態としては、以下で例示されるリンカーが挙げられる(例示されるように、リンカーは、リンカーを抗体に共有結合で連結するのに好適な基を含む)：

【0191】

10









20

30

40

50

【化 1 3 - 1】



【 0 1 9 2】

10


20

30

40

50

【化 1 3 - 2】



【0193】

特定の実施形態において、構造式（IVa）、（IVb）、（IVc）、または（IVd）を含むリンカーは、酸性媒体への曝露によって切断可能なカーボネート部分をさらに含む。特定の実施形態において、リンカーは、酸素を介して細胞傷害性物質および／または細胞増殖抑制性物質に取り付けられる。

【0194】

6. 2. 4. 切断不可能なリンカー

切断可能なリンカーは一定の利点を提供し得るが、本開示の抗グリコMUC1 ADCを含むリンカーは、必ずしも切断可能でなくてもよい。切断不可能なリンカーの場合、薬

物の放出は、血漿と一部の細胞質内区画との間で特性が異なることに依存しない。薬物の放出は、抗原媒介エンドサイトーシスを介したADCの内在化とリソソーム区画への送達後に起こり、そこで抗体は、細胞内タンパク質分解を介してアミノ酸レベルに分解されると仮定されている。このプロセスは、薬物、リンカー、およびリンカーが共有結合で取り付けられたアミノ酸残基によって形成される薬物誘導体を放出する。切断不可能なリンカーとのコンジュゲートからのアミノ酸薬物代謝産物は、切断可能なリンカーとのコンジュゲートと比較して、より親水性であり、一般的にはより低い膜透過性であり、それにより、より少ないバイスタンダー作用およびより少ない非特異的な毒性が生じる。一般的に、切断不可能なリンカーとのADCは、循環中で切断可能なリンカーとのADCより大きい安定性を有する。切断不可能なリンカーは、アルキレン鎖であってもよく、または天然の重合体、例えば、ポリアルキレングリコールポリマー、アミドポリマーベースのものであってもよいし、またはアルキレン鎖、ポリアルキレングリコール (glucol) および／またはアミドポリマーのセグメントを含んでもよい。

【0195】


薬物を抗体に連結するのに使用される様々な切断不可能なリンカーが記載されている。それぞれが参照により本明細書に組み入れられる、Jeffrey et al., 2006, Bioconjug. Chem. 17; 831-840; Jeffrey et al., 2007, Bioorg. Med. Chem. Lett. 17:2278-2280; and Jiang et al., 2005, J. Am. Chem. Soc. 127:11254-11255を参照されたい。これらのリンカーはいずれも、本開示の抗グリコMUC1 ADC中に含まれていてもよい。

【0196】

特定の実施形態において、リンカーは、インビボで切断不可能であり、例えば、構造式(VIa)、(VIb)、(VIc)または(VId)によるリンカーであり(例示された通り)、リンカーは、リンカーを抗体に共有結合で連結するのに好適な基:

【0197】

【化14】



またはその塩を含み、式中、 R^a は、水素、アルキル、スルホネートおよびメチルスルホネートから選択され； R^x は、リンカーを抗体に共有結合で連結することが可能な官能基を含む部分であり；

【0198】

【化 15】

は、リンカーの細胞傷害性物質および／または細胞増殖抑制性物質への取り付け点を表す。

【0199】

本開示の抗グリコMUC1 ADC中に含まれ得る構造式(VIa)～(VI d)によるリンカーの特定の例示的な実施形態としては、以下で例示されるリンカーが挙げられる(例示されるように、リンカーは、リンカーを抗体に共有結合で連結するのに好適な基を含み、


【0200】

【化 16】

は、細胞傷害性物質および／または細胞増殖抑制性物質)への取り付け点を表す。

【0201】

【化 17】



【0202】

6. 2. 5. リンカーを抗体に取り付けるのに使用される基

リンカー-薬物シントンを抗体に取り付けてADCを得るために、様々な基を使用する

ことができる。取り付け基は、本質的に求電子性であってもよく、その例としては、マレイミド基、活性化ジスルフィド、活性エステル、例えばNHSエステルおよびHOBTエステル、ギ酸ハロゲン化物、酸ハロゲン化物、ハロゲン化アルキルおよびベンジル、例えばハロアセトアミドが挙げられる。以下で論じられるように、本開示に従って使用することができる「自己安定化」マレイミドおよび「架橋形成ジスルフィド」に関する新興の技術もある。使用される具体的な基は、抗体への取り付け部位に一部依存すると予想される。

【0203】

抗体コンジュゲーション条件下で自発的に加水分解して安定性が改善されたADC種を生じる「自己安定化」マレイミド基の一例を以下の略図に描写する。米国特許出願公開第20130309256号明細書；さらに、Lyon et al., Nature Biotech published online, doi:10.1038/nbt.2968も参照されたい。

【0204】

10

20


30

40

50

【化 1 8】

通常の系:



10

20

30

経時的に「DAR 喪失」に至る


【 0 2 0 5】

40

50


【化 19】

SGN MalDPR(マレイミドジプロピルアミノ)系:



10

米国特許出願公開
第 20130309256 号明細書



20

【0206】

Polythericsは、天然ヒンジジスルフィド結合の還元から誘導されたスルフヒドリル基の対を架橋する方法を開示している。Badescu et al., 2014, Bioconjugate Chem. 25:1124-1136を参照されたい。この反応を以下の略図に描写する。この手法の利点は、IgGの完全な還元（スルフヒドリルの4つの対を生じる）とそれに続く4当量のアルキル化剤との反応によって富化したDAR 4 ADCを合成する能力である。「架橋されたジスルフィド」を含有するADCも、安定性が増加したと述べられている。


30

【0207】

40

50

【化 2 0】




【0208】

同様に、以下で描写されるように、スルフヒドリル基の対を架橋することが可能なマレイミド誘導体（1、以下）が開発されている。国際公開第2013／085925号パンフレットを参照されたい。

【0209】

【化 2 1】



10

【0 2 1 0】

6. 2. 6. リンカー選択の考察

当業者公知のように、特定のADCのための選択されたリンカーは、これらに限定されないが、抗体への取り付けの部位（例えば、lys、cysまたは他のアミノ酸残基）、薬物の薬理作用団の構造的な拘束、および薬物の親油性などの様々な要因によって影響を受ける可能性がある。具体的なADCのための選択されたリンカーは、具体的な抗体／複合薬に対してこれらの様々な要因のバランスをとることが求められることになる。ADCにおけるリンカーの選択によって影響を受ける要因の総論に関して、Nolting, Chapter 5 “Linker Technology in Antibody-Drug Conjugates,” In: Antibody-Drug Conjugates: Methods in Molecular Biology, vol. 1045, pp. 71-100, Laurent Ducry (Ed.), Springer Science & Business Media, LLC, 2013を参照されたい。

20

【0 2 1 1】

例えば、ADCは、抗原陽性腫瘍細胞の近くに存在するバースタンダー抗原陰性細胞を致死させることが観察されている。ADCによるバースタンダー細胞致死のメカニズムは、ADCの細胞内プロセッシング中に形成された代謝産物が役割を果たし得ることを示した。抗原陽性細胞中でのADCの代謝によって生成した中性の細胞傷害性の代謝産物は、バースタンダー細胞致死において役割を果たすようであるが、電荷を有する代謝産物は、膜を介した媒体への拡散が阻止される可能性があり、それゆえにバースタンダー致死に影響を与えることができない。特定の実施形態において、リンカーは、ADCの細胞代謝産物によって引き起こされるバースタンダー致死作用を弱めるように選択される。特定の実施形態において、リンカーは、バースタンダー致死作用を増加させるように選択される。

30

【0 2 1 2】

またリンカーの特性も、使用および／または貯蔵条件下でADCの凝集に影響を与える可能性がある。典型的には、文献で報告されたADCは、抗体分子1個当たり3～4個以下の薬物分子を含有する（例えば、Chari, 2008, Acc Chem Res 41:98-107を参照）。より高い薬物対抗体の比率（「DAR」）を得ようとする試みは、特に薬物とリンカーの両方が疎水性の場合、ADCが凝集するため失敗することが多い（King et al., 2002, J Med Chem 45:4336-4343; Hollander et al., 2008, Bioconjugate Chem 19:358-361; Burke et al., 2009 Bioconjugate Chem 20:1242-1250）。多くの例において、3～4より高いDARが、効力増加の手段として有益であり得る。細胞傷害性物質および／または細胞増殖抑制性物質が本質的に疎水性である例において、特に3～4より大きいDARが望ましい例において、ADC凝集を低減させる手段として、相対的に親水性のリンカーを選択することが望ましい場合がある。したがって、特定の実施形態において、リンカーは、貯蔵および／または使用中にADCの凝集を低減する化学成分を取り込んでいる。リンカーは、ADCの凝集を低減するために、極性または親水性基、例えば電荷を有する基または生理学的なpHで電荷を有するようになる基を取り込んでいてもよい。

40

50

例えば、リンカーは、生理学的な pH で、例えばカルボン酸を脱プロトン化する、または例えばアミンをプロトン化する、電荷を有する基、例えば塩または基を取り込んでいてもよい。

【0213】

20もの高いDARをもたらすと報告されている、多数の細胞傷害性物質および／または細胞増殖抑制性物質を抗体に連結するのに使用できる例示的な多価リンカーは、その内容が参照によりそれらの全体が本明細書に組み入れられる、国際公開第2009/073445号パンフレット；国際公開第2010/068795号パンフレット；国際公開第2010/138719号パンフレット；国際公開第2011/120053号パンフレット；国際公開第2011/171020号パンフレット；国際公開第2013/096901号パンフレット；国際公開第2014/008375号パンフレット；国際公開第2014/093379号パンフレット；国際公開第2014/093394号パンフレット；国際公開第2014/093640号パンフレットに記載されている。

【0214】

特定の実施形態において、貯蔵または使用中のADCの凝集は、サイズ排除クロマトグラフィー（SEC）によって決定した場合、約10%未満である。特定の実施形態において、貯蔵または使用中のADCの凝集は、サイズ排除クロマトグラフィー（SEC）によって決定した場合、10%未満、例えば、約5%未満、約4%未満、約3%未満、約2%未満、約1%未満、約0.5%未満、約0.1%未満であるか、またはそれよりさらに低い。

【0215】

6.2.7. 抗グリコMUC1 ADCを作製する方法

本開示の抗グリコMUC1 ADCは、周知の化学的方法を使用して合成することができる。選択された化学的方法は、数ある中でも、細胞傷害性物質および／または細胞増殖抑制性物質、リンカーを抗体に取り付けるのに使用されるリンカーおよび基の性質に依存すると予想される。一般的に、式（I）によるADCは、以下のスキームに従って調製することができる：



式中、D、L、Ab、XYおよびnはこれまでに定義した通りであり、R^XおよびR^Yは、上記で論じられたように、互いに共有結合による連結を形成することが可能な補完的な基を表す。

【0216】

R^XおよびR^Y基の性質は、シントンド-L-R^Xを抗体に連結するのに使用される化学的方法に依存すると予想される。一般的に、使用される化学的方法は、抗体の完全性、例えばその標的に結合するその能力を変更しないものであるべきである。好ましくは、コンジュゲートした抗体の結合特性は、コンジュゲートしていない抗体の結合特性に極めて類似していると予想される。分子を抗体などの生体分子にコンジュゲートするための様々な化学的方法および技術が当業界において公知であり、特に抗体にコンジュゲートするためのものが周知である。例えば、Amon et al., "Monoclonal Antibodies For Immunotargeting Of Drugs In Cancer Therapy," in: Monoclonal Antibodies And Cancer Therapy, Reisfeld et al. Eds., Alan R. Liss, Inc., 1985; Hellstrom et al., "Antibodies For Drug Delivery," in: Controlled Drug Delivery, Robinson et al. Eds., Marcel Dekker, Inc., 2nd Ed. 1987; Thorpe, "Antibody Carriers Of Cytotoxic Agents In Cancer Therapy: A Review," in: Monoclonal Antibodies '84: Biological And Clinical Applications, Pinchera et al., Eds., 1985; "Analysis, Results, and Future Prospective of the Therapeutic Use of Radiolabeled Antibody In Cancer Therapy," in: Monoclonal Antibodies For Cancer Detection And Therapy, Baldwin et al., Eds., Academic Press, 1985; Thorpe et al., 1982, Immunol. Rev. 62:119-58; PCT国際公開第89/12624号パンフレットを参照されたい。これらの化学的方法のいずれも、シントンを抗体に連結するのに使用することができる。

【0217】

接近可能なリシン残基にシントンを連結するのに有用な官能基 R^x の数および化学的方法は公知であり、一例としては、これらに限定されないが、NHS-エステルおよびイソチオシアネートが挙げられる。

【0218】

システイン残基の接近可能な遊離のスルフヒドリル基にシントンを連結するのに有用な官能基 R^x の数および化学的方法は公知であり、一例としては、これらに限定されないが、ハロアセチルおよびマレイミドが挙げられる。

【0219】

しかしながら、コンジュゲーションの化学的性質は、利用可能な側鎖基に限定されない。アミンなどの側鎖は、適切な小分子をアミンに連結することによって、他の有用な基、例えばヒドロキシルに変換することができる。この戦略は、抗体の接近可能なアミノ酸残基の側鎖に多官能性の小分子をコンジュゲートすることによって抗体上の利用可能な連結部位の数を増加させるために使用することができる。次いで、これらの「変換された」官能基にシントンを共有結合で連結するのに好適な官能基 R^x が、シントンに含まれる。

【0220】

抗体はまた、コンジュゲーションのためのアミノ酸残基を含むように操作することができる。ADCの状態では薬物をコンジュゲートするのに有用な非遺伝子コード化アミノ酸残基を含むように抗体を操作するためのアプローチは、非コード化アミノ酸にシントンを連結するのに有用な化学的方法および官能基と共に、Axupet al., 2012, Proc Natl Acad Sci USA, 109(40):16101-16106によって記載されている。

【0221】

典型的には、シントンは、抗体のアミノ酸残基の側鎖に、例えば、接近可能なリシン残基の一級アミノ基または接近可能なシステイン残基のスルフヒドリル基などに連結されている。遊離のスルフヒドリル基は、鎖間のジスルフィド結合を還元することにより得ることができる。

【0222】

R^y がスルフヒドリル基である場合（例えば、 R^x がマレイミドである場合）の連結では、一般的に、抗体はまず完全または部分的に還元して、システイン残基間の鎖間のジスルフィド架橋を崩壊させる。

【0223】

1つまたは複数のコドンの突然変異によって、ジスルフィド架橋に参加しないシステイン残基が抗体に入るように操作することができる。これらの対応のないシステインの還元により、コンジュゲーションに好適なスルフヒドリル基が生じる。操作されたシステインを取り込むのに好ましい位置としては、一例として、これらに限定されないが、ヒトIgG₁重鎖上の、S112C位、S113C位、A114C位、S115C位、A176C位、S180C位、S252C位、V286C位、V292C位、S357C位、A359C位、S398C位、S428C位（Kabattの番号付け）、およびヒトIgG₁軽鎖上の、V110C位、S114C位、S121C位、S127C位、S168C位、V205C位（Kabattの番号付け）が挙げられる（例えば、米国特許第7,521,541号明細書、米国特許第7,855,275号明細書および米国特許第8,455,622号明細書を参照）。

【0224】

当業者により理解されていると予想されるように、抗体分子に連結された多数の細胞傷害性物質および／または細胞増殖抑制性物質は、一部の抗体は1つの連結された薬剤を含有する、一部の抗体は2つの連結された薬剤を含有する、一部の抗体は3つの連結された薬剤を含有するなど（一部の抗体は連結された薬剤を含有しない）、ADCの集合体が本質的に不均質であり得るように変更することが可能である。不均質性の程度は、数ある中でも、細胞傷害性物質および／または細胞増殖抑制性物質を連結するのに使用される化学的方法に依存すると予想される。例えば、抗体が還元されて取り付けのためのスルフヒド

10

20

30

40

50

リル基が生じる場合、分子1個当たり0、2、4、6または8個の連結された薬剤を有する抗体の不均質な混合物が産生されることが多い。さらに、取り付け化合物のモル比を制限することによって、分子1個当たり0、1、2、3、4、5、6、7または8個の連結された薬剤を有する抗体が産生されることが多い。したがって、文脈に応じて、述べられるDARは、抗体の集合体の平均であり得ることが理解されたと予想される。例えば、「DAR4」は、特定のDARピークを単離するために精製に供されておらず、抗体1個当たりの取り付けられた細胞増殖抑制性物質および／または細胞傷害性物質の数が異なる（例えば、抗体1個当たり0、2、4、6、8個の薬剤）ADC分子の不均質な混合物を含み得るが、平均の薬物対抗体の比率が4であるADC調製物を指すことができる。同様に、一部の実施形態において、「DAR2」は、平均の薬物対抗体の比率が2である不均質なADC調製物を指す。

10

【0225】

富化した調製物が望ましい場合、既定の数の連結された細胞傷害性物質および／または細胞増殖抑制性物質を有する抗体は、不均質な混合物の精製を介して、例えば、カラムクロマトグラフィー、例えば、疎水性相互作用クロマトグラフィーを介して得ることができる。

【0226】

純度は、当業界において公知のように、様々な方法によって評価することができる。具体的な例として、ADC調製物は、HPLCまたは他のクロマトグラフィーを介して分析してもよく、純度は、得られたピークの曲線下面積を分析することによって評価してもよい。

20

【0227】

6.3 キメラ抗原受容体

本発明の開示は、本明細書に記載される抗グリコムUC1抗体または抗原結合フラグメントを含むキメラ抗原受容体(CAR)を提供する。

【0228】

本開示のCARは、典型的には、膜貫通ドメインに作動可能に連結した細胞外ドメインを含み、これが順にシグナル伝達のための細胞内ドメインに作動可能に連結している。

【0229】

本開示のCARの細胞外ドメインは、抗グリコムUC1抗体または抗原結合フラグメントの配列（例えば、セクション6.1または実施形態1から145に記載される通り）を含む。

30

【0230】

例示的な膜貫通ドメイン配列および細胞内ドメイン配列は、それぞれセクション6.3.1および6.3.2に記載されている。

【0231】

本明細書に記載される数々の融合タンパク質（例えば、実施形態152および153）は、CARであり、CARに関連する開示は、このような融合タンパク質に適用される。

【0232】

6.3.1. 膜貫通ドメイン

40

膜貫通ドメインに関して、CARは、CARの細胞外ドメインに作動可能に連結された（例えば、融合した）膜貫通ドメインを含むように設計することができる。

【0233】

膜貫通ドメインは、天然源または合成源のいずれに由来するものでもよい。源が天然である場合、ドメインは、あらゆる膜結合または膜貫通タンパク質由来であり得る。この開示における特定の用途の膜貫通領域は、T細胞受容体、CD28、CD3イプシロン、CD45、CD4、CD5、CD8、CD9、CD16、CD22、CD33、CD37、CD64、CD80、CD86、CD134、CD137、CD154のアルファ、ベータまたはゼータ鎖由来であってもよい（すなわち、その少なくとも膜貫通領域を含んでいてもよい）。一部の場

50

ヒンジも同様に採用することができる。

【0234】

一実施形態において、膜貫通ドメインは、合成である（すなわち、天然に存在しない）。合成膜貫通ドメインの例は、ロイシンおよびバリンなどの主として疎水性の残基を含むペプチドである。好ましくは、合成膜貫通ドメインの各末端に、フェニルアラニン、トリプトファンおよびバリンの三つ組が見出されると予想される。任意選択で、短いオリゴまたはポリペプチドリンカー、好ましくは2から10アミノ酸の長さのものが、膜貫通ドメインとCARの細胞質内シグナル伝達ドメインとの間に連結を形成することができる。グリシン-セリンの二つ組は、特に好適なリンカーを提供する。

【0235】

一実施形態において、本開示のCARにおける膜貫通ドメインは、CD8膜貫通ドメインである。一実施形態において、CD8膜貫通ドメインは、アミノ酸配列YLHLGALGRDLWGPPSPVTGYHPLL（配列番号102）を含む。

【0236】

一実施形態において、本開示のCARにおける膜貫通ドメインは、CD28膜貫通ドメインである。一実施形態において、CD28膜貫通ドメインは、アミノ酸配列FWVLVVVGGLACYSLLVTVAFIIFWV（配列番号103）を含む。

【0237】

一部の場合において、本開示のCARの膜貫通ドメインは、CD8aヒンジドメインを含む。一実施形態において、CD8aヒンジドメインは、アミノ酸配列TTTPAPRPPTPAPTIASQPLSLRPEACRPAAGGAVHTRGLDFAC（配列番号104）を含む。

【0238】

6.3.2. 細胞内ドメイン

本開示のCARの細胞内シグナル伝達ドメインは、CARが発現される免疫細胞の正常なエフェクター機能の少なくとも1つの活性化に関与する。用語「エフェクター機能」は、細胞の特殊化した機能を指す。例えばT細胞のエフェクター機能は、細胞溶解活性またはサイトカインの分泌を含むヘルパー活性であり得る。したがって、用語「細胞内シグナル伝達ドメイン」は、エフェクター機能シグナルを変換し、細胞が特殊化した機能を実行するように方向付けるタンパク質の部分の部分を指す。通常、細胞内シグナル伝達ドメイン全体が採用できるが、多くの場合において、鎖全体を使用することは必ずしも必要ではない。細胞内シグナル伝達ドメインの短縮化された部分の使用される限りにおいて、このような短縮化された部分は、それがエフェクター機能シグナルを変換しさえすれば、無傷の鎖の代わりに使用することができる。したがって細胞内シグナル伝達ドメインという用語は、エフェクター機能シグナルを変換するのに十分な、細胞内シグナル伝達ドメインのあらゆる短縮化された部分を含むことを意味する。

【0239】

本開示のCARで使用するための細胞内シグナル伝達ドメインの好ましい例としては、抗原受容体と結合した後に協同的に作用してシグナル伝達を開始させるT細胞受容体（TCR）および補助受容体の細胞質内配列、加えて、これらの配列のあらゆる誘導体またはバリエーション、および同じ機能的な能力を有するあらゆる合成配列が挙げられる。

【0240】

TCR単独により生成したシグナルは、T細胞の完全な活性化には不十分な場合があり、二次または共刺激シグナルも必要である。したがって、T細胞の活性化は、2つの別個のクラスの細胞質内シグナル伝達配列、すなわち、TCRを介して抗原依存性の一次活性化を開始させるシグナル伝達配列（一次細胞質内シグナル伝達配列）、および抗原非依存性の方式で作用して、二次または共刺激シグナルをもたらすシグナル伝達配列（二次細胞質内シグナル伝達配列）によって媒介されることができる。

【0241】

一次細胞質内シグナル伝達配列は、刺激によるか、または阻害によるかのいずれかでT

10

20

30

40

50

C R複合体の一次活性化を調節する。刺激による方式で作用する一次細胞質内シグナル伝達配列は、免疫受容体チロシンベース活性化モチーフまたはI T A Mとして公知のシグナル伝達モチーフを含有していてもよい。

【0242】

本開示のC A Rにおいて特定の用途を有するI T A Mを含有する一次細胞質内シグナル伝達配列の例としては、T C Rゼータ、F c Rガンマ、F c Rベータ、C D 3ガンマ、C D 3デルタ、C D 3イプシロン、C D 5、C D 2 2、C D 7 9 a、C D 7 9 b、およびC D 6 6 d由来のものが挙げられる。本開示のC A Rにおける細胞質内シグナル伝達分子は、C D 3-ゼータ由来の細胞質内シグナル伝達配列を含むことが特に好ましい。

【0243】

好ましい実施形態において、C A Rの細胞質内ドメインは、I T A Mを含有する一次細胞質内シグナル伝達配列ドメイン（例えば、C D 3-ゼータのもの）そのものを含む、または本開示のC A Rの状況で有用な他のあらゆる望ましい細胞質内ドメインと組み合わせて含むように設計される。例えば、C A Rの細胞質内ドメインは、C D 3ゼータ鎖部分および共刺激シグナル伝達領域を含んでもよい。

【0244】

共刺激シグナル伝達領域は、共刺激分子の細胞内ドメインを含むC A Rの部分を目指す。共刺激分子は、リンパ球の抗原への効率的な応答に必要な、抗原受容体またはそのリガンド以外の細胞表面分子である。このような分子の例としては、C D 2 7、C D 2 8、4-1 B B (C D 1 3 7)、O X 4 0、C D 3 0、C D 4 0、P D-1、I C O S、リンパ球機能関連抗原-1 (L F A-1)、C D 2、C D 7、L I G H T、N K G 2 C、B 7-H 3、およびC D 8 3と特異的に結合するリガンドなどが挙げられる。

【0245】

本開示のC A Rの細胞質内シグナル伝達部分内の細胞質内シグナル伝達配列は、ランダムな、または特定された順番で互いに連結されていてもよい。任意選択で、短いオリゴまたはポリペプチドリンカー、好ましくは2から10アミノ酸の長さのものが、連結を形成することができる。グリシン-セリンの二つ組は、特に好適なリンカーを提供する。

【0246】

一実施形態において、細胞質内ドメインは、C D 3-ゼータのシグナル伝達ドメインおよびC D 2 8のシグナル伝達ドメインを含む。別の実施形態において、細胞質内ドメインは、C D 3-ゼータのシグナル伝達ドメインおよび4-1 B Bのシグナル伝達ドメインを含む。

【0247】

6. 4 核酸、組換えベクターおよび宿主細胞

本発明の開示は、抗グリコM U C 1抗体の免疫グロブリン軽鎖および重鎖遺伝子をコードする核酸分子、このような核酸を含むベクター、および本開示の抗グリコM U C 1抗体を産生することが可能な宿主細胞を包含する。特定の態様において、核酸分子は、本開示の抗グリコM U C 1抗体および抗体結合フラグメント（例えば、セクション6. 1および実施形態1~145に記載される通り）、加えて、それらを含有する融合タンパク質（例えば、実施形態146~151に記載される通り）およびキメラ抗原受容体（例えば、セクション6. 3および実施形態152~153に記載される通り）をコードし、宿主細胞は、それらを発現することが可能である。本開示の例示的なベクターは、実施形態166~168に記載されており、例示的な宿主細胞は、実施形態169~172に記載されている。

【0248】

本開示の抗グリコM U C 1抗体は、宿主細胞中での免疫グロブリン軽鎖および重鎖遺伝子の組換え発現によって調製することができる。抗体を組換え発現するために、宿主細胞は、抗体の免疫グロブリン軽鎖および重鎖をコードするD N Aフラグメントを有する1つまたは複数の組換え発現ベクターをトランスフェクトされ、それにより、軽鎖および重鎖が宿主細胞中で発現され、任意選択でそれらは宿主細胞が培養される培地に分泌され、そ

10

20

30

40

50

の培地から抗体を回収することができる。標準的な組換えDNA手法は、抗体重鎖および軽鎖遺伝子を得て、これらの遺伝子を組換え発現ベクターに組み込み、ベクターを、宿主細胞に、例えば、Molecular Cloning; A Laboratory Manual, Second Edition (Sambrook, Fritsch and Maniatis (eds), Cold Spring Harbor, N. Y., 1989), Current Protocols in Molecular Biology (Ausubel, F. M. et al., eds., Greene Publishing Associates, 1989)および米国特許第4,816,397号明細書に記載されるものに導入するのに使用される。

【0249】

このような抗グリコMUC1抗体をコードする核酸を生成するために、まず、軽鎖および重鎖可変領域をコードするDNAフラグメントを得る。これらのDNAは、例えばポリメラーゼ連鎖反応(PCR)を使用して、軽鎖および重鎖可変配列をコードする生殖細胞系DNAまたはcDNAを増幅および改変することにより得ることができる。ヒト重鎖および軽鎖可変領域遺伝子の生殖細胞系DNA配列は、当業界において公知である(例えば、「VBASE」ヒト生殖細胞系配列データベースを参照されたい; Kabat et al., 1991, Sequences of Proteins of Immunological Interest, Fifth Edition, U.S. Department of Health and Human Services, NIH Publication No.91-3242; Tomlinson et al., 1992, J. Mol. Biol. 227:116-198; and Cox et al., 1994, Eur. J. Immunol. 24:827-836も参照されたい; これらそれぞれの内容は参照により本明細書に組み入れられる)。

【0250】

抗グリコMUC1抗体関連のV_HおよびV_LセグメントをコードするDNAフラグメントが得られたら、これらのDNAフラグメントはさらに、標準的な組換えDNA技術によって操作して、例えば、可変領域遺伝子を、全長抗体鎖遺伝子、Fabフラグメント遺伝子またはscFv遺伝子に変換することができる。これらの操作において、V_HまたはV_LをコードするDNAフラグメントは、別のタンパク質、例えば抗体定常領域またはフレキシブルなリンカーをコードする別のDNAフラグメントに作動可能に連結されている。用語「作動可能に連結される」は、この状況で使用される場合、2つのDNAフラグメントによってコードされたアミノ酸配列がフレーム内に残るように2つのDNAフラグメントが合体することを意味することが意図される。

【0251】

V_H領域をコードする単離されたDNAは、V_HをコードするDNAを、重鎖定常領域(CH₁、CH₂、CH₃、および任意選択でCH₄)をコードする別のDNA分子に作動可能に連結することによって、全長重鎖遺伝子に変換することができる。ヒト重鎖定常領域遺伝子の配列は、当業界において公知であり(例えば、Kabat et al., 1991, Sequences of Proteins of Immunological Interest, Fifth Edition, U.S. Department of Health and Human Services, NIH Publication No.91-3242を参照)、これらの領域を包含するDNAフラグメントは、標準的なPCR増幅により得ることができる。重鎖定常領域は、IgG₁、IgG₂、IgG₃、IgG₄、IgA、IgE、IgMまたはIgDの定常領域であってもよいが、特定の実施形態において、IgG₁またはIgG₄の定常領域である。Fabフラグメント重鎖遺伝子の場合、V_HをコードするDNAは、重鎖CH₁定常領域のみをコードする別のDNA分子に作動可能に連結されていてもよい。

【0252】

V_L領域をコードする単離されたDNAは、V_LをコードするDNAを、軽鎖定常領域、CLをコードする別のDNA分子に作動可能に連結することによって、全長軽鎖遺伝子(加えてFab軽鎖遺伝子)に変換することができる。ヒト軽鎖定常領域遺伝子の配列は、当業界において公知であり(例えば、Kabat et al., 1991, Sequences of Proteins of Immunological Interest, Fifth Edition, U.S. Department of Health and Human Services, NIH Publication No.91-3242を参照)、これらの領域を包含するDNAフラグメントは、標準的なPCR増幅により得ることができる。軽鎖定常領域は、カッパまたはラムダ定常領域であってもよいが、特定の実施形態において、カッパ定常領域である。

【0253】

s c F v 遺伝子を作製するために、V_HおよびV_LをコードするDNAフラグメントは、V_HおよびV_L配列が、V_HおよびV_L領域がフレキシブルなリンカーによって合体した連続する単鎖タンパク質として発現できるように、フレキシブルなリンカーをコードする別のフラグメント、例えばアミノ酸配列 (G l y₄ ~ S e r)₃をコードする別のフラグメントに作動可能に連結されていてもよい (例えば、Bird et al., 1988, Science 242:423-426; Huston et al., 1988, Proc. Natl. Acad. Sci. USA 85:5879-5883; McCafferty et al., 1990, Nature 348:552-554を参照)。

【0254】

本開示の抗グリコムUC1抗体を発現させるために、上述したようにして得られた部分的または全長の軽鎖および重鎖をコードするDNAは、遺伝子が転写および翻訳制御配列に作動可能に連結されるように発現ベクターに挿入される。この文脈において、用語「作動可能に連結した」は、ベクター内の転写および翻訳制御配列が、抗体遺伝子の転写および翻訳を調節するそれらの意図した機能を発揮するように、抗体遺伝子がベクターにライゲートされることを意味することが意図される。発現ベクターおよび発現制御配列は、使用される発現宿主細胞に適合するように選ばれる。抗体軽鎖遺伝子および抗体重鎖遺伝子は、別個のベクターに挿入されていてもよいし、またはより典型的には、両方の遺伝子が同じ発現ベクターに挿入される。

【0255】

抗体遺伝子は、標準的な方法 (例えば、抗体遺伝子フラグメントおよびベクター上の相補的制限部位ライゲーション、または制限部位が存在しない場合、平滑末端のライゲーション) によって発現ベクターに挿入される。抗グリコムUC1抗体関連の軽鎖または重鎖配列の挿入の前に、発現ベクターは、すでに抗体定常領域配列を有していてもよい。例えば、抗グリコムUC1モノクローナル抗体関連のV_HおよびV_L配列を全長抗体遺伝子に変換するための1つのアプローチは、V_Hセグメントがベクター内のC_Hセグメントに作動可能に連結され、V_Lセグメントがベクター内のC_Lセグメントに作動可能に連結されるように、重鎖定常および軽鎖定常領域をそれぞれ予めコードする発現ベクターにそれらを挿入することである。加えて、または代替として、組換え発現ベクターは、宿主細胞からの抗体鎖の分泌を容易にするシグナルペプチドをコードしていてもよい。抗体鎖遺伝子は、シグナルペプチドがフレーム内で抗体鎖遺伝子のアミノ末端に連結されるように、ベクターにクローニングすることができる。シグナルペプチドは、免疫グロブリンのシグナルペプチドまたは異種シグナルペプチド (すなわち、非免疫グロブリンタンパク質由来のシグナルペプチド) であってもよい。

【0256】

抗体鎖遺伝子に加えて、本開示の組換え発現ベクターは、宿主細胞中で抗体鎖遺伝子の発現を制御する調節配列を有する。用語「調節配列」は、プロモーター、エンハンサー、および抗体鎖遺伝子の転写または翻訳を制御する他の発現制御エレメント (例えば、ポリアデニル化シグナル) を含むことが意図される。このような調節配列は、例えば、Goeddel, Gene Expression Technology: Methods in Enzymology 185, Academic Press, San Diego, Calif., 1990に記載されている。当業者であれば、調節配列の選択を含む発現ベクターの設計は、形質転換しようとする宿主細胞の選択、望ましいタンパク質の発現のレベルなどのような要因によって決まる可能性があることを理解していると予想される。哺乳類宿主細胞発現に好適な調節配列としては、哺乳類細胞における高レベルのタンパク質発現を指示するウイルスエレメント、例えば、サイトメガロウイルス (CMV) 由来のプロモーターおよび／またはエンハンサー (例えばCMVプロモーター／エンハンサー)、シミアンウイルス40 (SV40) 由来のプロモーターおよび／またはエンハンサー (例えばSV40プロモーター／エンハンサー)、アデノウイルス由来のプロモーターおよび／またはエンハンサー (例えば、アデノウイルス主要後期プロモーター (AdMLP))、ならびにポリオーマ由来のプロモーターおよび／またはエンハンサーが挙げられる。ウイルス調節エレメントおよびその配列のさらなる説明に関して、例えば、S t i n s

k i による米国特許第 5, 168, 062 号明細書、B e l l らによる米国特許第 4, 510, 245 号明細書、および S c h a f f n e r らによる米国特許第 4, 968, 615 号明細書を参照されたい。

【0257】

抗体鎖遺伝子および調節配列に加えて、本開示の組換え発現ベクターは、宿主細胞中でのベクターの複製を調節する配列（例えば、複製起点）および選択可能マーカー遺伝子などの追加の配列を有していてもよい。選択可能マーカー遺伝子は、ベクターが導入された宿主細胞の選択を容易にする（例えば、全て A x e l らによる、米国特許第 4, 399, 216 号明細書、第 4, 634, 665 号明細書および第 5, 179, 017 号明細書を参照）。例えば、典型的には、選択可能マーカー遺伝子は、G 418、ハイグロマイシンまたはメトトレキセートなどの薬物に対する耐性を、ベクターが導入された宿主細胞に付与する。好適な選択可能マーカー遺伝子としては、ジヒドロ葉酸レダクターゼ（D H F R）遺伝子（D H F R⁻宿主細胞でメトトレキセート選択／増幅と共に使用するため）および n e o 遺伝子（G 418 選択のため）が挙げられる。軽鎖および重鎖の発現のために、重鎖および軽鎖をコードする発現ベクターは、標準的な技術によって宿主細胞にトランスフェクトされる。用語「トランスフェクション」の様々な形態は、例えば、エレクトロポレーション、リポフェクション、リン酸カルシウム沈殿、D E A E - デキストラントランスフェクションなどの、原核または真核宿主細胞への外因性 D N A の導入のために一般的に使用される様々な技術を含むことが意図される。

【0258】

原核または真核宿主細胞のいずれかで本開示の抗体を発現することが考えられる。特定の実施形態において、抗体の発現、または適切にフォールディングされ免疫学的に活性な抗体の最適な分泌は、真核細胞、例えば、哺乳類宿主細胞で実行される。本開示の組換え抗体を発現するための例示的な哺乳類宿主細胞としては、チャイニーズハムスター卵巣（C H O 細胞）（例えば、Urlaub and Chasin, 1980, Proc. Natl. Acad. Sci. USA 77: 4216-4220 に記載される D H F R⁻ C H O 細胞などであり、これは、例えば、Kaufman and Sharp, 1982, Mol. Biol. 159:601-621 に記載されるような D H F R 選択可能マーカーと共に使用される）、N S O 骨髓腫細胞、C O S 細胞および S P 2 細胞が挙げられる。抗体遺伝子をコードする組換え発現ベクターが哺乳類宿主細胞に導入される場合、抗体は、宿主細胞中での抗体の発現または宿主細胞が増殖する培養培地への抗体の分泌を可能にするのに十分な期間にわたり、宿主細胞を培養することによって産生される。抗体は、標準的なタンパク質精製方法を使用して培養培地から回収することができる。宿主細胞も、無傷抗体の一部、例えば F a b フラグメントまたは s c F v 分子を産生するために使用することができる。上記の手順のバリエーションは本発明の開示の範囲内であることが理解される。例えば、本開示の抗グリコ M U C 1 抗体の軽鎖または重鎖のいずれか（ただし両方ではない）をコードする D N A を宿主細胞にトランスフェクトすることが望ましい場合がある。

【0259】

本開示の C A R の発現に関して、例えばセクション 6.3 として、さらに実施形態 152 および 153 に記載される通り、好ましくは、宿主細胞は T 細胞であり、好ましくはヒト T 細胞である。一部の実施形態において、宿主細胞は、細胞が腫瘍細胞上の M U C 1 と架橋されると、抗腫瘍免疫を示す。本開示の T 細胞を産生するための詳細な方法は、セクション 6.4.1 に記載されている。

【0260】

組換え D N A 技術はまた、グリコ M U C 1 への結合に必ずしも必要ではない軽鎖および重鎖のいずれかまたは両方をコードする D N A の一部または全部を除去するのに使用することもできる。このような短縮化された D N A 分子から発現される分子も、本開示の抗体に包含される。

【0261】

本開示の抗グリコ M U C 1 抗体の組換え発現のために、宿主細胞は、2つの本開示の発

現ベクター、すなわち、重鎖由来のポリペプチドをコードする第1のベクターおよび軽鎖由来のポリペプチドをコードする第2のベクターをコトランスフェクトされてもよい。2つのベクターは、同一な選択可能マーカ含有していてもよく、またはそれらは、それぞれ別の選択可能マーカ含有していてもよい。代替として、両方の重鎖および軽鎖ポリペプチドをコードする単一のベクターを使用してもよい。

【0262】

核酸が抗グリコMUC1抗体の1つまたは複数の部分をコードするようになれば、例えば、異なるCDR配列を有する抗体、Fc受容体への親和性が低減した抗体、または異なるサブクラスの抗体をコードする核酸を生成するように、さらなる変更または突然変異をコード配列に導入することができる。

【0263】

本開示の抗グリコMUC1抗体はまた、化学合成によって（例えば、Solid Phase Peptide Synthesis, 2nd ed., 1984 The Pierce Chemical Co., Rockford, Ill.に記載される方法によって）産生することもできる。パリアント抗体も、無細胞プラットフォームを使用して生成することができる（例えば、Chu et al., Biochemia No.2, 2001 (Roch e Molecular Biologicals)およびMurray et al., 2013, Current Opinion in Chemical Biology, 17:420-426を参照）。

【0264】

組換え発現によって本開示の抗グリコMUC1抗体が産生されたら、免疫グロブリン分子の精製に関する当業界において公知のあらゆる方法によって、例えば、クロマトグラフィー（例えば、イオン交換、親和性、およびサイジングカラムクロマトグラフィー）、遠心分離、分別溶解によって、または他のあらゆる標準的なタンパク質精製技術によってこれを精製することができる。さらに、本発明の開示の抗グリコMUC1抗体および／または結合フラグメントは、精製を容易にするために、本明細書に記載される、またはそれ以外の当業界において公知の異種ポリペプチド配列に融合させることができる。

【0265】

抗グリコMUC1抗体は、単離されたら、必要に応じて、例えば高速液体クロマトグラフィーによって（Fisher, Laboratory Techniques In Biochemistry And Molecular Biology, Work and Burdon, eds., Elsevier, 1980を参照）、またはSuperdex（商標）75カラム（Pharmacia Biotech AB, Uppsala, Sweden）でのゲルろ過クロマトグラフィーによってさらに精製してもよい。

【0266】

6. 4. 1. T細胞におけるCARの組換え産生

一部の実施形態において、本開示の抗グリコMUC1 CARをコードする核酸は、レトロウイルスまたはレンチウイルスベクターを使用して細胞に送達される。CARを発現するレトロウイルスおよびレンチウイルスベクターは、担体として形質導入された細胞を使用して、またはカプセル化された、結合した、または裸のベクターの無細胞の局所または全身送達を使用して、異なるタイプの真核細胞に、さらには組織および生物全体にも送達することができる。使用される方法は、安定な発現が必要であるかまたは十分なあらゆる目的のための方法であり得る。

【0267】

他の実施形態において、CAR配列は、インビトロで転写されたmRNAを使用して細胞に送達される。インビトロで転写されたmRNA CARは、担体としてトランスフェクトされた細胞を使用して、またはカプセル化された、結合した、または裸のmRNAの無細胞の局所または全身送達を使用して、異なるタイプの真核細胞に、さらには組織および生物全体にも送達することができる。使用される方法は、一過性発現が必要であるかまたは十分なあらゆる目的のための方法であり得る。

【0268】

別の実施形態において、望ましいCARは、トランスポゾンによって細胞中で発現させることができる。

10

20

30

40

50

【0269】

本開示のRNAトランスフェクション方法の1つの利点は、RNAトランスフェクションは、本質的に一過性であり、ベクターを含まないことであり、すなわちRNA導入遺伝子は、リンパ球に送達され、短時間のインビトロにおける細胞活性化の後、いかなる追加のウイルス配列も必要とせずに、最小限の発現カセットとしてそこで発現される。これらの条件下で、宿主細胞ゲノムへの導入遺伝子の組み込みが起こる可能性は低い。細胞のクローニングは、必ずしもRNAのトランスフェクション効率やリンパ球集団全体を均一に改変するその能力によるわけではない。

【0270】

インビトロで転写されたRNA (IVT-RNA) でのT細胞の遺伝学的改変は、両方とも様々な動物モデルで継続的に試験されている2つの異なる戦略を利用する。細胞に、リポフェクションまたはエレクトロポレーションによって、インビトロで転写されたRNAをトランスフェクトする。好ましくは、移入されたIVT-RNAの持続的な発現を達成するために、様々な改変を使用してIVT-RNAを安定化させることが望ましい。

【0271】

一部のIVTベクターが、インビトロでの転写のためのテンプレートとして標準化された方式で利用されており、安定化されたRNA転写物が産生されるように遺伝子改変されていることが文献公知である。現在のところ、当業界で使用されるプロトコルは、以下の構造：RNA転写を可能にする5' RNAポリメラーゼプロモーター、それに続き3' および／または5' のいずれかで非翻訳領域 (UTR) に隣接する目的の遺伝子、および50～70個のAヌクレオチドを含有する3' ポリアデニルカセットを有するプラスミドベクターに基づく。インビトロでの転写の前に、環状プラスミドを、ポリアデニルカセットの下流でII型制限酵素 (認識配列は切断部位に対応する) によって線形化する。したがってポリアデニルカセットは、転写物中の後期ポリ (A) 配列に対応する。この手順の結果として、一部のヌクレオチドは、線形化後に酵素切断部位の一部として残り、3' 末端におけるポリ (A) 配列を伸長させるかまたはマスキングする。この非生理学的なオーバーハングが、このようなコンストラクトから細胞内で産生されたタンパク質の量に影響を与えるかどうかは不明確である。

【0272】

RNAは、より伝統的なプラスミドまたはウイルスアプローチを超える数々の利点を有する。RNA源からの遺伝子発現は、転写を必要とせず、タンパク質生成物は、トランスフェクションのすぐ後に産生される。さらに、RNAは、核ではなく細胞質に侵入するだけでよい。ため、典型的なトランスフェクション方法は、極めて高いトランスフェクション率をもたらす。加えて、プラスミドベースアプローチは、研究中の細胞中で目的の遺伝子の発現を駆動させるプロモーターを活性にすることを必要とする。

【0273】

別の態様において、RNAコンストラクトは、エレクトロポレーションによって細胞に送達することができる。例えば、米国特許出願公開第2004/0014645号明細書、米国特許出願公開第2005/0052630号明細書、米国特許出願公開第2005/0070841号明細書、米国特許出願公開第2004/0059285号明細書、米国特許出願公開第2004/0092907号明細書で教示されるような、哺乳類細胞への核酸コンストラクトのエレクトロポレーションの配合物および手法を参照されたい。あらゆる公知の細胞型のエレクトロポレーションに必要な電場強度などの様々なパラメーターは、一般的に、この分野の関連する研究文献に加えて多数の特許および出願において公知である。例えば、米国特許第6,678,556号明細書、米国特許第7,171,264号明細書、および米国特許第7,173,116号明細書を参照されたい。エレクトロポレーションの治療適用のための装置、例えば、MedPulser (商標) DNAエレクトロポレーション治療システム (Inovio/Genetronics、San Diego、Calif.) が商業的に利用可能であり、米国特許第6,567,694号明細書；米国特許第6,516,223号明細書、米国特許第5,993,434号明

10

20

30

40

50

細書、米国特許第6,181,964号明細書、米国特許第6,241,701号明細書、および米国特許第6,233,482号明細書などの特許に記載されており、エレクトロポレーションは、例えば米国特許出願公開第20070128708号明細書で記載されるように、インビトロでの細胞のトランスフェクションのためにも使用することができる。またエレクトロポレーションは、インビトロで核酸を細胞に送達することにも利用することができる。したがって、当業者公知の多くの利用可能なデバイスおよびエレクトロポレーションシステムのいずれかを利用する、発現コンストラクトを含む核酸の細胞へのエレクトロポレーション媒介投与は、標的細胞に目的のRNAを送達するためのエキサイティングな新しい手段を提供する。

【0274】

6.4.1.1 T細胞源

T細胞源は、増加させ遺伝学的に改変する前に、対象から得られる。用語「対象」は、免疫応答を惹起できる生物（例えば、哺乳動物）を含むことが意図される。対象の例としては、ヒト、イヌ、ネコ、マウス、ラット、およびそれらのトランスジェニック種が挙げられる。好ましくは、対象は、ヒトである。

【0275】

T細胞は、末梢血単核細胞、骨髓、リンパ節組織、臍帯血、胸腺組織、感染部位由来の組織、腹水、胸膜滲出液、脾臓組織、および腫瘍などの多数の源から得ることができる。本発明の開示の特定の実施形態において、当業界において入手可能な様々なT細胞株を使用することができる。本発明の開示の特定の実施形態において、T細胞は、Ficoll（商標）分離などの当業者公知の様々な技術を使用して対象から収集された血液単位から得ることができる。好ましい一実施形態において、個体の循環血液からの細胞は、アフエレーシスにより得られる。アフエレーシス生成物は、典型的には、T細胞を含むリンパ球、単球、顆粒球、B細胞、他の有核の白血球、赤血球、および血小板を含有する。一実施形態において、アフエレーシスによって収集された細胞を洗浄して、血漿画分を除去し、それに続く処理工程のために、細胞を適切な緩衝液または媒体中に入れることができる。本開示の一実施形態において、細胞は、リン酸緩衝食塩水（PBS）で洗浄される。代替の実施形態において、洗浄溶液は、カルシウムを欠いており、マグネシウムを欠いていてもよく、または部分的であっても多くの2価カチオンを欠いていてもよい。ここでも、驚くべきことに、カルシウムの非存在下における最初の活性化工程は、一層の活性化をもたらす。当業者であれば容易に理解していると予想されるように、洗浄工程は、当業者公知の方法によって、例えば、製造元の指示に従って半自動化「フロースルー」遠心分離機（例えば、Cobe 2991セルプロセッサ、Baxter Cytomate、またはHaemonetics Cell Saver 5）を使用することによって達成してもよい。洗浄後、細胞は、様々な生体適合性の緩衝液、例えば、Ca非含有、Mg非含有PBS、PlasmaLyte A、または緩衝液含有もしくは非含有の他の塩類溶液などに再懸濁してもよい。代替として、アフエレーシスサンプルの不要な成分を除去して、細胞を培養培地に直接再懸濁してもよい。

【0276】

別の実施形態において、T細胞は、赤血球を溶解させ、例えばPERCOLL（商標）勾配による遠心分離または対向流遠心溶出法により単球を枯渇させることによって末梢血リンパ球から単離される。T細胞の特定の部分集団、例えばCD3⁺、CD28⁺、CD4⁺、CD8⁺、CD45RA⁺およびCD45RO⁺T細胞は、陽性または陰性選択技術によってさらに単離することができる。例えば、一実施形態において、T細胞は、抗CD3/抗CD28（すなわち、3×28個の）コンジュゲートビーズ、例えばDYNABEA DS（登録商標）M-450 CD3/CD28Tと、望ましいT細胞の陽性選択に十分な期間にわたりインキュベートすることによって単離される。一実施形態において、期間は、約30分である。さらなる実施形態において、期間は、30分から、36時間またはそれより長い時間の範囲、その間の全ての整数値の範囲である。さらなる実施形態において、期間は、少なくとも1、2、3、4、5、または6時間である。さらに別の好ましい

10

20

30

40

50

実施形態において、期間は、10から24時間である。好ましい一実施形態において、インキュベーション期間は、24時間である。白血病を有する患者からのT細胞の単離の場合、より長いインキュベーション時間、例えば24時間の使用は、細胞収量を上昇させることができる。より長いインキュベーション時間は、腫瘍組織または免疫不全個体から腫瘍浸潤リンパ球(TIL)を単離する場合のように、他の細胞型と比較してT細胞が極めて少ないあらゆる状況でT細胞を単離するのに使用することができる。さらに、より長いインキュベーション時間の使用は、CD8+T細胞の捕捉効率を増加させることができる。したがって、単にT細胞をCD3/CD28ビーズに結合させる時間を短くするまたは長くすることによって、および/またはビーズのT細胞に対する比率を増加または減少させることによって(本明細書でさらに記載される通り)、培養開始のときに、またはプロセス中の他のタイムポイントで、T細胞の部分集団を、存在するかしないかにかかわらず優先的に選択することができる。加えて、ビーズまたは他の表面上の抗CD3および/または抗CD28抗体の比率を増加または減少させることによって、培養開始のときに、または他の望ましいタイムポイントで、T細胞の部分集団を、存在するかしないかにかかわらず優先的に選択することができる。当業者であれば、本開示の状況において複数回の選択も使用できることを認識しているものと予想される。特定の実施形態において、選択手順を実行し、活性化および増加プロセスで「選択されなかった」細胞を使用することが望ましい場合がある。「選択されなかった」細胞はまた、さらなる回数の選択に供することもできる。

10

【0277】

20

陰性選択によるT細胞集団の濃縮は、陰性選択された細胞に固有な表面マーカーに対する抗体を併用して達成することができる。1つの方法は、陰性選択された細胞上に提示される細胞表面マーカーに対するモノクローナル抗体のカクテルを使用する陰性磁気免疫接着またはフローサイトメトリーを介したセルソーティングおよび/または選択である。例えば、陰性選択によってCD4⁺細胞を富化するために、モノクローナル抗体カクテルは、典型的には、CD14、CD20、CD11b、CD16、HLA-DR、およびCD8に対する抗体を含む。特定の実施形態において、典型的にはCD4⁺、CD25⁺、CD62L^{hi}、GITR⁺、およびFoxP3⁺を発現する調節性T細胞を富化する、またはそれらを陽性選択することが望ましい場合がある。代替として、特定の実施形態において、調節性T細胞は、抗CD25コンジュゲートビーズまたは他の類似の選択方法によって、枯渇される。

30

【0278】

陽性または陰性選択による望ましい細胞集団の単離のために、細胞および表面(例えば、ビーズなどの粒子)の濃度は、様々であってもよい。特定の実施形態において、ビーズおよび細胞と一緒に混合する体積を顕著に減少させ(すなわち、細胞の濃度を増加させる)、細胞およびビーズの最大の接触を確実にすることが望ましい場合がある。例えば、一実施形態において、1ml当たり細胞20億個の濃度が使用される。一実施形態において、1ml当たり細胞10億個の濃度が使用される。さらなる実施形態において、1ml当たり細胞1億個より多くが使用される。さらなる実施形態において、1ml当たり細胞1000万、1500万、2000万、2500万、3000万、3500万、4000万、4500万、または5000万個の細胞濃度が使用される。さらに別の実施形態において、1ml当たり細胞7500万、8000万、8500万、9000万、9500万、または1億個からの細胞濃度が使用される。さらなる実施形態において、1ml当たり細胞1億2500万または1億5000万個の濃度が使用されてもよい。高濃度の使用は、細胞収量の上昇、細胞の活性化、および細胞の増加をもたらすことができる。さらに、高い細胞濃度の使用は、目的の標的抗原の発現が弱い可能性がある細胞、例えばCD28陰性T細胞のより効率的な捕捉、または多くの腫瘍細胞が存在するサンプル(すなわち、白血病の血液、腫瘍組織など)からの捕捉を可能にする。このような細胞集団は、治療的価値を有する可能性があり、入手が望ましいと予想される。例えば、高濃度の細胞の使用は、通常CD28発現が比較的弱いCD8⁺T細胞のより効率的な選択を可能にする。

40

50

【0279】

関連する実施形態において、より低い細胞濃度を使用することが望ましい場合がある。T細胞および表面（例えば、ビーズなどの粒子）の混合物を顕著に希釈することによって、粒子と細胞との間の相互作用が最小化される。これは、粒子に結合させようとする望ましい抗原を大量に発現する細胞を選択する。例えば、 $CD4^+$ T細胞は、より高いレベルの $CD28$ を発現し、希薄な濃度で $CD8^+$ T細胞より効率的に捕捉される。一実施形態において、使用される細胞濃度は、 $5 \times 10^6 / \text{ml}$ である。他の実施形態において、使用される濃度は、約 $1 \times 10^5 / \text{ml}$ から $1 \times 10^6 / \text{ml}$ 、およびその間のあらゆる整数値の範囲であってもよい。

【0280】

他の実施形態において、細胞は、回転器において、様々な長さの時間にわたり、様々な速度で、 $2^\circ\text{C} \sim 10^\circ\text{C}$ または室温のいずれかでインキュベートしてもよい。

【0281】

刺激のためのT細胞はまた、洗浄工程後に凍結してもよい。理論に縛られるつもりはないが、凍結およびそれに続く融解工程は、細胞集団中の顆粒球やある程度の単球を除去することによって、より均質な生成物を提供する。血漿および血小板を除去する洗浄工程後に、細胞を凍結溶液中に懸濁してもよい。多くの凍結溶液およびパラメーターが当業界において公知であり、この状況において有用であると予想されるが、1つの方法は、20% DMSOおよび8%ヒト血清アルブミンを含有するPBS、または10%デキストラン40および5%デキストロース、20%ヒト血清アルブミンおよび7.5% DMSO、もしくは31.25% PlasmaLyte-A、31.25%デキストロース5%、0.45% NaCl、10%デキストラン40および5%デキストロース、20%ヒト血清アルブミン、および7.5% DMSOを含有する培養培地、または例えばHespanおよびPlasmaLyte-Aを含有する他の好適な細胞凍結培地を使用することを含み、次いで細胞は、 $1^\circ / \text{分}$ の速度で -80°C に凍結され、液体窒素貯蔵タンクの気相中に貯蔵される。他の制御冷凍方法も、 -20°C で即座の、または液体窒素中の制御されていない冷凍と同様に使用することができる。

【0282】

特定の実施形態において、本発明の開示の方法を使用して活性化する前に、低温保存された細胞を融解し、本明細書に記載される通り洗浄し、室温で1時間そのまま静置する。

【0283】

また、本明細書に記載される増加した細胞が必要と思われるときの前の期間に、対象から血液サンプルまたはアフエーシス生成物を収集することも本開示の状況において予期される。したがって、増加させようとする細胞の源は、必要なあらゆるタイムポイントで収集でき、望ましい細胞、例えばT細胞を、T細胞療法によって利益を得ると予想される様々な疾患または状態、例えば本明細書に記載される疾患または状態のためのT細胞療法での後の使用のために単離および凍結することができる。一実施形態において、血液サンプルまたはアフエーシスは、全体的に健康な対象から採取される。特定の実施形態において、血液サンプルまたはアフエーシスは、疾患を発症させるリスクがあるが疾患をまだ発症させていない全体的に健康な対象から採取され、目的の細胞は、後の使用のために単離および凍結される。特定の実施形態において、T細胞は、その後の時間で増加する、凍結する、および使用することが可能である。特定の実施形態において、サンプルは、本明細書に記載される特定の疾患の診断の直後に、ただしいずれかの処置の前に、患者から収集される。さらなる実施形態において、様々な関連する処置法、例えば、これらに限定されないが、ナタリズマブ、エファリズマブ、抗ウイルス剤、化学療法剤、放射線、免疫抑制剤、例えばシクロスポリン、アザチオプリン、メトトレキサート、ミコフェノール酸塩、およびFK506、抗体、または他の免疫除去剤、例えばCAMPATH、抗CD3抗体、シトキサン、フルダラビン、シクロスポリン、FK506、ラパマイシン、ミコフェノール酸、ステロイド、FR901228、および放射線照射などの薬剤での処置の前に、細胞は、対象からの血液サンプルまたはアフエーシスから単離される。これらの薬

10

20

30

40

50

物は、カルシウム依存性ホスファターゼであるカルシニューリンを阻害するか（シクロスポリンおよびFK506）、または増殖因子によって誘導されたシグナル伝達にとって重要なp70S6キナーゼを阻害するか（ラパマイシン）のいずれかである。（Liu et al., Cell 66:807-815, 1991; Henderson et al., Immun. 73:316-321, 1991; Bierer et al., Curr. Opin. Immun. 5:763-773, 1993）。さらなる実施形態において、細胞は、化学療法剤、例えばフルダラビン、体外照射療法（XRT）、シクロホスファミドのいずれかを使用する骨髄もしくは幹細胞移植またはT細胞除去療法を併用する（例えば、その前の、それと同時の、またはその後の）後の使用のために、患者ごとに単離され、凍結される。

【0284】

本発明の開示のさらなる実施形態において、T細胞は、処置の直後に患者から得られる。これに関して、特定のがん処置の後、特に免疫系に損傷を与える薬物での処置の後、患者が通常処置から回復すると予想される期間中の処置の直後に、得られたT細胞の品質は、そのエクスピボで増加する能力に関して最適であるかまたは改善されている可能性があることが観察されている。同様に、本明細書に記載される方法を使用するエクスピボでの操作の後、これらの細胞は、生着およびインピボでの増加の強化にとって好ましい状況にある可能性がある。したがって、本発明の開示の状況において、この回復期間中、T細胞、樹状細胞、または他の造血系統の細胞を含む血液細胞を収集することが予期される。さらに、特定の実施形態において、動員（例えば、GM-CSFでの動員）およびコンディショニングレジメンは、特に療法後の既定された時間枠中に特定の細胞型の再定着、再循環、再生、および／または増加にとって好ましい、対象における状態を生じさせるために使用することができる。例示的な細胞型としては、T細胞、B細胞、樹状細胞、および他の免疫系細胞が挙げられる。

【0285】

6. 4. 1. 2 T細胞の活性化および増加

T細胞は、一般的に、例えば、米国特許第6,352,694号明細書；第6,534,055号明細書；第6,905,680号明細書；第6,692,964号明細書；第5,858,358号明細書；第6,887,466号明細書；第6,905,681号明細書；第7,144,575号明細書；第7,067,318号明細書；第7,172,869号明細書；第7,232,566号明細書；第7,175,843号明細書；第5,883,223号明細書；第6,905,874号明細書；第6,797,514号明細書；第6,867,041号明細書；および米国特許公開公報第20060121005号明細書に記載されるような方法を使用して活性化および増加される。

【0286】

一般的に、本開示のT細胞は、CD3/TCR複合体関連シグナルを刺激する薬剤およびT細胞表面上の共刺激分子を刺激するリガンドが取り付けられた表面と接触させることによって増加される。特に、T細胞集団は、例えば、抗CD3抗体もしくはその抗原結合フラグメント、または表面上に固定された抗CD2抗体と接触させることによって、またはカルシウムイオノフォアと共にプロテインキナーゼC活性化剤（例えば、プリオスタチン）と接触させることによって、本明細書に記載されるように刺激することができる。T細胞の表面上のアクセサリ分子の共刺激のために、アクセサリ分子と結合するリガンドが使用される。例えば、T細胞の集団は、T細胞の増殖を刺激するのに適切な条件下で、抗CD3抗体および抗CD28抗体と接触させることができる。CD4⁺T細胞またはCD8⁺T細胞のいずれかの増殖を刺激するために、抗CD3抗体および抗CD28抗体。抗CD28抗体の例としては、9.3、B-T3、XR-CD28（Diaclone、Besancon、France）が挙げられ、一般的に当業界で公知の他の方法と同様に使用できる（Berg et al., Transplant Proc. 30(8):3975-3977, 1998; Haanen et al., J. Exp. Med. 190(9):1319-1328, 1999; Garland et al., J. Immunol Meth. 227(1-2):53-63, 1999）。

【0287】

特定の実施形態において、T細胞に関する一次刺激シグナルおよび共刺激シグナルは、様々なプロトコールによって提供することができる。例えば、各シグナルを提供する薬剤は、溶液の形態であってもよいし、または表面にカップリングされていてもよい。表面にカップリングされる場合、薬剤は、同じ表面に（すなわち、「cis」構成で）または別の表面に（すなわち、「trans」構成で）カップリングされていてもよい。代替として、一方の薬剤が表面にカップリングされ、他方の薬剤が溶液の形態であってもよい。一実施形態において、共刺激シグナルを提供する薬剤が、細胞表面に結合しており、一次活性化シグナルを提供する薬剤が、溶液の形態であるかまたは表面にカップリングされている。特定の実施形態において、両方の薬剤が、溶液の形態であってもよい。別の実施形態において、薬剤は、可溶性の形態であってもよく、次いで、Fc受容体を発現する細胞などの表面に、または薬剤に結合すると予想される抗体もしくは他の結合剤に架橋されてもよい。これに関して、例えば、本発明の開示においてT細胞の活性化および増加での使用に関して予期される人工抗原提示細胞（aAPC）に関して、米国特許出願公開公報第20040101519号明細書および第20060034810号明細書を参照されたい。
【0288】

一実施形態において、2つの薬剤は、同じビーズ上、すなわち「cis」、または別のビーズ上、すなわち「trans」のいずれかで、ビーズ上に固定される。一例として、一次活性化シグナルを提供する薬剤は、抗CD3抗体またはその抗原結合フラグメントであり、共刺激シグナルを提供する薬剤は、抗CD28抗体またはその抗原結合フラグメントであり、両方の薬剤は、同等の分子の量で同じビーズ共に固定される。一実施形態において、CD4⁺T細胞の増加およびT細胞増殖のために、1：1比率のビーズに結合した各抗体が使用される。本発明の開示の特定の態様において、1：1の比率を使用して観察された増加と比較してT細胞増加における上昇が観察されるような、ビーズに結合した抗CD3：CD28抗体の比率が使用される。1つの特定の実施形態において、1：1の比率を使用して観察された増加と比較して、約1から約3倍の上昇が観察される。一実施形態において、ビーズに結合したCD3：CD28抗体の比率は、100：1から、1：100の範囲、およびその間の全ての整数値の範囲である。本発明の開示の一態様において、抗CD3抗体より多くの抗CD28抗体が粒子に結合しており、すなわち、CD3：CD28の比率は、1未満である。本開示の特定の実施形態において、ビーズに結合した抗CD28抗体の抗CD3抗体に対する比率は、2：1より大きい。1つの特定の実施形態において、1：100のCD3：CD28の比率のビーズに結合した抗体が使用される。別の実施形態において、1：75のCD3：CD28の比率のビーズに結合した抗体が使用される。さらなる実施形態において、1：50のCD3：CD28の比率のビーズに結合した抗体が使用される。別の実施形態において、1：30のCD3：CD28の比率のビーズに結合した抗体が使用される。好ましい一実施形態において、1：10のCD3：CD28の比率のビーズに結合した抗体が使用される。別の実施形態において、1：3のCD3：CD28の比率のビーズに結合した抗体が使用される。さらに別の実施形態において、3：1のCD3：CD28の比率のビーズに結合した抗体が使用される。

【0289】

1：500から500：1、およびその間のあらゆる整数値の粒子の細胞に対する比率が、T細胞または他の標的細胞を刺激するのに使用することができる。当業者であれば容易に理解できるように、粒子の細胞に対する比率は、標的細胞に対する粒度によって決まる可能性がある。例えば、小さいサイズのビーズは数個の細胞としか結合できないが、より大きいビーズは多くの細胞と結合できる。特定の実施形態において細胞の粒子に対する比率は、1：100から100：1の範囲、およびその間のあらゆる整数値であり、さらなる実施形態において、比率は、1：9から9：1の範囲、およびその間のあらゆる整数値を含み、これらもT細胞を刺激するのに使用することができる。T細胞刺激が起こる抗CD3および抗CD28がカップリングした粒子とT細胞の比率は、上述したように様々であってもよいが、特定の好ましい値としては、1：100、1：50、1：40、1：30、1：20、1：10、1：9、1：8、1：7、1：6、1：5、1：4、1：3

、1：2、1：1、2：1、3：1、4：1、5：1、6：1、7：1、8：1、9：1、10：1、および15：1が挙げられ、1つの好ましい比率は、少なくとも1：1の粒子のT細胞に対する比率である。一実施形態において、1：1またはそれより低い粒子の細胞に対する比率が使用される。1つの特定の実施形態において、好ましい粒子：細胞の比率は、1：5である。さらなる実施形態において、粒子の細胞に対する比率は、刺激の日に応じて変更することができる。例えば、一実施形態において、粒子の細胞に対する比率は、1日目に1：1から10：1であり、その後、10日まで、追加の粒子が、1：1から1：10の最終的な比率で（添加の日の細胞数に基づく）毎日または1日おきに細胞に添加される。1つの特定の実施形態において、粒子の細胞に対する比率は、刺激の1日目に1：1であり、刺激の3日目および5日目に1：5に調整される。別の実施形態において、粒子は、毎日または1日おきに添加され、1日目に1：1の最終的な比率に、刺激の3日目および5日目に1：5にする。別の実施形態において、粒子の細胞に対する比率は、刺激の1日目に2：1であり、刺激の3日目および5日目に1：10に調整される。別の実施形態において、粒子は、毎日または1日おきに添加され、1日目に1：1の最終的な比率に、刺激の3日目および5日目に1：10にする。当業者は、様々な他の比率が、本発明の開示で使用するのに適している可能性があることを理解しているものと予想される。特に、比率は、粒度および細胞のサイズおよびタイプに応じて様々であると予想される。

【0290】

本発明の開示のさらなる実施形態において、細胞、例えばT細胞を、薬剤でコーティングされたビーズと合わせ、その後、ビーズおよび細胞を分離し、次いで細胞を培養する。代替の実施形態において、培養の前に、薬剤でコーティングされたビーズおよび細胞を分離しないが、一緒に培養する。さらなる実施形態において、まず磁力などの力の適用によってビーズおよび細胞を濃縮し、その結果として細胞表面マーカーのライゲーションを増加させ、それによって細胞の刺激を誘導する。

【0291】

一例として、細胞表面タンパク質は、抗CD3および抗CD28が取り付けられている常磁性ビーズ（3×28個のビーズ）をT細胞と接触させることによってライゲートさせることができる。一実施形態において、細胞（例えば、10⁴から10⁹個のT細胞）およびビーズ（例えば、1：1の比率のDYNABEADS（登録商標）M-450CD3/CD28T常磁性ビーズ）を、緩衝液中で、好ましくはPBS（カルシウムおよびマグネシウムなどの2価カチオンを含まない）中で混ぜる。ここでも当業者は、あらゆる細胞濃度が使用できることを容易に理解することができる。例えば、標的細胞は、サンプル中で非常に希少であってもよいし、サンプルの0.01%を構成するだけでもよく、またはサンプル全体（すなわち、100%）が目的の標的細胞で構成されていてもよい。したがって、あらゆる細胞数が、本発明の開示の内容に含まれる。特定の実施形態において、粒子および細胞と一緒に混合される体積を有意に減少させて（すなわち、細胞の濃度を増加させて）、細胞と粒子との最大の接触を確実にすることが望ましい場合がある。例えば、一実施形態において、1ml当たり細胞約20億個の濃度が使用される。別の実施形態において、1ml当たり細胞1億個より多くが使用される。さらなる実施形態において、1ml当たり、細胞1000万個、1500万個、2000万個、2500万個、3000万個、3500万個、4000万個、4500万個、または5000万個の細胞濃度が使用される。さらに別の実施形態において、1ml当たり、細胞7500万個、8000万個、8500万個、9000万個、9500万個、または1億個の細胞濃度が使用される。さらなる実施形態において、1ml当たり細胞1億2500万個または1億5000万個の濃度が使用されてもよい。高濃度の使用は、細胞収量の上昇、細胞の活性化、および細胞の増加をもたらすことができる。さらに、高い細胞濃度の使用は、目的の標的抗原の発現が弱い可能性がある細胞、例えばCD28陰性T細胞のより効率的な捕捉を可能にする。このような細胞集団は、治療的価値を有する可能性があり、特定の実施形態において入手が望ましいと予想される。例えば、高濃度の細胞の使用は、通常CD28発現が比

10

20

30

40

50

較的弱いCD8⁺T細胞のより効率的な選択を可能にする。

【0292】

本発明の開示の一実施形態において、混合物は、数時間（約3時間）から約14日にわたり、またはその間の整数値のいずれかの時間で培養することができる。別の実施形態において、混合物は、21日間培養することができる。本開示の一実施形態において、ビーズおよびT細胞は、約8日間、一緒に培養される。別の実施形態において、ビーズおよびT細胞は、2～3日間、一緒に培養される。T細胞の培養時間を60日またはそれより長くできるように、数サイクルの刺激が望ましい場合もある。T細胞培養に適切な条件としては、血清（例えば、ウシ胎児またはヒト血清）、インターロイキン-2（IL-2）、インスリン、IFN- γ 、IL-4、IL-7、GM-CSF、IL-10、IL-12、IL-15、TGF β 、およびTNF- α などの増殖および生存に必要な因子、または当業者公知の細胞増殖のための他のあらゆる添加剤を含有していてもよい適切な培地（例えば、最小必須培地またはRPMI培地1640または、X-vivo15（Lonza））が挙げられる。細胞増殖のための他の添加剤としては、これらに限定されないが、界面活性剤、プラスマネート、ならびにN-アセチル-L-システインおよび2-メルカプトエタノールなどの還元剤が挙げられる。培地としては、アミノ酸、ピルビン酸ナトリウム、およびビタミンが添加された、無血清か、または適切な量の血清（または血漿）または既定されたセットのホルモン、および／またはT細胞の増殖および増加に十分な量のサイトカインが補充されたか、のいずれかの、RPMI1640、AIM-V、DMEM、MEM、 α -MEM、F-12、X-Vivo15、およびX-Vivo20、Optimiserを挙げることができる。抗生物質、例えば、ペニシリンおよびストレプトマイシンは、実験培養でのみ含まれ、対象に注入しようとする細胞の培養には含まれない。標的細胞は、増殖を支持するのに必要な条件下で、例えば、適切な温度（例えば、37℃）および雰囲気（例えば、空気に加えて5%CO₂）下で維持される。

【0293】

様々な刺激時間に曝露されたT細胞は、異なる特徴を示し得る。例えば、典型的な血液またはアフエーシスを受けた末梢血単核細胞生成物は、細胞傷害性またはサブレッサーT細胞集団（T_C、CD8⁺）より大きいヘルパーT細胞集団（T_H、CD4⁺）を有する。エクスビオでのCD3およびCD28受容体を刺激することによるT細胞の増加は、約8～9日目の前、主としてT_H細胞からなるT細胞の集団を産生するが、約8～9日目の後、T細胞の集団は、より一層大きいT_C細胞の集団を含む。したがって、処置の目的に応じて、主としてT_H細胞を含むT細胞集団を対象に注入することが、有利な場合がある。同様に、T_C細胞の抗原特異的なサブセットが単離された場合、このサブセットをより高度に増加させることが有益な場合がある。

【0294】

さらに、CD4およびCD8マーカーに加えて、細胞増加プロセスの経過中、他の表現型マーカーは、顕著に、ただし大部分は再現性よく変化する。したがって、このような再現性は、活性化T細胞生成物を特定の目的に合わせる能力を可能にする。

【0295】

6.5 組成物

本開示の抗グリコMUC1抗体および／または抗グリコMUC1 ADCは、抗グリコMUC1抗体および／またはADC、ならびに1つまたは複数の担体、賦形剤および／または希釈剤を含む組成物の形態であってもよい。組成物は、特定の使用のために、例えば、獣医学的な使用またはヒトでの医薬的な使用のために製剤化されてもよい。使用される組成物（例えば、乾燥粉末、液体配合物など）ならびに賦形剤、希釈剤および／または担体の形態は、抗体および／またはADCの意図される使用によって、さらに治療的使用、投与様式ごとに決まると予想される。

【0296】

治療的使用の場合、組成物は、医薬的に許容される担体を含む滅菌された医薬組成物の一部として供給されてもよい。この組成物は、あらゆる好適な形態であり得る（患者にそ

10

20

30

40

50

れを投与する望ましい方法に応じて)。医薬組成物は、経口、経皮、皮下、鼻腔内、静脈内、筋肉内、腫瘍内、クモ膜下、外用または局所などの様々な経路によって患者に投与することができる。いずれかの所与の場合における最も好適な投与経路は、特定の抗体および／またはADC、対象、ならびに対象の疾患および身体的な状態の性質および重症度によって決まると予想される。典型的には、医薬組成物は、静脈内または皮下投与されると予想される。

【0297】

医薬組成物は、1用量当たり予め決定された量の本開示の抗グリコMUC1抗体および／または抗グリコMUC1 ADCを含有する単位剤形で都合よく提供することができる。単位用量に含まれる抗体および／またはADCの量は、処置されている疾患、加えて当業界において周知の他の要因によって決まると予想される。このような単位投薬は、単回投与に好適な抗体および／またはADCの量を含有する凍結乾燥された乾燥粉末の形態であってもよいし、または液体の形態であってもよい。乾燥粉末の単位剤形は、キット中に、シリンジ、好適な量の希釈剤および／または投与に有用な他の成分と共にパッケージ化されていてもよい。液体形態での単位投薬は、単回投与に好適な量の抗体および／またはADCで予め充填されたシリンジの形態で都合よく供給することができる。

【0298】

医薬組成物はまた、複数回投与に好適な量のADCを含有するバルクの形態で供給されてもよい。

【0299】

医薬組成物は、凍結乾燥製剤または水溶液として貯蔵するために、望ましい純度を有する抗体および／またはADCを、当業界において典型的に採用される任意選択の医薬的に許容される担体、賦形剤または安定剤（これらは全て、本明細書では「担体」と称される）、すなわち、緩衝剤、安定化剤、保存剤、等張化剤、非イオン性デタージェント、抗酸化剤、および他の混成の添加剤と混合することによって調製してもよい。Remington's Pharmaceutical Sciences, 16th edition (Osol, ed.1980)を参照されたい。このような添加剤は、受容者に対して、採用された投薬および濃度で非毒性であるべきである。

【0300】

緩衝剤は、pHを生理学的条件に近い範囲に維持することを助ける。緩衝剤は、様々な濃度で存在していてもよいが、典型的には約2 mMから約50 mMの範囲の濃度で存在すると予想される。本発明の開示で使用するために好適な緩衝剤としては、例えば、クエン酸緩衝液（例えば、クエン酸－ナトリウム－クエン酸二ナトリウム混合物、クエン酸－クエン酸三ナトリウム混合物、クエン酸－クエン酸－ナトリウム混合物など）、コハク酸緩衝液（例えば、コハク酸－コハク酸－ナトリウム混合物、コハク酸－水酸化ナトリウム混合物、コハク酸－コハク酸二ナトリウム混合物など）、酒石酸緩衝液（例えば、酒石酸－酒石酸ナトリウム混合物、酒石酸－酒石酸カリウム混合物、酒石酸－水酸化ナトリウム混合物など）、フマル酸緩衝液（例えば、フマル酸－フマル酸－ナトリウム混合物、フマル酸－フマル酸二ナトリウム混合物、フマル酸－ナトリウム－フマル酸二ナトリウム混合物など）、グルコン酸緩衝液（例えば、グルコン酸－グルコン酸ナトリウム（sodium glyconate）混合物、グルコン酸－水酸化ナトリウム混合物、グルコン酸－グルコン酸カリウム（potassium glyuconate）混合物など）、シュウ酸緩衝液（例えば、シュウ酸－シュウ酸ナトリウム混合物、シュウ酸－水酸化ナトリウム混合物、シュウ酸－シュウ酸カリウム混合物など）、乳酸緩衝液（例えば、乳酸－乳酸ナトリウム混合物、乳酸－水酸化ナトリウム混合物、乳酸－乳酸カリウム混合物など）および酢酸緩衝液（例えば、酢酸－酢酸ナトリウム混合物、酢酸－水酸化ナトリウム混合物など）などの、有機および無機酸の両方ならびにその塩が挙げられる。加えて、リン酸緩衝液、ヒスチジン緩衝液およびトリメチルアミン塩、例えばトリスを使用することができる。

【0301】

微生物の増殖を妨害するために、保存剤が添加されていてもよく、約0.2%～1%（w/v）の範囲の量で添加することができる。本発明の開示で使用するために好適な保存

剤としては、フェノール、ベンジルアルコール、メタクレゾール、メチルパラベン、プロピルパラベン、オクタデシルジメチルベンジルアンモニウムクロリド、ベンザルコニウムハロゲン化物（例えば、塩化物、臭化物、およびヨウ化物）、塩化ヘキサメトニウム、およびアルキルパラベン、例えばメチルまたはプロピルパラベン、カテコール、レソルシノール、シクロヘキサノール、ならびに3-ペンタノールが挙げられる。等張化剤は、時には「安定剤」としても公知であり、本発明の開示の液体組成物の等張性を確実にするために添加することができ、その例としては、多価糖アルコール、例えば3水酸基またはそれより多くの水酸基を有する糖アルコール、例えばグリセリン、エリスリトール、アラビトール、キシリトール、ソルビトールおよびマンニトールが挙げられる。安定剤は、賦形剤の広義のカテゴリーを指し、これは、増量剤から、治療剤を可溶化したり、または変性または容器壁への接着の防止を助けたりする添加剤まで機能面で様々なものであり得る。典型的な安定剤は、多価糖アルコール（上記列挙されたもの）；例えばアルギニン、リシン、グリシン、グルタミン、アスパラギン、ヒスチジン、アラニン、オルニチン、L-ロイシン、2-フェニルアラニン、グルタミン酸、スレオニンなどのアミノ酸、例えばラクトース、トレハロース、スタキオース、マンニトール、ソルビトール、キシリトール、リビトール、ミオイノシトール（myoinositol）、ガラクトシトール、グリセロールなど、例えばシクリトール、例えばイノシトールなどの有機糖または糖アルコール；ポリエチレングリコール；アミノ酸ポリマー；例えば尿素、グルタチオン、チオクト酸、チオグリコール酸ナトリウム、チオグリセロール、 α -モノチオグリセロールおよびチオ硫酸ナトリウムなどの硫黄を含有する還元剤；低分子量ポリペプチド（例えば、10残基またはそれより少ない残基のペプチド）；例えばヒト血清アルブミン、ウシ血清アルブミン、ゼラチンまたは免疫グロブリンなどのタンパク質；ポリビニルピロリドンなどの親水性ポリマー、例えばキシロース、マンノース、フルクトース、グルコースなどの単糖；例えばラクトース、マルトース、スクロースおよびトレハロースなどの二糖類；ならびに例えばラフィノースなどの三糖（trisaccharide）；ならびに例えばデキストランなどの多糖類であり得る。安定剤は、ADCの重量に対して0.5から10wt%の範囲の量で存在していてもよい。

【0302】

非イオン界面活性剤またはデタージェント（「湿潤剤」としても公知）は、糖タンパク質の可溶化を助けることに加えて、攪拌により誘発される凝集から糖タンパク質を保護するために添加されてもよく、それにより、タンパク質変性を引き起こすことなく配合物がストレスを受けた剪断面に曝されることも許容する。好適な非イオン界面活性剤としては、ポリソルベート（20、80など）、ポロキサマー（polyoxamer）（184、188など）、およびプルロニックポリオールが挙げられる。非イオン界面活性剤は、約0.05mg/mLから約1.0mg/mLの範囲、例えば約0.07mg/mLから約0.2mg/mLの範囲で存在していてもよい。

【0303】

追加の混成の賦形剤としては、増量剤（例えば、デンプン）、キレート剤（例えば、EDTA）、抗酸化剤（例えば、アスコルビン酸、メチオニン、ビタミンE）、および共溶媒が挙げられる。

【0304】

6.6 使用方法

本明細書に記載される抗グリコMUC1抗体または結合フラグメントは、様々な診断アッセイで使用することができる。例えば、抗体および結合フラグメントは、イムノアッセイ、例えば競合結合アッセイ、直接および間接サンドイッチアッセイ、ならびに免疫沈降アッセイ、例えば、免疫組織化学法、酵素結合免疫吸着検査法（ELISA）、蛍光活性化セルソーティング（FACS）、およびウェスタンブロットなどで採用することができる。

【0305】

本明細書に記載される抗グリコMUC1抗体または結合フラグメントはまた、インビボ

の放射線撮影画像化にも有用であり、その場合、放射線不透過性の薬剤または放射線同位体などの検出可能な部分で標識された抗体が、対象に、好ましくは血流に投与され、標識された抗体の宿主中の存在および位置がアッセイされる。この画像化技術は、悪性腫瘍の病期分類および処置において有用である。

【0306】

本明細書に記載される抗グリコMUC1抗体または結合フラグメント、ADCおよびCARは、グリコMUC1を発現するがん、例えば、膀胱がん、肺がん、脳腫瘍、乳がん、非ホジキンリンパ腫、子宮頸がん、卵巣がん；結腸直腸がん、胃がん、胆管細胞癌、軟骨肉腫、膵臓がん、食道がん、前立腺がん、腎臓がん、皮膚がん、白血病、甲状腺がん、肝臓がん、子宮がん、および子宮頸がんなどを処置するのに有用である。一部の実施形態において、がんは、上皮がん、例えば乳がん、卵巣がん、膵臓がん、または肺がんである。

10

【0307】

したがって、本開示は、例えば、がん、例えば前の段落で同定されたがんのいずれかの処置で使用するための医薬として使用するための、診断アッセイで使用するための、および放射線写真のインビボにおける画像化で使用するための、本明細書に記載される抗グリコMUC1抗体、結合フラグメント、ADC、およびCARを提供する。本開示は、さらに、例えば、がん、例えば前の段落で同定されたがんのいずれかの処置のための医薬品の製造における、本明細書に記載される抗グリコMUC1抗体、結合フラグメント、ADCおよびCARの使用を提供する。

【0308】

20

療法に本開示のCARを使用する場合、本開示の治療方法は、グリコMUC1を発現する腫瘍を有する対象に、例えばセクション6.3または実施形態152または実施形態153に記載されるように、本開示のCARを発現するように操作された遺伝子改変された細胞の有効量を投与することを含む。CARを発現するように細胞、特にT細胞を改変する方法は、セクション6.4.1に記載されている。

【実施例】

【0309】

[実施例1]

抗グリコMUC1抗体の同定

7.1.1. 材料および方法

30

7.1.1.1 Tn MUC1糖ペプチドの合成

GST-MUC1 15-mer (ビオチン-RPAPGSTAPP AHGV T) (配列番号99) ペプチドを、最初にFontenot et al., 1993, Pept. Res. 6:330-336によって報告されたように、太字と下線の文字で同定されたセリンおよびスレオニン残基上に提示されるGalNAcを有するペプチドを提供するために、グリコシル化部位のために標準的な合成ペプチド化学およびF-MOC-GalNAc-Ser/Thrを使用して合成した。この糖ペプチドは、時には本明細書において「GSTA」と言及される。グリコシル化なしの対照ペプチド70-MUC1 (ビオチン-RPAPGSTAPP AHGV T) (配列番号99) をスクリーニングのために使用した。精製されたグリコペプチドは、ディレイドエクストラクションを備えたVoyager DEまたはVoyager DE Pro MALDI-TOF質量分析計(PerSeptive Biosystems)でのMALDI-TOF質量分析によって特徴付けられた。MALDIマトリックスは、0.1% TFAと30%アセトニトリル水溶液との2:1混合物中に溶解した10g/Lの2,5-ジヒドロキシ安息香酸(Aldrich, Milwaukee, WI)であった。0.1% TFA中に約1 pmol/μLの濃度に溶解したサンプルを、1 μLのサンプル溶液をプローブチップに入れ、続いて1 μLのマトリックスを入れることによって分析のために調製した。全ての質量スペクトルをリニアモードで得た。データ処理を、GRAMS/386ソフトウェア(Galactic Industries, Salem, NH)を使用して行った。

40

【0310】

50

7. 1. 1. 2 免疫化プロトコール

GST-グリコペプチドを、グルタルアルデヒドを使用してKLH (Pierce、Rockford、IL) にカップリングした。コンジュゲーションの効率を、画分の抗MUC1 ELISAを使用したPD-10カラムでのサイズ排除クロマトグラフィーにより反応を分析することによって評価した。本質的に全ての反応性が、排除された画分で見出され、ペプチドを含有することが予測される排除されなかった画分で、有意ではない反応性が見出された。さらなる評価には、ELISAでの対応するグリコペプチドとのKLHコンジュゲートの比較滴定分析が含まれていた。コンジュゲーションが完全に近いと、1:300の、KLHのグリコペプチドに対する比率がもたらすはずであり、両方の分析はコンジュゲーションが完全に近いことを示した。雌Balb/c野生型マウスに、総体積200μLの10または15μgの(糖)ペプチド(フロイントアジュバント、Sigmaとの1:1の混合物)を皮下注射した。マウスは14日の間隔をあけて4回の免疫化を受け、3回目および4回目の免疫化から1週間後に尾部または目からの出血によって血液サンプルを得た。

【0311】

7. 1. 1. 3 マウスMAb抗Tn-MUC1の生成

KLHにカップリングされたGST-MUC1糖ペプチドで免疫化された野生型Balb/cマウス由来のMAbを、糖ペプチドELISA、それに続いて乳がん細胞株(MCF7およびT47D)を用いた免疫細胞学およびがん組織を用いた免疫組織学を使用してスクリーニングした。選択は、同じマウスの総血清に類似する反応性パターンに基づいてなされた。2つの抗体、1AGおよび4AGを、さらなる特徴付けのために選択した。

【0312】

[実施例2]

ELISAによる1AGおよび4AG抗体の機能的な特徴付け

7. 2. 1. 概要

表4で示されるように異なるグリコシル化部位(非グリコシル化ペプチドを含む)を有する、滴定されるMUC1ペプチドに対する抗MUC1 mAbの反応性を試験するために、1AGおよび4AGを、間接的なELISAによって特徴付けた。

【0313】

【表12】

表 4	
ペプチド	配列 (太字と下線 = GalNAc 部位)
C2	RPAPGST <u>I</u> APPAHGVT (配列番号: 99)
C3	RPAPG <u>S</u> TAPPAHGVT (配列番号: 99)
C4	RPAPG <u>ST</u> APPAHGVT (配列番号: 99)
GST	ビオチン-RPAPG <u>ST</u> APPAHGVT (配列番号: 99)
70	ビオチン-RPAPGSTAPPAHGVT (配列番号: 99)

【0314】

7. 2. 2. 材料および方法

ELISAプレートを、0.08μg/mLから10μg/mLの範囲の濃度で一晩かけて0.2Mの炭酸水素塩緩衝液、pH9.4中で滴定したMUC1ペプチドでコーティングした。BSAを、対照/バックグラウンドの尺度として使用した。次いでプレートを、SuperBlock (商標) (Thermo Fisher) で、室温で1時間プロ

ックした。プレートを洗浄した後、1 A Gおよび4 A Gハイブリドーマ上清を、E L I S Aプレート上で1時間インキュベートした。次いでプレートを洗浄し、次いで二次抗体（1／3 0 0 0のヤギ抗マウスI g G（H＋L）H R P（a b c a m 6 2－6 5 2 0））と共に1時間インキュベートした。次いでプレートを洗浄し、1－S t e p（商標）U l t r a T M B（T h e r m o F i s h e r）で2分間発色させた。次いで発色を2 N 硫酸で止めた。次いで4 5 0 n mでの吸光度を測定した。

【0 3 1 5】

7. 2. 3. 結果

図1 A～図1 Fおよび図2 A～図2 Bに、結果を示す。図面で示されるように、1 A Gおよび4 A Gは、グリコシル化ペプチドC 3、C 4およびG S Tに特異的に結合するが、グリコシル化ペプチドC 2または非グリコシル化ペプチド7 0に結合しない。

【0 3 1 6】

〔実施例3〕

抗体滴定による1 A Gおよび4 A G抗体の機能的な特徴付け

1 A Gおよび4 A Gを、一定濃度の抗原G S T Aに対する抗体滴定アッセイによって特徴付けた。

【0 3 1 7】

図3に、結果を示す。

【0 3 1 8】

〔実施例4〕

表面プラズモン共鳴による1 A Gおよび4 A G抗体の機能的な特徴付け

7. 4. 1. 材料および方法

1つのグリコシル化および1つの非グリコシル化ペプチドへの1 A Gおよび4 A G抗体の結合（表5）を、表面プラズモン共鳴（S P R）によって評価した。

【0 3 1 9】

【表13】

表 5	
ペプチド	配列 (太字と下線 = GalNAc 部位)
グリコシル化	RPAPG <u>ST</u> APPAHGVT (配列番号：99)
非グリコシル化	RPAPGSTAPPAHGVT (配列番号：99)

【0 3 2 0】

全てのS P R実験を、各チャンネルで1 0, 0 0 0 R Uの抗マウス抗体を用いたC M 5 センサーチップを備えたB i a c o r e T 2 0 0（G E H e a l t h c a r e）で、2 5 °Cで、ランニングおよびサンプル緩衝液としてH B S－P＋（1 0 m MのH E P E S p H 7. 4、1 5 0 m MのN a C l、0. 0 5 % T w e e n 2 0、および1 m g／m lのB S A）、および再生緩衝液として1 0 m Mのグリシン、p H 1. 7を用いて実行した。

【0 3 2 1】

1 A Gおよび4 A G抗体を、1 0 m M酢酸ナトリウム、p H 5. 0中の3 0 μ g／m L溶液として、標準的なアミンカップリング化学（E D C／N H S 活性化）を使用して固定した。抗体補足を、5 μ L／分で7 から1 0 分にわたり、反応緩衝液への1 0 倍希釈を使用して実行した。6 0 0 から1 0 0 0 R Uの固定レベルを使用した。ペプチドサンプルを、ランニング緩衝液中の1 0 0 n Mの開始濃度を用いた一連の2 倍希釈物（6. 2 5 n M、1 2. 5 n M、2 5 n M、5 0 n M、および1 0 0 n M）として調製し、単一サイクルの注入で、5 0 μ L／分で2 分にわたり注入した。解離を5 分から3 0 分にわたりモニターした。

【0 3 2 2】

7. 4. 2. 結果

表 6 に、結果を示す。表 6 で示されるように、グリコシル化ペプチドに対する 1 A G の親和性は、2 桁のナノモル濃度範囲内であり、グリコシル化ペプチドに対する 4 A G の親和性は、1 桁のナノモル濃度範囲内である。

【 0 3 2 3 】

【表 1 4】

表 6					
抗体	ペプチド	k_a (1/Ms)	k_d (1/s)	K_D (M)	理論上の %Rmax/Rmax
1AG	グリコシル化	1.79e5	7e-3	3.73e-8	67
1AG	非グリコシル化	NB	NB	NB	NA
4AG	グリコシル化	2.72e5	9.3e-4	3.4e-9	84
4AG	非グリコシル化	NB	NB	NB	NA
k_a – 会合速度定数 k_d – 解離速度定数 K_D – 平衡解離定数					

【 0 3 2 4 】

【実施例 5】

抗グリコ M u c 1 抗体の配列分析

c D N A 末端の迅速増幅 (R a p i d A m p l i f i c a t i o n o f c D N A E n d s ; R A C E) を実行して、1 A G および 4 A G の重鎖および軽鎖ヌクレオチド配列を決定した。

【 0 3 2 5 】

1 A G の重鎖および軽鎖可変領域をコードするヌクレオチド配列は、それぞれ配列番号 2 1 および配列番号 2 2 に記載されている。配列番号 2 1 および配列番号 2 2 によってコードされた重鎖および軽鎖可変領域は、それぞれ配列番号 1 および配列番号 2 に記載されている。予測された重鎖 C D R 配列 (I M G T の定義) は、それぞれ配列番号 3 ~ 5 に記載されており、予測された軽鎖 C D R 配列 (I M G T の定義) は、それぞれ配列番号 6 ~ 8 に記載されている。予測された重鎖 C D R 配列 (K a b a t の定義) は、それぞれ配列番号 9 ~ 1 1 に記載されており、予測された軽鎖 C D R 配列 (K a b a t の定義) は、それぞれ配列番号 1 2 ~ 1 4 に記載されている。予測された重鎖 C D R 配列 (C h o t h i a の定義) は、それぞれ配列番号 1 5 ~ 1 7 に記載されており、予測された軽鎖 C D R 配列 (C h o t h i a の定義) は、それぞれ配列番号 1 8 ~ 2 0 に記載されている。

【 0 3 2 6 】

4 A G の重鎖および軽鎖可変領域をコードするヌクレオチド配列は、それぞれ配列番号 4 3 および配列番号 4 4 に記載されている。配列番号 4 3 および配列番号 4 4 によってコードされた重鎖および軽鎖可変領域は、それぞれ配列番号 2 3 および配列番号 2 4 に記載されている。予測された重鎖 C D R 配列 (I M G T の定義) は、それぞれ配列番号 2 5 ~ 2 7 に記載されており、予測された軽鎖 C D R 配列 (I M G T の定義) は、それぞれ配列番号 2 8 ~ 3 0 に記載されている。予測された重鎖 C D R 配列 (K a b a t の定義) は、それぞれ配列番号 3 1 ~ 3 3 に記載されており、予測された軽鎖 C D R 配列 (K a b a t の定義) は、それぞれ配列番号 3 4 ~ 3 6 に記載されている。予測された重鎖 C D R 配列 (C h o t h i a の定義) は、それぞれ配列番号 3 7 ~ 3 9 に記載されており、予測された軽鎖 C D R 配列 (C h o t h i a の定義) は、それぞれ配列番号 4 0 ~ 4 2 に記載されている。

【 0 3 2 7 】

【実施例 6】

抗グリコ M u c 1 抗体を使用した様々な腫瘍組織の免疫組織化学的染色

7 . 6 . 1 . 材料および方法

ヒト組織マイクロアレイ (T M A) B C N 7 2 1 a (U S B i o m a x) を使用して、抗体 1 A G および 4 A G を、様々な腫瘍組織を染色するそれらの能力についてスクリー

ニングした。TMAは、食道、胃、結腸、直腸、肝臓、肺、腎臓、乳房、子宮頸部、卵巣、前立腺および膵臓を含む12タイプのヒト臓器からの組織サンプルを含有しており、各タイプは、3人の正常なヒト個体から採取され、1ケース当たり単一のコアであった。

【0328】

表7に、TMAにおける各組織の同一性を記載する。

【0329】

【表15-1】

表7								
位置	年齢	性別	臓器 (解剖学的な部位)	病理学的な診断	TNM	グレード	段階	タイプ
A1	62	M	食道	扁平上皮癌	T3N1M0	2	IIIA	悪性
A2	56	M	食道	扁平上皮癌	T3N0M0	2	IIA	悪性
A3	72	F	食道	扁平上皮癌	T2N0M0	-	IIA	悪性
A4	74	M	胃	腺癌	T3N1M0	3	IIIA	悪性
A5	56	M	胃	腺癌	T3N1M0	3	IIIA	悪性
A6	55	F	胃	腺癌	T3N3M0	3	IIIC	悪性
A7	67	M	結腸	腺癌	T3N0M0	1	IIA	悪性
A8	58	M	結腸	腺癌	T4N1M1	2	IV	悪性
A9	37	M	結腸	腺癌	T4N1M0	2	IIIC	悪性
B1	38	M	食道	がん隣接する食道組織	-	-	-	AT
B2	64	M	食道	がん隣接する食道組織	-	-	-	AT
B3	48	M	食道	がん隣接する食道組織	-	-	-	AT
B4	54	M	胃	がん隣接する胃組織	-	-	-	AT
B5	54	M	胃	がん隣接する胃組織	-	-	-	AT
B6	64	F	胃	がん隣接する胃組織	-	-	-	AT
B7	56	F	結腸	がん隣接する結腸組織	-	-	-	AT
B8	70	F	結腸	がん隣接する結腸組織	-	-	-	AT
B9	64	F	結腸	がん隣接する結腸組織	-	-	-	AT
C1	55	M	直腸	腺癌	T3N0M0	1	IIA	悪性
C2	67	M	直腸	腺癌	T4N0M0	2	IIB	悪性
C3	44	F	直腸	腺癌	T3N1M0	3	IIIB	悪性
C4	32	F	肝臓	肝細胞癌	T3N0M0	1	IIIA	悪性
C5	40	M	肝臓	肝細胞癌	T3N1M0	2	IVA	悪性
C6	55	F	肝臓	肝細胞癌	T3N0M0	2	IIIA	悪性
C7	66	M	肺	扁平上皮癌	T2N0M0	2	I	悪性
C8	55	M	肺	扁平上皮癌	T2N1M0	2	IIB	悪性
C9	55	M	肺	扁平上皮癌	T2N1M0	2	IIA	悪性
D1	43	F	直腸	がん隣接する直腸組織	-	-	-	AT
D2	52	M	直腸	がん隣接する直腸組織	-	-	-	AT
D3	67	M	直腸	がん隣接する直腸組織	-	-	-	AT
D4	63	M	肝臓	がん隣接する肝臓組織	-	-	-	AT
D5	55	M	肝臓	がん隣接する肝臓組織	-	-	-	AT

【0330】

10

20

30

40

50

【表 1 5 - 2】

D6	56	M	肝臓	がん隣接肝臓組織	-	-	-	AT
D7	68	F	肺	がん隣接肺組織	-	-	-	AT
D8	65	M	肺	がん隣接肺組織	-	-	-	AT
D9	68	M	肺	がん隣接肺組織	-	-	-	AT
E1	70	M	腎臓	明細胞癌	T1N0M0	1	I	悪性
E2	46	M	腎臓	明細胞癌	T1N0M0	1	I	悪性
E3	82	M	腎臓	明細胞癌	T1N0M0	2	I	悪性
E4	29	F	乳房	浸潤性乳管癌	T2N0M0	1	IIA	悪性
E5	51	F	乳房	浸潤性乳管癌	T4N0M0	2	IIIB	悪性
E6	63	F	乳房	浸潤性乳管癌	T2N0M0	3	IIA	悪性
E7	45	F	子宮頸部	扁平上皮癌	T2N0M0	2	II	悪性
E8	76	F	子宮頸部	扁平上皮癌	T2N0M0	2	II	悪性
E9	47	F	子宮頸部	扁平上皮癌	T2N0M0	2	II	悪性
F1	54	M	腎臓	がん隣接腎臓組織	-	-	-	AT
F2	56	M	腎臓	がん隣接腎臓組織	-	-	-	AT
F3	61	F	腎臓	がん隣接腎臓組織	-	-	-	AT
F4	43	F	乳房	がん隣接乳房組織	-	-	-	AT
F5	38	F	乳房	がん隣接乳房組織	-	-	-	AT
F6	41	F	乳房	がん隣接乳管組織	-	-	-	AT
F7	39	F	子宮頸部	がん隣接子宮頸管組織	-	-	-	AT
F8	25	F	子宮頸部	がん隣接子宮頸管組織	-	-	-	AT
F9	49	F	子宮頸部	がん隣接子宮頸管組織	-	-	-	AT
G1	55	F	卵巣	漿液性乳頭腺癌	T1AN0M0	2	IA	悪性
G2	49	F	卵巣	漿液性腺癌	T2N0M0	3	II	悪性
G3	48	F	卵巣	漿液性腺癌	T1BN0M0	3	IB	悪性
G4	76	M	前立腺	腺癌	T3N0M0	2	III	悪性
G5	80	M	前立腺	腺癌	T3N0M0	2	III	悪性
G6	82	M	前立腺	腺癌	T2N0M0	3	IIA	悪性
G7	55	M	膵臓	導管腺癌	T3N0M0	2	II	悪性
G8	65	M	膵臓	導管腺癌	T3N0M0	2	IIA	悪性
G9	68	F	膵臓	導管腺癌	T2N0M0	2	IB	悪性
H1	53	F	卵巣	がん隣接卵巣組織	-	-	-	AT
H2	45	F	卵巣	がん隣接卵巣組織	-	-	-	AT
H3	40	F	卵巣	がん隣接卵巣組織	-	-	-	AT

【 0 3 3 1】

【表 1 5 - 3】

H4	63	M	前立腺	がん隣接前立腺組織	-	-	-	AT
H5	52	M	前立腺	がん隣接前立腺組織	-	-	-	AT
H6	35	M	前立腺	がん隣接前立腺組織	-	-	-	AT
H7	69	F	膵臓	がん隣接膵臓組織	-	-	-	AT
H8	64	M	膵臓	がん隣接膵臓組織	-	-	-	AT
H9	70	M	膵臓	がん隣接膵臓組織	-	-	-	AT
AT -隣接する組織								

【 0 3 3 2】

切片を、冷たい 1 0 %緩衝化中性ホルマリン中で 1 5 分固定した。希釈していないハイブリドーマ上清または精製した M a b （ 1 A G および 4 A G ） と共にスライドを 4 ° C で 2 4 時間または室温で 2 時間インキュベートすることによって、免疫組織化学（ I H C ）を

実行した。結合したmAbを、FITCコンジュゲートウサギ抗マウス免疫グロブリン（1：100；Dako、Denmark）またはペルオキシダーゼコンジュゲートウサギ抗マウス免疫グロブリンで検出した。スライドを、Prolong Gold褪色防止試薬、DAPI（Invitrogen）と共にマウントし、Leica広視野蛍光顕微鏡で顕微鏡写真を得た。

【0333】

7.6.2. 結果

図4に、1AGの結果を示す。図5に、4AGの結果を示す。mAbおよび1AGおよびmAb 4AGは、検査されたがん組織の大部分と特異的に反応した。健康な組織の染色から、特に胃組織で細胞内構造の一部の標識が見られたが、表面構造との反応性は極めて限定的であることが実証された。

【0334】

【実施例7】

抗グリコMuc1抗体を使用した卵巣腫瘍組織の免疫組織化学的染色

7.7.1. 材料および方法

ヒト組織マイクロアレイ（TMA）OV241c（US Biomax）を使用して、抗体1AGおよび4AGを、卵巣腫瘍組織を染色するそれらの能力についてスクリーニングした。

【0335】

表8に、TMAにおける各組織の同一性を記載する。

【0336】

【表16】

位置	年齢	性別	臓器 (解剖学的な部位)	病理学的な診断	TNM	グレード	段階	タイプ
A1	26	F	卵巣	漿液性乳頭腺癌	T1CN0M0	1		悪性
A2	26	F	卵巣	漿液性乳頭腺癌	T1CN0M0	1		悪性
A3	44	F	卵巣	隣接する正常な卵巣組織	-	-		NAT
A4	44	F	卵巣	隣接する正常な卵巣組織	-	-		NAT
A5	55	F	卵巣	漿液性乳頭腺癌	T2N1M0	2		悪性
A6	55	F	卵巣	漿液性乳頭腺癌	T2N1M0	2		悪性
A7	45	F	卵巣	隣接する正常な卵巣組織	-	-		NAT
A8	45	F	卵巣	隣接する正常な卵巣組織	-	-		NAT
B1	75	F	卵巣	漿液性乳頭腺癌	T3N1M0	1		悪性
B2	75	F	卵巣	漿液性乳頭腺癌	T3N1M0	1		悪性
B3	44	F	卵巣	隣接する正常な卵巣組織	-	-		NAT
B4	44	F	卵巣	隣接する正常な卵巣組織	-	-		NAT
B5	59	F	卵巣	漿液性乳頭腺癌	T2BN0M0	3		悪性
B6	59	F	卵巣	漿液性乳頭腺癌	T2BN0M0	3		悪性
B7	68	F	卵巣	隣接する正常な卵巣組織	-	-		NAT
B8	68	F	卵巣	隣接する正常な卵巣組織	-	-		NAT
C1	55	F	卵巣	漿液性乳頭腺癌	T1AN0M0	3		悪性
C2	55	F	卵巣	漿液性乳頭腺癌	T1AN0M0	3		悪性
C3	52	F	卵巣	隣接する正常な卵巣組織	-	-		NAT
C4	52	F	卵巣	隣接する正常な卵巣組織	-	-		NAT
C5	53	F	卵巣	類内膜腺癌	T1N0M0	2		悪性
C6	53	F	卵巣	類内膜腺癌	T1N0M0	2		悪性
C7	46	F	卵巣	がん隣接する卵巣組織	-	-		AT
C8	46	F	卵巣	がん隣接する卵巣組織	-	-		AT

AT - 隣接する組織
NAT - 正常な隣接組織

【0337】

切片を、冷たい10%緩衝化中性ホルマリン中で15分固定した。希釈していないハイブリードーマ上清または精製したMab(1AGおよび4AG)と共にスライドを4℃で24時間または室温で2時間インキュベートすることによって、免疫組織化学(IHC)を実行した。結合したmAbを、FITCコンジュゲートウサギ抗マウス免疫グロブリン(1:100; Dako, Denmark)またはペルオキシダーゼコンジュゲートウサギ抗マウス免疫グロブリンで検出した。スライドを、Prolong Gold褪色防止試薬、DAPI(Invitrogen)と共にマウントし、Leica広視野蛍光顕微鏡で顕微鏡写真を得た。

【0338】

7.7.2. 結果

図6に、1AGの結果を示す。図7に、4AGの結果を示す。mAb 4AGは、卵巣腺癌からの検査された組織の大部分と特異的に反応した。隣接する健康な組織の染色から、細胞内構造の一部が標識されることが実証された。これらの条件下で、卵巣がんおよび腫瘍に隣接する組織のmAb 1AGで有意な標識は見られなかった。

【0339】

【実施例8】

抗グリコMuc1抗体を使用した腫瘍組織の免疫組織化学的染色

7.8.1. 材料および方法

ヒト組織マイクロアレイ(TMA)BC000119(US Biomax)を使用して、抗体1AGおよび4AGを、様々な腫瘍組織を染色するそれらの能力についてスクリーニングした。TMAは、乳房浸潤性乳管癌、肺扁平上皮癌、結腸腺癌、前立腺腺癌および膵臓腺癌のそれぞれにつき40ケースを含有していた。健康対照サンプルを、複数の臓器の正常組織アレイから評価した。

【0340】

表9に、TMAにおける各組織の同一性を記載する。

【0341】

10

20

30

40

50

【表 17-1】

表 9								
位置	年齢	性別	臓器 (解剖学的な部位)	病理学的な診断	TNM	グレード	段階	タイプ
A1	44	F	乳房	浸潤性乳管癌	T1N0M0	1	I	悪性
A2	63	F	乳房	浸潤性乳管癌	T4N0M0	1	IIIb	悪性
A3	40	F	乳房	浸潤性乳管癌	T2N0M0	2	IIa	悪性
A4	61	F	乳房	浸潤性乳管癌	T2N1M0	2	IIb	悪性
A5	58	F	乳房	浸潤性乳管癌	T1N0M0	1	I	悪性
A6	57	F	乳房	浸潤性乳管癌	T4N2M0	2	IIIa	悪性
A7	53	F	乳房	浸潤性乳管癌	T2N1M0	3	IIb	悪性
A8	38	F	乳房	浸潤性乳管癌	PT3N1M0	3	IIb	悪性
A9	40	F	乳房	浸潤性乳管癌 (腺疾患)	T4N0M0	-	IIIb	悪性
A10	63	F	乳房	浸潤性乳管癌	T1N0M0	2	I	悪性
A11	43	F	乳房	浸潤性乳管癌	T1N0M0	2	I	悪性
A12	54	F	乳房	浸潤性乳管癌	T3N0M0	2	IIb	悪性
A13	57	F	乳房	浸潤性乳管癌 (脂肪組織)	T2N0M0	-	IIa	悪性
A14	51	F	乳房	浸潤性乳管癌	T2N0M0	2	IIa	悪性
A15	46	F	乳房	浸潤性乳管癌	T1N0M0	3	I	悪性
A16	49	F	乳房	浸潤性乳管癌	T2N0M0	3	IIa	悪性
B1	36	F	乳房	浸潤性乳管癌	T2N0M0	2	IIa	悪性
B2	47	F	乳房	浸潤性乳管癌	T2N0M0	3	IIa	悪性
B3	69	F	乳房	浸潤性乳管癌	T4N0M0	3	IIIb	悪性
B4	81	F	乳房	浸潤性乳管癌	T4N0M0	3	IIIb	悪性
B5	57	F	乳房	浸潤性乳管癌	T4N1M0	3	IIIb	悪性
B6	52	F	乳房	浸潤性乳管癌	T4N1M0	3	IIIb	悪性
B7	39	F	乳房	浸潤性乳管癌	T4N1M0	3	IIIb	悪性
B8	42	F	乳房	浸潤性乳管癌 (散在)	T2N0M0	2	IIa	悪性
B9	45	F	乳房	浸潤性乳管癌 (散在)	T2N0M0	-	IIa	悪性
B10	52	F	乳房	浸潤性乳管癌	T2N1M0	3	IIb	悪性
B11	44	F	乳房	浸潤性乳管癌	T2N1M0	2	IIb	悪性
B12	38	F	乳房	浸潤性乳管癌	T2N1M0	2	IIb	悪性
B13	53	F	乳房	浸潤性乳管癌	T3N1M0	3	IIb	悪性
B14	60	F	乳房	浸潤性乳管癌	T2N0M0	3	IIa	悪性
B15	39	F	乳房	浸潤性乳管癌	T2N0M0	2	IIa	悪性
B16	42	F	乳房	浸潤性乳管癌	T2N0M0	3	IIa	悪性
C1	47	F	乳房	浸潤性乳管癌	T3N0M0	2	IIb	悪性
C2	31	F	乳房	浸潤性乳管癌	T4N2M0	3	IIIb	悪性
C3	57	F	乳房	浸潤性乳管癌 (線維性脂肪組織)	T2N0M0	-	IIa	悪性
C4	60	F	乳房	浸潤性乳管癌	T2N0M0	3	IIa	悪性
C5	29	F	乳房	浸潤性乳管癌	T2N0M0	3	IIa	悪性
C6	62	F	乳房	浸潤性乳管癌	T4N0M0	3	IIIb	悪性
C7	46	F	乳房	浸潤性乳管癌	T2N0M0	3	IIa	悪性
C8	48	F	乳房	浸潤性乳管癌	T2N0M0	3	IIa	悪性
C9	54	M	肺	扁平上皮癌	T2N0M0	1	I	悪性
C10	68	M	肺	扁平上皮癌	T2N0M0	1	I	悪性

【0342】

10

20

30

40

50

【表 17-2】

C11	74	M	肺	扁平上皮癌	T3N0M0	1	IIa	悪性
C12	44	M	肺	扁平上皮癌	T2N1M0	2	II	悪性
C13	39	M	肺	扁平上皮癌	T2N1M0	2	II	悪性
C14	48	M	肺	扁平上皮癌	T2N0M0	2	I	悪性
C15	65	M	肺	扁平上皮癌	T3N0M0	1	IIa	悪性
C16	54	M	肺	扁平上皮癌	T2N3M0	2	IIb	悪性
D1	54	F	肺	扁平上皮癌	T2N1M0	2	II	悪性
D2	59	M	肺	扁平上皮癌	T2N1M0	2	II	悪性
D3	56	M	肺	扁平上皮癌	T3N0M0	3	IIa	悪性
D4	60	M	肺	扁平上皮癌	T2N1M0	3	II	悪性
D5	74	M	肺	扁平上皮癌	T2N1M0	2	II	悪性
D6	68	M	肺	扁平上皮癌	T2N1M0	3	II	悪性
D7	56	M	肺	扁平上皮癌 (散在)	T3N0M0	2	IIa	悪性
D8	53	M	肺	扁平上皮癌	T2N0M0	3	I	悪性
D9	50	M	肺	壊死を伴う扁平上皮癌	T2N0M0	3	I	悪性
D10	61	M	肺	扁平上皮癌	T2N1M0	3	II	悪性
D11	47	M	肺	扁平上皮癌	T2N1M0	2	II	悪性
D12	45	M	肺	扁平上皮癌	T2N0M0	2	I	悪性
D13	56	M	肺	扁平上皮癌	T2N0M0	2	I	悪性
D14	65	M	肺	扁平上皮癌	T2N0M0	2	I	悪性
D15	66	M	肺	扁平上皮癌	T2N0M0	2	I	悪性
D16	70	F	肺	扁平上皮癌	T2N1M0	2	II	悪性
E1	63	M	肺	扁平上皮癌	T2N1M0	3	II	悪性
E2	61	M	肺	壊死を伴う扁平上皮癌	T3N1M0	3	IIa	悪性
E3	65	M	肺	扁平上皮癌	T2N1M0	3	II	悪性
E4	24	M	肺	扁平上皮癌	T2N1M0	2	II	悪性
E5	60	M	肺	扁平上皮癌	T2N0M0	2	I	悪性
E6	50	M	肺	扁平上皮癌	T3N1M0	2	IIa	悪性
E7	65	M	肺	扁平上皮癌	T2N1M0	3	II	悪性
E8	69	M	肺	扁平上皮癌	T1N0M0	3	I	悪性
E9	49	F	肺	扁平上皮癌 (散在)	T2N1M0	3	II	悪性
E10	71	M	肺	扁平上皮癌	T2N1M0	3	II	悪性
E11	69	M	肺	扁平上皮癌	T2N0M0	3	I	悪性
E12	49	M	肺	扁平上皮癌	T2N0M0	3	I	悪性
E13	61	M	肺	扁平上皮癌	T2N0M0	3	I	悪性
E14	63	M	肺	扁平上皮癌	T3N1M0	3	IIa	悪性
E15	68	M	肺	扁平上皮癌	T3N0M0	3	IIa	悪性
E16	59	M	肺	扁平上皮癌	T2N1M0	3	II	悪性
F1	37	F	結腸	粘液性腺癌	T4N2M0	1	III	悪性
F2	68	F	結腸	粘液性腺癌	T3N1M0	1	II	悪性
F3	45	F	結腸	乳頭腺癌	T4N2M0	1	III	悪性
F4	45	M	結腸	粘液性腺癌	T2N0M0	2	I	悪性
F5	69	F	結腸	腺癌	T3N1M0	2	II	悪性
F6	82	M	結腸	腺癌 (散在)	T4N0M0	2	II	悪性
F7	74	M	結腸	腺癌	T4N0M0	2	II	悪性
F8	52	F	結腸	腺癌	T3N1M0	2	II	悪性
F9	41	M	結腸	腺癌	T4N0M0	2	II	悪性

【0343】

10

20

30

40

50

【表 1 7 - 3】

F10	54	F	結腸	腺癌	T4N1M0	2	III	悪性
F11	79	F	結腸	腺癌	T4N0M0	2	II	悪性
F12	53	M	結腸	腺癌	T4N0M0	2	II	悪性
F13	54	F	結腸	腺癌	T4N0M0	2	II	悪性
F14	46	M	結腸	腺癌	T4N0M0	2	II	悪性
F15	58	F	結腸	腺癌	T4N0M0	2	II	悪性
F16	46	M	結腸	粘液性腺癌	T3N2M0	2	III	悪性
G1	66	M	結腸	粘液性腺癌	T4N0M0	2	II	悪性
G2	56	M	結腸	腺癌 (散在)	T2N0M0	2	II	悪性
G3	70	F	結腸	粘液性腺癌	T3N1M0	1	II	悪性
G4	45	M	結腸	腺癌 (散在)	T4N1M0	2	III	悪性
G5	55	F	結腸	腺癌	T3N1M0	1	II	悪性
G6	58	F	結腸	腺癌	T4N2M0	3	III	悪性
G7	64	M	結腸	腺癌	T3N1M0	1	II	悪性
G8	66	F	結腸	壊死を伴う腺癌	T4N0M0	2	II	悪性
G9	47	F	結腸	壊死を伴う腺癌	T3N1M0	2	II	悪性
G10	78	F	結腸	腺癌	T3N1M0	2	II	悪性
G11	71	M	結腸	腺癌	T4N0M0	2	II	悪性
G12	34	F	結腸	腺癌	T4N0M0	2	II	悪性
G13	73	F	結腸	腺癌	T4N1M0	3	III	悪性
G14	74	F	結腸	腺癌 (平滑筋および血管組織)	T3N0M0	-	II	悪性
G15	61	M	結腸	粘液性腺癌	T3N1M0	2	II	悪性
G16	38	M	結腸	腺癌	T4N0M0	3	II	悪性
H1	46	M	結腸	腺癌	T4N0M0	3	II	悪性
H2	70	M	結腸	腺癌 (線維組織および血管組織)	T4N0M0	-	II	悪性
H3	37	M	結腸	腺癌	T4N0M0	3	II	悪性
H4	48	F	結腸	腺癌	T4N2M1	3	IV	悪性
H5	50	M	結腸	腺癌	T4N0M0	3	II	悪性
H6	30	M	結腸	腺癌	T4N0M0	3	II	悪性
H7	70	F	結腸	粘液性腺癌	T3N1M0	3	II	悪性
H8	48	M	結腸	腺癌	T4N2M1	3	IV	悪性
H9	76	M	前立腺	腺癌	T2aN0M0	1	II	悪性
H10	70	M	前立腺	腺癌	T2aN0M0	1	II	悪性
H11	60	M	前立腺	腺癌	T4N1M1c	1	IV	悪性
H12	70	M	前立腺	腺癌	T2N0M0	1	II	悪性
H13	66	M	前立腺	腺癌	T3N1M1	1-2	IV	悪性
H14	62	M	前立腺	腺癌	T2N0M0	2	II	悪性
H15	82	M	前立腺	腺癌	T2N0M0	2	II	悪性
H16	78	M	前立腺	腺癌	T4N1M1b	2	IV	悪性
I1	80	M	前立腺	腺癌	T4N1M1c	2	IV	悪性
I2	67	M	前立腺	腺癌	T2N0M1	3	IV	悪性
I3	69	M	前立腺	腺癌	T3N0M0	1	III	悪性
I4	73	M	前立腺	腺癌	T2N0M0	1	II	悪性
I5	64	M	前立腺	腺癌	T3N0M1b	2	IV	悪性
I6	69	M	前立腺	腺癌	T2N0M0	3	II	悪性
I7	64	M	前立腺	腺癌	T2aN0M0	2	II	悪性
I8	73	M	前立腺	腺癌	T2N0M0	2	II	悪性

【 0 3 4 4】

10

20

30

40

50

【表 17-4】

I9	75	M	前立腺	腺癌	T4N1M1b	3	IV	悪性
I10	85	M	前立腺	腺癌	T3N1M1	1	IV	悪性
I11	69	M	前立腺	腺癌 (平滑筋および血管組織)	T4N0M0	-	III	悪性
I12	71	M	前立腺	腺癌 (散在)	T2N0M0	3	II	悪性
I13	70	M	前立腺	腺癌	T2N0M0	2	II	悪性
I14	64	M	前立腺	腺癌	T2N0M0	3	II	悪性
I15	51	M	前立腺	腺癌 (過形成)	T2N0M0	-	II	悪性
I16	70	M	前立腺	腺癌	T2bN0M0	3	II	悪性
J1	62	M	前立腺	腺癌	T3N1M1b	2	IV	悪性
J2	58	M	前立腺	腺癌	T2N0M0	2	II	悪性
J3	57	M	前立腺	腺癌 (散在)	T2aN0M0	3	II	悪性
J4	69	M	前立腺	腺癌	T2N0M0	1	II	悪性
J5	72	M	前立腺	腺癌	T3N0M0	3	III	悪性
J6	70	M	前立腺	腺癌	T3N0M0	3	III	悪性
J7	82	M	前立腺	腺癌 (平滑筋および血管組織)	T2N0M0	-	II	悪性
J8	55	M	前立腺	腺癌 (過形成)	T2N0M0	-	II	悪性
J9	66	M	前立腺	腺癌	T2N0M0	3	II	悪性
J10	73	M	前立腺	腺癌	T4N1M1c	3	IV	悪性
J11	75	M	前立腺	腺癌	T2N1M1c	3	IV	悪性
J12	63	M	前立腺	腺癌	T2N1M1b	3	IV	悪性
J13	60	M	前立腺	腺癌	T3N1M1b	3	IV	悪性
J14	75	M	前立腺	腺癌	T3N0M0	3	III	悪性
J15	87	M	前立腺	腺癌	T2N0M0	3	II	悪性
J16	55	M	前立腺	腺癌 (散在)	T2N0M0	3	II	悪性
K1	65	M	膵臓	腺癌 (線維組織および炎症細胞浸潤)	T2N0M0	-	I	悪性
K2	68	F	膵臓	腺癌 (線維組織およびわずかな膵島組織)	T2N0M0	-	I	悪性
K3	53	F	膵臓	導管腺癌 (散在)	T2N0M0	-	I	悪性
K4	54	F	膵臓	導管腺癌	T3N0M0	1	II	悪性
K5	42	F	膵臓	導管腺癌	T3N0M0	2	II	悪性
K6	57	M	膵臓	導管腺癌	T3N0M0	3	II	悪性
K7	62	F	膵臓	粘液性腺癌	T4N0M0	1	IV	悪性
K8	50	M	膵臓	導管腺癌	T2N1M0	2	III	悪性
K9	60	M	膵臓	導管腺癌	T3N0M0	2	II	悪性
K10	53	F	膵臓	導管腺癌	T3N0M0	3	II	悪性
K11	75	F	膵臓	導管腺癌	T3N0M1	1	IV	悪性
K12	47	M	膵臓	導管腺癌	T3N0M0	2	II	悪性
K13	60	M	膵臓	粘液性腺癌	T2N0M0	3	I	悪性
K14	64	M	膵臓	腺癌 (リンパ組織)	T3N0M0	-	II	悪性
K15	38	M	膵臓	導管腺癌	T3N0M1	3	IV	悪性
K16	49	M	膵臓	粘液性腺癌	T3N0M0	2	II	悪性
L1	64	F	膵臓	導管腺癌	T3N0M0	2	II	悪性
L2	49	M	膵臓	導管腺癌	T2N1M0	2-3	III	悪性
L3	51	F	膵臓	導管腺癌	T3N0M0	2	II	悪性
L4	54	F	膵臓	導管腺癌	T2N0M0	2	I	悪性
L5	76	F	膵臓	導管腺癌	T4N0M0	2	IV	悪性

【0345】

10

20

30

40

50

【表 17-5】

L6	60	M	膵臓	導管腺癌	T3N0M0	2	II	悪性
L7	55	M	膵臓	導管腺癌	T3N0M0	2	II	悪性
L8	51	F	膵臓	導管腺癌	T3N0M0	3	II	悪性
L9	67	M	膵臓	導管壊死を伴う腺癌	T3N0M0	3	II	悪性
L10	44	M	膵臓	導管腺癌	T3N0M0	3	II	悪性
L11	68	F	膵臓	導管腺癌	T3N0M0	3	II	悪性
L12	62	M	膵臓	導管腺癌	T3N0M0	3	II	悪性
L13	57	F	膵臓	導管腺癌	T2N0M0	3	I	悪性
L14	53	F	膵臓	導管壊死を伴う腺癌 (散在)	T2N0M0	3	I	悪性
L15	41	M	膵臓	導管腺癌	T4N1M0	3	III	悪性
L16	47	F	膵臓	導管腺癌(膵臓組織の慢性炎症)	T3N1M0	-	III	悪性
M1	58	F	膵臓	導管腺癌	T3N0M0	2	II	悪性
M2	78	M	膵臓	導管腺癌	T3N0M0	3	II	悪性
M3	61	M	膵臓	導管腺癌	T3N0M1	3	IV	悪性
M4	56	M	膵臓	導管壊死を伴う腺癌	T2N0M0	3	I	悪性
M5	45	M	膵臓	導管腺癌	T2N1M0	3	III	悪性
M6	50	M	膵臓	導管壊死を伴う腺癌	T2N0M0	3	I	悪性
M7	52	M	膵臓	導管腺癌 (散在)	T2N0M0	3	I	悪性
M8	55	M	膵臓	導管腺癌	T3N0M0	3	II	悪性

10

【0346】

切片を、冷たい10%緩衝化中性ホルマリン中で15分固定した。希釈していないハイブリドーマ上清または精製したMAb(1AGおよび4AG)と共にスライドを4℃で24時間または室温で2時間インキュベートすることによって、免疫組織化学(IHC)を実行した。結合したmAbを、FITCコンジュゲートウサギ抗マウス免疫グロブリン(1:100; Dako, Denmark)またはペルオキシダーゼコンジュゲートウサギ抗マウス免疫グロブリンで検出した。スライドを、Prolong Gold褪色防止試薬、DAPI(Invitrogen)と共にマウントし、Leica広視野蛍光顕微鏡で顕微鏡写真を得た。

20

【0347】

7.8.2. 結果

図8に、1AGの結果を示す。図9に、4AGの結果を示す。mAb 1AGは、乳癌、肺癌、結腸癌、および膵臓癌からの組織を含む検査されたがん組織のほとんどからの所定割合の腫瘍と特異的に反応した。mAb 4AGは、乳癌、肺癌、結腸癌、前立腺癌、および膵臓癌からの組織を含む検査されたがんのほとんどからの有意な割合の腫瘍と強く特異的に反応した。

30

【0348】

【実施例9】

アラニンスキャニングによる1AGおよび4AG抗体のエピトープマッピング

7.9.1. 材料および方法

7.9.1.1 材料

以下の試薬を、この実施例において記載される研究に使用した。

40

【0349】

50

【表 18】

試薬	供給元、カタログ番号
0.2M 炭酸水素塩緩衝液	Thermo Scientific, 28382
ELISA プレート	Corning, 9018
1×PBS pH7.4 中の 2.5%BSA	PBS: Gibco, 10010049 BSA: USBiological, A1311
ビオチン化 <i>Villa Villosa</i> レクチン	Vector Labs, B-1235
1X TBS/0.05% Tween-20 (TBST)	VWR, K873-1
ヤギ抗マウス IgG (H+L)-HRP	Jackson ImmunoResearch, 115-035-062
ストレプトアビジン - HRP	Thermo Scientific, N504
1-Step TMB 基質	Thermo Scientific, 34028
2 N 硫酸	VWR, cat no. BDH7500-1L

10

【0350】

7.9.1.2 ウォーキング (Walking) アラニンライブラリー合成

MUC1タンパク質の28-merのセクション (TAPPAHGVTSAPDTRPAPGSTAPPAHGV (配列番号105)) (式中、太字と下線で示した残基は、GalNAcでグリコシル化されている) をベースとする12種の直鎖状糖ペプチドを含有するウォーキングアラニンライブラリーを構築した。12種の糖ペプチドはそれぞれ、28-merのMUC1タンパク質の13~24位内に固有のアラニン点突然変異を含有する。13~24位内の天然アミノ酸がアラニンの場合、この残基はグリシン残基に突然変異された。表10Aに、ライブラリーの糖ペプチドのアミノ酸配列を示す。糖ペプチドを、Fmoc化学を使用して合成した。Fmoc-GalNAc-セリン (GalNAc-Ser) およびFmoc-GalNAc-スレオニン (GalNAc-Thr) ビルディングブロックを、Sussex Research (Ottawa, Canada) から購入した。28-merのMUC1ペプチドの非グリコシル化バージョンを糖ペプチドと並行して合成して、陰性対照として役立てた。合成後にペプチドを凍結乾燥し、使用前、1 mg/mlの濃度に脱イオン水中に再懸濁した。

20

30

【0351】

7.9.1.3 5E5、1AG、および4AGのエピトープマッピング

ライブラリーをELISAフォーマットで使用して、以下のMUC1-Tn抗体: 5E5、1AGおよび4AGのエピトープをマッピングした。非グリコシル化MUC1ペプチドは、陰性対照として役立て、太字と下線の文字で示されるセリンおよびスレオニン残基上においてGalNAcでグリコシル化されたペプチドRPAPGSTAPPAHGVT (配列番号99) を、陽性対照として使用した。無関係の糖ペプチドを使用して、GalNAc交差反応性を測定した。表10Bに、対照ペプチド配列を示す。

【0352】

40

【表 19】

表 10A : MUC1 アラニンライブラリー																												
ペプチド	アミノ酸位置																											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
1 (配列番号: 106)	T	A	P	P	A	H	G	V	I	S	A	P	A	I	R	P	A	P	G	S	I	A	P	P	A	H	G	V
2 (配列番号: 107)	T	A	P	P	A	H	G	V	I	S	A	P	D	A	R	P	A	P	G	S	I	A	P	P	A	H	G	V
3 (配列番号: 108)	T	A	P	P	A	H	G	V	I	S	A	P	D	I	A	P	A	P	G	S	I	A	P	P	A	H	G	V
4 (配列番号: 109)	T	A	P	P	A	H	G	V	I	S	A	P	D	I	R	A	A	P	G	S	I	A	P	P	A	H	G	V
5 (配列番号: 110)	T	A	P	P	A	H	G	V	I	S	A	P	D	I	R	P	G	P	G	S	I	A	P	P	A	H	G	V
6 (配列番号: 111)	T	A	P	P	A	H	G	V	I	S	A	P	D	I	R	P	A	A	G	S	I	A	P	P	A	H	G	V
7 (配列番号: 112)	T	A	P	P	A	H	G	V	I	S	A	P	D	I	R	P	A	P	A	S	I	A	P	P	A	H	G	V
8 (配列番号: 113)	T	A	P	P	A	H	G	V	I	S	A	P	D	I	R	P	A	P	G	A	I	A	P	P	A	H	G	V
9 (配列番号: 114)	T	A	P	P	A	H	G	V	I	S	A	P	D	I	R	P	A	P	G	S	A	A	P	P	A	H	G	V
10 (配列番号: 115)	T	A	P	P	A	H	G	V	I	S	A	P	D	I	R	P	A	P	G	S	I	G	P	P	A	H	G	V
11 (配列番号: 116)	T	A	P	P	A	H	G	V	I	S	A	P	D	I	R	P	A	P	G	S	I	A	A	P	A	H	G	V
12 (配列番号: 117)	T	A	P	P	A	H	G	V	I	S	A	P	D	I	R	P	A	P	G	S	I	A	P	A	A	H	G	V
太字、イタリックの文字は、アラニン置換部位を示す(または天然に存在するアラニンのケースではグリシン)。 太字、下線の文字は、GalNAc-セリンまたは GalNAc-スレオニンを示す。																												

【0353】

【表 20】

表 10B : 対照ペプチド	
ペプチド	ペプチド配列
陰性対照	TAPPAHGVTSAPDTRPAPGSTAPPAHGV (配列番号: 105)
陽性対照または「野生型」	RPAPG S TAPPAHGV (配列番号: 99)
無関係の糖ペプチド	PPERGAPP S <u>IF</u> KG T P T AENP (配列番号: 118)
太字、下線の文字は、GalNAc-セリンまたは GalNAc-スレオニンを示す。	

【0354】

糖ペプチドおよび関連する対照を、0.2 Mの炭酸水素塩緩衝液、pH 9.8で0.25 μg/mlに希釈し、100 μlを、高結合ELISAプレートの各ウェル上で平板培養した。次いでプレートを4℃で一晩インキュベートした。コーティング緩衝液を捨てた後、プレートを、ウェル当たり300 μlのブロッキング緩衝液(1×PBS中の2.5% BSA)で室温で1時間ブロックした。次いでブロッキング緩衝液を捨て、5 E5、1 A G、および4 A Gそれぞれにつきウェル当たり100 μlの抗体上清(ブロッキング緩衝液で希釈した)を添加し、室温で1時間インキュベートした。各抗体につき、抗体上清希釈物を事前に最適化した(データは示されない)。ビオチン化V i l l a V i l l o s aレクチン(ブロッキング緩衝液中、1 μg/mlの、ウェル当たり100 μl)を、対照としてプレートに添加して、ペプチド上のG a l N A c改変残基の存在を検出した。プレートを、ウェル当たり300 μlの1×TBS/0.05% Tween-20 (TBS T)で3回洗浄した。二次抗体ヤギ抗マウスI g G (H+L)-HRPをブロッキング緩衝液で1/5000に希釈し、ウェル当たり100 μlの希釈した抗体を添加し、プレート上で室温で1時間インキュベートした。ストレプトアビジン-HRPをブロッキング緩衝液で1/3000に希釈し、100 μlの希釈したストレプトアビジン-HRPを、ビオチン化レクチンを含有するウェルに添加した。第2のインキュベーション後、プレートを、ウェル当たり300 μlのTBS Tで4回洗浄し、次いで75 μlの室温の1-Step TMB基質で発色させた。1分後、発色を75 μlの2 N硫酸を使用して止めた。次いで、プレートリーダー(Molecular Device SpectraMax i3)を使用して、プレートを450 nmで読んだ。

【0355】

7.9.1.4 データ分析

Microsoft Excelソフトウェアでデータを分析した。「突然変異体」ペプチドに対する各抗体の反応性を、野生型ペプチドと比較した結合パーセントとして変換することによって、データを解釈した。結合パーセントは、式 $(OD_{\text{突然変異ペプチド}} / OD_{\text{野生型ペプチド}})$ を使用して計算された。次いでパーセント結合を、全ての値を0～1の間とする棒グラフで表示した。

【0356】

7.9.2. 結果

ペプチドへの5E5、1AG、および4AGの結合パーセントをそれぞれ図10～12に示す。残基17～23の領域内のアラニン置換は、1AGおよび4AGの結合を大幅に低減した。5E5と比較して、1AGおよび4AG結合は、より多くのアラニン置換によって低減した。ペプチド5～11のそれぞれにつき、4AG結合は、「野生型」ペプチドと比較して大幅に減少した。これは、4AGの結合エピトープが残基17～23の領域内であることを示唆する。1AG結合はより一層限定的であり、残基15～24の領域に対応するペプチド3～12のそれぞれにつき、野生型と比較して結合は大幅に減少した。残基19～22の領域において、1AGおよび4AG結合は、ペプチド8におけるSer-GalNAc置換によってほぼ完全に阻害されたが（それぞれ2.23%および1.63%）、それに対して5E5は、それでもなお結合が可能であった（18%）。対照的に、ペプチド9におけるThr-GalNAc置換は、5E5結合をほぼ完全に阻害したが（2.93%）、4AGおよび1AGは、それでもなおそれぞれ14.62%および6.07%で結合が可能であった。これは、グリコシル化セリンが、1AGおよび4AG結合において、GalNAc-Thrより大きい役割を果たすが、5E5ではその逆であったことを示唆する。総合すると、アラニンスキンの結果は、1AGおよび4AGのエピトープは、5E5と異なると考えられることを示す。その差としては、グリコMUC1との接触がより多くなることが挙げられ、このことが（理論に縛られることはないが）、がん抗原へのより高い選択性を付与すると考えられる。

【0357】

8. 具体的な実施形態、参考文献の引用

様々な具体的な実施形態を例示し記載したが、本開示の本質および範囲から逸脱することなく様々な変更をなすことができることが理解されると予想される。本発明の開示は、以下に記載の番号付けされた実施形態によって例示される。

【0358】

1. 太字と下線の文字で示されるセリンおよびスレオニン残基においてGalNAcでグリコシル化されたMUC1ペプチドRPAPG**ST**APPAHGV**T**（配列番号99）への結合に関して、（i）配列番号1の重鎖可変（VH）配列および配列番号2の軽鎖可変（VL）配列、または（ii）配列番号23の重鎖可変（VH）配列および配列番号24の軽鎖可変（VL）配列を含む抗体または抗原結合フラグメントと競合する抗グリコMUC1抗体または抗原結合フラグメント。

【0359】

2. 乳がん細胞株MCF7またはT47Dへの結合に関して、（i）配列番号1の重鎖可変（VH）配列および配列番号2の軽鎖可変（VL）配列、または（ii）配列番号23の重鎖可変（VH）配列および配列番号24の軽鎖可変（VL）配列を含む抗体または抗原結合フラグメントと競合する抗グリコMUC1抗体または抗原結合フラグメント。

【0360】

3. 配列番号93のアミノ酸配列を含む相補性決定領域（CDR）H1、配列番号94のアミノ酸配列を含むCDR-H2、配列番号95のアミノ酸配列を含むCDR-H3、配列番号96のアミノ酸配列を含むCDR-L1、配列番号97のアミノ酸配列を含むCDR-L2、および配列番号98のアミノ酸配列を含むCDR-L3を含む、抗グリコMUC1抗体または抗原結合フラグメント。

【0361】

4. 配列番号93のアミノ酸配列を含む相補性決定領域(CDR)H1、配列番号94のアミノ酸配列を含むCDR-H2、配列番号95のアミノ酸配列を含むCDR-H3、配列番号96のアミノ酸配列を含むCDR-L1、配列番号97のアミノ酸配列を含むCDR-L2、および配列番号98のアミノ酸配列を含むCDR-L3を含む、実施形態1または実施形態2に記載の抗グリコムUC1抗体または抗原結合フラグメント。

【0362】

5. CDR-H1が、配列番号3のアミノ酸配列を含む、実施形態3または実施形態4に記載の抗グリコムUC1抗体または抗原結合フラグメント。

【0363】

6. CDR-H1が、配列番号9のアミノ酸配列を含む、実施形態3または実施形態4に記載の抗グリコムUC1抗体または抗原結合フラグメント。

【0364】

7. CDR-H1が、配列番号15のアミノ酸配列を含む、実施形態3または実施形態4に記載の抗グリコムUC1抗体または抗原結合フラグメント。

【0365】

8. CDR-H1が、配列番号25のアミノ酸配列を含む、実施形態3または実施形態4に記載の抗グリコムUC1抗体または抗原結合フラグメント。

【0366】

9. CDR-H1が、配列番号31のアミノ酸配列を含む、実施形態3または実施形態4に記載の抗グリコムUC1抗体または抗原結合フラグメント。

【0367】

10. CDR-H1が、配列番号37のアミノ酸配列を含む、実施形態3または実施形態4に記載の抗グリコムUC1抗体または抗原結合フラグメント。

【0368】

11. CDR-H1が、配列番号45のアミノ酸配列を含む、実施形態3または実施形態4に記載の抗グリコムUC1抗体または抗原結合フラグメント。

【0369】

12. CDR-H1が、配列番号51のアミノ酸配列を含む、実施形態3または実施形態4に記載の抗グリコムUC1抗体または抗原結合フラグメント。

【0370】

13. CDR-H1が、配列番号57のアミノ酸配列を含む、実施形態3または実施形態4に記載の抗グリコムUC1抗体または抗原結合フラグメント。

【0371】

14. CDR-H1が、配列番号63のアミノ酸配列を含む、実施形態3または実施形態4に記載の抗グリコムUC1抗体または抗原結合フラグメント。

【0372】

15. CDR-H1が、配列番号69のアミノ酸配列を含む、実施形態3または実施形態4に記載の抗グリコムUC1抗体または抗原結合フラグメント。

【0373】

16. CDR-H1が、配列番号75のアミノ酸配列を含む、実施形態3または実施形態4に記載の抗グリコムUC1抗体または抗原結合フラグメント。

【0374】

17. CDR-H1が、配列番号81のアミノ酸配列を含む、実施形態3または実施形態4に記載の抗グリコムUC1抗体または抗原結合フラグメント

【0375】

18. CDR-H1が、配列番号87のアミノ酸配列を含む、実施形態3または実施形態4に記載の抗グリコムUC1抗体または抗原結合フラグメント。

【0376】

19. CDR-H2が、配列番号4のアミノ酸配列を含む、実施形態3から18のいずれ

10

20

30

40

50

れか一つに記載の抗グリコMUC1抗体または抗原結合フラグメント。

【0377】

20. CDR-H2が、配列番号10のアミノ酸配列を含む、実施形態3から18のいずれか一つに記載の抗グリコMUC1抗体または抗原結合フラグメント。

【0378】

21. CDR-H2が、配列番号16のアミノ酸配列を含む、実施形態3から18のいずれか一つに記載の抗グリコMUC1抗体または抗原結合フラグメント。

【0379】

22. CDR-H2が、配列番号26のアミノ酸配列を含む、実施形態3から18のいずれか一項に記載の抗グリコMUC1抗体または抗原結合フラグメント

10

【0380】

23. CDR-H2が、配列番号32のアミノ酸配列を含む、実施形態3から18のいずれか一項に記載の抗グリコMUC1抗体または抗原結合フラグメント

【0381】

24. CDR-H2が、配列番号38のアミノ酸配列を含む、実施形態3から18のいずれか一項に記載の抗グリコMUC1抗体または抗原結合フラグメント

【0382】

25. CDR-H2が、配列番号46のアミノ酸配列を含む、実施形態3から18のいずれか一項に記載の抗グリコMUC1抗体または抗原結合フラグメント

【0383】

20

26. CDR-H2が、配列番号52のアミノ酸配列を含む、実施形態3から18のいずれか一項に記載の抗グリコMUC1抗体または抗原結合フラグメント

【0384】

27. CDR-H3が、配列番号5のアミノ酸配列を含む、実施形態3から26のいずれか一項に記載の抗グリコMUC1抗体または抗原結合フラグメント

【0385】

28. CDR-H3が、配列番号11のアミノ酸配列を含む、実施形態3から26のいずれか一項に記載の抗グリコMUC1抗体または抗原結合フラグメント

【0386】

29. CDR-H3が、配列番号27のアミノ酸配列を含む、実施形態3から26のいずれか一項に記載の抗グリコMUC1抗体または抗原結合フラグメント

30

【0387】

30. CDR-H3が、配列番号33のアミノ酸配列を含む、実施形態3から26のいずれか一項に記載の抗グリコMUC1抗体または抗原結合フラグメント

【0388】

31. CDR-H3が、配列番号47のアミノ酸配列を含む、実施形態3から26のいずれか一項に記載の抗グリコMUC1抗体または抗原結合フラグメント

【0389】

32. CDR-L1が、配列番号6のアミノ酸配列を含む、実施形態3から31のいずれか一項に記載の抗グリコMUC1抗体または抗原結合フラグメント

40

【0390】

33. CDR-L1が、配列番号12のアミノ酸配列を含む、実施形態3から31のいずれか一項に記載の抗グリコMUC1抗体または抗原結合フラグメント

【0391】

34. CDR-L1が、配列番号18のアミノ酸配列を含む、実施形態3から31のいずれか一項に記載の抗グリコMUC1抗体または抗原結合フラグメント

【0392】

35. CDR-L1が、配列番号28のアミノ酸配列を含む、実施形態3から31のいずれか一項に記載の抗グリコMUC1抗体または抗原結合フラグメント

【0393】

50

36. CDR-L1が、配列番号34のアミノ酸配列を含む、実施形態3から31のいずれか一項に記載の抗グリコムUC1抗体または抗原結合フラグメント

【0394】

37. CDR-L1が、配列番号40のアミノ酸配列を含む、実施形態3から31のいずれか一項に記載の抗グリコムUC1抗体または抗原結合フラグメント

【0395】

38. CDR-L1が、配列番号54のアミノ酸配列を含む、実施形態3から31のいずれか一項に記載の抗グリコムUC1抗体または抗原結合フラグメント

【0396】

39. CDR-L1が、配列番号60のアミノ酸配列を含む、実施形態3から31のいずれか一項に記載の抗グリコムUC1抗体または抗原結合フラグメント

【0397】

40. CDR-L2が、配列番号13のアミノ酸配列を含む、実施形態3から39のいずれか一項に記載の抗グリコムUC1抗体または抗原結合フラグメント

【0398】

41. CDR-L3が、配列番号8のアミノ酸配列を含む、実施形態3から40のいずれか一項に記載の抗グリコムUC1抗体または抗原結合フラグメント

【0399】

42. 配列番号3～5の相補性決定領域(CDR)を含むVHおよび配列番号6～8のCDRを含むVLを有する、実施形態1から4のいずれか一項に記載の抗グリコムUC1抗体または抗原結合フラグメント

【0400】

43. 配列番号9～11の相補性決定領域(CDR)を含むVHおよび配列番号12～14のCDRを含むVLを有する、実施形態1から4のいずれか一項に記載の抗グリコムUC1抗体または抗原結合フラグメント

【0401】

44. 配列番号15～17の相補性決定領域(CDR)を含むVHおよび配列番号18～20のCDRを含むVLを有する、実施形態1から4のいずれか一項に記載の抗グリコムUC1抗体または抗原結合フラグメント

【0402】

45. 配列番号25～27の相補性決定領域(CDR)を含むVHおよび配列番号28～30のCDRを含むVLを有する、実施形態1から4のいずれか一項に記載の抗グリコムUC1抗体または抗原結合フラグメント

【0403】

46. 配列番号31～33の相補性決定領域(CDR)を含むVHおよび配列番号34～36のCDRを含むVLを有する、実施形態1から4のいずれか一項に記載の抗グリコムUC1抗体または抗原結合フラグメント

【0404】

47. 配列番号37～39の相補性決定領域(CDR)を含むVHおよび配列番号40～42のCDRを含むVLを有する、実施形態1から4のいずれか一項に記載の抗グリコムUC1抗体または抗原結合フラグメント

【0405】

48. 配列番号45～47の相補性決定領域(CDR)を含むVHおよび配列番号48～50のCDRを含むVLを有する、実施形態1から4のいずれか一項に記載の抗グリコムUC1抗体または抗原結合フラグメント

【0406】

49. 配列番号51～53の相補性決定領域(CDR)を含むVHおよび配列番号54～56のCDRを含むVLを有する、実施形態1から4のいずれか一項に記載の抗グリコムUC1抗体または抗原結合フラグメント

【0407】

10

20

30

40

50

50. 配列番号57～59の相補性決定領域(CDR)を含むVHおよび配列番号60～62のCDRを含むVLを有する、実施形態1から4のいずれか一項に記載の抗グリコムUC1抗体または抗原結合フラグメント

【0408】

51. 配列番号63～65の相補性決定領域(CDR)を含むVHおよび配列番号66～68のCDRを含むVLを有する、実施形態1から4のいずれか一項に記載の抗グリコムUC1抗体または抗原結合フラグメント

【0409】

52. 配列番号69～71の相補性決定領域(CDR)を含むVHおよび配列番号72～74のCDRを含むVLを有する、実施形態1から4のいずれか一項に記載の抗グリコムUC1抗体または抗原結合フラグメント

【0410】

53. 配列番号75～77の相補性決定領域(CDR)を含むVHおよび配列番号78～80のCDRを含むVLを有する、実施形態1から4のいずれか一項に記載の抗グリコムUC1抗体または抗原結合フラグメント

【0411】

54. 配列番号81～83の相補性決定領域(CDR)を含むVHおよび配列番号84～86のCDRを含むVLを有する、実施形態1から4のいずれか一項に記載の抗グリコムUC1抗体または抗原結合フラグメント

【0412】

55. 配列番号87～89の相補性決定領域(CDR)を含むVHおよび配列番号90～92のCDRを含むVLを有する、実施形態1から4のいずれか一項に記載の抗グリコムUC1抗体または抗原結合フラグメント

【0413】

56. キメラまたはヒト化抗体である、実施形態1から55のいずれか一項に記載の抗グリコムUC1抗体または抗原結合フラグメント

【0414】

57. 配列番号1と少なくとも95%の配列同一性を有するアミノ酸配列を含むVH、および配列番号2と少なくとも95%の配列同一性を有するアミノ酸配列を含むVLを有する、実施形態1から56のいずれか一項に記載の抗グリコムUC1抗体または抗原結合フラグメント

【0415】

58. 配列番号1と少なくとも97%の配列同一性を有するアミノ酸配列を含むVH、および配列番号2と少なくとも97%の配列同一性を有するアミノ酸配列を含むVLを有する、実施形態1から56のいずれか一項に記載の抗グリコムUC1抗体または抗原結合フラグメント

【0416】

59. 配列番号1と少なくとも99%の配列同一性を有するアミノ酸配列を含むVH、および配列番号2と少なくとも99%の配列同一性を有するアミノ酸配列を含むVLを有する、実施形態1から56のいずれか一項に記載の抗グリコムUC1抗体または抗原結合フラグメント

【0417】

60. 配列番号1のアミノ酸配列を含むVHおよび配列番号2のアミノ酸配列を含むVLを有する、実施形態1から4のいずれか一項に記載の抗グリコムUC1抗体または抗原結合フラグメント

【0418】

61. 配列番号23と少なくとも95%の配列同一性を有するアミノ酸配列を含むVH、および配列番号24と少なくとも95%の配列同一性を有するアミノ酸配列を含むVLを有する、実施形態1から56のいずれか一項に記載の抗グリコムUC1抗体または抗原結合フラグメント

10

20

30

40

50

【0419】

62. 配列番号23と少なくとも97%の配列同一性を有するアミノ酸配列を含むVH、および配列番号24と少なくとも97%の配列同一性を有するアミノ酸配列を含むVLを有する、実施形態1から56のいずれか一項に記載の抗グリコムUC1抗体または抗原結合フラグメント

【0420】

63. 配列番号23と少なくとも99%の配列同一性を有するアミノ酸配列を含むVH、および配列番号24と少なくとも99%の配列同一性を有するアミノ酸配列を含むVLを有する、実施形態1から56のいずれか一項に記載の抗グリコムUC1抗体または抗原結合フラグメント

【0421】

64. 配列番号23のアミノ酸配列を含むVHおよび配列番号24のアミノ酸配列を含むVLを有する、実施形態1から4のいずれか一項に記載の抗グリコムUC1抗体または抗原結合フラグメント

【0422】

65. ELISAによって測定した場合、ペプチドTAPPAHGVTSAPDTRPAPGATAPPAHGV（配列番号113）に結合するより高い親和性で、ペプチドRPAPGSTAPPAHGV（配列番号99）に結合し、前記ペプチドにおいて、太字と下線の文字で示されるセリンおよびスレオニン残基は、GalNAcでグリコシル化された残基を示す、実施形態1から4のいずれか一項に記載の抗グリコムUC1抗体または抗原結合フラグメント

【0423】

66. 抗グリコムUC1抗体または抗原結合フラグメントの、ペプチドTAPPAHGVTSAPDTRPAPGATAPPAHGV（配列番号113）への結合が、ELISAによって測定した場合、抗グリコムUC1抗体または抗原結合フラグメントの、ペプチドRPAPGSTAPPAHGV（配列番号99）への結合の5%未満であり、前記ペプチドにおいて、太字と下線の文字で示されるセリンおよびスレオニン残基は、GalNAcでグリコシル化された残基を示す、実施形態65に記載の抗グリコムUC1抗体または抗原結合フラグメント

【0424】

67. 抗グリコムUC1抗体または抗原結合フラグメントの、ペプチドTAPPAHGVTSAPDTRPAPGATAPPAHGV（配列番号113）への結合が、ELISAによって測定した場合、抗グリコムUC1抗体または抗原結合フラグメントの、ペプチドRPAPGSTAPPAHGV（配列番号99）への結合の3%未満であり、前記ペプチドにおいて、太字と下線の文字で示されるセリンおよびスレオニン残基は、GalNAcでグリコシル化された残基を示す、実施形態65に記載の抗グリコムUC1抗体または抗原結合フラグメント

【0425】

68. ELISAによって測定した場合、ペプチドTAPPAHGVTSAPDTRPAPGSAAPPAHGV（配列番号114）に結合するより高い親和性で、ペプチドRPAPGSTAPPAHGV（配列番号99）に結合し、前記ペプチドにおいて、太字と下線の文字で示されるセリンおよびスレオニン残基は、GalNAcでグリコシル化された残基を示す、実施形態65から67のいずれか一項に記載の抗グリコムUC1抗体または抗原結合フラグメント

【0426】

69. 抗グリコムUC1抗体または抗原結合フラグメントの、TAPPAHGVTSAPDTRPAPGSAAPPAHGV（配列番号114）への結合が、ELISAによって測定した場合、抗グリコムUC1抗体または抗原結合フラグメントの、ペプチドRPAPGSTAPPAHGV（配列番号99）への結合の20%未満であり、前記ペプチドにおいて、太字と下線の文字で示されるセリンおよびスレオニン残基は、GalNAcで

10

20

30

40

50

グリコシル化された残基を示す、実施形態 68 に記載の抗グリコ MUC 1 抗体または抗原結合フラグメント

【0427】

70. 抗グリコ MUC 1 抗体または抗原結合フラグメントの、T A P P A H G V T S A P D T R P A P G S A A P P A H G V (配列番号 114) への結合が、E L I S A によって測定した場合、抗グリコ MUC 1 抗体または抗原結合フラグメントの、ペプチド R P A P G S T A P P A H G V T (配列番号 99) への結合の 10%未満であり、前記ペプチドにおいて、太字と下線の文字で示されるセリンおよびスレオニン残基は、G a l N A c でグリコシル化された残基を示す、実施形態 68 に記載の抗グリコ MUC 1 抗体または抗原結合フラグメント

10

【0428】

71. E L I S A によって測定した場合、ペプチド T A P P A H G V T S A P D T R P A P G S T G P P A H G V (配列番号 115) に結合するより高い親和性で、ペプチド R P A P G S T A P P A H G V T (配列番号 99) に結合し、前記ペプチドにおいて、太字と下線の文字で示されるセリンおよびスレオニン残基は、G a l N A c でグリコシル化された残基を示す、実施形態 68 から 70 のいずれか一項に記載の抗グリコ MUC 1 抗体または抗原結合フラグメント

【0429】

72. 抗グリコ MUC 1 抗体または抗原結合フラグメントの、ペプチド T A P P A H G V T S A P D T R P A P G S T G P P A H G V (配列番号 115) への結合が、E L I S A によって測定した場合、抗グリコ MUC 1 抗体または抗原結合フラグメントの、ペプチド R P A P G S T A P P A H G V T (配列番号 99) への結合の 20%未満であり、前記ペプチドにおいて、太字と下線の文字で示されるセリンおよびスレオニン残基は、G a l N A c でグリコシル化された残基を示す、実施形態 71 に記載の抗グリコ MUC 1 抗体または抗原結合フラグメント

20

【0430】

73. 抗グリコ MUC 1 抗体または抗原結合フラグメントの、ペプチド T A P P A H G V T S A P D T R P A P G S T G P P A H G V (配列番号 115) への結合が、E L I S A によって測定した場合、抗グリコ MUC 1 抗体または抗原結合フラグメントの、ペプチド R P A P G S T A P P A H G V T (配列番号 99) への結合の 10%未満であり、前記ペプチドにおいて、太字と下線の文字で示されるセリンおよびスレオニン残基は、G a l N A c でグリコシル化された残基を示す、実施形態 71 に記載の抗グリコ MUC 1 抗体または抗原結合フラグメント

30

【0431】

74. 抗グリコ MUC 1 抗体または抗原結合フラグメントの、ペプチド T A P P A H G V T S A P D T R P A P G S T G P P A H G V (配列番号 115) への結合が、E L I S A によって測定した場合、抗グリコ MUC 1 抗体または抗原結合フラグメントの、ペプチド R P A P G S T A P P A H G V T (配列番号 99) への結合の 5%未満であり、前記ペプチドにおいて、太字と下線の文字で示されるセリンおよびスレオニン残基は、G a l N A c でグリコシル化された残基を示す、実施形態 71 に記載の抗グリコ MUC 1 抗体または抗原結合フラグメント

40

【0432】

75. E L I S A によって測定した場合、ペプチド T A P P A H G V T S A P D T R P A P G S T A A P A H G V (配列番号 116) に結合するより高い親和性で、ペプチド R P A P G S T A P P A H G V T (配列番号 99) に結合し、前記ペプチドにおいて、太字と下線の文字で示されるセリンおよびスレオニン残基は、G a l N A c でグリコシル化された残基を示す、実施形態 71 から 74 のいずれか一項に記載の抗グリコ MUC 1 抗体または抗原結合フラグメント

【0433】

76. 抗グリコ MUC 1 抗体または抗原結合フラグメントの、ペプチド T A P P A H G

50

VTSAPDTRPAPGSTAAPAHGV（配列番号116）への結合が、ELISAによって測定した場合、抗グリコMUC1抗体または抗原結合フラグメントの、ペプチドRPAPGSTAPPAHGV（配列番号99）への結合の10%未満であり、前記ペプチドにおいて、太字と下線の文字で示されるセリンおよびスレオニン残基は、G a l N A cでグリコシル化された残基を示す、実施形態75に記載の抗グリコMUC1抗体または抗原結合フラグメント

【0434】

77. 抗グリコMUC1抗体または抗原結合フラグメントの、ペプチドTAPPAHGVTSAPDTRPAPGSTAAPAHGV（配列番号116）への結合が、ELISAによって測定した場合、抗グリコMUC1抗体または抗原結合フラグメントの、ペプチドRPAPGSTAPPAHGV（配列番号99）への結合の5%未満であり、前記ペプチドにおいて、太字と下線の文字で示されるセリンおよびスレオニン残基は、G a l N A cでグリコシル化された残基を示す、実施形態75に記載の抗グリコMUC1抗体または抗原結合フラグメント

【0435】

78. ELISAによって測定した場合、ペプチドTAPPAHGVTSAPDTRPAPGSTAPAAHGV（配列番号117）に結合するより高い親和性で、ペプチドRPAPGSTAPPAHGV（配列番号99）に結合し、前記ペプチドにおいて、太字と下線の文字で示されるセリンおよびスレオニン残基は、G a l N A cでグリコシル化された残基を示す、実施形態75から77のいずれか一項に記載の抗グリコMUC1抗体または抗原結合フラグメント

【0436】

79. 抗グリコMUC1抗体または抗原結合フラグメントの、ペプチドTAPPAHGVTSAPDTRPAPGSTAPAAHGV（配列番号117）への結合が、ELISAによって測定した場合、抗グリコMUC1抗体または抗原結合フラグメントの、ペプチドRPAPGSTAPPAHGV（配列番号99）への結合の80%未満であり、前記ペプチドにおいて、太字と下線の文字で示されるセリンおよびスレオニン残基は、G a l N A cでグリコシル化された残基を示す、実施形態78に記載の抗グリコMUC1抗体または抗原結合フラグメント

【0437】

80. 抗グリコMUC1抗体または抗原結合フラグメントの、ペプチドTAPPAHGVTSAPDTRPAPGSTAPAAHGV（配列番号117）への結合が、ELISAによって測定した場合、抗グリコMUC1抗体または抗原結合フラグメントの、ペプチドRPAPGSTAPPAHGV（配列番号99）への結合の70%未満であり、前記ペプチドにおいて、太字と下線の文字で示されるセリンおよびスレオニン残基は、G a l N A cでグリコシル化された残基を示す、実施形態78に記載の抗グリコMUC1抗体または抗原結合フラグメント

【0438】

81. 抗グリコMUC1抗体または抗原結合フラグメントの、ペプチドTAPPAHGVTSAPDTRPAPGSTAPAAHGV（配列番号117）への結合が、ELISAによって測定した場合、抗グリコMUC1抗体または抗原結合フラグメントの、ペプチドRPAPGSTAPPAHGV（配列番号99）への結合の20%未満であり、前記ペプチドにおいて、太字と下線の文字で示されるセリンおよびスレオニン残基は、G a l N A cでグリコシル化された残基を示す、実施形態78に記載の抗グリコMUC1抗体または抗原結合フラグメント

【0439】

82. ELISAによって測定した場合、ペプチドTAPPAHGVTSAPDTRPAPASTAPPAHGV（配列番号112）に結合するより高い親和性で、ペプチドRPAPGSTAPPAHGV（配列番号99）に結合し、前記ペプチドにおいて、太字と下線の文字で示されるセリンおよびスレオニン残基は、G a l N A cでグリコシル化さ

10

20

30

40

50

れた残基を示す、実施形態 65 から 81 のいずれか一項に記載の抗グリコMUC1 抗体または抗原結合フラグメント

【0440】

83. 抗グリコMUC1 抗体または抗原結合フラグメントの、ペプチドTAPP AHGVTSAPDTRPAPASTAPP AHGV (配列番号112) への結合が、ELISA によって測定した場合、抗グリコMUC1 抗体または抗原結合フラグメントの、ペプチドRPAPGSTAPP AHGV T (配列番号99) への結合の5%未満であり、前記ペプチドにおいて、太字と下線の文字で示されるセリンおよびスレオニン残基は、GalNAc でグリコシル化された残基を示す、実施形態82 に記載の抗グリコMUC1 抗体または抗原結合フラグメント

10

【0441】

84. 抗グリコMUC1 抗体または抗原結合フラグメントの、ペプチドTAPP AHGVTSAPDTRPAPASTAPP AHGV (配列番号112) への結合が、ELISA によって測定した場合、抗グリコMUC1 抗体または抗原結合フラグメントの、ペプチドRPAPGSTAPP AHGV T (配列番号99) への結合の3%未満であり、前記ペプチドにおいて、太字と下線の文字で示されるセリンおよびスレオニン残基は、GalNAc でグリコシル化された残基を示す、実施形態82 に記載の抗グリコMUC1 抗体または抗原結合フラグメント

【0442】

85. ELISA によって測定した場合、ペプチドTAPP AHGVTSAPDTRPAA GSTAPP AHGV (配列番号111) に結合するより高い親和性で、ペプチドRPAPGSTAPP AHGV T (配列番号99) に結合し、前記ペプチドにおいて、太字と下線の文字で示されるセリンおよびスレオニン残基は、GalNAc でグリコシル化された残基を示す、実施形態82 から84 のいずれか一項に記載の抗グリコMUC1 抗体または抗原結合フラグメント

20

【0443】

86. 抗グリコMUC1 抗体または抗原結合フラグメントの、ペプチドTAPP AHGVTSAPDTRPAA GSTAPP AHGV (配列番号111) への結合が、ELISA によって測定した場合、抗グリコMUC1 抗体または抗原結合フラグメントの、ペプチドRPAPGSTAPP AHGV T (配列番号99) への結合の10%未満であり、前記ペプチドにおいて、太字と下線の文字で示されるセリンおよびスレオニン残基は、GalNAc でグリコシル化された残基を示す、実施形態85 に記載の抗グリコMUC1 抗体または抗原結合フラグメント

30

【0444】

87. 抗グリコMUC1 抗体または抗原結合フラグメントの、ペプチドTAPP AHGVTSAPDTRPAA GSTAPP AHGV (配列番号111) への結合が、ELISA によって測定した場合、抗グリコMUC1 抗体または抗原結合フラグメントの、ペプチドRPAPGSTAPP AHGV T (配列番号99) への結合の5%未満であり、前記ペプチドにおいて、太字と下線の文字で示されるセリンおよびスレオニン残基は、GalNAc でグリコシル化された残基を示す、実施形態85 に記載の抗グリコMUC1 抗体または抗原結合フラグメント

40

【0445】

88. ELISA によって測定した場合、ペプチドTAPP AHGVTSAPDTRPGPGSTAPP AHGV (配列番号110) に結合するより高い親和性で、ペプチドRPAPGSTAPP AHGV T (配列番号99) に結合し、前記ペプチドにおいて、太字と下線の文字で示されるセリンおよびスレオニン残基は、GalNAc でグリコシル化された残基を示す、実施形態85 から87 のいずれか一項に記載の抗グリコMUC1 抗体または抗原結合フラグメント

【0446】

89. 抗グリコMUC1 抗体または抗原結合フラグメントの、ペプチドTAPP AHG

50

VTSAPDTRP GPGSTAPPAHGV（配列番号110）への結合が、ELISAによって測定した場合、抗グリコMUC1抗体または抗原結合フラグメントの、ペプチドRPAPGSTAPPAHGVT（配列番号99）への結合の5%未満であり、前記ペプチドにおいて、太字と下線の文字で示されるセリンおよびスレオニン残基は、GalNAcでグリコシル化された残基を示す、実施形態88に記載の抗グリコMUC1抗体または抗原結合フラグメント

【0447】

90．抗グリコMUC1抗体または抗原結合フラグメントの、ペプチドTAPPAHGVVTSAPDTRP GPGSTAPPAHGV（配列番号110）への結合が、ELISAによって測定した場合、抗グリコMUC1抗体または抗原結合フラグメントの、ペプチドRPAPGSTAPPAHGVT（配列番号99）への結合の3%未満であり、前記ペプチドにおいて、太字と下線の文字で示されるセリンおよびスレオニン残基は、GalNAcでグリコシル化された残基を示す、実施形態88に記載の抗グリコMUC1抗体または抗原結合フラグメント

【0448】

91．ELISAによって測定した場合、ペプチドTAPPAHGVVTSAPDTRAAPGSTAPPAHGV（配列番号109）に結合するより高い親和性で、ペプチドRPAPGSTAPPAHGVT（配列番号99）に結合し、前記ペプチドにおいて、太字と下線の文字で示されるセリンおよびスレオニン残基は、GalNAcでグリコシル化された残基を示す、実施形態88から90のいずれか一項に記載の抗グリコMUC1抗体または抗原結合フラグメント

【0449】

92．抗グリコMUC1抗体または抗原結合フラグメントの、ペプチドTAPPAHGVVTSAPDTRAAPGSTAPPAHGV（配列番号109）への結合が、ELISAによって測定した場合、抗グリコMUC1抗体または抗原結合フラグメントの、ペプチドRPAPGSTAPPAHGVT（配列番号99）への結合の80%未満であり、前記ペプチドにおいて、太字と下線の文字で示されるセリンおよびスレオニン残基は、GalNAcでグリコシル化された残基を示す、実施形態91に記載の抗グリコMUC1抗体または抗原結合フラグメント

【0450】

93．抗グリコMUC1抗体または抗原結合フラグメントの、ペプチドTAPPAHGVVTSAPDTRAAPGSTAPPAHGV（配列番号109）への結合が、ELISAによって測定した場合、抗グリコMUC1抗体または抗原結合フラグメントの、ペプチドRPAPGSTAPPAHGVT（配列番号99）への結合の50%未満であり、前記ペプチドにおいて、太字と下線の文字で示されるセリンおよびスレオニン残基は、GalNAcでグリコシル化された残基を示す、実施形態91に記載の抗グリコMUC1抗体または抗原結合フラグメント

【0451】

94．抗グリコMUC1抗体または抗原結合フラグメントの、ペプチドTAPPAHGVVTSAPDTRAAPGSTAPPAHGV（配列番号109）への結合が、ELISAによって測定した場合、抗グリコMUC1抗体または抗原結合フラグメントの、ペプチドRPAPGSTAPPAHGVT（配列番号99）への結合の20%未満であり、前記ペプチドにおいて、太字と下線の文字で示されるセリンおよびスレオニン残基は、GalNAcでグリコシル化された残基を示す、実施形態91に記載の抗グリコMUC1抗体または抗原結合フラグメント

【0452】

95．抗グリコMUC1抗体または抗原結合フラグメントの、ペプチドTAPPAHGVVTSAPDTRAAPGSTAPPAHGV（配列番号109）への結合が、ELISAによって測定した場合、抗グリコMUC1抗体または抗原結合フラグメントの、ペプチドRPAPGSTAPPAHGVT（配列番号99）への結合の10%未満であり、前記

10

20

30

40

50

ペプチドにおいて、太字と下線の文字で示されるセリンおよびスレオニン残基は、G a l N A cでグリコシル化された残基を示す、実施形態 9 1 に記載の抗グリコMUC 1 抗体または抗原結合フラグメント

【0453】

96. E L I S Aによって測定した場合、ペプチドT A P P A H G V T S A P D T A P A P G S T A P P A H G V (配列番号108)に結合するより高い親和性で、ペプチドR P A P G S T A P P A H G V T (配列番号99)に結合し、前記ペプチドにおいて、太字と下線の文字で示されるセリンおよびスレオニン残基は、G a l N A cでグリコシル化された残基を示す、実施形態 9 1 から95のいずれか一項に記載の抗グリコMUC 1 抗体または抗原結合フラグメント

【0454】

97. 抗グリコMUC 1 抗体または抗原結合フラグメントの、ペプチドT A P P A H G V T S A P D T A P A P G S T A P P A H G V (配列番号108)への結合が、E L I S Aによって測定した場合、抗グリコMUC 1 抗体または抗原結合フラグメントの、ペプチドR P A P G S T A P P A H G V T (配列番号99)への結合の80%未満であり、前記ペプチドにおいて、太字と下線の文字で示されるセリンおよびスレオニン残基は、G a l N A cでグリコシル化された残基を示す、実施形態 9 6 に記載の抗グリコMUC 1 抗体または抗原結合フラグメント

【0455】

98. 抗グリコMUC 1 抗体または抗原結合フラグメントの、ペプチドT A P P A H G V T S A P D T A P A P G S T A P P A H G V (配列番号108)への結合が、E L I S Aによって測定した場合、抗グリコMUC 1 抗体または抗原結合フラグメントの、ペプチドR P A P G S T A P P A H G V T (配列番号99)への結合の50%未満であり、前記ペプチドにおいて、太字と下線の文字で示されるセリンおよびスレオニン残基は、G a l N A cでグリコシル化された残基を示す、実施形態 9 6 に記載の抗グリコMUC 1 抗体または抗原結合フラグメント

【0456】

99. 抗グリコMUC 1 抗体または抗原結合フラグメントの、ペプチドT A P P A H G V T S A P D T A P A P G S T A P P A H G V (配列番号108)への結合が、E L I S Aによって測定した場合、抗グリコMUC 1 抗体または抗原結合フラグメントの、ペプチドR P A P G S T A P P A H G V T (配列番号99)への結合の20%未満であり、前記ペプチドにおいて、太字と下線の文字で示されるセリンおよびスレオニン残基は、G a l N A cでグリコシル化された残基を示す、実施形態 9 6 に記載の抗グリコMUC 1 抗体または抗原結合フラグメント

【0457】

100. 抗グリコMUC 1 抗体または抗原結合フラグメントの、ペプチドT A P P A H G V T S A P D T A P A P G S T A P P A H G V (配列番号108)への結合が、E L I S Aによって測定した場合、抗グリコMUC 1 抗体または抗原結合フラグメントの、ペプチドR P A P G S T A P P A H G V T (配列番号99)への結合の10%未満であり、前記ペプチドにおいて、太字と下線の文字で示されるセリンおよびスレオニン残基は、G a l N A cでグリコシル化された残基を示す、実施形態 9 6 に記載の抗グリコMUC 1 抗体または抗原結合フラグメント

【0458】

101. E L I S Aが、ペプチドが0.25 μg/mlの濃度で使用されるE L I S Aを含む、実施形態 65 から100のいずれか一項に記載の抗グリコMUC 1 抗体または抗原結合フラグメント

【0459】

102. E L I S Aが、抗グリコMUC 1 抗体または抗原結合フラグメントを発現する細胞株からの細胞培養上清で実行されるE L I S Aを含む、実施形態 65 から101のいずれか一項に記載の抗グリコMUC 1 抗体または抗原結合フラグメント

10

20

30

40

50

【0460】

103. E L I S A が、抗グリコMUC1抗体または抗原結合フラグメントを発現する細胞株からの希釈された細胞培養上清で実行されるE L I S Aを含む、実施形態65から101のいずれか一項に記載の抗グリコMUC1抗体または抗原結合フラグメント

【0461】

104. 希釈された細胞培養上清が、緩衝液で2～20倍に希釈される細胞培養上清を含む、実施形態103に記載の抗グリコMUC1抗体または抗原結合フラグメント

【0462】

105. E L I S Aにおける抗体または抗原結合フラグメントの濃度が、0.1mg/mLから2mg/mLの間の範囲であり、任意選択で、E L I S Aにおける抗体または抗原結合フラグメントの濃度が、0.5mg/mLから1mg/mLの間の範囲である、実施形態65から104のいずれか一項に記載の抗グリコMUC1抗体または抗原結合フラグメント

10

【0463】

106. E L I S Aにおける抗体または抗原結合フラグメントの濃度が、MUC1ペプチドR P A P G S T A P P A H G V T（配列番号99）への結合をもたらす、実施形態65から105のいずれか一項に記載の抗グリコMUC1抗体または抗原結合フラグメント

【0464】

107. E L I S Aが、実施例9に記載された通りに実行される、実施形態65から106のいずれか一項に記載の抗グリコMUC1抗体または抗原結合フラグメント

20

【0465】

108. 太字と下線の文字で示されるセリンおよびスレオニン残基においてG a l N A cでグリコシル化されたMUC1ペプチドR P A P G S T A P P A H G V T（配列番号99）への結合に関して、(i) 配列番号1の重鎖可変(VH)配列および配列番号2の軽鎖可変(VL)配列、または(ii) 配列番号23の重鎖可変(VH)配列および配列番号24の軽鎖可変(VL)配列を含む参照抗体または抗原結合フラグメントと競合する抗グリコMUC1抗体または抗原結合フラグメントであって、抗グリコMUC1抗体または抗原結合フラグメントは、

(a) VH配列内に第1、第2および第3のCDR手段を有するVH配列；および

(b) VL配列内に第4、第5および第6のCDR手段を有するVL配列

30

を含み、

第1、第2、第3、第4、第5、および第6のCDR手段は、協同して、抗グリコMUC1抗体または抗原結合フラグメントの前記MUC1ペプチドへの結合を生じさせるものであり、前記結合は、参照抗体または抗原結合フラグメントの結合と競合する、抗グリコMUC1抗体または抗原結合フラグメント

【0466】

109. 配列番号23のVH配列および配列番号24のVL配列を含む参照抗体または抗原結合フラグメントと競合する、実施形態108に記載の抗グリコMUC1抗体または抗原結合フラグメント

【0467】

40

110. 配列番号1のVH配列および配列番号2のVL配列を含む参照抗体または抗原結合フラグメントと競合する、実施形態108に記載の抗グリコMUC1抗体または抗原結合フラグメント

【0468】

111. 正常細胞と比較してがん細胞で過剰発現されるグリコMUC1エピトープに優先的に結合する、実施形態1から110のいずれか一項に記載の抗グリコMUC1抗体または抗原結合フラグメント

【0469】

112. 表面プラズモン共鳴によって測定した場合、1nMから50nMの結合親和性(K_D)で、太字と下線の文字で示されるセリンおよびスレオニン残基においてG a l N

50

A cでグリコシル化されたMUC 1ペプチドRPAPG STAPPAHGVT（配列番号99）に結合する、実施形態1から111のいずれか一項に記載の抗グリコMUC 1抗体または抗原結合フラグメント

【0470】

113．表面プラズモン共鳴によって測定した場合、3 nMから50 nMの結合親和性（ K_D ）で、太字と下線の文字で示されるセリンおよびスレオニン残基においてGalNAcでグリコシル化されたMUC 1ペプチドRPAPG STAPPAHGVT（配列番号99）に結合する、実施形態112に記載の抗グリコMUC 1抗体または抗原結合フラグメント

【0471】

114．表面プラズモン共鳴によって測定した場合、3 nMから40 nMの結合親和性（ K_D ）で、太字と下線の文字で示されるセリンおよびスレオニン残基においてGalNAcでグリコシル化されたMUC 1ペプチドRPAPG STAPPAHGVT（配列番号99）に結合する、実施形態112に記載の抗グリコMUC 1抗体または抗原結合フラグメント

【0472】

115．表面プラズモン共鳴によって測定した場合、3 nMから25 nMの結合親和性（ K_D ）で、太字と下線の文字で示されるセリンおよびスレオニン残基においてGalNAcでグリコシル化されたMUC 1ペプチドRPAPG STAPPAHGVT（配列番号99）に結合する、実施形態112に記載の抗グリコMUC 1抗体または抗原結合フラグメント

【0473】

116．表面プラズモン共鳴によって測定した場合、5 nMから50 nMの結合親和性（ K_D ）で、太字と下線の文字で示されるセリンおよびスレオニン残基においてGalNAcでグリコシル化されたMUC 1ペプチドRPAPG STAPPAHGVT（配列番号99）に結合する、実施形態112に記載の抗グリコMUC 1抗体または抗原結合フラグメント

【0474】

117．表面プラズモン共鳴によって測定した場合、5 nMから25 nMの結合親和性（ K_D ）で、太字と下線の文字で示されるセリンおよびスレオニン残基においてGalNAcでグリコシル化されたMUC 1ペプチドRPAPG STAPPAHGVT（配列番号99）に結合する、実施形態112に記載の抗グリコMUC 1抗体または抗原結合フラグメント

【0475】

118．表面プラズモン共鳴によって測定した場合、10 nMから50 nMの結合親和性（ K_D ）で、太字と下線の文字で示されるセリンおよびスレオニン残基においてGalNAcでグリコシル化されたMUC 1ペプチドRPAPG STAPPAHGVT（配列番号99）に結合する、実施形態112に記載の抗グリコMUC 1抗体または抗原結合フラグメント

【0476】

119．表面プラズモン共鳴によって測定した場合、10 nMから25 nMの結合親和性（ K_D ）で、太字と下線の文字で示されるセリンおよびスレオニン残基においてGalNAcでグリコシル化されたMUC 1ペプチドRPAPG STAPPAHGVT（配列番号99）に結合する、実施形態112に記載の抗グリコMUC 1抗体または抗原結合フラグメント

【0477】

120．表面プラズモン共鳴によって測定した場合、15 nMから50 nMの結合親和性（ K_D ）で、太字と下線の文字で示されるセリンおよびスレオニン残基においてGalNAcでグリコシル化されたMUC 1ペプチドRPAPG STAPPAHGVT（配列番号99）に結合する、実施形態112に記載の抗グリコMUC 1抗体または抗原結合フラ

10

20

30

40

50

グメント

【0478】

121. 表面プラズモン共鳴によって測定した場合、15 nMから25 nMの結合親和性 (K_D) で、太字と下線の文字で示されるセリンおよびスレオニン残基において **G a l N A c** でグリコシル化された **M U C 1** ペプチド **R P A P G S T A P P A H G V T** (配列番号99) に結合する、実施形態112に記載の抗グリコ**M U C 1**抗体または抗原結合フラグメント

【0479】

122. 表面プラズモン共鳴によって測定した場合、20 nMから50 nMの結合親和性 (K_D) で、太字と下線の文字で示されるセリンおよびスレオニン残基において **G a l N A c** でグリコシル化された **M U C 1** ペプチド **R P A P G S T A P P A H G V T** (配列番号99) に結合する、実施形態112に記載の抗グリコ**M U C 1**抗体または抗原結合フラグメント

【0480】

123. 表面プラズモン共鳴によって測定した場合、25 nMから50 nMの結合親和性 (K_D) で、太字と下線の文字で示されるセリンおよびスレオニン残基において **G a l N A c** でグリコシル化された **M U C 1** ペプチド **R P A P G S T A P P A H G V T** (配列番号99) に結合する、実施形態112に記載の抗グリコ**M U C 1**抗体または抗原結合フラグメント

【0481】

124. 多価である、実施形態1から123のいずれか一項に記載の抗グリコ**M U C 1**抗体または抗原結合フラグメント

【0482】

125. 単鎖可変フラグメント (**s c F v**) の形態である、実施形態1から123のいずれか一項に記載の抗グリコ**M U C 1**抗体または抗原結合フラグメント

【0483】

126. **s c F v** が、軽鎖可変フラグメントのN末端側に重鎖可変フラグメントを含む、実施形態125に記載の抗グリコ**M U C 1**抗体または抗原結合フラグメント。

【0484】

127. **s c F v** の重鎖可変フラグメントおよび軽鎖可変フラグメントが、4~15アミノ酸のリンカー配列に共有結合している、実施形態125または実施形態126に記載の抗グリコ**M U C 1**抗体または抗原結合フラグメント。

【0485】

128. 多重特異性抗体の形態である、実施形態1から123のいずれかに記載の抗グリコ**M U C 1**抗体または抗原結合フラグメント。

【0486】

129. 多重特異性抗体が、第1のエピトープと異なる第2のエピトープに結合する二重特異性抗体である、実施形態128に記載の抗グリコ**M U C 1**抗体または抗原結合フラグメント。

【0487】

130. 二重特異性抗体が、**C r o s s M a b**、**F a b**アーム交換抗体、二重特異性T細胞エンゲージャー (**B i T E**)、または二重親和性リターゲティング分子 (**D A R T**) である、実施形態129に記載の抗グリコ**M U C 1**抗体または抗原結合フラグメント。

【0488】

131. 二重特異性抗体が、**C r o s s M a b**である、実施形態130に記載の抗グリコ**M U C 1**抗体または抗原結合フラグメント。

【0489】

132. 二重特異性抗体が、**C r o s s M a b**^{F A B}である、実施形態131に記載の抗グリコ**M U C 1**抗体または抗原結合フラグメント。

【0490】

133. 二重特異性抗体が、CrossMab^{VH-VL}である、実施形態131に記載の抗グリコMUC1抗体または抗原結合フラグメント。

【0491】

134. 二重特異性抗体が、CrossMab^{CH1-CL}である、実施形態131に記載の抗グリコMUC1抗体または抗原結合フラグメント。

【0492】

135. 二重特異性抗体が、Fabアーム交換抗体である、実施形態130に記載の抗グリコMUC1抗体または抗原結合フラグメント。

【0493】

136. 二重特異性抗体が、二重親和性リターゲティング分子(DART)である、実施形態130に記載の抗グリコMUC1抗体または抗原結合フラグメント。

【0494】

137. 二重特異性抗体が、二重特異性T細胞エンゲージャー(BiTE)である、実施形態130に記載の抗グリコMUC1抗体または抗原結合フラグメント。

【0495】

138. 第2のエピトープが、MUC1エピトープである、実施形態129から137のいずれか一つに記載の抗グリコMUC1抗体または抗原結合フラグメント。

【0496】

139. 第2のエピトープが、正常細胞と比較して、がん細胞上で過剰発現されるMUC1エピトープである、実施形態129から137のいずれか一つに記載の抗グリコMUC1抗体または抗原結合フラグメント。

【0497】

140. 第2のエピトープが、T細胞エピトープである、実施形態129から137のいずれか一つに記載の抗グリコMUC1抗体または抗原結合フラグメント。

【0498】

141. T細胞エピトープが、CD3エピトープ、CD8エピトープ、CD16エピトープ、CD25エピトープ、CD28エピトープ、またはNKG2Dエピトープを含む、実施形態140に記載の抗グリコMUC1抗体または抗原結合フラグメント。

【0499】

142. T細胞エピトープが、CD3エピトープを含み、CD3エピトープは、任意選択でヒトCD3中に存在するエピトープである、実施形態141に記載の抗グリコMUC1抗体または抗原結合フラグメント。

【0500】

143. CD3エピトープが、CD3ガンマエピトープ、CD3デルタエピトープ、CD3イプシロンエピトープ、またはCD3ゼータエピトープを含む、実施形態142に記載の抗グリコMUC1抗体または抗原結合フラグメント。

【0501】

144. 検出可能な部分にコンジュゲートされている、実施形態1から143のいずれか一つに記載の抗グリコMUC1抗体または抗原結合フラグメント。

【0502】

145. 検出可能な部分が、酵素、放射線同位体、または蛍光標識である、実施形態144に記載の抗グリコMUC1抗体または抗原結合フラグメント。

【0503】

146. 少なくとも第2のアミノ酸配列に作動可能に連結した、実施形態1から145のいずれか一つに記載の二重特異性抗体のアミノ酸配列を含む融合タンパク質。

【0504】

147. 第2のアミノ酸配列が、4-1BB、CD3-ゼータ、またはそのフラグメントのアミノ酸配列である、実施形態146に記載の融合タンパク質。

【0505】

148. 第2のアミノ酸配列が、融合ペプチドのアミノ酸配列である、実施形態146

10

20

30

40

50

に記載の融合タンパク質。

【0506】

149. 融合ペプチドが、CD28-CD3-ゼータまたは4-1BB (CD137)-CD3-ゼータ融合ペプチドである、実施形態148に記載の融合タンパク質。

【0507】

150. 第2のアミノ酸配列が、T細胞の活性化のモジュレーターまたはそのフラグメントのアミノ酸配列である、実施形態146に記載の融合タンパク質。

【0508】

151. T細胞の活性化のモジュレーターが、IL-15またはIL-15Raである、実施形態150に記載の融合タンパク質。

【0509】

152. 実施形態125から127のいずれか一つに記載のscFvを含むキメラ抗原受容体(CAR)。

【0510】

153. アミノ末端からカルボキシ末端の順で、ヒトCD8リーダーペプチド、scFv、ヒトCD8ヒンジドメイン、ヒトCD8膜貫通ドメイン、およびCD3-ゼータシグナル伝達ドメインを含む、実施形態152に記載のCAR。

【0511】

154. 細胞傷害性物質にコンジュゲートした、実施形態1から145のいずれか一つに記載の二重特異性抗体、または実施形態146から151のいずれか一つに記載の融合タンパク質を含む抗体-薬物コンジュゲート。

【0512】

155. 細胞傷害性物質が、オーリスタチン、DNA副溝結合剤、アルキル化剤、エンジイン、レキシトロプシン、デュオカルマイシン、タキサン、ドラスタチン、メイタンシノイド、またはビンカアルカロイドである、実施形態154に記載の抗体-薬物コンジュゲート。

【0513】

156. 抗グリコMUC1抗体もしくは抗原結合フラグメントまたは二重特異性抗体が、リンカーを介して細胞傷害性物質にコンジュゲートされている、実施形態155に記載の抗体-薬物コンジュゲート。

【0514】

157. リンカーが、細胞内条件下で切断可能である、実施形態156に記載の抗体-薬物コンジュゲート。

【0515】

158. 切断可能なリンカーが、細胞内のプロテアーゼによって切断可能である、実施形態157に記載の抗体-薬物コンジュゲート。

【0516】

159. リンカーが、ジペプチドを含む、実施形態158に記載の抗体-薬物コンジュゲート。

【0517】

160. ジペプチドが、val-citまたはphe-lysである、実施形態159に記載の抗体-薬物コンジュゲート。

【0518】

161. 切断可能なリンカーが、5.5未満のpHで加水分解性である、実施形態157に記載の抗体-薬物コンジュゲート。

【0519】

162. 加水分解性のリンカーが、ヒドラゾンリンカーである、実施形態161に記載の抗体-薬物コンジュゲート。

【0520】

163. 切断可能なリンカーが、ジスルフィドリンカーである、実施形態157に記載

10

20

30

40

50

の抗体－薬物コンジュゲート。

【0521】

164. 実施形態1から145のいずれか一つに記載の二重特異性抗体、実施形態146から151のいずれか一つに記載の融合タンパク質、または実施形態152または実施形態153に記載のCARのコード領域を含む核酸。

【0522】

165. コード領域が、ヒト細胞における発現のためにコドン最適化されている、実施形態164に記載の核酸。

【0523】

166. 実施形態164または実施形態165に記載の核酸を含むベクター。

10

【0524】

167. ウイルスベクターである、実施形態166に記載のベクター。

【0525】

168. ウイルスベクターが、レンチウイルスベクターである、実施形態167に記載のベクター。

【0526】

169. 実施形態164または実施形態165に記載の核酸を発現するように操作された宿主細胞。

【0527】

170. 実施形態152または実施形態153に記載のCARを発現するように操作されたヒトT細胞である、実施形態169に記載の宿主細胞。

20

【0528】

171. 実施形態166から168のいずれか一つに記載のベクターを含む宿主細胞。

【0529】

172. 宿主細胞が、T細胞であり、ベクターが、実施形態152または実施形態153に記載のCARをコードする、実施形態171に記載の宿主細胞。

【0530】

173. (a) 実施形態1から145のいずれか一つに記載の二重特異性抗体、実施形態146から151のいずれか一つに記載の融合タンパク質、実施形態152または実施形態153に記載のCAR、実施形態154から163のいずれか一つに記載の抗体－薬物コンジュゲート、実施形態164または実施形態165に記載の核酸、実施形態166から168のいずれか一つに記載のベクター、または実施形態169から172のいずれか一つに記載の実施形態の宿主細胞、および(b) 生理学的に好適な緩衝液、アジュバントまたは希釈剤を含む医薬組成物。

30

【0531】

174. がんを処置する方法であって、それを必要とする対象に、有効量の実施形態1から145のいずれか一つに記載の二重特異性抗体、実施形態146から151のいずれか一つに記載の融合タンパク質、実施形態152または実施形態153に記載のCAR、実施形態154から163のいずれか一つに記載の抗体－薬物コンジュゲート、実施形態164または実施形態165に記載の核酸、実施形態166から168のいずれか一つに記載のベクター、実施形態169から172のいずれか一つに記載の実施形態の宿主細胞、または実施形態173に記載の医薬組成物を投与することを含む方法

40

【0532】

175. 対象が、乳がん、肺がん、前立腺がん、膵臓がん、食道がん、結腸直腸がん、卵巣がん、子宮がん、子宮頸がん、膀胱がん、脳腫瘍、非ホジキンリンパ腫、子宮頸がん、胃がん、胆管細胞癌、軟骨肉腫、腎臓がん、皮膚がん、白血病、甲状腺がん、または肝臓がん罹患している、実施形態174に記載の方法

【0533】

176. 対象が、乳がん罹患している、実施形態175に記載の方法

【0534】

50

177. 対象が、肺がんに罹患している、実施形態175に記載の方法
【0535】
178. 対象が、非小細胞肺がんである、実施形態177に記載の方法
【0536】
179. 対象が、前立腺がんに罹患している、実施形態175に記載の方法
【0537】
180. 対象が、膵臓がんに罹患している、実施形態175に記載の方法
【0538】
181. 対象が、食道がんに罹患している、実施形態175に記載の方法
【0539】 10
182. 対象が、結腸直腸がんに罹患している、実施形態175に記載の方法
【0540】
183. 対象が、卵巣がんに罹患している、実施形態175に記載の方法
【0541】
184. 対象が、子宮がんに罹患している、実施形態175に記載の方法
【0542】
185. 対象が、子宮頸がんに罹患している、実施形態175に記載の方法
【0543】
186. 対象が、膀胱がんに罹患している、実施形態175に記載の方法
【0544】 20
187. 対象が、脳腫瘍に罹患している、実施形態175に記載の方法
【0545】
188. 対象が、非ホジキンリンパ腫に罹患している、実施形態175に記載の方法
【0546】
189. 対象が、子宮頸がんに罹患している、実施形態175に記載の方法
【0547】
190. 対象が、胃がんに罹患している、実施形態175に記載の方法
【0548】
191. 対象が、胆管細胞癌に罹患している、実施形態175に記載の方法
【0549】 30
192. 対象が、軟骨肉腫に罹患している、実施形態175に記載の方法
【0550】
193. 対象が、腎臓がんに罹患している、実施形態175に記載の方法
【0551】
194. 対象が、皮膚がんに罹患している、実施形態175に記載の方法
【0552】
195. 対象が、白血病に罹患している、実施形態175に記載の方法
【0553】
196. 対象が、甲状腺がんに罹患している、実施形態175に記載の方法
【0554】 40
197. 対象が、肝臓がんに罹患している、実施形態175に記載の方法。
【0555】
198. 生物学的サンプルでがんを検出する方法であって、サンプルを、実施形態1から145のいずれか一つに記載の抗グリコMUC1抗体または抗原結合フラグメントと接触させること、および抗グリコMUC1抗体または抗原結合フラグメントの結合を検出することを含む方法。
【0556】
199. 抗グリコMUC1抗体または抗原結合フラグメントの結合を定量化することをさらに含む、実施形態198に記載の方法。
【0557】 50

200. 結合が、陰性／ベースライン対照としての正常な組織対照と比較される、および／または陽性対照としてのがん性組織対照と比較される、実施形態198または実施形態199に記載の方法

【0558】

201. がんが、乳がん、肺がん、前立腺がん、膵臓がん、食道がん、結腸直腸がん、卵巣がん、子宮がん、子宮頸がん、膀胱がん、脳腫瘍、非ホジキンリンパ腫、子宮頸がん、胃がん、胆管細胞癌、軟骨肉腫、腎臓がん、皮膚がん、白血病、甲状腺がん、または肝臓がんである、実施形態198から200のいずれか一項に記載の方法

【0559】

202. がんが、乳がんである、実施形態201に記載の方法

10

【0560】

203. がんが、肺がんである、実施形態201に記載の方法

【0561】

204. 肺がんが、非小細胞肺がんである、実施形態203に記載の方法

【0562】

205. がんが、前立腺がんである、実施形態201に記載の方法

【0563】

206. がんが、膵臓がんである、実施形態201に記載の方法

【0564】

207. がんが、食道がんである、実施形態201に記載の方法

20

【0565】

208. がんが、結腸直腸がんである、実施形態201に記載の方法

【0566】

209. がんが、卵巣がんである、実施形態201に記載の方法

【0567】

210. がんが、子宮がんである、実施形態201に記載の方法

【0568】

211. がんが、子宮頸がんである、実施形態201に記載の方法

【0569】

212. がんが、膀胱がんである、実施形態201に記載の方法

30

【0570】

213. がんが、脳腫瘍である、実施形態201に記載の方法

【0571】

214. がんが、非ホジキンリンパ腫である、実施形態201に記載の方法

【0572】

215. がんが、子宮頸がんである、実施形態201に記載の方法

【0573】

216. がんが、胃がんである、実施形態201に記載の方法

【0574】

217. がんが、胆管細胞癌である、実施形態201に記載の方法

40

【0575】

218. がんが、軟骨肉腫である、実施形態201に記載の方法

【0576】

219. がんが、腎臓がんである、実施形態201に記載の方法

【0577】

220. がんが、皮膚がんである、実施形態201に記載の方法

【0578】

221. がんが、白血病である、実施形態201に記載の方法

【0579】

222. がんが、甲状腺がんである、実施形態201に記載の方法

50

【0580】

223. がんが、肝臓がんである、実施形態201に記載の方法

【0581】

224. 医薬として使用するための、実施形態1から145のいずれか一項に記載の抗グリコMUC1抗体または抗原結合フラグメント、実施形態146から151のいずれか一項に記載の融合タンパク質、実施形態152または実施形態153に記載のCAR、実施形態154から163のいずれか一項に記載の抗体-薬物コンジュゲート、実施形態164または実施形態165に記載の核酸、実施形態166から168のいずれか一項に記載のベクター、実施形態169から172のいずれか一項に記載の宿主細胞、または実施形態173に記載の医薬組成物

10

【0582】

225. がんの処置で使用するためであり、任意選択で、がんは、乳がん、肺がん、前立腺がん、膵臓がん、食道がん、結腸直腸がん、卵巣がん、子宮がん、子宮頸がん、膀胱がん、脳腫瘍、非ホジキンリンパ腫、子宮頸がん、胃がん、胆管細胞癌、軟骨肉腫、腎臓がん、皮膚がん、白血病、甲状腺がん、または肝臓がんである、実施形態1から145のいずれか一項に記載の抗グリコMUC1抗体または抗原結合フラグメント、実施形態146から151のいずれか一項に記載の融合タンパク質、実施形態152または実施形態153に記載のCAR、実施形態154から163のいずれか一項に記載の抗体-薬物コンジュゲート、実施形態164または実施形態165に記載の核酸、実施形態166から168のいずれか一項に記載のベクター、実施形態169から172のいずれか一項に記載の宿主細胞、または実施形態173に記載の医薬組成物

20

【0583】

226. 乳がんの処置で使用するための、実施形態1から145のいずれか一項に記載の抗グリコMUC1抗体または抗原結合フラグメント、実施形態146から151のいずれか一項に記載の融合タンパク質、実施形態152または実施形態153に記載のCAR、実施形態154から163のいずれか一項に記載の抗体-薬物コンジュゲート、実施形態164または実施形態165に記載の核酸、実施形態166から168のいずれか一項に記載のベクター、実施形態169から172のいずれか一項に記載の宿主細胞、または実施形態173に記載の医薬組成物

【0584】

227. 肺がんの処置で使用するための、実施形態1から145のいずれか一項に記載の抗グリコMUC1抗体または抗原結合フラグメント、実施形態146から151のいずれか一項に記載の融合タンパク質、実施形態152または実施形態153に記載のCAR、実施形態154から163のいずれか一項に記載の抗体-薬物コンジュゲート、実施形態164または実施形態165に記載の核酸、実施形態166から168のいずれか一項に記載のベクター、実施形態169から172のいずれか一項に記載の宿主細胞、または実施形態173に記載の医薬組成物

30

【0585】

228. 前立腺がんの処置で使用するための、実施形態1から145のいずれか一項に記載の抗グリコMUC1抗体または抗原結合フラグメント、実施形態146から151のいずれか一項に記載の融合タンパク質、実施形態152または実施形態153に記載のCAR、実施形態154から163のいずれか一項に記載の抗体-薬物コンジュゲート、実施形態164または実施形態165に記載の核酸、実施形態166から168のいずれか一項に記載のベクター、実施形態169から172のいずれか一項に記載の宿主細胞、または実施形態173に記載の医薬組成物

40

【0586】

229. 膵臓がんの処置で使用するための、実施形態1から145のいずれか一項に記載の抗グリコMUC1抗体または抗原結合フラグメント、実施形態146から151のいずれか一項に記載の融合タンパク質、実施形態152または実施形態153に記載のCAR、実施形態154から163のいずれか一項に記載の抗体-薬物コンジュゲート、実施

50

形態 1 6 4 または実施形態 1 6 5 に記載の核酸、実施形態 1 6 6 から 1 6 8 のいずれか一項に記載のベクター、実施形態 1 6 9 から 1 7 2 のいずれか一項に記載の宿主細胞、または実施形態 1 7 3 に記載の医薬組成物

【0587】

230. 食道がんの処置で使用するための、実施形態 1 から 1 4 5 のいずれか一項に記載の抗グリコMUC1抗体または抗原結合フラグメント、実施形態 1 4 6 から 1 5 1 のいずれか一項に記載の融合タンパク質、実施形態 1 5 2 または実施形態 1 5 3 に記載のCAR、実施形態 1 5 4 から 1 6 3 のいずれか一項に記載の抗体-薬物コンジュゲート、実施形態 1 6 4 または実施形態 1 6 5 に記載の核酸、実施形態 1 6 6 から 1 6 8 のいずれか一項に記載のベクター、実施形態 1 6 9 から 1 7 2 のいずれか一項に記載の宿主細胞、または実施形態 1 7 3 に記載の医薬組成物

10

【0588】

231. 結腸直腸がんの処置で使用するための、実施形態 1 から 1 4 5 のいずれか一項に記載の抗グリコMUC1抗体または抗原結合フラグメント、実施形態 1 4 6 から 1 5 1 のいずれか一項に記載の融合タンパク質、実施形態 1 5 2 または実施形態 1 5 3 に記載のCAR、実施形態 1 5 4 から 1 6 3 のいずれか一項に記載の抗体-薬物コンジュゲート、実施形態 1 6 4 または実施形態 1 6 5 に記載の核酸、実施形態 1 6 6 から 1 6 8 のいずれか一項に記載のベクター、実施形態 1 6 9 から 1 7 2 のいずれか一項に記載の宿主細胞、または実施形態 1 7 3 に記載の医薬組成物

20

【0589】

232. 卵巣がんの処置で使用するための、実施形態 1 から 1 4 5 のいずれか一項に記載の抗グリコMUC1抗体または抗原結合フラグメント、実施形態 1 4 6 から 1 5 1 のいずれか一項に記載の融合タンパク質、実施形態 1 5 2 または実施形態 1 5 3 に記載のCAR、実施形態 1 5 4 から 1 6 3 のいずれか一項に記載の抗体-薬物コンジュゲート、実施形態 1 6 4 または実施形態 1 6 5 に記載の核酸、実施形態 1 6 6 から 1 6 8 のいずれか一項に記載のベクター、実施形態 1 6 9 から 1 7 2 のいずれか一項に記載の宿主細胞、または実施形態 1 7 3 に記載の医薬組成物

【0590】

233. 子宮がんの処置で使用するための、実施形態 1 から 1 4 5 のいずれか一項に記載の抗グリコMUC1抗体または抗原結合フラグメント、実施形態 1 4 6 から 1 5 1 のいずれか一項に記載の融合タンパク質、実施形態 1 5 2 または実施形態 1 5 3 に記載のCAR、実施形態 1 5 4 から 1 6 3 のいずれか一項に記載の抗体-薬物コンジュゲート、実施形態 1 6 4 または実施形態 1 6 5 に記載の核酸、実施形態 1 6 6 から 1 6 8 のいずれか一項に記載のベクター、実施形態 1 6 9 から 1 7 2 のいずれか一項に記載の宿主細胞、または実施形態 1 7 3 に記載の医薬組成物

30

【0591】

234. 子宮頸がんの処置で使用するための、実施形態 1 から 1 4 5 のいずれか一項に記載の抗グリコMUC1抗体または抗原結合フラグメント、実施形態 1 4 6 から 1 5 1 のいずれか一項に記載の融合タンパク質、実施形態 1 5 2 または実施形態 1 5 3 に記載のCAR、実施形態 1 5 4 から 1 6 3 のいずれか一項に記載の抗体-薬物コンジュゲート、実施形態 1 6 4 または実施形態 1 6 5 に記載の核酸、実施形態 1 6 6 から 1 6 8 のいずれか一項に記載のベクター、実施形態 1 6 9 から 1 7 2 のいずれか一項に記載の宿主細胞、または実施形態 1 7 3 に記載の医薬組成物

40

【0592】

235. 膀胱がんの処置で使用するための、実施形態 1 から 1 4 5 のいずれか一項に記載の抗グリコMUC1抗体または抗原結合フラグメント、実施形態 1 4 6 から 1 5 1 のいずれか一項に記載の融合タンパク質、実施形態 1 5 2 または実施形態 1 5 3 に記載のCAR、実施形態 1 5 4 から 1 6 3 のいずれか一項に記載の抗体-薬物コンジュゲート、実施形態 1 6 4 または実施形態 1 6 5 に記載の核酸、実施形態 1 6 6 から 1 6 8 のいずれか一項に記載のベクター、実施形態 1 6 9 から 1 7 2 のいずれか一項に記載の宿主細胞、また

50

は実施形態 173 に記載の医薬組成物

【0593】

236. 脳腫瘍の処置で使用するための、実施形態 1 から 145 のいずれか一項に記載の抗グリコMUC1 抗体または抗原結合フラグメント、実施形態 146 から 151 のいずれか一項に記載の融合タンパク質、実施形態 152 または実施形態 153 に記載のCAR、実施形態 154 から 163 のいずれか一項に記載の抗体-薬物コンジュゲート、実施形態 164 または実施形態 165 に記載の核酸、実施形態 166 から 168 のいずれか一項に記載のベクター、実施形態 169 から 172 のいずれか一項に記載の宿主細胞、または実施形態 173 に記載の医薬組成物

【0594】

237. 非ホジキンリンパ腫の処置で使用するための、実施形態 1 から 145 のいずれか一項に記載の抗グリコMUC1 抗体または抗原結合フラグメント、実施形態 146 から 151 のいずれか一項に記載の融合タンパク質、実施形態 152 または実施形態 153 に記載のCAR、実施形態 154 から 163 のいずれか一項に記載の抗体-薬物コンジュゲート、実施形態 164 または実施形態 165 に記載の核酸、実施形態 166 から 168 のいずれか一項に記載のベクター、実施形態 169 から 172 のいずれか一項に記載の宿主細胞、または実施形態 173 に記載の医薬組成物

【0595】

238. 子宮頸がんの処置で使用するための、実施形態 1 から 145 のいずれか一項に記載の抗グリコMUC1 抗体または抗原結合フラグメント、実施形態 146 から 151 のいずれか一項に記載の融合タンパク質、実施形態 152 または実施形態 153 に記載のCAR、実施形態 154 から 163 のいずれか一項に記載の抗体-薬物コンジュゲート、実施形態 164 または実施形態 165 に記載の核酸、実施形態 166 から 168 のいずれか一項に記載のベクター、実施形態 169 から 172 のいずれか一項に記載の宿主細胞、または実施形態 173 に記載の医薬組成物

【0596】

239. 胃がんの処置で使用するための、実施形態 1 から 145 のいずれか一項に記載の抗グリコMUC1 抗体または抗原結合フラグメント、実施形態 146 から 151 のいずれか一項に記載の融合タンパク質、実施形態 152 または実施形態 153 に記載のCAR、実施形態 154 から 163 のいずれか一項に記載の抗体-薬物コンジュゲート、実施形態 164 または実施形態 165 に記載の核酸、実施形態 166 から 168 のいずれか一項に記載のベクター、実施形態 169 から 172 のいずれか一項に記載の宿主細胞、または実施形態 173 に記載の医薬組成物

【0597】

240. 胆管細胞癌の処置で使用するための、実施形態 1 から 145 のいずれか一項に記載の抗グリコMUC1 抗体または抗原結合フラグメント、実施形態 146 から 151 のいずれか一項に記載の融合タンパク質、実施形態 152 または実施形態 153 に記載のCAR、実施形態 154 から 163 のいずれか一項に記載の抗体-薬物コンジュゲート、実施形態 164 または実施形態 165 に記載の核酸、実施形態 166 から 168 のいずれか一項に記載のベクター、実施形態 169 から 172 のいずれか一項に記載の宿主細胞、または実施形態 173 に記載の医薬組成物

【0598】

241. 軟骨肉腫の処置で使用するための、実施形態 1 から 145 のいずれか一項に記載の抗グリコMUC1 抗体または抗原結合フラグメント、実施形態 146 から 151 のいずれか一項に記載の融合タンパク質、実施形態 152 または実施形態 153 に記載のCAR、実施形態 154 から 163 のいずれか一項に記載の抗体-薬物コンジュゲート、実施形態 164 または実施形態 165 に記載の核酸、実施形態 166 から 168 のいずれか一項に記載のベクター、実施形態 169 から 172 のいずれか一項に記載の宿主細胞、または実施形態 173 に記載の医薬組成物

【0599】

10

20

30

40

50

242. 腎臓がんの処置で使用するための、実施形態1から145のいずれか一項に記載の抗グリコMUC1抗体または抗原結合フラグメント、実施形態146から151のいずれか一項に記載の融合タンパク質、実施形態152または実施形態153に記載のCAR、実施形態154から163のいずれか一項に記載の抗体-薬物コンジュゲート、実施形態164または実施形態165に記載の核酸、実施形態166から168のいずれか一項に記載のベクター、実施形態169から172のいずれか一項に記載の宿主細胞、または実施形態173に記載の医薬組成物

【0600】

243. 皮膚がんの処置で使用するための、実施形態1から145のいずれか一項に記載の抗グリコMUC1抗体または抗原結合フラグメント、実施形態146から151のいずれか一項に記載の融合タンパク質、実施形態152または実施形態153に記載のCAR、実施形態154から163のいずれか一項に記載の抗体-薬物コンジュゲート、実施形態164または実施形態165に記載の核酸、実施形態166から168のいずれか一項に記載のベクター、実施形態169から172のいずれか一項に記載の宿主細胞、または実施形態173に記載の医薬組成物

【0601】

244. 白血病の処置で使用するための、実施形態1から145のいずれか一項に記載の抗グリコMUC1抗体または抗原結合フラグメント、実施形態146から151のいずれか一項に記載の融合タンパク質、実施形態152または実施形態153に記載のCAR、実施形態154から163のいずれか一項に記載の抗体-薬物コンジュゲート、実施形態164または実施形態165に記載の核酸、実施形態166から168のいずれか一項に記載のベクター、実施形態169から172のいずれか一項に記載の宿主細胞、または実施形態173に記載の医薬組成物

【0602】

245. 甲状腺がんの処置で使用するための、実施形態1から145のいずれか一項に記載の抗グリコMUC1抗体または抗原結合フラグメント、実施形態146から151のいずれか一項に記載の融合タンパク質、実施形態152または実施形態153に記載のCAR、実施形態154から163のいずれか一項に記載の抗体-薬物コンジュゲート、実施形態164または実施形態165に記載の核酸、実施形態166から168のいずれか一項に記載のベクター、実施形態169から172のいずれか一項に記載の宿主細胞、または実施形態173に記載の医薬組成物

【0603】

246. 肝臓がんの処置で使用するための、実施形態1から145のいずれか一項に記載の抗グリコMUC1抗体または抗原結合フラグメント、実施形態146から151のいずれか一項に記載の融合タンパク質、実施形態152または実施形態153に記載のCAR、実施形態154から163のいずれか一項に記載の抗体-薬物コンジュゲート、実施形態164または実施形態165に記載の核酸、実施形態166から168のいずれか一項に記載のベクター、実施形態169から172のいずれか一項に記載の宿主細胞、または実施形態173に記載の医薬組成物

【0604】

247. がんの処置のための医薬を製造するための、実施形態1から145のいずれか一項に記載の抗グリコMUC1抗体または抗原結合フラグメント、実施形態146から151のいずれか一項に記載の融合タンパク質、実施形態152または実施形態153に記載のCAR、実施形態154から163のいずれか一項に記載の抗体-薬物コンジュゲート、実施形態164または実施形態165に記載の核酸、実施形態166から168のいずれか一項に記載のベクター、実施形態169から172のいずれか一項に記載の宿主細胞、または実施形態173に記載の医薬組成物の使用であって、任意選択で、がんは、乳がん、肺がん、前立腺がん、膵臓がん、食道がん、結腸直腸がん、卵巣がん、子宮がん、子宮頸がん、膀胱がん、脳腫瘍、非ホジキンリンパ腫、子宮頸がん、胃がん、胆管細胞癌、軟骨肉腫、腎臓がん、皮膚がん、白血病、甲状腺がん、または肝臓がんである、使用

10

20

30

40

50

【0605】

248. がんが、乳がんである、実施形態247に記載の使用

【0606】

249. がんが、肺がんである、実施形態247に記載の使用

【0607】

250. がんが、前立腺がんである、実施形態247に記載の使用

【0608】

251. がんが、膵臓がんである、実施形態247に記載の使用

【0609】

252. がんが、食道がんである、実施形態247に記載の使用

10

【0610】

253. がんが、結腸直腸がんである、実施形態247に記載の使用

【0611】

254. がんが、卵巣がんである、実施形態247に記載の使用

【0612】

255. がんが、子宮がんである、実施形態247に記載の使用

【0613】

256. がんが、子宮頸がんである、実施形態247に記載の使用

【0614】

257. がんが、膀胱がんである、実施形態247に記載の使用

20

【0615】

258. がんが、脳腫瘍である、実施形態247に記載の使用

【0616】

259. がんが、非ホジキンリンパ腫である、実施形態247に記載の使用

【0617】

260. がんが、子宮頸がんである、実施形態247に記載の使用

【0618】

261. がんが、胃がんである、実施形態247に記載の使用

【0619】

262. 前記がんが、胆管細胞癌である、実施形態247に記載の使用

30

【0620】

263. 前記がんが、軟骨肉腫である、実施形態247に記載の使用

【0621】

264. 前記がんが、腎臓がんである、実施形態247に記載の使用

【0622】

265. 前記がんが、皮膚がんである、実施形態247に記載の使用

【0623】

266. 前記がんが、白血病である、実施形態247に記載の使用

【0624】

267. 前記がんが、甲状腺がんである、実施形態247に記載の使用

40

【0625】

268. 前記がんが、肝臓がんである、実施形態247に記載の使用。

【0626】

本出願で引用された全ての公報、特許、特許出願および他の文書は、それぞれ個々の公報、特許、特許出願または他の文書があらゆる目的のために参照により組み入れられることが個々に示されたのと同程度に、あらゆる目的のために参照によりそれらの全体が本明細書に組み入れられる。本明細書に組み入れられる参考文献の1つまたは複数の教示と本発明の開示との間に不一致がある事象では、本明細書の教示が意図される。

本発明は次の実施態様を含む。

【1】

50

太字と下線の文字で示されるセリンおよびスレオニン残基において G a l N A c でグリコシル化された M U C 1 ペプチド R P A P G S T A P P A H G V T (配列番号 99) への結合に関して、(i) 配列番号 1 の重鎖可変 (VH) 配列および配列番号 2 の軽鎖可変 (VL) 配列、または (i i) 配列番号 23 の重鎖可変 (VH) 配列および配列番号 24 の軽鎖可変 (VL) 配列を含む抗体または抗原結合フラグメントと競合する抗グリコ M U C 1 抗体または抗原結合フラグメント。

[2]

乳がん細胞株 M C F 7 または T 4 7 D への結合に関して、(i) 配列番号 1 の重鎖可変 (VH) 配列および配列番号 2 の軽鎖可変 (VL) 配列、または (i i) 配列番号 23 の重鎖可変 (VH) 配列および配列番号 24 の軽鎖可変 (VL) 配列を含む抗体または抗原結合フラグメントと競合する抗グリコ M U C 1 抗体または抗原結合フラグメント。

10

[3]

配列番号 93 のアミノ酸配列を含む相補性決定領域 (CDR) H1、配列番号 94 のアミノ酸配列を含む CDR-H2、配列番号 95 のアミノ酸配列を含む CDR-H3、配列番号 96 のアミノ酸配列を含む CDR-L1、配列番号 97 のアミノ酸配列を含む CDR-L2、および配列番号 98 のアミノ酸配列を含む CDR-L3 を含む抗グリコ M U C 1 抗体または抗原結合フラグメント。

[4]

CDR-H1 が、配列番号 3、配列番号 9、配列番号 15、配列番号 25、配列番号 31、配列番号 37、配列番号 45、配列番号 51、配列番号 57、配列番号 63、配列番号 69、配列番号 75、配列番号 81、または配列番号 87 のアミノ酸配列を含む、上記 [3] に記載の抗グリコ M U C 1 抗体または抗原結合フラグメント。

20

[5]

CDR-H2 が、配列番号 4、配列番号 10、配列番号 16、配列番号 26、配列番号 32、配列番号 38、配列番号 46、または配列番号 52 のアミノ酸配列を含む、上記 [3] に記載の抗グリコ M U C 1 抗体または抗原結合フラグメント。

[6]

CDR-H3 が、配列番号 5、配列番号 11、配列番号 27、配列番号 33、または配列番号 47 のアミノ酸配列を含む、上記 [3] に記載の抗グリコ M U C 1 抗体または抗原結合フラグメント。

30

[7]

CDR-L1 が、配列番号 6、配列番号 12、配列番号 18、配列番号 28、配列番号 34、配列番号 40、配列番号 54、または配列番号 60 のアミノ酸配列を含む、上記 [3] に記載の抗グリコ M U C 1 抗体または抗原結合フラグメント。

[8]

CDR-L2 が、配列番号 13 のアミノ酸配列を含む、上記 [3] に記載の抗グリコ M U C 1 抗体または抗原結合フラグメント。

[9]

CDR-L3 が、配列番号 8 のアミノ酸配列を含む、上記 [3] に記載の抗グリコ M U C 1 抗体または抗原結合フラグメント。

40

[10]

(a) 配列番号 3 ~ 5 の相補性決定領域 (CDR) を含む VH および配列番号 6 ~ 8 の CDR を含む VL ;

(b) 配列番号 9 ~ 11 の相補性決定領域 (CDR) を含む VH および配列番号 12 ~ 14 の CDR を含む VL ;

(c) 配列番号 15 ~ 17 の相補性決定領域 (CDR) を含む VH および配列番号 18 ~ 20 の CDR を含む VL ;

(d) 配列番号 25 ~ 27 の相補性決定領域 (CDR) を含む VH および配列番号 28 ~ 30 の CDR を含む VL ;

(e) 配列番号 31 ~ 33 の相補性決定領域 (CDR) を含む VH および配列番号 34

50

～36のCDRを含むVL；

（f）配列番号37～39の相補性決定領域（CDR）を含むVHおよび配列番号40～42のCDRを含むVL；

（g）配列番号45～47の相補性決定領域（CDR）を含むVHおよび配列番号48～50のCDRを含むVL；

（h）配列番号51～53の相補性決定領域（CDR）を含むVHおよび配列番号54～56のCDRを含むVL；

（i）配列番号57～59の相補性決定領域（CDR）を含むVHおよび配列番号60～62のCDRを含むVL；

（j）配列番号63～65の相補性決定領域（CDR）を含むVHおよび配列番号66～68のCDRを含むVL；

（k）配列番号69～71の相補性決定領域（CDR）を含むVHおよび配列番号72～74のCDRを含むVL；

（l）配列番号75～77の相補性決定領域（CDR）を含むVHおよび配列番号78～80のCDRを含むVL；

（m）配列番号81～83の相補性決定領域（CDR）を含むVHおよび配列番号84～86のCDRを含むVL；または

（n）配列番号87～89の相補性決定領域（CDR）を含むVHおよび配列番号90～92のCDRを含むVL

を有する、上記「3」に記載の抗グリコムUC1抗体または抗原結合フラグメント。

「11」

（a）配列番号1と少なくとも95%の配列同一性を有するアミノ酸配列を含むVHおよび配列番号2と少なくとも95%の配列同一性を有するアミノ酸配列を含むVL；

（b）配列番号1と少なくとも97%の配列同一性を有するアミノ酸配列を含むVHおよび配列番号2と少なくとも97%の配列同一性を有するアミノ酸配列を含むVL；

（c）配列番号1と少なくとも99%の配列同一性を有するアミノ酸配列を含むVHおよび配列番号2と少なくとも99%の配列同一性を有するアミノ酸配列を含むVLを有する、上記「3」に記載の抗グリコムUC1抗体または抗原結合フラグメント。

「12」

配列番号1のアミノ酸配列を含むVHおよび配列番号2のアミノ酸配列を含むVLを有する、上記「3」に記載の抗グリコムUC1抗体または抗原結合フラグメント。

「13」

（a）配列番号23と少なくとも95%の配列同一性を有するアミノ酸配列を含むVHおよび配列番号24と少なくとも95%の配列同一性を有するアミノ酸配列を含むVL；

（b）配列番号23と少なくとも97%の配列同一性を有するアミノ酸配列を含むVHおよび配列番号24と少なくとも97%の配列同一性を有するアミノ酸配列を含むVL；

または

（c）配列番号23と少なくとも99%の配列同一性を有するアミノ酸配列を含むVHおよび配列番号24と少なくとも99%の配列同一性を有するアミノ酸配列を含むVLを有する、上記「3」に記載の抗グリコムUC1抗体または抗原結合フラグメント。

「14」

配列番号23のアミノ酸配列を含むVHおよび配列番号24のアミノ酸配列を含むVLを有する、上記「3」に記載の抗グリコムUC1抗体または抗原結合フラグメント。

「15」

ELISAによって測定した場合、ペプチドTAPPAHGVTSAPDTRPAPGATAPPAHGV（配列番号113）に結合するより高い親和性で、ペプチドRPAPGSTAPPAHGV（配列番号99）に結合する抗グリコムUC1抗体または抗原結合フラグメントであって、前記ペプチドにおいて、太字と下線の文字で示されるセリンおよびスレオニン残基は、GaLNAcでグリコシル化された残基を示す、上記「1」に記載の抗グリコムUC1抗体または抗原結合フラグメント。

10

20

30

40

50

[1 6]

E L I S Aによって測定した場合、ペプチドT A P P A H G V T S A P D T R P A P G S A A P P A H G V（配列番号114）に結合するより高い親和性で、ペプチドR P A P G S T A P P A H G V T（配列番号99）に結合する抗グリコM U C 1抗体または抗原結合フラグメントであって、前記ペプチドにおいて、太字と下線の文字で示されるセリンおよびスレオニン残基は、G a l N A cでグリコシル化された残基を示す、上記「15」に記載の抗グリコM U C 1抗体または抗原結合フラグメント。

[1 7]

E L I S Aによって測定した場合、ペプチドT A P P A H G V T S A P D T R P A P G S T G P P A H G V（配列番号115）に結合するより高い親和性で、ペプチドR P A P G S T A P P A H G V T（配列番号99）に結合する抗グリコM U C 1抗体または抗原結合フラグメントであって、前記ペプチドにおいて、太字と下線の文字で示されるセリンおよびスレオニン残基は、G a l N A cでグリコシル化された残基を示す、上記「16」に記載の抗グリコM U C 1抗体または抗原結合フラグメント。

10

[1 8]

E L I S Aによって測定した場合、ペプチドT A P P A H G V T S A P D T R P A P G S T A A P A H G V（配列番号116）に結合するより高い親和性で、ペプチドR P A P G S T A P P A H G V T（配列番号99）に結合する抗グリコM U C 1抗体または抗原結合フラグメントであって、前記ペプチドにおいて、太字と下線の文字で示されるセリンおよびスレオニン残基は、G a l N A cでグリコシル化された残基を示す、上記「17」に記載の抗グリコM U C 1抗体または抗原結合フラグメント。

20

[1 9]

E L I S Aによって測定した場合、ペプチドT A P P A H G V T S A P D T R P A P G S T A P A A H G V（配列番号117）に結合するより高い親和性で、ペプチドR P A P G S T A P P A H G V T（配列番号99）に結合する抗グリコM U C 1抗体または抗原結合フラグメントであって、前記ペプチドにおいて、太字と下線の文字で示されるセリンおよびスレオニン残基は、G a l N A cでグリコシル化された残基を示す、上記「18」に記載の抗グリコM U C 1抗体または抗原結合フラグメント。

[2 0]

E L I S Aによって測定した場合、ペプチドT A P P A H G V T S A P D T R P A P A S T A P P A H G V（配列番号112）に結合するより高い親和性で、ペプチドR P A P G S T A P P A H G V T（配列番号99）に結合する抗グリコM U C 1抗体または抗原結合フラグメントであって、前記ペプチドにおいて、太字と下線の文字で示されるセリンおよびスレオニン残基は、G a l N A cでグリコシル化された残基を示す、上記「15」に記載の抗グリコM U C 1抗体または抗原結合フラグメント。

30

[2 1]

E L I S Aによって測定した場合、ペプチドT A P P A H G V T S A P D T R P A A G S T A P P A H G V（配列番号111）に結合するより高い親和性で、ペプチドR P A P G S T A P P A H G V T（配列番号99）に結合する抗グリコM U C 1抗体または抗原結合フラグメントであって、前記ペプチドにおいて、太字と下線の文字で示されるセリンおよびスレオニン残基は、G a l N A cでグリコシル化された残基を示す、上記「20」に記載の抗グリコM U C 1抗体または抗原結合フラグメント。

40

[2 2]

E L I S Aによって測定した場合、ペプチドT A P P A H G V T S A P D T R P G P G S T A P P A H G V（配列番号110）に結合するより高い親和性で、ペプチドR P A P G S T A P P A H G V T（配列番号99）に結合する抗グリコM U C 1抗体または抗原結合フラグメントであって、前記ペプチドにおいて、太字と下線の文字で示されるセリンおよびスレオニン残基は、G a l N A cでグリコシル化された残基を示す、上記「21」に記載の抗グリコM U C 1抗体または抗原結合フラグメント。

[2 3]

50

ELISAによって測定した場合、ペプチドTAPPAHGVTSAPDTRAAPGSTAPPAHGV（配列番号109）に結合するより高い親和性で、ペプチドRPAPGSTAPPAHGV（配列番号99）に結合する抗グリコMUC1抗体または抗原結合フラグメントであって、前記ペプチドにおいて、太字と下線の文字で示されるセリンおよびスレオニン残基は、GalNAcでグリコシル化された残基を示す、上記「22」に記載の抗グリコMUC1抗体または抗原結合フラグメント。

「24」

ELISAによって測定した場合、ペプチドTAPPAHGVTSAPDTAPAPGSTAPPAHGV（配列番号108）に結合するより高い親和性で、ペプチドRPAPGSTAPPAHGV（配列番号99）に結合する抗グリコMUC1抗体または抗原結合フラグメントであって、前記ペプチドにおいて、太字と下線の文字で示されるセリンおよびスレオニン残基は、GalNAcでグリコシル化された残基を示す、上記「23」に記載の抗グリコMUC1抗体または抗原結合フラグメント。

「25」

太字と下線の文字で示されるセリンおよびスレオニン残基においてGalNAcでグリコシル化されたMUC1ペプチドRPAPGSTAPPAHGV（配列番号99）への結合に関して、（i）配列番号1の重鎖可変（VH）配列および配列番号2の軽鎖可変（VL）配列、または（ii）配列番号23の重鎖可変（VH）配列および配列番号24の軽鎖可変（VL）配列を含む参照抗体または抗原結合フラグメントと競合する抗グリコMUC1抗体または抗原結合フラグメントであって、前記抗グリコMUC1抗体または抗原結合フラグメントは、

（a）VH配列内に第1、第2および第3のCDR手段を有するVH配列；および

（b）VL配列内に第4、第5および第6のCDR手段を有するVL配列

を含み、

前記第1、第2、第3、第4、第5、および第6のCDR手段は、協同して、前記抗グリコMUC1抗体または抗原結合フラグメントの前記MUC1ペプチドへの結合を生じさせるものであり、前記結合は、前記参照抗体または抗原結合フラグメントと競合する、抗グリコMUC1抗体または抗原結合フラグメント。

「26」

正常細胞と比較してがん細胞で過剰発現されるグリコMUC1エпитープに優先的に結合する、上記「1」に記載の抗グリコMUC1抗体または抗原結合フラグメント。

「27」

（a）表面プラズモン共鳴によって測定した場合、1 nMから50 nM；

（b）表面プラズモン共鳴によって測定した場合、3 nMから50 nM；

（c）表面プラズモン共鳴によって測定した場合、3 nMから40 nM；

（d）表面プラズモン共鳴によって測定した場合、3 nMから25 nM；

（e）表面プラズモン共鳴によって測定した場合、5 nMから50 nM；

（f）表面プラズモン共鳴によって測定した場合、5 nMから25 nM；

（g）表面プラズモン共鳴によって測定した場合、10 nMから50 nM；

（h）表面プラズモン共鳴によって測定した場合、10 nMから25 nM；

（i）表面プラズモン共鳴によって測定した場合、15 nMから50 nM；

（j）表面プラズモン共鳴によって測定した場合、15 nMから25 nM；

（k）表面プラズモン共鳴によって測定した場合、20 nMから50 nM；または

（l）表面プラズモン共鳴によって測定した場合、25 nMから50 nM

の結合親和性（ K_D ）で、太字と下線の文字で示されるセリンおよびスレオニン残基においてGalNAcでグリコシル化された前記MUC1ペプチドRPAPGSTAPPAHGV（配列番号99）に結合する、上記「1」に記載の抗グリコMUC1抗体または抗原結合フラグメント。

「28」

多価である、上記「1」に記載の抗グリコMUC1抗体または抗原結合フラグメント。

- [2 9]
単鎖可変フラグメント (s c F v) の形態である、上記 [1] に記載の抗グリコ M U C 1 抗体または抗原結合フラグメント。
- [3 0]
多重特異性抗体の形態である、上記 [1] に記載の抗グリコ M U C 1 抗体または抗原結合フラグメント。
- [3 1]
前記多重特異性抗体が、第 1 のエピトープと異なる第 2 のエピトープに結合する二重特異性抗体である、上記 [3 0] に記載の抗グリコ M U C 1 抗体または抗原結合フラグメント。
- [3 2]
前記二重特異性抗体が、C r o s s M a b、F a b - アーム交換抗体、二重特異性 T 細胞エンゲージャー (B i T E)、または二重親和性リターゲティング分子 (D A R T) である、上記 [3 1] に記載の抗グリコ M U C 1 抗体または抗原結合フラグメント。
- [3 3]
前記第 2 のエピトープが、M U C 1 エピトープである、上記 [3 1] に記載の抗グリコ M U C 1 抗体または抗原結合フラグメント。
- [3 4]
前記第 2 のエピトープが、正常細胞と比較してがん細胞で過剰発現される M U C 1 エピトープである、上記 [3 3] に記載の抗グリコ M U C 1 抗体または抗原結合フラグメント。
- [3 5]
前記第 2 のエピトープが、T 細胞エピトープである、上記 [3 1] に記載の抗グリコ M U C 1 抗体または抗原結合フラグメント。
- [3 6]
前記 T 細胞エピトープが、C D 3 エピトープ、C D 8 エピトープ、C D 1 6 エピトープ、C D 2 5 エピトープ、C D 2 8 エピトープ、または N K G 2 D エピトープを含む、上記 [3 5] に記載の抗グリコ M U C 1 抗体または抗原結合フラグメント。
- [3 7]
少なくとも第 2 のアミノ酸配列に作動可能に連結した、上記 [1] から [3 6] のいずれかに記載の抗グリコ M U C 1 抗体または抗原結合フラグメントのアミノ酸配列を含む融合タンパク質。
- [3 8]
上記 [2 9] に記載の s c F v を含むキメラ抗原受容体 (C A R) 。
- [3 9]
細胞傷害性物質にコンジュゲートした、上記 [1] から [3 6] のいずれかに記載の抗グリコ M U C 1 抗体または抗原結合フラグメントを含む抗体-薬物コンジュゲート。
- [4 0]
上記 [1] から [3 6] のいずれかに記載の抗グリコ M U C 1 抗体または抗原結合フラグメントのコード領域を含む核酸。
- [4 1]
上記 [4 0] に記載の核酸を含むベクター。
- [4 2]
上記 [4 0] に記載の核酸を発現するように操作された宿主細胞。
- [4 3]
上記 [4 1] に記載のベクターを含む宿主細胞。
- [4 4]
(a) 上記 [1] から [3 6] のいずれかに記載の抗グリコ M U C 1 抗体または抗原結合フラグメント、および (b) 生理学的に好適な緩衝液、アジュバントまたは希釈剤を含む医薬組成物。
- [4 5]

10

20

30

40

50

がんを処置する方法であって、それを必要とする対象に、有効量の上記〔１〕から〔３６〕のいずれかに記載の抗グリコＭＵＣ１抗体または抗原結合フラグメントを投与することを含む方法。

〔４６〕

前記対象が、乳がん、肺がん、前立腺がん、膵臓がん、食道がん、結腸直腸がん、卵巣がん、子宮がん、子宮頸がん、膀胱がん、脳腫瘍、非ホジキンリンパ腫、子宮頸がん、胃がん、胆管細胞癌、軟骨肉腫、腎臓がん、皮膚がん、白血病、甲状腺がん、または肝臓がん罹患している、上記〔４５〕に記載の方法。

〔４７〕

生物学的サンプルにおいてがんを検出する方法であって、サンプルを、上記〔１〕から〔３６〕のいずれかに記載の抗グリコＭＵＣ１抗体または抗原結合フラグメントと接触させること、および前記抗グリコＭＵＣ１抗体または抗原結合フラグメントの結合を検出することを含む方法。

〔４８〕

前記がんが、乳がん、肺がん、前立腺がん、膵臓がん、食道がん、結腸直腸がん、卵巣がん、子宮がん、子宮頸がん、膀胱がん、脳腫瘍、非ホジキンリンパ腫、子宮頸がん、胃がん、胆管細胞癌、軟骨肉腫、腎臓がん、皮膚がん、白血病、甲状腺がん、または肝臓がんである、上記〔４７〕に記載の方法。

【図面】

【図１－１】




図 1A

【図１－２】




図 1C




図 1B




図 1D

10

20

30

40

50

【図 1 - 3】




図 1E




図 1F

【図 2 - 1】




図 2A

【図 2 - 2】




図 2B

【図 3】




図 3

10

20

30

40

50

【図 4】




図 4

【図 5】




図 5

【図 6】




図 6

【図 7】




図 7

10


20

30

40

50

【図 8】



【図 9】




図 8

図 9

【図 10】




図 10

【図 11】




図 11

10

20

30

40

50

【図 12】




図 12

【配列表】

0007541930000001.app

10

20

30

40

50

フロントページの続き

(51)国際特許分類

C 1 2 N 1/21 (2006.01)
C 1 2 N 5/10 (2006.01)
C 0 7 K 19/00 (2006.01)
A 6 1 K 39/395 (2006.01)
A 6 1 K 47/68 (2017.01)
A 6 1 P 35/00 (2006.01)
G 0 1 N 33/574 (2006.01)
G 0 1 N 33/531 (2006.01)

F I

C 1 2 N 1/21
C 1 2 N 5/10
C 0 7 K 19/00
A 6 1 K 39/395 N
A 6 1 K 39/395 L
A 6 1 K 47/68
A 6 1 P 35/00
G 0 1 N 33/574 B
G 0 1 N 33/531 A

(33)優先権主張国・地域又は機関

米国(US)

弁理士 鈴木 康仁

(72)発明者 ワンダル, ハンス

デンマーク国 2 9 2 0 シャーロテンルン, エスペランス アレ 1 8

(72)発明者 ホワイト, セイヤー

アメリカ合衆国 マサチューセッツ州 0 1 9 2 0, ボックスフォード, トップスフィールド ロード 6 3 ビー

審査官 大西 隆史

(56)参考文献 特表 2 0 1 0 - 5 0 5 7 7 5 (J P, A)

SONG, Wei et al., International Journal of Oncology, 2012年09月27日, Vol. 41, Issue 6, pp.1977-1984, DOI: 10.3892/ijo.2012.1645

QU, Jin et al., International Journal of Oncology, 2015年12月18日, Vol. 48, No. 2, pp. 587-594, DOI: 10.3892/ijo.2015.3302

TARP, Mads A. et al., Glycobiology, 2006年10月18日, Vol. 17, Issue 2, pp. 197-209, DOI: 10.1093/glycob/cwl061

ZHOU, Dapeng et al., Molecules, 2018年05月31日, Vol. 23, No. 6, pp. 1-27, DOI: 10.3390/molecules23061326

(58)調査した分野 (Int.Cl., D B名)

C 1 2 N 1 5 / 0 0 - 1 5 / 9 0

C 0 7 K 1 / 0 0 - 1 9 / 0 0

C 1 2 N 1 / 0 0 - 7 / 0 8

A 6 1 K 3 8 / 0 0 - 5 1 / 1 2

A 6 1 P 1 / 0 0 - 4 3 / 0 0

G 0 1 N 3 3 / 4 8 - 3 3 / 9 8

J S T P l u s / J M E D P l u s / J S T 7 5 8 0 (J D r e a m I I I)

C A p l u s / R E G I S T R Y / M E D L I N E / E M B A S E / B I O S I S (S T N)

P u b M e d