

(12) 特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局

(43) 国際公開日
2015年10月1日(01.10.2015)



(10) 国際公開番号
WO 2015/146537 A1

- (51) 国際特許分類:
G01N 33/15 (2006.01) *G01N 33/50* (2006.01)
C12Q 1/02 (2006.01) *G01N 33/68* (2006.01)
C12Q 1/68 (2006.01)
- (21) 国際出願番号: PCT/JP2015/056603
- (22) 国際出願日: 2015年3月6日(06.03.2015)
- (25) 国際出願の言語: 日本語
- (26) 国際公開の言語: 日本語
- (30) 優先権データ:
特願 2014-060341 2014年3月24日(24.03.2014) JP
特願 2015-040187 2015年3月2日(02.03.2015) JP
- (71) 出願人: 花王株式会社 (KAO CORPORATION)
[JP/JP]; 〒1038210 東京都中央区日本橋茅場町一丁目1番10号 Tokyo (JP).
- (72) 発明者: 古賀 義隆(KOGA, Yoshitaka); 〒3213497 栃木県芳賀郡市貝町赤羽2606 花王株式会社研究所内 Tochigi (JP). 大崎 紀子(OSAKI, Noriko); 〒1318501 東京都墨田区文花2丁目1番3号 花王株式会社研究所内 Tokyo (JP). 渡邊 学(WATANABE, Manabu); 〒3213497 栃木県芳賀

郡市貝町赤羽2606 花王株式会社研究所内 Tochigi (JP).

- (74) 代理人: 特許業務法人アルガ特許事務所 (THE PATENT CORPORATE BODY ARUGA PATENT OFFICE); 〒1030013 東京都中央区日本橋人形町1丁目3番8号 沢の鶴人形町ビル Tokyo (JP).
- (81) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BN, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IR, IS, KE, KG, KN, KP, KR, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LU, LY, MA, MD, ME, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH, PL, PT, QA, RO, RS, RU, RW, SA, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, ZA, ZM, ZW.
- (84) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SD, SL, ST, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC,

[続葉有]

(54) Title: METHOD FOR EVALUATING OR SELECTING GIP RISE INHIBITOR

(54) 発明の名称: G I P 上昇抑制剤の評価又は選択方法




FIG. 2:
AA TG level in blood
BB Change in Δ TG in blood
CC Control
DD Inhibitor
EE Time elapsed (min)
FF GIP level in blood
GG Change in Δ GIP in blood

(57) Abstract: A method for evaluating or selecting a GIP rise inhibitor, which comprises steps (A) to (D): (A) a step of bringing each of substances to be tested into contact with a tissue or cell derived from a mammal in which FABP4 gene or FABP5 gene or FABP4 protein or FABP5 protein can be expressed; (B) a step of measuring the expression amount of FABP4 gene or FABP5 gene, the expression amount of FABP4 protein or FABP5 protein or the activity of FABP4 protein or FABP5 protein in the tissue or cell derived from the mammal; (C) a step of comparing the expression amount or the activity measured in the above-mentioned step (B) with the expression amount of FABP4 gene or FABP5 gene, the expression amount of FABP4 protein or FABP5 protein or the activity of FABP4 protein or FABP5 protein in a control group; and (D) a step of evaluating or selecting a substance which can reduce the expression amount of FABP4 gene or FABP5 gene, the expression amount of FABP4 protein or FABP5 protein or the activity of FABP4 protein or FABP5 protein as a GIP rise inhibitor on the basis of the results obtained in the above-mentioned step (C).

(57) 要約: 以下の工程 (A) ~ (D) を含む、G I P 上昇抑制剤の評価又は選択方法: (A) F A B P 4 遺伝子若しくは F A B P 5 遺伝子、又は F A B P 4 蛋白質若しくは F A B P 5 蛋白質を発現可能な哺乳動物由来の組織又は細胞に、被験物質を接触させる工程、(B) 該哺乳動物由来の組織又は細胞における F A B P 4 遺伝子若しくは F A B P 5 遺伝子の発現量、F A B P 4 蛋白質若しくは F A B P 5 蛋白質の発現量、又は F A B P 4 蛋白質若しくは F A B P 5 蛋白質の活性を測定する工程、(C) 上記 (B) で測定した発現量又は活性を、対照群における F A B P 4 遺伝子若しくは F A B P 5 遺伝子の発現量、F A B P 4 蛋白質若しくは F A B P 5 蛋白質の発現量、又は F A B P 4 蛋白質若しくは F A B P 5 蛋白質の活性を減少させる被験物質を、G I P 上昇抑制剤として評価又は選択する工程。

質の活性と比較する工程、(D) 上記 (C) の結果に基づいて、F A B P 4 遺伝子若しくは F A B P 5 遺伝子の発現量、F A B P 4 蛋白質若しくは F A B P 5 蛋白質の発現量、又は F A B P 4 蛋白質若しくは F A B P 5 蛋白質の活性を減少させる被験物質を、G I P 上昇抑制剤として評価又は選択する工程。



MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, 添付公開書類:
TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, — 国際調査報告 (条約第 21 条(3))
KM, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

明 細 書

発明の名称： G I P 上昇抑制剤の評価又は選択方法

技術分野

[0001] 本発明は、G I P 上昇抑制剤の評価又は選択方法に関する。

背景技術

[0002] G I P (g l u c o s e - d e p e n d e n t i n s u l i n o t r o p i c p o l y p e p t i d e) は、脂質や糖質、アミノ酸を摂取することで、消化管上皮の分泌細胞（K細胞）より分泌されるインクレチンである。G I P は、グルコース依存的に膵臓β細胞からインスリン分泌を促進し、血糖値の調節に寄与する。近年、人為的に血中G I P 濃度を高くしたマウスは、高脂肪食摂取下において脂質燃焼が抑制されることが報告されている。また、G I P 受容体欠損マウスは高脂肪食負荷による内臓脂肪や皮下脂肪の蓄積が抑制されることが明らかになっている。これらの知見から、食後のG I P 調節が肥満予防や改善に有効であると考えられる。さらにG I P は、胃酸分泌抑制作用や胃運動抑制作用を有することが知られていることから、G I P の上昇抑制は、食後の消化促進や胃もたれの改善に有効であると考えられる。したがって、G I P の上昇を抑制する物質の開発が望まれており、そのために、物質のG I P の上昇抑制能を高感度で迅速に評価することができる方法の開発が求められている。

[0003] 従来のG I P 上昇抑制剤の評価又は選択方法としては、細胞におけるC P T 1 遺伝子やC P T 1 蛋白質の発現、又はC P T 1 蛋白質の活性を指標とする方法（特許文献1）、F A T / C D 3 6 遺伝子又はF A T / C D 3 6 蛋白質の発現を指標とする方法（特許文献2）などが知られている。

[0004] F A B P s (f a t t y a c i d - b i n d i n g p r o t e i n s) は、細胞内の脂肪酸結合蛋白質ファミリーであり、脂肪酸に高い結合性を有する14～15kDaのタンパク質である（非特許文献1、2）。脂肪酸はエネルギー源、代謝制御のシグナル分子など細胞内で多岐にわたる機能を

有する。FABPsは、不溶性の脂肪酸に結合して細胞内の様々な器官への輸送を可能にすることにより、脂肪酸の機能発現に重要な役割を果たしている。

[0005] FABPsのアイソフォームであるFABP4とFABP5は、アミノ酸配列と立体構造の相同性が高く脂肪細胞とマクロファージに共発現している（非特許文献2～4）。FABP4とFABP5に関してノックアウトマウスを用いた機能解析が行われている（非特許文献2～15）。FABP4は、脂肪細胞の細胞質タンパク質の1～3%を占めており、脂肪細胞の分化マーカーとして広く利用されている（非特許文献5）。FABP4については、脂肪細胞においては分子シャペロンとしての機能以外に、脂質によるシグナル伝達や細胞小器官の応答にも関わっていること、またマクロファージにおいては炎症反応に関わっていることが報告されている（非特許文献2、6、9）。FABP5については、ケラチノサイトにおける乾癬の病変形成への関与が示唆され（非特許文献7）、また膵臓において自然免疫応答キ因子であるサイトカイン（IL-12p70）の制御に関与することが報告されている（非特許文献8）。

[0006] 2型糖尿病モデルであるob/obマウスにおいてFABP4をノックアウトしたマウスはインスリン感受性低下の抑制が認められた（非特許文献11）。また、FABP4ノックアウトマウスに高脂肪食を与えると野生型と比較してインスリン感受性の低下は抑制されるが、体重増加や脂肪肝には影響が認められなかった（非特許文献4、10）。FABP4ノックアウトマウスの脂肪細胞ではFABP5の発現が上昇していることから、FABP5が代償的に働いていると考えられている（非特許文献16、17）。FABP5ノックアウトマウスでもFABP4ノックアウトマウスと同様の傾向が認められている（非特許文献12）。シングルノックアウトマウスでの結果を受けて、FABP4/5ダブルノックアウトでの解析が行われ、高脂肪食を与えた際に野生型と比較して、食事誘導性肥満、インスリン抵抗性、2型糖尿病、脂肪肝の惹起が抑制されたことが報告されている（非特許文献13）。

、14、15）。

[0007] F A B Pの阻害剤であるBMS309403を2型糖尿病又は動脈硬化のモデルマウスに経口投与すると、病態の改善が認められた（非特許文献18）。食事誘導性肥満のマウスに対するF A B P 4／5阻害剤の投与は、血中のトリグリセリド値、遊離脂肪酸値の低減等、脂質異常症の改善をもたらした（非特許文献19）。

[0008] しかしながら、腸で主に発現しているF A B Pは、F A B P 2であり、そのため、腸における脂質代謝の役割はF A B P 2が果たしていると従来考えられていた。

特許文献1：特開2011-080804号公報

特許文献2：特開2011-080803号公報

非特許文献1：Hum. Genomics, 2011, 5:170-191

非特許文献2：Nat. Rev. Drug Discov., 2008, 7: 489-503

非特許文献3：Proc. Natl. Acad. Sci. U. S. A, 1986, 83:3786-3790

非特許文献4：Nat. Med., 2001, 7:699-705

非特許文献5：Biochim. Biophys. Acta., 1999, 1441:106-116.

非特許文献6：J. Biol. Chem., 2007, 282:32424-32432.

非特許文献7：J. Invest. Dermatol., 2011, 131:604-612

非特許文献8：Biochem. Biophys. Res. Commun., 2006, 345:459-466

非特許文献9：J. Biol. Chem., 2005, 280:12888-12895

非特許文献10：Science, 1996, 274:1377-1379

非特許文献11: *Endocrinology*, 2000, 141: 3388-3396

非特許文献12: *Diabetes*, 2003, 52: 300-307

非特許文献13: *Cell Metab.*, 2005, 1: 107-119

非特許文献14: *Diabetes*, 2006, 55: 1915-1922

非特許文献15: *Circulation*, 2004, 110: 1492-1498

非特許文献16: *Diabetes*, 2000, 49: 904-911

非特許文献17: *Am. J. Physiol. Endocrinol. Metab.*, 2006, 290: E814-E823

非特許文献18: *Nature*, 2007, 447: 959-965

非特許文献19: *J. Lipid Res.*, 2011, 52: 646-656

発明の概要

[0009] 本発明は、以下の工程（A）～（D）：

（A）FABP4遺伝子若しくはFABP5遺伝子、又はFABP4蛋白質若しくはFABP5蛋白質を発現可能な哺乳動物由来の組織又は細胞に、被験物質を接触させる工程、

（B）該哺乳動物由来の組織又は細胞におけるFABP4遺伝子若しくはFABP5遺伝子の発現量、FABP4蛋白質若しくはFABP5蛋白質の発現量、又はFABP4蛋白質若しくはFABP5蛋白質の活性を測定する工程、

（C）上記（B）で測定した発現量又は活性を、対照群におけるFABP4遺伝子若しくはFABP5遺伝子の発現量、FABP4蛋白質若しくはFABP5蛋白質の発現量、又はFABP4蛋白質若しくはFABP5蛋白質の活性と比較する工程、

（D）上記（C）の結果に基づいて、FABP4遺伝子若しくはFABP5遺伝子の発現量、FABP4蛋白質若しくはFABP5蛋白質の発現量、又

はF A B P 4 蛋白質若しくはF A B P 5 蛋白質の活性を減少させる被験物質を、G I P 上昇抑制剤として評価又は選択する工程、を含む、G I P 上昇抑制剤の評価又は選択方法を提供する。

[0010] また本発明は、以下の工程（A'）～（D'）：

（A'）被験物質を非ヒト哺乳動物に投与する工程、

（B'）該非ヒト哺乳動物から採取した小腸におけるF A B P 4 遺伝子若しくはF A B P 5 遺伝子の発現量、F A B P 4 蛋白質若しくはF A B P 5 蛋白質の発現量、又はF A B P 4 蛋白質若しくはF A B P 5 蛋白質の活性を測定する工程、

（C'）上記（B'）で測定した発現量又は活性を、対照群の非ヒト哺乳動物から採取した小腸におけるF A B P 4 遺伝子若しくはF A B P 5 遺伝子の発現量、F A B P 4 蛋白質若しくはF A B P 5 蛋白質の発現量、又はF A B P 4 蛋白質若しくはF A B P 5 蛋白質の活性と比較する工程、

（D'）上記（C'）の結果に基づいて、F A B P 4 遺伝子若しくはF A B P 5 遺伝子の発現量、F A B P 4 蛋白質若しくはF A B P 5 蛋白質の発現量、又はF A B P 4 蛋白質若しくはF A B P 5 蛋白質の活性を減少させる被験物質を、G I P 上昇抑制剤として評価又は選択する工程、を含む、G I P 上昇抑制剤の評価又は選択方法を提供する。

図面の簡単な説明

[0011] [図1]腸細胞におけるF A B P 5 とG I P の共免疫染色。

[図2]脂質乳剤単回投与後のマウスにおける血中T G 及び血中G I P 濃度。A：血中 Δ T G 及び血中 Δ G I P の経時変化、B：血中G I P 濃度のi A U C（0－1 h）及びC m a x。

[図3]小腸初代培養細胞における脂質誘導性G I P 分泌に対するF A B P 4／5 阻害剤の影響。A：B M S 3 0 9 4 0 3 による影響、B：C o m p o u n d 2 による影響。

[図4]実施例4 で用いたF A B P 5 活性測定法の原理。

[図5]G I P 上昇抑制物質によるF A B P 5 阻害活性。

[図6]魚油のG I P上昇抑制作用。A : 血中G I P濃度変化量 (Δ G I P)、
B : 血中G I P濃度のi A U C (0 - 4 h)。* : $P < 0.05$ 。

発明の詳細な説明

[0012] 本発明は、G I P上昇抑制剤の評価又は選択方法に関する。

[0013] 本発明者らは、G I Pを分泌する腸細胞にF A B P 4及びF A B P 5（本明細書において、これらをまとめてF A B P 4 / 5とも称することがある）が発現していること、当該F A B P 4 / 5を阻害することによって血中G I P濃度が低下すること、したがってF A B P 4 / 5を阻害する物質がG I P上昇抑制剤として有用であることを見出した。これらの知見から、本発明者らは、F A B P 4 / 5の発現又は活性の抑制作用を指標として、G I P上昇抑制剤の評価又は選択することが可能であることを見出した。

[0014] 本発明によれば、各種物質のG I P上昇抑制効果をより簡便かつ正確に評価することができ、優れたG I P上昇抑制剤を選択することが可能となる。また、本発明の方法により選択されたG I P上昇抑制剤は、肥満等の発症可能性の低下、予防若しくは改善、体重増加の予防若しくは体重の低下、又は食後の消化促進や胃もたれの改善をするための有効成分として有用である。

[0015] 従来、腸にF A B P sが発現していることは知られており、またマウス腸管組織切片の免疫染色により、F A B P 4が腸腺上皮細胞の細胞膜上に局在していることが知られていた（[www.rndsystems.com/ihc_molecule_images.aspx?m=1416]）。一方で従来、腸で主に発現しているF A B PはF A B P 2であることが知られており、そのため腸における脂質代謝はF A B P 2が担っていると考えられていた。

[0016] しかしながら、本発明者らが腸管組織切片においてG I PとF A B P 5との共免疫染色を行ったところ、G I Pのシグナルが検出される細胞において、F A B P 5の強いシグナルが認められた（図1）。この結果から、F A B P 4 / 5がともに腸上皮細胞に発現している蛋白質であることが明らかになった。また後述の実施例に示すように、F A B P 4 / 5を阻害することによってG I P濃度が低下したことから、F A B P 4 / 5がG I P分泌に関わっ

ていることが判明した。したがって、F A B P 4 / 5 を阻害する物質は G I P 上昇抑制剤として有用であり、かつ F A B P 4 / 5 遺伝子の発現量、又は F A B P 4 / 5 蛋白質の発現量や活性を測定することにより、各種物質の G I P 上昇抑制効果を評価することができ、また G I P 上昇抑制剤を選択することができる。

[0017] したがって、本発明においては、F A B P 4 / 5 阻害作用を指標として、各種物質の G I P 上昇抑制作用を評価し、又当該評価結果に基づいて G I P 上昇抑制剤を選択する。本明細書において「G I P 上昇抑制」とは、脂質及び糖質を含む食事、特に脂質を多く含む食事、そのなかでもトリアシルグリセロールを多く含む食事を摂取することにより、小腸に存在する K 細胞から分泌された G I P の上昇を抑制することをいう。すなわち、本明細書における「G I P 上昇抑制」とは、主として食後に生じる G I P 上昇を抑制することをいう。そして、本明細書における「G I P 上昇抑制作用」は、K 細胞からの G I P 分泌を抑制することで G I P 上昇を抑制する G I P 分泌抑制作用、及び血中 G I P 濃度を低下させることにより G I P 上昇を抑制する G I P 低下作用のいずれをも含む概念である。

[0018] 本明細書において「F A B P 4 / 5 の発現」とは、F A B P 4 遺伝子若しくは F A B P 5 遺伝子の発現、又は F A B P 4 蛋白質若しくは F A B P 5 蛋白質の発現をいう。また本明細書において「F A B P 4 / 5 の活性」とは、F A B P 4 蛋白質若しくは F A B P 5 蛋白質の活性をいう。

[0019] 本発明の G I P 上昇抑制剤の評価又は選択方法は、*in vitro* 又は *ex vivo* で行うことも、*in vivo* で行うこともできる。

[0020] *in vitro* 又は *ex vivo* で行う場合、本発明の G I P 上昇抑制剤の評価又は選択方法は、以下の工程 (A) ~ (D) を含む。

(A) F A B P 4 / 5 を発現可能な哺乳動物由来の組織又は細胞に、被験物質を接触させる工程、

(B) 該哺乳動物由来の組織又は細胞における F A B P 4 / 5 の発現量又は活性を測定する工程、

(C) 上記 (B) で測定した発現量又は活性を、対照群における F A B P 4 / 5 の発現量又は活性と比較する工程、

(D) 上記 (C) の結果に基づいて、F A B P 4 / 5 の発現量又は活性を減少させる被験物質を、G I P 上昇抑制剤として評価又は選択する工程。

[0021] 上記本発明の方法に使用される被験物質は、G I P 上昇抑制剤として使用することを所望する物質であれば、特に制限されない。被験物質は、天然に存在する物質であっても、化学的又は生物学的方法等で人工的に合成した物質であってもよく、また化合物であっても、組成物若しくは混合物であってもよい。

[0022] 上記工程 (A) に用いられる、F A B P 4 / 5 を発現可能な哺乳動物由来の組織又は細胞の例としては、F A B P 4 遺伝子若しくは F A B P 5 遺伝子、又は F A B P 4 蛋白質若しくは F A B P 5 蛋白質を発現している、哺乳動物から単離された組織若しくは細胞、又はその培養物が挙げられる。当該単離された組織若しくは細胞、又はその培養物としては、哺乳動物から採取された十二指腸や空腸等の小腸組織又は細胞、脂肪組織又は細胞、胸腺上皮組織又は細胞、皮膚上皮組織又は細胞、及びそれらの培養物；小腸初代培養細胞；C a c o - 2 細胞、I E C - 6 細胞、I E C - 1 8 細胞、S T C - 1 細胞、G L U T a g 細胞等の小腸培養細胞；3 T 3 - L 1 細胞、などが挙げられる。

[0023] あるいは、上記工程 (A) に用いられる、F A B P 4 / 5 を発現可能な哺乳動物由来の組織又は細胞の例としては、F A B P 4 遺伝子若しくは F A B P 5 遺伝子、又は F A B P 4 蛋白質若しくは F A B P 5 蛋白質を発現するように遺伝的に改変された哺乳動物の組織若しくは細胞、又はその培養物が挙げられる。当該遺伝的に改変された哺乳動物の組織又は細胞、及びその培養物は、例えば、哺乳動物の任意の組織又は細胞に F A B P 4 蛋白質又は F A B P 5 蛋白質をコードする遺伝子を導入して、該組織又は細胞が F A B P 4 / 5 を発現するように、あるいは F A B P 4 / 5 の発現が強化されるように形質転換することによって作製することができる。遺伝子を細胞に導入する

方法としては、エレクトロポレーションやリポフェクションなどによるベクター導入が挙げられるが、これらに限定されない。

[0024] 本発明の方法で使用されるF A B P 4 / 5を発現可能な組織又は細胞が由来する哺乳動物としては、特に限定されないが、例えば、ヒト、マウス、ラット、ハムスター、ウサギ等が挙げられる。

[0025] 上記F A B P 4 / 5を発現可能な哺乳動物由来の組織又は細胞と被験物質との接触は、例えば被験物質を所定の濃度になるように予め培養液中に添加した後、当該組織又は細胞を培養液に載置すること、あるいは、当該組織又は細胞が載置された培養液に、被験物質を所定の濃度になるように添加することにより行うことができる。接触後の組織又は細胞は、例えば室温（25℃）～37℃で通常3～48時間程度、好ましくは6～24時間程度培養するのが好ましい。

[0026] 上記培養液に対する上記組織又は細胞の播種時の濃度は、細胞が増殖可能な濃度であれば特に限定されない。また、被験物質の添加濃度は、0.00001～10質量%（乾燥残分）とするのが好ましく、特に0.00001～3質量%（乾燥残分）とするのが好ましい。

[0027] 上記組織又は細胞を培養する培地は、常用の培地を用いることができ、例えば10%FBS含有Dulbecco's Modified Eagle's Mediumなどが挙げられる。細胞継代、増殖時にはこれらの培地に、血清、増殖因子、インスリン等の増殖添加剤や抗菌剤等を添加することが好ましい。

[0028] 次いで、工程（B）において、上記組織又は細胞を回収して、F A B P 4 遺伝子若しくはF A B P 5 遺伝子の発現量、F A B P 4 蛋白質若しくはF A B P 5 蛋白質の発現量、又はF A B P 4 蛋白質若しくはF A B P 5 蛋白質の活性を測定する。遺伝子の発現量の測定は、mRNAレベルで検出する場合は、例えば細胞からtotal RNAを抽出して、リアルタイムRT-PCR法、RNA分解酵素プロテクションアッセイ法、あるいはノーザンブロット解析法等を利用して、F A B P 4 / 5 遺伝子から転写されたmRNAを

検出定量することにより行うことができる。

[0029] F A B P 4 / 5 蛋白質の発現量の測定は、通常の免疫測定法、例えば R I A 法、E I A 法、E L I S A、バイオアッセイ法、ウェスタンブロットなどにより行うことができるが、ウェスタンブロットが安価かつ簡便で望ましい。F A B P 4 / 5 蛋白質の活性の測定は、F A B P 4 / 5 蛋白質に対する結合基質の結合量を測定することなどにより行うことができる。

[0030] 工程 (C) ~ (D) においては、上記工程 (B) で測定した、被験物質に接触させた F A B P 4 / 5 を発現可能な哺乳動物由来の組織又は細胞 (試験群) における F A B P 4 / 5 の発現量又は活性を、対照群における F A B P 4 / 5 の発現量又は活性と比較し、当該比較結果に基づいて、G I P 上昇抑制剤として使用できる被験物質を選択する。

[0031] 対照群としては、試験群と同じ F A B P 4 / 5 を発現可能な哺乳動物由来の組織又は細胞であって、被験物質に接触させなかったものが挙げられる。あるいは、対照群としては、生来的に F A B P 4 / 5 の発現能がない又はほとんどない哺乳動物由来の組織又は細胞；試験群と同じ組織又は細胞を、F A B P 4 / 5 が発現しないように改変したもの；さらにこれら組織又は細胞を被験物質に接触させたもの、などが挙げられる。F A B P 4 / 5 が発現しないように改変した組織又は細胞としては、s i R N A による F A B P 4 / 5 ノックダウン細胞、F A B P 4 / 5 ノックアウトマウス由来の組織又は細胞などが挙げられる。対照群における F A B P 4 / 5 の発現量又は活性の測定は、上記工程 (B) に関して説明した試験群の場合と同様の手順で行うことができる。

[0032] 次いで、試験群における F A B P 4 / 5 の発現量又は活性と、対照群における F A B P 4 / 5 の発現量又は活性とを比較する。試験群における発現量又は活性が対照群と比べて減少した場合、被験物質には G I P 上昇抑制効果があると評価し、該被験物質を G I P 上昇抑制剤として選択する。例えば、対照群における発現量又は活性に対して、試験群における発現量又は活性が統計学的に有意に減少していた場合に、被験物質には G I P 上昇抑制効果が

あると評価する。別の例としては、対照群における発現量又は活性を100%としたときに、試験群における発現量又は活性が90%以下、好ましくは80%以下、より好ましくは60%以下である場合に、被験物質にはGIP上昇抑制効果があると評価する。GIP上昇抑制効果があると評価された被験物質は、GIP上昇抑制剤として選択される。

[0033] *in vivo*で行う場合、本発明のGIP上昇抑制剤の評価又は選択方法は、以下の工程(A')～(D')を含む。

(A') 被験物質を非ヒト哺乳動物に投与する工程、

(B') 該非ヒト哺乳動物から採取した小腸におけるFABP4/5の発現量又は活性を測定する工程、

(C') 上記(B')で測定した発現量又は活性を、対照群の非ヒト哺乳動物から採取した小腸におけるFABP4/5の発現量又は活性と比較する工程、

(D') 上記(C')の結果に基づいて、FABP4/5の発現量又は活性を減少させる被験物質を、GIP上昇抑制剤として評価又は選択する工程。

[0034] 上記工程(A')に用いられる非ヒト哺乳動物としては、性別、月齢を問わず、いかなる種類の動物でもよい。例えば、マウス、ラット、ハムスター、モルモット、ウサギ、ネコ、イヌ、及びサル等の霊長類を挙げることができるが、入手や取扱いが容易な点から、ラットやマウスなどのげっ歯類が好ましい。

[0035] 上記非ヒト哺乳動物への被験物質の投与方法としては、例えば、経口投与、消化管内投与、腹腔内投与、血管内投与、皮内投与、皮下投与等が挙げられる。簡便さや低侵襲性の点からは経口投与する方法が好ましい。あるいは、GIPは十二指腸及び空腸のK細胞より分泌されることから、カニュレーション等を用い、十二指腸や空腸に直接還流させる方法も好ましい。

[0036] 被験物質の投与量は、0.0004mg/g体重以上、好ましくは0.04～2mg/g体重である。投与回数は単回であっても、間隔をあけて数回に分けて投与してもよい。食餌毎の投与が好ましく、食前60分～食後60

分の間に投与することがより好ましい。

[0037] 次いで、工程（B'）において、被験物質を投与した非ヒト哺乳動物の小腸におけるF A B P 4 / 5の発現量又は活性を測定する。測定の方法は、侵襲的方法でも非侵襲的方法でもよく、特に限定されない。

[0038] 例えば、被験物質の投与1～360分後、好ましくは5～120分後に、上記非ヒト哺乳動物から小腸を採取する。小腸の採取は、麻酔下又は安楽死直後に開腹し、胃の幽門より下部を採取する。次いで、採取した細胞のF A B P 4 / 5の発現量又は活性を測定する。

[0039] 工程（C'）～（D'）においては、上記で得られた被験物質を投与した非ヒト哺乳動物の小腸（試験群）におけるF A B P 4 / 5の発現量又は活性を、被験物質を投与しなかった同じ非ヒト哺乳動物から採取した小腸（対照群）の発現量又は活性と比較する。試験群における発現量又は活性が対照群と比べて減少した場合、被験物質にはG I P上昇抑制効果があると評価し、該被験物質をG I P上昇抑制剤として選択する。

[0040] 本方法におけるその他の手法、例えば使用できる被験物質の種類、F A B P 4 / 5の発現量又は活性の測定手順、試験群と対照群との比較手順、被験物質の評価又は選択の手順は、上述した*in vitro*又は*ex vivo*で行う方法の場合と同じである。

[0041] 必要に応じて、選択された物質をさらなるスクリーニングにかけてもよい。例えば、上記方法でG I P上昇抑制効果があると評価又は選択された試験物質について、哺乳類小腸K細胞モデルの培養細胞株を用いた分泌刺激試験や実験動物を用いた単回投与実験によってK細胞からのG I P上昇抑制能を直接測定することにより、より強力なG I P上昇抑制作用を有する物質をさらに選別することができる。

[0042] 以上の手順で本発明により選択されたG I P上昇抑制剤は、食後のG I Pを減少させ、肥満の発症可能性の低下、予防若しくは改善のため、体重減少や体重の増加抑制のため、又は消化促進や胃もたれを改善するための有効成分として使用される。

[0043] したがって、別の一態様において、本発明は、上記工程（A）～（D）又は（A'）～（D'）を含む食欲抑制剤の評価又は選択方法を提供する。さらに別の一態様において、本発明は、上記工程（A）～（D）又は（A'）～（D'）を含む肥満予防及び／又は改善剤の評価又は選択方法を提供する。さらに別の一態様において、本発明は、上記工程（A）～（D）又は（A'）～（D'）を含む体重増加抑制剤の評価又は選択方法を提供する。なお別の一態様において、本発明は、上記工程（A）～（D）又は（A'）～（D'）を含む消化促進剤又は胃もたれ改善剤の評価又は選択方法を提供する。

これらの方法の工程（D）又は（D'）では、工程（C）又は（C'）の結果に基づいて、FABP4／5の発現量又は活性を減少させる被験物質を、食欲抑制剤、肥満予防及び／又は改善剤、体重増加抑制剤、あるいは消化促進剤又は胃もたれ改善剤として、それぞれ評価又は選択する。

[0044] 本発明の例示的实施形態として、さらに以下の組成物、製造方法、用途あるいは方法を本明細書に開示する。ただし、本発明はこれらの実施形態に限定されない。

[0045] <1>以下の工程（A）～（D）：

（A）FABP4遺伝子若しくはFABP5遺伝子、又はFABP4蛋白質若しくはFABP5蛋白質を発現可能な哺乳動物由来の組織又は細胞に、被験物質を接触させる工程、

（B）該哺乳動物由来の組織又は細胞におけるFABP4遺伝子若しくはFABP5遺伝子の発現量、FABP4蛋白質若しくはFABP5蛋白質の発現量、又はFABP4蛋白質若しくはFABP5蛋白質の活性を測定する工程、

（C）上記（B）で測定した発現量又は活性を、対照群におけるFABP4遺伝子若しくはFABP5遺伝子の発現量、FABP4蛋白質若しくはFABP5蛋白質の発現量、又はFABP4蛋白質若しくはFABP5蛋白質の活性と比較する工程、

（D）上記（C）の結果に基づいて、FABP4遺伝子若しくはFABP5

遺伝子の発現量、F A B P 4 蛋白質若しくはF A B P 5 蛋白質の発現量、又はF A B P 4 蛋白質若しくはF A B P 5 蛋白質の活性を減少させる被験物質を、G I P 上昇抑制剤として評価又は選択する工程、を含む、G I P 上昇抑制剤の評価又は選択方法。

[0046] <2>以下の工程（A）～（D）：

（A）F A B P 4 遺伝子若しくはF A B P 5 遺伝子、又はF A B P 4 蛋白質若しくはF A B P 5 蛋白質を発現可能な哺乳動物由来の組織又は細胞に、被験物質を接触させる工程、

（B）該哺乳動物由来の組織又は細胞におけるF A B P 4 遺伝子若しくはF A B P 5 遺伝子の発現量、F A B P 4 蛋白質若しくはF A B P 5 蛋白質の発現量、又はF A B P 4 蛋白質若しくはF A B P 5 蛋白質の活性を測定する工程、

（C）上記（B）で測定した発現量又は活性を、対照群におけるF A B P 4 遺伝子若しくはF A B P 5 遺伝子の発現量、F A B P 4 蛋白質若しくはF A B P 5 蛋白質の発現量、又はF A B P 4 蛋白質若しくはF A B P 5 蛋白質の活性と比較する工程、

（D）上記（C）の結果に基づいて、F A B P 4 遺伝子若しくはF A B P 5 遺伝子の発現量、F A B P 4 蛋白質若しくはF A B P 5 蛋白質の発現量、又はF A B P 4 蛋白質若しくはF A B P 5 蛋白質の活性を減少させる被験物質を、食欲抑制剤として評価又は選択する工程、を含む、食欲抑制剤の評価又は選択方法。

[0047] <3>以下の工程（A）～（D）：

（A）F A B P 4 遺伝子若しくはF A B P 5 遺伝子、又はF A B P 4 蛋白質若しくはF A B P 5 蛋白質を発現可能な哺乳動物由来の組織又は細胞に、被験物質を接触させる工程、

（B）該哺乳動物由来の組織又は細胞におけるF A B P 4 遺伝子若しくはF A B P 5 遺伝子の発現量、F A B P 4 蛋白質若しくはF A B P 5 蛋白質の発現量、又はF A B P 4 蛋白質若しくはF A B P 5 蛋白質の活性を測定する工

程、

(C) 上記 (B) で測定した発現量又は活性を、対照群における F A B P 4 遺伝子若しくは F A B P 5 遺伝子の発現量、F A B P 4 蛋白質若しくは F A B P 5 蛋白質の発現量、又は F A B P 4 蛋白質若しくは F A B P 5 蛋白質の活性と比較する工程、

(D) 上記 (C) の結果に基づいて、F A B P 4 遺伝子若しくは F A B P 5 遺伝子の発現量、F A B P 4 蛋白質若しくは F A B P 5 蛋白質の発現量、又は F A B P 4 蛋白質若しくは F A B P 5 蛋白質の活性を減少させる被験物質を、肥満予防及び／又は改善剤として評価又は選択する工程、

を含む、肥満予防及び／又は改善剤の評価又は選択方法。

[0048] <4>以下の工程 (A) ~ (D) :

(A) F A B P 4 遺伝子若しくは F A B P 5 遺伝子、又は F A B P 4 蛋白質若しくは F A B P 5 蛋白質を発現可能な哺乳動物由来の組織又は細胞に、被験物質を接触させる工程、

(B) 該哺乳動物由来の組織又は細胞における F A B P 4 遺伝子若しくは F A B P 5 遺伝子の発現量、F A B P 4 蛋白質若しくは F A B P 5 蛋白質の発現量、又は F A B P 4 蛋白質若しくは F A B P 5 蛋白質の活性を測定する工程、

(C) 上記 (B) で測定した発現量又は活性を、対照群における F A B P 4 遺伝子若しくは F A B P 5 遺伝子の発現量、F A B P 4 蛋白質若しくは F A B P 5 蛋白質の発現量、又は F A B P 4 蛋白質若しくは F A B P 5 蛋白質の活性と比較する工程、

(D) 上記 (C) の結果に基づいて、F A B P 4 遺伝子若しくは F A B P 5 遺伝子の発現量、F A B P 4 蛋白質若しくは F A B P 5 蛋白質の発現量、又は F A B P 4 蛋白質若しくは F A B P 5 蛋白質の活性を減少させる被験物質を、体重増加抑制剤として評価又は選択する工程、

を含む、体重増加抑制剤の評価又は選択方法。

[0049] <5>以下の工程 (A) ~ (D) :

(A) F A B P 4 遺伝子若しくはF A B P 5 遺伝子、又はF A B P 4 蛋白質若しくはF A B P 5 蛋白質を発現可能な哺乳動物由来の組織又は細胞に、被験物質を接触させる工程、

(B) 該哺乳動物由来の組織又は細胞におけるF A B P 4 遺伝子若しくはF A B P 5 遺伝子の発現量、F A B P 4 蛋白質若しくはF A B P 5 蛋白質の発現量、又はF A B P 4 蛋白質若しくはF A B P 5 蛋白質の活性を測定する工程、

(C) 上記 (B) で測定した発現量又は活性を、対照群におけるF A B P 4 遺伝子若しくはF A B P 5 遺伝子の発現量、F A B P 4 蛋白質若しくはF A B P 5 蛋白質の発現量、又はF A B P 4 蛋白質若しくはF A B P 5 蛋白質の活性と比較する工程、

(D) 上記 (C) の結果に基づいて、F A B P 4 遺伝子若しくはF A B P 5 遺伝子の発現量、F A B P 4 蛋白質若しくはF A B P 5 蛋白質の発現量、又はF A B P 4 蛋白質若しくはF A B P 5 蛋白質の活性を減少させる被験物質を、消化促進剤として評価又は選択する工程、

を含む、消化促進剤の評価又は選択方法。

[0050] <6>以下の工程 (A) ~ (D) :

(A) F A B P 4 遺伝子若しくはF A B P 5 遺伝子、又はF A B P 4 蛋白質若しくはF A B P 5 蛋白質を発現可能な哺乳動物由来の組織又は細胞に、被験物質を接触させる工程、

(B) 該哺乳動物由来の組織又は細胞におけるF A B P 4 遺伝子若しくはF A B P 5 遺伝子の発現量、F A B P 4 蛋白質若しくはF A B P 5 蛋白質の発現量、又はF A B P 4 蛋白質若しくはF A B P 5 蛋白質の活性を測定する工程、

(C) 上記 (B) で測定した発現量又は活性を、対照群におけるF A B P 4 遺伝子若しくはF A B P 5 遺伝子の発現量、F A B P 4 蛋白質若しくはF A B P 5 蛋白質の発現量、又はF A B P 4 蛋白質若しくはF A B P 5 蛋白質の活性と比較する工程、

(D) 上記(C)の結果に基づいて、F A B P 4 遺伝子若しくはF A B P 5 遺伝子の発現量、F A B P 4 蛋白質若しくはF A B P 5 蛋白質の発現量、又はF A B P 4 蛋白質若しくはF A B P 5 蛋白質の活性を減少させる被験物質を、胃もたれ改善剤として評価又は選択する工程、を含む、胃もたれ改善剤の評価又は選択方法。

[0051] <7>好ましくは、上記F A B P 4 遺伝子若しくはF A B P 5 遺伝子、又はF A B P 4 蛋白質若しくはF A B P 5 蛋白質を発現可能な哺乳動物由来の組織又は細胞が以下である、<1>~<6>のいずれか1に記載の方法：

- (1) 哺乳動物から採取された小腸組織若しくは細胞、又はその培養物；
- (2) 哺乳動物から採取された脂肪組織若しくは細胞、胸腺上皮組織若しくは細胞、皮膚上皮組織若しくは細胞、又はその培養物；
- (3) F A B P 4 遺伝子若しくはF A B P 5 遺伝子、又はF A B P 4 蛋白質若しくはF A B P 5 蛋白質を発現するように遺伝的に改変された哺乳動物の組織若しくは細胞、又はその培養物；
- (4) 小腸初代培養細胞；又は、
- (5) C a c o - 2 細胞、I E C - 6 細胞、I E C - 1 8 細胞、S T C - 1 細胞、G L U T a g 細胞、又は3 T 3 - L 1 細胞。

[0052] <8>好ましくは、上記対照群が以下である、<1>~<7>のいずれか1に記載の方法：

- (1) 上記F A B P 4 遺伝子若しくはF A B P 5 遺伝子、又はF A B P 4 蛋白質若しくはF A B P 5 蛋白質を発現可能な哺乳動物由来の組織又は細胞であって、上記被験物質に接触させなかったもの；
- (2) 生来的にF A B P 4 遺伝子若しくはF A B P 5 遺伝子、又はF A B P 4 蛋白質若しくはF A B P 5 蛋白質の発現能がない又はほとんどない哺乳動物由来の組織又は細胞；
- (3) 上記F A B P 4 遺伝子若しくはF A B P 5 遺伝子、又はF A B P 4 蛋白質若しくはF A B P 5 蛋白質を発現可能な哺乳動物由来の組織又は細胞を、当該遺伝子又は蛋白質が発現しないように改変したもの；又は

(4) 該(2)又は(3)の組織又は細胞を被験物質に接触させたもの。

[0053] <9>好ましくは、上記(B)で測定した発現量又は活性が、上記対照群における発現量又は活性に対して統計学的に有意に減少していた場合に、上記被験物質はGIP上昇抑制効果、食欲抑制効果、肥満予防及び／又は改善効果、体重増加抑制効果、消化促進効果、あるいは胃もたれ改善効果があると評価される、<1>～<8>のいずれか1に記載の方法。

[0054] <10>好ましくは、上記(B)で測定した発現量又は活性が、上記対照群における発現量又は活性を100%としたときに90%以下、好ましくは80%以下、より好ましくは60%以下である場合に、上記被験物質はGIP上昇抑制効果、食欲抑制効果、肥満予防及び／又は改善効果、体重増加抑制効果、消化促進効果、あるいは胃もたれ改善効果があると評価される、<1>～<8>のいずれか1に記載の方法。

[0055] <11>以下の工程(A')～(D')：

(A') 被験物質を非ヒト哺乳動物に投与する工程、

(B') 該非ヒト哺乳動物から採取した小腸におけるFABP4遺伝子若しくはFABP5遺伝子の発現量、FABP4蛋白質若しくはFABP5蛋白質の発現量、又はFABP4蛋白質若しくはFABP5蛋白質の活性を測定する工程、

(C') 上記(B')で測定した発現量又は活性を、対照群の非ヒト哺乳動物から採取した小腸におけるFABP4遺伝子若しくはFABP5遺伝子の発現量、FABP4蛋白質若しくはFABP5蛋白質の発現量、又はFABP4蛋白質若しくはFABP5蛋白質の活性と比較する工程、

(D') 上記(C')の結果に基づいて、FABP4遺伝子若しくはFABP5遺伝子の発現量、FABP4蛋白質若しくはFABP5蛋白質の発現量、又はFABP4蛋白質若しくはFABP5蛋白質の活性を減少させる被験物質を、GIP上昇抑制剤として評価又は選択する工程、
を含む、GIP上昇抑制剤の評価又は選択方法。

[0056] <12>以下の工程(A')～(D')：

(A') 被験物質を非ヒト哺乳動物に投与する工程、

(B') 該非ヒト哺乳動物から採取した小腸におけるFABP4遺伝子若しくはFABP5遺伝子の発現量、FABP4蛋白質若しくはFABP5蛋白質の発現量、又はFABP4蛋白質若しくはFABP5蛋白質の活性を測定する工程、

(C') 上記(B')で測定した発現量又は活性を、対照群の非ヒト哺乳動物から採取した小腸におけるFABP4遺伝子若しくはFABP5遺伝子の発現量、FABP4蛋白質若しくはFABP5蛋白質の発現量、又はFABP4蛋白質若しくはFABP5蛋白質の活性と比較する工程、

(D') 上記(C')の結果に基づいて、FABP4遺伝子若しくはFABP5遺伝子の発現量、FABP4蛋白質若しくはFABP5蛋白質の発現量、又はFABP4蛋白質若しくはFABP5蛋白質の活性を減少させる被験物質を、食欲抑制剤として評価又は選択する工程、

を含む、食欲抑制剤の評価又は選択方法。

[0057] <13>以下の工程(A')～(D')：

(A') 被験物質を非ヒト哺乳動物に投与する工程、

(B') 該非ヒト哺乳動物から採取した小腸におけるFABP4遺伝子若しくはFABP5遺伝子の発現量、FABP4蛋白質若しくはFABP5蛋白質の発現量、又はFABP4蛋白質若しくはFABP5蛋白質の活性を測定する工程、

(C') 上記(B')で測定した発現量又は活性を、対照群の非ヒト哺乳動物から採取した小腸におけるFABP4遺伝子若しくはFABP5遺伝子の発現量、FABP4蛋白質若しくはFABP5蛋白質の発現量、又はFABP4蛋白質若しくはFABP5蛋白質の活性と比較する工程、

(D') 上記(C')の結果に基づいて、FABP4遺伝子若しくはFABP5遺伝子の発現量、FABP4蛋白質若しくはFABP5蛋白質の発現量、又はFABP4蛋白質若しくはFABP5蛋白質の活性を減少させる被験物質を、肥満予防及び／又は改善剤として評価又は選択する工程、

を含む、肥満予防及び／又は改善剤の評価又は選択方法。

[0058] <14>以下の工程（A'）～（D'）：

（A'）被験物質を非ヒト哺乳動物に投与する工程、

（B'）該非ヒト哺乳動物から採取した小腸におけるFABP4遺伝子若しくはFABP5遺伝子の発現量、FABP4蛋白質若しくはFABP5蛋白質の発現量、又はFABP4蛋白質若しくはFABP5蛋白質の活性を測定する工程、

（C'）上記（B'）で測定した発現量又は活性を、対照群の非ヒト哺乳動物から採取した小腸におけるFABP4遺伝子若しくはFABP5遺伝子の発現量、FABP4蛋白質若しくはFABP5蛋白質の発現量、又はFABP4蛋白質若しくはFABP5蛋白質の活性と比較する工程、

（D'）上記（C'）の結果に基づいて、FABP4遺伝子若しくはFABP5遺伝子の発現量、FABP4蛋白質若しくはFABP5蛋白質の発現量、又はFABP4蛋白質若しくはFABP5蛋白質の活性を減少させる被験物質を、体重増加抑制剤として評価又は選択する工程、

を含む、体重増加抑制剤の評価又は選択方法。

[0059] <15>以下の工程（A'）～（D'）：

（A'）被験物質を非ヒト哺乳動物に投与する工程、

（B'）該非ヒト哺乳動物から採取した小腸におけるFABP4遺伝子若しくはFABP5遺伝子の発現量、FABP4蛋白質若しくはFABP5蛋白質の発現量、又はFABP4蛋白質若しくはFABP5蛋白質の活性を測定する工程、

（C'）上記（B'）で測定した発現量又は活性を、対照群の非ヒト哺乳動物から採取した小腸におけるFABP4遺伝子若しくはFABP5遺伝子の発現量、FABP4蛋白質若しくはFABP5蛋白質の発現量、又はFABP4蛋白質若しくはFABP5蛋白質の活性と比較する工程、

（D'）上記（C'）の結果に基づいて、FABP4遺伝子若しくはFABP5遺伝子の発現量、FABP4蛋白質若しくはFABP5蛋白質の発現量、

又はF A B P 4 蛋白質若しくはF A B P 5 蛋白質の活性を減少させる被験物質を、消化促進剤として評価又は選択する工程、
を含む、消化促進剤の評価又は選択方法。

[0060] < 1 6 > 以下の工程 (A') ~ (D') :

(A') 被験物質を非ヒト哺乳動物に投与する工程、

(B') 該非ヒト哺乳動物から採取した小腸におけるF A B P 4 遺伝子若しくはF A B P 5 遺伝子の発現量、F A B P 4 蛋白質若しくはF A B P 5 蛋白質の発現量、又はF A B P 4 蛋白質若しくはF A B P 5 蛋白質の活性を測定する工程、

(C') 上記 (B') で測定した発現量又は活性を、対照群の非ヒト哺乳動物から採取した小腸におけるF A B P 4 遺伝子若しくはF A B P 5 遺伝子の発現量、F A B P 4 蛋白質若しくはF A B P 5 蛋白質の発現量、又はF A B P 4 蛋白質若しくはF A B P 5 蛋白質の活性と比較する工程、

(D') 上記 (C') の結果に基づいて、F A B P 4 遺伝子若しくはF A B P 5 遺伝子の発現量、F A B P 4 蛋白質若しくはF A B P 5 蛋白質の発現量、又はF A B P 4 蛋白質若しくはF A B P 5 蛋白質の活性を減少させる被験物質を、胃もたれ改善剤として評価又は選択する工程、
を含む、胃もたれ改善剤の評価又は選択方法。

[0061] < 1 7 > 好ましくは、上記対照群が被験物質を投与しなかった上記非ヒト哺乳動物から採取した小腸である、< 1 1 > ~ < 1 6 > のいずれか 1 に記載の方法。

[0062] < 1 8 > 好ましくは、上記 (B') で測定した発現量又は活性が、上記対照群における発現量又は活性に対して統計学的に有意に減少していた場合に、上記被験物質はG I P 上昇抑制効果、食欲抑制効果、肥満予防及び／又は改善効果、体重増加抑制効果、消化促進効果、あるいは胃もたれ改善効果があると評価される、< 1 1 > ~ < 1 7 > のいずれか 1 に記載の方法。

[0063] < 1 9 > 好ましくは、上記 (B') で測定した発現量又は活性が、上記対照群における発現量又は活性を 1 0 0 % としたときに 9 0 % 以下、好ましくは 8

0%以下、より好ましくは60%以下である場合に、上記被験物質はGIP上昇抑制効果、食欲抑制効果、肥満予防及び／又は改善効果、体重増加抑制効果、消化促進効果、あるいは胃もたれ改善効果があると評価される、＜11＞～＜17＞のいずれか1に記載の方法。

実施例


[0064] 以下、実施例を示し、本発明をより具体的に説明する。

[0065] (FABP4／5阻害剤)

以下の実施例では、FABP4／5阻害剤として、下記のBMS309403 (AstaTech, Inc.) 又はCompound 2 (J Lipid Res. 2011, 52, 646-656) を用いた。


[0066] [化1]

A



BMS309403

B



Compound 2

[0067] 実施例1 腸細胞におけるFABP4／5の発現

(免疫染色)

C57BL/6Jマウス(雄)(日本クレア)より採取した十二指腸を4% Paraformaldehyde水溶液で固定後、凍結切片を作製し、免疫染色を行った。GIP及びFABP5における抗体を用いて二重蛍光染色を行い、腸細胞におけるFABP5の発現を検討した。一次抗体として、GIPの抗体にはT-4340 (Peninsula製)を用いた。また、FABP5の抗体にはAF1476 (R&D systems製)を用いた。また二次抗体にはAlexa Fluor 488 Donkey Anti-Rabbit IgG (Invitrogen製)、Alexa Fl

uor 568 Donkey Anti-goat IgG (Invitrogen製)を用いた。常法に従い、4% Paraformaldehyde水溶液において4℃にて10分間固定し、PBS洗浄後、一次抗体(100倍ブロッキング液:10% Donkey Serum in PBS)において室温で3時間反応させた。再度PBS洗浄した後、二次抗体(500倍ブロッキング液)を室温で1時間反応させ、PBS洗浄後、Prolong Gold antifade reagent with DAPI (Invitrogen製)にて核染色及び封入し、顕微鏡下で観察した(405nm、488nm、568nmのレーザー使用)。

[0068] (結果)

染色像を図1に示した。マウス小腸において、絨毛に存在する細胞の管腔側に連続的にFABP5の発現が認められた(矢印)。また、GIP陽性であるK細胞(白点線内)においてもFABP5の発現が認められた。なお、FABP4が腸腺上皮の細胞膜上に局在していることは既に知られている([www.rndsystems.com/ihc_molecule_images.aspx?m=1416])。したがって本実施例の結果から、FABP4/5がともに腸の上皮細胞で発現していることが明らかにされた。

[0069] 実施例2 FABP4/5阻害がGIP分泌に及ぼす影響

(マウス単回投与試験)

18時間絶食したマウス(C57BL/6J、雄性、9週齢、n=4-5、日本クレア)に、麻酔下にてFABP4/5阻害剤BMS309403(30mg/kg体重)を含む溶媒(10% 1-methyl-2-pyrrolidone、5% cremophor、2% ethanol)、又は溶媒のみ(コントロール)を経口ゾンデにて胃内投与した。30分後、脂質乳剤(トリオレイン; 2mg/g体重)を胃内投与した。採血は、脂質乳剤投与前、投与後10、30、及び60分において眼窩静脈叢採血により行った。採取した血液を11,000rpm、4℃で10分間遠心分離を行い、血漿を調製した。血中GIP濃度、血中トリグリセリド(TG)濃度については

、それぞれG I P E L I S Aキット（ラット／マウス用）（ミリポア）及びトリグリセライドEーテストワコー（和光純薬工業）用いて測定した。

[0070] （結果）

脂質乳剤単回投与後のマウスにおける血中のT G濃度変化量（ Δ T G）及びG I P濃度変化量（ Δ G I P）の経時変化、ならびに血中G I P濃度のi A U C（0－1 h）及びC m a xを図2に示す。脂質乳剤投与後における血中T G濃度及び血中G I P濃度の上昇は、コントロール群と比較して阻害剤添加群において統計学的に有意に低減した（図2 A）。また、血中G I P濃度のi A U C及びC m a xもまた、コントロール群と比較して阻害剤添加群において統計学的に有意に低減した（図2 B）。

[0071] 実施例3 小腸初代培養細胞でのF A B P 4／5 阻害試験

（小腸初代培養細胞の調製）

13～17週齢のC57BL／6Jマウスを麻酔下で頸椎脱臼により安楽死させた後、上部小腸（胃幽門直下から10cm）を摘出して、氷冷したL－15培地（Sigma）に浸透した。これを氷冷PBS中に移し、腸管に付着した脂肪及び血管等を丁寧に除去し、管腔内を氷冷PBSで洗浄した後、メスを用いて組織を微塵切り（2mm²以下の小片）にした。小片をPBSで3～4回洗浄した後、Collagenase XI（Sigma；0.4mg／mL）を溶解したDMEM（Sigma）を10mL添加し、10秒間激しく振とうしてから37℃で5分間インキュベートした。上清を除去した後、再びCollagenase溶液を10mL添加して10秒間激しく振とうし、37℃で5分間インキュベートした。その後、上清を除去し、再びCollagenase溶液を10mL添加して10秒間激しく振とうし、37℃で15分間インキュベートした。その間、5分ごとに10秒間の振とうを行った。インキュベート後に上清を回収し（上清1）、同様にCollagenase溶液を添加して15分間インキュベートし、上清を回収した（上清2）。上清1と上清2を100rcf（約800rpm）で3分間遠心した（室温）。上清を除去し、それぞれ10mLのDMEMに懸濁し

た後、これらを合わせて100rcfで3分間遠心した（室温）。上清を除去し、7mLのDMEM（10%FBS（Invitrogen）、1%Glutamax（Invitrogen）、1%penicillin/streptomycin（Invitrogen）含有）に懸濁した。これをmatrigel™（BD Biosciences）でコートした48ウェルプレートに播種し（1匹辺り24ウェル）、37℃、5%CO₂下でインキュベートした。

[0072]（GIP分泌刺激）

24時間培養した小腸初代培養細胞を刺激培地（4.5mM KCl、138mM NaCl、4.2mM NaHCO₃、1.2mM NaH₂PO₄、2.6mM CaCl₂、1.2mM MgCl₂、10mM HEPES、NaOH（pH7.4に調整））で1回穏やかに洗浄した後、刺激培地のみ、又はFABP4/5阻害剤（10又は25μM）を含む刺激培地を添加してインキュベートした。30分後、刺激培地で1回穏やかに洗浄し、刺激培地のみ（コントロール）、脂質ミセル（PPM：刺激培地+500μMタウロコール酸Na、200μMオレイン酸、50μM 2-モノオレイン）、又はPPM+FABP4/5阻害剤（10又は25μM）を添加し、30分後に培地を回収した。FABP4/5阻害剤としては、BMS309403又はCompound2を用いた。

[0073]（GIP分泌率の測定）

回収した培地を、8,000rpm、4℃で5分間遠心して上清を得た（Secretion sample）。上清回収後のプレートにCell Lysis Buffer（0.5%（w/v）Sodium Deoxycholate monohydrate、1%（v/v）Igepal CA-630、50mmol/L Tris-HCl（pH7.4）、150mmol/L NaCl、1 tablet EDTA-free protease inhibitor cocktail tablet（Roche））を添加し、凍結融解した後に細胞を回収した。これを12,000rpm、4℃

で5分間遠心し、上清を得た (L y s i s s a m p l e)。これらのサンプルについてG I P E L I S Aキット (ラット／マウス用) (ミリポア) を用いてG I Pの定量を行い、G I P分泌率を求めた。G I P分泌率の算出方法を下記に示す。

[0074] [化2]

$$\begin{aligned} \text{GIP分泌率 (\%)} &= \frac{\text{培地へのGIP分泌量}}{\text{全GIP量}} \times 100 \\ &= \frac{\text{GIP量 (Secretion sample)}}{\text{GIP量 (Lysis sample)} + \text{GIP量 (Secretion sample)}} \times 100 \end{aligned}$$

[0075] (結果)

P P M刺激された小腸初代培養細胞におけるG I P分泌率を図3に示す。P P M刺激された細胞 (P P M群) では、コントロール群と比較して、刺激後30分でのG I P分泌率が統計学的に有意に上昇した。一方、P P M刺激に加えてF A B P 4 / 5阻害剤を添加した細胞 (P P M+阻害剤群) では、P P M群に対してG I P分泌率の上昇が統計学的に有意に抑制された。P P M刺激+B M S 3 0 9 4 0 3添加群では、用量依存的なG I P分泌の上昇抑制傾向が認められた (図3A)。

[0076] 実施例4 F A B P 5活性に基づくG I P上昇抑制剤のスクリーニング

F A B P 5活性に基づいてG I P上昇抑制剤をスクリーニングした。試験物質のF A B P 5活性に及ぼす影響は、F A B P 5蛋白質への試験物質の拮抗的な結合を利用してF A B P 5活性を測定することにより調べた。本実施例で用いたF A B P 5活性測定法の原理を図4に示す。1 - a n i l i n o n a p h t h a l e n e - 8 - s u l f o n i c a c i d (1, 8 - A N S) は、F A B P 5に結合することで蛍光を発することが報告されている物質である (Hum. Mol. Genet., 2014, 23 (24) : 6495 - 6511)。1, 8 - A N Sは、疎水性環境下でのみ蛍光を発する物質であり、親水性環境下では蛍光を発しない (図4A)。一方、F A B P 5存在下では、1, 8 - A N SはF A B P 5との結合により分子周辺が疎水性

環境となるため蛍光を発するようになる（図4B）。しかし、FABP5に対する結合定数がより小さい物質がさらに存在すると、その物質が1, 8-ANSより優先的にFABP5に結合するため、1, 8-ANSは蛍光を発しなくなる（図4C）。上記方法で蛍光強度の上昇を抑制した試験物質は、FABP5蛋白質と結合してその活性を阻害する物質である。

[0077] （試験物質によるFABP5阻害活性の測定）

大腸菌由来組換え型FABP5を定法により発現させ、精製した。96穴プレートに、精製したFABP5蛋白質、1, 8-ANS及び試験物質を添加し、室温にて5分間静置した後、プレートリーダーにて蛍光強度（励起波長：355nm、蛍光波長：480nm）を測定した。試験物質としては、実施例3で用いたGIP上昇抑制作用を有するFABP5阻害剤（Compound 2）、及び後述の参考例1で示すようにGIP上昇抑制作用を有する油脂である魚油を用いた。評価系中の試験物質の最終濃度は0.002%～0.1%（w/v）とした。

[0078] （結果）

評価結果を図5に示す。FABP5と1, 8-ANSが共存することによりbufferのみ、又はFABP5や1, 8-ANS単独と比較して有意な蛍光強度の上昇が認められた。この蛍光強度の上昇は、GIP上昇抑制作用を有するFABP5阻害剤の添加により統計学的に有意に抑制された（t-test、 $p < 0.05$ ）。また、GIP上昇抑制作用を有する油脂である魚油を添加した場合も、蛍光強度は統計学的に有意に低下した（t-test、 $p < 0.05$ ）。一方、GIP上昇抑制作用を有さない試験物質を添加した場合は、蛍光強度は低下しなかった（データ示さず）。これらの結果は、FABP5の活性を指標に、試験物質のGIP上昇抑制作用を評価することができることを示している。

[0079] 参考例1 魚油のGIP上昇抑制作用

マウス単回食餌試験により、魚油のGIP上昇抑制作用を調べた。18時間絶食したマウス（C57BL/6J、雄性、8週齢、 $n = 10$ 、日本クレ

ア) に、60 分間、高脂肪食 (HF) 食 (25%なたね油 + 5%パーム油) 又は、魚油食 (15.4%なたね油 + 5%パーム油 + 9.6%魚油 (10%DHA)) を粉末飼料として自由摂餌させた。自由摂餌前、摂餌後 60、120、及び 240 分において各マウスの眼窩静脈叢から採血した。採取した血液を 11,000 rpm、4℃で 10 分間遠心分離を行い、血漿を調製し、GIP ELISA キット (ラット/マウス用) (ミリポア) を用いて血中 GIP 濃度を測定した。試験食摂餌後のマウスにおける血中 GIP 濃度変化量 (Δ GIP) の経時変化、および血中 GIP 濃度の iAUC (0–4 h) を図 6 A、B に示す。血中 GIP 濃度の上昇は、HF 食群と比較して魚油食群において統計学的に有意に低減した。

請求の範囲

[請求項1]

以下の工程（A）～（D）：

（A）F A B P 4 遺伝子若しくはF A B P 5 遺伝子、又はF A B P 4 蛋白質若しくはF A B P 5 蛋白質を発現可能な哺乳動物由来の組織又は細胞に、被験物質を接触させる工程、

（B）該哺乳動物由来の組織又は細胞におけるF A B P 4 遺伝子若しくはF A B P 5 遺伝子の発現量、F A B P 4 蛋白質若しくはF A B P 5 蛋白質の発現量、又はF A B P 4 蛋白質若しくはF A B P 5 蛋白質の活性を測定する工程、

（C）前記（B）で測定した発現量又は活性を、対照群におけるF A B P 4 遺伝子若しくはF A B P 5 遺伝子の発現量、F A B P 4 蛋白質若しくはF A B P 5 蛋白質の発現量、又はF A B P 4 蛋白質若しくはF A B P 5 蛋白質の活性と比較する工程、

（D）前記（C）の結果に基づいて、F A B P 4 遺伝子若しくはF A B P 5 遺伝子の発現量、F A B P 4 蛋白質若しくはF A B P 5 蛋白質の発現量、又はF A B P 4 蛋白質若しくはF A B P 5 蛋白質の活性を減少させる被験物質を、G I P 上昇抑制剤として評価又は選択する工程、

を含む、G I P 上昇抑制剤の評価又は選択方法。

[請求項2]

以下の工程（A）～（D）：

（A）F A B P 4 遺伝子若しくはF A B P 5 遺伝子、又はF A B P 4 蛋白質若しくはF A B P 5 蛋白質を発現可能な哺乳動物由来の組織又は細胞に、被験物質を接触させる工程、

（B）該哺乳動物由来の組織又は細胞におけるF A B P 4 遺伝子若しくはF A B P 5 遺伝子の発現量、F A B P 4 蛋白質若しくはF A B P 5 蛋白質の発現量、又はF A B P 4 蛋白質若しくはF A B P 5 蛋白質の活性を測定する工程、

（C）前記（B）で測定した発現量又は活性を、対照群におけるF A

B P 4 遺伝子若しくは F A B P 5 遺伝子の発現量、F A B P 4 蛋白質若しくは F A B P 5 蛋白質の発現量、又は F A B P 4 蛋白質若しくは F A B P 5 蛋白質の活性と比較する工程、

(D) 前記 (C) の結果に基づいて、F A B P 4 遺伝子若しくは F A B P 5 遺伝子の発現量、F A B P 4 蛋白質若しくは F A B P 5 蛋白質の発現量、又は F A B P 4 蛋白質若しくは F A B P 5 蛋白質の活性を減少させる被験物質を、食欲抑制剤として評価又は選択する工程、を含む、食欲抑制剤の評価又は選択方法。

[請求項3]

以下の工程 (A) ~ (D) :

(A) F A B P 4 遺伝子若しくは F A B P 5 遺伝子、又は F A B P 4 蛋白質若しくは F A B P 5 蛋白質を発現可能な哺乳動物由来の組織又は細胞に、被験物質を接触させる工程、

(B) 該哺乳動物由来の組織又は細胞における F A B P 4 遺伝子若しくは F A B P 5 遺伝子の発現量、F A B P 4 蛋白質若しくは F A B P 5 蛋白質の発現量、又は F A B P 4 蛋白質若しくは F A B P 5 蛋白質の活性を測定する工程、

(C) 前記 (B) で測定した発現量又は活性を、対照群における F A B P 4 遺伝子若しくは F A B P 5 遺伝子の発現量、F A B P 4 蛋白質若しくは F A B P 5 蛋白質の発現量、又は F A B P 4 蛋白質若しくは F A B P 5 蛋白質の活性と比較する工程、

(D) 前記 (C) の結果に基づいて、F A B P 4 遺伝子若しくは F A B P 5 遺伝子の発現量、F A B P 4 蛋白質若しくは F A B P 5 蛋白質の発現量、又は F A B P 4 蛋白質若しくは F A B P 5 蛋白質の活性を減少させる被験物質を、肥満予防又は改善剤として評価又は選択する工程、

を含む、肥満予防又は改善剤の評価又は選択方法。

[請求項4]

以下の工程 (A) ~ (D) :

(A) F A B P 4 遺伝子若しくは F A B P 5 遺伝子、又は F A B P 4

蛋白質若しくはF A B P 5 蛋白質を発現可能な哺乳動物由来の組織又は細胞に、被験物質を接触させる工程、

(B) 該哺乳動物由来の組織又は細胞におけるF A B P 4 遺伝子若しくはF A B P 5 遺伝子の発現量、F A B P 4 蛋白質若しくはF A B P 5 蛋白質の発現量、又はF A B P 4 蛋白質若しくはF A B P 5 蛋白質の活性を測定する工程、

(C) 前記(B)で測定した発現量又は活性を、対照群におけるF A B P 4 遺伝子若しくはF A B P 5 遺伝子の発現量、F A B P 4 蛋白質若しくはF A B P 5 蛋白質の発現量、又はF A B P 4 蛋白質若しくはF A B P 5 蛋白質の活性と比較する工程、

(D) 前記(C)の結果に基づいて、F A B P 4 遺伝子若しくはF A B P 5 遺伝子の発現量、F A B P 4 蛋白質若しくはF A B P 5 蛋白質の発現量、又はF A B P 4 蛋白質若しくはF A B P 5 蛋白質の活性を減少させる被験物質を、体重増加抑制剤として評価又は選択する工程、

を含む、体重増加抑制剤の評価又は選択方法。

[請求項5]

以下の工程(A)～(D)：

(A) F A B P 4 遺伝子若しくはF A B P 5 遺伝子、又はF A B P 4 蛋白質若しくはF A B P 5 蛋白質を発現可能な哺乳動物由来の組織又は細胞に、被験物質を接触させる工程、

(B) 該哺乳動物由来の組織又は細胞におけるF A B P 4 遺伝子若しくはF A B P 5 遺伝子の発現量、F A B P 4 蛋白質若しくはF A B P 5 蛋白質の発現量、又はF A B P 4 蛋白質若しくはF A B P 5 蛋白質の活性を測定する工程、

(C) 前記(B)で測定した発現量又は活性を、対照群におけるF A B P 4 遺伝子若しくはF A B P 5 遺伝子の発現量、F A B P 4 蛋白質若しくはF A B P 5 蛋白質の発現量、又はF A B P 4 蛋白質若しくはF A B P 5 蛋白質の活性と比較する工程、

(D) 前記 (C) の結果に基づいて、F A B P 4 遺伝子若しくは F A B P 5 遺伝子の発現量、F A B P 4 蛋白質若しくは F A B P 5 蛋白質の発現量、又は F A B P 4 蛋白質若しくは F A B P 5 蛋白質の活性を減少させる被験物質を、消化促進剤として評価又は選択する工程、を含む、消化促進剤の評価又は選択方法。

[請求項6]

以下の工程 (A) ~ (D) :

(A) F A B P 4 遺伝子若しくは F A B P 5 遺伝子、又は F A B P 4 蛋白質若しくは F A B P 5 蛋白質を発現可能な哺乳動物由来の組織又は細胞に、被験物質を接触させる工程、

(B) 該哺乳動物由来の組織又は細胞における F A B P 4 遺伝子若しくは F A B P 5 遺伝子の発現量、F A B P 4 蛋白質若しくは F A B P 5 蛋白質の発現量、又は F A B P 4 蛋白質若しくは F A B P 5 蛋白質の活性を測定する工程、

(C) 前記 (B) で測定した発現量又は活性を、対照群における F A B P 4 遺伝子若しくは F A B P 5 遺伝子の発現量、F A B P 4 蛋白質若しくは F A B P 5 蛋白質の発現量、又は F A B P 4 蛋白質若しくは F A B P 5 蛋白質の活性と比較する工程、

(D) 前記 (C) の結果に基づいて、F A B P 4 遺伝子若しくは F A B P 5 遺伝子の発現量、F A B P 4 蛋白質若しくは F A B P 5 蛋白質の発現量、又は F A B P 4 蛋白質若しくは F A B P 5 蛋白質の活性を減少させる被験物質を、胃もたれ改善剤として評価又は選択する工程、を含む、胃もたれ改善剤の評価又は選択方法。

[請求項7]

前記 (B) で測定した発現量又は活性が、前記対照群における発現量又は活性に対して統計学的に有意に減少していた場合に、前記被験物質は G I P 上昇抑制効果、食欲抑制効果、肥満予防及び／又は改善効果、体重増加抑制効果、消化促進効果、あるいは胃もたれ改善効果があると評価される、請求項 1 ~ 6 のいずれか 1 項記載の方法。

[請求項8] 前記（Ｂ）で測定した発現量又は活性が、前記対照群における発現量又は活性を１００％としたときに９０％以下である場合に、前記被験物質はＧＩＰ上昇抑制効果、食欲抑制効果、肥満予防及び／又は改善効果、体重増加抑制効果、消化促進効果、あるいは胃もたれ改善効果があると評価される、請求項１～６のいずれか１項記載の方法。

[請求項9] 以下の工程（Ａ'）～（Ｄ'）：

（Ａ'）被験物質を非ヒト哺乳動物に投与する工程、

（Ｂ'）該非ヒト哺乳動物から採取した小腸におけるＦＡＢＰ４遺伝子若しくはＦＡＢＰ５遺伝子の発現量、ＦＡＢＰ４蛋白質若しくはＦＡＢＰ５蛋白質の発現量、又はＦＡＢＰ４蛋白質若しくはＦＡＢＰ５蛋白質の活性を測定する工程、

（Ｃ'）前記（Ｂ'）で測定した発現量又は活性を、対照群の非ヒト哺乳動物から採取した小腸におけるＦＡＢＰ４遺伝子若しくはＦＡＢＰ５遺伝子の発現量、ＦＡＢＰ４蛋白質若しくはＦＡＢＰ５蛋白質の発現量、又はＦＡＢＰ４蛋白質若しくはＦＡＢＰ５蛋白質の活性と比較する工程、

（Ｄ'）前記（Ｃ'）の結果に基づいて、ＦＡＢＰ４遺伝子若しくはＦＡＢＰ５遺伝子の発現量、ＦＡＢＰ４蛋白質若しくはＦＡＢＰ５蛋白質の発現量、又はＦＡＢＰ４蛋白質若しくはＦＡＢＰ５蛋白質の活性を減少させる被験物質を、ＧＩＰ上昇抑制剤として評価又は選択する工程、

を含む、ＧＩＰ上昇抑制剤の評価又は選択方法。

[請求項10] 以下の工程（Ａ'）～（Ｄ'）：

（Ａ'）被験物質を非ヒト哺乳動物に投与する工程、

（Ｂ'）該非ヒト哺乳動物から採取した小腸におけるＦＡＢＰ４遺伝子若しくはＦＡＢＰ５遺伝子の発現量、ＦＡＢＰ４蛋白質若しくはＦＡＢＰ５蛋白質の発現量、又はＦＡＢＰ４蛋白質若しくはＦＡＢＰ５蛋白質の活性を測定する工程、

(C') 前記 (B') で測定した発現量又は活性を、対照群の非ヒト哺乳動物から採取した小腸における F A B P 4 遺伝子若しくは F A B P 5 遺伝子の発現量、F A B P 4 蛋白質若しくは F A B P 5 蛋白質の発現量、又は F A B P 4 蛋白質若しくは F A B P 5 蛋白質の活性と比較する工程、

(D') 前記 (C') の結果に基づいて、F A B P 4 遺伝子若しくは F A B P 5 遺伝子の発現量、F A B P 4 蛋白質若しくは F A B P 5 蛋白質の発現量、又は F A B P 4 蛋白質若しくは F A B P 5 蛋白質の活性を減少させる被験物質を、食欲抑制剤として評価又は選択する工程、を含む、食欲抑制剤の評価又は選択方法。

[請求項11]

以下の工程 (A') ~ (D') :

(A') 被験物質を非ヒト哺乳動物に投与する工程、

(B') 該非ヒト哺乳動物から採取した小腸における F A B P 4 遺伝子若しくは F A B P 5 遺伝子の発現量、F A B P 4 蛋白質若しくは F A B P 5 蛋白質の発現量、又は F A B P 4 蛋白質若しくは F A B P 5 蛋白質の活性を測定する工程、

(C') 前記 (B') で測定した発現量又は活性を、対照群の非ヒト哺乳動物から採取した小腸における F A B P 4 遺伝子若しくは F A B P 5 遺伝子の発現量、F A B P 4 蛋白質若しくは F A B P 5 蛋白質の発現量、又は F A B P 4 蛋白質若しくは F A B P 5 蛋白質の活性と比較する工程、

(D') 前記 (C') の結果に基づいて、F A B P 4 遺伝子若しくは F A B P 5 遺伝子の発現量、F A B P 4 蛋白質若しくは F A B P 5 蛋白質の発現量、又は F A B P 4 蛋白質若しくは F A B P 5 蛋白質の活性を減少させる被験物質を、肥満予防又は改善剤として評価又は選択する工程、

を含む、肥満予防又は改善剤の評価又は選択方法。

[請求項12]

以下の工程 (A') ~ (D') :

(A') 被験物質を非ヒト哺乳動物に投与する工程、

(B') 該非ヒト哺乳動物から採取した小腸におけるFABP4遺伝子若しくはFABP5遺伝子の発現量、FABP4蛋白質若しくはFABP5蛋白質の発現量、又はFABP4蛋白質若しくはFABP5蛋白質の活性を測定する工程、

(C') 前記(B')で測定した発現量又は活性を、対照群の非ヒト哺乳動物から採取した小腸におけるFABP4遺伝子若しくはFABP5遺伝子の発現量、FABP4蛋白質若しくはFABP5蛋白質の発現量、又はFABP4蛋白質若しくはFABP5蛋白質の活性と比較する工程、

(D') 前記(C')の結果に基づいて、FABP4遺伝子若しくはFABP5遺伝子の発現量、FABP4蛋白質若しくはFABP5蛋白質の発現量、又はFABP4蛋白質若しくはFABP5蛋白質の活性を減少させる被験物質を、体重増加抑制剤として評価又は選択する工程、

を含む、体重増加抑制剤の評価又は選択方法。

[請求項13]

以下の工程(A')～(D')：

(A') 被験物質を非ヒト哺乳動物に投与する工程、

(B') 該非ヒト哺乳動物から採取した小腸におけるFABP4遺伝子若しくはFABP5遺伝子の発現量、FABP4蛋白質若しくはFABP5蛋白質の発現量、又はFABP4蛋白質若しくはFABP5蛋白質の活性を測定する工程、

(C') 前記(B')で測定した発現量又は活性を、対照群の非ヒト哺乳動物から採取した小腸におけるFABP4遺伝子若しくはFABP5遺伝子の発現量、FABP4蛋白質若しくはFABP5蛋白質の発現量、又はFABP4蛋白質若しくはFABP5蛋白質の活性と比較する工程、

(D') 前記(C')の結果に基づいて、FABP4遺伝子若しくはF

F A B P 5 遺伝子の発現量、F A B P 4 蛋白質若しくはF A B P 5 蛋白質の発現量、又はF A B P 4 蛋白質若しくはF A B P 5 蛋白質の活性を減少させる被験物質を、消化促進剤として評価又は選択する工程、を含む、消化促進剤の評価又は選択方法。

[請求項14]

以下の工程（A'）～（D'）：

（A'）被験物質を非ヒト哺乳動物に投与する工程、

（B'）該非ヒト哺乳動物から採取した小腸におけるF A B P 4 遺伝子若しくはF A B P 5 遺伝子の発現量、F A B P 4 蛋白質若しくはF A B P 5 蛋白質の発現量、又はF A B P 4 蛋白質若しくはF A B P 5 蛋白質の活性を測定する工程、

（C'）前記（B'）で測定した発現量又は活性を、対照群の非ヒト哺乳動物から採取した小腸におけるF A B P 4 遺伝子若しくはF A B P 5 遺伝子の発現量、F A B P 4 蛋白質若しくはF A B P 5 蛋白質の発現量、又はF A B P 4 蛋白質若しくはF A B P 5 蛋白質の活性と比較する工程、

（D'）前記（C'）の結果に基づいて、F A B P 4 遺伝子若しくはF A B P 5 遺伝子の発現量、F A B P 4 蛋白質若しくはF A B P 5 蛋白質の発現量、又はF A B P 4 蛋白質若しくはF A B P 5 蛋白質の活性を減少させる被験物質を、胃もたれ改善剤として評価又は選択する工程、

を含む、胃もたれ改善剤の評価又は選択方法。

[請求項15]


前記（B'）で測定した発現量又は活性が、前記対照群における発現量又は活性に対して統計学的に有意に減少していた場合に、前記被験物質はG I P 上昇抑制効果、食欲抑制効果、肥満予防及び／又は改善効果、体重増加抑制効果、消化促進効果、あるいは胃もたれ改善効果があると評価される、請求項9～14のいずれか1項記載の方法。

[請求項16]


前記（B'）で測定した発現量又は活性が、前記対照群における発現量又は活性を100%としたときに90%以下である場合に、前記

被験物質はG I P上昇抑制効果、食欲抑制効果、肥満予防及び／又は改善効果、体重増加抑制効果、消化促進効果、あるいは胃もたれ改善効果があると評価される、請求項9～14のいずれか1項記載の方法。


[図1]




[図2]




[図3]




[図4]



[図5]



[図6]



INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/JP2015/056603

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER

G01N33/15(2006.01)i, C12Q1/02(2006.01)i, C12Q1/68(2006.01)i, G01N33/50(2006.01)i, G01N33/68(2006.01)i

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)

G01N33/15, 33/48-33/98, C12Q1/00-1/70

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Jitsuyo Shinan Koho	1922-1996	Jitsuyo Shinan Toroku Koho	1996-2015
Kokai Jitsuyo Shinan Koho	1971-2015	Toroku Jitsuyo Shinan Koho	1994-2015

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practicable, search terms used)

CAPLUS/MEDLINE/EMBASE/BIOSIS (STN)

C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
<u>X</u> A	JP 2004-065194 A (Sumitomo Chemical Co., Ltd.), 04 March 2004 (04.03.2004), claims; paragraphs [0004], [0041] to [0051] (Family: none)	<u>3, 4, 7, 8</u> 1, 2, 5, 6, 9-16
<u>X</u> A	Mas R.A.A.Syamsunarno, "Fatty Acid Binding Protein-4 and -5 are Expressed in Intestinal Capillary Endothelial Cells and Regulate Lipid Absorption", Circulation Journal, 2014.02.20, Vol. 78, supplement 1, 1737	<u>3, 4, 7, 8, 11,</u> <u>12, 15, 16</u> 1, 2, 5, 6, 9, 10, 13, 14
<u>X</u> A	JP 2002-524517 A (Bristol-Myers Squibb Co.), 06 August 2002 (06.08.2002), claims; paragraphs [0002] to [0003] & US 2002/0035064 A1 & WO 2000/015229 A1 & EP 1113801 A1	<u>3, 4, 7, 8</u> 1, 2, 5, 6, 9-16

☒ Further documents are listed in the continuation of Box C. ☐ See patent family annex.

* Special categories of cited documents:	"T" later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention
"A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance	"X" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone
"E" earlier application or patent but published on or after the international filing date	"Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art
"L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)	"&" document member of the same patent family
"O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means	
"P" document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed	

Date of the actual completion of the international search
12 May 2015 (12.05.15)

Date of mailing of the international search report
26 May 2015 (26.05.15)

Name and mailing address of the ISA/
Japan Patent Office
3-4-3, Kasumigaseki, Chiyoda-ku,
Tokyo 100-8915, Japan

Authorized officer

Telephone No.

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/JP2015/056603

C (Continuation). DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
<u>X</u> A	FURUHASHI, "Fatty Acid-Binding Protein Family", Journal of Japan Society for the Study of Obesity, 25 December 2013 (25.12.2013), vol.19, no.3, pages 167 to 174	<u>3, 4, 7, 8</u> 1, 2, 5, 6, 9-16
A	JP 2011-080803 A (Kao Corp.), 21 April 2011 (21.04.2011), entire text; all drawings (Family: none)	1-16
A	K. B. Comerford et al., "The Effects of Weight Loss on FABP4 and RBP4 in Obese Women with Metabolic Syndrome", Horm. Metab. Res., 2013. 08.26, 46(3), pp. 224-231	1-16
A	Hong Lan et al., "Small-molecule inhibitors of FABP4/5 ameliorate dyslipidemia but not insulin resistance in mice with diet-induced obesity", J. Lipid Res., 2011.04, 52(4), pp. 646-656	1-16
A	Diane H. Song et al., "Glucose-Dependent Insulinotropic Polypeptide Enhances Adipocyte Development and Glucose Uptake in Part through Akt Activation", Gastroenterology, 2007.12, 133(6), pp. 1796-1805	1-16
A	Randi Ugleholdt et al., "Transgenic Rescue of Adipocyte Glucose-dependent Insulinotropic Polypeptide Receptor Expression Restores High Fat Diet-induced Body Weight Gain", J. Biol. Chem., 2011.12, 286(52), pp. 44632-44645	1-16
P,X	Kimitaka Shibue et al., "FABP5 is an essential modulator of fatty acid-induced GIP secretion in enteroendocrine K cells", Diabetologia, 2014.09, 57(1) Supplement, p. 766	1-16
P,X	SHIBUE et al., "Shibosan Ketsugo Tanpaku 5 (FABP5) wa K Saibo ni Okeru Shibo Yudosei K Saibo ni Okeru Shibo Yudosei GIP Bunpi no Seigyo ni Kan'yo suru", Dai 29 Kai The Japanese Society of Experimental Diabetes and Obesity on Diagnosis of Diabetes Mellitus in Animal Models Koen Yoshishu, 19 February 2015 (19.02.2015) (received date), page 48	1-16

A. 発明の属する分野の分類（国際特許分類（I P C））

Int.Cl. G01N33/15(2006.01)i, C12Q1/02(2006.01)i, C12Q1/68(2006.01)i, G01N33/50(2006.01)i,
G01N33/68(2006.01)i

B. 調査を行った分野

調査を行った最小限資料（国際特許分類（I P C））

Int.Cl. G01N33/15, 33/48-33/98, C12Q1/00-1/70

最小限資料以外の資料で調査を行った分野に含まれるもの

日本国実用新案公報	1 9 2 2 - 1 9 9 6 年
日本国公開実用新案公報	1 9 7 1 - 2 0 1 5 年
日本国実用新案登録公報	1 9 9 6 - 2 0 1 5 年
日本国登録実用新案公報	1 9 9 4 - 2 0 1 5 年

国際調査で使用した電子データベース（データベースの名称、調査に使用した用語）

CAplus/MEDLINE/EMBASE/BIOSIS(STN)

C. 関連すると認められる文献

引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求項の番号
<u>X</u> A	JP 2004-065194 A（住友化学工業株式会社）2004.03.04, 【特許請求の範囲】，【0004】，【0041】 - 【0051】 （ファミリーなし）	<u>3, 4, 7, 8</u> 1, 2, 5, 6, 9-16
<u>X</u> A	Mas R. A. A. Syamsunarno, “Fatty Acid Binding Protein-4 and -5 are Expressed in Intestinal Capillary Endothelial Cells and Regulate Lipid Absorption”, Circulation Journal, 2014.02.20, Vol. 78, supplement 1, 1737	<u>3, 4, 7, 8,</u> <u>11, 12, 15, 16</u> 1, 2, 5, 6, 9, 10, 13, 14

☒ C 欄の続きにも文献が列挙されている。

☐ パテントファミリーに関する別紙を参照。

* 引用文献のカテゴリー

「A」特に関連のある文献ではなく、一般的技術水準を示すもの
「E」国際出願日前の出願または特許であるが、国際出願日以後に公表されたもの
「L」優先権主張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行日若しくは他の特別な理由を確立するために引用する文献（理由を付す）
「O」口頭による開示、使用、展示等に言及する文献
「P」国際出願日前で、かつ優先権の主張の基礎となる出願

の日の後に公表された文献

「T」国際出願日又は優先日後に公表された文献であって出願と矛盾するものではなく、発明の原理又は理論の理解のために引用するもの
「X」特に関連のある文献であって、当該文献のみで発明の新規性又は進歩性がないと考えられるもの
「Y」特に関連のある文献であって、当該文献と他の1以上の文献との、当業者にとって自明である組合せによって進歩性がないと考えられるもの
「&」同一パテントファミリー文献

国際調査を完了した日

1 2 . 0 5 . 2 0 1 5

国際調査報告の発送日

2 6 . 0 5 . 2 0 1 5

国際調査機関の名称及びあて先

日本国特許庁（I S A / J P）
郵便番号 1 0 0 - 8 9 1 5
東京都千代田区霞が関三丁目4番3号

特許庁審査官（権限のある職員）

廣田 健介

電話番号 0 3 - 3 5 8 1 - 1 1 0 1 内線 3 2 5 2

2 J

3 8 0 7

C (続き) . 関連すると認められる文献		
引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求項の番号
<u>X</u> A	JP 2002-524517 A (ブリストル・マイヤーズ スクイブ カンパニー) 2002.08.06, 【特許請求の範囲】, 【0002】 - 【0003】 & US 2002/0035064 A1 & WO 2000/015229 A1 & EP 1113801 A1	<u>3, 4, 7, 8</u> 1, 2, 5, 6, 9-16
<u>X</u> A	古橋, “脂肪酸結合タンパクファミリー”, 肥満研究, 2013.12.25, Vol. 19, No. 3, pp. 167-174	<u>3, 4, 7, 8</u> 1, 2, 5, 6, 9-16
A	JP 2011-080803 A (花王株式会社) 2011.04.21, 全文、全図 (ファミリーなし)	1-16
A	K. B. Comerford et al., “The Effects of Weight Loss on FABP4 and RBP4 in Obese Women with Metabolic Syndrome”, Horm. Metab. Res., 2013.08.26, 46(3), pp. 224-231	1-16
A	Hong Lan et al., “Small-molecule inhibitors of FABP4/5 ameliorate dyslipidemia but not insulin resistance in mice with diet-induced obesity”, J. Lipid Res., 2011.04, 52(4), pp. 646-656	1-16
A	Diane H. Song et al., “Glucose-Dependent Insulinotropic Polypeptide Enhances Adipocyte Development and Glucose Uptake in Part through Akt Activation”, Gastroenterology, 2007.12, 133(6), pp. 1796-1805	1-16
A	Randi Ugleholdt et al., “Transgenic Rescue of Adipocyte Glucose-dependent Insulinotropic Polypeptide Receptor Expression Restores High Fat Diet-induced Body Weight Gain”, J. Biol. Chem., 2011.12, 286(52), pp. 44632-44645	1-16
P, X	Kimitaka Shibue et al., “FABP5 is an essential modulator of fatty acid-induced GIP secretion in enteroendocrine K cells”, Diabetologia, 2014.09, 57(1) Supplement, p. 766	1-16
P, X	渋谷 他12名, “脂肪酸結合タンパク5 (FABP5) はK細胞における脂肪誘導性K細胞における脂肪誘導性GIP分泌の制御に関与する”, 第29回日本糖尿病・肥満動物学会講演要旨集, 2015.02.19 (受入日), p. 48	1-16