




СОЮЗ СОВЕТСКИХ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ
РЕСПУБЛИК

(19) SU (11) 1268155 A1

(5D) 4 A 61 B 17/56

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР
ПО ДЕЛАМ ИЗОБРЕТЕНИЙ И ОТКРЫТИЙ

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ И АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ



- (21) 3669044/28-14
(22) 30.11.83
(46) 07.11.86. Бюл. № 41
(71) Ленинградский научно-исследовательский детский ортопедический институт им. Г.И.Турнера
(72) В.Л.Андрианов и Е.С.Тихоненков
(53) 616.71-089(088.8)
(56) Ортопедия, травматология и протезирование, 1968, № 7, с. 48-53.
(54) СПОСОБ ЛЕЧЕНИЯ ДЕГЕНЕРАТИВНО-ДИСТРОФИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ ШЕЙКИ И ГОЛОВКИ БЕДРА

(57) Изобретение относится к травматологии и ортопедии. Цель изобретения - сокращение сроков лечения. Вскрывают мягкие ткани и обнажают передне-внутреннюю часть проксимального отдела бедренной кости. Затем долотом выкраивают костный лоскут с прикрепляющейся к нему передней порцией средней ягодичной мышцы. Сверлом в шейке делают туннель до эпифиза головки бедра. В этот туннель вводят выкроенный трансплантат. На конечность накладывают гипсовую повязку.

(19) SU (11) 1268155 A1

Изобретение относится к медицине, а именно к ортопедии и травматологии.

Цель изобретения - сокращение сроков лечения.

Способ осуществляется следующим образом.

После вскрытия мягких тканей и обнажения передне-внутренней части проксимального отдела бедренной кости долотом выкраивают костный лоскут шириной 0,5 см и длиной, равной длине шейки бедра, вместе с частью большого вертела и прикрепляющейся к ней передней порцией средней ягодичной мышцы. Затем сверлом в шейке делают туннель до эпифиза головки бедра, куда и вводится выкроенный трансплантат. Рана послойно ушивается и накладывается гипсовая повязка.

Способ штифтования шейки и головки бедра обладает преимуществами ускорения репаративных процессов в шейке и головке бедра до 3-6 мес. вместо 1-2 лет при ранее применяемых способах.

Пример. Больной Ш. 3 лет с болезнью Пертеса. После вскрытия мягких тканей обнажают передне-внутрен-

нюю часть проксимального отдела бедренной кости и выкраивают костный лоскут, равный длине шейки бедра, вместе с частью большого вертела и прикрепляющейся к ней передней порцией средней ягодичной мышцы. Сверлом в шейке сделан канал до эпифиза головки бедра и введен в канал выкроенный трансплантат. Рана послойно ушита, наложена гипсовая повязка. На контрольной рентгенограмме через 3 мес. имеется восстановление формы головки.

15 Ф о р м у л а и з о б р е т е н и я

Способ лечения дегенеративно-дистрофических процессов шейки и головки бедра путем выкраивания костно-мышечного лоскута из проксимального отдела бедра, формирования канала в шейке и головке бедра и последующего внедрения в него трансплантата, отличающийся тем, что, с целью сокращения сроков лечения, трансплантат выкраивают из переднего отдела бедренной кости с передней порцией средней ягодичной мышцы.

Составитель П. Филиппов

Редактор Н. Бобкова

Техред Л. Олейник

Корректор М. Шароши

Заказ 5953/2

Тираж 660

Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета СССР

по делам изобретений и открытий

113035, Москва, Ж-35, Раушская наб., д. 4/5

Производственно-полиграфическое предприятие, г. Ужгород, ул. Проектная, 4