

[19] 中华人民共和国国家知识产权局

[51] Int. Cl⁷
A61K 35/78
A61K 33/24 A61K 9/06
A61P 17/00



[12] 发 明 专 利 说 明 书

[21] ZL 专利号 00114556.8

[45] 授权公告日 2004 年 2 月 4 日

[11] 授权公告号 CN 1136865C

[22] 申请日 2000.5.11 [21] 申请号 00114556.8
[71] 专利权人 王介毅
地址 430300 湖北省武汉市黄陂区人民医院
骨科
[72] 发明人 王介毅
审查员 杨 兴

[74] 专利代理机构 武汉开元专利代理有限责任公
司
代理人 陈家安

权利要求书 1 页 说明书 3 页

[54] 发明名称 一种中药愈创消肿膏
[57] 摘要

一种用于愈创消肿的中药膏体，以大黄、当归、川芎、白芷、红花、麻油、升麻、麻黄、木鳖子、血竭、铅丹经配料，炸料、煤油、下丹、去火毒、总细料、推膏、包装而成，该中药膏体能直接外敷治疗各种皮肤缺损创口及某些外科感染性疾病，有良好的治疗效果，有些方面优于目前西医临床上常规的扩创缝合或植皮修补等治疗方法。

I S S N 1 0 0 8 - 4 2 7 4

1、一种用于愈创消肿的中药膏，其特征在于它是以大黄、当归、川芎、白芷、红花、麻油、升麻、麻黄、木鳖子、血竭、铅丹为原料，用以下方法制成的有效膏体：

(1) 把大黄 12 重量份、当归 30 份量重、川芎 30 份量重、白芷 30 份量重、红花 20 份量重、升麻 30 份量重，麻黄 24 份量重、木鳖子 24 份量重，血竭 15 份量重炮制合格，称量配齐；

(2) 将大黄、当归、川芎、白芷、红花、升麻、麻黄、木鳖子酌予碎断，置于铁锅内，加入 1000 份量重麻油，加热炸枯，捞取残渣，取油过滤，即为药油；

(3) 将药油按火上下丹法炼油，再按火上下丹法将铅丹 700 ± 份量重加入，最后如常法去火毒得膏油；

(4) 取膏油加热融化，待爆音停止，水气去尽，微凉，将血竭 15 份量重细粉加入搅匀；

(5) 将膏药摊于布上，切割，包装密封。

一种中药愈创消肿膏

本发明涉及一种用中药制成的膏剂，特别是一种用于治愈创伤消除肿痛的中药硬膏剂。

以指端开放性损伤为例。目前，西医的治疗方法是扩创缝合，即咬除指骨残端，缩短患指进行缝合，或者植皮修补。因此患指缩短，后遗疤痕及功能障碍，影响美观；施行植皮者，有的形成角化组织，有的坏死，有的虽然植皮成活，但没有知觉，天冷皮肤发紫肿胀，影响活动。更有发生感染，炎症扩散致蜂窝组织炎或骨髓炎，终久需行截指术。

本发明的目的在于提供一种自制中药愈创消肿膏直接外敷治疗各种皮肤缺损创口及某些外科感染性疾病，有良好的治疗效果，有些方面优于目前某些临床常规的治疗方法。

本发明的具体实施方案是：一种用于愈创消肿的中药膏体的特征在于它是以大黄、当归、川芎、白芷、红花、麻油、升麻、麻黄、木鳖子、血竭、铅丹为原料用以下方法制成的有效膏体：

(1) 把大黄 12 重量份、当归 30 份量重、川芎 30 份量重、白芷 30 份量重、红花 20 份量重、升麻 30 份量重，麻黄 24 份量重、木鳖子 24 份量重，血竭 15 份量重炮制合格，称量配齐、血竭 15 份量重单包；

(2) 将大黄、当归、川芎、白芷、红花、升麻、麻黄、木鳖子八味药、酌予碎断，置于铁锅内，加入 1000 份量重麻油，加热炸枯，捞取残渣，取油过滤，即为药油；

(3) 将药油按火上下丹法炼油，再按火上下丹法将铅丹 $700 \pm$ 份量重加入即下丹，最后如常法去火毒得膏油；

(4) 取膏油加热融化，待爆音停止，水气去尽，微凉，将血竭 15 份量重细粉加入搅匀；

(5) 将膏药摊于布上，切割，包装密封。

经临床医学实践证明，本发明中药愈创消肿膏与西医临床常规治疗方法扩创缝合或植皮修补相比，基本上无疤痕挛缩，创面有不同程度的再生修复，基本上无后遗症功能障碍，其疗效有些方面优于西医临床常规的治疗方法。

实施例：（1）把大黄 12g、当归 30g、川芎 30g、白芷 30g、红花 20g、升麻 30g、麻黄 24g、木鳖子 24g、血竭 15g 炮制合格，称量配齐，血竭单包；

（2）将大黄 12g、当归 30g、川芎 30g、白芷 30g、红花 20g、升麻 30g、麻黄 24g、木鳖子 24g 酌予碎断，置于铁锅内，加入麻油 1000g，加热炸枯，捞取残渣，取油过滤，即为药油；

（3）将药油按火上下丹法炼油，再按火上下丹法操作将铅丹 700g±加入，最后如常法去火毒得膏油；

（4）取膏油加热融化，待爆音停止，水气去尽，微凉，将血竭 15g 细粉加入搅匀；

（5）将膏药摊于布上，切割、包装密封。

以下为本发明中药愈创消肿膏临床医学实验结果（以实施例提供的膏剂进行实验）。

表 1 为本发明中药膏对患指治疗的有关参数指标

治疗类型 疤痕指数 感染指数 功能障碍指数

中药膏	3	0	2
扩创缝合	43	21	42
植皮修补	34	37	35

伤口愈合以新皮完全覆盖创面为临床愈合标准，各组分别观察患指为 150 指。

手指创伤治疗是西医治疗上比较困难的一种病例，因手指神经末梢丰富，且治疗效果不佳容易产生功能障碍并影响美观。

根据患指创面程度的不同，在接受中药愈创消肿膏治疗 14 天后愈后 33 指，20~30 天内愈合 95 指，30~40 天内愈合 22 指。无一例感染及不良肉芽组织生长的情况出现，基本上无疤痕挛缩。

经临床医学实验证明,本发明中药愈创消肿膏有明显的愈创消肿作用,能作为愈创消肿的膏剂使用,由于本发明中药膏剂为纯中药制剂,对机体无副作用,对体弱的患者尤为有利。

与西医的治疗方法相比:本发明中药愈创消肿膏具有下列优点:1、愈创消肿膏具有止痛消炎、解毒消肿、生肌生皮之功能。止痛一般在用药后一小时左右显效,原则上不需用止痛药和抗菌素($T < 38^{\circ}\text{C}$),无感染情况发生,不会粘贴创面,故不会引起伤口出血和疼痛,不会损伤创面,不会刺激人体组织,无不良肉芽组织生长,基本上无疤痕挛缩。就手指末端损伤而言,甚至创面有不同程度的再生修复。2、愈创消肿膏应用范围广,不仅用于各种创面,还用于急性软组织损伤,疮痈肿痛,黄水湿疮,对痛风病疗效甚佳,对前列腺炎及增生性疾病疗效甚佳,对颈腰椎增生性疾病有疗效。治疗或辅助治疗骨髓炎病。3、中药愈创消肿膏药源广泛低廉,使用经济简便,可直接外贴愈创消肿膏(人体自身体温足矣),疗效可靠。

抗生素的出现和使用一百年来,我们已经面临进入后抗生素时代的压力。中药愈创消肿膏不需或很大程度上减少对抗生素的依赖,在使用中视患处需要,任意切割大小,既可由医学指导,也可居家自备。

中药愈创消肿膏在临床上的应用:

1、1~2日新鲜创伤:先冲洗伤口,用愈创消肿膏外敷弹性加压包扎,初时有压迫止血作用,边缘有碎裂皮片者,不必修整切除,可将碎裂皮片平铺在创面上,有利创面愈合,用愈创膏后,前2次每日换药,再隔日换药1次,以后可隔2~3日换药一次,直至痊愈。用生理盐水擦去分泌物,如有白膜,也可除掉。常规注射TAT(破伤风抗毒素)1500单位,原则上可不用抗菌素和止痛药。

2、陈旧性创面:伤口长期难以愈合,感染情况不明显的用愈创消肿膏很快伤口愈合;伤口感染有坏死组织,用愈创消肿膏有去腐生肌,使坏死组织剥落,坏死组织未完全剥落,去腐难尽可剪除掉,再按新鲜创面处理。局部伤口感染,未致体温超过 38°C 者,可不另用抗生素。

3、未溃患区:用愈创消肿膏可3日左右换药一次。