



(12) 发明专利申请

(10) 申请公布号 CN 102210771 A

(43) 申请公布日 2011. 10. 12

(21) 申请号 201110137625. 9

(22) 申请日 2011. 05. 26

(71) 申请人 张兆俊

地址 250400 山东省济南市平阴县府前街
35 号张泉林转

(72) 发明人 张兆俊 张爱增

(51) Int. Cl.

A61K 36/758 (2006. 01)

A61P 17/00 (2006. 01)

A61K 31/19 (2006. 01)

权利要求书 1 页 说明书 2 页

(54) 发明名称

一种治疗湿疹的药物配方及其制备方法

(57) 摘要

本发明公开了一种中药制剂及制备方法,特别是治疗湿疹的药物及制备方法。该药物主要是由下述重量份数比原料制成的药物,花椒 20-30、地肤子 20-30、荆芥 30-50、防风 30-40、透骨草 30-50、红花 2-3、陈醋 400-500。本发明的有益效果是本发明公开的治疗湿疹的药物,原料易得,制备方法简单,疗效确切,属纯中药制剂,治疗费用低,副作用小,治愈率高,达到 85-90%,是治疗湿疹的一种新型药物。

1. 一种治疗湿疹的药物,其特征是:由下述原料重量份数比的原料制成的药剂:花椒 20-30、地肤子 20-30、荆芥 30-50、防风 30-40、透骨草 30-50、红花 2-3、陈醋 400-500。

2. 根据权利要求 1 所述的一种治疗湿疹的药物,其特征在于,其各种原料重量份数比是:

花椒 25、地肤子 25、荆芥 40、防风 35、透骨草 40、红花 3、陈醋 450。

3. 由权利要求 1 所述的一种治疗湿疹的药物的制备方法,其特征是:

A、按照重量称取花椒、地肤子、荆芥、防风、透骨草、红花用砂锅或搪瓷器皿加干净冷水 1200-1500 重量份(煎药用水量一般以浸过药面 3 厘米为宜,井水或自来水均可,但不能用矿泉水)浸泡 1 个小时;

B、将步骤 A 浸泡的中药及浸泡液用药锅煎药沸腾后 20-30 分钟停火,滤去药渣保留药液备用;

C、取陈醋 400-500 重量份与步骤 B 留存的药液充分混合,用武火熬浓缩到 500-600 毫升即得所需要的药液,装瓶存放使用。

一种治疗湿疹的药物配方及其制备方法

技术领域

[0001] 本发明属于一种中药制剂及制备方法,特别是治疗湿疹的中药制剂及其制备方法。

背景技术

[0002] 湿疹是一种常见的皮肤病,能够治疗的药物不少,有的价格昂贵,病人依从性差,治疗效果不理想。我们发明的治疗湿疹的药物,属纯中药制剂,治疗费用低,副作用小,治愈率高,达到 85-90%。

发明内容

[0003] 本发明的目的是提供一种治疗湿疹的中药制剂的技术方案,本发明的另一个目的是提供该药物的制备方法。

[0004] 本发明的技术方案是:一种治疗湿疹的药物,其特征是:由下述重量份数比的原料制成的药剂:花椒 20-30、地肤子 20-30、荆芥 30-50、防风 30-40、透骨草 30-50、红花 2-3、陈醋 400-500。

[0005] 优选的各种原料的重量份数比是:

[0006] 花椒 25、地肤子 25、荆芥 40、防风 35、透骨草 40、红花 3、陈醋 450。

[0007] 一种治疗湿疹的药物的制备方法,包括下述步骤:

[0008] A、按照重量称取花椒、地肤子、荆芥、防风、透骨草、红花用砂锅或搪瓷器皿加干净冷水 1200-1500 重量份(煎药用水量一般以浸过药面 3 厘米为宜,井水或自来水均可,但不能用矿泉水)浸泡 1 个小时;

[0009] B、将步骤 A 浸泡的中药及浸泡液用药锅煎药沸腾后 20-30 分钟停火,滤去药渣保留药液备用;

[0010] C、取陈醋 400-500 重量份与步骤 B 留存的药液充分混合,用武火熬浓缩到 500-600 毫升即得所需要的药液,装瓶存放使用。

[0011] 使用方法:本药物用棉棒沾用涂抹患处使用,一天三次,五天为一个疗程,一般两个疗程就可痊愈。本发明为外用药,不可内服。

[0012] 发明人认为:本发明中的花椒味辛,性温,具有温中寒除湿止痛、杀菌解毒止痒的效果。地肤子性寒,味辛苦,具有祛风止痒,对真菌有抑制作用。荆芥味辛,性温,有祛风解表散风,透疹消疮的作用。防风味辛,微湿,具有祛风解表、除湿止痛的效果。透骨草味辛,性温,祛风除湿、舒筋活血止痛、散瘀消肿的作用。红花有活血通经,散瘀止痛的效果。风种药物混合后,作用相互促进,具有增强微循环的活力,增强解毒和消疹的效果,活血散瘀、除湿止痛、杀菌解毒止痒的效果。

[0013] 本发明的有益效果是本发明公开的治疗湿疹的药物,原料易得,制备方法简单,疗效确切,是治疗湿疹的一种新型药物。

具体实施方式

[0014] 本发明的具体实施方式是：

[0015] 实施例 1

[0016] A、称取花椒 20 克、地肤子 25 克、荆芥 30 克、防风 30 克、透骨草 35 克、红花 2 克用砂锅或搪瓷器皿加干净冷水 1200 克（煎药用水量一般以浸过药面 3 厘米为宜，井水或自来水均可，但不能用矿泉水）浸泡 1 个小时；

[0017] B、将步骤 A 浸泡的中药及浸泡液用药锅煎药沸腾后 20-30 分钟停火，滤去药渣保留药液备用；

[0018] C、取陈醋 400 克与步骤 B 留存的药液充分混合，用武火熬浓缩到 500-600 毫升即得所需要的药液，装瓶存放使用。

[0019] 实施例 2

[0020] A、称取花椒 25 克、地肤子 25 克、荆芥 40 克、防风 35 克、透骨草 40 克、红花 3 克用砂锅或搪瓷器皿加干净冷水 1500 克（煎药用水量一般以浸过药面 3 厘米为宜，井水或自来水均可，但不能用矿泉水）浸泡 1 个小时；

[0021] B、将步骤 A 浸泡的中药及浸泡液用药锅煎药沸腾后 20-30 分钟停火，滤去药渣保留药液备用；

[0022] C、取陈醋 450 克与步骤 B 留存的药液充分混合，用武火熬浓缩到 500-600 毫升即得所需要的药液，装瓶存放使用。

[0023] 实施例 3

[0024] A、称取花椒 25 克、地肤子 30 克、荆芥 40 克、防风 35 克、透骨草 35 克、红花 3 克用砂锅或搪瓷器皿加干净冷水 1500 克（煎药用水量一般以浸过药面 3 厘米为宜，井水或自来水均可，但不能用矿泉水）浸泡 1 个小时；

[0025] B、将步骤 A 浸泡的中药及浸泡液用药锅煎药沸腾后 20-30 分钟停火，滤去药渣保留药液备用；

[0026] C、取陈醋 450 克与步骤 B 留存的药液充分混合，用武火熬浓缩到 500-600 毫升即得所需要的药液，装瓶存放使用。