



(12) 发明专利申请

(10) 申请公布号 CN 105031156 A

(43) 申请公布日 2015. 11. 11

(21) 申请号 201510537271. 5

A61K 35/64(2015. 01)

(22) 申请日 2015. 08. 28

(71) 申请人 马国丰

地址 325017 浙江省温州市瓯海区郭溪街道
浦北村仙庄路 18 号

(72) 发明人 马国丰

(51) Int. Cl.

A61K 36/8945(2006. 01)

A61K 9/06(2006. 01)

A61P 19/04(2006. 01)

A61P 29/00(2006. 01)

A61K 33/10(2006. 01)

A61K 35/14(2015. 01)

A61K 35/24(2015. 01)

A61K 35/62(2006. 01)

权利要求书1页 说明书4页

(54) 发明名称

一种治疗跌打膏药

(57) 摘要

本发明涉及一种治疗跌打膏药,由下列重量份的原料制成:花蕊石 40-50 份、土鳖虫 25-30 份、山羊血(伊麻音-赤素)90-100 份、水蛭 40-50 份、五灵脂 100-115 份、四块瓦 30-35 份、驳骨丹 70-80 份、蛇莓 50-70 份、毛茛 30-40 份、百两金 45-55 份、红花 30-40 份、苏木 90-110 份、桃仁 90-100 份、穿山龙 50-55 份、透骨草 50-70 份、牡丹皮 35-40 份、白醋 180-190 份、凡士林 230-245 份、蜂蜜 70-90 份。本发明采用不同药性的药材进行科学配伍,诸药共奏活血化瘀、续筋接骨、破血逐瘀、消肿止痛之功效,本发明对治疗跌打有效率 91% 以上取得了较好的临床疗效。

1. 一种治疗跌打膏药,其特征在于:它是由下列重量份的原料制成:花蕊石 40-50 份、土鳖虫 25-30 份、山羊血(伊麻音-赤素) 90-100 份、水蛭 40-50 份、五灵脂 100-115 份、四块瓦 30-35 份、驳骨丹 70-80 份、蛇莓 50-70 份、毛茛 30-40 份、百两金 45-55 份、红花 30-40 份、苏木 90-110 份、桃仁 90-100 份、穿山龙 50-55 份、透骨草 50-70 份、牡丹皮 35-40 份、白醋 180-190 份、凡士林 230-245 份、蜂蜜 70-90 份。

2. 根据权利要求 1 所述的治疗跌打膏药,其特征在于:它是由下列重量份的原料制成:花蕊石 50 份、土鳖虫 30 份、山羊血(伊麻音-赤素) 95 份、水蛭 50 份、五灵脂 110 份、四块瓦 35 份、驳骨丹 80 份、蛇莓 65 份、毛茛 40 份、百两金 55 份、红花 40 份、苏木 105 份、桃仁 100 份、穿山龙 55 份、透骨草 65 份、牡丹皮 40 份、白醋 190 份、凡士林 240 份、蜂蜜 87 份。

3. 根据权利要求 1 所述的治疗跌打膏药,其特征在于:它是由下列重量份的原料制成:花蕊石 40 份、土鳖虫 25 份、山羊血(伊麻音-赤素) 90 份、水蛭 40 份、五灵脂 105 份、四块瓦 30 份、驳骨丹 70 份、蛇莓 55 份、毛茛 30 份、百两金 45 份、红花 33 份、苏木 95 份、桃仁 90 份、穿山龙 50 份、透骨草 50 份、牡丹皮 35 份、白醋 180 份、凡士林 235 份、蜂蜜 75 份。

4. 根据权利要求 1 所述的治疗跌打膏药,其特征在于:它是由下列重量份的原料制成:花蕊石 45 份、土鳖虫 28 份、山羊血(伊麻音-赤素) 95 份、水蛭 45 份、五灵脂 108 份、四块瓦 33 份、驳骨丹 75 份、蛇莓 60 份、毛茛 35 份、百两金 50 份、红花 35 份、苏木 100 份、桃仁 95 份、穿山龙 52 份、透骨草 60 份、牡丹皮 37 份、白醋 185 份、凡士林 237 份、蜂蜜 80 份。

5. 根据权利要求 1-4 中任一项所述的治疗跌打膏药,其特征在于包括以下工艺步骤:

I 取赤水蛭洗净、切块、晾干,用紫外线杀菌后备用;

II 将步骤 I 得到的原料烧存性,再放置于研钵内研末后再加入白醋并搅拌均匀,密封浸泡 12-15 小时待用;

III 取土鳖虫洗净、微波烘干、捣碎待用;

IV 取花蕊石捣碎,将碎块研末;

V 取五灵脂烘干,放入粉碎机粉碎成粉末;

VI 取山羊血(伊麻音-赤素)、四块瓦、驳骨丹、蛇莓、毛茛、百两金、红花、苏木、桃仁、穿山龙、透骨草、牡丹皮洗净、用微波烘干切段,放入粉碎机里粉碎成粉末,并将粉碎后的粉末混合均匀;

VII 将步骤 IV、V、VI 得到的原料放入锅内一起混合均匀并加入香油及蜂蜜,用文火边熬制边搅拌 25-30min 后离火并立即加入凡士林和步骤 II、III 得到的原料一起搅拌均匀既得膏药。

一种治疗跌打膏药

技术领域

[0001] 本发明涉及中药技术领域,特别是涉及一种治疗跌打膏药。

背景技术

[0002] 跌打损伤是一种常见的人体伤患,现在医院采用的常规疗法是打石膏用消炎药等方法治疗。但是该法具有恢复时间长,患者痛苦多,费用高等缺点。另外,治疗跌打损伤的药物也有很多,但这些药物普遍效果不佳,存在疗程长、消炎止痛效果不明显、治愈率低等问题,目前有一些中药物虽然对治疗跌打损伤效果不错,但大多存在各药组份过多,药材原料名贵,造成药品价格较高,普通收入患者难以接受。

发明内容

[0003] 本发明目的就是为了弥补现有技术的不足,提供一种治疗跌打膏药。

[0004] 本发明是通过以下技术方案来实现的:

一种治疗跌打膏药,它是由下列重量份的原料制成:花蕊石 40-50 份、土鳖虫 25-30 份、山羊血(伊麻音-赤素) 90-100 份、水蛭 40-50 份、五灵脂 100-115 份、四块瓦 30-35 份、驳骨丹 70-80 份、蛇莓 50-70 份、毛茛 30-40 份、百两金 45-55 份、红花 30-40 份、苏木 90-110 份、桃仁 90-100 份、穿山龙 50-55 份、透骨草 50-70 份、牡丹皮 35-40 份、白醋 180-190 份、凡士林 230-245 份、蜂蜜 70-90 份。

[0005] 优选地,一种治疗跌打膏药由下列重量份的原料制成:花蕊石 50 份、土鳖虫 30 份、山羊血(伊麻音-赤素) 95 份、水蛭 50 份、五灵脂 110 份、四块瓦 35 份、驳骨丹 80 份、蛇莓 65 份、毛茛 40 份、百两金 55 份、红花 40 份、苏木 105 份、桃仁 100 份、穿山龙 55 份、透骨草 65 份、牡丹皮 40 份、白醋 190 份、凡士林 240 份、蜂蜜 87 份。

[0006] 优选地,一种治疗跌打膏药由下列重量份的原料制成:花蕊石 40 份、土鳖虫 25 份、山羊血(伊麻音-赤素) 90 份、水蛭 40 份、五灵脂 105 份、四块瓦 30 份、驳骨丹 70 份、蛇莓 55 份、毛茛 30 份、百两金 45 份、红花 33 份、苏木 95 份、桃仁 90 份、穿山龙 50 份、透骨草 50 份、牡丹皮 35 份、白醋 180 份、凡士林 235 份、蜂蜜 75 份。

[0007] 优选地,一种治疗跌打膏药由下列重量份的原料制成:花蕊石 45 份、土鳖虫 28 份、山羊血(伊麻音-赤素) 95 份、水蛭 45 份、五灵脂 108 份、四块瓦 33 份、驳骨丹 75 份、蛇莓 60 份、毛茛 35 份、百两金 50 份、红花 35 份、苏木 100 份、桃仁 95 份、穿山龙 52 份、透骨草 60 份、牡丹皮 37 份、白醋 185 份、凡士林 237 份、蜂蜜 80 份。

[0008] 以上所述的一种治疗跌打膏药,它包括以下工艺步骤:

I 取赤水蛭洗净、切块、晾干,用紫外线杀菌后备用;

II 将步骤 I 得到的原料烧存性,再放置于研钵内研末后再加入白醋并搅拌均匀,密封浸泡 12-15 小时待用;

III 取土鳖虫洗净、微波烘干、捣碎待用;

IV 取花蕊石捣碎,将碎块研末;

V取五灵脂烘干干燥,放入粉碎机粉碎成粉末;

VI取山羊血(伊麻音-赤素)、四块瓦、驳骨丹、蛇莓、毛茛、百两金、红花、苏木、桃仁、穿山龙、透骨草、牡丹皮洗净、用微波烘干切段,放入粉碎机里粉碎成粉末,并将粉碎后的粉末混合均匀;

VII将步骤IV、V、VI得到的原料放入锅内一起混合均匀并加入香油及蜂蜜,用文火边熬制边搅拌 25-30min 后离火并立即加入凡士林和步骤II、III得到的原料一起搅拌均匀既得膏药。

[0009] 本发明原料药理作用如下:

花蕊石:味酸、涩,性平,归肝经,化瘀、止血;

土鳖虫:味咸,性寒,归肝经,破血逐瘀、续筋接骨;

山羊血(伊麻音-赤素):味甘,性凉,解毒、愈伤、接骨、止血;

五灵脂:味苦、甘,性温,归肝、脾经,活血止痛、化瘀止血、消积解毒;

四块瓦:味辛、苦,性温,祛风除湿、活血止痛、止咳、解毒;

水蛭:味咸、苦,性平、归肝经,破血逐瘀、通经消癥;

驳骨丹:味辛、苦,性平,活血止痛、化瘀接骨、祛风除湿、消肿解毒;

蛇莓:味苦、甘,性寒,归肺、肝、胃经,清热泻火、解毒消肿;

毛茛:味辛,性温,归肝、胆、心、胃经,退黄、定喘、截疟、镇痛、消翳;

百两金:味苦、辛,性凉,清热利咽、祛痰利湿、活血解毒,

红花:味辛,性温,归心、肚经,活血能经、祛瘀止痛;

苏木:味甘、咸,性平,归心、肝、胃、大肠经,活血祛瘀、消肿定痛;

桃仁:味苦、甘,性平,归心、肝、大肠、肺、脾经,破血行瘀、润燥滑肠;

穿山龙:味苦,性平,归肝、肺经,祛风除湿、活血通络、止咳;

透骨草:味辛,性温,归肺、肝经,祛风除湿、舒筋活血、散瘀消肿、解毒目痛;

牡丹皮:味辛、苦,性凉、微寒,归心、肝、肾、肺经,清热、活血散瘀。

[0010] 膏药经皮肤发挥作用,贴膏药疗法是中医临床常用的外治方法之一,它遵循中医辨证论治及中药的功效、主治与归经的原则,充分调动药物互相协调为用的效能,组成多味药物的复方,以发挥药物的良好效果。由于膏药直接敷贴于体表,而制作膏剂的药物大多气味较浓,再加入辛香走窜极强的引经药物,通过渗透入皮肤,内传经络、脏腑,起到调气血、通经络、散寒湿,消肿痛等作用。中医外科膏药是运用中药归经原则,运用药物互相协调为用的效能,组成多味药物的大复方,以发挥药物的良好效果。膏药用于肌表薄贴,膏药中取气味具厚的药物,并加以引药率领群药,开结行滞直达病所。因此可透入皮肤产生消炎,止痛,活血化淤,通经走络,开窍透骨,祛风散寒等功效。贴于体表的膏药刺激神经末梢,通过反射,扩张血管,促进局部血液循环,改善周围组织营养,达到消肿,消炎和镇痛的目的。同时药物在患处通过皮肤渗透达皮下组织,在局部产生药物浓度的相对优势,从而发挥较强的药理作用。此外,因膏药中有些刺激性强的药物,强刺激通过神经反射,可以调节肌体功能促进抗体形成,提高人体免疫力。药物穿通皮肤及黏膜后,经过血管或淋巴管进入体循环,也可产生全身性药物作用。

[0011] 有益效果是:本发明膏药使用方便、安全、无副作用,采用内病外治方法,贴于患处进行治疗,能通过皮肤吸收,使局部药物有效浓度显著高于血液浓度,从而发挥较为显著的

疗效,本发明采用不同药性的药材进行科学配伍,诸药共奏活血化瘀、续筋接骨、破血逐瘀、消肿止痛之功效,本发明对治疗跌打有效率达到 91% 以上取得了较好的临床疗效。

具体实施方式

[0012] 实施例 1

本实施例所述的一种治疗跌打膏药由下列重量份的原料制成:花蕊石 50 份、土鳖虫 30 份、山羊血(伊麻音-赤素) 95 份、水蛭 50 份、五灵脂 110 份、四块瓦 35 份、驳骨丹 80 份、蛇莓 65 份、毛茛 40 份、百两金 55 份、红花 40 份、苏木 105 份、桃仁 100 份、穿山龙 55 份、透骨草 65 份、牡丹皮 40 份、白醋 190 份、凡士林 240 份、蜂蜜 87 份。

[0013] 实施例 2

本实施例所述的一种治疗跌打膏药由下列重量份的原料制成:花蕊石 40 份、土鳖虫 25 份、山羊血(伊麻音-赤素) 90 份、水蛭 40 份、五灵脂 105 份、四块瓦 30 份、驳骨丹 70 份、蛇莓 55 份、毛茛 30 份、百两金 45 份、红花 33 份、苏木 95 份、桃仁 90 份、穿山龙 50 份、透骨草 50 份、牡丹皮 35 份、白醋 180 份、凡士林 235 份、蜂蜜 75 份。

[0014] 实施例 3

本实施例所述的一种治疗跌打膏药由下列重量份的原料制成:花蕊石 45 份、土鳖虫 28 份、山羊血(伊麻音-赤素) 95 份、水蛭 45 份、五灵脂 108 份、四块瓦 33 份、驳骨丹 75 份、蛇莓 60 份、毛茛 35 份、百两金 50 份、红花 35 份、苏木 100 份、桃仁 95 份、穿山龙 52 份、透骨草 60 份、牡丹皮 37 份、白醋 185 份、凡士林 237 份、蜂蜜 80 份。

[0015] 以上所述的一种治疗跌打膏药,它包括以下工艺步骤:

I 取赤水蛭洗净、切块、晾干,用紫外线杀菌后备用;

II 将步骤 I 得到的原料烧存性,再放置于研钵内研末后再加入白醋并搅拌均匀,密封浸泡 12-15 小时待用;

III 取土鳖虫洗净、微波烘干、捣碎待用;

IV 取花蕊石捣碎,将碎块研末;

V 取五灵脂烘干干燥,放入粉碎机粉碎成粉末;

VI 取山羊血(伊麻音-赤素)、四块瓦、驳骨丹、蛇莓、毛茛、百两金、红花、苏木、桃仁、穿山龙、透骨草、牡丹皮洗净、用微波烘干切段,放入粉碎机里粉碎成粉末,并将粉碎后的粉末混合均匀;

VII 将步骤 IV、V、VI 得到的原料放入锅内一起混合均匀并加入香油及蜂蜜,用文火边熬制边搅拌 25-30min 后离火并立即加入凡士林和步骤 II、III 得到的原料一起搅拌均匀既得膏药。

[0016] 下面通过临床资料对本药物的治疗效果进行进一步说明:

1 一般资料:

骨伤科门诊陆续抽取 45 例伤者使用本发明治疗;其中男性 26 例,女性 19 例,年龄 35-72 岁,平均年龄 57 岁。

[0017] 2 治疗方法:清洗干净患处皮肤表面,使用本发明膏药贴于患处,每贴使用 3 天,4 贴为一个疗程。

[0018] 3 疗效判定标准:

治愈：肿胀疼痛完全消失，肢体恢复正常功能。

[0019] 好转：伤处或附近关节功能正常，但剧烈活动后患处有轻微肿胀或疼痛。

[0020] 无效：休息时患处微感不适，并轻度肿胀，长时间剧烈活动或负重后患处漫肿不消，并有较严重的疼痛不适。

[0021] 采用本发明膏药对 45 位患者进行治疗，连续治疗 2 个疗程后，统计患者治疗情况，其中：总有效率 = 治愈率 + 好转率，见表 1：

治疗效果		治愈	好转	无效	总有效率
45 例	第一个疗程	15	19	11	75.5%
	第二个疗程	27	14	4	91%

[0022] 4 典型病例举例：

患者 1, 胡某某, 男, 42 岁, 手背被重物击伤, 疼痛难忍, 有淤血, 用本发明膏药 2 贴, 疼痛明显减轻, 继续用 2 贴后, 淤血、疼痛消除。

[0023] 患者 2, 姜某某, 男, 31 岁, 因跑步导致脚踝关节扭伤, 未做治疗, 一直脚踝旋转疼痛、且脚踝区按压疼痛, 4 周后用本发明膏药治疗, 一个疗程症状全部消除, 痊愈。

[0024] 患者 3, 马某某, 女, 17 岁, 因滑倒造成腿部和腰部内伤疼痛、内瘀血, 引起血液循环障碍。后用本发明药膏 2 贴后患处疼痛好转; 继续用 2 贴患处疼痛消除, 全部症状痊愈。

[0025] 患者 4, 周某某, 男, 45 岁, 职业司机, 因发生车祸, 手和腿软组织内伤, 疼痛瘀血, 局部紫黑明显, 用本发明膏药 1 疗程后出现好转, 减少痛感, 肿胀也开始消减。再连续用 1 疗程疼痛基本消除。

[0026] 患者 5, 梁某某, 男, 35 岁, 因不慎骑自行车摔倒, 左腿和臂部大部损伤, 出现肿胀、疼痛, 后住院治疗, 但患处还是出现疼痛, 红肿等症状, 使用本发明膏药 2 贴后疼痛、红肿等症状明显改善, 1 个疗程后痊愈。

[0027] 上述对本发明的具体示例性实施方案的描述是为了说明和例证的目的。这些描述并非想将本发明限定为所公开的精确形式, 并且很显然, 根据上述教导, 可以进行很多改变和变化。对示例性实施例进行选择 and 描述的目的在于解释本发明的特定原理及其实际应用, 从而使得本领域的技术人员能够实现并利用本发明的各种不同的示例性实施方案以及各种不同的选择和改变。本发明的范围意在由权利要求书及其等同形式所限定。