



(12) 发明专利

(10) 授权公告号 CN 103055052 B

(45) 授权公告日 2015. 04. 01

(21) 申请号 201310013219. 0

审查员 田洪旻

(22) 申请日 2013. 01. 15

(73) 专利权人 张成海

地址 236300 安徽省阜阳市阜南县鹿城镇地
城北路 393 号张成海医疗按摩室

(72) 发明人 张成海

(74) 专利代理机构 安徽合肥华信知识产权代理
有限公司 34112

代理人 余成俊

(51) Int. Cl.

A61K 36/87(2006. 01)

A61K 9/06(2006. 01)

A61P 17/02(2006. 01)

(56) 对比文件

CN 101632773 A, 2010. 01. 27, 权利要求
1-10 和说明书摘要 .

权利要求书1页 说明书3页

(54) 发明名称

一种治疗烧伤、烫伤的膏剂及其制备方法

(57) 摘要

本发明公开了一种治疗烧伤、烫伤的膏剂,其各原料组分的重量配比为:木鳖子 15-20、金银花 15-20、紫草 15-20、地榆 10-15、大黄 10-15 等。按照配方选取上述中药物,清除杂质,洗净后干燥、粉碎。将上述处理后的中药物放入葵花油、蜂蜡中,浸 5 小时,得到药油混合物。将药油混合物放入铁锅中循环加热冷凉,药油混合物温度降至 50℃后,过滤得到溶液,密封,隔光即可。本发明外用于患者,为治疗中、重度烧伤、烫伤的膏剂中药组合物。且为纯中草药治剂,用后无副作用,消肿止痛,收敛快,结痂好,治愈率高。

1. 一种治疗烧伤、烫伤的膏剂,其特征在于:其各原料组分的重量配比为:木鳖子 15-20、金银花 15-20、紫草 15-20、地榆 10-15、大黄 10-15、川芎 15-20、黄连 10-15、当归 15-20、黄柏 15-20、红花 20-25、白蔹 10-15、白芷 10-15、赤芍 10-15、黄芩 10-15、樟脑 20-25、蜂蜡 10-15、没药 10-14、丹皮 12-16、苦参 12-16、木芙蓉 15-20、葵花油 2000---3000、来马回 10-14、车桑仔根 10-15;

所述的治疗烧伤、烫伤的膏剂的制备方法,依次按照以下步骤进行:

①按照配方选取上述中药物,清除杂质,洗净后干燥,使得中药物的水分含量小于 10%,粉碎过 80 目筛;

②将上述处理后的中药物放入葵花油、蜂蜡中,浸 5 小时,得到药油混合物;

③将药油混合物放入铁锅中烧至沸腾后停火;药油混合物降至 30-40℃时,小火 2—3 小时;冷凉后,再加热到 50—70℃,中火 1—2 小时;冷凉后,再加热至 90—100℃,大火 10—20 分钟;

④药油混合物温度降至 50℃后,过滤后得到溶液,密封,隔光,即可。

2. 根据权利要求 1 所述的一种治疗烧伤、烫伤的膏剂,其特征在于:其各原料组分的重量配比为:木鳖子 19、金银花 18、紫花 18、地榆 14、大黄 14、川芎 16、黄连 13、当归 18、黄柏 18、红花 23、白蔹 14、白芷 14、赤芍 15、黄芩 13、樟脑 22、蜂蜡 11、没药 12.5、丹皮 14.5、苦参 12-16、木芙蓉 18.5、葵花油 2000---3000、来马回 12、车桑仔根 13。

一种治疗烧伤、烫伤的膏剂及其制备方法

技术领域

[0001] 本发明涉及中药领域,具体涉及一种治疗烧伤、烫伤的膏剂及其制备方法。

背景技术

[0002] 烧伤、烫伤,皆因外界火烧、水烫(及化学药物)过度伤害和侵袭皮肤创伤所致。特别是中度和重度烧伤、烫伤,首先造成疼痛和肌肉溃烂,如不及时医治,病邪和细菌侵入,轻者疼痛加重,扩大创伤面积;重者人体发烧、昏迷皮肤,更重者肌肉扩大溃烂,延至骨髓,产生坏血症,导致死亡。目前治疗深2度和3度度烧伤、烫伤的药物,纵然品种繁多,但伤口愈合慢,一些医疗单位采用植皮等技术治疗,但有20%植皮不成功,且费用高,效果很不理想。

[0003] 发明内容:

[0004] 本发明的目的是提供一种更为有效的治疗中重度烧伤、烫伤的膏剂及其制备方法。且为纯中草药治剂,用后无副作用,药效好,消肿止痛,收敛快,结痂好,治愈高。

[0005] 为实现上述目的本发明采用如下技术方案:

[0006] 一种治疗烧伤、烫伤的膏剂,其特征在于:其各原料组分的重量配比为:木鳖子15-20、金银花15-20、紫草15-20、地榆10-15、大黄10-15、川芎15-20、黄连10-15、当归15-20、黄柏15-20、红花20-25、白芷10-15、白芨10-15、赤芍10-15、黄芩10-15、蟑螂20-25、蜂蜡10-15、没药10-14、丹皮12-16、苦参12-16、木芙蓉15-20、葵花油2000—3000、来马回10-14、车桑仔根10-15。

[0007] 一种治疗烧伤、烫伤的膏剂,其特征在于:其各原料组分的重量配比为:木鳖子19、金银花18、紫花18、地榆14、大黄14、川芎16、黄连13、当归18、黄柏18、红花23、白芷14、白芨14、赤芍15、黄芩13、蟑螂22、蜂蜡11、没药12.5、丹皮14.5、苦参12-16、木芙蓉18.5、葵花油2000—3000、来马回12、车桑仔根13。

[0008] 一种治疗烧伤、烫伤的膏剂的制备方法,其特征在于:依次按照以下步骤进行:①按照配方选取上述中药物,清除杂质,洗净后干燥,使得中药物水分含量小于10%,粉碎过80目筛。②将上述处理后的中药物放入葵花油、蜂蜡中,浸5小时,得到药油混合物。③将药油混合物放入铁锅中烧至沸腾(液体温度100℃)后停火;药油混合物降至30—40℃时,小火2—3小时;冷凉后,再加热到50—70℃,中火1—2小时;冷凉后,再加热至90—100℃,大火10—20分钟。④药油混合物温度降至50℃后,取出医用纱布过滤;过滤后的溶液,无沉淀物,黄棕色;放入容器中密封,隔光,待用。

[0009] 本发明膏剂的用法:①把烧伤、烫伤伤口,用无菌蒸馏水清洗。②把本发明膏剂,涂抹在伤口创面上。③将创面,用无菌纱布包扎。④每天1次,6天内可消痛去肿,7—10天收敛伤口,15—20天可结痂,25—30天即可痊愈。

[0010] 本发明选择的16位中草药组合使用,使得各种药物功效产生协调作用,从而能够更有效治疗烧伤、烫伤。其中,木鳖子、当归、红花、大黄、白芷这6种药是性温,可入各藏府、经络,散积实,行瘀止血,清热解毒,消炎止痛,消肿散血,并可追脓水,去腐肉,散郁火,收敛伤口。金银花、川芎、地榆、黄连、黄柏、白芷、三条筋这8种药都是性寒,可入各藏府、经脉,

去燥湿,破积滞,清热解毒,追毒消肿,排脓长肉,生肌敛口。蟑螂、蜂蜡这 3 种药,清热燥湿、泻火解毒、破瘀化积、生肌敛疮。黄柏味苦,入肾、膀胱、大肠经;清热,解毒泻火,坚肾益阴;治疗急慢性化脓炎症。地榆味甘苦,入肝、大肠经,凉血止血,清热解毒,收敛止痛,治疗烧伤、烫伤。来马回味苦,入心包经、肝经,清热、解毒、透疹,治疗水火烫伤。木鳖子味苦、有毒,入肝、胃、脾经;消肿散血,解毒止痛;主治恶疮、痛肿、痞块。车桑子根味苦、寒,入肺、胆、脾、肾经;功效清热燥湿,泻火解毒,止血;对绿脓杆菌有特效。蟑螂味辛、咸、寒,有小毒;入肝、脾肾经,功效破瘀化积,解毒消肿;内含生物肽,对多种细菌有杀灭作用。蜂蜡味酸、甘;入肝、脾经;功效散结止痛,生肌敛疮。

[0011] 本发明的有益效果:

[0012] 本发明的中药组合物可以治疗中度、重度不同类型的烧伤、烫伤,为纯中草药用后无副作用,药效好,结痂快,治愈高。

[0013] 具体实施方式。

[0014] 一种治疗烧伤、烫伤的膏剂,其各原料组分的重量(g)为:木鳖子 19、金银花 18、紫花 18、地榆 14、大黄 14、川芎 16、黄连 13、当归 18、黄柏 18、红花 23、白蔹 14、白芷 14、赤芍 15、黄芩 13、蟑螂 22、蜂蜡 11、没药 12.5、丹皮 14.5、苦参 12-16、木芙蓉 18.5、葵花油 2000—3000、来马回 12、车桑子根 13。

[0015] 一种治疗烧伤、烫伤的膏剂的制备方法,依次按照以下步骤进行:①按照配方选取上述中药物,清除杂质,洗净后干燥,使得中药物水分含量小于 10%,粉碎过 80 目筛。②将上述处理后的中药物放入葵花油、蜂蜡中,浸 5 小时,得到药油混合物。③将药油混合物放入铁锅中烧至沸腾(液体温度 100℃)后停火;药油混合物降至 30—40℃时,小火 2—3 小时;冷凉后,再加热到 50—70℃,中火 1—2 小时;冷凉后,再加热至 90—100℃,大火 10—20 分钟。④药油混合物温度降至 50℃后,取出医用纱布过滤;过滤后的溶液,无沉淀物,黄棕色;放入容器中密封,隔光,待用。

[0016] 为证明本发明膏剂的诊断疗效,特提供以下资料:

[0017] 1、收治门诊:①烧伤、烫伤皮肤剧烈疼痛;②烧伤(深 2—3 度);③烫伤(深 2—3 度);3 类患者 45 例,其中年龄 20—30 岁 12 例,30—40 岁 10 例,40—50 岁 15 例,50 岁以上者 8 例。

[0018] 2、诊断标准:①烧伤、烫伤引起的皮肤剧烈疼痛;②烧伤、烫伤引起的皮肤和肌肉溃烂,中度昏迷。

[0019] 根据患者病情临床可分 3 种类型。

[0020] 轻度患者:烧伤、烫伤引起的皮肤剧烈疼痛。

[0021] 中度患者:深 2 度烧伤、烫伤,皮肤溃烂并伴有剧烈疼痛。

[0022] 重度患者:深 3 度烧伤、烫伤,皮肤溃烂,并伤及肌肉,剧烈疼痛及中度昏迷。

[0023] 3、治疗方法:①把烧伤、烫伤伤口,用无菌蒸馏水清洗。②把制备的烧伤、烫伤的中药膏剂组合物,涂抹在伤口创面上。③将创面,用无菌纱布包扎。④每天 1 次,6 天内可消肿去肿,7—10 天收敛伤口,15—20 天可结痂,25—30 天即可痊愈。

[0024] 4、疗效评定标准

[0025] 治愈:用药后,伤口愈合,肌体功能恢复正常。

[0026] 好转:伤口逐步恢复正常,疼痛明显减轻,部位逐步好转。

[0027] 5、治疗结果：①烧伤、烫伤引起的皮肤疼痛，治疗及时可立即镇痛，2-5 天痊愈。治疗 8 例，治愈率为 100 %。②浅 2 度烧伤、烫伤，皮肤溃烂并伴有剧烈疼痛。治疗 25 例，治疗率为 100%。③深 2 度和 3 度烧伤、烫伤，皮肤溃烂并伤及肌肉，剧烈疼痛，活动受限，不能行走。治愈 11 例，好转 1 例，治愈率为 92. 3%，好转率为 7. 6%，总有效率为 99. 9%。