



(12) 发明专利申请

(10) 申请公布号 CN 104740405 A

(43) 申请公布日 2015. 07. 01

(21) 申请号 201510172195. 2

(22) 申请日 2015. 04. 14

(71) 申请人 房经富

地址 276800 山东省日照市东港区望海路
35 号日照市中医医院

(72) 发明人 房经富

(51) Int. Cl.

A61K 36/899(2006. 01)

A61P 13/12(2006. 01)

A61P 7/04(2006. 01)

A61K 35/32(2015. 01)

A61K 35/64(2015. 01)

权利要求书1页 说明书8页

(54) 发明名称

一种治疗过敏性紫癜性肾损害的中药制剂及制备方法

(57) 摘要

本发明公开了一种治疗过敏性紫癜性肾损害的中药制剂,它是由黄芪、金银花、蒲公英、防风、生地黄、白鲜皮、地肤子、当归、黄芩、赤芍、白芍、牡丹皮、墨旱莲、紫草、蝉蜕、槐花、水牛角、藕节、白茅根、仙鹤草、桑白皮、玄参、生甘草按照一定的重量配比组成,具有清热解毒、补气升阳、养阴生津、散瘀止痛的功效,能够有效治疗过敏性紫癜性肾损害。

1. 一种治疗过敏性紫癜性肾损害的中药制剂,其特征在於,该中药制剂是由以下重量份的药物组成:黄芪 45-55 份、金银花 10-20 份、蒲公英 13-23 份、防风 4-14 份、生地黄 15-25 份、白鲜皮 7-17 份、地肤子 10-20 份、当归 10-20 份、黄芩 7-17 份、赤芍 7-17 份、白芍 10-20 份、牡丹皮 7-17 份、墨旱莲 10-20 份、紫草 7-17 份、蝉蜕 3-9 份、槐花 4-14 份、水牛角 13-23 份、藕节 7-17 份、白茅根 15-25 份、仙鹤草 19-29 份、桑白皮 7-17 份、玄参 7-17 份、生甘草 3-9 份。

2. 根据权利要求书 1 所述的治疗过敏性紫癜性肾损害的中药制剂,其特征在於,由以下重量份的药物组成:黄芪 50 份、金银花 15 份、蒲公英 18 份、防风 9 份、生地黄 20 份、白鲜皮 12 份、地肤子 15 份、当归 15 份、黄芩 12 份、赤芍 12 份、白芍 15 份、牡丹皮 12 份、墨旱莲 15 份、紫草 12 份、蝉蜕 6 份、槐花 9 份、水牛角 18 份、藕节 12 份、白茅根 20 份、仙鹤草 24 份、桑白皮 12 份、玄参 12 份、生甘草 6 份。

3. 根据权利要求 1 或 2 所述的治疗过敏性紫癜性肾损害的中药制剂,其特征在於:所述中药制剂为汤剂。

4. 一种治疗过敏性紫癜性肾损害的中药制剂的制备方法,其特征在於,制备方法如下:
步骤一:按本发明重量配比,称取黄芪、防风、生地黄、白鲜皮、当归、黄芩、赤芍、白芍、牡丹皮、紫草、白茅根、桑白皮、玄参放入砂锅中加入冷水,超过药面 3-6 厘米,用武火煮沸后,转为文火煎煮 20-30 分钟,过滤,得滤液,在剩余药渣中加入 3-4 厘米的水,加入蒲公英、地肤子、墨旱莲、仙鹤草以及用纱布包好的藕节,煎煮 20-30 分钟,最后加入金银湖、槐花、生甘草煎煮 15 分钟,过滤,得滤液,合并两次滤液,弃渣,备用;步骤二:按本发明重量配比,称取蝉蜕、水牛角进行研磨粉碎、过 180 目筛,备用;步骤三:将步骤二所得细粉加入步骤一所得药液中搅拌混合均匀,既得本发明所述的治疗过敏性紫癜性肾损害的中药汤剂,汤剂分两次服用,早晚各一次,温服。

一种治疗过敏性紫癜性肾损害的中药制剂及制备方法

技术领域

[0001] 本发明涉及一种中药制剂,具体涉及一种治疗过敏性紫癜性肾损害的中药制剂。本发明还涉及该中药制剂的制备方法。

背景技术

[0002] 过敏性紫癜性肾损害(Henoch-Schonlein purpura, HSP, anaphylactoid purpura)是一组以变态反应所致的广泛性毛细血管炎为主要病理基础的临床综合征,包括特征性皮疹、腹部绞痛、关节痛及肾小球肾炎,有时还出现上消化道出血。由于皮肤病变并不是该病仅有的特征,许多学者认为不能单纯称为“过敏性紫癜”,而用“Henoch-Schonlein-Henoch 综合征”称之更加恰当。由于过敏性紫癜病人约 1/3 以上出现肾损害,其预后主要取决于肾病变的严重程度,因此将过敏性紫癜所引起的肾损害称为过敏性紫癜性肾炎。

[0003] 中医认为过敏性紫癜性肾小球肾炎发病之初,多有外感病史,其病机多为患者素有血热内蕴,复因外感、饮食、虫毒、药物或化学毒素等触动,风热相搏,灼伤血络,以致迫血妄行,外溢肌肤,内迫肠胃,甚者及肾,故有皮肤紫癜,腹痛频作,甚则便血、尿血等;久则伤及肾阴,致阴虚火旺,火热灼伤血络,伤及肾与膀胱血络,而见紫斑、尿血。因此可以认为,过敏性紫癜性肾炎之阴虚火旺既是温热病邪日久热耗津液的病理产物,又是继续引起紫斑、尿血的病因病机;久病失治误治,则可伤及脾肾,致脾肾两虚,脾气不足,则运化失职,水湿不运,肾气不足,则不能化气行水,导致膀胱气化失司,开合不利,脾肾气虚,水湿泛滥则身肿,肾失开合则尿闭,从而形成过敏性紫癜性肾炎的尿少、水肿等临床表现。综上所述,过敏性紫癜性肾炎主要与肺、脾、肾三脏功能失常有关,尤与脾肾两脏关系密切。即所谓“其标在肺,其本在肾,其制在脾”。风热内侵,血分伏热,瘀血阻滞及脾肾气血阴阳的失衡是本病的病机。

[0004] 由于过敏性紫癜性肾损害的病因目前尚不明朗,主要考虑与感染和变态反应有关,因此目前西药还没有确切的治疗此病的药物,肾上腺皮质激素等虽然对紫癜效果明显,但是对紫癜性肾炎疗效却不理想,因此现在迫切需要一种治疗过敏性紫癜性肾损伤的药物。

发明内容

[0005] 本发明的目的是提供一种中药制剂,该中药制剂对于治疗过敏性紫癜性肾损害具有疗效显著,价格低廉,无毒副作用,标本兼治的特点。

[0006] 本发明的另一目的是提供该治疗过敏性紫癜性肾损害的中药制剂的制备方法。

[0007] 发明人在多年的临床医疗实践中,观察到过敏性紫癜性肾损害给患者带来的痛苦,根据该病症的发展规律,以及中药的配伍原则,并通过大量的临床验证,反复探索总结出一种治疗过敏性紫癜性肾损害的中药制剂的新配方,本发明选择黄芪、金银花、蒲公英、防风、生地黄、白鲜皮、地肤子、当归、黄芩、赤芍、白芍、牡丹皮、墨旱莲、紫草、蝉蜕、槐花、水牛角、藕节、白茅根、仙鹤草、桑白皮、玄参、生甘草进行组合,将这些药物组合使得各药物功

效产生协同作用,使之具有清热解毒、补气升阳、养阴生津、散瘀止痛的功效,从而能够有效治疗过敏性紫癜性肾损害。

[0008] 本发明中药物的作用:

其中:

黄芪:为豆科植物蒙古黄芪 *Astragalus membranaceus* (Fisch.) Bge. var. *mongholicus* (Bge.) Hsiao 或膜荚黄芪 *Astragalus membranaceus* (Fisch.) Bge. 的干燥根。性味:甘,微温。归肺、脾、肝、肾经。功效:补气升阳、固表敛汗、利水消肿、托疮排脓、通调水道。在《本草汇言》中有记载:“黄芪,补肺健脾,实卫敛汗,驱风运毒之药也。故阳虚之人,自汗频来,乃表虚而腠理不密也,黄芪可以实卫而敛汗;伤寒之证,行发表而邪汗不出,乃里虚而正气内乏也,黄芪可以济津以助汗;贼风之疴,偏中血脉而手足不随者,黄芪可以荣筋骨;痈疡之证,脓血内溃,阳气虚而不敛者,黄芪可以生肌肉,又阴疮不能起发,阳气虚而不愈者,黄芪可以生肌肉。”本品在体外对志贺氏痢疾杆菌、炭疽杆菌、甲型溶血性链球菌、乙型溶血性链球菌、白喉杆菌、假白喉杆菌、肺炎双球菌、金黄色葡萄球菌、柠檬色葡萄球菌、枯草杆菌等均有抑制作用。黄芪擅长补中益气,为补气升阳的要药,并且补气利尿,以消肿。另外用黄芪治疗慢性肾炎有一定的疗效。

[0009] 金银花:为忍冬科植物忍冬 *Lonicera japonica* Thunb.、红腺忍冬 *Lonicera hypoglauca* Miq.、山银花(毛萼忍冬) *Lonicera confusa* DC. 或毛花柱忍冬 *Lonicera dasystyla* Rehd. 的干燥花蕾或带初开的花。性味:甘、寒。归肺、心、胃经。功效:清热解毒,疏风散热。本品性味甘寒,既能清热解毒,又善散痈消肿,为治疗一切阳证痈肿疔疮的要药。临床上用于痈疽疔毒:常与紫地丁、野菊花等同用,能增强清热解毒作用,可用以痈疽疔毒,红肿疼痛。古方记载,金银花治一切肿毒,不问已溃未溃,或初起发热,并疔疮便毒,喉痹乳蛾:金银花(连茎叶)自然汁半碗,煎八分服之,以滓敷上,败毒托里,散气和血,其功独胜。

[0010] 蒲公英:蒲公英又称尿床草,为菊科植物蒲公英 *Toraxacum mongolicum* Hand. Mazz.、碱地蒲公英 *Toraxacum borealisinense* Kitam. 或同属数种植物的干燥全草。性味:甘、微苦、寒。归肝、胃经。功效:清热解毒,消肿散结。蒲公英具有消炎、抗菌、抗肿瘤、清热解毒的功效,现代临床上应用范围广,作用好。用于疔疮肿毒,乳痈,瘰疬,目赤,咽痛,肺痈,肠痈,湿热黄疸,热淋涩痛。

[0011] 防风:为伞形科植物防风 *Saposhnikovia divaricata* (Turcz.) Schischk. 的干燥根。性味:辛、甘、微温。归膀胱、肺、脾、肝经。功效:祛风解表、胜湿止痛、解痉、止痒。用于外感表证或风疹瘙痒。本品性微温而不燥,甘缓而不峻,有“风药中之润剂”之称,不论风寒、风热表证均可应用。本品还可用于破伤风、牙关紧闭、角弓反张。防风治破伤风,有祛风止痉的作用。

[0012] 生地黄:为玄参科植物地黄 *Rehmannia glutinosa* Libosch. 的新鲜或干燥块根。性味:甘、寒。归心、肝、肾经。功效:清热凉血,养阴生津。可用于津伤口渴,内热消渴。本品甘寒,能于清热之中养阴生津,性寒而入血分,不仅能清营血分之热而凉血,而且味甘性寒能生津,有滋阴清热的作用,常与麦冬、沙参等同用。用于治疗血热吐衄,便血崩漏,温病热入营血,常与牡丹皮,赤芍同用。

[0013] 白鲜皮:是芸香科多年生草本植物白鲜 *Dictamnus dasycarpus* Turcz. 的根皮。性味:苦、咸、寒。归脾、肺、小肠、胃、膀胱经。功能:清热燥湿;祛风止痒;解毒。《药性论》:

“治一切热毒风,恶风,风疮、疥癣赤烂,眉发脱脆,皮肤急,壮热恶寒;主解热黄、酒黄、急黄、谷黄、劳黄等。”现代药理学研究,白鲜皮具有抗菌作用:体外试验 1:4 的水浸液对多种致病真菌如堇色毛癣菌、同心性毛癣菌、许兰氏黄癣菌,均有不同程度的抑制作用,但有报告本品的乙醚、乙醇和水提取物对金黄色等球菌、大肠杆菌绿脓杆菌和草分枝杆菌均未见效果。

[0014] 地肤子:为藜科植物地肤 *Kochia scoparia* (L.) Schrad. 的干燥成熟果实。性味:辛、苦,寒。归肾、膀胱经。功效:清热利湿,祛风止痒。用于小便涩痛,阴痒带下,风疹,湿疹,皮肤瘙痒。

[0015] 当归:为伞形科植物当归 *Angelica sinensis* (Oliv.) Diels 的干燥根。性味:甘、辛、苦,温。归肝、心、脾经。功效:补血;活血;调经止痛;润燥滑肠。当归对中枢神经系统有抑制作用,挥发油有镇静、催眠、镇痛、麻醉等作用。用于血虚萎黄、眩晕心悸、虚寒腹痛、风湿痹痛、跌扑损伤、痈疽疮疡。据《本草正》载:“其味甘而重,故专能补血,其气轻而辛,故又能行血,能养营养血,补气生精,安五脏,强形体,益神志,凡有形虚损之病,无所不宜。”现代医学研究证实,当归具有抗菌、消炎作用,当归热水提取物对慢性风湿关节炎急性发作时有明显的抑制作用。

[0016] 黄芩:为唇形科植物黄芩 *Scutellaria baicalensis* Georgi 的干燥根。性味:苦,寒。归肺、胆、脾、胃、大肠、小肠经。功效:清热燥湿,泻火解毒,止血,安胎,降血压。黄芩的临床应用抗菌比较好,而且不产生抗药性。本品有清热凉血止血之功,用治火热炽盛,迫血妄行的吐血,崩漏,便血等。

[0017] 赤芍:为毛茛科植物芍药 *Paeonia lactiflora* Pall. 或川赤芍 *Paeonia veitchii* Lynch 的干燥根。性味:苦,微寒。归肝经。功效:散瘀止痛,清热凉血,消肿。用于温毒发斑,吐血衄血,目赤肿痛,肝郁胁痛,经闭痛经,症瘕腹痛,跌扑损伤,痈肿疮疡。本品苦降,有活血通经、散瘀消癥、行滞止痛的功效。常配牡丹皮。用于温热病热入血分,本品苦寒,主入肝经,善走血分,能清肝火,除血分郁热而有凉血、止血、散瘀消斑之功。

[0018] 白芍:为双子叶植物毛茛科植物芍药 *Paeonia lactiflora* Pall. 的干燥根。性味:凉,苦酸,微寒。功效:补血柔肝、平肝止痛,敛阴收汗。研究表明:白芍中含有的芍药甙有抗菌、解热、抗炎、增加冠状动脉流量、改善心肌营养血流、扩张血管、对抗急性心肌缺血、抑制血小板聚集、镇静、镇痛、解痉、抗溃疡、调节血糖的作用。白芍煎剂能抑制痢疾杆菌、肺炎链球菌、大肠杆菌、伤寒杆菌、溶血性链球菌、绿脓杆菌等。本品能养肝血、敛肝阴、抑肝阳、疏肝气,又能缓挛急、止疼痛,为治疗肝经各种疼痛之良药。

[0019] 牡丹皮:为毛茛科植物牡丹 *Paeonia suffruticosa* Andr. 的干燥根皮。性味:苦,凉。归心、肝、肾、肺经。功效:清热凉血,活血散瘀。牡丹皮和赤芍均能清热凉血,活血化瘀,用治温热病入血分。牡丹皮凉血之力较强,既能清血分实热,又能治阴虚发热,赤芍活血之功较胜,善治淤血所致的痛症。本品性微寒,能清营分、血分实热,有凉血止血之功,并且牡丹皮辛寒,善入血分,既能凉血以止血,又能活血以散瘀,善通血热瘀滞,常与生地黄、赤芍同用。对于疮痈肿毒、肠痈等症,本品也是常用的药物。疗疮痈可配合清热解毒药如连翘、地丁草之类;治肠痈初起未能脓者可和大黄等同用。本品通过清热凉血、活血散瘀以消痈,可用于肠痈及痈肿疮毒,肠痈初期可配伍大黄,也可配金银花、连翘等清热降火。

[0020] 墨旱莲:为菊科植物鳢肠 *Eclipta prostrata* L. 的干燥地上部分。性味:甘、酸,寒。归肾、肝经。功效:滋补肝肾,凉血止血。用于牙齿松动,须发早白,眩晕耳鸣,腰膝酸

软,阴虚血热、吐血、衄血、尿血,血痢,崩漏下血,外伤出血。

[0021] 紫草:为紫草科植物紫草(硬紫草) (*Lithospermum erythrorhizon* sieb. et zucc.) 和新疆紫草(软紫草) [*Arnebia euchroma* (Royle) Johnston.] 的根。性味:寒、甘、咸。归经:归心、肝经。功能:凉血,活血,解毒透疹。用于血热毒盛、斑疹紫黑、麻疹不透、疮疡、湿疹、水火烫伤。清热凉血,用于麻疹,热病痲疹,湿疹,尿血,血淋,血痢,疮疡,丹毒,烧伤,热结便秘。

[0022] 蝉蜕:为蝉科昆虫黑蚱 *Cryptotympana pustulata* Fabricius 的幼虫羽化时脱落的皮壳。性味:甘、寒。归肺、肝经。功效:疏散风热、透疹止痒、明目退翳、息风止痉。本品宣散透发,疏风散热,透疹止痒可用于治疗麻疹、湿疹等。

[0023] 槐花:为豆科植物槐 *Sophora japonica* L. 的干燥花及花蕾。性味:苦,微寒。归肝、大肠经。功效:凉血止血,清肝泻火。用于便血,痔血,血痢,崩漏,吐血,衄血,肝热目赤,头痛眩晕。

[0024] 水牛角:为牛科动物水牛 *Bubalus bubalis* Linnaeus 的角。性味:苦,寒。归心、肝经。功效:清热解毒,凉血,定惊。用于温病高热,神昏谵语,发斑发疹,吐血衄血,惊风,癲狂。

[0025] 藕节:为睡莲科植物莲 *Nelumbo nucifera* G. 的肥大根茎。性味:平、甘、涩。归经:胃、肝、肾。功效:止血,散瘀。治咳血,吐血,衄血,尿血,便血,血痢,血崩。本品甘涩性平,即能收敛止血,又能散瘀血,具有止血不留瘀之特点,惟药力较缓,常作辅助止血药用。藕的节部。用于衄血、咳血、吐血、便血、尿血和妇女崩漏,以失血而有瘀血者最为适宜。单用,或配伍适当的药物。

[0026] 白茅根:为禾本科植物多年生草本白茅 *Imperata cylindrica* 的根茎。性味:甘,寒。归肺、胃、膀胱经。功效:凉血止血,清热利尿。用于血热吐血,衄血,尿血,热病烦渴,黄疸,水肿,热淋涩痛;急性肾炎水肿。《本草经疏》记载:劳伤虚羸,必内热,茅根甘能补脾,甘则虽寒而不犯胃。甘寒能除内热,故主劳伤虚羸。益脾所以补中,除热所以益气,甘能益血,血热则瘀,瘀则闭,闭则寒热作矣,寒凉血,甘益血,热去则血和,和则瘀消而闭通,通则寒热自止也。小便不利,由于内热也,热解则便自利。淋者,血分虚热所致也,凉血益血,则淋自愈,而肠胃之客热自解,津液生而渴亦止矣。肝藏血而主筋,补血凉肝,则筋坚矣。血热则崩,凉血和血,则崩自愈矣。血热则妄行,溢出上窍为吐、为咯、为鼻衄、齿衄,凉血和血,则诸证自除。益脾补中,利小便,故亦治水腫黄疸,而兼理伤寒嘔逆也。

[0027] 仙鹤草:为蔷薇科多年生草本植物龙芽草 *Agrimonia pilosa* Ledeb. 的地上部分。性味:苦、涩、平。归心、肝经。功效:收敛止血,解毒,止痢,杀虫截虐。用于咳血、吐血、治流鼻血有特效、疟疾、脱力劳伤、痲肿。本品味涩收敛而性平,不论寒热虚实的出血证皆可应用。治疗血热出血常与生地黄、丹皮同用。

[0028] 桑白皮:为桑科植物桑 *Morus alba* L. 的干燥根皮。性味:甘,寒。归肺经。功效:泻肺平喘,利水消肿。用于肺热喘咳,水肿胀满尿少,面目肌肤浮肿。本品能清降肺气、通调水道而利水消肿,用治全身水肿、小便不利、面目浮肿者,常配茯苓皮、大腹皮等同用。

[0029] 玄参:为玄参科植物玄参 *Scrophularia ningpoensis* Hemsl. 的干燥根。性味:甘、苦、咸,微寒。归肺、胃、肾经。功效:清热凉血,泻火解毒,滋阴。用于:温热病热入营血,热病伤阴之证。有清热凉血,解毒滋阴的功效。

[0030] 生甘草：为豆科植物甘草 *Glycyrrhiza uralensis* Fisch.，胀果甘草 *Glycyrrhiza Inflatata* Bat. 或光果甘草 *Glycyrrhiza Glabra* L. 的干燥根及根茎。性味：甘，平。归心、肺、脾、胃经。功效：补脾和胃，益气复脉。《日华子本草》：安魂定魄。补五劳七伤，一切虚损、惊悸、烦闷、健忘。通九窍，利百脉，益精养气，壮筋骨，解冷热。

[0031] 本发明的方解是：方中黄芪补气升阳、通调水道，金银花清热解毒、疏风散热，蒲公英清热解毒、消肿散结，防风祛风解表、胜湿止痛，生地黄清热凉血、养阴生津，白鲜皮清热燥湿、祛风止痒，以上六味共为君药，黄芪从根本上儒养肾脏，控制病情的发展，防止累及其他脏器，金银花、蒲公英清热解毒，疏风散热，可以有效的治疗慢性肾炎，还具有广谱抗菌作用，阻止炎症的反复复发，其他几味，清热凉血，可以治疗过敏性紫癜所引起的血瘀、风热等症状。地肤子清热利湿、祛风止痒，当归补血活血，黄芩清热燥湿、泻火解毒，赤芍散瘀止痛，白芍补血柔肝、平肝止痛，牡丹皮清热凉血、活血散瘀，墨旱莲、紫草滋补肝肾、凉血止血，以上八味共为臣药，增加君药药效的同时，还能缓解过敏性紫癜性肾损害所带来的其他并发症。蝉蜕疏散风热、透疹止痒，槐花凉血止血、清肝泻火，水牛角清热解毒，藕节止血散瘀，白茅根清热利尿，仙鹤草收敛止血，桑白皮利水消肿，玄参清热凉血、泻火解毒，以上几味共为佐药，从多方面入手，滋养患者肾、脾、肺三脏，从而提高治愈率，生甘草调和诸药，引药归经，为使药。此方诸药合用，君臣协力，佐使共辅，具有清热解毒、补气升阳、养阴生津、散瘀止痛的功效，能够有效治疗过敏性紫癜性肾损害。

[0032] 本发明药物原料用量是经发明人进行大量摸索总结得出的，各原料用量为在下述重量份范围都具有较好的疗效：黄芪 45-55 份、金银花 10-20 份、蒲公英 13-23 份、防风 4-14 份、生地黄 15-25 份、白鲜皮 7-17 份、地肤子 10-20 份、当归 10-20 份、黄芩 7-17 份、赤芍 7-17 份、白芍 10-20 份、牡丹皮 7-17 份、墨旱莲 10-20 份、紫草 7-17 份、蝉蜕 3-9 份、槐花 4-14 份、水牛角 13-23 份、藕节 7-17 份、白茅根 15-25 份、仙鹤草 19-29 份、桑白皮 7-17 份、玄参 7-17 份、生甘草 3-9 份。

[0033] 其中优选为：黄芪 50 份、金银花 15 份、蒲公英 18 份、防风 9 份、生地黄 20 份、白鲜皮 12 份、地肤子 15 份、当归 15 份、黄芩 12 份、赤芍 12 份、白芍 15 份、牡丹皮 12 份、墨旱莲 15 份、紫草 12 份、蝉蜕 6 份、槐花 9 份、水牛角 18 份、藕节 12 份、白茅根 20 份、仙鹤草 24 份、桑白皮 12 份、玄参 12 份、生甘草 6 份。

[0034] 本发明药物可以采用中药制剂的常规方法制备成任何常规内服制剂，如丸剂、散剂、片剂、口服液等。例如可以将这些原料药研成粉末混合均匀制成散剂冲服；可以用水煎，经过滤得滤液，加入防腐剂制成口服液；必要时也可以直接服用汤剂。

[0035] 本发明优选的制备方法是汤剂，其制备方法如下：

步骤一：按本发明重量配比，称取黄芪、防风、生地黄、白鲜皮、当归、黄芩、赤芍、白芍、牡丹皮、紫草、白茅根、桑白皮、玄参放入砂锅中加入冷水，超过药面 3-6 厘米，用武火煎沸后，转为文火煎煮 20-30 分钟，过滤，得滤液，在剩余药渣中加入 3-4 厘米的水，加入蒲公英、地肤子、墨旱莲、仙鹤草以及用纱布包好的藕节，煎煮 20-30 分钟，最后加入金银湖、槐花、生甘草煎煮 15 分钟，过滤，得滤液，合并两次滤液，弃渣，备用；

步骤二：按本发明重量配比，称取蝉蜕、水牛角进行研磨粉碎、过 180 目筛，备用；

步骤三：将步骤二所得细粉加入步骤一所得药液中搅拌混合均匀，既得本发明所述的治疗过敏性紫癜性肾损害的中药汤剂，汤剂分两次服用，早晚各一次，温服。

[0036] 本发明药物清热解毒、补气升阳、养阴生津、散瘀止痛等功效,且疗效显著,价格低廉,无毒副作用,标本兼治,据对临床 80 例患者观察统计,使用本发明药物一个疗程总有效率 85%,两个疗程总有效率 96.25%。

具体实施方式

[0037] 实施例一、黄芪 45 份、金银花 10 份、蒲公英 13 份、防风 4 份、生地黄 15 份、白鲜皮 7 份、地肤子 10 份、当归 10 份、黄芩 7 份、赤芍 7 份、白芍 10 份、牡丹皮 7 份、墨旱莲 10 份、紫草 7 份、蝉蜕 3 份、槐花 4 份、水牛角 13 份、藕节 7 份、白茅根 15 份、仙鹤草 19 份、桑白皮 7 份、玄参 7 份、生甘草 3 份。

[0038] 实施例二、黄芪 50 份、金银花 15 份、蒲公英 18 份、防风 9 份、生地黄 20 份、白鲜皮 12 份、地肤子 15 份、当归 15 份、黄芩 12 份、赤芍 12 份、白芍 15 份、牡丹皮 12 份、墨旱莲 15 份、紫草 12 份、蝉蜕 6 份、槐花 9 份、水牛角 18 份、藕节 12 份、白茅根 20 份、仙鹤草 24 份、桑白皮 12 份、玄参 12 份、生甘草 6 份。

[0039] 实施例三、黄芪 55 份、金银花 20 份、蒲公英 23 份、防风 14 份、生地黄 25 份、白鲜皮 17 份、地肤子 20 份、当归 20 份、黄芩 17 份、赤芍 17 份、白芍 20 份、牡丹皮 17 份、墨旱莲 20 份、紫草 17 份、蝉蜕 9 份、槐花 14 份、水牛角 23 份、藕节 17 份、白茅根 25 份、仙鹤草 29 份、桑白皮 17 份、玄参 17 份、生甘草 9 份。

[0040] 下面是患者使用本发明药物的临床统计资料:

一、一般资料

收治门诊患者 160 例,将患者随机分为观察组和对照组,其中男性 87 例,女性 73 例,男女比例 1.2:1,平均年龄 12 岁,病程几天年到几个月不等。两组患者年龄、性别、病程等各项基本资料基本相同,差异无统计学意义($P > 0.05$)。

[0041] 二、治疗方法:

1、观察组按照本发明药物实施例二,以及优选的制备方法,称取原料药(一日剂量),水煎后过滤去渣,早晚各服一次,温服。15 天为一个疗程。

[0042] 2、对照组采用常规西药治疗过敏性紫癜性肾损害,观察期为 15 天。

[0043] 三、疗效评定标准

- 1、治愈:临床症状、体征完全消失,肾功能以及尿常规均显示正常;
- 2、好转:临床症状、各项体征及并发症基本消失,肾功能、尿常规有轻微的异常;
- 3、未愈:临床症状无任何好转,各项指标无改善。

[0044] 四、观察组结果统计

治疗 时间	治愈		好转		未愈	
	例数	治愈率%	例数	好转率%	例数	未愈率%
一个疗程	44	55	24	30	12	15
两个疗程	59	73.75	18	22.5	3	3.75

对照组结果统计

治疗 时间	治愈		好转		未愈	
	例数	治愈率%	例数	好转率%	例数	未愈率%
一个疗程	32	40	26	32.5	22	27.5
两个疗程	41	51.25	25	31.25	14	17.5

其中：总有效率 = 治愈率 + 好转率

使用该中药制剂两个疗程两组患者的疗效对比情况

组别	例数	治愈[n(%)]	好转[n(%)]	未愈[n(%)]	总有效率(%)
观察组	80	59 (73.75)	18 (22.5)	3 (3.75)	96.25
对照组	80	41 (51.25)	25 (31.25)	14 (17.5)	82.5

通过对比两组患者的治疗总有效率可以发现观察组明显高于对照组，由此说明，本发明中药在治疗过敏性紫癜性肾损害具有良好的临床效果，能有效提高治疗的治愈率，减轻患者的痛苦，值得在临床应用上推广。

[0045] 典型病例及疗效：

病例一、邱某，男，14岁，患者半年前发现双腿有瘀斑、瘀点，并且偶然发现尿液中泡沫增多，经让地医院进行激光治疗以后，身上的瘀斑消失，但是没过多长时间患者出现腹痛现象，身上重新出现紫斑的现象，严重时还会出现关节痛，病情复发，患者去医院进行全面的检查，确诊为过敏性紫癜性肾损害，患者采用希望采用中医中药的治疗方法，采用本发明实施例二中所制汤剂，患者服用两个疗程后，症状明显减轻，腹痛现象消失，腿上的斑点也逐渐变浅，患者继续服用两个疗程，身体症状明显好转，体质增强，患者去医院进行检查，肾功能以及尿常规检查均显示正常，患者为防止复发，又坚持服用了一个疗程，生活状况良好，电话随访半年，未见复发，痊愈。

[0046] 病例二、王某，男，10岁，患者患有过敏性紫癜性肾损害，腹痛明显，并伴有四肢、

腰腹部有紫色斑点,患者家长四处寻药,后采用本发明实施例二中所制汤剂,患者服用两个疗程后,感觉症状明显减轻,紫斑、腹痛现行消失,患者继续服用一段时间,身体状况完全好转,患者去医院复查,各项检查均显示正常,电话随访半年,未见复发,痊愈。

[0047] 病例三、袁某,女,15岁,患者几个月前发现腿部出现紫斑,去医院检查,诊断为过敏性紫癜性肾损害,患者采用本发明实施例二中所制汤剂,服用两个疗程后患者紫斑现象明显减轻,继续服用一个疗程身体状况完全好转,患者去医院复查,各项指标均显示正常,电话随访半年,未复发,痊愈。