



(19) 中華民國智慧財產局

(12) 發明說明書公開本

(11) 公開編號：TW 201728560 A

(43) 公開日：中華民國 106 (2017) 年 08 月 16 日

(21) 申請案號：106102624

(22) 申請日：中華民國 106 (2017) 年 01 月 24 日

(51) Int. Cl. : *C07C49/303 (2006.01)* *C07C63/06 (2006.01)*
C07C69/612 (2006.01) *C07C233/66 (2006.01)*
C07D207/06 (2006.01) *C07D213/72 (2006.01)*
C07D331/04 (2006.01) *A01N35/04 (2006.01)*
A01N37/08 (2006.01) *A01N37/18 (2006.01)*
A01N37/10 (2006.01) *A01N43/20 (2006.01)*
A01N43/36 (2006.01) *A01N43/40 (2006.01)*
A01P7/00 (2006.01)

(30) 優先權：2016/01/25 美國 62/286,593
 2016/01/25 美國 62/286,599

(71) 申請人：陶氏農業科學公司 (美國) DOW AGROSCIENCES LLC (US)
 美國

(72) 發明人：巴頓 湯瑪斯 BARTON, THOMAS (US)；高欣 GAO, XIN (CN)；杭特 吉姆 HUNTER, JIM (US)；利帕雷 保羅 R. LEPLAE, PAUL RENEE (US)；勞勒 羅里 K. LAWLER, LORI K. (US)；洛 威廉 C. LO, WILLIAM C. (US)；派特庫斯 傑佛瑞 J. PETKUS, JEFFERY J. (IN)；柏魯瓦 約紹迪普 BORUWA, JOSHODEEP (IN)；坦吉雷拉 拉古拉姆 TANGIRALA, RAGHURAM (IN)；沃森 傑拉德 B. WATSON, GERALD B. (US)；赫伯特 約翰 HERBERT, JOHN (US)

(74) 代理人：憚軼群；劉法正

申請實體審查：無 申請專利範圍項數：15 項 圖式數：0 共 233 頁


(54) 名稱

具有殺蟲效用之分子及與其相關之中間物、組成物及方法(三)

MOLECULES HAVING PESTICIDAL UTILITY, AND INTERMEDIATES, COMPOSITIONS, AND PROCESSES, RELATED THERETO


(57) 摘要

此揭示係有關於下列領域：具有對抗節肢動物門、軟體動物門，及圓形動物門之害蟲之殺蟲效用的分子、生產此類分子之方法、此類方法中使用的中間物、含有此等分子之組成物，以及使用此等分子及組成物對抗此種害蟲之方法。這些分子及組成物可使用作為舉例而言，殺蟬蟎劑、殺昆蟲劑、殺蟎劑、殺軟體動物劑，及殺線蟲劑。本文件揭示具有下式(“式 1”)之分子。




This disclosure relates to the field of molecules having pesticidal utility against pests in Phyla Arthropoda, Mollusca, and Nematoda, processes to produce such molecules, intermediates used in such processes, compositions containing such molecules, and processes of using such molecules and compositions against such pests. These molecules and compositions may be used, for example, as acaricides, insecticides,

miticides, molluscicides, and nematocides. This document discloses molecules having the following formula (“Formula One”).



特徵化學式：

式1





【發明摘要】

【中文發明名稱】


具有殺蟲效用之分子及與其相關之中間物、組成物及方法(三)

【英文發明名稱】

MOLECULES HAVING PESTICIDAL UTILITY, AND INTERMEDIATES, COMPOSITIONS, AND PROCESSES, RELATED THERETO


【中文】

此揭示係有關於下列領域：具有對抗節肢動物門、軟體動物門，及圓形動物門之害蟲之殺蟲效用的分子、生產此類分子之方法、此類方法中使用的中間物、含有此等分子之組成物，以及使用此等分子及組成物對抗此種害蟲之方法。這些分子及組成物可使用作為舉例而言，殺蟬蟎劑、殺昆蟲劑、殺蟎劑、殺軟體動物劑，及殺線蟲劑。本文件揭示具有下式(“式1”)之分子。



【英文】

This disclosure relates to the field of molecules having pesticidal utility against pests in Phyla Arthropoda, Mollusca, and Nematoda, processes to produce such molecules, intermediates used in such processes, compositions containing such molecules, and processes of using such molecules and compositions against such pests. These molecules and compositions may be used, for example, as acaricides, insecticides, miticides, molluscicides, and nematocides. This document discloses molecules having the following formula (“Formula One”).




【指定代表圖】(無)

【代表圖之符號簡單說明】

【特徵化學式】

式1



【發明說明書】

【中文發明名稱】

具有殺蟲效用之分子及與其相關之中間物、組成物及方法(三)

【英文發明名稱】

MOLECULES HAVING PESTICIDAL UTILITY,
AND INTERMEDIATES, COMPOSITIONS, AND
PROCESSES, RELATED THERETO

【技術領域】

【0001】發明領域

相關申請案之交叉引述

此申請案主張2016年1月25日提申之美國專利臨時申請案第62/286593號及第62/286599號之利益及優先權，其等各者在此明確地併入以作為參考資料。

【0002】此揭示係有關於下列領域：具有對抗節肢動物門、軟體動物門，及圓形動物門之害蟲之殺蟲效用的分子，生產此類分子之方法、使用於此類方法中之中間物、含有此等分子之殺蟲組成物，以及使用此等殺蟲組成物對抗此種害蟲之方法。這些殺蟲組成物可使用作為舉例而言，殺蟬蟎劑、殺昆蟲劑、殺蟎劑、殺軟體動物劑，及殺線蟲劑。

【先前技術】

【0003】發明背景

“許多最危險的人類疾病是由昆蟲媒介傳播的”(Rivero等人)。“由歷史上來看，瘧疾、登革熱、黃熱病、

鼠疫、絲蟲病、蝨傳斑疹傷寒、錐蟲病(trypanosomiasis)、萊什曼病(leishmaniasis)和其他病媒感染疾病，較其他原因引起更多的人類疾病與死亡，自17至20世紀初期”(Gubler)。病媒感染疾病佔全球寄生蟲病與傳染病約17%。僅僅瘧疾每年便造成超過800,000人死亡，這些死亡者有85%為五歲以下之孩童。每年約有五千萬至一億件案例之登革熱出血。每年發生另外的250,000至500,000件案例之登革熱出血(Matthews)。病媒防治在預防與控制感染性疾病方面扮演相當重要的角色。然而，殺蟲劑抗性包括多重殺蟲劑抗性，在人類疾病主要病媒之所有昆蟲物種上愈來愈嚴重(Rivero等人)。近來，超過550個節肢動物物種業已發展出對至少一種殺蟲劑之抗性(Whalon等人)。

【0004】 每年昆蟲、植物病原體與雜草破壞了超過40%之所有食物生產量。儘管施用殺蟲劑及使用一系列廣泛的非化學控制，諸如輪作及生物控制，但此損失仍存在。若僅僅此食物中的一些可保存，便可用於供養世界上超過三十億營養不良的人口(Pimental)。

【0005】 植物寄生線蟲為分佈最廣的害蟲之一，且常常為最隱伏及代價高的害蟲之一。據估計，由於線蟲造成之損失，在已開發國家為約9%，在未開發國家為約15%。然而，在美國，根據35個州對於各種作物之調查顯示，線蟲衍生之損失高達25%(Nicol等人)。


【0006】 值得注意的是，腹足類(蛞蝓和蝸牛)為經濟

重要性低於其他的節肢動物或線蟲的害蟲，但在某些地方，腹足類可能會實質上大量降低產率，嚴重影響收穫產品的品質，以及會傳播人類、動物及植物疾病。雖然只有幾十種腹足類是嚴重地區性害蟲，但有少數品種是世界範圍內的重要害蟲。特別是，腹足類影響廣泛多種農業和園藝作物，如耕地、牧場、和纖維作物；蔬菜；灌木和喬木果實；草本植物；以及觀賞植物(Speiser)。

【0007】白蟻會造成各種私人和公共建築，以及農業和林業資源損害。據估計，在2005年，白蟻造成每年全世界損失超過500億美元(Korb)。

【0008】因此，就許多理由，包括上述之該等理由，持續需要昂貴的(估計於2010年每害蟲為大約2億5千6百萬美元)、耗時的(每害蟲平均為大約10年)，以及困難開發的新穎殺蟲劑(CropLife America)。

【0009】DeMassey等人揭示下列結構。更多詳細信息，請參閱US 2002/0068838。



此揭示引用的某些參考文獻

【0010】CropLife America, **The Cost of New Agrochemical Product Discovery, Development & Registration, and Research & Development predictions for the Future, 2010.**

Gubler, D., **Resurgent Vector-Borne Diseases as a Global Health Problem, Emerging Infectious Diseases**, Vol. 4, No. 3, p. 442-450, 1998.

Korb, J., **Termites, Current Biology**, Vol. 17, No. 23, 2007.

Matthews, G., **Integrated Vector Management: Controlling Vectors of Malaria and Other Insect Vector Borne Diseases**, Ch. 1, p. 1- 2011.

Nicol, J., Turner S.; Coyne, L.; den Nijs, L., Hockslan, L., Tahna-Maafi, Z., **Current Nematode Threats to World Agriculture, Genomic and Molecular Genetics of Plant – Nematode Interactions**, p.21-43, 2011).

Pimental, D., **Pest Control in World Agriculture, Agricultural Sciences - Vol. II**, 2009.

Rivero, A., Vezilier, J., Weill, M., Read, A., Gandon, S., **Insect Control of Vector-Borne Diseases: When is Insect Resistance a Problem? Public Library of Science Pathogens**, Vol. 6, No. 8, p. 1-9, 2010.

Speiser, B., **Molluscicides, Encyclopedia of Pest Management**, Ch. 219, p. 506-508, 2002.


Whalon, M., Mota-Sanchez, D., Hollingworth, R., **Analysis of Global Pesticide Resistance in Arthropods, Global Pesticide Resistance in**

Arthropods, Ch. 1, p. 5-33, 2008.

【發明內容】

【0011】發明概要

依據本發明之一實施例，係特地提出一種具下式之分子



式1

其中：

(A) R^1 、 R^5 、 R^6 、 R^{11} 及 R^{12} 各自獨立地選自於下列所構成的群組：H、F、Cl、Br、I、CN、(C₁-C₄)烷基、(C₁-C₄)鹵烷基、(C₁-C₄)烷氧基，以及(C₁-C₄)鹵烷氧基；

(B) R^2 、 R^3 及 R^4 各自獨立地選自於下列所構成的群組：H、F、Cl、Br、I、CN、(C₁-C₄)烷基、(C₂-C₄)烯基、(C₂-C₄)炔基、(C₁-C₄)鹵烷基、(C₁-C₄)烷氧基，以及(C₁-C₄)鹵烷氧基

(C) R^7 為(C₁-C₆)鹵烷基

(D) R^9 係選自於下列所構成的群組：(F)、H、F、Cl、Br、I、CN、(C₁-C₄)烷基、(C₁-C₄)鹵烷基、(C₁-C₄)烷氧基，以及(C₁-C₄)鹵烷氧基

(E) R^{10} 係選自於下列所構成的群組：(F)、F、Cl、Br、I、CN、(C₁-C₄)烷基、(C₂-C₄)烯基、(C₂-C₄)炔基、(C₁-C₄)鹵烷基、(C₁-C₄)烷氧基，以及(C₁-C₄)鹵烷氧基

(F) R^9 及 R^{10} 能選擇性地一起形成一個3至5員飽和或不飽和的、烴基(hydrocarbyl)鍵聯，

其中該烴基鍵聯可選擇性地以一個或更多個獨立地選自於下列所構成的群組之取代基予以取代：F、Cl、Br、I及CN；

(G) X係

(1) $NR^{13}R^{14}$ ，其中 R^{13} 及 R^{14} 各自獨立地選自於下列所構成的群組：H、CHO、 (C_1-C_4) 烷基、 (C_2-C_4) 烯基、 (C_1-C_4) 鹵烷基、 (C_1-C_4) 烷氧基、 (C_1-C_4) 鹵烷氧基、 (C_3-C_8) 環烷基、 (C_1-C_4) 烷基苯基、 (C_1-C_4) 烷基吡啶基、吡啶基、 $CH=NO(C_1-C_4)$ 烷基、 (C_1-C_4) 烷基 $CH=NO(C_1-C_4)$ 鹵烷基、 (C_1-C_4) 烷基 $NH(C_1-C_4)$ 鹵烷基、 (C_1-C_4) 烷基 $N((C_1-C_4)烷基)(C_1-C_4)$ 鹵烷基、硫環丁基(thietanyl)、硫環丁基-氧化物，以及硫環丁基-二氧化物，

其中各個烷基、烯基、鹵烷基、烷氧基、鹵烷氧基、環烷基、苯基、吡啶基、硫環丁基、硫環丁基-氧化物及硫環丁基-二氧化物可以選擇性地以一個或更多個獨立地選自於下列所構成的群組之取代基予以取代：F、Cl、Br、I、CN、OH、 (C_1-C_4) 烷基及 (C_1-C_4) 烷氧基；

(2) $N=CHN((C_1-C_4)烷基)_2$ 或

(3) Z，其中Z為一包含3至7個原子之雜環基，其中該等原子之至少一者為一氮，且其中該氮有一鍵往 $C(=Q)$ ，

其中該雜環基可選擇性地以一個或更多個獨立地選自於下列所構成的群組之取代基予以取代：F、Cl、Br、I

及CN；以及

(H) Q係選自於下列所構成的群組：O及S。

【實施方式】

【0012】本揭示使用的定義

在此等定義中所提供之範例一般而言並非非窮舉性的，且不得解釋為限制本揭示。應理解，取代基應依從與其所連接的特定分子相關之化學鍵結規則及立體相容性的限制。此等定義僅用於本揭示的目的。

【0013】「活性成分」係意指一種材料，其具有控制害蟲有用的活性，及/或其有用於協助其他材料有更好的控制害蟲之活性，此等材料的實例包括但不限於：殺蟬蟎劑、除藻劑、殺鳥劑(avicide)、殺菌劑、殺真菌劑、除草劑、殺昆蟲劑、殺蟎劑、殺線蟲劑、滅鼠劑、殺病毒劑、拒食劑、驅鳥劑、化學絕育劑、除草劑安全劑、誘蟲劑、驅蟲劑、驅哺乳動物劑、交配干擾劑、植物活化劑、植物生長調節劑，以及協力劑。此等材料的特定實例包括但不限於活性成分群組 α 之中列出的材料。

【0014】「活性成分群組 α 」(此後稱為“AIGA”)係集體意指下列材料：

(1)(3-乙氧基丙基)溴化汞、1,2-二溴乙烷、1,2-二氯乙烷、1,2-二氯丙烷、1,3-二氯丙烯、1-MCP、1-甲基環丙烯、1-萘酚、2-(辛基硫基)乙醇、2,3,3-TPA、2,3,5-三碘苯甲酸、2,3,6-TBA、2,4,5-T、2,4,5-TB、2,4,5-TP、2,4-D、2,4-DB、2,4-DEB、2,4-DEP、2,4-DES、2,4-DP、

2,4-MCPA、2,4-MCPB、2iP、2-甲氧基乙基氯化汞、2-苯基酚、3,4-DA、3,4-DB、3,4-DP、3,6-二氯2-吡啶甲酸、4-胺基吡啶、4-CPA、4-CPB、4-CPP、4-羥基苯乙基醇、8-羥基喹啉硫酸鹽、8-苯基汞氧基喹啉、阿巴美丁(abamectin)、阿巴美丁胺甲基(abamectin-aminomethyl)、脫落酸(abscisic acid)、ACC、毆殺松(acephate)、亞醜蟻(acequinocyl)、亞滅培(acetamiprid)、家蠅磷(acethion)、乙草胺(acetochlor)、三氯殺蟲酯(acetofenate)、乙酯磷(acetophos)、乙醯蟲脞(acetoprole)、阿拉酸式苯(acibenzolar)、亞喜芬(acifluorfen)、苯草醚(aclonifen)、ACN、內醯吡庚胺(acrep)、阿納寧(acrinathrin)、丙烯醛(acrolein)、丙烯脞、阿西佩它克斯(acypetacs)、阿斐多匹朋(afidopyropen)、阿福藍(afoxolaner)、拉草(alachlor)、納得爛(alanap)、棉鈴威(alanycarb)、阿苯達唑(albendazole)、得滅克(aldicarb)、得滅克砒、十二嗎啉(aldimorph)、涕滅砒威(aldoxycarb)、阿特靈(aldrin)、亞列寧(allethrin)、蒜素(allicin)、草毒死(allidochlor)、阿洛胺菌素(allosamidin)、亞汰草(alloxydim)、烯丙醇、除害威(allyxycarb)、亞羅列克(alorac)、 α -賽滅寧(*alpha*-cypermethrin)、 α -安殺番(*alpha*-endosulfan)、亞滅寧(alphamethrin)、六甲嘧胺(altretamine)、磷化鋁(aluminium phosphide)、磷化鋁(aluminum phosphide)、辛啞嘧菌胺(ametoctradin)、特津酮

(ametrione)、草殺淨(ametryn)、草殺淨(ametryne)、特草嗪酮(amibuzin)、胺唑草酮(amicarbazone)、拌種靈(amicarthiazol)、賽硫磷(amidithion)、磺胺蟎酯(amidoflumet)、醯嘧磺隆(amidosulfuron)、滅害威(aminocarb)、環丙嘧啶酸(aminocyclopyrachlor)、氯胺吡啶酸(aminopyralid)、胺三唑、甲基胺草磷(amiprofos-methyl)、胺草磷(amiprofos)、甲基胺草磷(amiprofos-methyl)、安美速(amisulbrom)、阿米通(amiton)、三亞蟎(amitraz)、殺草強(amitrole)、胺磺酸銨鹽、代森銨(amobam)、非晶形矽膠、非晶形二氧化矽、1-胺基丙基磷酸(ampropylfos)、AMS、毒藜鹼(anabasine)、嘧啶醇(ancymidol)、敵菌靈(anilazine)、莎稗磷(anilofos)、疏草隆(anisuron)、蔥醌(anthraquinone)、安妥(antu)、唑磷嗪(apholate)、殺蟎特(aramite)、殘殺威(arprocarb)、三氧化二砷、福美砷(asomate)、阿司匹靈(aspirin)、磺草靈(asulam)、乙基殺撲磷(athidathion)、阿特拉通(atraton)、草脫淨(atrazine)、金色制黴素(aureofungin)、阿維菌素B1(avermectin B1)、AVG、四烯雌酮(aviglycine)、氧環唑(azaconazole)、印苦楝子素(azadirachtin)、草芬定(azafenidin)、亞滅松(azamethiphos)、滅蚜松(azidithion)、四唑嘧磺隆(azimsulfuron)、乙基谷速松(azinphosethyl)、乙基谷速松(azinphos-ethyl)、谷速松(azinphosmethyl)、谷速松(azinphos-methyl)、疊氮津

(aziprotryn)、滅蘇民(aziprotryne)、塞侖(azithiram)、
偶氮苯(azobenzene)、亞環錫(azocyclotin)、偶氮磷
(azothoate)、亞托敏(azoxystrobin)、菊乙胺酯
(bachmedesh)、燕麥靈(barban)、燕麥靈(barbanate)、六
氟矽酸鋇、多硫化鋇、矽氟化鋇(barium silicofluoride)、
椒菊酯(barthrin)、鹼式碳酸銅(basic copper
carbonate)、鹼式氯化銅(II)(basic copper chloride)、鹼
式硫酸銅(basic copper sulfat)、BCPC、氟丁醯草胺
(beflubutamid)、本達樂(benalaxyl)、本達樂-M、草除靈
(benazolin)、醯苯草酮(bencarbazone)、異噻蟲啉
(benclothiaz)、苯噻嗪丙酯(bendaqingbingzhi)、免敵克
(bendiocarb)、苯達松(bendioxide)、倍尼芬(benefin)、
氟草胺(benfluralin)、免扶克(benfuracarb)、呋草黃
(benfuresate)、苯嘧磺草胺(benmihuangcaoan)、麥鏽靈
(benodanil)、免賴得(benomyl)、解草酮(benoxacor)、苯
噁磷(benoxafos)、醯肱脞(benquinox)、免速隆
(bensulfuron)、地散磷(bensulide)、免速達(bensultap)、
苯他隆(bentaluron)、本達隆(bentazon)、本達隆
(bentazone)、苯噻菌胺(benthiavalicarb)、苯噻硫氰
(benthiazole)、(benthiocarb)、草噁嗪(bentranyl)、苯甲
醯胺氧乙酸(benzadox)、氯化烷基二甲基苄基銨、苯瑪松
(benzamacril)、異噁草胺(benzamizole)、抑菌啉
(benzamorf)、六氯化苯、雙苯嘧草酮(benzfendizone)、
苯甲亞胺(benzimine)、苄草胺(benzipram)、苯并雙環酮

(benzobicyclon) 、 硫 丹 (benzoepin) 、 吡 草 酮 (benzofenap) 、 氟 草 黃 (benzofluor) 、 苯 基 異 脛 肼 酸 (benzohydroxamic acid) 、 苯 蟎 特 (benzomate) 、 苯 并 磷 酸 酯 (benzophosphate) 、 苯 并 噻 二 唑 (benzothiadiazole) 、 苯 并 烯 氟 菌 唑 (benzovindiflupyr) 、 西 脫 蟎 (benzoximate) 、 新 燕 靈 (benzoylprop) 、 苯 噻 隆 (benzthiazuron) 、 苯 唑 草 酮 (benzuocaotong) 、 苯 甲 酸 苄 酯 、 苯 甲 基 腺 嘌 呤 (benzyladenine) 、 黃 連 素 (berberine) 、 β - 賽 扶 寧 (*beta*-cyfluthrin) 、 β - 賽 滅 寧 (*beta*-cypermethrin) 、 比 托 沙 (bethoxazin) 、 BHC 、 雙 丙 氨 磷 (bialaphos) 、 雙 環 吡 喃 酮 (bicyclopyrone) 、 必 芬 蟎 (bifenazate) 、 治 草 醚 (bifenox) 、 畢 芬 寧 (bifenthrin) 、 吡 氟 菌 酯 (bifujunzhi) 、 畢 拉 草 (bilanafos) 、 百 蟎 克 (binapacryl) 、 病 氰 硝 (bingqingxiao) 、 百 亞 列 寧 (bioallethrin) 、 苄 呋 烯 菊 酯 (bioethanomethrin) 、 生 物 氯 菊 酯 (biopermethrin) 、 生 物 苄 呋 菊 酯 (bioresmethrin) 、 聯 苯 、 吡 殺 茲 (bisazir) 、 噻 枯 唑 (bismertiazol) 、 噻 枯 唑 - 銅 (bismertiazol-copper) 、 雙 苯 基 汞 亞 甲 基 二 (x-萘-y-磺 酸) (bisphenylmercury methylenedi(x-naphthalene-y-sulphonate)) 、 雙 草 醚 (bispyribac) 、 雙 三 氟 蟲 脲 (bistrifluron) 、 殺 蟲 雙 (bisultap) 、 比 多 農 (bitertanol) 、 硫 雙 二 氯 酚 (bithionol) 、 聯 苯 吡 菌 胺 (bixafen) 、 保 米 黴 素 (blasticidin-S) 、 硼 砂 、 波 爾 多 (Bordeaux) 混 合 液 、 硼 酸 、 白 克 列 (boscalid) 、

BPPS、芸苔素內酯(brassinolide)、芸苔素內酯-乙基、小蠹集合信息素(brevicommin)、溴鼠隆(brodifacoum)、苜蓿醯(brofenprox)、溴滅菊酯(brofenvaletrate)、溴氟苯胺(broflanilide)、溴氟菊酯(brofluthrin)、克草(bromacil)、溴敵隆(bromadiolone)、二溴磷(bromchlophos)、溴鼠胺(bromethalin)、溴苄呋菊酯(bromethrin)、溴苯烯磷(bromfenvinfos)、溴乙醯胺(bromoacetamide)、除草溴(bromobonil)、溴丁醯草胺(bromobutide)、保滿丹(bromociclen)、保滿丹(bromocyclen)、溴-滴滴涕(DDT)、溴酚肟(bromofenoxim)、溴磷松(bromophos)、溴甲烷(bromomethane)、溴磷松(bromophos)、乙基-溴磷松、新殺蟻(bromopropylate)、溴菌腈(bromothalonil)、溴苯腈(bromoxynil)、殺莠敏(brompyrazon)、溴克座(bromuconazole)、溴硝醇(bromopol)、BRP、BTH、增效特(bucarpolate)、必克蝨(bufencarb)、佈敏納弗(buminafos)、布瑞莫(bupirimate)、布芬淨(buprofezin)、勃根第(Burgundy)混合液、白消安(busulfan)、白消安(busulphan)、畜蟲威(butacarb)、丁基拉草(butachlor)、布芬草(butafenacil)、牧草胺(butam)、抑草磷(butamifos)、丁烷-芬普尼(butane-fipronil)、佈伏斯(butathiofos)、丁烯草胺(butenachlor)、丁烷-芬普尼(butane-fipronil)、苜蓿菊酯(butethrin)、丁硫咪唑酮(buthidazole)、丁硫啶

(buthiobate)、丁噁隆(buthiuron)、脫葉磷(butifos)、佈嘉信(butocarboxim)、布托酯(butonate)、避蚊酮(butopyronoxyl)、丁酮砒威(butoxycarboxim)、比達寧(butralin)、丁三唑(butrizol)、丁苯草酮(butroxydim)、炔草隆(buturon)、丁基胺、丁酸鹽(butylate)、丁酯磷(butylchlorophos)、伸丁基-芬普尼(butylene-fipronil)、二甲胂酸(cacodylic acid)、硫線磷(cadusafos)、啞草胺(cafenstrole)、成骨醇(calciferol)、砷酸鈣、氰酸鈣、氰胺化鈣(calcium cyanamide)、氰化鈣、多硫化鈣、鈣殺畏(calvinphos)、卡本二氯(cambendichlor)、毒殺芬(camphechlor)、樟腦(camphor)、四氯丹(captafol)、蓋普丹(captan)、N-甲基二硫代胺基甲酸(carbam)、嗎菌威(carbamorph)、氯滅殺威(carbanolate)、胺甲萘(carbaril)、胺甲(carbaryl)、除草隆(carbasulam)、卡巴松(carbathion)、貝芬替(carbendazim)、多菌靈(carbendazol)、雙醯草胺(carbetamide)、卡波硫磷(carbofenotion)、加保扶(carbofuran)、二硫化碳、四氯化碳、硫化羰(carbonyl sulfide)、加芬松(carbophenothion)、馬拉硫磷(carbophos)、丁基加保扶(carbosulfan)、羧酸唑(carboxazole)、環二混劑(carboxide)、萎鏽靈(carboxin)、克繁草(carfentrazone)、加普胺(carpropamid)、培丹(cartap)、香芹酚(carvacrol)、香芹酮(carvone)、CAVP、CDAA、CDEA、CDEC、滅胞素(cellocidin)、CEPC、西拉洛

(ceralure)、敵菌脞(cerenox)、沙巴達(cevadilla)、切欣特混合液(Cheshunt mixture)、愛卡士(chinalphos)、愛卡士 - 甲基 (chinalphos-méthyl) 、 螞 離 丹 (chinomethionat)、滅螞猛(chinomethionate)、愛卡士(chiralaxyl) 、 殼 聚 糖 (chitosan) 、 克 氯 綜 (chlobenthiazone)、甲氧基護谷(chlomethoxyfen)、氯醛糖(chloralose) 、 克 爛 本 (chloramben) 、 氯 胺 磷 (chloramine phosphorus)、氯黴素(chloramphenicol)、雙胺靈(chloraniformethan)、克氯尼(chloranil)、丁醯草胺(chloranocryl)、剋安勃(chlorantraniliprole)、炔禾靈(chlorazifop) 、 可 樂 津 (chlorazine) 、 氯 殺 螞 (chlorbenside) 、 滅 幼 脲 (chlorbenzuron) 、 冰 片 丹 (chlorbicyclen) 、 滅 落 寧 (chlorbromuron) 、 氯 草 靈 (chlorbufam) 、 可 氯 丹 (chlordane) 、 氯 癸 酮 (chlordecone)、氯苯甲脒(chlordimeform)、氯烯炔菊酯(chlorempenthrin) 、 玉 雄 殺 (chloretazate) 、 乙 烯 利 (chlorethephon) 、 氯 氧 磷 (chlorethoxyfos) 、 氯 特 龍 (chloreturon) 、 伐 草 克 (chlorfenac) 、 克 凡 派 (chlorfenapyr) 、 2-(2- 氯 苯 基)-1H- 苯 并 咪 唑 (chlorfenazole) 、 殺 螞 醇 (chlorfenethol) 、 滅 草 隆 (chlorfenidim) 、 燕 麥 酯 (chlorfenprop) 、 殺 螞 酯 (chlorfenson) 、 敵 螞 丹 (chlorfensulphide) 、 氯 芬 松 (chlorfenvinphos) 、 氯 芬 松 - 甲 基 (chlorfenvinphos-methyl)、克福隆(chlorfluazuron)、氟

咪殺(chlorflurazole)、氯甲丹(chlorflurecol)、氯苄酸(chlorfluren)、整形醇(chlorflurenol)、氯草敏(chloridazon)、氯嘧磺隆(chlorimuron)、氯化物(chlorinate)、氯苯胺靈(chlor-IPC)、氯甲磷(chlormephos)、矮壯素陽離子(chlormequat)、磺草酮(chlormesulone)、甲氧基護谷(chlormethoxynil)、氯乙靈(chlornidine)、全滅草(chlornitrofen)、氯醋酸(chloroacetic acid)、克氯苯(chlorobenzilate)、氯二硝萘(chlorodinitronaphthalene)、殺蟎酯(chlorofénizon)、氯仿、滅蟎脒(chloromebuform)、滅蟲脲(chloromethiuron)、二氯甲氧苯(chloroneb)、氯鼠酮(chlorophacinone)、敵百蟲(chlorophos)、氯化苦(chloropicrin)、三氯丙酸(chloropon)、克氯蟎(chloropropylate)、四氯異苯腈(chlorothalonil)、氯麥隆(chlorotoluron)、枯草隆(chloroxifenidim)、枯草隆(chloroxuron)、羥敵草腈(chloroxynil)、矮形磷(chlorphonium)、氯辛硫磷(chlorphoxim)、滅蟲吡啶(chlorprazophos)、氯普卡(chlorprocarb)、氯普芬(chlorpropham)、陶斯松(chlorpyrifos)、甲基陶斯松(chlorpyrifos-methyl)、四氯喹噁啉(chlorquinox)、氯磺隆(chlorsulfuron)、大克草(chlorthal)、草克樂(chlorthiamid)、克硫松(chlorthiophos)、綠麥隆(chlortoluron)、克氯得(chlozolate)、乙菌利(chltosan)、膽鈣化醇(cholecalciferol)、氯化膽鹼、可芬

諾(chromafenozide)、環己米特(cicloheximide)、抗倒酯(cimectacarb)、抗倒酯(cimetacarb)、瓜菊酯(cinerin)I、瓜菊酯II、瓜菊酯類(cinerins)、乙基環醯草酯(cinidon-ethyl)、環庚草醚(cinmethylin)、西速隆(cinosulfuron)、津奧啉(cintofen)、苯氰丁醯胺(ciobutide)、落草胺(cisanilide)、順式苜呋菊酯(cismethrin)、氯酰草膦(clacyfos)、環苯草酮(clefoxydim)、克崙吡林(clenpirin)、克崙吡林(clenpyrin)、剋草同(clethodim)、甘寶素(climbazole)、氯碘吡啶酯(cliodinate)、炔草酯(clodinafop)、除線威(cloethocarb)、苯噻嗪鉀(clofencet)、滴滴涕(clofenotane)、克芬蟻(clofentezine)、氯芬磷(clofenvinfos)、氯貝酸(clofibric acid)、氯丁草(clofop)、可滅蹤(clomazone)、克普草(clomeprop)、氯硝柳胺(clonitralid)、調果酸(cloprop)、環丁烯草酮(cloproxydim)、畢克草(clopyralid)、解毒啞(cloquintocet)、氯酯磺草胺(cloransulam)、氯氰碘柳胺(closantel)、可尼丁(clothianidin)、克黴唑(clotrimazole)、座果酸(cloxyfonac)、抑霉胺(cloxylacon)、抑霉胺(clozylacon)、CMA、CMMP、CMP、CMU、十二碳二烯醇(codlélure)、膽骨化醇(colecalciferol)、噻唑硫磷(colophonate)、8-羥基喹啉銅(copper 8-quinolinolate)、乙酸銅、乙醯亞砷酸銅、砷酸銅、碳酸銅鹼式、氫氧化銅、萘酸銅、油酸銅、氯氧化銅、

矽酸銅、硫酸銅、硫酸銅鹼式、鉻酸銅鋅、氯殺鼠靈 (coumachlor)、殺鼠靈(coumafène)、庫馬磷(coumafos)、克滅鼠(coumafuryl)、蠅毒磷(coumaphos)、殺鼠迷(coumatetralyl)、甲香菌酯(coumethoxystrobin)、畜蟲磷(coumithoate)、丁香菌酯(coumoxystrobin)、CPMC、CPMF、CPPC、必滅草(credazine)、甲酚(cresol)、甲苯酚(cresylic acid)、甲基鼠滅定(crimidine)、克羅米通(crotamiton)、丁烯磷(crotoxyfos)、丁烯磷(crotoxyphos)、育畜磷(crufomate)、冰晶石(cryolite)、誘蠅酮(cue-lure)、銅合浦單劑(cufraneb)、二苯隆(cumyleron)、草隆(cumyluron)、福美銅氯(cuprobam)、氧化亞銅、莪術醇(curcumenol)、CVMP、氰胺、氰草淨(cyanatryn)、氰乃淨(cyanazine)、施力松(cyanofenphos)、氰、氰乃松(cyanophos)、果蟲磷(cyanthoate)、氰蟲醯胺(cyantraniliprole)、三聚氰酸、賽座滅(cyazofamid)、賽百摧(cybutryne)、環菌胺(cyclafuramid)、環丙醯胺酸(cyclanilide)、環胺普羅(cyclaniliprole)、環戊烯菊酯(cyclethrin)、環草敵(cycloate)、環己醯亞胺(cycloheximide)、環蟻酯(cycloprate)、乙氰菊酯(cycloprothrin)、環比瑞摩(cyclopyrimorate)、環磺隆(cyclosulfamuron)、環殺草(cycloxydim)、環莠隆(cycluron)、啞蟻氰(cyenopyrafen)、賽芬胺(cyflufenamid)、賽芬蟻(cyflumetofen)、賽扶寧(cyfluthrin)、賽伏草

(cyhalofop)、賽洛寧(cyhalothrin)、錫蟻丹(cyhexatin)、
蟻蟬胺(cymiazole)、克絕(cymoxanil)、解草胺腈
(cyometrinil)、伏賜丁(cypendazole)、賽滅寧
(cypermethrin)、牧草快(cyperquat)、賽芬寧
(cyphenothrin)、環丙津(cyprazine)、三環噁草胺
(cyprazole)、環克座(cyproconazole)、賽普洛
(cyprodinil)、酯菌胺(cyprofuram)、環草胺(cypromid)、
環丙磺醯胺(cyprosulfamide)、賽滅淨(cyromazine)、賽
滅磷(cythioate)、賽翠斯(cytrex)、汰草龍(daimuron)、
得拉本(dalapon)、丁醯肼(daminozide)、噠幼酮
(dayoutong)、邁隆(dazomet)、DBCP、*d*-樟腦
(*d*-camphor)、DCB、DCIP、DCPA、DCPTA、DCU、
DDD、DDPP、DDT、DDVP、咪菌威(debacarb)、癸磷
錫(decafeintin)、溴氰菊酯(decamethrin)、去甲基克百威
(decarbofuran)、避蚊胺(deet)、去氫乙酸、敵草快
(deiquat)、異丁草胺(delachlor)、大克松(delnav)、第滅
寧(deltamethrin)、甲基滅賜松(demephion)、甲基滅賜松
-O、甲基滅賜松-S、內吸磷(demeton)、甲基內吸磷、內
吸磷-O、甲基內吸磷-O、內吸磷-S、甲基內吸磷-S、磯吸
磷(demeton-S-methyl sulphon)、磯吸磷
(demeton-S-methylsulphon)、DEP、生物丙烯菊酯
(depalléthrine)、毒利死(derris)、甜菜安
(desmedipham)、敵草淨(desmetryn)、敵草淨
(desmetryne)、*d*-反式氯炔丙菊酯

(*d*-fanshiluquebingjuzhi)、汰芬隆(diafenthiuron)、氯亞磷(dialifor)、得拉松(dialifos)、燕麥敵(diallate)、除線特(diamidafos)、麥草畏(dianat)、矽藻土(diatomaceous earth)、矽藻土(diatomite)、大利松(diazinon)、二溴磷(dibrom)、酞酸二丁酯、丁二酸二丁酯、汰克草(dicamba)、異氯磷(dicapthon)、二氯苯腈(dichlobenil)、除線磷(dichlofenthion)、益發靈(dichlofluanid)、二氯萘醌(dichlone)、氯全隆(dichloralurea)、滅幼脲(dichlorbenzuron)、敵草隆(dichlorfenidim)、羧酸苄(dichlorflurecol)、二氯甲丹(dichlorflurenol)、苄胺靈(dichlormate)、二氯丙烯胺(dichlormid)、二氯甲烷、二氯滅座替(dicloromezotiaz)、二氯酚(dichlorophen)、2,4-滴丙酸(dichlorprop)、2,4-滴丙酸-P、二氯松(dichlorvos)、賜克滅(dichlozolin)、賜克滅(dichlozoline)、苄氯三唑醇(diclobutrazol)、雙氯氰菌胺(diclocymet)、禾草靈(diclofop)、達滅淨(diclomezine)、大克爛(dicloran)、雙氯磺草胺(diclosulam)、大克蟎(dicofol)、二氯二苯三氯乙烷(dicophane)、雙香豆素(dicoumarol)、大跨希(dicresyl)、雙特松(dicrotophos)、地快樂(dicryl)、雙羥香豆素(dicumarol)、環蟲腈(dicyclanil)、二環隆(dicyclonon)、地特靈(dieldrin)、得氯蟎(dienochlor)、二依馬(diethamquat)、乙醯甲草胺(diethatyl)、乙硫磷(diethion)、乙硫磷(diéthion)、乙黴威(diethofencarb)、迪艾索諾(dietholate)、迪艾索

(diéthon)、焦碳酸二乙酯(diethyl pyrocarbonate)、二乙
甲苯醯胺(diethyltoluamide)、鼠得克(difenacoum)、待
克利(difenoconazole)、戊味禾草靈(difenopenten)、枯莠
隆(difenoconazole)、野燕枯(difenzoquat)、噻鼠靈
(difethialone)、氟蟎吡(diflovidazin)、二福隆
(diflubenzuron)、吡氟草胺(diflufenican)、吡氟草胺
(diflufenicanil)、氟吡草腓(diflufenzopyr)、二氟林
(diflumetorim)、敵草克(dikegulac)、二羥丙茶鹼
(dilor)、滴馬提夫(dimatif)、四氟甲醚菊酯
(dimefluthrin)、甲氟磷(dimefox)、啞啞隆(dimefuron)、
殺蟲雙(dimehypo)、哌草丹(dimepiperate)、菌核淨
(dimetachlone)、地麥威(dimetan)、混滅威
(dimethacarb)、菌核淨(dimethachlone)、二甲草胺
(dimethachlor)、異戊乙淨(dimethametryn)、汰草滅
(dimethenamid)、汰草滅-P、噻節因(dimethipin)、二甲
噻酚(dimethirimol)、大滅松(dimethoate)、達滅芬
(dimethomorph)、苜菊酯(dimethrin)、卡百酸二甲酯
(dimethyl carbate)、二硫二甲烷、酞酸二甲酯、二甲基亞
硝胺(dimethylvinphos)、敵蠅威(dimetilan)、草滅散
(dimexano)、草噻酮(dimidazon)、醚菌胺
(dimoxystrobin)、敵匹硫磷(dimpylate)、殺草隆
(dimuron)、消蟎酚(dinex)、啞菌噁啞(dinjunezuo)、達
克利(diniconazole)、達克利-M、撻乃安(dinitramine)、
二硝基酚、大脫蟎(dinobuton)、白粉克(dinocap)、白粉

克-4、白粉克-6、敵蟪消(dinocton)、地樂特(dinofenate)、
硝戊酯(dinopenton)、硝丙酚(dinoprop)、戊硝酚
(dinosam)、達諾殺(dinoseb)、硝辛酯殺蟪劑
(dinosulfon)、達特南(dinotefuran)、特樂酚(dinoterb)、
硝丁酯(dinoterbon)、苯蟲醯(diufenolan)、殺力松
(dioxabenzofos)、二氧威(dioxacarb)、敵殺磷
(dioxathion)、敵殺磷(dioxation)、敵鼠(diphacin)、得
伐鼠(diphacinone)、得伐鼠(diphenadione)、大芬滅
(diphenamid)、大芬滅(diphenamide)、二苯砒、二苯胺、
硫化二苯基(diphenylsulphide)、調味酸(diproglucic
acid)、胺樂靈(dipropalin)、殺草淨(dipropetryn)、三氯
松(dipterex)、大芬滅替松(dipymetitron)、雙硫氧吡啶
(dipyrithione)、大刈特(diquat)、四硼酸二鈉、殺蟲雙
(disosultap)、環氧十九烷(disparlure)、麥草畏甲酯
(disugran)、賽松(disul)、二硫龍(disulfiram)、二硫松
(disulfoton)、普得松(ditalimfos)、腈硫醯(dithianon)、
大賽伏(dithicrofos)、二硫醯、甲基乙拌磷
(dithiométon)、汰硫草(dithiopyr)、達有龍(diuron)、二
黃原酸(dixanthogen)、*d*-檸檬油精(*d*-limonene)、
DMDS、DMPA、DNOC、十二環味啉(dodemorph)、多
地辛(dodicin)、多寧(dodine)、朵芬娜賓(dofenapyn)、
多果定(dogvadine)、多明尼卡路(dominicalure)、多滅蟲
(doramectin)、DPC、胼菌酮(drazoxolon)、DSMA、右
旋反式氯丙炔菊酯(*d-trans*-allethrin)、右旋反式苜呋菊酯

(*d-trans*-resmethrin)、毒氟磷(dufulin)、殺草隆(dymron)、EBEP、EBP、克線丹(ebufos)、蛻皮甾酮(ecdysterone)、氯唑靈(echlomezol)、EDB、EDC、EDDP、護粒松(edifenphos)、甘草津(eglinazine)、因滅汀(emamectin)、EMPC、益避寧(empenthrin)、烯腺嘌呤(enadenine)、安殺番(endosulfan)、草多索(endothal)、草多索(endothall)、因毒磷(endothion)、安特靈(endrin)、烯肱菌酯(enestroburin)、恩康唑(enilconazole)、烯肱菌酯(enoxastrobin)、除蟎酯(ephirsulfonate)、EPN、丙醯芸苔素內酯(epocholeone)、保幼醯(epofenonane)、依普座(epoxiconazole)、乙醯胺基阿維菌素(eprinomectin)、磺唑草(epronaz)、EPTC、抑草蓬(erbon)、鈣化醇(ergocalciferol)、二氯醯草胺(erlujixiancaon)、富右旋反式丙烯菊酯(esdépalléthrine)、益化利(esfenvalerate)、ESP、禾草畏(esprocarb)、乙烯矽(etacelasil)、乙環唑(etaconazole)、抑他風(etaphos)、益地安(etem)、噻唑菌胺(ethaboxam)、克草胺(ethachlor)、乙丁烯氟靈(ethalfluralin)、胺苯磺隆(ethametsulfuron)、殺草胺(ethaprochlor)、乙烯利(ethephon)、磺噻隆(ethidimuron)、愛芬克(ethiofencarb)、硫草敵(ethiolate)、愛殺松(ethion)、乙噻草酮(ethiozin)、乙蟲腈(ethiprole)、依瑞莫(ethirimol)、益硫磷(ethoate-methyl)、乙氧苯草胺(ethobenzanid)、益覆滅

(ethofumesate)、乙基己二醇(ethohexadiol)、滅克磷(ethoprop)、普伏松(ethoprophos)、氯氟草醚(ethoxyfen)、乙氧基喹啉(ethoxyquin)、亞速隆(ethoxysulfuron)、吲唑酯(ethychlozate)、甲酸乙酯(ethyl formate)、焦磷酸乙酯(ethyl pyrophosphate)、乙滴涕(ethylan)、乙基-DDD、乙烯、二溴化乙烯、二氯化乙烯、環氧乙烷、乙蒜素(ethylicin)、乙基汞2,3二羥基丙基硫醇酯(ethylmercury 2,3-dihydroxypropyl mercaptide)、乙基乙酸汞(ethylmercury acetate)、乙基溴化汞(ethylmercury bromide)、乙基氯化汞、乙基磷酸汞、硝草酚(etinofen)、ETM、乙胺草醚(etnipromid)、乙氧苯草胺(etobenzanid)、依芬寧(etofenprox)、依殺蟎(etoxazole)、依得利(etridiazole)、益多松(etrifos)、益多松(étrifos)、丁香酚(eugenol)、EXD、凡殺同(famoxadone)、胺磺磷(famphur)、伐草克(fenac)、咪唑菌酮(fenamidone)、敵磺鈉(fenaminosulf)、烯肟菌胺(fenaminstrobin)、芬滅松(fenamiphos)、咪菌腈(fenapanil)、芬瑞莫(fenarimol)、醯苯磺威(fenasulam)、抗蟎唑(fenazaflor)、芬殺蟎(fenazaquin)、芬克座(fenbuconazole)、芬佈賜(fenbutatin oxide)、解草唑(fenclorazole)、樂乃松(fenclorphos)、樂乃松(fenclorfos)、解草啞(fenclorim)、芬硫克(fenethacarb)、五氟苯菊酯(fenfluthrin)、甲呋醯胺(fenfuram)、環醯菌胺(fenhexamid)、非草隆(fenidin)、

種衣酯(fenitropan)、撲滅松(fenitrothion)、芬蟎酯(fénizon)、酚菌酮(fenjuntong)、丁基滅必蝨(fenobucarb)、毒菌錫(fenolovo)、2,4,5-涕丙酸(fenoprop)、芬硫克(fenothiocab)、芬噁寧(fenoxacrim)、芬諾尼(fenoxanil)、芬殺草(fenoxaprop)、芬殺草-P、異噁苯磺(fenoxasulfone)、芬諾克(fenoxycarb)、拌種咯(fenpiclonil)、吡氯氰菊酯(fenpirithrin)、芬普寧(fenpropathrin)、苯鏽啉(fenpropidin)、芬普福(fenpropimorph)、胺苯吡菌酮(fenpyrazamine)、芬普蟎(fenpyroximate)、芬昆諾三酮(fenquinotrione)、殺雄嗪(fenridazon)、芬蟎酯(fenson)、繁福松(fensulfothion)、氯苯氧乙醇(fenteracol)、噻唑禾草靈(fenthiaprop)、芬殺松(fenthion)、乙基芬殺松(fenthion-ethyl)、噻唑禾草靈(fentiaprop)、三苯錫(fentin)、四唑醯草胺(fentrazamide)、芳氟胺(fentrifanil)、非草隆(fenuron)、非草隆TCA、芬化利(fenvalerate)、富爾邦(ferbam)、富米綜(ferimzone)、磷酸鐵、硫酸亞鐵、芬普尼(fipronil)、麥草氟酯(flamprop)、麥草氟酯-M、伏速隆(flazasulfuron)、伏滅鼠(flocoumafen)、弗美托奎(flometoquin)、氟尼胺(flonicamid)、雙氟磺草胺(florasulam)、嘧蟎酯(flucacrypyrim)、伏寄普(fluzifop)、伏寄普-P(fluzifop-P)、扶吉胺(fluzinam)、異丙吡草酯(fluzolate)、氟啉蟬脛

(fluazuron)、氟大滅(flubendiamide)、氟苯并胺噻唑(flubenzimine)、溴氟菊酯(flubrocythrinat e)、氟酮磺隆(flucarbazon e)、氟吡磺隆(flucetosulfuron)、氟消草(fluchloralin)、伏克隆(flucofuron)、氟蟎脲(flucycloxuron)、護賽寧(flucythrinate)、護汰寧(fludioxonil)、聯氟蟎(fluénéthyl)、聯苯氟(fluenetil)、氟噻蟲磺(fluensulfone)、氟噻草胺(flufenacet)、嘧蟲胺(flufenerim)、弗芬肯(flufenican)、氟芬隆(flufenoxuron)、氟菌蟎酯(flufenoxystrobin)、三氟醚菊酯(flufenprox)、氟噻嗪草酯(flufenpyr)、氟蟎嗪(flufenzine)、丁蟲腈(flufiprole)、氟菲殺磺(fluhexafon)、氟氯苯菊酯(flumethrin)、氟醯菌胺(flumetover)、氟節胺(flumetralin)、啞嘧磺草胺(flumetsulam)、氟每淨(flumezin)、氟烯草酸(flumiclorac)、丙炔氟草胺(flumioxazin)、炔草胺(flumipropyn)、氟味啉(flumorph)、可奪草(flumeturon)、氟比來(fluopicolide)、氟吡菌醯胺(flupyram)、氟殺蟎(fluorbenside)、增糖胺(fluridamid)、氟乙醯胺(fluoroacetamide)、氟乙酸(fluoroacetic acid)、氟咯草酮(fluorochloridone)、三氟硝草醚(fluorodifen)、乙羧氟草醚(fluoroglycofen)、氟醯亞胺(fluoroimide)、氟氯菌核利(fluoromide)、啞啞草(fluoromidine)、氟除草醚(fluoronitrofen)、氯氟吡氧乙酸(fluoroxypyr)、殺克丹(fluothiuron)、三氟苯唑

(fluotrimazole)、氟嘧菌酯(fluxastrobin)、氟胺草啞(flupoxam)、氟異丙嘧草酯(flupropacil)、氟鼠啞(flupropadine)、氟丙酸(flupropanate)、弗比南載夫隆(flupyradifurone)、氟啞嘧磺隆(flupyrsulfuron)、氟啞啞(flquinconazole)、氟拉藍(fluralaner)、解草安(flurazole)、抑草丁(flurecol)、抑草丁(flurenol)、氟啞草酮(fluridone)、氟咯草酮(flurochloridone)、氟氯嘧定(fluromidine)、氟氯比(fluroxypyr)、呋啞醇(flurprimidol)、硫氟磺醯胺(flursulamid)、呋草酮(flurtamone)、護矽得(flusilazole)、氟硫滅(flusulfamide)、氟蟊嗪(flutenzine)、氟噠草酯(fluthiacet)、氟噠草胺(fluthiamide)、氟停安(flutianil)、福多寧(flutolanil)、護汰芬(flutriafol)、福化利(flualinate)、氟啞菌醯胺(fluxapyroxad)、胟草安(fluxofenim)、滅菌丹(folpel)、福爾培(folpet)、氟磺胺草醚(fomesafen)、大福松(fonofos)、甲醯胺磺隆(foramsulfuron)、氟吡脲(forchlorfenuron)、甲醛、覆滅蟊(formetanate)、福木松(formothion)、藻蟊威(formparanate)、調節磷(fosamine)、福賽得(fosetyl)、丁苯硫磷(fosmethilan)、甲基氯吡磷(fospirate)、福賽絕(fosthiazate)、丁硫環磷(fosthietan)、弗羅塔林(frontalin)、四氯苯酞(fthalide)、麥穗靈(fuberidazole)、氟草淨(fucaojing)、氟草醚(fucaomi)、氟菌蟊酯(fjunmanzhi)、氟乳醚(fulumi)、薰草呋(fumarin)、氟

奈西草林(funaihecaoling)、呋苯硫脲(fuphenthiourea)、
乙二醇縮糠醛(furalane)、呋霜靈(furalaxyl)、呋呋菊酯
(furamethrin)、福拉比(furametpyr)、呋喃蟲醯肼(furan
tebufenozide)、呋線威(furathiocarb)、二甲呋醯胺
(furcarbanil)、呋菌唑(furconazole)、呋菌唑
(furconazole)-順式、糠醛菊酯(furethrin)、糠醛
(furfural)、呋喃解草唑(furilazole)、伴種胺
(furmecyclox)、呋甲硫菌靈(furophanate)、呋氧草醚
(furyloxyfen)、 γ -BHC、 γ -賽洛寧
(*gamma*-cyhalothrin)、 γ -HCH、格蟻酯(genit)、赤黴酸
(gibberellic acid)、赤黴素A3(gibberellin A3)、赤黴素
(gibberellins)、甘氟(gliftor)、鼠甘伏(glitor)、氯醛葡萄糖
(glucochloralose)、草銨膦(glufosinate)、草銨膦-P、固
毆寧(glyodin)、乙二胟(glyoxime)、嘉磷塞
(glyphosate)、草甘二膦(glyphosine)、誘蟲十六酯
(gossyplure)、誘殺烯混劑(grandlure)、灰黃黴素
(griseofulvin)、胍諾克丁(guanoctine)、雙胍辛
(guazatine)、丙烯酸喹啉酯(halacrinatate)、哈洛昔芬
(halauxifen)、合芬寧(halfenprox)、合芬隆
(halofenozide)、鹵殺芬(halosafen)、合速隆
(halosulfuron)、氟啶草(haloxydine)、合氯氟
(haloxyfop)、合氯氟-P、合氯氟-R、HCA、HCB、HCH、
六甲蜜胺(hemel)、海母帕(hempa)、HEOD、飛佈達
(heptachlor)、烯胟菌(heptafluthrin)、飛達松

(heptenophos)、增產肱(heptopargil)、除莠菌素(herbimycin)、除莠菌素A(herbimycin A)、速殺硫磷(heterophos)、六氯(hexachlor)、六六六(hexachloran)、六氯丙酮(hexachloroacetone)、六氯苯、六氯丁二烯、六氯酚(hexachlorophene)、菲克利(hexaconazole)、六伏隆(hexaflumuron)、六伏胺(hexafluoramin)、六氟鹽(hexaflurate)、紅鈴誘烯(hexalure)、己醯胺(hexamide)、菲殺淨(hexazinone)、己硫松(hexylthiofos)、合賽多(hexythiazox)、HHDN、赫洛塞呋(holosulf)、高油菜素內酯(homobrassinolide)、磺硝肱(huancaiwo)、環蟲腈(huanchongjing)、磺草靈(huangcaoling)、環菌唑(huanjunzuo)、愛美隆(hydramethylon)、汞加芬(hydrargaphen)、熟石灰(hydrated lime)、氫氰胺(hydrogen cyanamide)、氰化氫(hydrogen cyanide)、烯蟲乙酯(hydroprene)、土菌消(hydroxyisoxazole)、殺紋寧(hymexazol)、水奎威(hyquincarb)、IAA、IBA、IBP、埃卡瑞丁(icaridin)、依滅列(imazalil)、咪草酸(imazamethabenz)、甲氧咪草煙(imazamox)、甲咪唑烟酸(imazapic)、依滅草(imazapyr)、滅草啞(imazaquin)、咪唑乙煙酸(imazethapyr)、依速隆(imazosulfuron)、易胺座(imibenconazole)、新煙鹼類(imicyafos)、益達胺(imidacloprid)、氯噻啉(imidaclothiz)、克熱淨(iminoctadine)、依普寧(imiprothrin)、依納素(inabenfide)、茛草酮(indanofan)、三嗪茛草胺

(indaziflam)、因得克(indoxacarb)、枯瘟淨(inezin)、矽藻土(infusorial earth)、碘普尼(iodobonil)、碘卡佈(iodocarb)、丙胺磷(iodofenphos)、碘甲烷(iodomethane)、碘磺隆(iodosulfuron)、碘芬磺隆(iofensulfuron)、碘苯腈(ioxynil)、抑草津(ipazine)、IPC、種菌唑(ipconazole)、鹵苯胺唑(ipfencarbazone)、依普芬三氟康納唑(ipfentrifluconazole)、丙基喜樂松(iprobenfos)、依普同(iprodione)、丙森辛(iprovalicarb)、丙草定(iprymidam)、小蟲二醇烯(ipsdienol)、小蟲醇烯(ipsenol)、IPSP、IPX、依殺米朵孚斯(isamidofos)、依殺松(isazofos)、碳氯靈(isobenzan)、丁咪醯胺(isocarbamid)、丁咪醯胺(isocarbamide)、水胺硫磷(isocarbophos)、異草定(isocil)、異氯甲橋(isodrin)、亞芬松(isofenphos)、甲基亞芬松、艾索非他米(isofetamid)、異索威(isolan)、丁吡草酮(isomethiozin)、異草完隆(isonoruron)、異潘松(isopamphos)、氮葦草(isopolinate)、滅必蝨(isoprocab)、異草定(isoprocil)、異丙樂靈(isopropalin)、異丙吡草酯(isopropazol)、亞賜圃(isoprothiolane)、異丙隆(isoproturon)、萘吡菌胺(isopyrazam)、異皮莫(isopyrimol)、獲賜松(isothioate)、異噻菌胺(isotianil)、愛速隆(isouron)、異凡二酮(isovaledione)、異嘮草胺(isoxaben)、異嘮氯草酮(isoxachlortole)、雙苯噁唑酸(isoxadifen)、異嘮唑草酮

(isoxaflutole)、異嘮草醚(isoxapyrifop)、加福松(isoxathion)、異噁隆(isuron)、依維菌素(ivermectin)、異嘮草胺(ixoxaben)、淨種磷(izopamfos)、淨種磷(izopamphos)、茉莉油(japonilure)、喃烯菊酯(japothrins)、茉莉菊酯素(jasmolin)I、茉莉菊酯素II、茉莉酸(jasmonic acid)、甲磺蔥脘(jiahuangchongzong)、甲基硝啉(jiajizengxiaolin)、甲香菊酯(jiaxiangjunzhi)、解草完(jiecaowan)、解草稀(jiecaoxi)、井崗黴素A(Jinganmycin A)、護粒松(jodfenphos)、青春激素I(juvenile hormone I)、青春激素II、青春激素III、噁噁菊酯(kadethrin)、κ-畢芬寧(kappa-bifenthrin)、κ-汰福寧(kappa-tefluthrin)、特胺靈(karbutilate)、卡列他南(karetazan)、嘉賜黴素(kasugamycin)、柯均林(kejunlin)、氯戊環(kelevan)、酮螺氧(ketospiradox)、矽藻土(kieselguhr)、細胞分裂素(kinetin)、烯蟲炔酯(kinoprene)、精苯霜靈(kiralaxyl)、克收欣(kresoxim-methyl)、庫卡辛(kuicaoxi)、乳氟禾草靈(lactofen)、λ-賽洛寧(*lambda*-cyhalothrin)、拉提路(latilure)、砷酸鉛(lead arsenate)、環草定(lenacil)、里琵菌素(lepimectin)、福賜松(leptophos)、聯苯胼酯(lianbenjingzhi)、石灰硫磺(lime sulfur)、靈丹(lindane)、雷尼汀(lineatin)、理有龍(linuron)、力輪松(lirimfos)、利露(litlure)、誘池蛾酯(looplure)、祿芬隆(lufenuron)、氯醯草膦(lüxiancaolin)、氯啞菌酯

(lvdingjunzhi)、氯氟醚菊酯(lvfumijvzhi)、氯醯草膦(lvxiancaolin)、噻唑磷(lythidathion)、M-74、M-81、MAA、磷化鎂、馬拉松(malathion)、麥迪遜(maldison)、順丁烯二醯肼(maleic hydrazide)、特蟎腈(malonoben)、麥芽糊精(maltodextrin)、MAMA、代森錳銅(mancopper)、鋅錳乃浦(mancozeb)、曼戴克敏(mandestrobin)、曼普胺(mandipropamid)、錳乃浦(maneb)、苦參鹼(matrine)、疊氮磷(mazidox)、MCC、MCP、MCPA、硫乙基MCPA、MCPB、MCPB、巴斯丹(mebenil)、滅加松(mecarbam)、苯并威(mecarbinzid)、四甲磷(mecarphon)、2-甲-4-氯丙酸(mecoprop)、2-甲-4-氯丙酸-P、殺蟎脛(medimeform)、地樂施(medinoterb)、誘殺酯(medlure)、滅芬草(mefenacet)、右滅達樂(mefenoxam)、吡唑二酸(mefenpyr)、氟磺醯草胺(mefluidide)、十四碳二烯酸(megatomoic acid)、蜜蠟醇、雙薰草素醇(melitoxin)、MEMC、美納松(menazon)、MEP、滅派林(mepanipyrim)、氯氟醚菊酯(meperfluthrin)、甲苯諾(mephenate)、美福松(mephosfolan)、甲哌啶(mepiquat)、滅普寧(mepronil)、敵蟎普(meptyldinocap)、滅蟲威(mercaptodimethur)、倍硫磷(mercaptophos)、內吸磷(mercaptophos thiol)、馬拉硫磷(mercaptothion)、氯化汞、氧化汞、氯化亞汞、脫葉亞磷(merphos)、脫葉亞磷氧化物(merphos oxide)、滅莠津(mesoprazine)、磺胺磺隆(mesosulfuron)、硝磺草

酮 (mesotrione) 、 甲 硫 酚 (mesulfen) 、 倍 硫 磷 亞 砷 (mesulfenfos) 、 每 蘇 芬 (mesulphen) 、 間 甲 酚 (metacresol) 、 美 氟 綜 (metaflumizone) 、 滅 達 樂 (metalaxyl) 、 右 滅 達 樂 (metalaxyl-M) 、 聚 乙 醛 (metaldehyde) 、 斯 美 地 (metam) 、 啞 啞 醯 草 胺 (metamifop) 、 苯 吡 草 酮 (metamitron) 、 偏 磷 酸 鈣 (metaphos) 、 興 豐 寶 (metaxon) 、 滅 草 胺 (metazachlor) 、 雙 醚 氯 吡 啶 磺 隆 (metazosulfuron) 、 間 氯 敵 菌 酮 (metazoxolon) 、 滅 特 座 (metconazole) 、 甲 基 涕 巴 (metepa) 、 二 甲 噠 草 伏 (metflurazon) 、 甲 基 苯 噠 隆 (methabenzthiazuron) 、 滅 克 松 (methacrifos) 、 甲 基 丙 樂 靈 (methalpropalin) 、 威 百 畝 (metham) 、 達 馬 松 (methamidophos) 、 滅 速 克 (methasulfocarb) 、 滅 草 啞 (methazole) 、 呋 菌 胺 (methfuroxam) 、 甲 基 苯 噠 隆 (methibenzuron) 、 滅 大 松 (methidathion) 、 甲 硫 苯 威 (methiobencarb) 、 滅 賜 克 (methiocarb) 、 甲 硫 啶 磺 隆 (methiopyrisulfuron) 、 甲 硫 涕 巴 (methiotepa) 、 美 西 除 靈 (methiozolin) 、 滅 草 恆 (methiuron) 、 殺 蟲 乙 烯 磷 (methocrotophos) 、 速 滅 威 (métholcarb) 、 醚 草 通 (methometon) 、 納 乃 得 (methomyl) 、 美 賜 平 (methoprene) 、 蓋 草 津 (methoprotryn) 、 格 草 淨 (methoprotryne) 、 喹 啉 羧 酸 - 丁 基 (methoquin-butyl) 、 甲 醚 菊 酯 (methothrin) 、 甲 氧 滴 涕 (methoxychlor) 、 滅 芬 諾 (methoxyfenozide) 、 去 草 酮 (methoxyphenone) 、 甲 基

啞磷嗪(methyl apholate)、溴甲烷、甲基丁香粉(methyl eugenol)、碘甲烷(methyl iodide)、異硫氰酸甲酯(methyl isothiocyanate)、甲基巴拉松(methyl parathion)、甲基乙酯磷(methylacetophos)、甲氯仿、甲基二硫胺甲酸(methyldithiocarbamic acid)、甲基殺草隆(methyldymron)、二氯甲烷、甲基亞芬松(methyl-isofenphos)、甲基倍硫磷(methylmercaptophos)、甲基倍硫磷氧化物(methylmercaptophos oxide)、甲基內吸磷(methylmercaptophos thiol)、甲基苯甲酸汞(methylmercury benzoate)、甲基汞二氰二胺(methylmercury dicyandiamide)、甲基五氯苯氧化汞(methylmercury pentachlorophenoxide)、亞甲癸醯胺(methylneodecanamide)、殺螟硫磷(methylnitrophos)、保棉磷(methyltriazothion)、啞嘧磺草胺(metiozolin)、免得爛(metiram)、免得爛鋅(metiram-zinc)、吡喃隆(metobenzuron)、撲奪草(metobromuron)、美特寧(metofluthrin)、莫多草(metolachlor)、治滅蟲(metolcarb)、苯磺隆(metometuron)、苯氧菌胺(metominostrobin)、磺草啞胺(metosulam)、啞蟲酮(metoxadiazone)、甲氧隆(metoxuron)、滅芬農(metrafenone)、代森聯(metriam)、滅必淨(metribuzin)、敵百蟲(metrifonate)、敵百蟲(metriphonate)、噁菌胺(metsulfovax)、磺隆(metsulfuron)、美文松

(mevinphos) 、 治 克 威 (mexacarbate) 、 滅 除 威 (miechuwei) 、 邁 森 (mieshuan) 、 滅 蚊 菊 酯 (miewenjuzhi) 、 密 滅 汀 (milbemectin) 、 倍 脈 心 (milbemycin oxime) 、 代 森 環 (milneb) 、 嘜 蟻 胺 (mima2nan) 、 丙 胺 氟 磷 (mipafox) 、 MIPC 、 滅 蟻 樂 (mirex) 、 MNAF 、 蘑 菇 醇 (moguchun) 、 稻 得 壯 (molinate) 、 殺 蟲 單 (molosultap) 、 氧 苄 氟 菊 酯 (momfluorothrin) 、 庚 醯 草 胺 (monalide) 、 莫 尼 速 隆 (monisuron) 、 單 甲 脒 (monoamitraz) 、 一 氯 乙 酸 、 亞 素 靈 (monocrotophos) 、 綠 谷 龍 (monolinuron) 、 殺 蟲 單 (monomehypo) 、 舒 非 侖 (monosulfiram) 、 單 嘜 磺 隆 (monosulfuron) 、 殺 蟲 單 (monosultap) 、 滅 草 隆 (monuron) 、 滅 草 隆 TCA 、 伐 草 快 (morfamquat) 、 嗎 啉 胍 (moroxydine) 、 茂 硫 磷 (morphothion) 、 墨 茲 (morzid) 、 莫 西 菌 素 (moxidectin) 、 MPMC 、 MSMA 、 MTMC 、 誘 蟲 烯 (muscalure) 、 邁 克 尼 (myclobutanil) 、 滅 克 寧 (myclozolin) 、 三 十 醇 (myricyl alcohol) 、 *N*-(乙 基 汞)-對-甲 苯 磺 醯 胺 苯 、 NAA 、 NAAM 、 代 森 鈉 (nabam) 、 萘 呋 磷 (naftalofos) 、 乃 力 松 (naled) 、 萘 、 萘 乙 醯 胺 、 萘 二 甲 酸 酐 (naphthalic anhydride) 、 萘 酞 磷 (naphthalophos) 、 萘 氧 乙 酸 、 萘 乙 酸 、 萘 啉 烷 -1,3- 二 酮 (naphthylindane-1,3-diones) 、 萘 氧 基 乙 酸 (naphthyloxyacetic acids) 、 萘 丙 胺 (naproanilide) 、 滅 落 脫 (napropamide) 、 滅 落 脫 -M (napropamide-M) 、 納 得 爛

(naptalam)、納他黴素(natamycin)、NBPOS、草不隆(neburea)、草不龍(neburon)、安特靈(nendrin)、新菸鹼、尼克羅福(nichlorfos)、除草醚(niclofen)、氯硝柳胺(niclosamide)、啞醯菌胺(nicobifen)、煙嘧磺隆(nicosulfuron)、尼古丁、硫酸菸鹼(nicotine sulfate)、伏蟻靈(nifluridide)、尼克黴素(nikkomycins)、NIP、吡氯草胺(nipyraclofen)、氟氯草胺(nipyralofen)、烯啶蟲胺(nitenpyram)、硝乙脲噻啞(nithiazine)、滅殺草(nitralin)、氯啞(nitrapyrin)、戊氰威(nitrilacarb)、護谷(nitrofen)、三氟甲草醚(nitrofluorfen)、硝苯乙烯(nitrostyrene)、酞菌酯(nitrothal-isopropyl)、鼠特靈(nobormide)、壬醇、鼠特靈(norbormide)、草完隆(norea)、氟草敏(norflurazon)、降菸鹼(nornicotine)、草完隆(noruron)、諾伐隆(noaluron)、多氟脲(noviflumuron)、NPA、尼瑞莫(nuarimol)、諾瑞隆(nuranone)、OCH、八氯二丙基醚、辛噻酮(octhilinone)、鄰二氯苯(*o*-dichlorobenzene)、呋醯胺(ofurace)、歐滅松(omethoate)、鄰苯基苯酚、坪草丹(orbencarb)、歐弗拉洛(orfralure)、坪草丹(orthobencarb)、鄰二氯苯(*ortho*-dichlorobenzene)、噻苯胺磺隆(orthosulfamuron)、歐塔路(oryctalure)、肱醯菌胺(orysastrobin)、歐拉靈(oryzalin)、王草腦(osthol)、王草腦(osthole)、歐斯措莫(ostramone)、除蟻酯(ovatron)、蟻淨(ovex)、解草腈(oxabetrinil)、丙炔啉草酮

(oxadiargyl)、樂滅草(oxadiazon)、毆殺斯(oxadixyl)、草氨酸酯(oxamate)、歐殺滅(oxamyl)、草噻松(oxapyrazon)、草噻松(oxapyrazone)、環氧嘧磺隆(oxasulfuron)、奧賽普林(oxathiapiprolin)、啞吡草酮(oxaziclomefone)、快得寧(oxine-copper)、快得寧(oxine-Cu)、歐索林酸(oxolinic acid)、啞咪唑(oxpoconazole)、嘉保信(oxycarboxin)、滅多松(oxydemeton-methyl)、異亞砒磷(oxydeprofos)、砒拌磷(oxydisulfoton)、羥烯腺嘌呤(oxyadenine)、復祿芬(oxyfluorfen)、氧化苦參鹼(oxymatrine)、土黴素(oxytetracycline)、滅蟎猛(oxythioquinox)、PAC、巴克素(paclobutrazol)、哌蟲啉(paichongding)、亞烈寧(palléthrine)、PAP、對-二氯苯(*para*-dichlorobenzene)、對氟隆(parafluron)、巴拉刈(paraquat)、巴拉松(parathion)、甲基巴拉松、苯吡醇(parinol)、巴黎綠(Paris green)、PCNB、PCP、PCP-Na、對-二氯苯(*p*-dichlorobenzene)、PDJ、克草猛(pebulate)、消蟎酚(pédinex)、披扶座(pefurazoate)、壬酸(pelargonic acid)、平克座(penconazole)、賓克隆(pencycuron)、施得圃(pendimethalin)、半滴乙酯(penfenate)、戊苯吡菌胺(penflufen)、氟幼脲(penfluron)、二甲戊靈(penoxalin)、平速爛(penoxsulam)、五氯酚(pentachlorophenol)、月桂酸五氯苯酯(pentachlorophenyl laurate)、甲氯醯草胺

(pentanochlor) 、 噻菌胺 (penthioyrad) 、 百滅寧 (pentmethrin) 、 環戊嘔草酮 (pentoxazone) 、 滅蟻靈 (perchlordecone) 、 苯氟磺安 (perfluidone) 、 百滅寧 (permethrin) 、 烯草胺 (pethoxamid) 、 PHC 、 氰烯菌胺 (phenamacril) 、 乙基氰烯菌胺 (phenamacril-ethyl) 、 敵磺鈉 (phénaminosulf) 、 葉枯淨 (phenazine oxide) 、 酚那卡貝 (phénétacarbe) 、 棉胺寧 (phenisopham) 、 芬硫磷 (phenkapton) 、 甜菜寧 (phenmedipham) 、 乙基甜菜寧 、 醯草隆 (phenobenzuron) 、 酚硫殺 (phenothiol) 、 酚丁滅寧 (phenothrin) 、 苯蟎醚 (phenproxide) 、 賽達松 (phenthoate) 、 苯基汞脲 (phenylmercuriurea) 、 苯基乙酸汞 (phenylmercury acetate) 、 苯基汞氯化物 (phenylmercury chloride) 、 焦兒茶酚之苯基汞衍生物 (phenylmercury derivative of pyrocatechol) 、 硝酸苯汞 (phenylmercury nitrate) 、 苯基汞水楊酸鹽 (phenylmercury salicylate) 、 福瑞松 (phorate) 、 毒鼠磷 (phosacetim) 、 裕必松 (phosalone) 、 特丁淨 (phosametine) 、 毒鼠磷 (phosazetim) 、 毒鼠磷 (phosazetin) 、 三磷錫 (phoscyclotin) 、 氯瘟磷 (phosdiphen) 、 乙磷 (phosethyl) 、 硫環磷 (phosfolan) 、 硫環磷 - 甲基 (phosfolan-methyl) 、 甘胺硫磷 (phosglycin) 、 益滅松 (phosmet) 、 對氯硫磷 (phosnichlor) 、 磷醯胺 (phosphamide) 、 福賜米松 (phosphamidon) 、 磷、草丁磷 (phosphinothricin) 、 磷克

(phosphocarb)、磷、三磷錫(phostin)、巴賽松(phoxim)、
甲基巴賽松、熱必斯(phthalide)、亞胺硫磷
(phthalophos)、胺菊酯(phthalthrin)、皮卡布西
(picarbutrazox)、避卡蚋叮(picaridin)、畢克爛
(picloram)、氟吡醯草胺(picolinafen)、啞氧菌酯
(picoxystrobin)、鏈黴菌素(pimaricin)、殺鼠酮
(pindone)、啞啞草酯(pinoxaden)、哌丙靈(piperalin)、
哌啉(piperazine)、胡椒基丁氧化物、胡椒基環己烯酮
(piperonyl cyclonene)、哌草磷(piperophos)、哌壯素
(piproctanly)、哌壯素(piproctanyl)、增效醛(piprotal)、
必美松(pirimetaphos)、比加普(pirimicarb)、滅鼠優
(piriminil)、嘧啞氧磷(pirimioxyphos)、必滅松
(pirimiphos-ethyl)、亞特松(pirimiphos-methyl)、殺鼠
酮(pival)、殺鼠酮(pivaldione)、三氯殺三氯酯
(plifenate)、PMA、PMP、聚丁烯(polybutenes)、聚胺
甲酸酯(polycarbamate)、多氯化茨烯
(polychlorcamphene)、聚乙氧基喹啉
(polyethoxyquinoline)、保粒黴素D (polyoxin D)、保粒
黴素(polyoxins)、保粒黴素丁(polyoxorim)、多噻烷
(polythialan)、亞砷酸鉀(potassium arsenite)、疊氮化鉀
(potassium azide)、氰酸鉀、乙基黃原酸鉀(potassium
ethylxanthate)、環烷酸鉀(potassium naphthenate)、多
硫化鉀(potassium polysulfide)、硫氰酸鉀(potassium
thiocyanate)、4,4-滴滴涕(pp'-DDT)、普亞烈寧

(prallethrin)、早熟素I(precocene I)、早熟素II、早熟素III、普拉草(pretilachlor)、嘧啶松(primidophos)、氟嘧磺隆(primisulfuron)、撲殺熱(probenazole)、撲克拉(prochloraz)、丙氯醇(proclonol)、丙腈津(procyazine)、撲滅寧(procymidone)、氨氟樂靈(prodiamine)、佈飛松(profenofos)、氟唑草胺(profluazol)、環丙氟靈(profluralin)、丙氟菊酯(profluthrin)、氯苯噻草酮(profoxydim)、殺蟲安(profurite-aminium)、丙草止津(proglinazine)、調環酸(prohexadione)、茉莉酮(prohydrojasmon)、蜚虱威(promacyl)、普滅克(promecarb)、撲滅通(prometon)、佈滅淨(prometryn)、佈滅淨(prometryne)、捕滅鼠(promurit)、拿草特(pronamide)、雷蒙得(propachlor)、丙蟲磷(propafos)、普羅帕脒(propamidine)、普拔克(propamocarb)、除草寧(propanil)、加護松(propaphos)、普拔草(propaquizafop)、毆蟎多(propargite)、撲蟲菊(proparthrin)、普拔根(propazine)、撲達松(propetamphos)、苯胺靈(propham)、普克利(propiconazole)、羥哌酯(propidine)、甲基鋅乃浦(propineb)、異丙草胺(propisochlor)、安丹(propoxur)、丙苯磺隆(propoxycarbazone)、丙基增效劑(propyl isome)、吡啶唑嘧磺隆(propyrisulfuron)、戊炔草胺(propyzamide)、丙氧喹啉(proquinazid)、骨酯素(prosuler)、甲硫磺樂靈(prosulfalin)、苜草丹

(prosulfocarb)、三氟丙磺隆(prosulfuron)、乙噻唑磷(prothidathion)、胺丙威(prothiocarb)、丙硫菌唑(prothioconazole)、普硫松(prothiofos)、飛克松(prothoate)、丙苯炔菊酯(protrifenbute)、撲滅生(proxan)、吡嘧丹磷(prymidophos)、丙炔草胺(prynachlor)、補骨脂素(psoralen)、補骨脂素(psoralene)、吡達農(pydanon)、派福布敏(pyflubumide)、派滅淨(pymetrozine)、賜加落(pyracarbolid)、白克松(pyraclofos)、雙唑草腈(pyraclonil)、百克敏(pyraclostrobin)、派芬草(pyraflufen)、必伏清(pyrafluprole)、嘧啶威(pyramat)、唑胺菌酯(pyrametostrobin)、唑菌酯(pyraoxystrobin)、磺醯草吡唑(pyrasulfotole)、必記福敏(pyraziflumid)、吡唑特(pyrazolate)、苜草唑(pyrazolynate)、殺草敏(pyrazon)、白粉松(pyrazophos)、百速隆(pyrazosulfuron)、彼硫磷(pyrazothion)、普芬草(pyrazoxyfen)、吡菊酯(pyresmethrin)、除蟲菊精I、除蟲菊精II、除蟲菊精類、草醚-異丙基(pyribambenz-isopropyl)、草醚-丙基(pyribambenz-propyl)、吡菌苯威(pyribencarb)、嘧啶肟草醚(pyribenzoxim)、稗草丹(pyributicarb)、氯草定(pyriclor)、畢達本(pyridaben)、噻草福(pyridafol)、啶蟲丙醚(pyridalyl)、必芬松(pyridaphenthion)、必芬松(pyridaphenthione)、必汰草(pyridate)、雙滴保

(pyridinitril) 、 比 芬 諾 (pyrifenox) 、 氟 蟲 吡 嗒 (pyrifluquinazon) 、 環 酯 草 醚 (pyriftingalid) 、 吡 嘧 他 磷 (pyrimétaphos) 、 派 美 尼 (pyrimethanil) 、 抗 蚜 威 (pyrimicarbe) 、 畢 汰 芬 (pyrimidifen) 、 嘧 草 醚 (pyriminobac) 、 嘧 蟎 胺 (pyriminostrobin) 、 乙 基 嘧 啉 磷 (pyrimiphos-éthyl) 、 甲 基 嘧 啉 磷 (pyrimiphos-méthyl) 、 吡 嘧 蘇 芬 (pyrimisulfan) 、 嘧 硫 磷 (pyrimitate) 、 滅 鼠 優 (pyrinuron) 、 甲 氧 苯 啉 菌 (pyriofenone) 、 必 清 (pyriprole) 、 吡 啉 醇 (pyripropanol) 、 百 利 普 芬 (pyriproxyfen) 、 啉 菌 噁 唑 (pyrisoxazole) 、 嘧 硫 草 醚 (pyrithiobac) 、 吡 啉 威 (pyrolan) 、 百 快 隆 (pyroquilon) 、 吡 啉 磺 (pyroxasulfone) 、 甲 氧 磺 草 胺 (pyroxsulam) 、 氯 甲 氧 吡 啉 (pyroxychlor) 、 氯 吡 根 呋 醚 (pyroxyfur) 、 嗶 草 酸 (qincaosuan) 、 青 枯 靈 (qingkuling) 、 苦 木 (quassia) 、 嗶 烯 酮 (quinacetol) 、 拜 裕 松 (quinalphos) 、 甲 基 拜 裕 松 、 醯 菌 脲 (quinazamid) 、 快 克 草 (quinclorac) 、 嗶 克 座 (quinconazole) 、 氯 甲 嗶 啉 酸 (quinmerac) 、 滅 藻 醯 (quinoclamine) 、 滅 蟎 猛 (quinomethionate) 、 氯 藻 胺 (quinonamid) 、 畜 寧 磷 (quinothion) 、 快 諾 芬 (quinoxifen) 、 嗶 硫 磷 (quintiofos) 、 五 氯 硝 苯 (quintozene) 、 快 伏 草 (quizalofop) 、 快 伏 草 -P 、 驅 蚊 酯 (quwenzhi) 、 驅 蠅 啉 (quyingding) 、 吡 咪 唑 (rabenzazole) 、 碘 醚 柳 胺 (rafoxanide) 、 R- 達 克 利 (R-diniconazole) 、 二 乙 基 苯 甲 醯 胺 (rebemide) 、 敵 草 快

(reglone)、瑞毒隆(renriduron)、列卡路(rescalure)、列滅寧(resmethrin)、硫氰苯胺(rhodethanil)、鬮羊花毒素-III(rhodojaponin-III)、病毒啞(ribavirin)、碸噻磺隆(rimsulfuron)、丁蟲腈(rizazole)、R-滅達樂(R-metalaxyl)、硫氰苯胺(rodéthanil)、皮蠅磷(ronnel)、魚藤酮(rotenone)、蘭尼汀(ryania)、沙巴藜蘆(sabadilla)、噻啞肱草醚(saflufenacil)、噻菌茂(saijunmao)、噻森銅(saisentong)、柳醯胺苯、氟矽菊酯(salifluofen)、血根鹼(sanguinarine)、山道年(santonin)、右亞列寧(S-bioallethrin)、八甲焦磷醯胺(schradan)、海蔥糖苷(scilliroside)、另丁津(sebuthylazine)、仲丁通(secbumeton)、環丙吡菌胺(sedaxane)、色拉菌素(selamectin)、單甲咪(semiamitraz)、增效菊(sesamex)、芝麻啞(sesamolín)、西松(sesone)、西殺草(sethoxydim)、西維因(sevin)、雙甲胺草磷(shuangjiaancaolin)、雙甲胺草磷(shuangjianancaolin)、S-烯蟲乙酯(S-hydroprene)、環草隆(siduron)、西福明津治(sifumijvzhi)、誘蟲環(siglure)、矽護芬(silafluofen)、雜氮矽三環(silatrane)、矽氣凝膠(silica aerogel)、矽膠、矽噻菌胺(silthiofam)、矽噻菌胺(silthiopham)、矽噻菌胺(silthiophan)、2,4,5-涕丙酸(silvex)、草滅淨(simazine)、矽氟啞(simeconazole)、西瑪通(simeton)、西草淨(simetryn)、西草淨(simetryne)、殺雄啞(sintofen)、S-烯蟲炔酯

(S-kinoprene)、熟石灰(slaked lime)、SMA、S-美賜平(S-methoprene)、左旋莫多草(S-metolachlor)、亞砷酸鈉、疊氮化鈉、氯酸鈉、氰化鈉、氟化鈉、氟乙酸鈉、六氟矽酸鈉、環烷酸鈉(sodium naphthenate)、鄰苯基苯酚化鈉(sodium *o*-phenylphenoxide)、鄰苯基苯酚化鈉(sodium orthophenylphenoxide)、五氯酚鈉(sodium pentachlorophenate)、五氯酚鈉(sodium pentachlorophenoxide)、多硫化鈉(sodium polysulfide)、氟矽酸鈉(sodium silicofluoride)、四硫代硫酸鈉(sodium tetrathiocarbonate)、硫氰酸鈉、斯隆(solan)、蘇硫磷(sophamide)、賜諾特(spinetoram)、賜諾殺(spinosad)、賜派芬(spirodiclofen)、螺甲蟎酯(spiromesifen)、螺蟲乙酯(spirotetramat)、螺環菌胺(spiroxamine)、司替羅磷(stirofos)、鏈黴素(streptomycin)、番木鱉鹼(strychnine)、食菌甲誘醇(sulcatol)、殺克隆(sulcofuron)、磺草酮(sulcotrione)、草克死(sulfallate)、氟磺唑草胺(sulfentrazone)、舒非侖(sulfiram)、氟蟲胺(sulfluramid)、磺噻隆(sulfodiazole)、噻磺隆(sulfometuron)、草硫磷(sulfosate)、磺醯磺隆(sulfosulfuron)、治螟磷(sulfotep)、治螟磷(sulfotepp)、氟啶蟲胺腈(sulfoxaflor)、亞砷(sulfoxide)、硫脲磷(sulfoxime)、硫、硫酸、磺醯氟、蘇葡卡賓(sulglycapin)、草硫磷(sulphosate)、硫丙磷(sulprofos)、戊苯砷(sultropen)、

滅草靈 (swep)、τ - 福化利 (*tau*-fluvalinate)、稗草烯 (tavron)、噁蟎威 (tazimcarb)、TBTO、TBZ、TCA、TCBA、TCMTB、TCNB、TDE、得克利 (tebuconazole)、得芬諾 (tebufenozide)、得芬瑞 (tebufenpyrad)、異丁乙氧喹啉 (tebufloquin)、丁基嘧啶磷 (tebupirimfos)、牧草胺 (tebutam)、得葡隆 (tebuthiuron)、克枯爛 (tecloftalam)、四氯硝基苯 (tecnazene)、福美雙聯 (tecoram)、三氯殺蟎虱 (tedion)、得福隆 (teflubenzuron)、汰福寧 (tefluthrin)、特呔三酮 (tefuryltrione)、環磺酮 (tembotrione)、替美磷 (temefos)、亞培松 (temephos)、替哌 (tepa)、TEPP、得殺草 (tepraloxydim)、吡喃草酮 (teproloxydim)、環戊烯丙菊酯 (terallethrin)、特草定 (terbacil)、特草靈 (terbucarb)、特丁草胺 (terbuchlor)、托福松 (terbufos)、特丁通 (terbumeton)、特丁津 (terbuthylazine)、芽根靈 (terbutol)、特丁淨 (terbutryn)、特丁淨 (terbutryne)、五氯硝基苯 (terraclor)、土黴素 (terramicin)、土黴素 (terramycin)、四環唑 (tetcyclacis)、四氯乙烷 (tetrachloroethane)、樂本松 (tetrachlorvinphos)、四克利 (tetraconazole)、得脫蟎 (tetradifon)、殺蟎好 (tetradisul)、四氟隆 (tetrafluron)、治滅寧 (tetramethrin)、四氟醚菊酯 (tetramethylfluthrin)、四胺、殺蟎黴素 (tetranactin)、四普羅 (tetraniliprole)、四氟丙酸鈉 (tetrapion)、殺蟎硫醚 (tetrasul)、硫酸鉍 (thallium sulfate)、硫酸鉍 (thallous


sulfate) 、 欣 克 草 (thenylchlor) 、 θ - 賽 滅 寧 (cypermethrin) 、 腐 絕 (thiabendazole) 、 賽 果 培 (thiacloprid) 、 噻 二 吡 (thiadiazine) 、 噻 噠 氟 (thiadifluor) 、 賽 速 安 (thiamethoxam) 、 噻 磺 隆 (thiameturon) 、 蟲 脞 (thiapronil) 、 噻 氟 隆 (thiazafluron) 、 噻 氟 隆 (thiazfluron) 、 噻 啞 (thiazone) 、 噻 草 啞 (thiazopyr) 、 賽 伏 (thicrofos) 、 噻 菌 脞 (thicyofen) 、 噻 二 啞 草 胺 (thidiazimin) 、 噻 苯 隆 (thidiazuron) 、 酮 脲 磺 草 吩 酯 (thiencarbazone) 、 噻 吩 磺 隆 (thifensulfuron) 、 賽 氟 滅 (thifluzamide) 、 乙 汞 硫 柳 酸 鈉 (thimerosal) 、 甲 拌 磷 (thimet) 、 殺 丹 (thiobencarb) 、 抗 蟲 威 (thiocarboxime) 、 硫 氯 苯 亞 胺 (thiochlorfenphim) 、 硫 氯 苯 亞 胺 (thiochlorphenphime) 、 氰 硫 二 硝 基 苯 (thiocyanatodinitrobenzenes) 、 硫 賜 安 (thiocyclam) 、 硫 丹 (thiodan) 、 噻 菌 - 銅 (thiodiazole-copper) 、 硫 敵 克 (thiodicarb) 、 久 效 威 (thiofanocarb) 、 硫 伐 隆 (thiofanox) 、 硫 氟 肱 (thiofluoximate) 、 不 育 硫 磷 (thiohempa) 、 硫 柳 汞 (thiomersal) 、 硫 滅 松 (thiometon) 、 治 線 磷 (thionazin) 、 多 保 淨 (thiophanate) 、 乙 基 多 保 淨 (thiophanate-ethyl) 、 甲 基 多 保 淨 (thiophanate-methyl) 、 對 硫 磷 (thiophos) 、 克 殺 蟎 (thioquinox) 、 胺 基 硫 脲 (thiosemicarbazide) 、 殺 蟲 雙 (thiosultap) 、 噻 替 派 (thiotepa) 、 殺 線 威 (thioxamyl) 、 得

恩地 (thiram) 、 秋 蘭 姆 (thiuram) 、 蘇 力 菌 素 (thuringiensin) 、 噻 苯 達 唑 (tiabendazole) 、 噻 醞 菌 胺 (tiadinil) 、 氟 丙 嘧 草 酯 (tiafenacil) 、 調 劑 胺 (tiaojiean) 、 TIBA 、 噻 蟎 胺 (tifatol) 、 仲 草 丹 (tiocarbazil) 、 啼 草 胺 (tioclorim) 、 替 奧 沙 芬 (tioazafen) 、 替 係 米 (tioxyimid) 、 威 線 肱 (tirpate) 、 TMTD 、 脫 克 松 (tolclofos-methyl) 、 脫 芬 瑞 (tolfenpyrad) 、 托 普 洛 卡 (tolprocarb) 、 托 普 瑞 蓄 特 (tolpyralate) 、 對 甲 抑 菌 靈 (tolyfluanid) 、 甲 基 益 發 靈 (tolyfluanid) 、 甲 苯 基 乙 酸 汞 、 托 馬 蘭 (tomarin) 、 吡 草 磺 (topramezone) 、 德 克 沙 芬 (toxaphene) 、 TPN 、 三 甲 苯 草 酮 (tralkoxydim) 、 溴 氯 氰 菊 酯 (tralocythrin) 、 泰 滅 寧 (tralomethrin) 、 曲 洛 比 利 (tralopyril) 、 拜 富 寧 (transfluthrin) 、 反 式 百 滅 寧 (transpermethrin) 、 曲 他 胺 (tretamine) 、 三 十 烷 醇 (triacontanol) 、 三 泰 芬 (triadimefon) 、 三 泰 隆 (triadimenol) 、 氟 酮 磺 草 胺 (triafamone) 、 野 麥 畏 (triallate) 、 野 麥 畏 (tri-allate) 、 三 唑 磷 胺 (triamiphos) 、 抑 芽 唑 (triapenthenol) 、 三 苯 噻 蟎 吩 (triarathene) 、 嘧 菌 醇 (triarimol) 、 醚 苯 磺 隆 (triasulfuron) 、 唑 蚜 威 (triazamate) 、 丁 三 唑 (triazbutil) 、 三 吡 氟 草 胺 (triaziflam) 、 三 落 松 (triazophos) 、 乙 基 谷 硫 磷 (triazothion) 、 唑 菌 吡 (triazoxide) 、 鹼 式 氯 化 銅 (tribasic copper chloride) 、 三 元 硫 酸 銅 (tribasic copper sulfate) 、 苯 磺 隆 (tribenuron) 、 脫 葉 磷 (tribufos) 、 氧 化 三 丁 基 錫 、 殺 草 畏 (tricamba) 、 水 楊 菌 胺 (trichlamide) 、

三氯吡氧乙酸(trichlopyr)、三氯松(trichlorfon)、樂乃松(trichlormetaphos)-3、毒壤磷(trichloronat)、壤蟲磷(trichloronate)、三氯三硝基苯(trichlorotrinitrobenzenes)、敵百蟲(trichlorphon)、三氯比(triclopyr)、三環吡菌威(triclopyricarb)、三甲酚(tricresol)、三賽唑(tricyclazole)、三環己基氫氧化錫(tricyclohexyltin hydroxide)、三得芬(tridemorph)、滅草環(tridiphane)、草達津(trietazine)、蝸螺殺(trifenmorph)、三氯丙氧磷(trifenofos)、三氟敏(trifloxystrobin)、三氟啞磺隆(trifloxysulfuron)、三福戴嗎沙(trifludimoxazin)、三福滅作派林(triflumezopyrim)、賽福座(triflumizole)、三福隆(triflumuron)、三福林(trifluralin)、氟胺磺隆(triflusulfuron)、三氟苯氧丙酸(trifop)、三氟禾草肟(trifopsime)、賽福寧(triforine)、三羥基三吡、誘蠅羧酯(trimedlure)、混滅威(trimethacarb)、三甲隆(trimeturon)、抗倒酯(trinexapac)、三苯錫(triphenyltin)、烯蟲硫酯(triprene)、三丙丹(tripropindan)、雷公藤甲素(triptolide)、草達克(tritac)、殺蟲釘(trithialan)、滅菌唑(triticonazole)、三氟甲磺隆(tritosulfuron)、特朗扣(trunc-call)、脫葉磷(tuoyelin)、單克素(uniconazole)、單克素(uniconazole)-P、福美甲腫(urbacide)、烏瑞替派(uredepa)、戊酸酯(valerate)、維利黴素(validamycin)、維利黴素A(validamycin A)、

伐利芬奈蕾特(valifenalate)、異殺鼠酮(valone)、繁米松(vamidotion)、泛佳(vanguard)、凡力(vaniliprole)、萬隆(vernolate)、免克寧(vinclozolin)、維生素D3(vitamin D3)、華法林(warfarin)、硝蟲硫磷(xiaochongliulin)、辛菌胺(xinjunan)、烯肱菌胺(xiwojunan)、烯肱菌酯(xiwojunzhi)、XMC、二甲苯草胺(xylachlor)、二甲苯酚(xylenols)、滅爾蝨(xylylcarb)、噻蟎胺(xymiazole)、依希淨(yishijing)、氟菌胺(zarilamid)、玉米素(zeatin)、增效胺(zengxiaoan)、增效林(zengxiaolin)、ζ-賽滅寧(zeta-cypermethrin)、萘酸鋅、磷化鋅(zinc phosphide)、噻唑鋅(zinc thiazole)、噻唑鋅(zinc thiozole)、三氯酚鋅(zinc trichlorophenate)、三氯酚鋅(zinc trichlorophenoxide)、鋅乃浦(zineb)、福美鋅(ziram)、左拉伏(zolaprosfos)、華法林鈉(zoocoumarin)、座賽胺(zoxamide)、唑胺菌酯(zuoanjunzhi)、唑草胺(zuocaoan)、唑菌酯(zuojunzhi)、唑嘧磺隆(zuomihuanglong)、α-氯醇(α-chlorohydrin)、α-蛻皮激素(α-ecdysone)、α-多紋素(α-multistriatin)、α-萘乙酸(α-naphthaleneacetic acid)，及β-蛻皮激素(β-ecdysone)；


(2) 下列分子



N-(3-氯-1-(吡啶-3-基)-1*H*-吡唑-4-基)-*N*-乙基-3-((3,3,3-三氟丙基)硫)丙醯胺

於此文件中，此分子為了便於使用，稱為“**AI-1**”；


(3) 一種被稱為羅提蘭(Lotilaner)的分子，其具有下列結構








；以及

(4) 下列表A中的分子

表A. **M**-活性成分的結構

名稱	結構
M1	 <p style="text-align: right;">R = CH, N R₁ = H, Me</p>

M2	 <p>X = F, Cl R = H, F</p>
M3	
M4	
M5	
M6	

【0015】如在本揭示中使用，上文各者為一種活性成分，以及二種或更多種為活性成分。關於更多資訊，請查閱位於 Alanwood.net 之 “ **COMPENDIUM OF**

PESTICIDE COMMON NAMES”，及位於 bcpdata.com.之“**THE PESTICIDE MANUAL**”之各種版本，包括在線版。

【0016】 術語「烯基」意指由碳及氫組成之非環狀、不飽和(至少一個碳-碳雙鍵)、分支鏈或未分支的取代基，例如乙烯基、烯丙基、丁烯基、戊烯基及己烯基。

【0017】 術語「烯氧基」係指進一步由碳-氧單鍵組成之烯基，如烯丙基氧基、丁烯氧基、戊烯氧基、己烯氧基。

【0018】 術語「烷氧基」係指進一步由碳-氧單鍵組成之烷基，如甲氧基、乙氧基、丙氧基、異丙氧基、丁氧基、異丁氧基，以及三級丁氧基。

【0019】 術語「烷基」係指由碳及氫組成之非環狀、飽和、分支鏈或未分支的取代基，例如甲基、乙基、丙基、異丙基、丁基及三級丁基。

【0020】 術語「炔基」意指由碳及氫組成之非環狀、不飽和(至少一個碳-碳參鍵)、分支鏈或未分支的取代基，例如乙炔基、炔丙基、丁炔基及戊炔基。

【0021】 術語「炔氧基」意指進一步由碳-氧單鍵組成之炔基，例如戊炔氧基、己炔氧基、庚炔氧基及辛炔氧基。

【0022】 術語「芳基」意指由氫及碳組成之環狀、芳香族取代基，例如苯基、萘基及聯苯。

【0023】 術語「生物性殺蟲劑」意指一種微生物型生物性害蟲防治劑，一般而言，係以與化學性殺蟲劑類似的方式來施用。通常其等為細菌型，但亦有真菌控制劑之實

例，包括木黴屬 (*Trichoderma spp.*) 及白粉寄生孢 (*Ampelomyces quisqualis*)。一種眾所周知的生物性殺蟲劑實例為蘇力菌 (*Bacillus thuringiensis*)，其係一種鱗翅目 (Lepidoptera)、鞘翅目 (Coleoptera) 及雙翅目 (Diptera) 之細菌性疾病。生物性殺蟲劑包括以下列為基礎之產物：

(1) 昆蟲致病性真菌 (如黑殭菌 (*Metarhizium anisopliae*))；

(2) 昆蟲致病性線蟲 (如蕪菁夜蛾斯氏線蟲 (*Steinernema feltiae*))；以及

(3) 昆蟲致病性病毒 (如蘋果蠹蛾 (*Cydia pomonella*) 顆粒體病毒)。

【0024】昆蟲致病性生物體的其他實例包括但不限於桿狀病毒、原生動物及微孢子目 (Microsporidia)。為了避免疑問，生物性殺蟲劑被認為是活性成分。

【0025】術語「環烯基」意指由碳與氫組成之單環或多環、不飽和 (至少一碳-碳雙鍵) 取代基，例如環丁烯基、環戊烯基、環己烯基、降莖烯、雙環 [2.2.2] 辛烯基、四氫萘基、六氫萘基與八氫萘基。


【0026】術語「環烯氧基」係指更進一步由碳-氧單鍵組成之環烯基，例如環丁烯氧基、環戊烯氧基、降莖烯氧基，以及雙環 [2.2.2] 辛烯氧基。

【0027】術語「環烷基」係指由碳與氫組成之單環或多環、飽和取代基，例如環丙基、環丁基、環戊基、降莖烯、雙環 [2.2.2] 辛基與十氫萘。

吡嗪基、哌啶基、嗎啉基、吡咯啶基、四氫呋喃基，及四氫哌喃基；

(3) 部分或完全不飽和的雜環基取代基包括，但不限於 1,2,3,4-四氫-喹啉基、4,5-二氫-嘔啞基、4,5-二氫-1*H*-吡啞基、4,5-二氫-異嘔啞基以及 2,3-二氫-[1,3,4]-嘔二啞基；以及

(4) 額外的雜環基實例包括以下各者：



硫化三亞甲基 硫化三亞甲基-氧化物及硫化三亞甲基-二氧化物。

【0033】術語「所在地」意指一棲息地、養育場、植物、種子、土壤、材料，或害蟲將生長、能生長或能走過之環境，舉例而言，所在地可為：生長中之農作物、樹木、水果、穀物、飼料種類、葡萄、草皮，及/或觀賞植物之處；圈養動物居住之處；建築之內部或外部表面(如儲存穀物之處)；建築內所使用之建構材料(如浸漬木材)；以及建築附近之土壤。

【0034】用語「**MoA**材料」意指一種材料，其具有如同位於 irac-online.org，IRAC MoA Classification v. 7.3 中所示的作用模式(「**MoA**」)，描述以下幾組：

- (1) 乙醯膽鹼酯酶(AChE)抑制劑；
- (2) GABA-閘控型氯離子通道拮抗劑；
- (3) 鈉離子通道調節劑；

- (4)菸鹼型乙醯膽鹼(nAChR)協同劑；
- (5)菸鹼型乙醯膽鹼受器(nAChR)別構活化物；
- (6)氯離子通道活化劑；
- (7)保幼激素模擬物；
- (8)雜類非特異性(多重位置)抑制劑；
- (9)弦音器官(Chordotonal Organs)調節劑；
- (10)蠕生長抑制劑；
- (11)破壞昆蟲中腸膜之微生物；
- (12)粒腺體ATP合成酶抑制劑；
- (13)經由破壞質子梯度之氧化性磷酸化非耦聯劑；
- (14)菸鹼型乙醯膽鹼受器(nAChR)通道阻斷劑；
- (15)幾丁質生合成抑制劑，第0型；
- (16)幾丁質生合成抑制劑，第1型；
- (17)雙翅目脫皮干擾劑；
- (18)蛻皮激素受器協同劑；
- (19)章魚胺受器協同劑；
- (20)粒腺體複合物III電子傳遞抑制劑；
- (21)粒腺體複合物I電子傳遞抑制劑；
- (22)電壓-依賴型鈉離子通道阻斷劑；
- (23)乙醯基輔酶A羧化酶抑制劑；
- (24)粒腺體複合物IV電子傳遞抑制劑；
- (25)粒腺體複合物II電子傳遞抑制劑；以及
- (28)羅納丹受器(Ryanodine receptor)調節劑。

【0035】用語「**MoA**材料群組**α**」(此後稱為

“MoAMGA”)」係集體意指下列材料：阿巴美丁(abamectin)、毆殺松(acephate)、亞醜蟎(acequinocyl)、亞滅培(acetamiprid)、阿納寧(acrinathrin)、棉鈴威(alanycarb)、得滅克(aldicarb)、亞列寧(allethrin)、 α -賽滅寧(*alpha*-cypermethrin)、磷化鋁(aluminium phosphide)、三亞蟎(amitraz)、亞滅松(azamethiphos)、乙基谷速松(azinphos-ethyl)、谷速松(azinphos-methyl)、亞環錫(azocyclotin)、免敵克(bendiocarb)、免扶克(benfuracarb)、免速達(bensultap)、 β -賽扶寧(*beta*-cyfluthrin)、 β -賽滅寧(*beta*-cypermethrin)、畢芬寧(bifenthrin)、百亞列寧(bioallethrin)、S-環戊烯基百亞列寧異構物(bioallethrin S-cyclopentenyl isomer)、生物苜味菊酯(bioresmethrin)、雙三氟蟲脲(bistrifluron)、硼砂、布芬淨(buprofezin)、佈嘉信(butocarboxim)、丁酮砒威(butoxycarboxim)、硫線磷(cadusafos)、磷化鈣、胺甲(carbaryl)、加保扶(carbofuran)、丁基加保扶(carbosulfan)、培丹鹽酸鹽(cartap hydrochloride)、剋安勃(chlorantraniliprole)、可氯丹(chlordane)、氯氧磷(chlorethoxyfos)、克凡派(chlorfenapyr)、氯芬松(chlorfenvinphos)、克福隆(chlorfluazuron)、氯甲磷(chlormephos)、氯化苦(chloropicrin)、陶斯松(chlorpyrifos)、甲基陶斯松(chlorpyrifos-methyl)、可芬諾(chromafenozide)、克芬蟎(clofentezine)、可尼丁

(clothianidin)、蠅毒磷(coumaphos)、氰化物、氰乃松(cyanophos)、氰蟲醯胺(cyantraniliprole)、乙氰菊酯(cycloprothrin)、啞蟎氰(cyenopyrafen)、賽芬蟎(cyflumetofen)、賽扶寧(cyfluthrin)、賽洛寧(cyhalothrin)、錫蟎丹(cyhexatin)、賽滅寧(cypermethrin)、賽芬寧(cyphenothrin)、賽滅淨(cyromazine)、右旋順式反式氯丙炔菊酯(*d-cis-trans*-allethrin)、DDT、第滅寧(deltamethrin)、甲基內吸磷-S、汰芬隆(diafenthiuron)、大利松(diazinon)、二氯松(dichlorvos)/DDVP、雙特松(dicrotophos)、氟蟎吡(diflovidazin)、福隆(diflubenzuron)、大滅松(dimethoate)、二甲基亞硝酸胺(dimethylvinphos)、達特南(dinotefuran)、二硫松(disulfoton)、DNOC、右旋反式氯丙炔菊酯(*d-trans*-allethrin)、因滅汀苯甲酸鹽(emamectin benzoate)、益避寧(empenthrin)、安殺番(endosulfan)、EPN、益化利(esfenvalerate)、愛芬克(ethiofencarb)、愛殺松(ethion)、普伏松(ethoprophos)、依芬寧(etofenprox)、依殺蟎(etoxazole)、胺磺磷(famphur)、芬滅松(fenamiphos)、芬殺蟎(fenazaquin)、芬佈賜(fenbutatin oxide)、撲滅松(fenitrothion)、丁基滅必蟲(fenobucarb)、芬諾克(fenoxycarb)、芬普寧(fenpropathrin)、芬普蟎(fenpyroximate)、芬殺松(fenthion)、芬化利(fenvalerate)、氟尼胺(flonicamid)、

嘧蟎酯(flucrypyrim)、氟大滅(flubendiamide)、氟蟎脲(flucycloxuron)、護賽寧(flucythrinate)、氟芬隆(flufenoxuron)、氟氯苯菊酯(flumethrin)、弗比南載夫隆(flupyradifurone)、覆滅蟎(formetanate)、福賽絕(fosthiazate)、呋線威(furathiocarb)、 γ -賽洛寧(*gamma*-cyhalothrin)、合芬寧(halfenprox)、合芬隆(halofenozide)、飛達松(heptenophos)、六伏隆(hexaflumuron)、合賽多(hexythiazox)、愛美隆(hydramethylnon)、烯蟲乙酯(hydroprene)、新煙鹼類(imicyafos)、益達胺(imidacloprid)、依普寧(imiprothrin)、因得克(indoxacarb)、亞芬松(isofenphos)、滅必蝨(isoprocarb)、加福松(isoxathion)、噠噠菊酯(kadethrin)、烯蟲炔酯(kinoprene)、 λ -賽洛寧(*lambda*-cyhalothrin)、里琵菌素(lepimectin)、祿芬隆(lufenuron)、馬拉松(malathion)、滅加松(mecarbam)、美氟綜(metaflumizone)、達馬松(methamidophos)、滅大松(methidathion)、滅賜克(methiocarb)、納乃得(methomyl)、美賜平(methoprene)、(甲氧基胺基硫基-磷醯基)水楊酸酯、甲氧滴滴涕(methoxychlor)、滅芬諾(methoxyfenozide)、溴甲烷、治滅蝨(metolcarb)、美文松(mevinphos)、密滅汀(milbemectin)、亞素靈(monocrotophos)、乃力松(naled)、尼古丁、烯啶蟲胺(nitenpyram)、諾伐隆(novaluron)、多氟脲(noviflumuron)、歐殺滅(oxamyl)、滅多松

(oxydemeton-methyl)、巴拉松(parathion)、甲基巴拉松、百滅寧(permethrin)、酚丁滅寧(phenothrin)、賽達松(phenthoate)、福瑞松(phorate)、裕必松(phosalone)、益滅松(phosmet)、福賜米松(phosphamidon)、磷、巴賽松(phoxim)、比加普(pirimicarb)、亞特松(pirimiphos-methyl)、普亞烈寧(prallethrin)、佈飛松(profenofos)、毆蟻多(propargite)、撲達松(propetamphos)、安丹(propoxur)、普硫松(prothiofos)、派滅淨(pymetrozine)、白克松(pyraclufos)、除蟲菊精、畢達本(pyridaben)、必芬松(pyridaphenthion)、畢汰芬(pyrimidifen)、百利普芬(pyriproxyfen)、拜裕松(quinalphos)、列滅寧(resmethrin)、魚藤酮(rotenone)、矽護芬(silafluofen)、賜諾特(spinetoram)、賜諾殺(spinosad)、賜派芬(spirodiclofen)、螺甲蟻酯(spiromesifen)、螺蟲乙酯(spirotetramat)、氟蟲胺(sulfluramid)、治螟磷(sulfotep)、氟啶蟲胺腈(sulfoxaflor)、磺醯氟、吐酒石、 τ -福化利(**tau**-fluvalinate)、得芬諾(tebufenozide)、得芬瑞(tebufenpyrad)、丁基嘧啶磷(tebupirimfos)、得福隆(teflubenzuron)、汰福寧(tefluthrin)、亞培松(temephos)、托福松(terbufos)、樂本松(tetrachlorvinphos)、得脫蟻(tetradifon)、治滅寧(tetramethrin)、治滅寧(tetramethrin)、 θ -賽滅寧(**theta**-cypermethrin)、賽果培(thiacloprid)、賽速安

(thiamethoxam)、硫賜安(thiocyclam)、硫敵克(thiodicarb)、硫伐隆(thiofanox)、硫滅松(thiometon)、殺蟲雙鈉(thiosultap-sodium)、脫芬瑞(tolfenpyrad)、泰滅寧(tralomethrin)、拜富寧(transfluthrin)、啞蚜威(triazamate)、三落松(triazophos)、三氯松(trichlorfon)、三福隆(triflumuron)、混滅威(trimethacarb)、繁米松(vamidotion)、XMC、滅爾蝨(xylylcarb)、ζ -賽滅寧(zeta-cypermethrin)，及磷化鋅(zinc phosphide)。為了避免疑問，前述材料各者為一種活性成分。

【0036】術語「害蟲」係意指一種生物體，其對人類或是人類關心的事物(譬如，作物、食物、家畜等等)是有害的，該生物體係來自於節肢動物門、軟體動物門，或圓形動物門，特定的實例為螞蟻、蚜蟲、甲蟲、蠹蟲(bristletails)、蟑螂、蟋蟀、蠮螋(earwigs)、跳蚤、蒼蠅、蚱蜢、葉蟬、蝨(包括海蝨)、蝗蟲、蠐、蛾、線蟲(nematode)、介殼蟲、綜合綱(symphyllans)、白蟻、薊馬(thrips)、壁蝨、胡蜂，以及粉虱。額外的實例為下列之害蟲：

(1) 螯肢動物亞門(**Subphyla Chelicerata**)、多足亞門(**Myriapoda**)、甲殼綱(**Crustacea**)，及六足亞門(**Hexapoda**)；

(2) 蛛形綱(**Arachnida**)、顎足綱(**Maxillopoda**)、綜合綱(**Symphyla**)，及昆蟲綱(**Insecta**)；

(3) 虱目(**Order Anoplura**)。特定屬之非窮舉性清單包括，但不限於，血虱屬(*Haematopinus* spp.)、甲脅虱

屬(*Hoplopleura* spp.)、顎虱屬(*Linognathus* spp.)、虱屬(*Pediculus* spp.)及鱗虱屬(*Polyplax* spp.)。特定物種之非窮舉性清單包括，但不限於，驢血虱(*Haematopinus asini*)、豬血虱(*Haematopinus suis*)、毛虱(*Linognathus setosus*)、綿羊顎虱(*Linognathus ovillus*)、人頭蝨(*Pediculus humanus capitis*)、人體虱(*Pediculus humanus humanus*)及陰虱(*Pthirus pubis*)。

(4)鞘翅目(Order Coleoptera)。特定屬之非窮舉性清單包括但不限於，豆象屬(*Acanthoscelides* spp.)、叩頭蟲屬(*Agriotes* spp.)、花象屬(*Anthonomus* spp.)、梨象屬(*Apion* spp.)、金龜屬(*Apogonia* spp.)、守瓜屬(*Aulacophora* spp.)、豆象蟲屬(*Bruchus* spp.)、天牛屬(*Cerosterna* spp.)、豆葉甲蟲屬(*Cerotoma* spp.)、龜象屬(*Ceutorhynchus* spp.)、跳甲屬(*Chaetocnema* spp.)、肖葉甲蟲屬(*Colaspis* spp.)、金針蟲屬(*Ctenicera* spp.)、象鼻蟲屬(*Curculio* spp.)、圓頭犀金龜屬(*Cyclocephala* spp.)、葉甲屬(*Diabrotica* spp.)、葉象屬(*Hypera* spp.)、齒小蟲屬(*Ips* spp.)、粉蟲屬(*Lyctus* spp.)、美洲葉甲屬(*Megascelis* spp.)、露尾甲屬(*Meligethes* spp.)、耳象屬屬(*Otiorhynchus* spp.)、短喙象屬(*Pantomorus* spp.)、鯰角金龜屬(*Phyllophaga* spp.)、菜葉蚤屬(*Phyllotreta* spp.)、根觸金龜屬(*Rhizotrogus* spp.)、虎象屬(*Rhynchites* spp.)、大象鼻蟲屬(*Rhynchophorus* spp.)、小蟲屬(*Scolytus* spp.)、禾象鼻蟲屬(*Sphenophorus*

spp.)、米象屬(*Sitophilus* spp.)，以及擬穀盜屬(*Tribolium* spp.)。特定物種之非窮舉性清單包括但不限於，菜豆象(*Acanthoscelides obtectus*)、白蠟窄吉丁(*Agrilus planipennis*)、光肩星天牛(*Anoplophora glabripennis*)、棉鈴象蟲(*Anthonomus grandis*)、黑絨金龜(*Ataenius spretulus*)、甜菜隱食甲蟲(*Atomaria linearis*)、甜菜象(*Bothynoderes punctiventris*)、豌豆象(*Bruchus pisorum*)、四紋豆象(*Callosobruchus maculatus*)、黃斑露尾甲(*Carpophilus hemipterus*)、甜菜龜甲(*Cassida vittata*)、豆葉甲(*Cerotoma trifurcata*)、白菜籽龜象(*Ceutorhynchus assimilis*)、芫菁龜象(*Ceutorhynchus napi*)、梯斑叩頭蟲(*Conoderus scalaris*)、多斑叩頭蟲(*Conoderus stigmaticus*)、李象鼻蟲(*Conotrachelus nenuphar*)、綠花金龜(*Cotinis nitida*)、天門冬金花蟲(*Crioceris asparagi*)、鏽赤扁穀盜(*Cryptolestes ferrugineus*)、長角扁穀盜(*Cryptolestes pusillus*)、土耳其扁穀盜(*Cryptolestes turcicus*)、密點細枝象蟲(*Cylindrocopturus adpersus*)、芒果切葉象甲(*Deporaus marginatus*)、火腿皮蠹(*Dermestes lardarius*)、白腹皮蠹(*Dermestes maculatus*)、墨西哥豆瓢蟲(*Epilachna varivestis*)、蛀莖象甲(*Faustinus cubae*)、蒼白根頸象(*Hylobius pales*)、紫苜蓿葉象(*Hypera postica*)、咖啡果小蠹(*Hypothenemus hampei*)、菸草甲(*Lasioderma serricorne*)、馬鈴薯甲蟲(*Leptinotarsa decemlineata*)、

麗金龜 (*Liogenys fuscus*)、條紋水象甲 (*Liogenys suturalis*)、水稻水象鼻蟲 (*Lissorhoptrus oryzophilus*)、*Maecolaspis joliveti*、玉米叩甲 (*Melanotus communis*)、油菜露尾甲 (*Meligethes aeneus*)、大栗鰓角金龜子 (*Melolontha melolontha*)、梯頂天牛 (*Oberea brevis*)、線形筒天牛 (*Oberea linearis*)、椰子犀角金龜 (*Oryctes rhinoceros*)、貿易穀盜扁蟲 (*Oryzaephilus mercator*)、鋸穀盜 (*Oryzaephilus surinamensis*)、黑角負泥蟲 (*Oulema melanopus*)、水稻負泥蟲 (*Oulema oryzae*)、金龜子 (*Phyllophaga cuyabana*)、日本麗金龜 (*Popillia japonica*)、大穀蠹 (*Prostephanus truncatus*)、穀蠹 (*Rhyzopertha dominica*)、條紋根瘤象甲 (*Sitona lineatus*)、穀象 (*Sitophilus granarius*)、米象 (*Sitophilus oryzae*)、玉米象 (*Sitophilus zeamais*)、藥材甲 (*Stegobium paniceum*)、大穀盜 (*Tenebroides mauritanicus*)、擬穀盜 (*Tribolium castaneum*)、雜擬穀盜 (*Tribolium confusum*)、花斑皮蠹 (*Trogoderma variabile*)，及玉米距步甲蟲 (*Zabrus tenebrioides*)。

(5) 革翅目 (Order Dermaptera)。特定屬之非窮舉性清單包括但不限於，普通蠹蝨 (*Forficula auricularia*)。

(6) 蜚蠊目 (Order Blattaria)。特定物種之非窮舉性清單包括但不限於，德國姬蠊 (*Blattella germanica*)、東方蜚蠊 (*Blatta orientalis*)、賓西法尼亞木蠊 (*Parcoblatta pennsylvanica*)、美洲家蠊 (*Periplaneta americana*)、澳

洲家蠊 (*Periplaneta australasiae*)、棕色家蠊 (*Periplaneta brunnea*)、黑褐家蠊 (*Periplaneta fuliginosa*)、蔗綠蜚蠊 (*Pycnoscelus surinamensis*)及長鬚帶蠊 (*Supella longipalpa*)。

(7)雙翅目(Order Diptera)。特定屬之非窮舉性清單包括但不限於，斑蚊屬(*Aedes* spp.)、潛蠅屬(*Agromyza* spp.)、按實蠅屬(*Anastrepha* spp.)、瘧蚊屬(*Anopheles* spp.)、果實蠅屬(*Bactrocera* spp.)、地中海實蠅屬(*Ceratitis* spp.)、斑虻屬(*Chrysops* spp.)、錐蠅屬(*Cochliomyia* spp.)、瘿蚊屬(*Contarinia* spp.)、家蚊屬(*Culex* spp.)、葉瘿蚊屬(*Dasineura* spp.)、艷粉蝶屬(*Delia* spp.)、果蠅屬(*Drosophila* spp.)、廁蠅屬(*Fannia* spp.)、黑蠅屬(*Hylemyia* spp.)、斑潛蠅屬(*Liriomyza* spp.)、家蠅屬(*Musca* spp.)、草種蠅屬(*Phorbia* spp.)、虻屬(*Tabanus* spp.)及大蚊屬(*Tipula* spp.)。特定物種之非窮舉性清單包括但不限於，紫苜蓿潛蠅(*Agromyza frontella*)、加勒比按實蠅(*Anastrepha suspensa*)、墨西哥果實蠅(*Anastrepha ludens*)、西印度果實蠅(*Anastrepha obliqua obliqua*)、瓜實蠅(*Bactrocera cucurbitae*)、東方果實蠅(*Bactrocera dorsalis*)、入侵實蠅(*Bactrocera invadens*)、桃實蠅(*Bactrocera zonata*)、地中海實蠅(*Ceratitis capitata*)、油菜葉瘿蚊(*Dasineura brassicae*)、灰地種蠅(*Delia platura*)、黃腹廁蠅(*Fannia canicularis*)、灰腹廁蠅(*Fannia scalaris*)、腸胃蠅

(*Gasterophilus intestinalis*)、*Gracillia perseae*、東方臂蠅 (*Haematobia irritans*)、紋皮蠅 (*Hypoderma lineatum*)、菜斑潛蠅 (*Liriomyza brassicae*)、綿羊虱蠅 (*Melophagus ovinus*)、秋家蠅 (*Musca autumnalis*)、普通家蠅 (*Musca domestica*)、羊狂蠅 (*Oestrus ovis*)、黑麥稈蠅 (*Oscinella frit*)、甜菜泉蠅 (*Pegomya betae*)、胡蘿蔔蠅 (*Psila rosae*)、櫻桃果實蠅 (*Rhagoletis cerasi*)、蘋果果實蠅 (*Rhagoletis pomonella*)、藍橘繞實蠅 (*Rhagoletis mendax*)、麥紅吸漿蟲 (*Sitodiplosis mosellana*)及廢螯蠅 (*Stomoxys calcitrans*)。

(8)半翅目(Order Hemiptera)。特定屬之非窮舉性清單包括但不限於，球蚜屬(*Adelges* spp.)、輪盾介殼蟲屬(*Aulacaspis* spp.)、沫蟬屬(*Aphrophora* spp.)、蚜蟲屬(*Aphis* spp.)、粉虱屬(*Bemisia* spp.)、蠟蚧屬(*Ceroplastes* spp.)、雪盾介殼蟲屬(*Chionaspis* spp.)、褐圓盾介殼蟲屬(*Chrysomphalus* spp.)、介殼蟲屬(*Coccus* spp.)、小綠葉蟬屬(*Empoasca* spp.)、蠟盾介殼蟲屬(*Lepidosaphes* spp.)、稻椿象屬(*Lagynotomus* spp.)、草盲蝽屬(*Lygus* spp.)、長管蚜屬(*Macrosiphum* spp.)、黑尾葉蟬屬(*Nephotettix* spp.)、稻綠蝽屬(*Nezara* spp.)、沫蟬屬(*Philaenus* spp.)、植盲蝽屬(*Phytocoris* spp.)、壁蝽屬(*Piezodorus* spp.)、臀紋粉介殼蟲屬(*Planococcus* spp.)、粉介殼蟲屬(*Pseudococcus* spp.)、縊管蚜屬(*Rhopalosiphum* spp.)、黑盔蚧屬(*Saissetia* spp.)、彩斑

蚜屬(*Therioaphis* spp.)、蠟蚧蟲屬(*Toumeyella* spp.)、桔蚜屬(*Toxoptera* spp.)、粉虱屬(*Trialeurodes* spp.)、錐蝱屬(*Triatoma* spp.)及矢盾介殼蟲屬(*Unaspis* spp.)。特定物種之非窮舉性清單包括但不限於，擬綠蝱(*Acrosternum hilare*)、豌豆蚜(*Acyrtosiphon pisum*)、甘藍粉虱(*Aleyrodes proletella*)、螺旋粉虱(*Aleurodicus dispersus*)、絲絨粉虱(*Aleurothrixus floccosus*)、二點小綠葉蟬(*Amrasca biguttula biguttula*)、紅圓蚧(*Aonidiella aurantii*)、棉蚜(*Aphis gossypii*)、大豆蚜(*Aphis glycines*)、蘋果蚜(*Aphis pomi*)、馬鈴薯蚜(*Aulacorthum solani*)、銀葉粉虱(*Bemisia argentifolii*)、煙草粉虱(*Bemisia tabaci*)、麥長蝱(*Blissus leucopterus*)、天門冬小管蚜(*Brachycorynella asparagi*)、稻粉介殼蟲(*Brevennia rehi*)、甘藍蚜(*Brevicoryne brassicae*)、馬鈴薯俊盲蝱(*Calocoris norvegicus*)、紅蠟介殼蟲(*Ceroplastes rubens*)、熱帶臭蟲(*Cimex hemipterus*)、溫帶臭蟲(*Cimex lectularius*)、*Dagbertus fasciatus*、*Dichelops furcatus*、麥雙尾蚜(*Diuraphis noxia*)、柑橘木虱(*Diaphorina citri*)、車前圓尾蚜(*Dysaphis plantaginea*)、棉黑翅紅蝱(*Dysdercus suturellus*)、*Edessa meditabunda*、蘋果綿蚜(*Eriosoma lanigerum*)、歐扁盾蝱(*Eurygaster maura*)、英雄美洲蝱(*Euschistus heros*)、褐美洲蝱(*Euschistus servus*)、安氏角盲蝱(*Helopeltis antonii*)、茶角盲蝱(*Helopeltis*

theivora)、吹棉介殼蟲(*Icerya purchasi*)、椪果褐葉蟬(*Idioscopus nitidulus*)、斑飛虱(*Laodelphax striatellus*)、大稻緣蝽(*Leptocorisa oratorius*)、稻緣椿象(*Leptocorisa varicornis*)、豆莢草盲蝽(*Lygus hesperus*)、桑粉介殼蟲(*Maconellicoccus hirsutus*)、大戟長管蚜(*Macrosiphum euphorbiae*)、麥長管蚜(*Macrosiphum granarium*)、薔薇長管蚜(*Macrosiphum rosae*)、翠菊葉蟬(*Macrosteles quadrilineatus*)、沫蟬(*Mahanarva frimbiolata*)、麥無網蚜(*Metopolophium dirhodum*)、長角椿象(*Mictis longicornis*)、桃蚜(*Myzus persicae*)、偽黑尾葉蟬(*Nephotettix cinctipes*)、*Neurocolpus longirostris*、稻綠蝽(*Nezara viridula*)、褐飛蝨(*Nilaparvata lugens*)、糠片盾蚧(*Parlatoria pergandii*)、黑片盾介殼蟲(*Parlatoria ziziphi*)、玉米花翅飛虱(*Peregrinus maidis*)、葡萄根瘤蚜(*Phylloxera vitifoliae*)、去杉球蚧(*Physokermes piceae*)、加州盲蝽(*Phytocoris californicus*)、植盲蝽(*Phytocoris relativus*)、蓋德擬壁蝽(*Piezodorus guildinii*)、四線盲蝽(*Poecilocapsus lineatus*)、盲蝽(*Psallus vaccinicola*)、酪梨椿象(*Pseudacysta perseae*)、菠蘿潔粉介殼蟲(*Pseudococcus brevipes*)、梨園盾蚧(*Quadraspidiotus perniciosus*)、玉米蚜(*Rhopalosiphum maidis*)、稻麥蚜(*Rhopalosiphum padi*)、欖珠蠟蚧(*Saissetia oleae*)、栗花椿象(*Scaptocoris castanea*)、麥

二叉蚜 (*Schizaphis graminum*)、麥長管蚜 (*Sitobion avenae*)、白背飛虱 (*Sogatella furcifera*)、溫室粉虱 (*Trialeurodes vaporariorum*)、結翅粉蝨 (*Trialeurodes abutiloneus*)、箭頭介殼蟲 (*Unaspis yanonensis*) 以及 *Zulia entrerriana*。

(9)膜翅目(Order Hymenoptera)。特定屬之非窮舉性清單包括但不限於，切葉蟻屬(*Acromyrmex* spp.)、葉蟻屬(*Atta* spp.)、巨山蟻屬(*Camponotus* spp.)、松葉蜂屬(*Diprion* spp.)、蟻屬(*Formica* spp.)、單家蟻屬(*Monomorium* spp.)、新松葉蜂屬(*Neodiprion* spp.)、收穫蟻屬(*Pogonomyrmex* spp.)、馬蜂屬(*Polistes* spp.)、紅火蟻屬(*Solenopsis* spp.)、黃胡蜂屬(*Vespula* spp.)，及絨木蜂屬(*Xylocopa* spp.)。特定物種之非窮舉性清單包括但不限於，紅角菜葉蜂(*Athalia rosae*)、德克塞斯切葉蟻 (*Atta texana*)、阿根廷虹琉璃蟻 (*Iridomyrmex humilis*)、小黑蟻(*Monomorium minimum*)、小黃單家蟻 (*Monomorium pharaonis*)、入侵紅火蟻 (*Solenopsis invicta*)、熱帶火蟻 (*Solenopsis geminata*)、偷竊蟻 (*Solenopsis molesta*)、黑火蟻(*Solenopsis richtery*)、南方火蟻 (*Solenopsis xyloni*)，及酸臭家蟻 (*Tapinoma sessile*)。

(10)等翅目(Order Isoptera)。特定屬之非窮舉性清單包括但不限於，乳白蟻屬(*Coptotermes* spp.)、角象白蟻屬(*Cornitermes* spp.)、堆砂白蟻屬(*Cryptotermes*

spp.)、異白蟻屬 (*Heterotermes* spp.)、木白蟻屬 (*Kaloterme*s spp.)、楹白蟻屬 (*Incisitermes* spp.)、大白蟻屬 (*Macrotermes* spp.)、緣木白蟻屬 (*Marginitermes* spp.)、鋸白蟻屬 (*Microcerotermes* spp.)、原角白蟻屬 (*Procornitermes* spp.)、散白蟻屬 (*Reticulitermes* spp.)、長鼻白蟻屬 (*Schedorhinotermes* spp.)及古白蟻屬 (*Zootermopsis* spp.)。特定物種之非窮舉性清單包括但不限於，曲顎乳白蟻 (*Coptotermes curvignathus*)、法國乳白蟻 (*Coptotermes frenchii*)、臺灣乳白蟻 (*Coptotermes formosanus*)、金黃異白蟻 (*Heterotermes aureus*)、稻麥小白蟻 (*Microtermes obesi*)、班努斯散白蟻 (*Reticulitermes banyulensis*)、草地散白蟻 (*Reticulitermes grassei*)、黃肢散白蟻 (*Reticulitermes flavipes*)、哈氏散白蟻 (*Reticulitermes hageni*)、西方散白蟻 (*Reticulitermes hesperus*)、桑特散白蟻 (*Reticulitermes santonensis*)、黃胸散白蟻 (*Reticulitermes speratus*)、美黑脛散白蟻 (*Reticulitermes tibialis*) 及美小黑散白蟻 (*Reticulitermes virginicus*)。

(11)鱗翅目(Order Lepidoptera)。特定屬之非窮舉性清單包括但不限於，捲葉蛾屬 (*Adoxophyes* spp.)、地老虎屬 (*Agrotis* spp.)、帶卷蛾屬 (*Argyrotaenia* spp.)、卷葉蛾屬 (*Cacoecia* spp.)、麗細蛾屬 (*Caloptilia* spp.)、水稻螟蟲屬 (*Chilo* spp.)、鏤紋夜蛾屬 (*Chrysodeixis* spp.)、豆

粉蝶屬(*Colias* spp.)、草螟屬(*Crambus* spp.)、絹野螟屬(*Diaphania* spp.)、螟屬(*Diatraea* spp.)、鑽夜蛾屬(*Earias* spp.)、粉斑螟屬(*Ephestia* spp.)、尺蠖蛾屬(*Epimecis* spp.)、斑點夜蛾屬(*Feltia* spp.)、角劍夜蛾屬(*Gortyna* spp.)、鈴夜蛾屬(*Helicoverpa* spp.)、實夜蛾屬(*Heliothis* spp.)、根蠹屬(*Indarbela* spp.)、潛夜細蛾屬(*Lithocolletis* spp.)、切根蟲屬(*Loxagrotis* spp.)、天幕毛蟲屬(*Malacosoma* spp.)、疆夜蛾屬(*Peridroma* spp.)、小潛細蛾屬(*Phyllonorycter* spp.)、黏夜蛾屬(*Pseudaletia* spp.)、蛀莖夜蛾屬(*Sesamia* spp.)、夜盜蛾屬(*Spodoptera* spp.)、透翅蛾屬(*Synanthedon* spp.)及巢蛾屬(*Yponomeuta* spp.)。特定物種之非窮舉性清單包括但不限於，飛揚阿夜蛾(*Achaea janata*)、棉褐帶卷蛾(*Adoxophyes orana*)、小地老虎(*Agrotis ipsilon*)、棉葉波紋夜蛾(*Alabama argillacea*)、鱷梨卷葉蟲(*Amorbia cuneana*)、臍橙螟(*Amyelois transitella*)、棕灰蛾(*Anacamptodes defectaria*)、桃枒蛾(*Anarsia lineatella*)、黃麻夜蛾(*Anomis sabulifera*)、梨豆夜蛾(*Anticarsia gemmatalis*)、果樹黃捲蛾(*Archips argyrospila*)、玫瑰黃捲蛾(*Archips rosana*)、桔帶卷蛾(*Argyrotaenia citrana*)、伽馬紋夜蛾(*Autographa gamma*)、捲葉蛾(*Bonagota cranaodes*)、禾弄蝶(*Borbo cinnara*)、棉潛蛾(*Bucculatrix thurberiella*)、菸卷蛾(*Capua reticulana*)、桃蛀果蛾(*Carposina niponensis*)、

芒果螟蛾 (*Chlumetia transversa*)、玫瑰色卷蛾 (*Choristoneura rosaceana*)、稻縱卷葉螟 (*Cnaphalocrocis medinalis*)、可可細蛾 (*Conopomorpha cramerella*)、芳香木蠹蛾 (*Cossus cossus*)、石核桃卷蛾 (*Cydia caryana*)、李小食心蟲 (*Cydia funebrana*)、梨小食心蟲 (*Cydia molesta*)、豌豆小卷蛾 (*Cydia nigricana*)、蘋果蠹蛾 (*Cydia pomonella*)、茶刺蛾 (*Darna diducta*)、小蔗桿草螟 (*Diatraea saccharalis*)、西南玉米桿草螟 (*Diatraea graniosella*)、埃及鑽夜蛾 (*Earias insulata*)、翠紋鑽夜蛾 (*Earias vitella*)、對小卷蛾 (*Ecdytolopha aurantianum*)、南美玉米苗斑螟 (*Elasmopalpus lignosellus*)、粉斑螟 (*Ephestia cautella*)、菸草粉斑螟 (*Ephestia elutella*)、地中海粉螟 (*Ephestia kuehniella*)、大豆捲葉蛾 (*Epinotia aporema*)、淡棕蘋果蛾 (*Epiphyas postvittana*)、香蕉弄蝶 (*Erionota thrax*)、女貞細卷蛾 (*Eupoecilia ambiguella*)、原切根蟲 (*Euxoa auxiliaris*)、桃折心蟲 (*Grapholita molesta*)、三紋螟蛾 (*Hedylepta indicata*)、棉鈴蟲 (*Helicoverpa armigera*)、棉鈴實夜蛾 (*Helicoverpa zea*)、菸芽夜蛾 (*Heliothis virescens*)、菜心野螟 (*Hellula undalis*)、番茄蠹蛾 (*Keiferia lycopersicella*)、茄螟蛾 (*Leucinodes orbonalis*)、咖啡潛葉蛾 (*Leucoptera coffeella*)、旋紋潛蛾 (*Leucoptera malifoliella*)、葡萄花翅小卷蛾 (*Lobesia botrana*)、豆白緣切根蟲 (*Loxagrotis albicosta*)、舞毒蛾 (*Lymantria*

dispar)、桃潛葉蛾(*Lyonetia clerkella*)、蓑蛾(*Mahasena corbetti*)、甘藍夜蛾(*Mamestra brassicae*)、豆莢螟(*Maruca testulalis*)、袋蛾(*Metisa plana*)、栗夜盜蟲(*Mythimna unipuncta*)、番茄蛀蟲(*Neoleucinodes elegantalis*)、白水螟蛾(*Nymphula depunctalis*)、冬尺蠖蛾(*Operophtera brumata*)、歐洲玉米螟(*Ostrinia nubilalis*)、大戟草尺蠖蛾(*Oxydia vesulia*)、疆褐卷蛾(*Pandemis cerasana*)、蘋褐卷蛾(*Pandemis heparana*)、非洲達摩鳳蝶(*Papilio demodocus*)、白咖啡潛夜蟲(*Pectinophora gossypiella*)、雜色夜蛾(*Peridroma saucia*)、咖啡潛葉蛾(*Perileucoptera coffeella*)、馬鈴薯蠹蛾(*Phthorimaea operculella*)、柑橘潛夜蛾(*Phyllocnistis citrella*)、紋白蝶(*Pieris rapae*)、苜蓿綠夜蛾(*Plathypena scabra*)、印度穀螟蛾(*Plodia interpunctella*)、小菜蛾(*Plutella xylostella*)、葡萄捲葉蛾(*Polychrosis viteana*)、桔果巢蛾(*Prays endocarpa*)、油橄欖巢蛾(*Prays oleae*)、一星黏蟲(*Pseudaletia unipuncta*)、大豆夜蛾(*Pseudoplusia includens*)、向日葵尺蠖(*Rachiplusia nu*)、三化螟(*Scirpophaga incertulas*)、稻蛀莖夜蛾(*Sesamia inferens*)、西非蛀莖夜蛾(*Sesamia nonagrioides*)、蕁麻毛蟲(*Setora nitens*)、麥蛾(*Sitotroga cerealella*)、葡萄長鬚卷葉蛾(*Sparganothis pilleriana*)、甜菜夜蛾(*Spodoptera exigua*)、草地貪夜蛾(*Spodoptera fugiperda*)、南部灰翅

夜蛾 (*Spodoptera eridania*)、蒞蘿褐灰蝶 (*Thecla basilides*)、袋衣蛾 (*Tineola bisselliella*)、粉斑夜蛾 (*Trichoplusia ni*)、番茄斑潛蠅 (*Tuta absoluta*)、咖啡豹蠹蛾 (*Zeuzera coffeae*) 以及梨豹蠹蛾 (*Zeuzera pyrina*)；

(12)食毛目(Order Mallophaga)。特定屬之非窮舉性清單包括但不限於，細鵝虱屬(*Anaticola* spp.)、牛毛虱屬(*Bovicola* spp.)、大火雞虱屬(*Chelopistes* spp.)、雞角羽虱(*Goniodes* spp.)、雞虱屬(*Menacanthus* spp.)及犬毛虱屬(*Trichodectes* spp.)。特定物種之非窮舉性清單包括但不限於，牛羽虱(*Bovicola bovis*)、山羊住牛虱(*Bovicola caprae*)、綿羊虱(*Bovicola ovis*)、大火雞虱(*Chelopistes meleagridis*)、雞角羽虱(*Goniodes dissimilis*)、大角羽虱(*Goniodes gigas*)、雛雞羽蝨(*Menacanthus stramineus*)、雞羽虱(*Menopon gallinea*)以及犬嚙毛虱(*Trichodectes canis*)。

(13)直翅目(Order Orthoptera)。特定屬之非窮舉性清單包括但不限於，黑蝗屬(*Melanoplus* spp.)及側羽葉屬(*Pterophylla* spp.)。特定物種之非窮舉性清單包括但不限於，摩門螞斯(*Anabrus simplex*)、非洲螞蛄(*Gryllotalpa africana*)、南方螞蛄(*Gryllotalpa australis*)、黑短螞蛄(*Gryllotalpa brachyptera*)、歐洲痣蟋蟀(*Gryllotalpa hexadactyla*)、東亞飛蝗(*Locusta migratoria*)、角翅螞斯(*Microcentrum retinerve*)、沙漠蝗(*Schistocerca gregaria*)，以及叉尾灌叢樹蝨(*Scudderia furcata*)。

(14) 蚤目(**Order Siphonaptera**)。特定物種之非窮舉性清單包括但不限於，雞角葉蚤(*Ceratophyllus gallinae*)、黑角葉蚤(*Ceratophyllus niger*)、犬櫛頭蚤(*Ctenocephalides canis*)、貓櫛頭蚤(*Ctenocephalides felis*)，以及人蚤(*Pulex irritans*)。

(15) 管口水蚤目(**Order Siphonostomatoida**)。特定物種之非窮舉性清單包括但不限於，鮭魚虱(*Lepeophtheirus salmonis*)、*Lepeophtheirus pectoralis*、細長魚虱(*Caligus elongatus*)，以及*Caligus clemensi*。

(16) 縷翅目(**Order Thysanoptera**)。特定屬之非窮舉性清單包括但不限於，巢針薊馬屬(*Caliothrips* spp.)、花薊馬屬(*Frankliniella* spp.)、跳薊馬屬(*Scirtothrips* spp.)及薊馬屬(*Thrips* spp.)。特定物種之非窮舉性清單包括但不限於，菸褐花薊馬(*Frankliniella fusca*)、西方花薊馬(*Frankliniella occidentalis*)、梳缺花薊馬(*Frankliniella schultzei*)、威廉斯花薊馬(*Frankliniella williamsi*)、變葉木薊馬(*Heliothrips haemorrhaidalis*)、腹鉤薊馬(*Rhipiphorotheirus cruentatus*)、桔硬薊馬(*Scirtothrips citri*)、小黃薊馬(*Scirtothrips dorsalis*)、帶薊馬(*Taeniothrips rhopalantennalis*)、黃胸薊馬(*Thrips hawaiiensis*)、豆黃薊馬(*Thrips nigropilosus*)、東方薊馬(*Thrips orientalis*)，以及菸薊馬(*Thrips tabaci*)。

(17) 縷尾目(**Order Thysanura**)。特定屬之非窮舉性

清單包括但不限於，衣魚屬(*Lepisma* spp.)以及小灶衣魚屬(*Thermobia* spp.)。

(18) 蜱蟎目(Order Acarina)。特定屬之非窮舉性清單包括但不限於，粉蟎屬(*Acarus* spp.)、刺皮節蜱屬(*Aculops* spp.)、牛蜱蝨屬(*Boophilus* spp.)、蠕形蟎屬(*Demodex* spp.)、革蜱屬(*Dermacentor* spp.)、上癭蟎屬(*Epitimerus* spp.)、節蜱屬(*Eriophyes* spp.)、硬蜱屬(*Ixodes* spp.)、赤葉蟎屬(*Oligonychus* spp.)、全爪蟎屬(*Panonychus* spp.)、扇頭蜱屬(*Rhizoglyphus* spp.)及葉蟎屬(*Tetranychus* spp.)。特定物種之非窮舉性清單包括但不限於，伍德氏蟎(*Acarapis woodi*)、粗腳粉蟎(*Acarus siro*)、芒果瘤癭蟎(*Aceria mangiferae*)、番茄刺皮癭蟎(*Aculops lycopersici*)、皮氏刺皮癭蟎(*Aculus pelekassi*)、斯氏刺癭蟎(*Aculus schlechtendali*)、美洲鈍眼蜱(*Amblyomma americanum*)、卵形短鬚蟎(*Brevipalpus obovatus*)、紫紅短鬚蟎(*Brevipalpus phoenicis*)、變異革蜱(*Dermacentor variabilis*)、歐洲室塵蟎(*Dermatophagoides pteronyssinus*)、鵝耳櫪始葉蟎(*Eotetranychus carpini*)、貓節痂蟎(*Notoedres cati*)、茶紅葉蟎(*Oligonychus coffeae*)、伊氏赤葉蟎(*Oligonychus ilicis*)、柑橘葉蟎(*Panonychus citri*)、歐洲葉蟎(*Panonychus ulmi*)、柑桔皺葉刺節蜱(*Phyllocoptruta oleivora*)、側多食跗線蟎(*Polyphagotarsonemus latus*)、血紅扇頭蜱

(*Rhipicephalus sanguineus*)、人疥蟎 (*Sarcoptes scabiei*)、鱧梨頂冠癭蟎(*Tegolophus perseiflorae*)、二點葉蟎(*Tetranychus urticae*)，以及狄氏瓦蟎(*Varroa destructor*)。

(19) 結閥綱(Class Symphyla)。特定物種之非窮舉性清單包括但不限於，白松蟲(*Scutigera immaculata*)。

(20) 圓形動物門(Phylum Nematoda)。特定屬之非窮舉性清單包括但不限於，線蟲屬(*Aphelenchoides* spp.)、刺線蟲屬(*Belonolaimus* spp.)、小環線蟲屬(*Criconemella* spp.)、莖線蟲屬(*Ditylenchus* spp.)、孢囊線蟲屬(*Heterodera* spp.)、潛根線蟲屬(*Hirschmanniella* spp.)、紐帶線蟲屬(*Hoplolaimus* spp.)、根瘤線蟲屬(*Meloidogyne* spp.)、根腐線蟲屬(*Pratylenchus* spp.)及穿孔線蟲屬(*Radopholus* spp.)。特定物種之非窮舉性清單包括但不限於，犬惡絲蟲(*Dirofilaria immitis*)、玉米胞囊線蟲(*Heterodera zeae*)、南方根結線蟲(*Meloidogyne incognita*)、爪哇根瘤線蟲(*Meloidogyne javanica*)、人蟠尾絲蟲(*Onchocerca volvulus*)、相似穿孔線蟲(*Radopholus similis*)以及腎狀線蟲(*Rotylenchus reniformis*)。


【0037】用語「殺蟲有效量」意指對害蟲達成可觀察到的效應所需要的殺蟲劑量，舉例而言壞死、死亡、遲緩、預防、移除、破壞的效應，不然就是能減少害蟲於一所在地的發生及/或害蟲的活性，於一所在地驅逐害蟲族群，害

蟲於一所在地或附近無行為能力，以及/或是害蟲於一所在地或附近消滅的時候，可產生此效應。當然，可發生此等效應之組合。一般而言，害蟲族群、活性或是二者都希望降低超過百分之五十，較佳為超過百分之九十，且最佳為超過百分之九十九。通常，對於農業目的，殺蟲有效量為從大約每公頃0.0001公克至大約每公頃5000公克，較佳為從大約每公頃0.0001公克至大約每公頃500公克，以及還更佳為從大約每公頃0.0001公克至大約每公頃50公克。

較佳實施例之詳細說明

本揭示之詳細說明

【0038】本文件揭示式1分子



式1

其中：

(A) R^1 、 R^5 、 R^6 、 R^{11} 及 R^{12} 各自獨立地選自於下列所構成的群組：H、F、Cl、Br、I、CN、 (C_1-C_4) 烷基、 (C_1-C_4) 鹵烷基、 (C_1-C_4) 烷氧基，以及 (C_1-C_4) 鹵烷氧基；

(B) R^2 、 R^3 及 R^4 各自獨立地選自於下列所構成的群組：H、F、Cl、Br、I、CN、 (C_1-C_4) 烷基、 (C_2-C_4) 烯基、 (C_2-C_4) 炔基、 (C_1-C_4) 鹵烷基、 (C_1-C_4) 烷氧基，以及 (C_1-C_4) 鹵烷氧基；

(C) R^7 為(C₁-C₆)鹵烷基；

(D) R^9 係選自於下列所構成的群組：(F)、H、F、Cl、Br、I、CN、(C₁-C₄)烷基、(C₁-C₄)鹵烷基、(C₁-C₄)烷氧基，以及(C₁-C₄)鹵烷氧基；

(E) R^{10} 係選自於下列所構成的群組：(F)、F、Cl、Br、I、CN、(C₁-C₄)烷基、(C₂-C₄)烯基、(C₂-C₄)炔基、(C₁-C₄)鹵烷基、(C₁-C₄)烷氧基，以及(C₁-C₄)鹵烷氧基；

(F) R^9 及 R^{10} 能選擇性地一起形成一個3至5員飽和或不飽和的、烴基(hydrocarbyl)鍵聯，

其中該烴基鍵聯可選擇性地以一個或更多個獨立地選自於下列所構成的群組之取代基予以取代：F、Cl、Br、I 及CN；

(G) X係

(1) $NR^{13}R^{14}$ ，其中 R^{13} 及 R^{14} 各自獨立地選自於下列所構成的群組：H、CHO、(C₁-C₄)烷基、(C₂-C₄)烯基、(C₁-C₄)鹵烷基、(C₁-C₄)烷氧基、(C₁-C₄)鹵烷氧基、(C₃-C₈)環烷基、(C₁-C₄)烷基苯基、(C₁-C₄)烷基吡啶基、吡啶基、CH=NO(C₁-C₄)烷基、(C₁-C₄)烷基CH=NO(C₁-C₄)鹵烷基、(C₁-C₄)烷基NH(C₁-C₄)鹵烷基、(C₁-C₄)烷基N((C₁-C₄)烷基)(C₁-C₄)鹵烷基、硫環丁基(thietanyl)、硫環丁基-氧化物，以及硫環丁基-二氧化物，

其中各個烷基、烯基、鹵烷基、烷氧基、鹵烷氧基、環烷基、苯基、吡啶基、硫環丁基、硫環丁基-氧化物以及硫環丁基-二氧化物可以選擇性地以一個或更多個獨立地

選自於下列所構成的群組之取代基予以取代：F、Cl、Br、I、CN、OH、(C₁-C₄)烷基及(C₁-C₄)烷氧基；

(2) N=CHN((C₁-C₄)烷基)₂或

(3) Z，其中Z為一包含3至7個原子之雜環基，其中該等原子之至少一者為一氮，且其中該氮有一鍵往C(=Q)，

其中該雜環基可選擇性地以一個或更多個獨立地選自於下列所構成的群組之取代基予以取代：F、Cl、Br、I及CN；

(H) Q係選自於下列所構成的群組：O及S；以及

式1分子之農業上可接受的酸加成鹽類、鹽類衍生物、溶劑合物、酯類衍生物、結晶性多形體、同位素、解析的立體異構物，以及互變異構物。

【0039】在另一個具體例中，R¹、R³、R⁴、R⁵、R⁶、R⁹、R¹¹、R¹²、R¹³及R¹⁴為H。此具體例可與R²、R⁷、R¹⁰，及Q之其他具體例組合使用。

【0040】在另一個具體例中，R²為Cl、Br或CH₃。此具體例可與R¹、R³、R⁴、R⁵、R⁶、R⁷、R⁹、R¹⁰、R¹¹、R¹²、R¹³、R¹⁴，及Q之其他具體例組合使用。

【0041】在另一個具體例中，R³為F、Cl或Br。此具體例可與R¹、R²、R⁴、R⁵、R⁶、R⁷、R⁹、R¹⁰、R¹¹、R¹²、R¹³、R¹⁴，及Q之其他具體例組合使用。

【0042】在另一個具體例中，R⁴為Cl、Br或CH₃。此具體例可與R¹、R²、R³、R⁵、R⁶、R⁷、R⁹、R¹⁰、R¹¹、R¹²、R¹³、R¹⁴，及Q之其他具體例組合使用。

【0043】在另一個具體例中， R^2 、 R^3 及 R^4 為Cl。此具體例可與 R^1 、 R^5 、 R^6 、 R^7 、 R^9 、 R^{10} 、 R^{11} 、 R^{12} 、 R^{13} 、 R^{14} ，及Q之其他具體例組合使用。

【0044】在另一個具體例中， R^7 為(C₁-C₆)鹵烷基。此具體例可與 R^1 、 R^2 、 R^3 、 R^4 、 R^5 、 R^6 、 R^9 、 R^{10} 、 R^{11} 、 R^{12} 、 R^{13} 、 R^{14} ，及Q之其他具體例組合使用。

【0045】在另一個具體例中， R^7 為CF₃。此具體例可與 R^1 、 R^2 、 R^3 、 R^4 、 R^5 、 R^6 、 R^9 、 R^{10} 、 R^{11} 、 R^{12} 、 R^{13} 、 R^{14} ，及Q之其他具體例組合使用。

【0046】在另一個具體例中， R^{10} 為Br、CH₃或CF₃。此具體例可與 R^1 、 R^2 、 R^3 、 R^4 、 R^5 、 R^6 、 R^7 、 R^9 、 R^{11} 、 R^{12} 、 R^{13} 、 R^{14} ，及Q之其他具體例組合使用。

【0047】在另一個具體例中，X係NR¹³R¹⁴，其中 R^{13} 及 R^{14} 為H、CHO、CH₃、CH₂CF₃、CH(CH₃)CF₃、環丙基、環丁基、環己基、CH(CH₃)苯基、CH₂吡啶基、吡啶基、或CH=NOCH₃，其中該環己基及苯基可選擇性地以一個或更多個獨立地選自於下列所構成的群組之取代基予以取代：F、Cl、CH₃及OCH₃。此具體例可與 R^1 、 R^2 、 R^3 、 R^4 、 R^5 、 R^6 、 R^7 、 R^9 、 R^{11} 、 R^{12} ，及Q之其他具體例組合使用。

【0048】在另一個具體例中，X為N=CHN(CH₃)₂。此具體例可與 R^1 、 R^2 、 R^3 、 R^4 、 R^5 、 R^6 、 R^7 、 R^9 、 R^{11} 、 R^{12} ，及Q之其他具體例組合使用。

【0049】在另一個具體例中，X為Z，其中Z為吡咯

啖。此具體例可與 R^1 、 R^2 、 R^3 、 R^4 、 R^5 、 R^6 、 R^7 、 R^9 、 R^{11} 、 R^{12} ，及 Q 之其他具體例組合使用。

【0050】在另一個具體例中， Q 為 O 或 S 。此具體例可與 R^1 、 R^2 、 R^3 、 R^4 、 R^5 、 R^6 、 R^7 、 R^9 、 R^{10} 、 R^{11} 、 R^{12} 、 R^{13} ，及 R^{14} 之其他具體例組合使用。

【0051】在另一個具體例中，

(A) R^1 、 R^5 、 R^6 、 R^{11} 及 R^{12} 為 H ；

(B) R^2 、 R^3 及 R^4 各自獨立地選自於下列所構成的群組： H 、 F 、 Cl 、 Br 以及 (C_1-C_4) 烷基；

(C) R^7 為 (C_1-C_6) 鹵烷基；

(D) R^9 為 H ；

(E) R^{10} 係選自於下列所構成的群組： Br 、 (C_1-C_4) 烷基以及 (C_1-C_4) 鹵烷基；

(G) X 係

(1) $NR^{13}R^{14}$ ，其中 R^{13} 及 R^{14} 各自獨立地選自於下列所構成的群組： H 、 CHO 、 (C_1-C_4) 烷基、 (C_1-C_4) 鹵烷基、 (C_3-C_8) 環烷基、 (C_1-C_4) 烷基苯基、 (C_1-C_4) 烷基吡啶基、吡啶基，以及 $CH=NO(C_1-C_4)$ 烷基，

其中各個烷基、鹵烷基、環烷基、苯基及吡啶基可以選擇性地以一個或更多個獨立地選自於下列所構成的群組之取代基予以取代： F 、 Cl 、 (C_1-C_4) 烷基及 (C_1-C_4) 烷氧基，

(2) $N=CHN((C_1-C_4)$ 烷基) $_2$ 或

(3) Z ，其中 Z 為一包含3至7個原子之雜環基，其中該等原子之至少一者為一氮，且其中該氮有一鍵往 $C(=Q)$ ，

以及


(H) Q係選自於下列所構成的群組：O及S。

苯甲基鹵化物之製備

【0052】 苯甲基鹵化物**1-3**，其中 R^1 、 R^2 、 R^3 、 R^4 、 R^5 、 R^6 及 R^7 係如先前所揭示，可以用數種方式製備。酮**1-1**之製備可以在大約 $-78\text{ }^\circ\text{C}$ 至大約 $0\text{ }^\circ\text{C}$ 的溫度下，於極性非質子溶劑，較佳為二乙基醚內，用鋰鹼例如正丁基鋰來處理溴苯，接著以酯類 $R^7C(O)O(C_1-C_4)$ 烷基，其中 R^7 係如先前所揭示，例如2,2-二氟化丙酸乙酯(未顯示)予以處理。在大約 $-10\text{ }^\circ\text{C}$ 至大約 $10\text{ }^\circ\text{C}$ 下，於極性質子溶劑，較佳為甲醇內，在一種鹼諸如含水氫氧化鈉存在下，用一種還原劑，諸如硼氫化鈉來處理酮**1-1**，其中 R^1 、 R^2 、 R^3 、 R^4 、 R^5 及 R^7 係如先前所揭示，可以提供苯甲醇類**1-3**(流程圖1，步驟*a*)。任擇地，可以於極性非質子溶劑，較佳為四氫呋喃內，在一種催化量的四丁基氟化銨存在下，讓醛**1-2**，其中 R^6 為H且 R^1 、 R^2 、 R^3 、 R^4 及 R^5 係如先前所揭示，與三氟三甲基矽烷反應(流程圖1，步驟*b*)，以提供苯甲醇類**1-3**，其中 R^7 為 CF_3 。隨後，苯甲醇類**1-3**可以轉化成苯甲基鹵化物**1-4**，其中E為Br、Cl或I，且 R^1 、 R^2 、 R^3 、 R^4 、 R^5 、 R^6 及 R^7 係如先前所揭示，其係透過於大概 $40\text{ }^\circ\text{C}$ 下，在不會與試劑反應的溶劑，較佳為二氯甲烷內，用一種鹵化試劑諸如*N*-溴琥珀醯亞胺，及亞磷酸三乙酯予以處理，以提供苯甲基鹵化物**1-4**，E為Br(流程圖1，步驟*c*)。任擇地，苯甲醇類**1-3**可以轉化成苯甲基鹵化物**1-4**，其中E為

Br，其係透過於一種鹼諸如三乙胺存在下，用一種磺醯氯諸如甲磺醯氯來處理，然後用一種過渡金屬溴化物劑諸如溴化鐵(III)來處理生成的磺酸。此外，在大約110 °C下，於一種烴溶劑諸如甲苯內，於一種鹼諸如吡啶存在下，用氯化試劑諸如亞硫醯氯予以處理，可以提供苯甲基鹵化物**1-4**，其中**E**為Cl(流程圖1，步驟c)。

流程圖1




氟化乙烯基苯甲酯及酸之製備

【0053】 鹵苯甲酸**2-1**，其中 R^9 、 R^{10} 、 R^{11} 及 R^{12} 係如先前所揭示，可以轉化成鹵苯甲酸酯**2-2**，其中 R^9 、 R^{10} 、 R^{11} 及 R^{12} 係如先前所揭示。鹵苯甲酸**2-1**可以在一種(C_1 - C_8)醇諸如乙醇存在下，用一種酸諸如硫酸予以處理，以提供鹵苯甲酸乙基酯**2-2**(流程圖2，步驟a)。氟化乙烯基苯甲酸酯**2-3**可以經由在溫度範圍從大約周圍溫度至大約45 °C下，於一種極性非質子溶劑，較佳為1,3-二甲-2-咪

啞啞酮內，在鈀催化劑如四(三苯基膦)鈀(0)、銅添加劑如碘化銅(I)以及氟化物源諸如氟化鈉之存在下，使**2-2**與一種氟化乙烯基矽烷反應而取得，以提供氟化乙烯基苯甲酸酯**2-3**(流程圖2，步驟**b**)。氟化乙烯基苯甲酸酯**2-3**可以在大約周圍溫度下，於一種混合溶劑系統內，該混合溶劑系統包含極性非質子溶劑較佳為四氫呋喃以及極性質子溶劑較佳為甲醇與水，用一種金屬氫氧化物源如氫氧化鋰予以處理，以提供氟化乙烯基苯甲酸**2-4**(流程圖2，步驟**c**)。


流程圖2



【0054】任擇地，鹵苯甲酸**2-1**可以在溫度範圍從大約80°C至大約140°C下，於一種極性非質子溶劑較佳為二甲亞砜內，在一種鈀催化劑，例如1,1'-雙(二苯基膦基)二茂鐵二氯化鈀(II)，以及一種鹼諸如碳酸鉀的存在下，直接用一種乙烯基硼烷源，例如乙烯基三氟硼酸或3-羥基

-2,3- 二 甲 基 二 級 丁 基 氫 乙 烯 基 硼 酸 酯 (3-hydroxy-2,3-dimethylbutan-2-yl hydrogen vinylboronate) 予 以 處 理 ， 以 提 供 乙 烯 基 苯 甲 酸 **3-1** ， 其 中 R^9 、 R^{10} 、 R^{11} 及 R^{12} 係 如 先 前 所 揭 示 (流 程 圖 3 ， 步 驟 *a*) 。 乙 烯 基 苯 甲 酸 **3-1** 可 以 在 大 約 $0\text{ }^\circ\text{C}$ 下 ， 於 極 性 非 質 子 溶 劑 ， 較 佳 為 二 氯 甲 烷 內 ， 用 溴 源 諸 如 *N*- 溴 琥 珀 醯 亞 胺 ， 及 一 種 氟 源 諸 如 三 乙 胺 三 氟 化 氫 予 以 處 理 ， 以 提 供 溴 氟 烷 基 苯 甲 酸 **3-2** ， 其 中 R^9 、 R^{10} 、 R^{11} 及 R^{12} 係 如 先 前 所 揭 示 (流 程 圖 3 ， 步 驟 *b*) 。 溴 氟 烷 基 苯 甲 酸 **3-2** 可 以 在 溫 度 範 圍 從 大 約 $0\text{ }^\circ\text{C}$ 至 大 約 周 圍 溫 度 下 ， 於 一 種 極 性 質 子 溶 劑 較 佳 為 甲 醇 內 ， 用 一 種 鹼 諸 如 第 三 丁 氧 基 鉀 予 以 處 理 ， 以 提 供 氟 化 乙 烯 基 苯 甲 酸 **2-4** (流 程 圖 3 ， 步 驟 *c*) 。

流程圖3




大約120°C之間的溫度下，於一種無水非質子溶劑，諸如二氯甲烷、四氫呋喃、1,2-二氯乙烷、*N,N*-二甲基甲醯胺或其等之任何組合內，以一種鹼諸如三乙胺、二異丙基乙胺或4-甲基嗎福林，來處理胺或胺鹽**5-2**，其中 R^{13} 及 R^{14} 係如先前所揭示，以及活性的羧酸**5-1**，其中 Q 是 O 、 A 為一活化基團且 R^1 、 R^2 、 R^3 、 R^4 、 R^5 、 R^6 、 R^7 、 R^9 、 R^{10} 、 R^{11} 及 R^{12} 係如先前所揭示(流程圖5，步驟*a*)。

【0057】活性的羧酸**5-1**可以為一種酸性鹵化物，例如一酸性氯化物、酸性溴化物或酸性氟化物；一種羧酸酯，例如對硝基苯酯、五氟苯酯、乙基(羥亞胺基)氰乙酸酯、甲酯、乙酯、苯甲酯、*N*-羥琥珀醯亞胺酯、羥苯并三唑-1-基酯，或是羥吡啶基三唑-1-基酯；鄰醯基異脲(*O*-acylisourea)；一種酸酐；或是一種硫酯。酸性氯化物可從對應的羧酸製備，其係透過用一種脫水、氯化試劑諸如草醯氯或是亞硫醯氯來處理。活性的羧酸**5-1**可於原位、用一種脲鹽(uronium salt)例如2-(7-氧化苯并三氮唑)-*N,N,N',N'*-四甲基脲六氟磷酸酯(1-[bis(dimethylamino)methylene]-1*H*-1,2,3-triazolo[4,5-*b*]pyridinium 3-oxid hexafluorophosphate)(HATU)、*O*-(苯并三唑-1-基)-*N,N,N',N'*-四甲基脲六氟磷酸酯(HBTU)，或(1-氰基-2-乙氧基-2-側氧亞乙基胺基氧基)二甲基胺基-嗎福啉基-碳鎗六氟磷酸酯(COMU)，而從羧酸製備。活性的羧酸**5-1**亦可從羧酸於原位、用一種鎘鹽例如苯并三唑-1-基-氧三吡咯啶并鎘六氟磷酸酯

(benzotriazol-1-yl-oxytripyrrolidinophosphonium hexafluorophosphate) (PyBop)，而製備。活性的羧酸**5-1**亦可從羧酸於原位、於一種三唑，如羥苯并三唑·一水合物 (HOBt)或1-羥-7-偶氮苯并三唑(HOAt)存在下，用一種耦合試劑例如1-(3-二甲基胺丙基)-3-乙基碳二亞胺(EDC)或二環己基碳二亞胺 (DCC)，來製備。鄰醯基異脲 (*O*-Acylisourea)可以用一種脫水碳二亞胺，諸如1-(3-二甲基胺丙基)-3-乙基碳二亞胺或二環己基碳二亞胺來製備。活性的羧酸**5-1**亦可從羧酸於原位、於一種三唑如1-羥-7-偶氮苯并三唑(HOAt)存在下，用一種耦合試劑例如2-氯-1,3-二甲基咪唑六氟磷酸酯 (2-Chloro-1,3-dimethylimidazolidinium hexafluorophosphate) (CIP)，來製備。

流程圖5




【0058】胺或胺鹽**5-2**可藉由用一種酸如氯化氫予以處理，而於原位、從對應的*N*-三級丁氧基羰基胺來產生。

選擇性地，於一種鹼諸如碳酸氫鈉或三乙胺存在下，在與活性的羧酸**5-1**反應之前，或是在與活性的羧酸**5-1**反應的期間，可以使胺鹽**5-2**於原位中和，來提供苯基烯丙基苯甲醯胺**5-3**。

【0059】氟化苯基烯丙基苯甲醯胺**6-1**，其中**Q**是**O**、**R¹³**及**R¹⁴**是**H**且**R¹**、**R²**、**R³**、**R⁴**、**R⁵**、**R⁶**、**R⁷**、**R⁹**、**R¹⁰**、**R¹¹**及**R¹²**係如先前所揭示，可以在大約80°C至大約130°C之間的溫度下，於一種非質子溶劑諸如甲苯內，以一種親電子劑諸如**N,N**-二甲基甲醯胺二甲縮醛，來處理以提供二甲基胺基亞甲基苯基烯丙基苯甲醯胺**6-2**，其中**Q**是**O**且**R¹**、**R²**、**R³**、**R⁴**、**R⁵**、**R⁶**、**R⁷**、**R⁹**、**R¹⁰**、**R¹¹**及**R¹²**係如先前所揭示(流程圖6，步驟**a**)。二甲基胺基亞甲基苯基烯丙基苯甲醯胺**6-2**可以在大約0°C至大約80°C之間的溫度下，於一種極性非質子溶劑諸如二噁烷內，以(C₁-C₄)烷基-OH₂或其鹽類諸如**O**-甲基羥基胺鹽酸鹽、一種酸如乙酸，以及一種鹼如含水氫氧化鈉，來處理以提供**N**-烷氧基亞胺基苯基烯丙基苯甲醯胺**6-3**，其中**Q**是**O**、**R¹³**是**H**且**R¹**、**R²**、**R³**、**R⁴**、**R⁵**、**R⁶**、**R⁷**、**R⁹**、**R¹⁰**、**R¹¹**及**R¹²**係如先前所揭示(流程圖6，步驟**b**)。

流程圖6




實施例

【0060】 此等實施例係為了說明之目的，而不應解釋為將本揭示限制為僅此等實施例中揭露的具體例。

【0061】 自商業來源獲得之起始原料、試劑及溶劑係未經進一步純化即使用。無水溶劑係購自Aldrich之Sure/Seal™，且以所收到的形式使用。熔點係於Thomas Hoover Unimelt毛細管熔點儀或是在Stanford Research Systems之OptiMelt自動化熔點系統上測得，及未經校正。使用「室溫」的實施例係在溫度範圍大約20 °C至大約24 °C的氣候控制實驗室中進行。分子係以其等依據ISIS Draw、ChemDraw或ACD Name Pro內的命名程式所命名之已知名稱顯示。若此等程式無法命名一分子，則此分子係依習用的命名規則來命名。除非另有說明，否則¹H NMR光譜數據係以ppm (δ)為單位及於300、400、500或600 MHz記錄；¹³C NMR光譜數據係以ppm (δ)為單位及於

75、100或150 MHz記錄，以及 ^{19}F NMR光譜數據係以ppm (δ)為單位及於376 MHz記錄。


實施例1：(Z)-2-溴-4-(1,4,4,4-四氟-3-(3,4,5-三氯苯基)丁-1-烯-1-基)苯甲酸(C1)之製備



【0062】將配於*N*-甲基吡咯啉酮(2.0 mL)之2,2'-聯吡啶(0.255 g, 1.63 mmol)、2-溴-4-(1-氟乙烯基)苯甲酸(C24) (1.00 g, 4.08 mmol)及5-(1-溴-2,2,2-三氟乙基)-1,2,3-三氯苯(2.79 g, 8.16 mmol)添加至一個25 mL圓底燒瓶中，以提供黃色溶液。添加溴化銅(I) (0.117 g, 0.816 mmol)，以及反應混合物係用氮清洗5分鐘。反應混合物繼而加熱至150 °C歷時3小時。將反應混合物傾注至冰水(100 mL)內。將水過濾以及使生成的黑色膠溶解於乙酸乙酯(800 mL)內，用鹽水(2 x 200 mL)及水(2 x 200 mL)清洗，於硫酸鎂上乾燥、過濾以及濃縮，以提供如棕色油之標題化合物(1.40 g, 64%): ^1H NMR (400 MHz, CDCl_3) δ 8.03 (d, $J = 8.2$ Hz, 1H), 7.89 (d, $J = 1.8$ Hz, 1H), 7.59 (dd, $J = 8.3, 1.8$ Hz, 1H), 7.43 (s, 2H), 5.83 (dd, $J = 32.4, 9.6$ Hz, 1H), 4.60 (p, $J = 8.8$ Hz, 1H); ^{19}F NMR (376 MHz, CDCl_3) δ -69.32 (d, $J = 2.3$ Hz), -108.70 – -119.01 (m); ESIMS m/z 505 ($[\text{M}-\text{H}]^-$)。


【0063】 下列化合物係以實施例1中揭示之流程予以製備：

(Z)-4-(1,4,4,4-四氟-3-(3,4,5-三氯苯基)丁-1-烯-1-基)-2-(三氟甲基)苯甲酸(C2)



單離為黃色油(7.6 g, 68%): ^1H NMR (400 MHz, CDCl_3) δ 8.04 (d, $J = 8.2$ Hz, 1H), 7.99 - 7.94 (m, 1H), 7.84 (dd, $J = 8.2, 1.8$ Hz, 1H), 7.44 (s, 2H), 5.90 (dd, $J = 32.4, 9.6$ Hz, 1H), 4.62 (p, $J = 8.9$ Hz, 1H); ^{19}F NMR (376 MHz, CDCl_3) δ -59.60, -69.28 (d, $J = 2.3$ Hz), -112.11; ESIMS m/z 493 ($[\text{M}-\text{H}]^-$).


(Z)-4-(1,4,4-三氟-3-(3,4,5-三氯苯基)戊-1-烯-1-基)-2-(三氟甲基)苯甲酸(C3)



【0064】 單離為黃色泡沫(0.628 g, 60%): ^1H NMR (400 MHz, CDCl_3) δ 8.00 (d, $J = 8.2$ Hz, 1H), 7.95 (d, $J = 8.8$ Hz, 1H), 7.81 (d, $J = 8.3$ Hz, 1H), 7.42 (s, 2H), 5.96 (dd, $J = 33.6, 9.8$ Hz, 1H), 4.29 (td, $J = 14.3, 9.8$


Hz, 1H), 1.65 (t, $J = 18.4$ Hz, 3H); ^{19}F NMR (376 MHz, CDCl_3) δ -59.61, -92.97 – -97.35 (m), -114.82; ESIMS m/z 491 ($[\text{M}-\text{H}]^-$)。

(Z)-2-氯-4-(1,4,4,4-四氟-3-(3,4,5-三氯苯基)丁-1-烯-1-基)苯甲酸(C4)



【0065】單離為白色固體(4.27 g, 88%): ^1H NMR (400 MHz, CDCl_3) δ 8.07 (d, $J = 8.2$ Hz, 1H), 7.68 (d, $J = 1.7$ Hz, 1H), 7.54 (dd, $J = 8.3, 1.8$ Hz, 1H), 7.43 (s, 2H), 5.85 (dd, $J = 32.4, 9.6$ Hz, 1H), 4.60 (p, $J = 8.8$ Hz, 1H); ^{19}F NMR (376 MHz, CDCl_3) δ -69.33 (d, $J = 2.2$ Hz), -112.18 (d, $J = 2.4$ Hz); ESIMS m/z 461 ($[\text{M}-\text{H}]^-$)。


(Z)-4-(3-(3,5-二溴-4-氯苯基)-1,4,4,4-四氟丁-1-烯-1-基)-2-(三氟甲基)苯甲酸(C5)



【0066】單離為棕色膠(2.00 g, 37%): ESIMS m/z 583 ($[\text{M}-\text{H}]^-$)。


(Z)-4-(3-(3,5-二氯苯基)-1,4,4,4-四氟丁-1-烯-1-基)-2-(三氟甲基)苯甲酸(C5)

基)-2-(三氟甲基)苯甲酸(C6)



【0067】單離為棕色膠(0.50 g, 43%): $^1\text{H NMR}$ (400 MHz, $\text{DMSO-}d_6$) δ 13.9 (br s, 1H), 8.16 (s, 1H), 8.09 (d, $J = 8.0$ Hz, 1H), 7.92 (d, $J = 8.0$ Hz, 1H), 7.82 (s, 2H), 7.64 (t, $J = 6.0$ Hz, 1H), 6.90 (dd, $J = 36.0, 10.4$ Hz, 1H), 5.26 - 5.17 (m, 1H); IR(薄膜) 3416, 2926, 1716, 1119 cm^{-1} ; ESIMS m/z 449 ($[\text{M}+\text{H}]^+$)。


(Z)-4-(3-(3,4-二氯苯基)-1,4,4,4-四氟丁-1-烯-1-基)-2-(三氟甲基)苯甲酸(C7)




【0068】單離為棕色膠(2.50 g, 56%): $^1\text{H NMR}$ (300 MHz, $\text{DMSO-}d_6$) δ 13.9 (br s, 1H), 8.16 (s, 1H), 8.09 (d, $J = 10.8$ Hz, 1H), 8.08 (s, 1H), 7.92 (d, $J = 8.1$ Hz, 1H), 7.75 - 7.65 (m, 2H), 6.90 (dd, $J = 36.0, 10.4$ Hz, 1H), 5.22 - 5.16 (m, 1H); IR(薄膜) 3440, 2927, 1716, 1175 cm^{-1} ; ESIMS m/z 459 ($[\text{M}-\text{H}]^-$)。

(Z)-4-(3-(3,5-二溴苯基)-1,4,4,4-四氟丁-1-烯-1-基)-2-(三氟甲基)苯甲酸(C7)


基)-2-(三氟甲基)苯甲酸(C8)




【0069】單離為棕色膠(2.20 g, 39%): $^1\text{H NMR}$ (300 MHz, CDCl_3) δ 8.05 - 7.95 (m, 2H), 7.84 (d, $J = 7.2$ Hz, 1H), 7.69 - 7.68 (m, 1H), 7.49 (s, 2H), 5.95 (dd, $J = 32.7, 9.6$ Hz, 1H), 4.64 - 4.58 (p, 1H); IR(薄膜) 3439, 2925, 1714, 1118, 746 cm^{-1} ; ESIMS m/z 549 ($[\text{M}-\text{H}]^-$)。 (Z)-4-(3-(3,5-二氯-4-氟苯基)-1,4,4,4-四氟丁-1-烯-1-基)-2-(三氟甲基)苯甲酸(C9)




【0070】單離為棕色膠(1.20 g, 54%): $^1\text{H NMR}$ (300 MHz, CDCl_3) δ 7.88 (s, 2H), 7.76 - 7.75 (m, 1H), 7.37 (d, $J = 6.0$ Hz, 2H), 5.90 (dd, $J = 32.1, 9.0$ Hz, 1H), 4.62 - 4.56 (p, 1H); IR(薄膜) 3445, 2926, 1698, 1260, 750 cm^{-1} ; ESIMS m/z 477 ($[\text{M}-\text{H}]^-$)。 (Z)-4-(3-(4-氯-3,5-二甲基苯基)-1,4,4,4-四氟丁-1-烯-1-基)-2-(三氟甲基)苯甲酸(C10)



【0071】單離為黃色膠(2.20 g, 53%): $^1\text{H NMR}$ (300 MHz, CDCl_3) δ 8.01 (d, $J = 8.1$ Hz, 1H), 7.94 (s, 1H), 7.83 (d, $J = 8.1$ Hz, 1H), 7.11 (s, 2H), 6.00 (dd, $J = 33.0, 9.9$ Hz, 1H), 4.58 - 4.55 (m, 1H), 2.40 (s, 6H); IR(薄膜)3445, 1713, 852 cm^{-1} ; ESIMS m/z 453 ($[\text{M}-\text{H}]^-$)。 (Z)-4-(3-(4-溴-3,5-二氯苯基)-1,4,4,4-四氟丁-1-烯-1-基)-2-(三氟甲基)苯甲酸(C11)




【0072】單離為棕色固體(1.50 g, 65%): mp 78-81 $^{\circ}\text{C}$; $^1\text{H NMR}$ (300 MHz, CDCl_3) δ 8.09 - 7.99 (m, 2H), 7.83 - 7.81 (m, 1H), 7.42 (s, 2H), 5.95 (dd, $J = 32.4$ Hz, 9.6 Hz, 1H), 4.63 - 4.57 (m, 1H); IR(薄膜)3445, 1713, 852 cm^{-1} ; ESIMS m/z 538 ($[\text{M}+\text{H}]^+$)。 (Z)-4-(3-(3-溴-5-氯苯基)-1,4,4,4-四氟丁-1-烯-1-基)-2-(三氟甲基)苯甲酸(C12)




【0073】單離為棕色膠(2.0 g, 62%): $^1\text{H NMR}$ (300 MHz, $\text{DMSO-}d_6$) δ 13.80 (br s, 1H), 8.15 (s, 1H), 8.09 (d, $J = 8.1$ Hz, 1H), 7.93 - 7.78 (m, 4H), 6.91 (dd, $J = 35.7, 10.2$ Hz, 1H), 5.27 - 5.14 (m, 1H); IR(薄膜)3081, 2927, 1714, 776 cm^{-1} ; ESIMS m/z 503 ($[\text{M-H}]^-$)。

(Z)-4-(3-(3,4-二溴苯基)-1,4,4,4-四氟丁-1-烯-1-基)-2-(三氟甲基)苯甲酸(C13)




【0074】單離為黃色膠(2.1 g, 78%): $^1\text{H NMR}$ (400 MHz, CDCl_3) δ 8.02 (d, $J = 8.4$ Hz, 1H), 7.94 (s, 1H), 7.83 (d, $J = 8.4$ Hz, 1H), 7.66 (d, $J = 8.4$ Hz, 2H), 7.26 - 7.21 (m, 1H), 5.96 (dd, $J = 32.4, 9.2$ Hz, 1H), 4.67 - 4.58 (p, 1H); IR(薄膜)3426, 2925, 1714, 1115 cm^{-1} ; ESIMS m/z 547 ($[\text{M-H}]^-$)。

(Z)-2-甲基-4-(1,4,4,4-四氟-3-(3,4,5-三氯苯基)丁-1-烯-1-基)苯甲酸(C14)




【0075】單離為橘色油(0.94 g, 61%): ^1H NMR (400 MHz, CDCl_3) δ 8.09 (d, $J = 8.8$ Hz, 1H), 7.49 - 7.45 (m, 2H), 7.44 (s, 2H), 5.80 (dd, $J = 32.7, 9.6$ Hz, 1H), 4.60 (p, $J = 8.9$ Hz, 1H), 2.69 (s, 3H); ^{19}F NMR (376 MHz, CDCl_3) δ -69.40 (d, $J = 2.3$ Hz), -108.40 - -115.65 (m); ESIMS m/z 441 ($[\text{M}-\text{H}]^-$)。

(Z)-2-甲基-4-(1,4,4-三氟-3-(3,4,5-三氯苯基)戊-1-烯-1-基)苯甲酸(C15)




【0076】單離為橘色泡沫(0.204 g, 51%): ^1H NMR (400 MHz, CDCl_3) δ 8.07 (d, $J = 8.8$ Hz, 1H), 7.49 - 7.40 (m, 4H), 5.86 (dd, $J = 33.9, 9.9$ Hz, 1H), 4.27 (td, $J = 14.3, 9.7$ Hz, 1H), 2.68 (s, 3H), 1.65 (t, $J = 18.4$ Hz, 3H); ^{19}F NMR (376 MHz, CDCl_3) δ -95.11, -95.18, -114.57; ESIMS m/z 437 ($[\text{M}-\text{H}]^-$)。

(Z)-4-(1,4,4-三氟-3-(3,4,5-三氯苯基)己-1-烯-1-基)-2-(三氟甲基)苯甲酸(C16)



【0077】單離為橘色泡沫(0.136 g, 63%): ^1H NMR (400 MHz, CDCl_3) δ 7.99 (dd, $J = 8.4, 4.0$ Hz, 1H), 7.93 (s, 1H), 7.80 (d, $J = 7.9$ Hz, 1H), 7.42 (d, $J = 2.6$ Hz, 2H), 6.08 - 5.87 (m, 1H), 4.32 (td, $J = 14.6, 9.8$ Hz, 1H), 1.87 (ddt, $J = 21.6, 15.4, 8.0$ Hz, 2H), 1.07 (t, $J = 7.4$ Hz, 3H); ^{13}C NMR (101 MHz, CDCl_3) δ 170.72, 156.96 (d, $J_{\text{CF}} = 253.0$ Hz), 136.85, 135.06, 134.53, 133.75, 131.90, 131.19, 130.18, 129.17, 128.60, 128.05, 127.29, 124.11, 123.36 - 122.67 (m), 121.39, 104.66 (d, $J_{\text{CF}} = 18.0$ Hz), 46.46, 29.70 - 27.14 (m), 6.40 - 5.44 (m); ESIMS m/z 503 ($[\text{M}-\text{H}]^-$).


(Z)-4-(3-(3,4-二氯苯基)-1,4,4-三氟戊-1-烯-1-基)-2-(三氟甲基)苯甲酸(C17)



【0078】單離為橘色玻璃(0.495 g, 51%): ^1H NMR (400 MHz, CDCl_3) δ 8.01 (d, $J = 8.2$ Hz, 1H), 7.94 (d, $J = 1.6$ Hz, 1H), 7.80 (dd, $J = 8.2, 1.8$ Hz, 1H), 7.49 (d,


$J = 2.1$ Hz, 1H), 7.45 (d, $J = 8.3$ Hz, 1H), 7.26 7.22 (m, 1H), 6.00 (dd, $J = 33.9, 9.8$ Hz, 1H), 4.32 (ddd, $J = 15.8, 13.0, 9.8$ Hz, 1H), 1.62 (t, $J = 18.4$ Hz, 3H); ^{19}F NMR (376 MHz, CDCl_3) δ -59.58, -89.79 – -99.81 (m), -115.63; IR(薄膜)3008, 1711 cm^{-1} ; ESIMS m/z 455 ($[\text{M}-\text{H}]^-$)。

(Z)-4-(3-(3,4-二氯苯基)-1,4,4-三氟戊-1-烯-1-基)-2-(三氟甲基)苯甲酸(C18)



【0079】單離為棕色膠(2.5 g, 46%): ^1H NMR (300 MHz, $\text{DMSO}-d_6$) δ 13.79 (br s, 1H), 8.15 - 8.06 (m, 3H), 7.91 (d, $J = 8.1$ Hz, 1H), 7.71 (s, 2H), 6.90 (dd, $J = 36.0, 10.2$ Hz, 1H), 5.21 - 5.15 (m, 1H); IR(薄膜)3431, 2924, 1623, 597 cm^{-1} ; ESIMS m/z 503 ($[\text{M}-\text{H}]^-$)。


(Z)-4-(3-(3-氯-4-氟苯基)-1,4,4,4-四氟丁-1-烯-1-基)-2-(三氟甲基)苯甲酸(C19)



【0080】單離為黃色膠(1.50 g, 57%): ^1H NMR (300


MHz, CDCl_3) δ 8.01 (d, $J = 8.1$ Hz, 2H) 7.94 (s, 2H), 7.76 - 7.75 (m, 1H), 7.37 (d, $J = 6.0$ Hz, 2H), 5.90 (dd, $J = 32.1, 9.0$ Hz, 1H); IR(薄膜)3445, 2926, 1698, 1260, 750 cm^{-1} ; ESIMS m/z 443 ($[\text{M}-\text{H}]^-$)。

(Z)-4-(3-(4-氯-3-氟苯基)-1,4,4,4-四氟丁-1-烯-1-基)-2-(三氟甲基)苯甲酸(C20)



【0081】單離為棕色膠(0.50 g, 48%): ^1H NMR (300 MHz, CDCl_3) δ 8.03 (d, $J = 8.1$ Hz, 1H), 7.94 (s, 1H), 7.83 (d, $J = 7.8$ Hz, 1H), 7.46 - 7.44 (m, 1H), 7.23 - 7.13 (m, 2H), 5.98 (dd, $J = 34.2, 9.9$ Hz, 1H), 4.69 - 4.63 (m, 1H); IR(薄膜)3092, 1751, 750 cm^{-1} ; ESIMS m/z 443 ($[\text{M}-\text{H}]^-$)。


(Z)-4-(1,4,4,4-四氟-3-(3,4,5-三氯苯基)丁-1-烯-1-基)苯甲酸(CC1)



【0082】單離為黃色膠(1.1 g, 56%): ^1H NMR (400 MHz, CDCl_3) δ 8.15 (d, $J = 8.2$ Hz, 2H), 7.67 (d, $J = 8.3$


Hz, 2H), 7.44 (s, 2H), 5.84 (dd, $J = 32.6, 9.6$ Hz, 1H), 4.61 (p, $J = 8.9$ Hz, 1H); ^{19}F NMR (376 MHz, CDCl_3) δ -69.38 (d, $J = 2.2$ Hz), -109.75 – -116.47 (m); ESIMS m/z 427 ($[\text{M}-\text{H}]^-$)。

實施例2：(Z)-2-碘-4-(1,4,4,4-四氟-3-(3,4,5-三氯苯基)丁-1-烯-1-基)苯甲酸(C21)之製備




【0083】將(Z)-2-溴-4-(1,4,4,4-四氟-3-(3,4,5-三氯苯基)丁-1-烯-1-基)苯甲酸(C1) (0.500 g, 0.987 mmol)、碘化銅(I) (0.00940 g, 0.0490 mmol)以及1,4-二噁烷(4.9 mL)添加至一個25 mL小瓶，以形成黃色懸浮液。添加碘化鈉(0.296 g, 1.97 mmol)及反式-*N,N'*-二甲環己烷-1,2-二胺(0.0140 g, 0.0990 mmol)，以及反應混合物係於110 °C下攪拌歷時3.5小時。濃縮反應混合物，以及藉由急速管柱層析法予以純化，以提供如棕色油之標題化合物 (0.247 g, 43%): ^1H NMR (300 MHz, CDCl_3) δ 8.21 (d, $J = 1.7$ Hz, 1H), 8.02 (d, $J = 8.2$ Hz, 1H), 7.62 (dd, $J = 8.3, 1.7$ Hz, 1H), 7.43 (s, 2H), 5.82 (dd, $J = 32.5, 9.6$ Hz, 1H), 4.59 (p, $J = 8.9$ Hz, 1H); ^{19}F NMR (471 MHz, CDCl_3) δ -69.32, -112.14 (d, $J = 20.8$ Hz); ESIMS m/z 553($[\text{M}-\text{H}]^-$)。

實施例3：(Z)-2-碘-4-(1,4,4,4-四氟-3-(3,4,5-三氯苯基)丁-1-烯-1-基)苯甲酸(C22)之製備




【0084】於室溫下將四(三苯基膦)鈣(0)(0.30 g, 0.26 mmol)添加至配於甲苯(10 mL)之(Z)-4-(3-(4-溴-3,5-二氯苯基)-1,4,4,4-四氟丁-1-烯-1-基)-2-(三氟甲基)苯甲酸(C11) (1.4 g, 2.6 mmol)的溶液內。反應混合物係用氮(3 x 10分鐘)清洗予以除氣。添加三丁基乙烯基錫烷(0.82 g, 2.6 mmol)至反應混合物。反應混合物再次用氮(3 x 10分鐘)清洗予以除氣，以及於120°C下攪拌3小時。反應混合物係用水來驟冷，然後用乙酸乙酯來萃取。有機層係於硫酸鈉上乾燥、過濾以及濃縮。藉由使用30%乙酸乙酯/己烷之急速管柱層析法予以純化，提供如淡黃色膠之標題化合物(0.80 g, 63%): $^1\text{H NMR}$ (300 MHz, CDCl_3) δ 7.85 (s, 1H), 7.82 (d, $J = 8.4$ Hz, 1H), 7.74 (d, $J = 8.4$ Hz, 1H), 7.42 (s, 1H), 7.37 (s, 1H), 6.72 - 6.65 (dd, $J = 17.6$ Hz, 11.6 Hz, 1H), 5.86 - 5.73 (m, 3H), 4.61 - 4.56 (m, 1H); IR(薄膜)3445, 2925, 1646, 1275, 749 cm^{-1} ; ESIMS m/z 488 ($[\text{M}+\text{H}]^+$)。

實施例4：(Z)-4-(1,4,4,4-四氟-3-(3,4,5-三氯苯基)丁-1-烯-1-基)-2-(三氟甲基)苯甲醯氯(C23)之製備



【0085】將配於二氯甲烷(1.3 mL)之(*Z*)-4-(1,4,4,4-四氟-3-(3,4,5-三氯苯基)丁-1-烯-1-基)-2-(三氟甲基)苯甲酸(**C2**) (0.200 g, 0.404 mmol)、草醯氯(0.095 mL, 1.09 mmol)及*N,N*-二甲基甲醯胺(催化量)添加至一個25 mL小瓶，以提供黃色溶液。反應係於室溫下攪拌歷時15小時。於真空下移除溶劑提供如黃色膠之標題化合物(0.220 g, 95%): $^1\text{H NMR}$ (400 MHz, CDCl_3) δ 7.99 (d, $J = 8.2$ Hz, 1H), 7.92 (d, $J = 1.7$ Hz, 1H), 7.81 (dd, $J = 8.2, 1.8$ Hz, 1H), 7.44 (s, 2H), 5.88 (dd, $J = 32.5, 9.6$ Hz, 1H), 4.73 - 4.50 (m, 1H); $^{19}\text{F NMR}$ (376 MHz, CDCl_3) δ -59.58, -69.32, -109.75 - -113.19 (m); IR(薄膜)3445, 2925, 1646, 1275, 749 cm^{-1} ; ESIMS m/z 476 ($[\text{M}-\text{Cl}]^+$)。

實施例5：2-溴-4-(1-氟乙烯基)苯甲酸(**C24**)之製備




【0086】將甲基 2-溴-4-(1-氟乙烯基)苯甲酸酯(**C29**) (1.8 g, 7.0 mmol)、氫氧化鋰水合物(0.88 g, 21 mmol)、甲醇(7.0 mL)、四氫呋喃(21 mL)，以及水(7.0 mL)添加至一個250 mL圓底燒瓶，以及反應混合物係室溫下攪拌過

夜。使混合物濃縮，以及以pH 4的緩衝液來驟冷，並且用乙酸乙酯來萃取，以提供如白色固體之標題化合物(1.0 g, 56%): ^1H NMR (400 MHz, CDCl_3) δ 8.01 (d, $J = 8.2$ Hz, 1H), 7.89 (d, $J = 1.8$ Hz, 1H), 7.57 (dd, $J = 8.3, 1.8$ Hz, 1H), 5.21 (dd, $J = 48.6, 4.0$ Hz, 1H), 5.06 (dd, $J = 17.3, 3.9$ Hz, 1H); ^{19}F NMR (471 MHz, CDCl_3) δ -108.71 (d, $J = 1.4$ Hz); ESIMS m/z 244 ($[\text{M}-\text{H}]^-$)。


下列化合物係以實施例5中概述之流程相似的方式予以製備：

4-(1-氟乙基)-2-(三氟甲基)苯甲酸(C25)



【0087】單離為白色固體(1.9 g, 93%): ^1H NMR (400 MHz, 甲醇- d_4) δ 7.95 (d, $J = 1.5$ Hz, 1H), 7.95 - 7.91 (m, 1H), 7.90 - 7.86 (m, 1H), 5.46 (dd, $J = 50.0, 4.1$ Hz, 1H), 5.09 (dd, $J = 18.0, 4.1$ Hz, 1H); ^{19}F NMR (376 MHz, 甲醇- d_4) δ -61.04 (d, $J = 1.1$ Hz), -110.93; ESIMS m/z 233 ($[\text{M}-\text{H}]^-$)。


2-氯-4-(1-氟乙基)苯甲酸(C26)



【0088】單離為白色固體(3.5 g, 75%): ^1H NMR


(400 MHz, 丙酮- d_6) δ 7.97 (dd, $J = 8.2, 0.9$ Hz, 1H), 7.76 (d, $J = 1.7$ Hz, 1H), 7.70 (dd, $J = 8.2, 1.7$ Hz, 1H), 5.68 - 5.45 (m, 1H), 5.11 (dd, $J = 18.2, 4.1$ Hz, 1H); ^{19}F NMR (376 MHz, 丙酮- d_6) δ -108.71; ESIMS m/z 200 ($[\text{M}-\text{H}]^-$)。

4-(1-氟乙基)-2-甲基苯甲酸(C27)



【0089】單離為白色固體(0.550 g, 89%): ^1H NMR (400 MHz, 甲醇- d_4) δ 7.92 (d, $J = 8.1$ Hz, 1H), 7.59 - 7.52 (m, 1H), 7.52 - 7.44 (m, 1H), 5.29 (dd, $J = 50.1, 3.7$ Hz, 1H), 4.93 (dd, $J = 18.1, 3.7$ Hz, 1H), 2.60 (s, 3H); ^{19}F NMR (376 MHz, 甲醇- d_4) δ -110.32 (d, $J = 2.1$ Hz); ESIMS m/z 181 ($[\text{M}+\text{H}]^+$)。

實施例6：甲基 4-(1-氟乙基)-2-(三氟甲基)苯甲酸酯 (C28)之製備




【0090】將甲基 4-溴-2-(三氟甲基)苯甲酸酯(2.25 g, 8.00 mmol)、(1-氟乙基)(甲基)二苯基矽烷(3.58 g, 14.8 mmol)及1,3-二甲咪唑啉-2-酮(40 mL)添加至一個 100 mL圓底燒瓶。

【0091】添加四(三苯基磷)鈣(0) (0.459 g, 0.400

mmol)、碘化銅(I) (0.0760 mg, 0.400 mmol)及氟化鈾 (3.62 g, 23.9 mmol), 以及反應係於氮氣氛圍下、在室溫下攪拌歷時24小時。將水添加至混合物且混合物用3:1己烷/二乙基醚來稀釋。使層分離, 以及有機層係於硫酸鈉上乾燥、濃縮, 以及殘餘物係藉由急速管柱層析法予以純化, 以提供如無色油之標題化合物(2.00 g, 96%): ^1H NMR (400 MHz, CDCl_3) δ 7.96 - 7.87 (m, 1H), 7.83 (dq, $J = 8.1, 0.7$ Hz, 1H), 7.77 (dd, $J = 8.2, 1.7$ Hz, 1H), 5.23 (dd, $J = 48.6, 4.0$ Hz, 1H), 5.07 (dd, $J = 17.4, 4.0$ Hz, 1H), 3.95 (s, 3H); ^{19}F NMR (376 MHz, CDCl_3) δ -59.92, -108.73 (d, $J = 1.4$ Hz); EIMS m/z 248 ($[\text{M}]^+$)。


下列化合物係以實施例6中概述之流程相似的方式予以製備:

甲基 2-溴-4-(1-氟乙烯基)苯甲酸酯(C29)




【0092】單離為無色油(1.8 g, 93%): ^1H NMR (400 MHz, CDCl_3) δ 7.84 (d, $J = 1.7$ Hz, 1H), 7.82 (dd, $J = 8.2, 0.9$ Hz, 1H), 7.50 (d, $J = 1.5$ Hz, 1H), 5.16 (dd, $J = 48.7, 3.9$ Hz, 1H), 5.01 (dd, $J = 17.3, 3.9$ Hz, 1H), 3.94 (d, $J = 2.2$ Hz, 3H); ^{19}F NMR (376 MHz, CDCl_3) δ -108.61 (d, $J = 1.5$ Hz); ESIMS m/z 258 ($[\text{M}-\text{H}]^-$)。

甲基 2-氯-4-(1-氟乙烯基)苯甲酸酯(C30)




【0093】單離為無色油(2.1 g, 99%): ^1H NMR (400 MHz, CDCl_3) δ 7.86 (dd, $J = 8.2, 0.9$ Hz, 1H), 7.64 (d, $J = 1.7$ Hz, 1H), 7.48 (dd, $J = 8.3, 1.8$ Hz, 1H), 5.17 (dd, $J = 48.7, 3.8$ Hz, 1H), 5.02 (dd, $J = 17.3, 3.9$ Hz, 1H), 3.94 (s, 3H); ^{19}F NMR (376 MHz, CDCl_3) δ -108.63 (d, $J = 1.4$ Hz); ESIMS m/z 214 ($[\text{M}-\text{H}]^-$)。

甲基 2-氯-4-(1-氟乙基)苯甲酸酯(C31)



【0094】單離為無色油(0.5 g, 85%): ^1H NMR (400 MHz, 甲醇- d_4) δ 7.90 (d, $J = 8.2$ Hz, 1H), 7.51 (s, 1H), 7.49 (dd, $J = 8.0, 1.6$ Hz, 1H), 5.30 (dd, $J = 50.1, 3.7$ Hz, 1H), 4.95 (dd, $J = 18.0, 3.7$ Hz, 1H), 3.88 (d, $J = 5.9$ Hz, 3H), 2.59 (s, 3H); ^{19}F NMR (376 MHz, 甲醇- d_4) δ -110.41 (d, $J = 1.3$ Hz); ESIMS m/z 195 ($[\text{M}+\text{H}]^+$)。

實施例7：4-(1-氟乙基)-2-(三氟甲基)苯甲酸(C25)之製備




【0095】 步驟1：4-(2-溴-1-氟乙基)-2-(三氟甲基)苯甲酸(C32) 使2-(三氟甲基)-4-乙炔基苯甲酸(5.3 g, 24 mmol)於0°C下溶解於二氯甲烷(123 mL)內，添加三乙胺三氟化氫(8.0 mL, 49 mmol)接著*N*-溴琥珀醯亞胺(8.7 g, 49 mmol)。反應混合物攪拌歷時16小時同時加溫至室溫。繼而將水添加至混合物，用二氯甲烷來清洗，於硫酸鈉上乾燥、過濾以及濃縮，提供如黃色油之標題化合物，其能未經進一步純化即使用(5.0 g, 65%)。

【0096】 步驟2：4-(1-氟乙炔基)-2-(三氟甲基)苯甲酸(C25) 使4-(2-溴-1-氟乙基)-2-(三氟甲基)苯甲酸(4.3 g, 14 mmol)於0°C下溶解於甲醇(68 mL)之內，以及添加固體的第三丁氧基鉀(4.6 g, 41 mmol)同時攪拌。允許反應混合物緩慢地加溫至23 °C，然後攪拌歷時4小時。緩慢地添加鹽酸(1 N)，以及混合物係用乙酸乙酯來萃取。藉由使用0-40%丙酮/己烷之急速管柱層析法予以純化，提供如灰白色固體之標題化合物 (1.7 g, 53%): ¹H NMR (400 MHz, CDCl₃) δ 8.02 (d, *J* = 8.2 Hz, 1H), 8.00 - 7.93 (m, 1H), 7.82 (dd, *J* = 8.2, 1.8 Hz, 1H), 5.27 (dd, *J* = 48.5, 4.1 Hz, 1H), 5.11 (dd, *J* = 17.3, 4.1 Hz, 1H)。


下列化合物係以實施例7中概述之流程相似的方式予以製備：

4-(1-氟乙炔基)苯甲酸(C33)




【0097】單離為白色固體(6.5 g, 86%): ^1H NMR (400 MHz, CDCl_3) δ 8.13 (d, $J = 8.2$ Hz, 2H), 7.69 - 7.62 (m, 2H), 5.21 (dd, $J = 49.0, 3.7$ Hz, 1H), 5.02 (dd, $J = 17.5, 3.7$ Hz, 1H); ^{19}F NMR (376 MHz, CDCl_3) δ -108.35; ESIMS m/z 165 ($[\text{M}-\text{H}]^-$)。

4-(1-氟乙基)-2-甲基苯甲酸(C27)



【0098】單離為無色油(0.165 g, 89%): ^1H NMR (400 MHz, CDCl_3) δ 8.12 - 8.03 (m, 1H), 7.46 (dd, $J = 5.8, 2.1$ Hz, 2H), 5.17 (dd, $J = 49.1, 3.7$ Hz, 1H), 4.98 (dd, $J = 17.5, 3.7$ Hz, 1H), 2.68 (s, 3H); ^{19}F NMR (376 MHz, CDCl_3) δ -108.50。

實施例8：5-(1-溴-2,2-二氟丙基)-1,2,3-三氯苯(C34)之製備之製備




【0099】將*N*-溴琥珀醯亞胺(12.0 g, 67.5 mmol)添

加至配於二氯甲烷(72.6 mL)之2,2-二氟-1-(3,4,5-三氟苯基)丙-1-醇(C43)(6.00 g, 21.8 mmol)溶液內。緩慢逐滴地添加亞磷酸三苯酯(17.1 mL, 65.3 mmol)至此攪拌溶液，以及反應混合物變成棕黑色。反應混合物繼而以回流加熱歷時3小時。使溶劑濃縮，以及殘餘物係以二乙基醚予以研磨。將固體過濾，濃縮濾液，以及生成的油藉由使用己烷作為溶析液之急速管柱層析法予以純化，以提供如澄清且無色油之標題化合物 (2.20 g, 25%): $^1\text{H NMR}$ (400 MHz, CDCl_3) δ 7.52 (s, 2H), 4.85 (dd, $J = 12.3, 10.4$ Hz, 1H), 1.77 (t, $J = 18.2$ Hz, 3H); $^{19}\text{F NMR}$ (376 MHz, CDCl_3) δ -92.14 – -95.01 (m); EIMS m/z 338 ($[\text{M}]^+$)。


下列化合物係以實施例8中概述之流程相似的方式予以製備：

1,3-二溴-5-(1-溴-2,2,2-三氟乙基)-2-氯苯(C35)




【0100】單離為澄清油(28 g, 56%): $^1\text{H NMR}$ (400 MHz, $\text{DMSO}-d_6$) δ 8.01 - 7.97 (m, 2H), 6.26 - 6.20 (m, 1H); IR(薄膜)1168, 736, 557 cm^{-1} ; ESIMS m/z 428 ($[\text{M}+\text{H}]^+$)。

5-(1-溴-2,2,2-三氟乙基)-2-氯-1,3-二甲苯(C36)




【0101】單離為澄清油(6.32 g, 89%): ^1H NMR (300 MHz, $\text{DMSO-}d_6$) δ 7.39 (s, 2H), 6.17-6.09 (m, 1H), 2.35 (s, 6H); IR(薄膜) 1114, 754 cm^{-1} ; ESIMS m/z 302 ($[\text{M}+\text{H}]^+$)。

2-溴-5-(1-溴-2,2,2-三氟乙基)-1,3-二氯苯(C37)



【0102】單離為澄清油(19 g, 46%): ^1H NMR (400 MHz, CDCl_3) δ 7.54 - 7.51 (m, 2H), 5.03 - 4.98 (m, 1H); ^{19}F NMR (376 MHz, CDCl_3) δ -70.38。


4-(1-溴-2,2-二氟丙基)-1,2-二氯苯(C38)



【0103】單離為無色液體(1.40 g, 65%): ^1H NMR (300 MHz, $\text{DMSO-}d_6$) δ 7.76 - 7.70 (m, 2H), 7.54 (dd, J = 8.4, 1.8 Hz, 1H), 5.81 - 5.73 (m, 1H), 1.67 (d, J = 18.9 Hz, 3H); IR(薄膜) 1118, 800, 499 cm^{-1} ; EIMS m/z 304


($[M]^+$)。

2-溴-4-(1-溴-2,2,2-三氟乙基)-1-氯苯(C39)




【0104】 單離為無色液體(10.5 g, 54%): ^1H NMR (400 MHz, CDCl_3) δ 7.76 (d, $J = 1.2$ Hz, 1H), 7.49 - 7.47 (m, 1H), 7.41 - 7.39 (m, 1H), 5.07 - 5.02 (m, 1H); IR(薄膜)3437, 2924, 1631, 1114 cm^{-1} ; EIMS m/z 350 ($[M]^+$)。

4-(1-溴-2,2,2-三氟乙基)-2-氯-1-氟苯(C40)



【0105】 單離為無色油(8.0 g, 73%): ^1H NMR (300 MHz, CDCl_3) δ 7.59 - 7.57 (m, 1H), 7.42 - 7.33 (m, 1H), 7.20 - 7.14 (m, 1H), 5.10 - 5.03 (m, 1H); IR(薄膜)3429, 2926, 1502, 750 cm^{-1} ; ESIMS m/z 292 ($[M+H]^+$)。


4-(1-溴-2,2,2-三氟乙基)-1-氯-2-氟苯(C41)



【0106】 單離為黃色油(1.1 g, 45%): ^1H NMR (400 MHz, CDCl_3) δ 7.44 (dd, $J = 8.3, 7.5$ Hz, 1H), 7.34 (dd, $J = 9.5, 1.9$ Hz, 1H), 7.26 - 7.22 (s, 1H), 5.08 (q, $J = 7.1$

Hz, 1H); EIMS m/z 291 ($[M]^+$)。


實施例9：5-(1-溴-2,2-二氟丁基)-1,2,3-三氯苯(C42)之製備



【0107】將三乙胺(2.46 mL, 17.6 mmol)及甲磺醯氯(1.10 mL, 14.1 mmol)添加至配於二氯甲烷(58.7 mL)之2,2-二氟-1-(3,4,5-三氯苯基)丁-1-醇(C44) (3.40 g, 11.7 mmol)之溶液內。反應混合物攪拌歷時1小時，然後添加戊烷。過濾接著於真空下濃縮濾液提供白色固體。使固體溶解於二氯甲烷(58.7 mL)內以及添加溴化鐵(III) (6.94 g, 23.5 mmol)至其內。使反應混合物攪拌過夜。將混合物傾注至水內，然後用二氯甲烷來萃取。有機物係用鹽水清洗，於硫酸鈉上乾燥、過濾以及濃縮。藉由使用己烷作為溶析液之急速管柱層析法予以純化提供如白色固體之標題化合物(3.52 g, 72%): ^1H NMR (400 MHz, CDCl_3) δ 7.51 (s, 2H), 4.85 (t, $J = 12.1$ Hz, 1H), 2.14 - 1.91 (m, 2H), 1.06 (t, $J = 7.5$ Hz, 3H); ^{13}C NMR (101 MHz, CDCl_3) δ 135.55, 134.39, 132.52, 129.48, 120.25 (t, $J = 249.0$ Hz), 49.76 (t, $J = 30.3$ Hz), 28.03 (t, $J = 25.2$ Hz), 6.06 (t, $J = 5.1$ Hz); ESIMS m/z 351 ($[M-H]^-$)。

實施例10：2,2-二氟-1-(3,4,5-三氯苯基)丙-1-醇(C43)之


製備



【0108】 於室溫下，使2,2-二氟-1-(3,4,5-三氯苯基)丙-1-酮(**C52**) (1.75 g, 6.40 mmol)溶解於甲醇(64.0 mL)之內，以及添加硼氫化鈉(0.290 g, 7.68 mmol)。反應係於室溫下攪拌歷時1小時，直到氣體散展為止。將反應混合物傾注至水內以及用二乙基醚來萃取。有機層係用鹽水清洗，於硫酸鈉上乾燥、過濾以及濃縮。藉由使用0-30%丙酮/己烷作為溶析液之急速管柱層析法予以純化，提供如澄清、無色油之標題化合物(1.60 g, 91%): $^1\text{H NMR}$ (400 MHz, CDCl_3) δ 7.50 (d, $J = 0.9$ Hz, 2H), 4.81 (td, $J = 8.7, 3.8$ Hz, 1H), 1.65 – 1.41 (m, 3H); $^{19}\text{F NMR}$ (376 MHz, CDCl_3) δ -98.54 – -101.73 (m); IR(薄膜)3405, 1555, 1389 cm^{-1} 。


下列化合物係以實施例10中概述之流程相似的方式予以製備：

2,2-二氟-1-(3,4,5-三氯苯基)丁-1-醇(C44)




【0109】單離為澄清及無色油(3.4 g, 48%): ^1H NMR (400 MHz, CDCl_3) δ 7.48 (d, $J = 0.9$ Hz, 2H), 4.87 - 4.70 (m, 1H), 2.54 (dt, $J = 4.0, 1.0$ Hz, 1H), 2.06 - 1.82 (m, 1H), 1.82 - 1.63 (m, 1H), 1.02 (t, $J = 7.5$ Hz, 3H); ^{13}C NMR (101 MHz, CDCl_3) δ 136.85, 134.20, 131.60, 127.54, 123.19 (t, $J = 248.0$ Hz), 73.71 (t, $J = 30.0$ Hz), 25.05 (t, $J = 24.6$ Hz), 5.35 (t, $J = 5.2$ Hz); EIMS m/z 287 ($[\text{M}]^+$)。

1-(3,4-二氯苯基)-2,2-二氟丙-1-醇(C45)



【0110】單離為澄清及無色油(2.78 g, 89%): ^1H NMR (400 MHz, CDCl_3) δ 7.57 (dd, $J = 2.0, 0.9$ Hz, 1H), 7.46 (d, $J = 8.3$ Hz, 1H), 7.33 - 7.27 (m, 1H), 4.83 (td, $J = 8.9, 3.7$ Hz, 1H), 2.55 (dt, $J = 3.8, 1.1$ Hz, 1H), 1.50 (t, $J = 18.9$ Hz, 3H); ^{19}F NMR (376 MHz, CDCl_3) δ -99.52 (d, $J = 249.6$ Hz), -101.09 (d, $J = 249.4$ Hz); IR(薄膜)3417 cm^{-1} 。

實施例11：1-(3-溴-4-氯苯基)-2,2,2-三氟乙醇(C46)之製備




【0111】於室溫下將三甲基(三氟甲基)矽烷(10.1 mL, 68.4 mmol)及四丁基氟化銨(1.44 g, 4.56 mmol)添加至配於四氫呋喃(150 mL)之3-溴-4-氯-苯甲醛(10.0 g, 45.6 mmol)之攪拌溶液內, 以及反應混合物攪拌歷時2小時。反應混合物係用二氯甲烷予以稀釋且用鹽酸(2 N)來清洗。分離的有機層係用鹽水來清洗, 於硫酸鈉上乾燥、過濾以及濃縮, 以提供如棕色液體之標題化合物, 其能未經進一步純化即使用(13.2 g, 94%):

$^1\text{H NMR}$ (300 MHz, CDCl_3) δ 7.76 (s, 1H), 7.50 - 7.48 (m, 1H), 7.38 - 7.35 (m, 1H), 5.03 - 4.97 (m, 1H), 2.95 (br s, 1H); IR(薄膜)3406, 2881, 1469, 814 cm^{-1} ; EIMS m/z 288 ($[\text{M}]^+$)。


下列化合物係以實施例11中概述之流程相似的方式予以製備:

1-(3,5-二溴-4-氯苯基)-2,2,2-三氟乙醇(C47)




【0112】單離為淡黃色液體(7.4 g, 85%): $^1\text{H NMR}$ (400 MHz, $\text{DMSO}-d_6$) δ 7.90 (s, 2H), 7.24 (d, $J = 5.2$ Hz, 1H), 5.33 (d, $J = 6.4$ Hz, 1H); IR(薄膜)3370, 1175, 735, 541 cm^{-1} ; EIMS m/z 366 ($[\text{M}]^+$)。

1-(4-氯-3,5-二甲基苯基)-2,2,2-三氟乙醇(C48)




【0113】單離為澄清液體(5.0 g, 70%): ^1H NMR (400 MHz, CDCl_3) δ 7.18 (s, 2H), 4.95 - 4.92 (m, 1H), 2.40 (s, 6H); IR(薄膜)3378, 1124, 833 cm^{-1} ; EIMS m/z 238 ($[\text{M}]^+$)。

1-(4-溴-3,5-二氯苯基)-2,2,2-三氟乙醇(C49)




【0114】單離為澄清油(33 g, 86%): ^1H NMR (400 MHz, CDCl_3) δ 7.51 (s, 2H), 5.01 - 4.96 (m, 1H), 4.14 - 4.09 (m, 1H); ^{19}F NMR (376 MHz, CDCl_3) δ -78.32。

1-(3-氯-4-氟苯基)-2,2,2-三氟乙醇(C50)




【0115】單離為澄清及棕色膠(7.0 g, 97%): ^1H NMR (300 MHz, CDCl_3) δ 7.58 - 7.55 (m, 1H), 7.38 - 7.33 (m, 1H), 7.20 - 7.15 (m, 1H), 5.03 - 4.97 (m, 1H); EIMS m/z 228 ($[\text{M}]^+$)。

1-(4-氯-3-氟苯基)-2,2,2-三氟乙醇(C51)



【0116】單離為澄清及無色油(1.97 g, 75%): ^1H NMR (400 MHz, CDCl_3) δ 7.52 - 7.37 (m, 1H), 7.32 (d, $J = 9.6$ Hz, 1H), 7.21 (d, $J = 8.3$ Hz, 1H), 5.03 (dd, $J = 6.3, 3.6$ Hz, 1H), 2.62 (d, $J = 4.0$ Hz, 1H); ^{13}C NMR (101 MHz, CDCl_3) δ 158.06 ($J_{\text{CF}} = 188.9$ Hz), 134.40 (d, $J_{\text{CF}} = 6.6$ Hz), 130.79, 123.83 (d, $J_{\text{CF}} = 3.5$ Hz), 122.4 (q, $J_{\text{CF}} = 188.9$ Hz), 115.8 (d, $J = 25.3$ Hz), 71.65 (q, $J_{\text{CF}} = 31.6$ Hz); EIMS m/z 228 ($[\text{M}]^+$)。

實施例12：2,2-二氟-1-(3,4,5-三氯苯基)丙-1-酮(C52)之製備




【0117】於氮氣下，在 -78°C 將正丁基鋰(3.50 mL, 8.76 mmol)添加至溶解於二乙基醚(39.8 mL)內之5-溴-1,2,3-三氯苯(2.28 g, 8.76 mmol)。使溶液攪拌30分鐘。於10分鐘內逐滴地添加2,2-二氟化丙酸乙酯(1.10 g, 7.96 mmol, 為配於甲苯之20% w/w溶液)至此，以及反應混合物攪拌額外的1小時。添加飽和的含水氯化銨溶液至混合

物，以及於反應燒瓶加溫至室溫時持續攪拌。反應混合物接而用二乙基醚來萃取，用水及鹽水清洗，於硫酸鈉上乾燥、過濾以及濃縮。藉由急速管柱層析法予以純化，提供如淡黃色油之標題化合物(1.76 g, 73%): ^1H NMR (400 MHz, CDCl_3) δ 8.11 (d, $J = 0.9$ Hz, 2H), 1.89 (t, $J = 19.6$ Hz, 3H); ^{19}F NMR (376 MHz, CDCl_3) δ -92.66; ESIMS m/z 271 ($[\text{M}-\text{H}]^-$)。


下列化合物係以實施例12中概述之流程相似的方式予以製備：

2,2-二氟-1-(3,4,5-三氯苯基)丁-1-酮(C53)



【0118】單離為油(2.3 g, 68%)且可不需純化或特徵化即使用。


1-(3,4-二氯苯基)-2,2-二氟丙-1-酮(C54)



【0119】單離為無色油(3.89 g, 71%): ^1H NMR (400 MHz, CDCl_3) δ 8.21 - 8.18 (m, 1H), 7.99 - 7.93 (m, 1H), 7.59 (dd, $J = 8.4, 4.2$ Hz, 1H), 1.89 (t, $J = 19.6$ Hz, 3H); ^{19}F NMR (376 MHz, CDCl_3) δ -92.08 - -93.21 (m);

EIMS m/z 238/240 ($[M]^+$)。


實施例13：(Z)-4-(1,4,4,4-四氟-3-(3,4,5-三氯苯基)丁-1-烯-1-基)-N-(2,2,2-三氟乙基)-2-(三氟甲基)苯甲醯胺(F1)之製備



【0120】將(Z)-4-(1,4,4,4-四氟-3-(3,4,5-三氯苯基)丁-1-烯-1-基)-2-(三氟甲基)苯甲酸(C2) (0.062 g, 0.13 mmol)、2,2,2-三氟乙胺(0.019 g, 0.19 mmol)、((1H-苯并[d][1,2,3]三唑-1-基)氧)三(吡咯啉-1-基)磷六氟磷酸酯(V) (0.098 g, 0.19 mmol)及二氯甲烷(2.5 mL)添加至一個25 mL小瓶，以提供橘色懸浮液。添加三乙胺(0.070 mL, 0.50 mmol)且使反應混合物於室溫下攪拌過夜。使反應濃縮，以及殘餘物係藉由急速管柱層析法予以純化，以提供如黃色油之標題化合物(0.024 g, 31%)。


下列化合物係以實施例13中概述之流程相似的方式予以製備：

(Z)-4-(1,4,4,4-四氟-3-(3,4,5-三氯苯基)丁-1-烯-1-基)-2-(三氟甲基)-N-(1,1,1-三氟丙-2-基)苯甲醯胺(F2)




【0121】單離為黃色油 (0.021 g, 22%)。

(Z)-N-環丙基-4-(1,4,4,4-四氟-3-(3,4,5-三氯苯基)丁-1-烯-1-基)-2-(三氟甲基)苯甲醯胺(F3)




【0122】單離為黃色油 (0.036 g, 49%)。

(Z)-N-(4,4-二氟環己基)-4-(1,4,4,4-四氟-3-(3,4,5-三氯苯基)丁-1-烯-1-基)-2-(三氟甲基)苯甲醯胺(F4)




【0123】單離為黃色油 (0.025 g, 54%)。

(Z)-(2-溴-4-(1,4,4,4-四氟-3-(3,4,5-三氯苯基)丁-1-烯-1-基)苯基)(吡咯啉-1-基)甲酮(F5)




【0124】單離為黃色油 (0.010 g, 11%)。


(Z)-吡咯啉-1-基(4-(1,4,4,4-四氟-3-(3,4,5-三氯苯基)丁

-1-烯-1-基)-2-(三氟甲基)苯基)甲酮(F6)

【0125】單離為黃色油 (0.013 g, 10%)。

(Z)-2-氯-N-(4,4-二氟環己基)-4-(1,4,4,4-四氟-3-(3,4,5-三氯苯基)丁-1-烯-1-基)苯甲醯胺(F9)


【0126】單離為白色膠(0.119 g, 90%)。

(Z)-2-溴-N-(4,4-二氟環己基)-4-(1,4,4,4-四氟-3-(3,4,5-三氯苯基)丁-1-烯-1-基)苯甲醯胺(F10)

【0127】單離為黃色膠(0.104 g, 80%)。


(Z)-N-((6-氯吡啶-3-基)甲基)-4-(1,4,4,4-四氟-3-(3,4,5-

三氯苯基)-丁-1-烯-1-基)-2-(三氟甲基)苯甲醯胺(F11)




【0128】單離為淡黃色固體(0.115 g, 45%)。

(Z)-N-環丙基-4-(3-(3,5-二氯苯基)-1,4,4,4-四氟丁-1-烯-1-基)-2-(三氟甲基)苯甲醯胺(F23)




【0129】單離為棕色固體 (0.110 g, 47%)。

(Z)-N-(6-氯吡啶-3-基)-4-(1,4,4,4-四氟-3-(3,4,5-三氯苯基)丁-1-烯-1-基)-2-(三氟甲基)苯甲醯胺(F26)




【0130】單離為淡黃色固體 (0.105 g, 37%)。

(Z)-2-甲基-4-(1,4,4,4-四氟-3-(3,4,5-三氯苯基)丁-1-烯-1-基)-N-(2,2,2-三氟乙基)苯甲醯胺(F39)




【0131】單離為黃色膠 (0.070 g, 70%)。

(Z)-4-(1,4,4,4-四氟-3-(3,4,5-三氯苯基)丁-1-烯-1-基)-N-(2,2,2-三氟乙基)苯甲醯胺(FC1)



【0132】單離為黃色膠 (0.045 g, 72%)。

實施例 14：(Z)-N-環丙基-4-(3-(3,5-二溴-4-氯苯基)-1,4,4,4-四氟丁-1-烯-1-基)-2-(三氟甲基)苯甲醯胺(F12)之製備




【0133】將二異丙基乙胺(0.22 mL, 1.03 mmol)、2-氯-1,3-二甲基咪唑六氟磷酸酯(2-Chloro-1,3-dimethylimidazolium hexafluorophosphate)(0.12 g, 0.43 mmol)、1-羥-7-偶氮苯并三唑(0.058 g, 0.43 mmol)及環丙胺(0.026 g, 0.47

mmol)添加至配於二氯甲烷(5.0 mL)之(*Z*)-4-(3-(3,5-二溴-4-氯苯基)-1,4,4,4-四氟丁-1-烯-1-基)-2-(三氟甲基)苯甲酸(**C5**) (0.25 g, 0.43 mmol)之攪拌溶液，以及使反應混合物於室溫下攪拌歷時6小時。將反應混合物傾注至水內，以及用二氯甲烷來萃取。分離的有機層係用水、鹽水清洗，於硫酸鈉上乾燥、過濾以及濃縮。粗產物係藉由使用30%乙酸乙酯/石油醚作為溶析液之急速管柱層析法予以純化，提供如黃色膠之標題化合物(0.11 g, 36%)。


下列化合物係以實施例14中概述之流程相似的方式予以製備：

4-((*Z*)-3-(3,5-二氯苯基)-1,4,4,4-四氟丁-1-烯-1-基)-2-(三氟甲基)-*N*-(1,1,1-三氟丙-2-基)苯甲醯胺(**F15**)




【0134】單離為黃色膠 (0.170 g, 77%)。

4-((*Z*)-3-(3,4-二氯苯基)-1,4,4,4-四氟丁-1-烯-1-基)-2-(三氟甲基)-*N*-((*R*)-1,1,1-三氟丙-2-基)苯甲醯胺(**F16**)




【0135】單離為黃色膠 (0.130 g, 58%)。

(Z)-4-(3-(4-溴-3,5-二氯苯基)-1,4,4,4-四氟丁-1-烯-1-基)-N-(4,4-二氟環己基)-2-(三氟甲基)苯甲醯胺(F21)




【0136】單離為淡黃色固體 (0.110 g, 45%)。

(Z)-4-(3-(4-溴-3,5-二氯苯基)-1,4,4,4-四氟丁-1-烯-1-基)-N-環丙基-2-(三氟甲基)苯甲醯胺(F22)




【0137】單離為黃色黏性固體(0.125 g, 64%)。

(Z)-4-(3-(3,4-二氯苯基)-1,4,4,4-四氟丁-1-烯-1-基)-N-(4,4-二氟環己基)-2-(三氟甲基)苯甲醯胺(F24)




【0138】單離為淺黃色膠(0.164 g, 61%)。

(Z)-4-(3-(3,5-二氯苯基)-1,4,4,4-四氟丁-1-烯-1-基)-N-(4,4-二氟環己基)-2-(三氟甲基)苯甲醯胺(F25)




【0139】單離為棕色膠(0.170 g, 63%)。

(Z)-4-(3-(3,5-二氯-4-氟苯基)-1,4,4,4-四氟丁-1-烯-1-基)-2-(三氟甲基)-N-(1,1,1-三氟丙-2-基)苯甲醯胺(F27)




【0140】單離為黃色膠 (0.125 g, 49%)。

(Z)-4-(3-(3,5-二溴苯基)-1,4,4,4-四氟丁-1-烯-1-基)-2-(三氟甲基)-N-(1,1,1-三氟丙-2-基)苯甲醯胺(F28)




【0141】單離為黃色膠 (0.140 g, 62%)。

4-((Z)-3-(4-氯-3,5-二甲基苯基)-1,4,4,4-四氟丁-1-烯-1-基)-2-(三氟甲基)-N-(1,1,1-三氟丙-2-基)苯甲醯胺(F30)




【0142】單離為黃色膠 (0.150 g, 55%)。

(Z)-4-(3-(4-氯-3,5-二甲基苯基)-1,4,4,4-四氟丁-1-烯-1-基)-N-(4,4-二氟環己基)-2-(三氟甲基)苯甲醯胺(F31)




【0143】單離為黃色膠 (0.110 g, 38%)。

(Z)-4-(3-(3,5-二溴-4-氯苯基)-1,4,4,4-四氟丁-1-烯-1-基)-N-(4,4-二氟環己基)-2-(三氟甲基)苯甲醯胺(F32)




【0144】單離為棕色膠 (0.110 g, 33%)。

(Z)-N-環丙基-4-(3-(3,4-二氯苯基)-1,4,4,4-四氟丁-1-烯-1-基)-2-(三氟甲基)苯甲醯胺(F35)




【0145】單離為黃色膠(0.080 g, 34%)。

4-((Z)-3-(3,5-二溴-4-氯苯基)-1,4,4,4-四氟丁-1-烯-1-基)-2-(三氟甲基)-N-(1,1,1-三氟丙-2-基)苯甲醯胺(F36)




【0146】單離為棕色黏性固體(0.080 g, 28%)。

(Z)-4-(3-(4-氯-3,5-二甲基苯基)-1,4,4,4-四氟丁-1-烯-1-基)-N-環丙基-2-(三氟甲基)苯甲醯胺(F37)




【0147】單離為黃色膠(0.110 g, 46%)。

4-((Z)-3-(4-溴-3,5-二氯苯基)-1,4,4,4-四氟丁-1-烯-1-基)-2-(三氟甲基)-N-(1,1,1-三氟丙-2-基)苯甲醯胺(F38)




【0148】單離為黃色膠(0.075 g, 26%)。

(Z)-4-(3-(3,5-二溴苯基)-1,4,4,4-四氟丁-1-烯-1-基)-N-(4,4-二氟環己基)-2-(三氟甲基)苯甲醯胺(F40)




【0149】單離為棕色膠(0.155 g, 61%)。

(Z)-4-(3-(3,5-二氯-4-氟苯基)-1,4,4,4-四氟丁-1-烯-1-基)-N-(4,4-二氟環己基)-2-(三氟甲基)苯甲醯胺(F41)




【0150】單離為棕色膠(0.128 g, 53%)。

(Z)-N-環丙基-4-(3-(3,5-二溴苯基)-1,4,4,4-四氟丁-1-烯-1-基)-2-(三氟甲基)苯甲醯胺(F42)




【0151】單離為黃色膠(0.115 g, 53%)。

(Z)-N-環丙基-4-(3-(3,5-二氯-4-氟苯基)-1,4,4,4-四氟丁-1-烯-1-基)-2-(三氟甲基)苯甲醯胺(F43)




【0152】單離為黃色膠(0.125 g, 53%)。

(Z)-4-(3-(3,4-二溴苯基)-1,4,4,4-四氟丁-1-烯-1-基)-N-(4,4-二氟環己基)-2-(三氟甲基)苯甲醯胺(F44)




【0153】單離為黃色膠(0.115 g, 49%)。

4-((Z)-3-(3,4-二溴苯基)-1,4,4,4-四氟丁-1-烯-1-基)-2-(三氟甲基)-N-(1,1,1-三氟丙-2-基)苯甲醯胺(F45)




【0154】單離為黃色膠(0.110 g, 48%)。

(Z)-N-環丙基-4-(3-(3,4-二溴苯基)-1,4,4,4-四氟丁-1-烯-1-基)-2-(三氟甲基)苯甲醯胺(F46)



【0155】單離為黃色膠(0.120 g, 53%)。

實施例 15：(Z)-N-(3,3-二氟環丁基)-4-(1,4,4,4-四氟-3-(3,4,5-三氯苯基)丁-1-烯-1-基)-2-(三氟甲基)苯甲醯胺(F7)之製備




【0156】(Z)-4-(1,4,4,4-四氟-3-(3,4,5-三氯苯基)丁-1-烯-1-基)-2-(三氟甲基)苯甲酸(C2)(0.100 g, 0.202 mmol)、亞硫醯氯(0.0240 g, 0.202 mmol)及1,2-二氯乙烷(5 mL)係以回流攪拌歷時1.5小時。使反應混合物濃縮，以及殘餘物係用二氯甲烷化去，以及逐滴地添加至3,3-二

氟環丁胺鹽酸鹽(0.0304 g, 0.212 mmol)、三乙胺(0.0429 g, 0.424 mmol)及二氯甲烷(10 mL)之冷溶液內。使反應於室溫下攪拌過夜。反應混合物係用二氯甲烷予以稀釋且用鹽酸(1 N)來清洗。使層分離，以及有機層係用含水碳酸氫鈉、鹽水清洗，於硫酸鎂上乾燥、過濾以及濃縮，以提供如淺黃色泡沫之標題化合物(0.096 g, 81%)。


下列化合物係以實施例15中概述之流程相似的方式予以製備：

4-((Z)-1,4,4,4-四氟-3-(3,4,5-三氯苯基)丁-1-烯-1-基)-N-((R)-1-(對甲苯基)乙基)-2-(三氟甲基)苯甲醯胺 (F8)



【0157】 單離為黃色油(0.065 g, 66%)。


(Z)-N-(3,3-二氟環己基)-4-((Z)-1,4,4,4-四氟-3-(3,4,5-三氯苯基)丁-1-烯-1-基)-2-(三氟甲基)苯甲醯胺(F13)



【0158】 單離為棕色油(0.072 g, 58%)。


N-((R)-1-(3-甲氧基苯基)乙基)-4-((Z)-1,4,4,4-四氟

-3-(3,4,5-三氯苯基)丁-1-烯-1-基)-2-(三氟甲基)苯甲醯胺(F14)




【0159】單離為棕色泡沫(0.108 g, 85%)。

(Z)-4-(1,4,4,4-四氟-3-(3,4,5-三氯苯基)丁-1-烯-1-基)-2-(三氟甲基)苯甲醯胺(F17)




【0160】單離為棕色油(0.390 g, 98%)。

(Z)-N-甲基-4-(1,4,4,4-四氟-3-(3,4,5-三氯苯基)丁-1-烯-1-基)-N-(2,2,2-三氟乙基)-2-(三氟甲基)苯甲醯胺(F29)




【0161】單離為棕色泡沫/玻璃(0.180 g, 66%)。

實施例16：(E)-N-((二甲基胺基)亞甲基)-4-((Z)-1,4,4,4-四氟-3-(3,4,5-三氯苯基)丁-1-烯-1-基)-2-(三氟甲基)苯甲醯胺(F18)之製備



【0162】將(*Z*)-4-(1,4,4,4-四氟-3-(3,4,5-三氯苯基)丁-1-烯-1-基)-2-(三氟甲基)苯甲醯胺(**F17**)(0.384 g, 0.776 mmol)、*N,N*-二甲基甲醯胺二甲縮醛(0.208 mL, 1.55 mmol)及甲苯(15 mL)添加至一個25 mL圓底燒瓶。反應混合物溶液係於110°C下攪拌歷時1小時。使反應濃縮以提供深色殘餘物。藉由使用30-50%乙酸乙酯/己烷之急速管柱層析法予以純化，提供如濃稠的棕色油之標題化合物(0.330 g, 77%)。

實施例 17： *N*-((*E/Z*)-(甲氧基亞胺基)甲基)-4-((*Z*)-1,4,4,4-四氟-3-(3,4,5-三氯苯基)丁-1-烯-1-基)-2-(三氟甲基)苯甲醯胺(**F19**)之製備




【0163】將配於水(0.8 mL)之氫氧化鈉(0.0387 g, 0.968 mmol)溶液添加至 *O*-甲基脛基胺鹽酸鹽(0.0425 g, 0.509 mmol)、水(0.8 mL)及乙酸(1.6 mL)之溶液，接著逐滴添加配於四氫呋喃(1.0 mL)之(*E*)-*N*-((二甲基胺基)亞甲基)-4-((*Z*)-1,4,4,4-四氟-3-(3,4,5-三氯苯基)丁

-1-烯-1-基)-2-(三氟甲基)苯甲醯胺(**F18**) (0.140 g, 0.255 mmol)溶液。反應係於室溫下攪拌15分鐘。反應混合物係用二乙基醚來稀釋，以及小心地添加至碳酸氫鈉水溶液。使層分離，以及用二乙基醚來萃取水層。合併的二乙基醚層係用鹽水清洗，於硫酸鎂上乾燥、過濾以及濃縮。藉由使用30%二乙基醚/己烷之急速管柱層析法予以純化，以提供如淺黃色泡沫之標題化合物(0.106 g, 75%)。


下列化合物係以實施例17中概述之流程相似的方式予以製備：

(Z)-N-甲醯基-4-(1,4,4,4-四氟-3-(3,4,5-三氯苯基)丁-1-烯-1-基)-2-(三氟甲基)苯甲醯胺(**F20**)



【0164】使用3,3,3-三氟丙-1-胺及含水碳酸氫鈉，單離為米黃色泡沫(0.128 g, 84%)。


實施例18：(Z)-4-(1,4,4,4-四氟-3-(3,4,5-三氯苯基)丁-1-烯-1-基)-N-(2,2,2-三氟乙基)-2-(三氟甲基)硫代苯甲醯胺(**F33**)之製備



【0165】將(*Z*)-4-(1,4,4,4-四氟-3-(3,4,5-三氯苯基)丁-1-烯-1-基)-*N*-(2,2,2-三氟乙基)-2-(三氟甲基)苯甲醯胺(**F1**) (0.084 g, 0.15 mmol)、2,4-雙(4-甲氧基苯基)-1,3,2,4-二硫二磷雜環丁烷 2,4-二硫化物(2,4-bis(4-methoxyphenyl)-1,3,2,4-dithiadiphosphetane 2,4-disulfide) (0.15 g, 0.38 mmol)及1,2-二氯乙烷(3 mL)封在一5 mL小瓶中，以及於具有外部IR-感測器監測小瓶側的溫度之Biotage Initiator®微波反應器中，以130 °C加熱4小時。用二氯甲烷及飽和的含水碳酸氫鈉來稀釋原料。使有機層分離，以及用飽和的含水碳酸氫鈉(3x)來清洗，於硫酸鈉上乾燥，以及過濾。獲得的粗製殘餘物係藉由使用0-100%乙酸乙酯/己烷之急速管柱層析法予以純化，提供如黃色膜之標題化合物(0.057 g, 59%)。

下列化合物係以實施例18中概述之流程相似的方式予以製備：

(*Z*)-*N*-甲基-4-(1,4,4,4-四氟-3-(3,4,5-三氯苯基)丁-1-烯-1-基)-*N*-(2,2,2-三氟乙基)-2-(三氟甲基)硫代苯甲醯胺(**F34**)












【0166】單離為黃色泡沫/玻璃(0.100 g, 74%)。






【0167】下列表1內的化合物可以依據揭示的流程予






以製備：P1、P2、P3、P4、P5、P6、P7、P8、P9、P10、
 P11、P12、P13、P14、P15、P16、P17、P18、P19、
 P20、P21、P22、P23、P24、P25、P26、P27、P28及
 P29。


表1. 預言性的分子之結構和製備方法

編號	結構
P1	
P2	
P3	
P4	

P5	
P6	
P7	
P8	
P9	

P10	
P11	
P12	
P13	
P14	


P15	
P16	
P17	
P18	
P19	



P26	
P27	
P28	
P29	

下列化合物係以實施例1中概述之流程相似的方式予以製備：


(Z)-4-(1,4,4,4-四氟-3-(3,4,5-三氯苯基)丁-1-烯-1-基)-1-萘甲酸(C55)



【0168】單離為黃色固體(0.85 g, 53%): ^1H NMR (300 MHz, CDCl_3) δ 8.30 (d, $J = 7.5$ Hz, 1H), 8.07 - 8.05 (m, 1H), 7.70 - 7.61 (m, 4H), 7.49 (s, 2H), 5.69 (dd, $J = 9.9, 31.2$ Hz, 1H), 4.75 - 4.69 (m, 1H); IR(薄膜)3445, 1684, 1260, 750 cm^{-1} ; ESIMS m/z 475.23 ($[\text{M}]^-$)。


下列化合物係以實施例7中概述之流程相似的方式予以製備：

4-(1-氟乙基)-1-萘甲酸(C56)



【0169】單離為灰白色固體(0.70 g, 52%): mp 154 - 156 $^{\circ}\text{C}$; ^1H NMR (400 MHz, $\text{DMSO}-d_6$) δ 13.40 (br s, 1H), 8.88 - 8.84 (m, 1H), 8.17 - 8.10 (m, 2H), 7.75 - 7.66 (m, 3H), 5.39 (dd, $J = 3.6, 17.2$ Hz, 1H), 5.23 (dd, $J = 36.0, 50.4$ Hz, 1H); ESIMS m/z 215.20 ($[\text{M}-\text{H}]^-$)。

實施例19：4-乙基-1-萘甲酸(C57)之製備




【0170】將乙基三氟硼酸鉀(1.33 g, 9.96 mmol)、碳酸鉀(3.85 g, 27.9 mmol)及[1,1'-雙(二苯基膦基)二茂

鐵]二氯化鈮(II)(0.364 g, 0.498 mmol)添加至配於二甲基亞砜(32.3 mL)之4-溴-1-萘甲酸(2.50 g, 9.98 mmol)之攪拌溶液內。反應混合物係以80°C浴加熱歷時18小時。使反應混合物冷卻至周圍溫度，且用1 N含水鹽酸溶液(150 mL)及水(150 mL)予以稀釋。混合物係用乙酸乙酯來萃取。有機層係用鹽水清洗，於硫酸鈉上乾燥以及於減壓下濃縮以提供粗製化合物。粗製化合物係藉由管柱層析法(SiO₂，以配於己烷之0-100%乙酸乙酯予以溶析)來純化，以提供如亮黃色固體之標題化合物(1.36 g, 62%): mp 147 – 155 °C; ¹H NMR (300 MHz, acetone-*d*₆) δ 11.42 (s, 1H), 9.16 – 9.03 (m, 1H), 8.31 – 8.25 (m, 2H), 7.77 (dd, *J* = 7.7, 0.7 Hz, 1H), 7.70 – 7.57 (m, 3H), 5.95 (dd, *J* = 17.2, 1.5 Hz, 1H), 5.62 (dd, *J* = 11.1, 1.5 Hz, 1H); ESIMS *m/z* 197.1 ([M-H]⁻)。

下列化合物係以實施例13中概述之流程相似的方式予以製備：


(Z)-4-(1,4,4,4-四氟-3-(3,4,5-三氯苯基)丁-1-烯-1-基)-N-(2,2,2-三氟乙基)-1-萘甲醯胺(PF1)



【0171】 單離為棕色膠(0.115 g, 53%)。


(Z)-N-(1-氰基環丙基)-4-(1,4,4,4-四氟-3-(3,4,5-三氯苯

基)丁-1-烯-1-基)-2-(三氟甲基)苯甲醯胺(F62)



【0172】單離為黃色油(0.061 g, 51%)。


4-((Z)-1,4,4,4-四氟-3-(3,4,5-三氯苯基)丁-1-烯-1-基)-N-((R)-1-((2,2,2-三氟乙基)胺基)丙-2-基)-2-(三氟甲基)苯甲醯胺(F61)



【0173】單離為黃色油(0.022 g, 83%)。

下列化合物係以實施例14中概述之流程相似的方式予以製備：

(Z)-4-(1,4,4,4-四氟-3-(3,4,5-三氯苯基)丁-1-烯-1-基)-N-(硫環丁-3-基)-2-(三氟甲基)苯甲醯胺(PF2)




【0174】單離為淺棕色固體(0.250 g, 73%)。

下列化合物係以實施例15中概述之流程相似的方式予


以製備：

(Z)-N-((2-氯吡啶-4-基)甲基)-4-(1,4,4,4-四氟-3-(3,4,5-三氯苯基)丁-1-烯-1-基)-2-(三氟甲基)苯甲醯胺(F47)




【0175】單離為白色玻璃(0.036 g, 26%)。

(Z)-N-(吡啶-2-基甲基)-4-(1,4,4,4-四氟-3-(3,4,5-三氯苯基)丁-1-烯-1-基)-2-(三氟甲基)苯甲醯胺(F51)




【0176】單離為棕色油(0.158 g, 78%)。

(Z)-N-(1-(吡啶-2-基)乙基)-4-(1,4,4,4-四氟-3-(3,4,5-三氯苯基)丁-1-烯-1-基)-2-(三氟甲基)苯甲醯胺(F52)




【0177】單離為棕色油(0.163 g, 81%)。

(Z)-4-(3-(3-氯-4-氟苯基)-1,4,4,4-四氟丁-1-烯-1-基)-N-(3,3-二氟環丁基)-2-(三氟甲基)苯甲醯胺(F63)



【0178】單離為黃色殘餘物(0.051 g, 29%)。


實施例20：*(Z)*-*N*-(1-氧化硫環丁-3-基)-4-(1,4,4,4-四氟-3-(3,4,5-三氯苯基)丁-1-烯-1-基)-2-(三氟甲基)苯甲醯胺
((Z)-N-(1-Oxidothietan-3-yl)-4-(1,4,4,4-tetrafluoro-3-(3,4,5-trichlorophenyl)but-1-en-1-yl)-2-(trifluoromethyl)benzamide)(PF3)之製備



【0179】將3-氯過氧苯甲酸(0.050 g, 0.29 mmol)添加至經冰浴冷卻、配於二氯甲烷(5.0 mL)之*(Z)*-4-(1,4,4,4-四氟-3-(3,4,5-三氯苯基)丁-1-烯-1-基)-*N*-(硫環丁-3-基)-2-(三氟甲基)苯甲醯胺(**PF2**)(0.100 g, 0.18 mmol)之攪拌溶液。使反應混合物攪拌30分鐘，繼而於減壓下濃縮以提供粗製化合物。藉由管柱層析法予以純化(SiO_2 , 100-200篩孔，以配於己烷之20%乙酸乙酯予以溶析)，提供如灰白色固體之標題化合物(0.040 g, 33%)。


實施例21：*(Z)*-*N*-(1,1-二氧化硫環丁-3-基)-4-(1,4,4,4-

四氟-3-(3,4,5-三氯苯基)丁-1-烯-1-基)-2-(三氟甲基)苯甲醯胺 ((*Z*)-*N*-(1,1-Dioxidothietan-3-yl)-4-(1,4,4,4-tetrafluoro-3-(3,4,5-trichlorophenyl)but-1-en-1-yl)-2-(trifluoromethyl)benzamide) (PF4)之製備



【0180】將3-氯過氧苯甲酸(0.110 g, 0.64 mmol)添加至經冰浴冷卻、配於二氯甲烷(5.0 mL)之(*Z*)-4-(1,4,4,4-四氟-3-(3,4,5-三氯苯基)丁-1-烯-1-基)-*N*-(硫環丁-3-基)-2-(三氟甲基)苯甲醯胺(PF2)(0.180 g, 0.32 mmol)之攪拌溶液。允許反應混合物加溫至室溫以及攪拌歷時1小時。使反應混合物於減壓下濃縮以提供粗製化合物。藉由管柱層析法予以純化(SiO_2 , 100-200篩孔, 以配於己烷之20%乙酸乙酯予以溶析), 提供如灰白色固體之標題化合物(0.116 g, 61%)。

實施例25：*(R)*-*N*¹-(2,2,2-三氟乙基)丙-1,2-二胺鹽酸鹽(C58)之製備



【0181】將配於四氫呋喃之硼烷(1.0 M, 5.3 mL, 4.3 mmol)添加至配於四氫呋喃(1.7 mL)之(*R*)-2-胺基-*N*-(2,2,2-三氟乙基)丙醯胺(0.3 g, 1.763 mmol)之溶液。

反應混合物係於70°C下攪拌歷時15小時，然後移除溶劑以提供白色蠟。使蠟溶解於二氯甲烷(10 mL)內，其內添加配於二噁烷之氯化氫(4.0 M, 2.0 mL, 8.0 mmol)。藉由過濾予以純化且用己烷來清洗，提供如白色固體之標題化合物(0.28 g, 82%): ^1H NMR (400 MHz, 甲醇- d_4) δ 4.91 (s, 3H), 4.00 (q, $J = 9.1$ Hz, 2H), 3.72 (q, $J = 6.6$ Hz, 1H), 3.62 - 3.51 (m, 1H), 3.42 - 3.33 (m, 2H), 1.50 - 1.30 (m, 3H); ^{19}F NMR (376 MHz, 甲醇- d_4) δ -70.07; ESIMS m/z 156 ($[\text{M}-\text{HCl}]^-$)。

生物分析法

【0182】 因為甜菜夜蛾(Beet Armyworm) (甜菜夜蛾 (*Spodoptera exigua*)、甘藍銀紋夜蛾(Cabbage Looper) (粉紋夜蛾(*Trichoplusia ni*)、玉米穗蟲(Corn Earworm) (棉鈴實夜蛾(*Helicoverpa zea*)、碧桃蚜蟲(Green Peach Aphid)(桃蚜(*Myzus persicae*))，以及黃熱病蚊(埃及斑蚊 (*Aedes aegypti*))會造成損失，所以本文內含括下列對於其等的生物分析。再者，甜菜夜蛾、玉米穗蟲及甘藍銀紋夜蛾為範大廣泛的嚼食性害蟲之三種良好的指標性物種。此外，碧桃蚜蟲為範大廣泛的取食汁液害蟲之良好的指標性物種。此等四種指標性物種和黃熱病蚊一起的結果顯示出，式1的分子於控制節肢動物門、軟體動物門，及圓形動物門的害蟲方面之廣泛用途(關於進一步資訊，參見 **Methods for the Design and Optimization of New Active Ingredients, Modern Methods in Crop**

Protection Research, 由 Jeschke, P., Kramer, W., Schirmer, U., and Matthias W. 編輯, p. 1-20, 2012)。

實施例A：對甜菜夜蛾(**BEET ARMYWORM**) (甜菜夜蛾 (*Spodoptera exigua*), **LAPHEG**) (“**BAW**”)、玉米穗蟲 (**CORN EARWORM**) (棉鈴實夜蛾(*Helicoverpa zea*, **HELIZE**)(“**CEW**”) 與甘藍銀紋夜蛾 (**CABBAGE LOOPER**) (粉紋夜蛾 (*Trichoplusia ni*), **TRIPNI**) (“**CL**”)之生物分析

【0183】甜菜夜蛾對於紫花苜蓿、蘆筍、甜菜 (beets)、柑橘、玉米、棉花、洋蔥、豌豆、胡椒、馬鈴薯、大豆、甜菜(sugar beets)、向日葵、菸草、番茄以及其他作物而言，為經濟上嚴重關切的害蟲。其原產於東南亞但是現在於非洲、澳洲、日本、北美及南歐可找到。幼蟲可大規模取食，造成破壞性極大的作物損失。已知其對數種某些殺蟲劑有抗藥性。

【0184】甘藍銀紋夜蛾為全世界都可發現的嚴重害蟲。它會攻擊紫花苜蓿、豆類、甜菜(beets)、青花菜、甘藍、高麗菜、哈密瓜、花椰菜、芹菜、羽衣甘藍(collards)、棉花、黃瓜、茄子、甘藍(kale)、萵苣、甜瓜、芥菜、洋芹、豌豆、胡椒、馬鈴薯、大豆、菠菜、南瓜、番茄、蕪菁(turnip)及西瓜，以及其他作物。此物種貪婪的胃口，所以對於植物非常具破壞性。幼蟲每日會吃掉它們體重三倍的食物。取食處會明顯出現大量黏稠、濕潤之糞便。已知其對數種某些殺蟲劑有抗藥性。

【0185】玉米穗蟲被一些人認為是北美最昂貴的農作物害蟲。其常常攻擊有價值的作物，及作物收穫的部分。此害蟲會損害紫花苜蓿、洋薊、蘆筍、高麗菜、哈密瓜、羽衣甘藍(collards)、玉米、棉花、豇豆、黃瓜、茄子、萵苣、利馬豆(lima bean)、甜瓜、秋葵、豌豆、胡椒、馬鈴薯、南瓜(pumpkin)、四季豆、大豆、菠菜、南瓜(squash)、甘蔗、甘薯、番茄及西瓜，以及其他作物。再者，亦知道此害蟲對某些殺蟲劑有抗藥性。

【0186】因此，基於上述因素，此等害蟲之控制係重要的。而且，控制此等已知為嚼食性害蟲之害蟲(BAW、CEW及CL)之分子，可用於控制其他嚼食植物之害蟲。

【0187】本文件中揭示之某些分子係使用下列實施例中所述之程序，來測試其對抗BAW、CEW與CL之能力。有關結果之報導，使用“**BAW、CEW & CL**分級表”(參見表格部分)。

對**BAW**進行之生物分析

【0188】對BAW之生物分析係使用128孔之食物盤分析進行。將一至五隻第二齡期之BAW幼蟲置於食物盤之每一孔(3毫升)，此食物盤已事先填充1毫升之人工食物，已施加 $50 \mu\text{g}/\text{cm}^2$ 之測試分子(溶於 $50 \mu\text{L}$ 之90:10丙酮-水之混合物)(至八個孔之每一者)，之後讓其乾燥。盤係以一透明自黏性覆蓋物覆蓋，且於 25°C ，14:10亮-暗下保持五至七天。記錄每一孔之幼蟲死亡率百分比；接著將八個孔中之活性求平均值。結果在標題為「表**ABC**：生物分

析結果」(參見表格部分)之表中示出。

對CL進行之生物分析

【0189】對CL之生物分析係使用128孔之食物盤分析進行。將一至五隻第二齡期之CL幼蟲置於食物盤之每一孔(3毫升)，此食物盤已事先填充1毫升之人工食物，已施加 $50 \mu\text{g}/\text{cm}^2$ 之測試分子(溶於 $50 \mu\text{L}$ 之90：10丙酮-水之混合物)(至八個孔之每一者)，之後讓其乾燥。盤係以一透明自黏性覆蓋物覆蓋，且於 25°C ，14：10亮-暗下保持五至七天。記錄每一孔之幼蟲死亡率百分比；接著將八個孔中之活性求平均值。結果在標題為「表ABC：生物分析結果」(參見表格部分)之表中示出。

實施例B：對碧桃蚜蟲(**GREEN PEACH APHID**)(桃蚜(*Myzus persicae*), **MYZUPE**) (“**GPA**”)進行之生物分析.

【0190】GPA為桃樹最重要之蚜蟲害蟲，其導致生長減少、葉子枯萎及各種組織死亡。其亦因為作用為輸送植物病毒的載體而為有害，諸如將馬鈴薯病毒Y與馬鈴薯捲葉病毒(potato leafroll virus)輸送至顛茄/馬鈴薯科即茄科(nightshade/potato family *Solanaceae*)的成員，及將各種嵌紋病毒輸送至其他糧食作物。GPA侵襲諸如以下之植物：青花菜、牛蒡、甘藍、胡蘿蔔、花椰菜、蘿蔔(daikon)、茄子、青豆、萵苣、澳洲胡桃(macadamia)、木瓜、胡椒、甘薯、番茄、水芥(watercress)及西葫蘆(zucchini)以及其他作物。GPA亦侵襲多種觀賞性作物，諸如康乃馨、菊花、白花甘藍(flowering white cabbage)、一品紅及玫瑰。GPA

已對多種殺蟲劑產生抗藥性。因此，基於上述因素，此害蟲之控制係重要的。而且，控制此已知為取食汁液害蟲之害蟲(GPA)之分子，可用於控制其他取食植物汁液之害蟲。

【0191】本文件中揭示之某些分子係使用下列實施例中所述之程序，來測試其對抗GPA之能力。有關結果之報導，使用“GPA & YFM分級表”(參見表格部分)。

【0192】將在3英吋盆中生長之具有2-3片小(3-5cm)真葉之甘藍幼苗用作測試基材。在化學品施用前一天，用20-50隻GPA(無翅成蟲及若蟲階段)侵害該等幼苗。針對各次處理使用四個具有個別幼苗之盆。將測試分子(2mg)溶解於2mL丙酮/甲醇(1：1)溶劑中，形成1000 ppm測試分子之儲備溶液。將儲備溶液用含0.025%妥文(Tween 20)之水稀釋5x，得到200ppm測試分子之溶液。用手持抽吸型噴霧器將溶液噴至甘藍葉子之兩面直至徑流。用僅含有20體積%丙酮/甲醇(1：1)溶劑之稀釋劑對參考植物(溶劑檢查)進行噴霧。評級前，經處理之植物在約25 °C及環境相對濕度(RH)之貯存室中置放三天。藉由在顯微鏡下計數每株植物上活蚜蟲之數目來進行評估。藉由使用如下所示之阿博特氏(Abbott's)校正公式(W.S. Abbott, “A Method of Computing the Effectiveness of an Insecticide” J. Econ. Entomol. 18 (1925), 第265-267頁)來量測控制百分比。

$$\text{經校正之控制}\% = 100 * (X - Y) / X$$

其中

X=溶劑檢查植物上之活蚜蟲數目，及

Y=經處理植物上之活蚜蟲數目

【0193】結果在標題為「表**ABC**：生物分析結果」(參見表格部分)之表中示出。

實施例C：對黃熱病蚊(埃及斑蚊(*Aedes aegypti*，**AEDSAE**)(“**YFM**”)))進行之生物分析。

【0194】**YFM**喜歡在白天叮咬人類，且最常在人類居住處或附近被發現。**YFM**為傳播數種疾病之媒介。**YFM**為一種可傳播登革熱與黃熱病毒之蚊子。黃熱病是第二危險之蚊子傳播疾病，僅次於瘧疾。黃熱病為急性病毒出血性疾病，且未接受治療之嚴重病患至多有高達50%會死於黃熱病。預計每年全球會有200,000個黃熱病病例，導致30,000人死亡。登革熱是一種討厭的病毒性疾病；由於其會產生劇烈疼痛，所以有時稱為“關節痛熱”或“心臟痛熱”。登革熱每年造成約20,000人死亡。因此，基於上述因素，此害蟲之控制係重要的。而且，控制此已知為吸食性害蟲之害蟲(**YFM**)之分子，可用於控制造成人類與動物患病的其他的害蟲。

【0195】本文件中揭示之某些分子係使用下列實施例中所述之程序，來測試其對抗**YFM**之能力。有關結果之報導，使用“**GPA & YFM**分級表”(參見表格部分)。

【0196】使用含有400 μg 分子，其溶於100 μL 二甲基亞砷(**DMSO**)中(相當於4000 ppm溶液)之主盤。組合的分子之主盤每孔含有15 μL 。在此盤中，每孔加入135 μL 之

90:10水/丙酮混合物。機器人(Biomek® NXP Laboratory Automation Workstation)設定程式由主盤中分配15 μL 吸取液至空的96-孔淺盤中(“子”盤)。每主盤產生6 reps(“子”盤)。產生之“子”盤之後立即經YFM幼蟲感染。

【0197】在該盤處理前一日，將蚊子卵置於含有肝粉末之Millipore水中以開始孵化(4 g.至400 mL中)。在使用機器人製備“子”盤後，以220 μL 肝粉末/蚊幼蟲混合物(約1天大的幼蟲)感染子盤。該盤經蚊幼蟲感染後，使用非揮發性的上蓋覆蓋該盤，以降低乾燥情況。盤於室溫下維持3天，之後予以分級。3天後，觀察每一孔並依據死亡率評分。結果在標題為「表ABC：生物分析結果」(參見表格部分)之表中示出。

農業上可接受的酸加成鹽類、鹽類衍生物、溶劑合物、酯類衍生物、多形體、同位素與放射性核種

【0198】式1分子可以調配成農業上可接受的酸加成鹽類。作為非限制性例子，胺官能基可與氫氯酸、氫溴酸、硫酸、磷酸、乙酸、苯甲酸、檸檬酸、丙二酸、水楊酸、蘋果酸、福馬酸、草酸、琥珀酸、酒石酸、乳酸、葡萄糖酸、抗壞血酸、馬來酸、天冬門酸、苯磺酸、甲磺酸、乙磺酸、羥甲磺酸，及羥乙磺酸形成鹽類。另外，作為非限制性例子，酸官能基可形成鹽類，包括自鹼金屬或鹼土金屬衍生及自氨及胺衍生者。陽離子之較佳例子可包括鈉、鉀，及鎂。

【0199】式1分子可以調配成鹽衍生物。作為非限制

性例子，鹽衍生物可藉由使游離鹼與足夠量之所欲酸接觸產生鹽而製備。游離鹼可藉由將此鹽以適合的稀釋鹼水溶液處理而再生，鹼水溶液諸如稀釋的氫氧化鈉、碳酸鉀、氨，及碳酸氫鈉水溶液。作為許多案例中之範例，一種殺蟲劑如2,4-D，可藉由將其轉化為其二甲基胺鹽類而更具水溶性。

【0200】 式1分子可以與溶劑調配成穩定的錯合物，從而使該錯合物在移除未錯合的溶劑後仍保持完整。此等錯合物通常被稱為「溶劑合物」。然而，較佳以水作為溶劑形成穩定的水合物。

【0201】 式1分子可製備為酯類衍生物。這些酯類衍生物繼而可以類似於本文件揭示之分子的應用方式應用。

【0202】 式1分子可製備為各種結晶性多形體。多形性於發展農用化學品上係重要的，因為相同分子之不同結晶多形體或結構具有不同的物理性質及生物效能。

【0203】 式1分子可以用不同的同位素來製造。尤其重要的為具有²H(亦稱為氘)或是³H(亦稱為氚)取代1H之分子。式1分子可以用不同的放射性核種來製造。尤其重要的為具有¹⁴C之分子。具有氘、氚、或是¹⁴C取代之式1分子可以使用於生物研究，能夠追蹤化學及物理製程及半衰期研究，以及MoA研究。

立體異構物

【0204】 式1分子可以以一種或多種立體異構物形式存在。因此，一定的分子可以外消旋混合物形式生產。熟

習此項技術者將瞭解，一種立體異構物可比其他立體異構物更具活性。個別立體異構物可藉由已知的選擇性合成程序獲得、使用經解析之起始物質藉由習知合成程序獲得，或是藉由習知解析程序來獲得。此文件中揭示之一定的分子可以兩種或兩種以上異構物形式存在。各種異構物包括幾何異構物、非鏡相異構物，及鏡相異構物。因此，此文件中揭示之分子包括幾何異構物、外消旋混合物、個別立體異構物，及光學活性混合物。熟習此項技術者將瞭解，一種異構物可比其他異構物更具活性。本揭示中揭露之結構，為了清楚之故，係僅以一種幾何形式繪製，但是意欲表示該分子之所有幾何形式。

組合

【0205】 在本發明之另一個具體例中，式1分子可與一種或多種活性成分組合使用(諸如，呈組成混合物之形式，或同時或依序施用)。

【0206】 在本發明之另一個具體例中，式1分子可與一種或多種活性成分組合使用(諸如，呈組成混合物之形式，或同時或依序施用)，該活性成分每一者皆具有與式1分子之MoA相同、類似但是更可能為-相異之MoA。

【0207】 在另一個具體例中，式1分子可與一種或多種分子組合使用(諸如，呈組成混合物之形式，或同時或依序施用)，該一種或多種分子具有殺蟬蟎、殺藻、殺卵、殺菌、殺真菌、除草、殺昆蟲、殺軟體動物、殺線蟲、滅鼠及/或殺病毒特性。

【0208】在另一個具體例中，式1分子可與一種或多種分子組合使用(諸如，呈組成混合物之形式，或同時或依序施用)，該一種或多種分子為拒食劑、驅鳥劑、化學絕育劑、除草劑安全劑、誘蟲劑、驅蟲劑、驅哺乳動物劑、交配干擾劑、植物活化劑、植物生長調節劑及/或協力劑。

【0209】在另一個具體例中，式1分子可與一種或多種生物性殺蟲劑組合使用(諸如，呈組成混合物之形式，或同時或依序施用)。

【0210】在另一個具體例中，式1分子與活性成分之殺蟲組成物組合可以廣大變化範圍之重量比使用。舉例而言，二組分混合物，式1分子比活性成分之重量比可以為從約100:1至約1:100；在另一個實施例中，重量比可以為從約50:1至約1:50；；在另一個實施例中，重量比可以為從約20:1至約1:20；在另一個實施例中，重量比可以為從約10:1至約1:10；在另一個實施例中，重量比可以為從約5:1至約1:5；在另一個具體例中，重量比可以為從約3:1至約1:3；在另一個實施例中，重量比可以為從約2:1至約1:2；以及在最後的實施例中，重量比可以為從約1:1(見表B)。然而，一般而言，重量比小於約10:1至約1:10為較佳的。有時使用包含一種三或四組分的混合物亦為較佳的，該混合物包含式1分子及一種或更多種活性成分。

表B

式1分子：活性成分之重量比
100:1 至 1:100

50:1 至 1:50
20:1 至 1:20
10:1 至 1:10
5:1 至 1:5
3:1 至 1:3
2:1 至 1:2
1:1

【0211】式1分子與一種活性成分之重量比亦可以描述為 $X:Y$ ；其中 X 為式1之分子的重量份且 Y 為活性成分之重量份。 X 重量份之數值範圍為 $0 < X \leq 100$ 且 Y 重量份之數值範圍為 $0 < Y \leq 100$ ，以及通過圖表顯示於表C中。作為非限制性實例，式1之分子與一種活性成分之重量比範圍可以為20:1。

表 C

活性成分(Y)之重量份	100	X,Y		X,Y			X,Y			
	50	X,Y	X,Y	X,Y			X,Y	X,Y		
	20	X,Y		X,Y	X,Y		X,Y		X,Y	
	15	X,Y	X,Y					X,Y	X,Y	X,Y
	10	X,Y		X,Y						
	5	X,Y	X,Y	X,Y				X,Y		
	3	X,Y	X,Y		X,Y	X,Y		X,Y	X,Y	X,Y
	2	X,Y		X,Y	X,Y		X,Y		X,Y	
	1	X,Y	X,Y	X,Y	X,Y	X,Y	X,Y	X,Y	X,Y	X,Y
		1	2	3	5	10	15	20	50	100
式1分子 (X)之重量份										

【0212】式1分子與一種活性成分之重量比範圍可以描述為 $X_1 : Y_1$ 至 $X_2 : Y_2$ ，其中 X 及 Y 如上文所定義。

【0213】在一個具體例中，重量比範圍可為 $X_1 : Y_1$ 至 $X_2 : Y_2$ ，其中 $X_1 > Y_1$ 且 $X_2 < Y_2$ 。作為非限制性實例，式1分子與一種活性成分之重量比範圍可在約3 : 1與約1 : 3之間，含括端點。

【0214】在另一個具體例中，重量比範圍可為 $X_1 : Y_1$ 至 $X_2 : Y_2$ ，其中 $X_1 > Y_1$ 且 $X_2 > Y_2$ 。作為非限制性實例，式1分子與一種活性成分之重量比範圍可在約15 : 1與約3 : 1之間，含括端點。

【0215】在另一個具體例中，重量比範圍可為 $X_1 : Y_1$ 至 $X_2 : Y_2$ ，其中 $X_1 < Y_1$ 且 $X_2 < Y_2$ 。作為非限制性實例，式1分子與一種活性成分之重量比範圍可在約1 : 3與約1 : 20之間，含括端點。

調配物

【0216】殺蟲劑很少會適合以單純形式使用。通常需要添加其他物質，以便該殺蟲劑能以允許方便施用、處理、輸送、儲存及最大殺蟲劑活性之所需濃度及適宜形式使用。因此，殺蟲劑係調配成例如餌劑、濃縮乳劑、粉劑、可乳化性濃縮液、燻蒸劑、膠劑、粒劑、微膠囊、種子處理劑、懸浮濃縮劑、懸乳劑(suspoemulsion)、錠劑、水溶性液劑、水分散性粒劑或是乾燥可流動劑、可濕性粉劑及超低體積溶液。

【0217】殺蟲劑最經常以由此等殺蟲劑的濃縮調配

物所製備之含水懸浮液或乳劑的形式來施用。此等水溶性、水可懸浮或可乳化調配物為固體，通常稱為可濕性粉末、水可分散顆粒，或者為液體，通常稱為可乳化濃縮物或水性懸浮液。可濕性粉末，其可經壓緊以形成水可分散顆粒，包含殺蟲劑、載劑及界面活性劑之緊密混合物。殺蟲劑之濃度通常為約10重量%至約90重量%。載劑通常選自鎂鋁海泡石黏土(attapulgite clay)、蒙脫石黏土(montmorillonite clay)、矽藻土(diatomaceous earth)或純化矽酸鹽。包含約0.5%至約10%的可濕性粉劑之有效界面活性劑，見於磺酸化木質素、縮合萘磺酸鹽、萘磺酸鹽、烷基苯磺酸鹽、烷基硫酸鹽以及非離子性界面活性劑，諸如烷基苯酚的環氧乙烷加成物。

【0218】 殺蟲劑之可乳化濃縮物包含溶解於載劑中合宜濃度之殺蟲劑，諸如每公升液體約50至約500公克，該載劑為水可混溶的溶劑或水不混溶的有機溶劑及乳化劑之混合物。適用的有機溶劑包括芳族類，尤其是二甲苯類與石油分餾物，尤其是石油的高沸點萘與烯烴部分，諸如重芳族石油腦。亦可使用其他有機溶劑，諸如包括松香衍生物在內之萜烯溶劑、脂族酮類諸如環己酮，及複合醇類諸如2-乙氧基乙醇。用於可乳化性濃縮液之適宜乳化劑係選自習用的陰離子性及非離子性界面活性劑。

【0219】 水性懸浮液包含以在約5重量%至約50重量%範圍內之濃度，分散在水性載劑中之非水溶性殺蟲劑的懸浮液。懸浮液藉由以下方式製備：精細研磨殺蟲劑並將

其劇烈混合至載劑中，該載劑包含水及界面活性劑。亦可添加諸如無機鹽及合成膠或天然膠之成分，從而增加水性載劑之密度及黏度。通常最有效的為藉由以儀器，諸如砂磨機、球磨機或活塞型均質器中製備水性混合物並對其進行均質化來同時研磨及混合殺蟲劑。

【0220】 殺蟲劑亦可以顆粒組成物之形式來施用，該等顆粒組成物尤其適用於施用至土壤中。顆粒組成物通常含有約0.5重量%至約10重量%之殺蟲劑分散在載劑中，該載劑包含黏土或相似物質。該等組成物通常藉由以下方式製備：將該殺蟲劑溶解在適合之溶劑中並將其施用至顆粒載劑上，該顆粒載劑已經預成形為適當粒徑，在約0.5至約3mm範圍內。此等組成物亦可藉由以下方式調配：將該載劑及分子製成麵團狀或糊狀，且壓碎並乾燥，從而得到所需顆粒粒徑。

【0221】 含有殺蟲劑之塵劑係藉由以下方式製備：將呈粉末形式之殺蟲劑與適合之粉塵狀農業載劑，諸如高嶺黏土、經研磨火山岩及其類似載劑，緊密混合。塵劑可適當地含有約1%至約10%的殺蟲劑。塵劑可以施用作為拌種 (seed dressing) 或以粉塵鼓風機施用於葉片上。

【0222】 同樣可行的是以配於適當有機溶劑中的溶液形式施用之殺蟲劑，該有機溶劑通常為石油諸如噴霧油，該有機溶劑廣泛用於農業化學。

【0223】 殺蟲劑亦可以氣溶膠組成物之形式來施用。在此等組成物中，將殺蟲劑溶解或分散在載劑中，該

載劑為產生壓力之推進劑混合物。將氣溶膠組成物包裝在容器中，該混合物經由霧化閥而自該容器噴散。

【0224】當將殺蟲劑與食物或引誘劑或兩者混合時，形成殺蟲劑誘餌。當害蟲吃掉誘餌時，其等亦攝入殺蟲劑。誘餌可呈顆粒、凝膠、可流動粉末、液體或固體形式。誘餌可用於害蟲藏身處。

【0225】薰蒸劑為具有相對較高蒸氣壓之殺蟲劑，且因此可以濃度足以殺死土壤或密封空間中之害蟲的氣體形式存在。薰蒸劑之毒性與其濃度及曝露時間成比例。其等特徵在於具有良好的擴散能力，並藉由滲透至害蟲之呼吸系統中或經由害蟲之表皮吸收而起作用。施用薰蒸劑以便在氣密房間或建築物中或在專門腔室中，對防氣片(gas proof sheet)下之儲藏產品害蟲進行控制。

【0226】可藉由將殺蟲劑粒子或小滴懸浮在各種類型之塑膠聚合物中，而將殺蟲劑微膠囊化。藉由改變聚合物之化學性質或藉由改變加工中之因素，可形成各種大小、溶解度、壁厚度及滲透度之微膠囊。此等因素控制其中活性成分之釋放速度，而釋放速度又影響產品之殘留效能、作用速度及氣味。

【0227】油溶液濃縮物係藉由將殺蟲劑溶於一溶劑內而製備，該溶劑會將殺蟲劑留置於溶液中。殺蟲劑之油溶液由於溶劑本身具有殺蟲作用及溶解體被之蠟質覆蓋物而增加殺蟲劑的攝取速度，所以通常會提供比其他調配物更快的擊倒及殺死害蟲作用。油溶液之其他優點包括較好

的儲藏穩定性、更好的裂縫滲透性及更好的油膩表面黏附性。

【0228】 另一具體例為一種水包油型乳劑，其中該乳劑包含油性小球，該等油性小球各自提供有層狀液晶塗層，並分散在水相中，其中各油性小球包含至少一種具有農業活性之分子，並個別地塗佈有單層狀或寡層狀之層，該層包含：(1)至少一種非離子性親脂性界面活性劑，(2)至少一種非離子性親水性界面活性劑，及(3)至少一種離子性界面活性劑，其中該等小球具有小於800奈米之平均粒徑。

其他調配物組分

【0229】 一般而言，當式1揭示之分子使用於一調配物中時，此調配物亦可含有其他組分。此等組分包括但不限於(其係一個非詳盡無遺及非互相排除的清單)濕潤劑、展佈劑、黏著劑、滲透劑、緩衝劑、螯合劑、漂浮降低劑、相容劑、消泡劑、清潔劑及乳化劑。現即說明一些組分。

【0230】 潤濕劑為當添加至一液體時，藉由降低該液體與其展佈表面之間的界面張力而增加該液體的展佈或滲透力的物質。潤濕劑用於農業化學調配物中之兩種主要功能：在處理及製造期間增加粉末在水中之潤濕速率，從而製造可溶性液體之濃縮物或懸浮濃縮物；及在產品與水在噴霧罐中混合期間降低可濕性粉末之潤濕時間，並使水滲透進入水可分散顆粒中的情況改善。用於可濕性粉末、懸浮濃縮物及水可分散顆粒調配物中的潤濕劑之實例為：月

桂基硫酸鈉；二辛基磺基丁二酸鈉；烷基酚乙氧化物；及脂族醇乙氧化物。

【0231】分散劑為吸附至粒子表面上且有助於保持粒子之分散狀態以及防止粒子重新聚集的物質。將分散劑添加至農業化學調配物中以有助於製造期間之分散及懸浮，並且有助於確保粒子在噴霧罐中重新分散至水中。其等廣泛用於可濕性粉末、懸浮濃縮物及水可分散顆粒中。用作分散劑之界面活性劑具有牢固吸附至粒子表面上之能力，並對粒子重新聚集提供電荷或空間障壁。最常用的界面活性劑為陰離子型、非離子型或該等兩種類型之混合物。對於可濕性粉末調配物，最常用分散劑為木質素磺酸鈉。對於懸浮濃縮物而言，使用聚電解質，諸如鈉-萘磺酸鹽-甲醛-濃縮物來得到極好的吸附及穩定。亦使用三苯乙烷基苯酚乙氧化物磷酸酯。非離子物，諸如烷基芳基氧化乙烯濃縮物及EO-PO嵌段共聚物，有時與陰離子物組合起來作為用於懸浮濃縮物之分散劑。近年來，新型式之極高分子量聚合物界面活性劑已開發作為分散劑。此等具有極長之疏水性『主鏈』及大量氧化乙烯鏈，其形成『梳狀』界面活性劑之『齒』。此等高分子量聚合物可對懸浮濃縮物產生極好的長期穩定性，因為疏水性主鏈對粒子表面具有許多錨定點。用於農業化學調配物之分散劑之實例為：木質素磺酸鈉；萘磺酸鈉甲醛濃縮物；三苯乙烷基苯酚-乙氧化物-磷酸-酯；脂族醇乙氧化物；烷基乙氧化物；EO-PO嵌段共聚物；以及接枝共聚物。

【0232】 乳化劑為使一種液相之液滴於另一液相中之懸浮液穩定之物質。在無乳化劑之情況下，兩種液體會分離成兩個不混溶的液相。最常用的乳化劑摻合物含有具有12個或12個以上環氧乙烷單元之烷基酚或脂族醇，及十二烷基苯磺酸之油溶性鈣鹽。範圍在8至18的親水親油平衡(「HLB」)值通常會提供良好穩定之乳液。乳液穩定性有時可藉由添加少量EO-PO嵌段共聚物界面活性劑來改進。

【0233】 增溶劑為在濃度超過臨界微胞濃度時，在水中形成微胞之界面活性劑。接著，微胞能夠溶解(dissolve)或溶解(solubilize)微胞之疏水部分內之水不溶性物質。通常用於溶解作用之界面活性劑類型為非離子型、脫水山梨糖醇單油酸酯、脫水山梨糖醇單油酸酯乙氧化物及油酸甲酯。

【0234】 界面活性劑有時單獨使用，或與其他添加劑，諸如作為佐劑之礦物油或植物油，一起使用於噴霧罐混合物，以改進殺蟲劑對目標之生物效能。用於生物增強之界面活性劑類型通常視殺蟲劑之性質及作用模式而定。然而，其等通常為非離子物，諸如：烷基乙氧化物；線性脂族醇乙氧化物；脂族胺乙氧化物。

【0235】 農業調配物中的載劑或稀釋劑為添加至殺蟲劑中以得到所需強度產品之物質。載劑通常為具有較高吸收能力之物質，而稀釋劑通常為具有較低吸收能力之物質。載劑及稀釋劑係使用於塵劑、可濕性粉末、顆粒及水

可分散顆粒之調配物。

【0236】有機溶劑主要用於可乳化濃縮物、水包油乳液、懸乳劑及超低體積調配物之調配，及在較少程度上用於顆粒調配物。有時使用溶劑的混合物。第一主要群組之溶劑為脂族石蠟油，諸如煤油或精製石蠟。第二主要群組(且最常見)包含芳族溶劑，諸如二甲苯及較高分子量之C9及C10芳族溶劑之餾份。當將調配物乳化至水中時，氯化烴係使用作防止殺蟲劑結晶之共溶劑。醇類有時用作共溶劑以增強溶劑功效。其他溶劑可包括植物油、種子油及植物油與種子油之酯類。

【0237】增稠劑或膠凝劑主要用於懸浮濃縮物、乳液及懸乳劑之調配物，以改變液體之流變學或流動性質及防止分散粒子或液滴分離及沈降。增稠劑、膠凝劑及抗沈降劑通常屬於兩種類別，亦即水不溶性微粒及水溶性聚合物。可使用黏土及二氧化矽來製造懸浮濃縮物調配物。此等物質類型之實例包括但不限於，蒙脫石、膨潤土、矽酸鎂鋁及鎂鋁海泡石。水溶性多醣類多年來已用作增稠-膠凝劑。最常用之多醣類型為種子及海藻之天然萃取物或纖維素之合成衍生物。此等類型物質之實例包括但不限於，瓜爾膠；刺槐豆膠；角叉菜膠；海藻酸鹽；甲基纖維素；羧甲基纖維素鈉(SCMC)；羥乙基纖維素(HEC)。其他類型的抗沈降劑係以改質澱粉、聚丙烯酸酯、聚乙烯醇及聚氧化乙烯為基。另一種良好的抗沈降劑為三仙膠。

【0238】微生物會導致調配產品之腐敗。因此，使用

防腐劑來消除或降低其等之作用。此等試劑之實例包括但不限於：丙酸及其鈉鹽；山梨酸及其鈉或鉀鹽；苯甲酸及其鈉鹽；對羥基苯甲酸鈉鹽；對羥基苯甲酸甲酯；及1,2-苯并異噻唑啉-3-酮(BIT)。

【0239】界面活性劑之存在，經常造成水基調配物在製造及經由噴灑槽施用時在混合操作期間起泡。為了減少起泡之傾向，通常在製造階段期間或裝填至瓶中之前添加消泡劑。通常存在有兩種類型的消泡劑，亦即聚矽氧以及非聚矽氧。聚矽氧通常為二甲基聚矽氧烷之水性乳液，而非聚矽氧消泡劑為水不溶性油，諸如辛醇及壬醇，或二氧化矽。在該兩種情況下，消泡劑之功能為自空氣-水界面中替換界面活性劑。

【0240】「綠色」製劑(例如佐劑、界面活性劑、溶劑)可降低作物保護調配物之整體環境足跡。綠色試劑為生物可降解的，且通常衍生自天然及/或永續來源，例如植物及動物來源。特定實例為：植物油、種子油及其酯類，以及烷氧基化烷基聚葡萄糖苷。

施用

【0241】式1的分子可施用於任何所在地。施用此等分子之特定的作物所在地包括紫花苜蓿、杏仁、蘋果、大麥、豆類、油菜、玉米、棉花、十字花科植物、萵苣、燕麥、橘子、梨、胡椒、馬鈴薯、水稻、高粱、大豆、草莓、甘蔗、甜菜、向日葵、煙草、蕃茄、小麥，和其他有價值的作物生長之所在地或其種子待種植之處。

【0242】式1的分子亦可施用於植物，如作物生長之處，以及可造成此等植物的商業損失的害蟲水平低(甚至並無實際的存在)之區域。此所在地施用此等分子對於此所在地生長的植物為有利的。此等益處可以包括但不限於：協助植物生長出更好的根系；協助植物更佳地承受壓力生長條件；改進植物健康；改進植物產量(例如增加生物質及/或增加有價值成分之含量)；改進植物活力(例如改進植物生長及/或葉子更綠)；改進植物品質(例如改進某些成分之含量或組成)；以及改進植物對非生物及/或生物脅迫之耐受性。

【0243】在栽種各種植物時，式1的化合物可以與硫酸銨一起施用，因這樣可以提供額外的益處。

【0244】式1分子可以施用於經基因改造以表現特殊性狀，諸如蘇力菌(*Bacillus thuringiensis*)或其他殺昆蟲性毒素，或該等表現除草劑抗性之植物，或是該等具有表現殺昆蟲性毒素、除草劑抗性、營養強化作用或其他任一有利性狀之「堆疊式」外來基因者之植物上、之中或周圍。

【0245】式1分子可施用至待之植物葉子及/或果實部分以控制害蟲。此等分子會直接與害蟲接觸，或害蟲於食用植物或吸取植物汁液時，會攝入此等分子。

【0246】式1分子亦可施用至土壤，且當以此方式施用時，可控制食用根與莖之害蟲。根可吸收此等分子藉此將其送至植物之葉子部分，以控制地面上部嚼食與汁液取食之害蟲。

【0247】可藉由在植物的不同部分施用(例如藉由噴灑一所在地)式1分子，利用殺蟲劑在植物中的系統性移動，而控制位於植物另一部分的害蟲。舉例而言，可藉由滴灌或條施，藉由以例如種植前或種植後之土壤澆灌而處理土壤，或藉由種植前處理植物種子來達成控制食葉昆蟲。

【0248】式1的分子可以與誘餌一起施用。一般而言，在誘餌情況下，將誘餌置於地面，白蟻可與誘餌接觸及/或被吸引。亦可將誘餌施用至建築表面(水平、垂直或傾斜表面)，該處螞蟻、白蟻、蟑螂與蒼蠅，皆會與誘餌接觸及/或被吸引。

【0249】式1分子可囊封在膠囊內、或置放於膠囊表面上。膠囊的大小可在從奈米大小(直徑大約100-900奈米)至微米大小(直徑大約10-900微米)範圍內。

【0250】式1分子可以施用於害蟲之卵。由於一些害蟲之卵具有抗某些殺蟲劑之獨特能力，故可能需要重複施用此等分子以控制新出現之幼蟲。

【0251】式1分子可以施用作為種子處理。可對將發芽之所有類型的種子進行種子處理，包括經遺傳修飾以表現特殊性狀之植物的種子。代表性實例包括對無脊椎動物害蟲，諸如蘇力菌(*Bacillus thuringiensis*)，表現蛋白毒性或其他殺昆蟲毒素者，表現除草劑抗性者，諸如「Roundup Ready」種子，或具有表現殺昆蟲毒素、除草劑抗性、營養增強、抗旱性或任何其他有益特性之「堆疊式」外來基因者。另外，此等使用式1分子之種子處理可

進一步增強植物耐嚴苛生長條件的能力更佳。由此產生較健康，較有活力之植物，此在收穫時節可導致更高的產量。一般而言，預期每100,000個種子約1公克至約500公克之此等分子會提供良好的益處，預期每100,000個種子約10公克至約100公克之量會提供最佳的益處，且預期每100,000個種子約25公克至約75公克之量會提供甚至最佳的益處。

【0252】 式1的分子可與土壤改良領域中的一或多種活性成分一起使用。

【0253】 式1分子可用於控制獸醫學領域或在非人類動物飼養領域中之內寄生蟲及外寄生蟲。此等分子可以舉例而言藉由，例如錠劑、膠囊、飲料、顆粒形式經口投與，藉由以例如浸泡、噴灑、傾倒、點藥及噴粉形式塗覆皮膚，以及藉由以例如注射劑形式的非經腸投與來施用。

【0254】 式1分子亦可有利地用於家畜飼養，例如牛、綿羊、豬、雞、鮭魚及鵝。其等亦可有利地用於寵物，諸如馬、犬及貓。欲控制之特定害蟲將為會對該等動物造成麻煩之跳蚤及壁蝨。適合的調配物與飲用水或飼料一起經口投與該等動物。適合的劑量及調配物視物種而定。


【0255】 式1分子亦可用於控制寄生蟲，尤其是上列動物腸道中的寄生蟲。

【0256】 式1分子亦可用於人類健康照護之治療方法。此等方法包括但不限於，以例如錠劑、膠囊、飲料、顆粒形式經口投與及藉由皮膚施用。

【0257】式1分子亦可施用於侵入性害蟲。全世界之害蟲正遷移至新環境(對於此害蟲而言)，且此後在該新環境中變成新的侵入物種。此等分子亦可用於該等新的侵入物種以在該新環境中對其進行控制。

【0258】因此，根據上述以及表格部分的表格，提供下列項目。

1. 一種具下式之分子



式1

其中：

(A) R^1 、 R^5 、 R^6 、 R^{11} 及 R^{12} 各自獨立地選自於下列所構成的群組：H、F、Cl、Br、I、CN、 (C_1-C_4) 烷基、 (C_1-C_4) 鹵烷基、 (C_1-C_4) 烷氧基，以及 (C_1-C_4) 鹵烷氧基；

較佳地， R^1 、 R^5 、 R^6 、 R^{11} 及 R^{12} 為H；

(B) R^2 、 R^3 及 R^4 各自獨立地選自於下列所構成的群組：H、F、Cl、Br、I、CN、 (C_1-C_4) 烷基、 (C_2-C_4) 烯基、 (C_2-C_4) 炔基、 (C_1-C_4) 鹵烷基、 (C_1-C_4) 烷氧基，以及 (C_1-C_4) 鹵烷氧基

較佳地， R^2 、 R^3 及 R^4 為H、F、Cl、Br或 CH_3 ；

(C) R^7 為 (C_1-C_6) 鹵烷基

較佳地， R^7 為 CF_3 ；

(D) R^9 係選自於下列所構成的群組：**(F)**、H、F、Cl、Br、I、CN、 (C_1-C_4) 烷基、 (C_1-C_4) 鹵烷基、 (C_1-C_4) 烷氧基，以及 (C_1-C_4) 鹵烷氧基

較佳地 R^9 為H；

(E) R^{10} 係選自於下列所構成的群組：**(F)**、F、Cl、Br、I、CN、 (C_1-C_4) 烷基、 (C_2-C_4) 烯基、 (C_2-C_4) 炔基、 (C_1-C_4) 鹵烷基、 (C_1-C_4) 烷氧基，以及 (C_1-C_4) 鹵烷氧基

較佳地， R^{10} 為Br、 CH_3 或 CF_3 ；

(F) R^9 及 R^{10} 能選擇性地一起形成一個3至5員飽和或不飽和的、烴基(hydrocarbyl)鍵聯，

其中該烴基鍵聯可選擇性地以一個或更多個獨立地選自於下列所構成的群組之取代基予以取代：F、Cl、Br、I及CN；

(G) X係

(1) $NR^{13}R^{14}$ ，其中 R^{13} 及 R^{14} 各自獨立地選自於下列所構成的群組：H、CHO、 (C_1-C_4) 烷基、 (C_2-C_4) 烯基、 (C_1-C_4) 鹵烷基、 (C_1-C_4) 烷氧基、 (C_1-C_4) 鹵烷氧基、 (C_3-C_8) 環烷基、 (C_1-C_4) 烷基苯基、 (C_1-C_4) 烷基吡啶基、吡啶基、 $CH=NO(C_1-C_4)$ 烷基、 (C_1-C_4) 烷基 $CH=NO(C_1-C_4)$ 鹵烷基、 (C_1-C_4) 烷基 $NH(C_1-C_4)$ 鹵烷基、 (C_1-C_4) 烷基 $N((C_1-C_4)烷基)(C_1-C_4)$ 鹵烷基、硫環丁基、硫環丁基-氧化物，以及硫環丁基-二氧化物，

其中各個烷基、烯基、鹵烷基、烷氧基、鹵烷氧基、環烷基、苯基、吡啶基、硫環丁基、硫環丁基-氧化物以及

硫環丁基-二氧化物可以選擇性地以一個或更多個獨立地選自於下列所構成的群組之取代基予以取代：F、Cl、Br、I、CN、OH、(C₁-C₄)烷基及(C₁-C₄)烷氧基；

(2) N=CHN((C₁-C₄)烷基)₂或

(3) Z，其中Z為一包含3至7個原子之雜環基，其中該等原子之至少一者為一氮，且其中該氮有一鍵往C(=Q)，

其中該雜環基可選擇性地以一個或更多個獨立地選自於下列所構成的群組之取代基予以取代：F、Cl、Br、I及CN

較佳地X係

$\text{NR}^{13}\text{R}^{14}$ ，其中 R^{13} 及 R^{14} 為H、CHO、CH₃、CH₂CF₃、CH(CH₃)CF₃、環丙基、環丁基、環己基、CH(CH₃)苯基、CH₂吡啶基、吡啶基及CH=NOCH₃，其中該環己基及苯基可選擇性地以一個或更多個獨立地選自於下列所構成的群組之取代基予以取代：F、Cl、CH₃及OCH₃，或

N=CHN(CH₃)₂，或

吡咯啉；

(H) Q係選自於下列所構成的群組：O及S；

2.如1之分子(A molecule according to 1)，其中

(A) R^1 、 R^5 、 R^6 、 R^{11} 及 R^{12} 為H；

(B) R^2 、 R^3 及 R^4 各自獨立地選自於下列所構成的群組：H、F、Cl、Br以及(C₁-C₄)烷基；

(C) R^7 為(C₁-C₆)鹵烷基；

(D) R^9 為H；

(E) R^{10} 係選自於下列所構成的群組：Br、(C₁-C₄)烷基以及(C₁-C₄)鹵烷基；

(G) X 係

(1) $NR^{13}R^{14}$ ，其中 R^{13} 及 R^{14} 各自獨立地選自於下列所構成的群組：H、CHO、(C₁-C₄)烷基、(C₁-C₄)鹵烷基、(C₃-C₈)環烷基、(C₁-C₄)烷基苯基、(C₁-C₄)烷基吡啶基、吡啶基，以及 $CH=NO(C_1-C_4)$ 烷基，

其中各個烷基、鹵烷基、環烷基、苯基及吡啶基可以選擇性地以一個或更多個獨立地選自於下列所構成的群組之取代基予以取代：F、Cl、(C₁-C₄)烷基及(C₁-C₄)烷氧基，

(2) $N=CHN((C_1-C_4)烷基)_2$ 或

(3) Z，其中 Z 為一包含3至7個原子之雜環基，其中該等原子之至少一者為一氮，且其中該氮有一鍵往 C(=Q)；以及

(H) Q 係選自於下列所構成的群組：O 及 S。

3. 如1之分子，其中該分子係選自於表2的該等分子中之一者。

4. 如1之分子，其中該分子係選自於表1的該等分子中之一者。

5. 一種殺蟲組成物，其包含如1、2、3或4中任一者之分子，進一步包含一或更多種活性成分。

6. 如5之殺蟲組成物，其中該活性成分係來自AIGA。

7. 如5之殺蟲組成物，其中該活性成分係選自於下列所構成的群組：AI-1、1,3-二氯丙烯、陶斯松(chlorpyrifos)、

甲基陶斯松 (chlorpyrifos-methyl) 、 六 伏 隆 (hexaflumuron) 、 滅 芬 諾 (methoxyfenozide) 、 多 氟 脲 (noviflumuron) 、 賜 諾 特 (spinetoram) 、 賜 諾 殺 (spinosad) 、 氟 啶 蟲 胺 腈 (sulfoxaflor) ， 以 及 磺 醯 氟 。

8. 一 種 殺 蟲 組 成 物 ， 其 包 含 如 1 、 2 、 3 或 4 中 任 一 者 之 分 子 ， 其 進 一 步 包 含 一 種 **MoA** 材 料 。

9. 如 7 之 殺 蟲 組 成 物 ， 其 中 該 **MoA** 材 料 係 來 自 **MoAMGA** 。

10. 如 5 、 6 、 7 、 8 或 9 中 任 一 者 之 殺 蟲 組 成 物 ， 其 中 如 式 1 之 分 子 與 該 活 性 成 分 之 重 量 比 係 選 自 於 表 B 。

11. 一 種 控 制 害 蟲 的 方 法 ， 該 方 法 包 含 施 用 殺 蟲 有 效 量 的 如 1 、 2 、 3 或 4 中 任 一 者 之 分 子 至 一 所 在 地 。

12. 一 種 控 制 害 蟲 的 方 法 ， 該 方 法 包 含 施 用 殺 蟲 有 效 量 的 如 5 、 6 、 7 、 8 、 9 或 10 中 任 一 者 之 殺 蟲 組 成 物 至 一 所 在 地 。

13. 如 1 、 2 、 3 或 4 中 任 一 者 之 分 子 ， 或 如 5 、 6 、 7 、 8 、 9 或 10 中 任 一 者 之 殺 蟲 組 成 物 ， 其 中 該 分 子 係 呈 農 業 上 可 接 受 的 酸 加 成 鹽 類 的 形 式 。

14. 如 1 、 2 、 3 或 4 中 任 一 者 之 分 子 ， 或 如 5 、 6 、 7 、 8 、 9 或 10 中 任 一 者 之 殺 蟲 組 成 物 ， 其 中 該 分 子 係 呈 一 種 鹽 類 衍 生 物 的 形 式 。

15. 如 1 、 2 、 3 或 4 中 任 一 者 之 分 子 ， 或 如 5 、 6 、 7 、 8 、 9 或 10 中 任 一 者 之 殺 蟲 組 成 物 ， 其 中 該 分 子 係 呈 溶 劑 合 物 的 形 式 。

16.如1、2、3或4中任一者之分子，或如5、6、7、8、9或10中任一者之殺蟲組成物，其中該分子係呈一種酯類衍生物的形式。

17.如1、2、3或4中任一者之分子，或如5、6、7、8、9或10中任一者之殺蟲組成物，其中該分子係呈一種結晶性多形體的形式。

18.如1、2、3或4中任一者之分子，或如5、6、7、8、9或10中任一者之殺蟲組成物，其中該分子具有氘、氚、及或 ^{14}C 。

19.如1、2、3或4中任一者之分子，或如5、6、7、8、9或10中任一者之殺蟲組成物，其中該分子係呈一種或更多種立體異構物的形式。

20.如1、2、3或4中任一者之分子，或如5、6、7、8、9或10中任一者之殺蟲組成物，其中該分子係呈一種解析的立體異構物的形式。

21.如5、6、7、8、9或10中任一者之殺蟲組成物，其中該殺蟲組成物進一步包含另一種活性成分。

22.如5、6、7、8、9或10中任一者之殺蟲組成物，其中該殺蟲組成物進一步包含還有二種的活性成分。

23.如5、6、7、8、9或10中任一者之殺蟲組成物，其中該活性成分具有與該式1分子之MoA不同的一MoA。

24.如5、6、7、8、9或10中任一者之殺蟲組成物，其中該殺蟲組成物包含一種活性成分，其具有殺蟬蟎、殺藻、殺卵、殺菌、殺真菌、除草、殺昆蟲、殺軟體動物、殺線

蟲、滅鼠及/或殺病毒特性。

25. 如5、6、7、8、9或10中任一者之殺蟲組成物，其中該殺蟲組成物包含一種活性成分，其為一種拒食劑、驅鳥劑、化學絕育劑、除草劑安全劑、誘蟲劑、驅蟲劑、驅哺乳動物劑、交配干擾劑、植物活化劑、植物生長調節劑及/或協力劑。

26. 如5、6、7、8、9或10中任一者之殺蟲組成物，其中該殺蟲組成物包含一種活性成分，其為一種生物性殺昆蟲劑。

27. 如5、6、7、8、9或10中任一者之殺蟲組成物，其中該式1分子比一種活性成分之重量比為100:1至1:100。

28. 如5、6、7、8、9或10中任一者之殺蟲組成物，其中該式1分子比一種活性成分之重量比為50:1至1:50。

29. 如5、6、7、8、9或10中任一者之殺蟲組成物，其中該式1分子比一種活性成分之重量比為20:1至1:20。

30. 如5、6、7、8、9或10中任一者之殺蟲組成物，其中該式1分子比一種活性成分之重量比為10:1至1:10。

31. 如5、6、7、8、9或10中任一者之殺蟲組成物，其中該式1分子比一種活性成分之重量比為5:1至1:5。

32. 如5、6、7、8、9或10中任一者之殺蟲組成物，其中該式1分子比一種活性成分之重量比為3:1至1:3。

33. 如5、6、7、8、9或10中任一者之殺蟲組成物，其中該式1分子比一種活性成分之重量比為2:1至1:2。

34. 如5、6、7、8、9或10中任一者之殺蟲組成物，其

中該式1分子比一種活性成分之重量比為1:1

35. 如5、6、7、8、9或10中任一者之殺蟲組成物，其中該式1分子比活性成分之重量比係描述為 $X:Y$ ；其中 X 為式1之分子之重量份且 Y 為活性成分之重量份；進一步地其中 X 重量份之數值範圍為 $0 < X \leq 100$ 且 Y 重量份之數值範圍為 $0 < Y \leq 100$ ；以及進一步地其中 X 及 Y 係選自於表C。

36. 如35之殺蟲組成物，其中式1分子比活性成分之重量比範圍係描述為 $X_1:Y_1$ 至 $X_2:Y_2$ ，進一步地其中 $X_1 > Y_1$ 且 $X_2 < Y_2$ 。

37. 如35之殺蟲組成物，其中式1分子比活性成分之重量比範圍係描述為 $X_1:Y_1$ 至 $X_2:Y_2$ ，進一步地其中 $X_1 > Y_1$ 且 $X_2 > Y_2$ 。

38. 如35之殺蟲組成物，其中式1分子比活性成分之重量比範圍係描述為 $X_1:Y_1$ 至 $X_2:Y_2$ ，進一步地其中 $X_1 < Y_1$ 且 $X_2 < Y_2$ 。

39. 如35之殺蟲組成物，其中該殺蟲組成物為協同性的。

40. 如12之方法，其中該害蟲係來自節肢動物門(Phylum Arthropoda)。

41. 如12之方法，其中該害蟲係來自軟體動物門(Phylum Mollusca)。

42. 如12之方法，其中該害蟲係來自圓形動物門(Phylum Nematoda)。

43. 如12之方法，其中該害蟲為螞蟻、蚜蟲、甲蟲、蠹

蟲(bristletails)、蟑螂、蟋蟀、蠮螋(earwigs)、跳蚤、蒼蠅、蚱蜢、葉蟬、蝨(包括海蝨)、蝗蟲、蟎、蛾、線蟲(nematode)、介殼蟲、綜合綱(symphylans)、白蟻、薊馬(thrips)、壁蝨、胡蜂，及/或粉虱。

44.如12之方法，其中該所在地係紫花苜蓿、杏仁、蘋果、大麥、豆類、油菜、玉米、棉花、十字花科植物、萵苣、燕麥、橘子、梨、胡椒、馬鈴薯、水稻、高粱、大豆、草莓、甘蔗、甜菜、向日葵、煙草、蕃茄、小麥，和其他有價值的作物生長之所在地或其種子待種植之處。

45.如5、6、7、8、9或10中任一者之殺蟲組成物，其中該殺蟲組成物進一步包含硫酸銨。

46.如12之方法，其中該所在地係經遺傳修飾以表現特殊性狀之植物種植之處。

47.如12之方法，其中該施用係於植物葉子及/或果實部分上實行。

48.如12之方法，其中該施用係於土壤實行。

49.如12之方法，其中該施用係藉由滴灌、條施，或是種植前或種植後之土壤澆灌來實行。

50.如12之方法，其中該施用係於植物葉子及/或果實部分實行，或是藉由種植前處理植物種子來實行。

51.一種殺蟲組成物，其包含如1、2、3或4中任一者之分子及一種種子。

52.一種方法，其包含施用如1、2、3或4中任一者之分子，或如5、6、7、8、9或10中任一者之殺蟲組成物，

至一種種子。




53. 一種方法，其包含施用如1、2、3或4中任一者之分子至包括非人類動物之一所在地，以控制內寄生蟲及/或外寄生蟲。






54. 一種生產殺蟲組成物之方法，該方法包含混合如請求項1、2、3或4中任一者之分子與一種或更多種活性成分。






【0259】 本文件中之標題僅為方便且不能用於解釋本文件之任何部份。

表格部分






表2. F系列分子之結構和製備方法






編號	結構	Prep.*
F1		13
F2		13
F3		13






F4		13
F5		13
F6		13
F7		15
F8		15







F9		13
F10		13
F11		13
F12		14
F13		15

F14	 <chem>COc1ccc(cc1)[C@H](C)N(F)(F)c2ccc(cc2)/C=C/C(F)(F)Fc3cc(Cl)c(Cl)c(Cl)c3C(=O)O</chem>	15
F15	 <chem>CC(F)(F)F[C@H](C)N(F)(F)c2ccc(cc2)/C=C/C(F)(F)Fc3cc(Cl)c(Cl)cc3C(=O)O</chem>	14
F16	 <chem>CC(F)(F)F[C@H](C)N(F)(F)c2ccc(cc2)/C=C/C(F)(F)Fc3cc(Cl)c(Cl)cc3C(=O)O</chem>	14
F17	 <chem>Nc1ccc(cc1)/C=C/C(F)(F)Fc2cc(Cl)c(Cl)c(Cl)c2C(=O)O</chem>	15
F18	 <chem>CN(C)C=N(F)(F)c1ccc(cc1)/C=C/C(F)(F)Fc2cc(Cl)c(Cl)c(Cl)c2C(=O)O</chem>	16
F19	 <chem>COC(=O)N=N(F)(F)c1ccc(cc1)/C=C/C(F)(F)Fc2cc(Cl)c(Cl)c(Cl)c2C(=O)O</chem>	17







F20		17
F21		14
F22		14
F23		13
F24		14

F25		14
F26		13
F27		14
F28		14
F29		15

F30		14
F31		14
F32		14
F33		18
F34		18






F35		14
F36		14
F37		14
F38		14
F39		13
F40		14







F41	<chem>Clc1cc(Cl)c(F)cc1C(F)(F)F/C=C/Fc1ccc(cc1)C(F)(F)Nc2cc(F)cc(F)c2</chem>	14
F42	<chem>BrC1=CC=C(C=C1)C(F)(F)F/C=C/Fc1ccc(cc1)C(F)(F)Nc2CC2</chem>	14
F43	<chem>Clc1cc(Cl)c(F)cc1C(F)(F)F/C=C/Fc1ccc(cc1)C(F)(F)Nc2CC2</chem>	14
F44	<chem>BrC1=CC=C(C=C1)C(F)(F)F/C=C/Fc1ccc(cc1)C(F)(F)Nc2cc(F)cc(F)c2</chem>	14
F45	<chem>BrC1=CC=C(C=C1)C(F)(F)F/C=C/Fc1ccc(cc1)C(F)(F)N[C@@H](C)C(F)(F)F</chem>	14
F46	<chem>BrC1=CC=C(C=C1)C(F)(F)F/C=C/Fc1ccc(cc1)C(F)(F)Nc2CC2</chem>	14







F47		15
F51		15
F52		15
F61		13
F62		13
F63		15







*依據實施例編號來製備








表3. C系列分子之結構和製備方法







編號	結構	Prep.*
C1		1
C2		1
C3		1
C4		1
C5		1







C6		1
C7		1
C8		1
C9		1
C10		1
C11		1







C12		1
C13		1
C14		1
C15		1
C16		1
C17		1







C18		1
C19		1
C20		1
C21		2
C22		3
C23		4





C24	 <p>Chemical structure of 2-(4-(2-fluorovinyl)phenyl)acetic acid. It consists of a benzene ring with a vinyl group substituted with a fluorine atom at the para position, and an acetic acid group at the other para position.</p>	5
C25	 <p>Chemical structure of 2-(4-(2-fluorovinyl)phenyl)-2,2,2-trifluoroacetic acid. It consists of a benzene ring with a vinyl group substituted with a fluorine atom at the para position, and a trifluoroacetic acid group at the other para position.</p>	5, 7
C26	 <p>Chemical structure of 2-(4-(2-fluorovinyl)phenyl)acetic acid. It consists of a benzene ring with a vinyl group substituted with a fluorine atom at the para position, and an acetic acid group at the other para position.</p>	5
C27	 <p>Chemical structure of 2-(4-(2-fluorovinyl)phenyl)acetic acid. It consists of a benzene ring with a vinyl group substituted with a fluorine atom at the para position, and an acetic acid group at the other para position.</p>	5, 7
C28	 <p>Chemical structure of 2-(4-(2-fluorovinyl)phenyl)-2,2,2-trifluoroacetate. It consists of a benzene ring with a vinyl group substituted with a fluorine atom at the para position, and a trifluoroacetate group at the other para position.</p>	6
C29	 <p>Chemical structure of 2-(4-(2-fluorovinyl)phenyl)acetate. It consists of a benzene ring with a vinyl group substituted with a fluorine atom at the para position, and an acetate group at the other para position.</p>	6
C30	 <p>Chemical structure of 2-(4-(2-fluorovinyl)phenyl)acetate. It consists of a benzene ring with a vinyl group substituted with a fluorine atom at the para position, and an acetate group at the other para position.</p>	6

C31	 <p>Chemical structure of 4-(2-fluoroacryloyl)-2-methoxy-5-methylbenzoic acid. The benzene ring is substituted with a methyl group (CH₃) at the 5-position, a methoxycarbonyl group (COOCH₃) at the 2-position, and a 2-fluoroacryloyl group (CH₂=CF-CO-) at the 4-position.</p>	6
C32	 <p>Chemical structure of 2-(2-bromo-1-fluoroethyl)-3-(trifluoromethyl)benzoic acid. The benzene ring is substituted with a trifluoromethyl group (CF₃) at the 3-position, a carboxylic acid group (COOH) at the 1-position, and a 2-bromo-1-fluoroethyl group (CH₂Br-CH₂-F) at the 2-position.</p>	7
C33	 <p>Chemical structure of 4-(2-fluoroacryloyl)benzoic acid. The benzene ring is substituted with a carboxylic acid group (COOH) at the 1-position and a 2-fluoroacryloyl group (CH₂=CF-CO-) at the 4-position.</p>	7
C34	 <p>Chemical structure of 2-(2-bromo-1-(chloromethyl)-1-fluoroethyl)-3,4,5-trichlorobenzene. The benzene ring is substituted with three chlorine atoms (Cl) at the 3, 4, and 5 positions, and a 2-(2-bromo-1-(chloromethyl)-1-fluoroethyl) group (CH₂Cl-CH₂-C(F)(Cl)-) at the 1-position.</p>	8
C35	 <p>Chemical structure of 2-(2-bromo-1-(chloromethyl)-1-fluoroethyl)-3,4,5-tribromobenzene. The benzene ring is substituted with three bromine atoms (Br) at the 3, 4, and 5 positions, and a 2-(2-bromo-1-(chloromethyl)-1-fluoroethyl) group (CH₂Cl-CH₂-C(F)(Br)-) at the 1-position.</p>	8
C36	 <p>Chemical structure of 2-(2-bromo-1-(chloromethyl)-1-fluoroethyl)-3-chloro-4,6-dimethylbenzene. The benzene ring is substituted with a chlorine atom (Cl) at the 3-position, and methyl groups (CH₃) at the 4 and 6 positions, and a 2-(2-bromo-1-(chloromethyl)-1-fluoroethyl) group (CH₂Cl-CH₂-C(F)(Br)-) at the 1-position.</p>	8

C37		8
C38		8
C39		8
C40		8
C41		8
C42		9

C43		10
C44		10
C45		10
C46		11
C47		11
C48		11

C49	 <p>Chemical structure of 1-(2,4-dibromo-3,5-dichlorophenyl)ethane-1,1,1-trifluoroethan-2-ol. The structure shows a benzene ring with a trifluoroethyl group (-CH(OH)CF₃) at the 1-position, and bromine (Br) and chlorine (Cl) substituents at the 2, 3, and 4 positions.</p>	11
C50	 <p>Chemical structure of 1-(2-chloro-4-fluorophenyl)ethane-1,1,1-trifluoroethan-2-ol. The structure shows a benzene ring with a trifluoroethyl group (-CH(OH)CF₃) at the 1-position, and chlorine (Cl) and fluorine (F) substituents at the 2 and 4 positions.</p>	11
C51	 <p>Chemical structure of 1-(2-chloro-4-fluorophenyl)ethane-1,1,1-trifluoroethan-2-ol. The structure shows a benzene ring with a trifluoroethyl group (-CH(OH)CF₃) at the 1-position, and fluorine (F) and chlorine (Cl) substituents at the 2 and 4 positions.</p>	11
C52	 <p>Chemical structure of 1-(2,4,5-trichlorophenyl)ethane-1,1,1-trifluoroethan-2-one. The structure shows a benzene ring with a trifluoroacetyl group (-C(=O)CF₃) at the 1-position, and chlorine (Cl) substituents at the 2, 4, and 5 positions.</p>	12
C53	 <p>Chemical structure of 1-(2,4,5-trichlorophenyl)ethane-1,1,1-difluoroethane-2-one. The structure shows a benzene ring with a difluoroethyl ketone group (-C(=O)CH₂CF₂CH₃) at the 1-position, and chlorine (Cl) substituents at the 2, 4, and 5 positions.</p>	12
C54	 <p>Chemical structure of 1-(2,4-dichlorophenyl)ethane-1,1,1-trifluoroethan-2-one. The structure shows a benzene ring with a trifluoroacetyl group (-C(=O)CF₃) at the 1-position, and chlorine (Cl) substituents at the 2 and 4 positions.</p>	12

C55		1
C56		7
C57		19
C58		25

*依據實施例編號來製備

表4：表2及表中分子之分析數據

編號	Mp (°C)	質量 (<i>m/z</i>)	¹ H NMR	¹³ C NMR ¹⁹ F NMR ; IR
F1		578 ([M+ H] ⁺)	¹ H NMR (500 MHz, CDCl ₃) δ 7.86 (d, <i>J</i> = 1.6 Hz, 1H), 7.78 (dd, <i>J</i> = 8.2, 1.7 Hz, 1H), 7.59 (d, <i>J</i> = 8.1 Hz, 1H), 7.44 (s, 2H), 6.20 (t, <i>J</i> = 6.5 Hz, 1H), 5.84 (dd, <i>J</i> = 32.5, 9.6 Hz, 1H), 4.61 (p, <i>J</i> = 8.9 Hz, 1H), 4.09 (qd, <i>J</i> = 8.9, 6.4 Hz, 2H)	¹⁹ F NMR (471 MHz, CDCl ₃) δ -59.36, -69.33, -72.33, -112.05 (d, <i>J</i> = 33.0 Hz)

F2		592 ([M+ H] ⁺)	¹ H NMR (500 MHz, CDCl ₃) δ 7.87 (d, <i>J</i> = 1.6 Hz, 1H), 7.79 (dd, <i>J</i> = 8.2, 1.7 Hz, 1H), 7.61 (d, <i>J</i> = 8.0 Hz, 1H), 7.44 (s, 2H), 5.92 (dd, <i>J</i> = 9.5, 2.6 Hz, 1H), 5.83 (dd, <i>J</i> = 23.7, 9.4 Hz, 1H), 4.90 (dp, <i>J</i> = 9.6, 7.2 Hz, 1H), 1.43 (d, <i>J</i> = 7.0 Hz, 3H)	¹⁹ F NMR (471 MHz, CDCl ₃) δ -59.60, -69.31, -77.41, -111.93
F3		536 ([M+ H] ⁺)	¹ H NMR (500 MHz, CDCl ₃) δ 7.81 (s, 1H), 7.74 (dd, <i>J</i> = 8.0, 1.7 Hz, 1H), 7.56 (d, <i>J</i> = 8.0 Hz, 1H), 7.44 (s, 2H), 6.04 (s, 1H), 5.82 (dd, <i>J</i> = 32.6, 9.6 Hz, 1H), 4.60 (p, <i>J</i> = 8.9 Hz, 1H), 2.86 (dq, <i>J</i> = 7.1, 3.5 Hz, 1H), 0.94 - 0.80 (m, 2H), 0.63 (q, <i>J</i> = 3.9, 3.3 Hz, 2H)	¹⁹ F NMR (471 MHz, CDCl ₃) δ -59.06, -69.35, -108.86 - -115.18 (m)
F4		612 ([M- H] ⁻)	¹ H NMR (400 MHz, CDCl ₃) δ 7.84 (d, <i>J</i> = 1.7 Hz, 1H), 7.77 (dd, <i>J</i> = 8.1, 1.7 Hz, 1H), 7.58 (d, <i>J</i> = 8.0 Hz, 1H), 7.43 (s, 2H), 5.82 (dd, <i>J</i> = 32.6, 9.6 Hz, 1H), 5.71 (d, <i>J</i> = 8.1 Hz, 1H), 4.60 (p, <i>J</i> = 8.8 Hz, 1H), 4.12 (q, <i>J</i> = 7.2 Hz, 1H), 2.18 - 2.06 (m, 4H), 2.03 - 1.79 (m, 1H), 1.61 (d, <i>J</i> = 12.9 Hz, 3H)	¹⁹ F NMR (376 MHz, CDCl ₃) δ -58.86, -69.33 (d, <i>J</i> = 2.3 Hz), -108.33 - -113.86 (m)

F5		558 ([M-H] ⁻)	¹ H NMR (400 MHz, CDCl ₃) δ 7.77 (d, <i>J</i> = 1.6 Hz, 1H), 7.63 - 7.47 (m, 2H), 7.42 (s, 2H), 5.78 (dd, <i>J</i> = 32.5, 9.6 Hz, 1H), 4.57 (p, <i>J</i> = 8.9 Hz, 1H), 4.03 - 3.65 (m, 4H), 1.99 (s, 2H), 1.87 (s, 2H)	¹⁹ F NMR (376 MHz, CDCl ₃) δ -69.35 (d, <i>J</i> = 2.2 Hz), -112.13
F6		550 ([M+H] ⁺)	¹ H NMR (400 MHz, CDCl ₃) δ 7.86 (d, <i>J</i> = 1.7 Hz, 1H), 7.78 (dd, <i>J</i> = 8.0, 1.7 Hz, 1H), 7.49 - 7.39 (m, 3H), 5.80 (dd, <i>J</i> = 32.6, 9.6 Hz, 1H), 4.60 (p, <i>J</i> = 8.9 Hz, 1H), 3.65 (t, <i>J</i> = 7.0 Hz, 2H), 3.11 (t, <i>J</i> = 6.7 Hz, 2H), 2.03 - 1.79 (m, 4H)	¹⁹ F NMR (376 MHz, CDCl ₃) δ -60.65, -69.35 (d, <i>J</i> = 2.4 Hz), -111.90
F7		586 ([M+H] ⁺)	¹ H NMR (400 MHz, CDCl ₃) δ 7.86 (d, <i>J</i> = 1.7 Hz, 1H), 7.79 (dd, <i>J</i> = 8.1, 1.8 Hz, 1H), 7.60 (d, <i>J</i> = 8.0 Hz, 1H), 7.43 (s, 2H), 6.00 (d, <i>J</i> = 6.9 Hz, 1H), 5.83 (dd, <i>J</i> = 32.5, 9.6 Hz, 1H), 4.60 (p, <i>J</i> = 8.9 Hz, 1H), 4.45 (m, 1H), 3.11 (m, 2H), 2.57 (m, 2H)	¹⁹ F NMR (376 MHz, CDCl ₃) δ -58.89, -69.31 (d, <i>J</i> = 2.3 Hz), -85.56 (d, <i>J</i> = 199.3 Hz), -96.16 (d, <i>J</i> = 199.4 Hz), -111.95 (d, <i>J</i> = 2.7 Hz)

F8	612 ([M+ H] ⁺)	¹ H NMR (400 MHz, CDCl ₃) δ 7.84 (m, 1H), 7.74 (dd, <i>J</i> = 8.1, 1.8 Hz, 1H), 7.58 (d, <i>J</i> = 8.1 Hz, 1H), 7.43 (s, 2H), 7.26 (d, <i>J</i> = 8.1 Hz, 2H), 7.18 (d, <i>J</i> = 7.9 Hz, 2H), 5.93 (d, <i>J</i> = 8.0 Hz, 1H), 5.80 (dd, <i>J</i> = 32.6, 9.6 Hz, 1H), 5.29 (m, 1H), 4.59 (p, <i>J</i> = 8.9 Hz, 1H), 2.35 (s, 3H), 1.60 (d, <i>J</i> = 6.9 Hz, 3H)	¹⁹ F NMR (376 MHz, CDCl ₃) δ -58.92, -69.33 (d, <i>J</i> = 2.3 Hz), -111.87 (dd, <i>J</i> = 4.3, 2.3 Hz)
F9	559 ([M- F] ⁻)	¹ H NMR (400 MHz, CDCl ₃) δ 7.71 - 7.60 (m, 1H), 7.56 (d, <i>J</i> = 1.7 Hz, 1H), 7.48 (dd, <i>J</i> = 8.2, 1.7 Hz, 1H), 7.43 (s, 2H), 6.31 (d, <i>J</i> = 7.9 Hz, 1H), 5.78 (dd, <i>J</i> = 32.6, 9.6 Hz, 1H), 4.59 (p, <i>J</i> = 8.9 Hz, 1H), 4.11 (m, 1H), 2.26 - 2.06 (m, 5H), 2.01 - 1.80 (m, 1H), 1.80 - 1.55 (m, 2H)	¹⁹ F NMR (376 MHz, CDCl ₃) δ -69.37 (d, <i>J</i> = 2.3 Hz), -95.24 (d, <i>J</i> = 237.9 Hz), -100.77 (d, <i>J</i> = 238.9 Hz), -110.05 - -114.23 (m)
F10	604 ([M- F] ⁻)	¹ H NMR (400 MHz, CDCl ₃) δ 7.74 (d, <i>J</i> = 1.2 Hz, 1H), 7.52 (d, <i>J</i> = 1.6 Hz, 2H), 7.43 (s, 2H), 6.12 (d, <i>J</i> = 8.0 Hz, 1H), 5.76 (dd, <i>J</i> = 32.6, 9.6 Hz, 1H), 4.58 (p, <i>J</i> = 8.9 Hz, 1H), 4.11 (d, <i>J</i> = 7.2 Hz, 1H), 2.22 - 2.07 (m, 5H), 2.02 - 1.79 (m, 1H), 1.77 - 1.58 (m, 2H)	¹⁹ F NMR (376 MHz, CDCl ₃) δ -63.63 - -74.62 (m), -95.18 (d, <i>J</i> = 238.7 Hz), -100.86 (d, <i>J</i> = 239.3 Hz), -108.70 - -115.95 (m)

F11	67-70	619 ([M+ H] ⁺)	¹ H NMR (400 MHz, DMSO- <i>d</i> ₆) δ 9.19 (t, <i>J</i> = 5.6 Hz, 1H), 8.39 (s, 2H), 8.12 (s, 1H), 8.04 (s, 2H), 7.83 - 7.80 (m, 1H), 7.70 (d, <i>J</i> = 8.0 Hz, 1H), 7.54 (d, <i>J</i> = 8.4 Hz, 1H), 6.85 (dd, <i>J</i> = 35.6, 10.0 Hz, 1H), 5.26 - 5.25 (m, 1H), 4.48 (d, <i>J</i> = 6.0 Hz, 2H)	
F12		623 ([M+ H] ⁺)	¹ H NMR (300 MHz, DMSO- <i>d</i> ₆) δ 8.60 (d, <i>J</i> = 3.9 Hz, 1H), 8.18 (s, 2H), 8.09 (s, 1H), 8.03 (dd, <i>J</i> = 8.7 Hz, 1H), 7.61 (d, <i>J</i> = 8.1 Hz, 1H), 6.86 (dd, <i>J</i> = 35.7, 10.2 Hz, 1H), 5.26 - 5.18 (m, 1H), 2.81 - 2.75 (m, 1H), 0.71 - 0.67 (m, 2H), 0.52 - 0.47 (m, 2H)	IR (薄膜) 3421, 3005, 1275, 750 cm ⁻¹
F13		613 ([M+ H] ⁺)	¹ H NMR (400 MHz, CDCl ₃) δ 7.85 (m, 1H), 7.78 (dd, <i>J</i> = 8.1, 1.7 Hz, 1H), 7.60 (d, <i>J</i> = 8.1 Hz, 1H), 7.43 (s, 2H), 5.95 (d, <i>J</i> = 8.3 Hz, 1H), 5.82 (dd, <i>J</i> = 32.5, 9.6 Hz, 1H), 4.60 (p, <i>J</i> = 8.9 Hz, 1H), 4.44 (dt, <i>J</i> = 8.3, 4.3 Hz, 1H), 2.35 (q, <i>J</i> = 12.7, 11.3 Hz, 1H), 1.82 (m, 7H)	¹⁹ F NMR (376 MHz, CDCl ₃) δ -58.88, -62.51 (d, <i>J</i> = 1718.3 Hz), -69.34 (d, <i>J</i> = 2.3 Hz), -111.90 (t, <i>J</i> = 2.6 Hz)

F14		631 ([M+ H] ⁺)	¹ H NMR (400 MHz, CDCl ₃) δ 7.84 (d, <i>J</i> = 1.7 Hz, 1H), 7.75 (dd, <i>J</i> = 8.2, 1.7 Hz, 1H), 7.59 (d, <i>J</i> = 8.1 Hz, 1H), 7.43 (s, 2H), 7.29 (t, <i>J</i> = 7.9 Hz, 1H), 6.96 (m, 1H), 6.91 (t, <i>J</i> = 2.1 Hz, 1H), 6.84 (ddd, <i>J</i> = 8.3, 2.6, 1.0 Hz, 1H), 5.96 (d, <i>J</i> = 7.9 Hz, 1H), 5.80 (dd, <i>J</i> = 32.6, 9.6 Hz, 1H), 5.30 (m, 1H), 4.59 (p, <i>J</i> = 8.9 Hz, 1H), 3.82 (s, 3H), 1.60 (d, <i>J</i> = 6.9 Hz, 3H)	¹⁹ F NMR (376 MHz, CDCl ₃) δ -58.89, -69.33 (d, <i>J</i> = 2.3 Hz), -111.87 (d, <i>J</i> = 4.0 Hz)
F15		554 ([M- H] ⁻)	¹ H NMR (400 MHz, DMSO- <i>d</i> ₆) δ 9.19 (d, <i>J</i> = 8.8 Hz, 1H), 8.15 (s, 1H), 8.07 (d, <i>J</i> = 8.4 Hz, 1H), 7.81 (s, 2H), 7.69 (s, 1H), 7.62 (d, <i>J</i> = 7.6 Hz, 1H), 6.87 (dd, <i>J</i> = 35.6, 8.8 Hz, 1H), 5.23 - 5.19 (m, 1H), 4.78 - 4.74 (m, 1H), 1.32 - 1.28 (m, 3H)	IR (薄膜) 3445, 2928, 1661, 1178 cm ⁻¹
F16		554 ([M- H] ⁻)	¹ H NMR (400 MHz, DMSO- <i>d</i> ₆) δ 9.19 (d, <i>J</i> = 8.8 Hz, 1H), 8.15 (s, 1H), 8.06 (d, <i>J</i> = 8.0 Hz, 1H), 8.01 (s, 1H), 7.74 (d, <i>J</i> = 8.4 Hz, 1H), 7.72 - 7.62 (m, 1H), 7.62 (d, <i>J</i> = 8.4 Hz, 1H), 6.87 (dd, <i>J</i> = 36.0, 10.0 Hz, 1H), 5.21 - 5.16 (m, 1H), 4.78 - 4.76 (m, 1H), 1.32 - 1.30 (m, 3H)	IR (薄膜) 3275, 2928, 1667, 1142 cm ⁻¹

F17		496 ([M+ H] ⁺)	¹ H NMR (400 MHz, CDCl ₃) δ 7.88 (m, 1H), 7.79 (dd, <i>J</i> = 8.1, 1.8 Hz, 1H), 7.67 (d, <i>J</i> = 8.1 Hz, 1H), 7.44 (s, 2H), 5.85 (m, 3H), 4.61 (p, <i>J</i> = 8.9 Hz, 1H)	¹⁹ F NMR (376 MHz, CDCl ₃) δ -59.15, -69.32 (d, <i>J</i> = 2.4 Hz), -111.96 (m)
F18		551 ([M+ H] ⁺)	¹ H NMR (400 MHz, CDCl ₃) δ 8.61 (s, 1H), 7.87 (m, 2H), 7.73 (dd, <i>J</i> = 8.2, 1.8 Hz, 1H), 7.44 (s, 2H), 5.79 (dd, <i>J</i> = 32.6, 9.6 Hz, 1H), 4.60 (p, <i>J</i> = 8.9 Hz, 1H), 3.18 (m, 6H)	¹⁹ F NMR (376 MHz, CDCl ₃) δ -58.92 (d, <i>J</i> = 172.5 Hz), -69.34 (dd, <i>J</i> = 18.8, 2.3 Hz), -111.76 (m)
F19		553 ([M+ H] ⁺)	¹ H NMR (400 MHz, CDCl ₃) δ 8.53 (dd, <i>J</i> = 29.0, 9.9 Hz, 1H), 7.92 (d, <i>J</i> = 1.9 Hz, 1H), 7.84 (dd, <i>J</i> = 8.2, 1.8 Hz, 1H), 7.76 (d, <i>J</i> = 9.6 Hz, 1H), 7.67 (m, 1H), 7.44 (s, 2H), 5.86 (dd, <i>J</i> = 32.4, 9.6 Hz, 1H), 4.61 (p, <i>J</i> = 8.9 Hz, 1H), 3.85 (d, <i>J</i> = 34.8 Hz, 3H); <i>E</i> 及 <i>Z</i> 異構物混合物	¹⁹ F NMR (376 MHz, CDCl ₃) δ -59.01, -69.30 (d, <i>J</i> = 2.3 Hz), -112.03; <i>E</i> 及 <i>Z</i> 異構物混合物
F20		522 ([M- H] ⁻)	¹ H NMR (400 MHz, CDCl ₃) δ 9.19 (s, 1H), 8.44 (d, <i>J</i> = 9.7 Hz, 1H), 7.95 (m, 1H), 7.88 (dd, <i>J</i> = 8.1, 1.7 Hz, 1H), 7.67 (d, <i>J</i> = 8.1 Hz, 1H), 7.44 (s, 2H), 5.90 (dd, <i>J</i> = 32.4, 9.6 Hz, 1H), 4.62 (p, <i>J</i> = 8.9 Hz, 1H)	¹⁹ F NMR (376 MHz, CDCl ₃) δ -59.04 (d, <i>J</i> = 94.3 Hz), -69.26 (d, <i>J</i> = 2.3 Hz), -112.17 (m)

F21	85-88	656 ([M+H] ⁺)	¹ H NMR (300 MHz, DMSO- <i>d</i> ₆) δ 8.57 (d, <i>J</i> = 7.5 Hz, 1H), 8.11 (s, 1H), 8.04 - 8.00 (m, 3H), 7.62 (d, <i>J</i> = 8.1 Hz, 1H), 6.86 (dd, <i>J</i> = 36.0, 9.9 Hz, 1H), 5.25 - 5.19 (m, 1H), 3.94 - 3.90 (m, 1H), 2.02 - 1.88 (m, 6H), 1.58 - 1.55 (m, 2H)	
F22		578 ([M+H] ⁺)	¹ H NMR (400 MHz, DMSO- <i>d</i> ₆) δ 8.59 (d, <i>J</i> = 3.6 Hz, 1H), 8.09 (s, 1H), 8.02 - 8.00 (m, 3H), 7.61 (d, <i>J</i> = 8.4 Hz, 1H), 6.83 (dd, <i>J</i> = 35.6, 10.0 Hz, 1H), 5.24 - 5.19 (m, 1H), 2.80 - 2.76 (m, 1H), 0.72 - 0.67 (m, 2H), 0.51 - 0.49 (m, 2H)	IR (薄膜) 3430, 1652 cm ⁻¹
F23		500 ([M+H] ⁺)	¹ H NMR (300 MHz, DMSO- <i>d</i> ₆) δ 8.58 (d, <i>J</i> = 3.9 Hz, 1H), 8.07 (s, 1H), 8.02 (d, <i>J</i> = 8.4 Hz, 1H), 7.79 (d, <i>J</i> = 6.0 Hz, 1H), 7.66 (s, 1H), 7.59 (d, <i>J</i> = 8.1 Hz, 1H), 6.84 (dd, <i>J</i> = 35.7, 9.9 Hz, 1H), 5.24 - 5.18 (m, 1H), 3.29 - 2.97 (m, 1H), 0.69 - 0.62 (m, 2H), 0.57 - 0.48 (m, 2H)	IR (薄膜) 3431, 1652, 750 cm ⁻¹

F24		578 ([M+ H] ⁺)	¹ H NMR (400 MHz, DMSO- <i>d</i> ₆) δ 8.56(d, <i>J</i> = 7.6 Hz, 1H), 8.11 (s, 1H), 8.03 - 8.00 (m, 2H), 7.74 (d, <i>J</i> = 8.4 Hz, 1H), 7.68 - 7.64 (m, 1H), 7.61 (d, <i>J</i> = 8.4 Hz, 1H), 6.83 (dd, <i>J</i> = 35.6, 9.6 Hz, 1H), 5.20 - 5.15 (m, 1H), 3.96 (br s, 1H), 2.01 - 1.98 (m, 2H), 1.93 - 1.86 (m, 2H), 1.57 - 1.52 (m, 2H), 1.23 - 1.19 (m, 2H)	IR (薄膜) 3422, 2926, 1645, 764 cm ⁻¹
F25		578 ([M+ H] ⁺)	¹ H NMR (400 MHz, DMSO- <i>d</i> ₆) δ 8.56 (d, <i>J</i> = 8.0 Hz, 1H), 8.12 (s, 1H), 8.04 (d, <i>J</i> = 8.4 Hz 1H), 7.81 (d, <i>J</i> = 1.6 Hz, 2H), 7.68 (d, <i>J</i> = 1.6 Hz, 1H), 7.62 (d, <i>J</i> = 8.4 Hz, 1H), 6.83 (dd, <i>J</i> = 36.0, 10.8 Hz, 1H), 5.20 - 5.15 (m, 1H), 3.96 - 3.94 (br s, 1H), 2.09 - 1.68 (m, 6H), 1.23 - 1.19 (m, 2H)	IR (薄膜) 3429, 1645, 1119 cm ⁻¹
F26		605 ([M+ H] ⁺)	¹ H NMR (400 MHz, DMSO- <i>d</i> ₆) δ 8.68 (s, 1H), 8.20 (s, 2H), 8.18 - 8.17 (m, 1H), 8.12 (s, 1H), 8.05 (s, 2H), 7.91 (d, <i>J</i> = 8.4 Hz, 1H), 7.56 (d, <i>J</i> = 8.8 Hz, 1H), 6.91 (dd, <i>J</i> = 36.0, 10.0 Hz, 1H), 5.27 - 5.25 (m, 1H)	IR (薄膜) 3422, 2925, 1672, 1260, 750 cm ⁻¹

F27		572 ([M+ H] ⁺)	¹ H NMR (300 MHz, DMSO- <i>d</i> ₆) δ 9.20 (d, <i>J</i> = 8.1 Hz, 1H), 8.14 (s, 1H), 8.07 (d, <i>J</i> = 8.1 Hz, 1H), 8.01 (d, <i>J</i> = 6.3 Hz, 2H), 7.64 (d, <i>J</i> = 8.1 Hz, 1H), 6.87 (dd, <i>J</i> = 35.7, 10.2 Hz, 1H), 5.25 - 5.24 (m, 1H), 4.78 - 4.73 (m, 1H), 1.33 (d, <i>J</i> = 7.2 Hz, 3H)	IR (薄膜) 3435, 2927, 1666, 1178, 677 cm ⁻¹
F28		642 ([M- H] ⁻)	¹ H NMR (400 MHz, DMSO- <i>d</i> ₆) δ 9.20 (d, <i>J</i> = 8.8 Hz, 1H), 8.15 (s, 1H), 8.09 (d, <i>J</i> = 8.4 Hz, 1H), 7.96 (s, 2H), 7.91 - 7.90 (m, 1H), 7.62 (d, <i>J</i> = 8.0 Hz, 1H), 6.87 (dd, <i>J</i> = 36.0, 10.0 Hz, 1H), 5.22 - 5.19 (m, 1H), 4.78 - 4.73 (m, 1H), 1.32 (d, <i>J</i> = 6.8 Hz, 3H)	IR (薄膜) 3440, 2926, 1662, 1260, 749 cm ⁻¹
F29		592 ([M+ H] ⁺)	¹ H NMR (500 MHz, CDCl ₃) δ 7.89 (dd, <i>J</i> = 8.0, 1.9 Hz, 1H), 7.83 (dt, <i>J</i> = 8.1, 2.1 Hz, 1H), 7.45 (s, 2H), 7.41 (d, <i>J</i> = 8.0 Hz, 1H), 5.87 (ddd, <i>J</i> = 32.6, 9.6, 4.7 Hz, 1H), 4.68 - 4.57 (m, 1H), 4.27 - 4.17 (m, 2H), 旋轉異構體 3.24 (s) & 2.92 (s)(3H)	¹⁹ F NMR (471 MHz, CDCl ₃) δ 旋轉異構體 -60.73 & -60.81, 旋轉異構體 -69.33 (t, <i>J</i> = 9.0 Hz) & -69.76 (t, <i>J</i> = 8.6 Hz), -69.39 (d, <i>J</i> = 8.7 Hz), 旋轉異構體 -112.11 (d, <i>J</i> = 32.5 Hz) & -112.24 (d, <i>J</i> = 32.5 Hz)

F30	551 ([M+ H] ⁺)	¹ H NMR (300 MHz, DMSO- <i>d</i> ₆) δ 9.16 (d, <i>J</i> = 8.4 Hz, 1H), 8.12 (s, 1H), 8.06 (d, <i>J</i> = 7.8 Hz, 1H), 7.62 (d, <i>J</i> = 8.1 Hz, 1H), 7.45 (s, 2H), 6.79 (dd, <i>J</i> = 35.7, 9.9 Hz, 1H), 4.96 - 4.89 (m, 1H), 4.81 - 4.73 (m, 1H), 2.32 (s, 6H), 1.32 (d, <i>J</i> = 6.9 Hz, 3H)	IR (薄膜) 3452, 2927, 1664, 749 cm ⁻¹
F31	573 ([M+ H] ⁺)	¹ H NMR (300 MHz, DMSO- <i>d</i> ₆) δ 8.56 (d, <i>J</i> = 7.8 Hz, 1H), 8.08 (s, 1H), 8.03 (d, <i>J</i> = 8.1 Hz, 1H), 7.61 (d, <i>J</i> = 8.1 Hz, 1H), 7.45 (s, 2H), 6.78 (dd, <i>J</i> = 36.0, 9.9 Hz, 1H), 4.95 - 4.89 (m, 1H), 3.94 (br s, 1H), 2.35 (s, 6H), 2.02 - 1.98 (m, 4H), 1.89 - 1.86 (m, 2H), 1.57 - 1.54 (m, 2H)	IR (薄膜) 3435, 2929, 1653, 749 cm ⁻¹
F32	701 ([M+ H] ⁺)	¹ H NMR (300 MHz, DMSO- <i>d</i> ₆) δ 8.57 (d, <i>J</i> = 7.5 Hz, 1H), 8.17 - 8.01 (m, 4H), 7.62 (d, <i>J</i> = 8.1 Hz, 1H), 6.86 (dd, <i>J</i> = 36.0, 10.2 Hz, 1H), 5.25 - 5.19 (m, 1H), 4.10 - 3.96 (m, 1H), 2.02 - 1.87 (m, 6H), 1.57 - 1.55 (m, 2H)	IR (薄膜) 3422, 1651 cm ⁻¹

F33		591 ([M-H] ⁻)	¹ H NMR (300 MHz, CDCl ₃) δ 7.83 (d, <i>J</i> = 1.7 Hz, 1H), 7.75 (dd, <i>J</i> = 8.2, 1.8 Hz, 1H), 7.61 (d, <i>J</i> = 8.2 Hz, 1H), 7.47 - 7.38 (m, 3H), 5.82 (dd, <i>J</i> = 32.6, 9.6 Hz, 1H), 4.66 - 4.52 (m, 3H)	¹⁹ F NMR (471 MHz, CDCl ₃) δ -58.54, -69.36 (d, <i>J</i> = 8.7 Hz), -70.53 (t, <i>J</i> = 9.0 Hz), -111.94 (d, <i>J</i> = 32.8 Hz)
F34		605 ([M-H] ⁻)	¹ H NMR (300 MHz, CDCl ₃) δ 7.83 (dd, <i>J</i> = 5.0, 1.7 Hz, 1H), 7.76 (dd, <i>J</i> = 8.1, 1.8 Hz, 1H), 7.43 (s, 2H), 7.30 (d, <i>J</i> = 8.2 Hz, 1H), 5.80 (ddd, <i>J</i> = 32.6, 9.6, 3.4 Hz, 1H), 4.90 (ddq, <i>J</i> = 63.6, 14.7, 8.7 Hz, 1H), 4.61 (p, <i>J</i> = 8.8 Hz, 1H), 4.19-3.70 (m, 1H), 旋轉異構體 3.63 (s) & 3.12 (s)(3H)	¹⁹ F NMR (471 MHz, CDCl ₃) δ 旋轉異構體 -59.82 & -60.15, 旋轉異構體 -67.38 (t, <i>J</i> = 8.8 Hz) & -68.83 (t, <i>J</i> = 8.1 Hz), -69.37 (d, <i>J</i> = 8.6 Hz), 旋轉異構體 -112.01 (d, <i>J</i> = 32.7 Hz) & -112.12 (dd, <i>J</i> = 32.5, 10.8 Hz)
F35		500 ([M+H] ⁺)	¹ H NMR (300 MHz, DMSO- <i>d</i> ₆) δ 8.57 (d, <i>J</i> = 3.6 Hz, 1H), 8.07 (s, 1H), 8.01 - 7.97 (m, 2H), 7.77 - 7.52 (m, 3H), 6.82 (dd, <i>J</i> = 35.7, 9.9 Hz, 1H), 5.21 - 5.09 (m, 1H), 2.77 - 2.73 (m, 1H), 0.83 - 0.81 (m, 2H), 0.48 - 0.40 (m, 2H)	IR (薄膜) 3273, 2927, 1657, 1127 cm ⁻¹

F36		676 ([M-H] ⁻)	¹ H NMR (400 MHz, DMSO- <i>d</i> ₆) δ 9.17 (d, <i>J</i> = 8.8 Hz, 1H), 8.17 - 8.14 (m, 3H), 8.06 (d, <i>J</i> = 7.6 Hz, 1H), 7.62 (d, <i>J</i> = 7.6 Hz, 1H), 6.86 (dd, <i>J</i> = 35.6, 10.0 Hz, 1H), 5.24 - 5.20 (m, 1H), 4.80 - 4.74 (m, 1H), 1.32 (d, <i>J</i> = 7.2 Hz, 3H)	IR (薄膜) 3419, 1652 cm ⁻¹
F37		494 ([M+H] ⁺)	¹ H NMR (400 MHz, DMSO- <i>d</i> ₆) δ 8.59 (d, <i>J</i> = 4.0 Hz, 1H), 8.06 (s, 1H), 8.02 (d, <i>J</i> = 8.0 Hz, 1H), 7.59 (d, <i>J</i> = 8.0 Hz, 1H), 7.45 (s, 2H), 6.75 (dd, <i>J</i> = 36.4, 10.4 Hz, 1H), 4.93 - 4.89 (m, 1H), 2.80 - 2.75 (m, 1H), 2.49 (s, 6H), 0.72 - 0.67 (m, 2H), 0.51 - 0.48 (m, 2H)	IR (薄膜) 3434, 2272, 1656 cm ⁻¹
F38		634 ([M+H] ⁺)	¹ H NMR (300 MHz, DMSO- <i>d</i> ₆) δ 9.20 (d, <i>J</i> = 8.7 Hz, 1H), 8.14 (s, 1H), 8.07 - 8.00 (m, 3H), 7.63 (d, <i>J</i> = 8.1 Hz, 1H), 6.88 (dd, <i>J</i> = 35.4, 9.9 Hz, 1H), 5.26 - 5.20 (m, 1H), 4.78 - 4.73 (m, 1H), 1.32 (d, <i>J</i> = 6.9 Hz, 3H)	IR (薄膜) 3435, 2926, 1663, 1177, 749 cm ⁻¹

F39		522 ([M-H] ⁻)	¹ H NMR (400 MHz, CDCl ₃) δ 7.49 - 7.36 (m, 5H), 6.13 (t, <i>J</i> = 6.5 Hz, 1H), 5.73 (dd, <i>J</i> = 32.8, 9.6 Hz, 1H), 4.59 (p, <i>J</i> = 8.9 Hz, 1H), 4.09 (qd, <i>J</i> = 9.0, 6.9 Hz, 2H), 2.46 (s, 3H)	¹⁹ F NMR (376 MHz, CDCl ₃) δ -69.44 (d, <i>J</i> = 2.3 Hz), -72.38, -111.69; IR (薄膜) 3300, 1667, 1163, 727 cm ⁻¹
F40		666 ([M+H] ⁺)	¹ H NMR (300 MHz, DMSO- <i>d</i> ₆) δ 8.56 (d, <i>J</i> = 7.5 Hz, 1H), 8.11 (s, 1H), 8.04 (d, <i>J</i> = 9.0 Hz, 1H), 7.96 (s, 2H), 7.91 - 7.90 (m, 1H), 7.62 (d, <i>J</i> = 8.1 Hz, 1H), 6.86 (dd, <i>J</i> = 35.7, 10.2 Hz, 1H), 5.22 - 5.21 (m, 1H), 3.97 - 3.96 (m, 1H), 2.02 - 1.87 (m, 8H)	IR (薄膜) 3422, 2926, 1645, 1118, 745 cm ⁻¹
F41		596 ([M+H] ⁺)	¹ H NMR (300 MHz, DMSO- <i>d</i> ₆) δ 8.57 (d, <i>J</i> = 7.8 Hz, 1H), 8.10 (s, 1H), 8.04 (s, 1H), 8.01 (d, <i>J</i> = 6.3 Hz, 2H), 7.62 (d, <i>J</i> = 7.8 Hz, 1H), 6.85 (dd, <i>J</i> = 36.0, 10.2, Hz, 1H), 5.24 - 5.23 (m, 1H), 4.04 - 3.96 (m, 1H), 2.02 - 1.62 (m, 4H), 1.62 - 1.55 (m, 4H)	IR (薄膜) 3437, 2926, 1651, 1119, 815 cm ⁻¹

F42		589 ([M+ H] ⁺)	¹ H NMR (300 MHz, DMSO- <i>d</i> ₆) δ 8.59 (d, <i>J</i> = 4.5 Hz, 1H), 8.09 (s, 1H), 8.03 (d, <i>J</i> = 9.6 Hz, 1H), 7.96 (s, 2H), 7.91 - 7.90 (m, 1H), 7.60 (d, <i>J</i> = 8.1 Hz, 1H), 6.86 (dd, <i>J</i> = 36.0, 9.9 Hz, 1H), 5.21 - 5.15 (m, 1H), 2.80 - 2.72 (m, 1H), 0.85 - 0.66 (m, 2H), 0.52 - 0.48 (m, 2H)	IR (薄膜) 3431, 2925, 1651, 1119, 748 cm ⁻¹
F43		518 ([M+ H] ⁺)	¹ H NMR (300 MHz, DMSO- <i>d</i> ₆) δ 8.59 (d, <i>J</i> = 3.9 Hz, 1H), 8.08 (s, 1H), 8.02 (s, 1H), 8.00 (d, <i>J</i> = 6.3 Hz, 2H), 7.61 (d, <i>J</i> = 8.4 Hz, 1H), 6.84 (dd, <i>J</i> = 35.7, 10.2 Hz, 1H), 5.24 - 5.23 (m, 1H), 2.81 - 2.75 (m, 1H), 0.73 - 0.66 (m, 2H), 0.52 - 0.50 (m, 2H)	IR (薄膜) 3431, 2926, 1646, 749 cm ⁻¹
F44		667 ([M+ H] ⁺)	¹ H NMR (400 MHz, DMSO- <i>d</i> ₆) δ 8.56 (d, <i>J</i> = 7.2 Hz, 1H), 8.11 - 8.10 (m, 2H), 8.03 (d, <i>J</i> = 8.4 Hz, 1H), 7.85 (d, <i>J</i> = 8.4 Hz, 1H), 7.61 (d, <i>J</i> = 8.4 Hz, 2H), 6.82 (dd, <i>J</i> = 35.6, 9.6 Hz, 1H), 5.17 - 5.16 (m, 1H), 3.96 - 3.95 (m, 1H), 2.05 - 1.98 (m, 3H), 1.93 - 1.87 (m, 3H), 1.61 - 1.52 (m, 2H)	IR (薄膜) 3428, 2926, 1645, 749 cm ⁻¹

F45		642 ([M-H] ⁻)	¹ H NMR (400 MHz, DMSO- <i>d</i> ₆) δ 9.20 (d, <i>J</i> = 8.8 Hz, 1H), 8.15 (s, 1H), 8.10 (s, 1H), 8.06 (d, <i>J</i> = 6.8 Hz, 1H), 7.86 (d, <i>J</i> = 8.4 Hz, 1H), 7.62 (d, <i>J</i> = 8.4 Hz, 2H), 6.87 (dd, <i>J</i> = 36.0, 10.0 Hz, 1H), 5.18 - 5.17 (m, 1H), 4.80 - 4.74 (m, 1H), 1.32 (d, <i>J</i> = 7.2 Hz, 3H)	IR (薄膜) 3444, 2926, 1663, 1261, 750 cm ⁻¹
F46		588 ([M-H] ⁻)	¹ H NMR (400 MHz, DMSO- <i>d</i> ₆) δ 8.59 (d, <i>J</i> = 3.6 Hz, 1H), 8.09 (s, 2H), 8.02 (d, <i>J</i> = 8.4 Hz, 1H), 7.85 (d, <i>J</i> = 8.0 Hz, 1H), 7.61 - 7.59 (m, 2H), 6.82 (dd, <i>J</i> = 35.6, 9.6 Hz, 1H), 5.17 - 5.12 (m, 1H), 2.80 - 2.51 (m, 1H), 0.72 - 0.67 (m, 2H), 0.51 - 0.48 (m, 2H)	IR (薄膜) 3432, 2925, 1651, 749 cm ⁻¹
F47	65-85	621.1 ([M+H] ⁺)	¹ H NMR (500 MHz, CDCl ₃) δ 8.38 (d, <i>J</i> = 5.1 Hz, 1H), 7.89 (d, <i>J</i> = 1.7 Hz, 1H), 7.81 (dd, <i>J</i> = 8.1, 1.7 Hz, 1H), 7.64 (d, <i>J</i> = 8.0 Hz, 1H), 7.44 (s, 2H), 7.32 (s, 1H), 7.22 (d, <i>J</i> = 5.1 Hz, 1H), 6.24 (t, <i>J</i> = 6.2 Hz, 1H), 5.84 (dd, <i>J</i> = 32.5, 9.5 Hz, 1H), 4.64 (d, <i>J</i> = 6.1 Hz, 2H), 4.63 - 4.55 (m, 1H)	¹⁹ F NMR (471 MHz, CDCl ₃) δ -58.93, -69.29 (d, <i>J</i> = 9.7 Hz), -111.98 (d, <i>J</i> = 32.4 Hz)

F51		586.9 ([M+H] ⁺)	¹ H NMR (500 MHz, CDCl ₃) δ 8.51 (ddd, <i>J</i> = 4.9, 1.8, 0.9 Hz, 1H), 7.87 (d, <i>J</i> = 1.6 Hz, 1H), 7.78 (dd, <i>J</i> = 8.1, 1.8 Hz, 1H), 7.71 (td, <i>J</i> = 7.7, 1.8 Hz, 1H), 7.67 (d, <i>J</i> = 8.1 Hz, 1H), 7.44 (s, 2H), 7.33 (dt, <i>J</i> = 7.9, 0.9 Hz, 1H), 7.23 (ddd, <i>J</i> = 7.6, 4.9, 1.1 Hz, 1H), 5.82 (dd, <i>J</i> = 32.6, 9.6 Hz, 1H), 4.76 (d, <i>J</i> = 4.7 Hz, 2H), 4.61 (p, <i>J</i> = 8.8 Hz, 1H)	¹⁹ F NMR (471 MHz, CDCl ₃) δ -59.28, -69.33 (d, <i>J</i> = 8.7 Hz), -111.85 (d, <i>J</i> = 32.6 Hz); IR (薄膜) 1660, 1248, 1176, 1138, 1119 cm ⁻¹
F52		599.1 ([M+H] ⁺)	¹ H NMR (500 MHz, CDCl ₃) δ 8.50 (ddd, <i>J</i> = 4.9, 1.8, 0.9 Hz, 1H), 7.89 - 7.83 (m, 1H), 7.76 (dd, <i>J</i> = 8.1, 1.7 Hz, 1H), 7.70 (td, <i>J</i> = 7.7, 1.8 Hz, 1H), 7.62 (d, <i>J</i> = 8.0 Hz, 1H), 7.44 (s, 2H), 7.44 (br s, 1H), 7.30 (dt, <i>J</i> = 7.8, 1.1 Hz, 1H), 7.23 - 7.18 (m, 1H), 5.80 (dd, <i>J</i> = 32.5, 9.6 Hz, 1H), 5.32 (p, <i>J</i> = 6.8 Hz, 1H), 4.60 (p, <i>J</i> = 8.9 Hz, 1H), 1.58 (d, <i>J</i> = 6.7 Hz, 3H)	¹⁹ F NMR (471 MHz, CDCl ₃) δ -59.10, -69.34 (d, <i>J</i> = 8.4 Hz), -111.80 (d, <i>J</i> = 32.4 Hz); IR (薄膜) 1656, 1175, 1139, 1119 cm ⁻¹
F61		635.6 ([M+H] ⁺)	¹ H NMR (400 MHz, CDCl ₃) δ 7.84 (d, <i>J</i> = 1.7 Hz, 1H), 7.77 (dd, <i>J</i> = 8.1, 1.7 Hz, 1H), 7.59 (d, <i>J</i> = 8.0 Hz, 1H), 7.44 (s, 2H), 6.11 (d, <i>J</i> = 8.0 Hz, 1H), 5.82 (dd, <i>J</i> = 32.6, 9.6 Hz, 1H), 4.60 (p, <i>J</i> = 8.8 Hz, 1H), 4.26 (ddd, <i>J</i> = 12.8, 7.2, 5.6 Hz, 1H), 3.22 (qd, <i>J</i> = 9.3, 1.9 Hz, 2H), 2.88 (qd, <i>J</i> = 12.5, 5.2 Hz, 2H), 1.34 - 1.14 (m, 1H), 1.24 (d, <i>J</i> = 7.2 Hz, 3H)	¹⁹ F NMR (376 MHz, CDCl ₃) δ -59.03, -69.35 (d, <i>J</i> = 2.3 Hz), -72.01, -111.91

F62		559 ([M-H] ⁻)	¹ H NMR (300 MHz, CDCl ₃) δ 7.82 (d, <i>J</i> = 1.6 Hz, 1H), 7.78 (dd, <i>J</i> = 8.1, 1.7 Hz, 1H), 7.59 (d, <i>J</i> = 8.1 Hz, 1H), 7.44 (s, 2H), 6.71 (s, 1H), 5.85 (dd, <i>J</i> = 32.6, 9.6 Hz, 1H), 4.60 (p, <i>J</i> = 8.8 Hz, 1H), 1.68 - 1.58 (m, 2H), 1.40 - 1.32 (m, 2H)	IR (薄膜) 2976, 1711, 1630, 1433, 1284, 1171, 1117, 1055, 701, 667, 654 cm ⁻¹
F63		534 ([M+H] ⁺); HRMS -ESI (<i>m/z</i>) C ₂₂ H ₁₄ ClF ₁₀ N O 之 [M+H] ⁺ 估算 值, 534.06 04; 發 現值, 534.06 77	¹ H NMR (500 MHz, CDCl ₃) δ 7.82 (d, <i>J</i> = 1.7 Hz, 1H), 7.74 (dd, <i>J</i> = 8.0, 1.7 Hz, 1H), 7.53 (d, <i>J</i> = 8.0 Hz, 1H), 7.46 (dd, <i>J</i> = 6.8, 2.3 Hz, 1H), 7.29 (ddd, <i>J</i> = 8.6, 4.4, 2.3 Hz, 1H), 7.18 (t, <i>J</i> = 8.6 Hz, 1H), 6.24 (d, <i>J</i> = 6.8 Hz, 1H), 5.86 (dd, <i>J</i> = 32.8, 9.7 Hz, 1H), 4.63 (p, <i>J</i> = 9.0 Hz, 1H), 4.40 (tdt, <i>J</i> = 6.4, 4.8, 3.2 Hz, 1H), 3.14 - 2.98 (m, 2H), 2.64 - 2.46 (m, 2H)	¹³ C NMR (126 MHz, CDCl ₃) δ 166.72, 158.97 (d, <i>J</i> = 62.4 Hz), 156.95 (d, <i>J</i> = 66.7 Hz), 136.11 (d, <i>J</i> = 2.1 Hz), 132.71 (d, <i>J</i> = 29.2 Hz), 130.89 (d, <i>J</i> = 20.2 Hz), 129.30 (d, <i>J</i> = 2.0 Hz), 128.49 - 127.30 (m), 126.35, 124.14 (d, <i>J</i> = 8.2 Hz), 122.51 (dd, <i>J</i> = 7.5, 5.0 Hz), 122.15 - 121.40 (m), 120.67, 118.46 (d, <i>J</i> = 6.5 Hz), 117.20 (d, <i>J</i> = 21.4 Hz), 116.26, 102.25 - 100.86 (m), 45.65 - 43.81 (m), 42.79 (dd, <i>J</i> = 24.2, 22.6 Hz), 35.56 (dd, <i>J</i> = 15.7, 8.5 Hz); ¹⁹ F NMR (471 MHz, CDCl ₃) δ -58.99, -69.65 (d, <i>J</i> = 11.3 Hz), -84.52 - -86.43 (m), -95.64 - -97.55 (m), -112.59 - -113.75 (m), -114.06 - -115.84 (m); IR (薄膜) 3262, 1644, 1500, 1299, 1170, 1114, 907, 732 cm ⁻¹

表5. FC系列化合物之結構和製備方法

編號	結構	Prep.*
FC1		13

*依據實施例編號來製備

表6. CC系列分子之結構和製備方法

編號	結構	Prep.*
CC1		1




*依據實施例編號來製備

表7：表5中化合物之分析數據

編號	Mp (°C)	質量 (m/z)	¹ H NMR	¹⁹ F NMR ; IR
FC1		508 ([M-H] ⁻)	¹ H NMR (400 MHz, CDCl ₃) δ 7.83 (d, <i>J</i> = 8.2 Hz, 2H), 7.64 (d, <i>J</i> = 8.3 Hz, 2H), 7.43 (s, 2H), 6.48 (t, <i>J</i> = 6.5 Hz, 1H), 5.80 (dd, <i>J</i> = 32.7, 9.6 Hz, 1H), 4.60 (p, <i>J</i> = 8.9 Hz, 1H), 4.24 - 3.99 (m, 2H)	¹⁹ F NMR (376 MHz, CDCl ₃) δ -69.39 (d, <i>J</i> = 2.3 Hz), -72.24, -111.74 (d, <i>J</i> = 5.0 Hz)

表8. PF系列分子之結構和製備方法

編號	結構	Prep.*
PF1		13

PF2		14
PF3		20
PF4		21

*依據實施例編號來製備

表9：表8中化合物之分析數據

編號	Mp (°C)	質量 (<i>m/z</i>)	¹ H NMR	IR
PF1		558.4 0 ([M+ H] ⁺)	¹ H NMR (300 MHz, DMSO- <i>d</i> ₆) δ 9.35 (t, <i>J</i> = 6.3 Hz, 1H), 8.16 - 8.09 (m, 1H), 8.08 (s, 2H), 8.01 - 7.98 (m, 1H), 7.78 - 7.62 (m, 4H), 6.33 (dd, <i>J</i> = 10.5, 34.2 Hz, 1H), 5.36 - 5.29 (m, 1H), 4.22 - 4.13 (m, 2H)	IR (薄膜) 3291, 2927, 1657, 1163, 767 cm ⁻¹

PF2	81- 84	566.0 0 ([M+ H] ⁺)	¹ H NMR (400 MHz, DMSO- <i>d</i> ₆) δ 9.22 (d, <i>J</i> = 7.2 Hz, 1H), 8.12 (s, 1H), 8.05 - 8.04 (m, 3H), 7.66 (d, <i>J</i> = 7.6 Hz, 1H), 6.85 (dd, <i>J</i> = 9.6, 35.6 Hz, 1H), 5.26 - 5.22 (m, 1H), 5.17 - 5.10 (m, 1H), 3.45 (t, <i>J</i> = 8.4 Hz, 2H), 3.30 (t, <i>J</i> = 8.4 Hz, 2H)	
PF3	164 - 165	582.9 8 ([M+ H] ⁺)	¹ H NMR (300 MHz, DMSO- <i>d</i> ₆) δ 9.20 (d, <i>J</i> = 7.2 Hz, 1H), 8.18 - 8.04 (m, 4H), 7.71 (d, <i>J</i> = 8.1 Hz, 1H), 6.88 (dd, <i>J</i> = 9.9, 35.4 Hz, 1H), 5.27 - 5.21 (m, 1H), 4.41 - 4.32 (m, 1H), 4.13 - 4.07 (m, 2H), 3.31 - 3.14 (m, 2H)	
PF4	111 - 113	596.0 0 ([M- H])	¹ H NMR (400 MHz, DMSO- <i>d</i> ₆) δ 9.49 - 9.38 (m, 1H), 8.15 - 8.04 (m, 3H), 7.90 - 7.88 (m, 1H), 7.73 (d, <i>J</i> = 8.4 Hz, 1H), 6.87 (dd, <i>J</i> = 10.4, 36.0 Hz, 1H), 5.28 - 5.22 (m, 1H), 4.67 - 4.60 (m, 2H), 4.54 - 4.48 (m, 1H), 4.18 - 4.13 (m, 2H)	

BAW、CEW & CL 分級表	
控制(或死亡率) %	分級
50-100	A
大於 0 - 小於 50	B
未測試	C
在此生物分析中未觀察到活性	D

GPA & YFM 分級表	
控制(或死亡率) %	分級
80-100	A
大於 0 – 小於 80	B
未測試	C
在此生物分析中未觀察到活性	D

表ABC：生物結果

編號	害蟲			
	BAW	CL	GPA	YFM
F1	A	A	C	C
F2	A	A	C	C
F3	A	A	B	C
F4	A	A	C	C
F5	A	A	C	C
F6	A	A	C	C
F7	A	A	A	C
F8	A	A	C	C
F9	A	A	C	C
F10	A	A	C	C
F11	A	A	C	A
F12	A	A	C	A
F13	A	A	C	C

F14	A	A	C	C
F15	A	A	C	A
F16	A	A	C	A
F17	A	A	C	C
F18	A	A	C	C
F19	A	A	B	C
F20	A	A	C	C
F21	A	A	C	A
F22	A	A	C	A
F23	A	A	C	A
F24	A	A	C	A
F25	A	A	C	A
F26	A	A	C	A
F27	A	A	C	A
F28	A	A	C	A
F29	A	A	C	A
F30	A	A	C	A
F31	A	A	C	A
F32	A	A	C	A
F33	A	A	C	B
F34	A	A	C	B
F35	A	A	C	C
F36	A	A	C	C
F37	A	A	C	C


F38	A	A	C	C
F39	A	A	C	C
F40	A	A	C	A
F41	A	A	C	A
F42	A	A	C	A
F43	A	A	C	A
F44	A	A	C	A
F45	A	A	C	B
F46	A	A	C	A
F47	A	A	C	C
F51	A	A	C	A
F52	A	A	C	A
F61	A	A	C	C
F62	A	A	C	C
F63	A	A	C	C
PF1	A	A	C	A
PF2	A	A	C	C
PF3	A	A	C	C
PF4	A	A	C	C

比較數據

【0260】對BAW及CL進行之生物分析係按照實施例A：對甜菜夜蛾(**Beet Armyworm**) (“**BAW**”)與甘藍銀紋夜蛾(**Cabbage Looper**) (“**CL**”)之生物分析中概述之流

程、使用所示的濃度來進行。結果在表CD1中示出。

表CD1




編號	R ¹⁰	5 μg/cm ²		0.5 μg/cm ²	
		BAW	CL	BAW	CL
FC1	H	25*	100	0	6
F39	CH ₃	33	100	27	100
F1	CF ₃	100	100	100	100

*控制(或死亡率)百分比

【發明申請專利範圍】

【第1項】 一種具下式之分子



式1

其中：

(A) R^1 、 R^5 、 R^6 、 R^{11} 及 R^{12} 各自獨立地選自於下列所構成的群組：H、F、Cl、Br、I、CN、(C₁-C₄)烷基、(C₁-C₄)鹵烷基、(C₁-C₄)烷氧基，以及(C₁-C₄)鹵烷氧基；

(B) R^2 、 R^3 及 R^4 各自獨立地選自於下列所構成的群組：H、F、Cl、Br、I、CN、(C₁-C₄)烷基、(C₂-C₄)烯基、(C₂-C₄)炔基、(C₁-C₄)鹵烷基、(C₁-C₄)烷氧基，以及(C₁-C₄)鹵烷氧基

(C) R^7 為(C₁-C₆)鹵烷基

(D) R^9 係選自於下列所構成的群組：(F)、H、F、Cl、Br、I、CN、(C₁-C₄)烷基、(C₁-C₄)鹵烷基、(C₁-C₄)烷氧基，以及(C₁-C₄)鹵烷氧基

(E) R^{10} 係選自於下列所構成的群組：(F)、F、Cl、Br、I、CN、(C₁-C₄)烷基、(C₂-C₄)烯基、(C₂-C₄)炔基、(C₁-C₄)鹵烷基、(C₁-C₄)烷氧基，以及(C₁-C₄)鹵烷氧基

(F) R^9 及 R^{10} 能選擇性地一起形成一個3至5員飽和或不飽和的、烴基(hydrocarbyl)鍵聯，

其中該烴基鍵聯可選擇性地以一個或更多個獨立地選自於下列所構成的群組之取代基予以取代：F、Cl、Br、I及CN；

(G) X係

(1)NR¹³R¹⁴，其中R¹³及R¹⁴各自獨立地選自於下列所構成的群組：H、CHO、(C₁-C₄)烷基、(C₂-C₄)烯基、(C₁-C₄)鹵烷基、(C₁-C₄)烷氧基、(C₁-C₄)鹵烷氧基、(C₃-C₈)環烷基、(C₁-C₄)烷基苯基、(C₁-C₄)烷基吡啶基、吡啶基、CH=NO(C₁-C₄)烷基、(C₁-C₄)烷基CH=NO(C₁-C₄)鹵烷基、(C₁-C₄)烷基NH(C₁-C₄)鹵烷基、(C₁-C₄)烷基N((C₁-C₄)烷基)(C₁-C₄)鹵烷基、硫環丁基(thietanyl)、硫環丁基-氧化物，以及硫環丁基-二氧化物，

其中各個烷基、烯基、鹵烷基、烷氧基、鹵烷氧基、環烷基、苯基、吡啶基、硫環丁基、硫環丁基-氧化物及硫環丁基-二氧化物可以選擇性地以一個或更多個獨立地選自於下列所構成的群組之取代基予以取代：F、Cl、Br、I、CN、OH、(C₁-C₄)烷基及(C₁-C₄)烷氧基；

(2)N=CHN((C₁-C₄)烷基)₂或

(3) Z，其中Z為一包含3至7個原子之雜環基，其中該等原子之至少一者為一氮，且其中該氮有一鍵往C(=Q)，

其中該雜環基可選擇性地以一個或更多個獨立地選自於下列所構成的群組之取代基予以取代：F、Cl、Br、I及CN；以及

(H) Q係選自於下列所構成的群組：O及S。

【第2項】 如請求項1之分子，其中

(A) R^1 、 R^5 、 R^6 、 R^{11} 及 R^{12} 為H；

(B) R^2 、 R^3 及 R^4 各自獨立地選自於下列所構成的群組：H、F、Cl、Br以及(C₁-C₄)烷基；

(C) R^7 為(C₁-C₆)鹵烷基；

(D) R^9 為H；

(E) R^{10} 係選自於下列所構成的群組：Br、(C₁-C₄)烷基及(C₁-C₄)鹵烷基；

(G) X係

(1) $NR^{13}R^{14}$ ，其中 R^{13} 及 R^{14} 各自獨立地選自於下列所構成的群組：H、CHO、(C₁-C₄)烷基、(C₁-C₄)鹵烷基、(C₃-C₈)環烷基、(C₁-C₄)烷基苯基、(C₁-C₄)烷基吡啶基、吡啶基，以及CH=NO(C₁-C₄)烷基，

其中各個烷基、鹵烷基、環烷基、苯基及吡啶基可以選擇性地以一個或更多個獨立地選自於下列所構成的群組之取代基予以取代：F、Cl、(C₁-C₄)烷基及(C₁-C₄)烷氧基；

(2) $N=CHN((C_1-C_4)烷基)_2$ 或

(3) **Z**，其中**Z**為一包含3至7個原子之雜環基，其中該等原子之至少一者為一氮，且其中該氮有一鍵往C(=Q)；以及

(H) **Q**係選自於下列所構成的群組：O及S。

【第3項】 如請求項1之分子，其中該分子係選自於表2的該等分子中之一者。

【第4項】 如請求項1之分子，其中該分子係選自於

表1的該等分子中之一者。

【第5項】 一種殺蟲組成物，其包含一如請求項1、2、3及4中任一項之分子，其進一步包含一或更多種活性成分。

【第6項】 如請求項5之殺蟲組成物，其中該活性成分係來自活性成分群組 α (AIGA)。

【第7項】 如請求項5之殺蟲組成物，其中該活性成分係選自於下列所構成的群組：**AI-1**、1,3-二氯丙烯、陶斯松(chlorpyrifos)、甲基陶斯松(chlorpyrifos-methyl)、六伏隆(hexaflumuron)、滅芬諾(methoxyfenozide)、多氟脲(noviflumuron)、賜諾特(spinetoram)、賜諾殺(spinosad)、氟啶蟲胺脲(sulfoxaflor)，以及磺醯氟。

【第8項】 一種殺蟲組成物，其包含一如請求項1、2、3及4中任一項之分子，其進一步包含一**MoA**材料。

【第9項】 如請求項7之殺蟲組成物，其中該**MoA**材料係來自**MoA**材料群組 α (**MoAMGA**)。

【第10項】 如請求項5、6、7、8及9中任一項之殺蟲組成物，其中該如式1之分子與該活性成分之重量比係選自於表B。

【第11項】 一種控制一害蟲的方法，該方法包含施用一殺蟲有效量的如請求項1、2、3及4中任一項之分子至一所在地。

【第12項】 一種控制一害蟲的方法，該方法包含施用一殺蟲有效量的如請求項5、6、7、8、9及10中任一項之

殺蟲組成物至一所在地。

【第13項】如請求項12之方法，其中該害蟲為螞蟻、蚜蟲、甲蟲、蠹蟲(brush-tails)、蟑螂、蟋蟀、蠼螋(earwigs)、跳蚤、蒼蠅、蚱蜢、葉蟬、蝨(包括海蝨)、蝗蟲、蠨、蛾、線蟲(nematode)、介殼蟲、綜合綱(symphylans)、白蟻、薊馬(thrips)、壁蝨、胡蜂，及/或粉虱。

【第14項】一種殺蟲組成物，其包含如請求項1、2、3及4中任一項之分子，及一種子。

【第15項】一種方法，其包含施用如請求項1、2、3及4中任一項之分子至一包括一非人類動物之所在地，以控制內寄生蟲及/或外寄生蟲。