




C (45) Patentti myönnetty
11.10.1983
(51) Kv.lk.*/Int.Cl. C 07 C 50/32

SUOMI-FINLAND

(FI)	(21) Patentihakemus - Patentansökning	823531
	(22) Hakemispäivä - Ansökningsdag	15.10.82
Patentti- ja rekisterihallitus	(24) Alkuperä - Giltighetsdag	15.10.82
Patent- och registerstyrelsen	(41) Tullut julkiseksi - Blivit offentlig	17.04.83
	(44) Nähtäväksipanon ja kuul.julkaisun pvm. - Ansökan utlagd och utl.skriften publicerad	31.05.89
	(86) Kv. hakemus - Int. ansökan	
	(32) (33) (31) Pyydetty etuoikeus - Begärd prioritet	16.10.81
	16.07.82 Iso-Britannia-Storbritannien(GB)	
	8131206, 8220680 Toteennäytetty-Styrkt	
	(71) The Wellcome Foundation Limited, 183-193 Euston Road, London, Iso-Britannia-Storbritannien(GB)	
	(72) Alan Thomas Hudson, Sevenoaks, Kent, Anthony Winchester Randall, Hayes, Kent, Iso-Britannia-Storbritannien(GB)	
	(74) Oy Kolster Ab	
	(54) Menetelmä terapeutisesti käyttökelpoisten naftokinonien valmistamiseksi, ja menetelmässä käyttökelpoisia välituotteita - Förfarande för framställ- ning av terapeutiskt användbara naftokinoner, och vid förfarandet använd- bara mellanprodukter	

(57) Tiivistelmä

Keksintö koskee kaavan I mukaisten 2-substituoitu-
jen 3-hydroksi-1,4-naftokinonien valmistusta,




niistä valmistettuja farmaseuttisia tai eläinlääke-
valmisteita, sekä niiden käyttöä ihmisten ja eläin-
ten hoidossa. Kaavassa I R on C₁₋₁₀-alkyyli-ryhmä
ja n on 0 tai 1.

Erityisen edullisia kaavan (I) mukaisia yhdisteitä
ovat 2-(4'-t-butyylisykloheksyyli)-3-hydroksi-1,4-
naftokinoni, 2-hydroksi-3-(4'-t-pentyylisykloheksyy-
li)-1,4-naftokinoni, 2-/trans-(4-t-butyylisyklohek-
syyli)metyyli-3-hydroksi-1,4-naftokinoni ja 2-/trans-
(4-t-pentyylisykloheksyyli)metyyli-3-hydroksi-1,4-
naftokinoni. Yhdisteet ovat arvokkaita alkueläinten
vastaisina aineina, erityisesti malariala, kokkidioosia
ja Theileria-loisien aiheuttamia infektioita hoidet-
taessa.

(57) Sammandrag

Uppfinningen hänför sig till framställningen av 2-substituerade 3-hydroxi-1,4-naftokinoner med formeln I




och farmaceutiska och veterinärmedicinska preparat därav, samt till användningen av dessa vid behandling av människor och djur. I formeln I är R en C_{1-10} -alkylgrupp och n är 0 eller 1.

Särskilt prefererade föreningar med formeln (I) är 2-(4'-t-butylcyklohexyl)-3-hydroxi-1,4-naftokinon, 2-hydroxi-3-(4'-t-pentylcyklohexyl)-1,4-naftokinon, 2-[trans-(4-t-butylcyklohexyl)metyl]-3-hydroxi-1,4-naftokinon och 2-[trans-(4-t-pentyl-cyklohexyl)metyl]-3-hydroxi-1,4-naftokinon. Föreningarna är värdefulla som antiprotozoala medel, i synnerhet vid behandlingen av malaria, kockidios och Theileria-parasiter förorsakade infektioner.

Menetelmä terapeuttisesti käyttökelpoisten naftokinonien valmistamiseksi, ja menetelmässä käyttökelpoisia välituotteita

- 5 Keksinnön kohteena on menetelmä kaavan (I) mukaisen terapeuttisesti käyttökelpoisten naftokinonijohdannaisien ja niiden farmaseuttisesti hyväksyttävien suolojen valmistamiseksi,



jossa R on suoraketjuinen C_{1-4} -alkyyli. Kaavan (I) mukaiset yhdisteet ovat käyttökelpoisia alkueläimien aiheuttamien, ihmisten ja eläinten infektioiden kemoterapiassa.

- 20 2-substituoiduilla 3-hydroksi-1,4-naftokinoneilla on viime aikoina kuvattu olevan alkueläinten vastainen vaikutus, erityisesti malarian vastainen vaikutus, ja pienemmässä määrin, itiöloisten vastainen vaikutus. Siten Fieser et al. (J. Amer. Chem. Soc. 70 (1948) 3156) ovat kuvanneet muutamia satoja tällaisia yhdisteitä malarian
- 25 vastaisesti vaikuttavina. Sellaisia näistä yhdisteistä, joissa sykloalkyyli-ryhmä oli kiinnittynyt kinonirenkaaseen, pidettiin erityisen aktiivisina, ja niitä on kuvattu US-patenttijulkaisussa nro 2 553 648. Joitakin näistä yhdisteistä annettiin ihmisille, mutta annetuilla yhdisteillä oli se heikkous, että tarvittiin suuria annoksia
- 30 terapeuttisen vaikutuksen aikaan saamiseksi ihmisellä. Sen jälkeen huomio siirtyi yhdisteisiin, joissa oli w-sykloheksyylialkyyli-sivuketju, erityisesti menoktoniin, 2-(8-sykloheksyylioktyyli)-3-hydroksi-1,4-naftokinoniin (esimerkiksi Fieser et al., J. Med. Chem. 10 (1967) 513), mut-
- 35

ta mielenkiinto sammui jälleen, koska vaikutus ihmisellä oli heikko.

US-patenttijulkaisussa nro 3 357 742 kuvataan 2-(4'-sykloheksyyli-sykloheksyyli)-1,4-naftokinoni itiöloisten vastaisena aineena, mutta tätä yhdistettä ei ole milloinkaan valmistettu kaupallisesti.

GB-patenttijulkaisussa nro 1 553 424 kuvataan 2-hydroksi-3-sykloheksyyli-alkyyli- ja 2-hydroksi-3-sykloheksyyli-1,4-naftokinonijohdannaisia tehokkaina teilerioosin ehkäisyssä ja hoidossa. EP-hakemusjulkaisu nro 78 101 426 sisältää mm. 3-hydroksi-1,4-naftokinoneja, joissa substituenttina 2-asemassa on C_{3-12} -sykloalkyylirengas, joka on mahdollisesti substituoitu C_{1-4} -alkyyllillä, erityisesti metyyllillä. Hakemuksessa ei kuitenkaan mainita mitään erityisiä substituoituja yhdisteitä, ei myöskään mainita, mihin kohtiin sykloalkyylirengaan substituentit tulisi liittää.

Kaavan (I) mukaisilla naftokinoneilla on havaittu olevan hyvin voimakas yhden tai useamman alkueläinlajin vastainen vaikutus. Siten tietyillä näistä yhdisteistä on paljon voimakkaampi aktiivisuus ihmisen loista *Plasmodium falciparum* vastaan kuin sukulaisyhdisteillä, joita aiemmin pidettiin mahdollisina malarian vastaisina aineina. Lisäksi näillä yhdisteillä on voimakas, laajaspektrinen vaikutus kaupallisesti tärkeitä *Eimeria*-lajeja, kokkidioosin aiheuttajia vastaan.

On huomattava, että substituoimattoman 1,4-naftokinonin 2- ja 3-asemat ovat identtiset, ja siten nimettäessä yhdisteitä ilmoitetaan sopimuksen mukaan, onko sykloheksyyli-substituentti vai hydroksyyli-ryhmä 2-asemassa. Muka-

vuuden vuoksi tässä hakemuksessa jätetään tarkemmin määrittelemättä yhdisteet, joissa substituentti on 2-asemassa.

Kaavan (I) mukaisissa yhdisteissä metyyli ja etyyli ovat edullisia symbolin R merkityksiä.

On huomattava, että kaavan (I) mukaiset yhdisteet voivat esiintyä cis- ja trans-isomeereina, so. sykloheksyylirengas voi olla cis- tai trans-substituoitu naftokinonirenkaalla ja 4-t-alkyyllillä. Keksintö sisältää sekä cis- että trans-isomeerit sekä niiden seokset kaikissa suhteissa. Yleensä silloin, kun yhdiste on isomeeriseoksena, trans-isomeeria on noin 50 %, tai se on hallitseva, mutta myös seokset, joissa cis-isomeeri on hallitseva, kuuluvat keksinnön piiriin. Isomeerien tarkka suhde voi vaihdella tarpeen mukaan; tyypillisissä seoksissa cis/trans-isomeerisuhde on noin 1:1, 40:60 tai 5:95.


Erityisiä kaavan (I) mukaisia yhdisteitä ovat: 2-(4'-butyyლისykloheksyyli)-3-hydroksi-1,4-naftokinoni, 2-hydroksi-3-(4'-t-pentyyლისykloheksyyli)-1,4-naftokinoni, niiden puhtaat cis- ja trans-isomeerit sekä isomeeriseokset mukaan luettuna.

Kaavan (I) mukaiset yhdisteet voivat esiintyä tautomeerisessa muodossa, jossa hydroksyyli-ryhmä luovuttaa protonin jollekin oksoryhmistä, ja tällaiset tautomeeriset muodot sisältyvät keksintöön. Uskotaan kuitenkin, että kaavan (I) mukainen muoto on pysyvä.

Koska kaavan (I) mukaisten yhdisteiden hydroksyyli-ryhmä voi muodostaa suoloja emästen kanssa, farmaseuttisesti hyväksyttäviin suoloihin kuuluvat alkalimetallikationin, kuten natriumin tai kaliumin, ja orgaanisten emästen, kuten etanoliamiinin, dietanoliamiinin ja N-metyyliyglukamiinin kanssa muodostetut suolat.


Kaavan (I) mukaisia yhdisteitä valmistetaan keksinnön mukaisesti siten, että

a) hydrolysoidaan yhdiste, jonka on kaava (II)



jossa R on suoraketjuinen C_{1-4} -alkyyli ja X on halogeeni; tai

b) suoritetaan kaavan (IB) mukaiselle yhdisteelle Hooker-hapetus



minkä jälkeen haluttaessa valmistetaan vaiheesta a) tai b) saadun kaavan (I) mukaisen yhdisteen trans-isomeeri epimeroimalla vastaava cis-isomeeri väkevöidyllä rikkipollalla.


Menetelmässä (a) muutetaan analoginen 3-halogeeni-, esimerkiksi 3-kloori- tai 3-bromiyhdiste, jolla on kaava (II), jossa X on halogeeni, vastaavaksi 3-hydroksiyhdisteeksi emäshydrolyysillä, esimerkiksi alkalimetallihydroksidilla sopivassa väliaineessa; esimerkiksi kaliumhydroksidi vesipitoisessa metanolissa on todettu sopivaksi.

Kaavan (II) mukaiset yhdisteet ovat uusia yhdisteitä. Niitä voidaan valmistaa alalla tunnetuilla menetelmillä rakenteeltaan analogisten yhdisteiden valmistamiseksi, esimerkiksi L. Fieserin (J. Am. Chem. Soc. (1948) 3165) menetelmällä.

Kaavan (I) mukaiset yhdisteet voidaan valmistaa myös vastaavista kaavan (IB) mukaisista yhdisteistä Hooker-hapetuksella (kts. esimerkiksi J. Am. Chem. Soc. (1948) 3174 tai 3215) (menetelmä b).

Kaavan (II) mukaisia yhdisteitä voidaan valmistaa esim. halogenoimalla alalla tunnetuilla menetelmillä yhdiste, jonka kaava on (III),

5




5

jossa n ja R ovat edellä määritellyt.

Alan asiantuntijoille on selvää, että yllä kuvatut valmistusmenetelmät voivat johtaa joko kaavan (I) mukaisen yhdisteiden isomeeriseoksiin (cis ja trans) tai, kun käytetään lähtöaineena puhdasta isomeeria, puhtaisiin kaavan (I) mukaisiin cis- tai trans-yhdisteisiin.


Kaavan (III) mukaisia yhdisteitä voidaan lisäksi valmistaa antamalla yhdisteen, jonka kaava on (VI),

15



jossa Y on halogeeni (esimerkiksi kloori tai bromi), reagoita sykloheksyyli- tai sykloheksyyylimetyyliryhmän luovuttajan kanssa, joka sisältää ryhmän

25



ja joka on sellaisessa muodossa, että se luovuttaa substituoitua sykloheksyyli- tai sykloheksyyylimetyyliryhmän vapaana radikaalina, jossa elektroni on oikeassa asemassa vastapäätä alkyyli-substituenttia, joko spontaanisti tai hapettavissa olosuhteissa.

Soveltuva luovuttaja on vastaava sykloalkaanikarbonsyylisäily, jolle voidaan tehdä hapettava dekarboksylaatio. Esimerkiksi persulfaatti katalysaattorin, kuten

35

hopeaionien, kanssa on hyvä tähän tarkoitukseen (kts. Jacobson N. et al. Annalen (1972) 763, 135 ja Acta Chem. Scand. 27 (1973) 3211). Hapettavana aineena käytetään sopivasti ammoniumpersulfaattia hopeanitraatilla katalysoiden.

Esimerkki luovuttajasta, jossa itsessään on peroksidiryhmä, on menetelmä, jossa käytetään asianmukaisesti substituoitua sykloalkanoyyliperoksidia (US-patenttijulkaisu nro 2 553 647).

Vapaan sykloalkyyli-radikaalin aikaan saaminen spontaanilla irtoamisella luovuttajasta voidaan saada aikaan esimerkiksi käyttämällä trisykloalkyyliboraania. Tällainen reagenssi on helppo valmistaa antamalla sykloalkeenin reagoida boraanidimetyylisulfidin kanssa. Reaktio on hyvä suorittaa liuotuksessa, esimerkiksi tetrahydrofuraanissa.

Muita mahdollisia sykloheksyylin tai sykloheksyyli-metyylin luovuttajia ovat t-alkyyli-substituoitunut sykloheksyyli- tai sykloheksyyli-metyyli-karboksyylilihapot.

Alan asiantuntijoille on selvää, että yllä mainitut menetelmät johtavat cis- ja trans-isomeerien seokseen.

On havaittu, että ei-stereospesifiset menetelmät johtavat yleensä cis- ja trans-isomeerien suhteeseen noin 1:1, trans-isomeerin määrää saatavassa tuotteessa voidaan lisätä säätämällä reaktio-olosuhteita, erityisesti valitsemalla liuotinsysteemi, johon trans-isomeeri on heikommin liukeneva. Tällaiset liuotinsysteemit on helppo määrittää kokeilemalla, mutta erityisen tehokkaaksi havaittu liuotinsysteemi on veden ja asetonitriilin seos. Käyttämällä tällaisia systeemejä voidaan saada cis/trans-suhteeksi noin 2:3-1:4.

Kun halutaan saada puhdas cis- tai trans-isomeeri, käytetään stereospesifistä synteesiä, esimerkiksi edellä kuvattua Hooker-hapetusta, tai erotetaan isomeerit fysikaalisin menetelmin. Tällaiset menetelmät ovat alalla hyvin tunnettuja, ja niihin kuuluvat esimerkiksi fraktioiva

kiteytys tai kromatografinen erotus.

On havaittu lisäksi, että kaavan (I) mukaisten yhdisteiden cis-isomeeri voidaan epimeroida trans-isomeeriksi. Tällainen kaavan (I) mukaisten yhdisteiden cis-isomeerin epimerointi trans-isomeeriksi on keksinnön lisäkoh-
5 teena.

Tämä voidaan saada aikaan erityisesti käsittelemällä tietyillä mineraalihapoilla, erityisesti väkevöidyllä rikkihapolla. Cis-isomeerin muuttumisaste trans-isomeeriksi tällaisissa epimeroinneissa voidaan säätää valitsemalla
10 asianmukaiset reaktio-olosuhteet, erityisesti lämpötila ja reaktion kesto. Asianmukaisissa olosuhteissa voidaan valmistaa suurinpiirtein puhdasta trans-isomeeria. Sopiva lämpötila on 50-70°C tai korkeampi, ja sopivat reaktioajat
15 ovat 6-24 h tai jopa 4-6 vrk tai pidempiä.

Yllä kuvattuja epimerointireaktioita voidaan tehdä puhtaille cis-isomeereille, mutta niitä käytetään mukavimmin isomeeriseoksille, jotka on valmistettu ei-stereospesifisillä synteessimenetelmillä. Reaktioita voidaan käyttää
20 joko valmistettaessa kaavan (I) mukaisten yhdisteiden trans-isomeereja, jotka ovat suurinpiirtein vapaita cis-isomeerista, tai valmistettaessa seoksia, joissa cis- ja trans-isomeerien suhde on toivottu, esimerkiksi 5:95, 3:97 tai jokin muu haluttu suhde.

Kaavan (I) mukaisten yhdisteiden on havaittu olevan hyvin aktiivisia ihmisen malarialoista Plasmodium falciparumia vastaan, ja niillä on siten käyttöä malarian hoidossa ja/tai ehkäisyssä ihmisellä. Kaavan (I) mukaisten yhdisteiden on havaittu olevan hyvin aktiivisia myös alku-
30 eläimiä vastaan, jotka aiheuttavat kaupallisesti tärkeitä kokkidioosimuotoja, erityisesti Eimeria tenellaa ja E. acervulinää vastaan, ja ne ovat siten käyttökelpoisia hoidettaessa tai ehkäistäessä kokkidioosia eläimissä, erityisesti linnuissa.

35 Kaavan (I) mukaisten yhdisteiden on havaittu olevan

myös sekä syklo-oksigenaasi- että lipo-oksigenaasientsyymien inhibiittoreita kaniinin liuskatumaisissa leukosyyteissä in vitro. On myös havaittu, että kaavan (I) mukaiset yhdisteet estävät leukosyyttien akkumuloitumista rotan
5 tulehtuneen silmän kammioveteen sekä suun kautta että paikallisesti annettuina.

Kaavan (I) mukaiset yhdisteet ovat siten arvokkaita hoidettaessa sairaustiloja, jotka voivat helpottua estettäessä arakidonihapon (A.A.:n) metabolian lipo-oksigenaasi- ja syklo-oksigenaasireitit, esimerkiksi hoidettaessa
10 niveltulehduksia, tulehtunutta ihoa (ihottumia) tai silmätulehdusta (esimerkiksi sidekalvontulehdusta).

On huomattava, että se määrä kaavan (I) mukaista yhdistettä, joka tarvitaan hoidossa tai ehkäisyssä, ei
15 vaihtele vain aktiivisen yhdisteen mukaan, vaan myös antotavan ja infektion tai tilan luonteen mukaan. Yleensä imettäväsille (ihminen mukaan luettuna) hoitotarkoituksessa soveltuva annos, esimerkiksi malariaa hoidettaessa, on 0,1-200 mg/kg vrk, edullisesti 1-100 mg, erityisesti
20 10-40 mg. Hoidettaessa tai ehkäistäessä kokkidioosia yhdistettä yleensä annetaan rajoittamattomina annoksina juomavedessä tai ruuassa, ja soveltuvat lääkepitoisuudet ovat 1-500 ppm, edullisesti 10-400 ppm, edullisimmin noin 200 ppm.

25 Vaikka on mahdollista antaa kaavan (I) mukaisia yhdisteitä sellaisenaan silloin, kun niitä käytetään alkueläinten vastaisina aineina, on edullista antaa aktiivinen aineosa farmaseuttisena tai eläinlääkevalmisteena.

Lääkevalmisteet sisältävät aktiivista aineosaa yhdessä yhden tai useamman farmaseuttisesti hyväksyttävän kantoaineen, ja mahdollisesti muiden terapeuttisten ja/tai
30 ehkäisevien aineosien kanssa. Kantoaineen tai -aineiden tulee olla "hyväksyttäviä" siinä mielessä, että niiden tulee soveltua yhteen valmisteen muiden aineosien kanssa,
35 eivätkä ne saa olla haitallisia potilaalle.

Aktiivisten yhdisteiden on hyvä olla (lääkevalmisteina) yksikköannosmuodossa. Soveltuva yksikköannosmuoto sisältää aktiivista yhdistettä tai aktiivisia yhdisteitä 10 mg-1 g.

- 5 Terapeuttisiin valmisteisiin kuuluvat suun kautta, peräsuolen kautta tai parenteraalisesti (sisältäen lihakseen ja laskimoon antamisen) annettavat valmisteet, vaikka suun kautta antaminen on edullinen antotapa. Valmisteet voivat, silloin kun se on tarkoituksenmukaista, olla erillisinä annosyksikköinä, ja ne voidaan valmistaa millä tahansa farmasiassa hyvin tunnetulla menetelmällä. Kaikkiin menetelmiin kuuluu vaihe, jossa aktiivinen aine sekoitetaan nestemäisiin tai hienojakoisiin kiinteisiin kantoaineisiin tai molempiin, ja muodostetaan sitten, mikäli
- 10 välttämätöntä, tuotteesta haluttu formula.

- Eläinlääketieteessä käytettävät lääkevalmisteet, erityisesti kokkidioosin hoitoon tarkoitettut valmisteet, ovat edullisesti joko jauheena tai nestemäisenä tiivisteenä. Tavanomaisen eläinlääkevalmistekäytännön mukaisesti
- 20 jauheisiin voidaan lisätä tavallisia vesiliukoisia lisäaineita, kuten laktoosia tai sakkaroosia, valmisteiden fyysikaalisten ominaisuuksien parantamiseksi. Erityisen edulliset keksinnön mukaiset jauheet sisältävät 50-100 paino-%, edullisesti 60-80 paino-%, yhtä tai useampaa aktiivista aineosaa, ja 0-50 paino-%, edullisesti 20-40 paino-% tavanomaisia eläinten lääkkeissä käytettäviä lisäaineita. Nämä jauheet voidaan joko lisätä eläinten ruokaan, esimerkiksi tekemällä välivaiheena esisekoitus, tai laimentaa eläinten juomaveteen.

- 30 Keksinnön mukaiset nestetiivistet sisälvät sopivasti kaavan (I) mukaista vesiliukoista yhdistettä tai sen suolaa, ja ne saattavat mahdollisesti sisältää eläinlääketieteessä hyväksyttävää veteen sekoituvaa liuotinta, esimerkiksi polyetyleeniglykolia, propyleeniglykolia, glyserolia, glyseroliformaldehydiä tai jotain tämänkaltaista
- 35

liuotinta sekoitettuna etanoliin, jota on korkeintaan 30 tilavuus-%. Nestemäiset tiivisteet voidaan annostella eläinten, erityisesti siipikarjan juomaveteen.


Keksinnön mukaisia yhdisteitä voidaan käyttää myös yhdessä muiden terapeuttisten aineiden, esimerkiksi muiden alkueläinten vastaisten aineiden kanssa. Keksinnön mukaisia yhdisteitä voidaan käyttää erityisesti yhdessä tunnettujen malarian vastaisten ja/tai kokkidioosin vastaisten aineiden kanssa.

Kun kaavan (I) mukaisia yhdisteitä käytetään yhdessä toisen saman loisen vastaisen terapeuttisen aineen kanssa, kunkin yhdisteen annos on erilainen kuin käytettäessä yhdistettä yksinään. Alan asiantuntijoiden on helppo määrittää soveltuvat annokset.

Kaavan (I) mukaisten yhdisteiden biologinen vaikutus

I. 2-(substituoitu sykloheksyyli)-3-hydroksinaftokinonien vaikutus Plasmodium falciparumia vastaan

Alla olevan kaavan mukaisten yhdisteiden, kaavan (I) mukaiset yhdisteet mukaan luettuina, Plasmodium falciparumia estävä vaikutus tutkittiin.



Koemenetelmä oli muunnos Desjardins'in et al. (Antimicrob. Agents and Chemotherapy 16 (1979) 710-718) menetelmästä. Yhdisteet liuotettiin etanoliin pitoisuudeksi 1000 mg/l, ja tehtiin laimennokset pitoisuuteen 1 mg/l asti.

Lääkeliuokset laimennettiin sarjassa käyttäen RPMI 1640 väliainetta + 10 % ihmisen plasmaa mikrotitrausmal-

joissa. Lisättiin loisten saastuttamia ja tuoreita veren punasoluja yhdessä G³H-hypoksantiinin kanssa RPMI 1640 väliaine + 10 % ihmisen plasmaan, ja viljelmiä inkuboitiin 36 h. Viljelmät kerättiin, hiukkasmainen sisältö kerättiin lasikuitu-suodatinpaperille ja pestiin runsaalla vesimäärällä. Suodatinpaperit kuivattiin, ja radioaktiivisuus mitattiin käyttäen tuikelaskuria. Infektoituja käsittelemättömiä ja infektoimattomia käsittelemättömiä viljelmiä käytettiin vertailunäytteinä. Prosentuaalinen inhibitio korreloitiin annoksen kanssa ED₅₀-arvon saamiseksi. Tulokset ovat taulukossa 1.

Taulukko 1

R ^A	ED ₅₀ (M)
4'-sykloheksyyli (100 % <u>trans</u>)	4,05 x 10 ⁻⁹
15 4'-metyyli (100 % <u>trans</u>)	9,2 x 10 ⁻⁹
3'- <u>t</u> -butyyli (80 % <u>trans</u>)	3,0 x 10 ⁻⁷
4'- <u>t</u> -butyyli (50 % <u>trans</u>)	5,99 x 10 ⁻¹⁰
(4'- <u>t</u> -butyyli (75 % <u>trans</u>)	5,63 x 10 ⁻¹¹
4'- <u>t</u> -butyyli (80 % <u>trans</u>)	3,75 x 10 ⁻¹¹
20 4'- <u>t</u> -butyyli (100 % <u>trans</u>)	5,71 x 10 ⁻¹¹
4'- <u>t</u> -butyyli (100 % <u>cis</u>)	1,08 x 10 ⁻⁹
4'- <u>t</u> -pentyyli (60 % <u>trans</u>)	6,0 x 10 ⁻¹¹
4'- <u>t</u> -butyyli (100 % <u>cis</u>)	1,08 x 10 ⁻⁹

Menoktonin [2-(8-sykloheksyylioktyyli)-3-hydroksi-1,4-naftokinoni] ED₅₀-arvon havaittiin olevan 2,55 x 10⁻⁷.

Tulokset osoittavat, että kaavan (I) mukaiset yhdisteet olivat merkittävästi aktiivisempia kuin muut yhdisteet, joiden aktiivisuutta ihmisen loista, *P. falciparumia* vastaan tutkittiin.

II. 2-(substituoitu sykloheksyyli)-3-hydroksinaftokinonien *Eimeria*-lajien vastainen vaikutus

a) Vaikutus in vitro *E. tenellaa* vastaan

Kohdassa I tutkittujen yhdisteiden aktiivisuus *E. tenellaa* vastaan tutkittiin. Kokeessa käytetyt viljelmät infektoitiin kypsiä itiöitä sisältävillä *E. tenella*-sus-

pensioilla välittömästi yhdisteiden lisäämisen jälkeen. Yhdisteistä tehtiin laimennussarjat esimerkin 8 mukaisesti pitoisuusalueella 19 µg/l-20 mg/l pienemmän inhiboivan pitoisuuden (MIC) määrittämiseksi. Kun viljelmiä oli inkuboitu 96 h, ne kiinnitettiin ja solut värjättiin 0,1 % toluidiinisinisellä. Värjätyistä viljelmistä tutkittiin mikroskooppisesti loisten läsnäolo. Tulokset ovat taulukossa 2.

Taulukko 2

10	R ^A	MIC(M)
	4'-sykloheksyyli (100 % <u>trans</u>)	9,2 x 10 ⁻⁸
	4'-metyyli (100 % <u>trans</u>)	4,6 x 10 ⁻⁷
	3'- <u>t</u> -butyyli (80 % <u>trans</u>)	4,0 x 10 ⁻⁶
	4'- <u>t</u> -butyyli (80 % <u>trans</u>)	1,0 x 10 ⁻⁸
15	4'- <u>t</u> -butyyli (100 % <u>trans</u>)	2,5 x 4,0 x 10 ⁻⁹
	4'- <u>t</u> -butyyli (100 % <u>cis</u>)	2,5 x 10 ⁻⁸
	4'- <u>t</u> -pentyyli (50 % <u>trans</u>)	9,6 x 10 ⁻⁹
	4'- <u>t</u> -pentyyli (60 % <u>trans</u>)	9,6 x 10 ⁻⁹
	4'- <u>t</u> -pentyyli (96 % <u>trans</u>)	9,6 x 10 ⁻⁹
20	b) Vaikutus in vivo E. tenellaa ja E. arveculinaa vastaan	
25	Esimerkissä 9 (a) tutkitut yhdisteet tutkittiin antikokkidioosikokeella in vivo. Yhdisteitä annettiin ryhmille, joissa oli kussakin 5 urospuolista Ross Ranger-kananpoikaa (7 vrk:n ikäisiä), erilaisina annoksina ruuan mukana 6 vrk:n ajan. Jokainen kananpoika infektoitiin Eimeria tenellalla ja E. arveculinalla päivän kuluttua lääkityksen aloittamisesta E. tenellan aiheuttamilta vaurioilta välttyneiden lintujen lukumäärä laskettiin 5 vrk:n kuluttua infektoinnista, samoin tutkittiin E. arveculina-itiörakkuloiden läsnä- tai poissaolo ulosteissa. Tulokset ovat taulukossa 3, jossa luvut ilmoittavat E. tenellasta selvinneiden lintujen lukumäärän, ja kirjaimet osoittavat E. arveculinan läsnä- tai poissaolon [A = poissa; P = läsnä; M = 95 % puhtaus käsittelemättömiin vertailunäytteisiin verrattuna].	
30		
35		

Verisuonten laajenemiskasvu 24 ja 48 h:n kuluttua tutkittiin rakolamppua käyttäen, sitten rotat tapettiin ja silmän kammiovesi poistettiin proteiinipitoisuuksien ja leukosyyttien kokonaismäärien mittaamiseksi. Tulokset annetaan seuraavassa ED_{50} -arvoina:

Antotapa	ED_{50}
Suun kautta	5-25 mg/kg
Paikallisesti	10-20 µg/silmä

Seuraavat esimerkit kuvaavat keksintöä:

10 Esimerkki A

4-tert-alkyyylisykloheksaanikarboksyylihappojen valmistus

Esimerkeissä lähtöaineina käytetyt karboksyylihapot valmistettiin seuraavasti:

15 i) 4-tert-butyylisykloheksaani-1-karboksyylihappo, 4-tert-butyylisykloheksyylietikkahappo ja niiden puhtaat cis- ja trans-isomeerit saatiin kaupallisina tuotteina tai valmistettiin kirjallisuudessa (J. Amer. Chem. Soc. 1970), 92, 2800 ja siinä esitetyt viitteet) kuvatulla tavalla.

20 ii) 4-tert-pentyylisykloheksyyli-1-karboksyylihappo (cis/trans-seos) ja puhdas trans-4-tert-pentyylisykloheksyyli-1-karboksyylihappo valmistettiin seuraavasti:

a) Cis/trans-4-tert-pentyylisykloheksyyli-1-karboksyylihapon valmistus

25 4-tert-pentyylisykloheksaani (49,2 g) liuotettiin eetteriin (200 ml), ja liuokseen lisättiin natriumsyanidia (24,46 g) ja vettä (30 ml). Seos jäähdytettiin 0°C:seen ja siihen lisättiin tipoittain väkevää kloorivetyhappoa 1 tunnin kuluessa samalla sekoittaen voimakkaasti. Sekoit-
30 tamista jatkettiin vielä 3 tuntia, sitten seoksen annettiin seistä yli yön. Reaktioseos pestiin kyllästetyllä natriummetabisulfiittiliuoksella (2 x 200 ml), eetterikerros kuivattiin natriumsulfaatilla ja haihdutettiin vakuumissa, jolloin saatiin 54,0 g syanihydriiniä vaaleankeltaisena öljynä.
35

- Syaanihydriini (54,0 g) liuotettiin vedettömän pyridiinin (70 ml) ja vedettömän bentseenin (70 ml) seokseen, liuosta sekoitettiin ja liuos jäähdytettiin 0°C: seen. Siihen lisättiin 0°C:ssa tiipoittain 45 minuutin kuluessa fosforyylikloridia (90 ml) pyridiinissä (83 ml). Reaktioseosta kuumennettiin palautusjäähdytyslämpötilassa 30 minuuttia, sitten seos jäähdytettiin, kaadettiin jäille, ja seosta sekoitettiin 30 minuuttia. Seos uutettiin eetterillä, uute pestiin vedellä, kuivattiin (natriumsulfaatti) ja haihdutettiin kuiviin vakuuissa, jolloin saatiin 48,4 g 1-4-tert-pentyyllisykloheks-1-eeni-1-nitriiliä, öljy. 1-4-tert-pentyyllisykloheks-1-eeni-1-nitriili (48,0 g) lisättiin kaliumhydroksidin (23,3 g) veden (34 ml) ja etanolin (150 ml) seokseen. Seosta kuumennettiin palautusjäähdyttään 72 tuntia, seos jäähdytettiin jäillä, laimennettiin vedellä (175 ml) ja tehtiin happameksi väkevällä kloorivetyhapolla. Saostunut väritön kiinteä sakka suodatettiin, pestiin vedellä ja kuivattiin. Sakkaa käsiteltiin etyyliasetaatilla ja 2-n natriumhydroksidiliuoksella, emäksinen kerros erotettiin, tehtiin happameksi väkevällä kloorivetyhapolla, ja erottunut kiinteä aine suodatettiin, pestiin vedellä ja kuivattiin, jolloin saatiin 33,65 g 4-tert-pentyyllisykloheks-1-eeni-1-karboksyylihappoa, sp. 123-125°C.
- 4-tert-pentyyllisykloheks-1-eeni-1-karboksyylihapo (33,5 g) liuotettiin etanoliin (275 ml), ja liuokseen lisättiin 10-%:ista Pd/C-katalysaattoria (1,0 g). Seosta hydrattiin 10 atm paineessa, kunnes teoreettinen vetymäärä oli sitoutunut. Katalysaattori suodatettiin ja väritön suodos haihdutettiin kuiviin vakuuissa, jolloin saatiin 27,0 g 4-tert-pentyyllisykloheksyyli-1-karboksyylihappoa öljynä (cis/trans-seos).
- b) Puhtaan trans-4-tert-pentyyllisykloheksyyli-1-karboksyylihapon valmistus
- Happojen cis-trans-seosta (12 g, valmistettu a)-

kohdassa) kuumennettiin höyryhauteella väkevän rikkihapon (60 ml) kanssa 16 tuntia. Reaktioseos jäähdytettiin ja kaadettiin jäälle, jolloin saostui musta kiinteä aine. Se suodatettiin ja kuivattiin, sitten sitä hierrettiin petrolieetterissä (kp. 40-60°C), kunnes suurin osa kiinteästä aineesta oli liuennut. Petrolieetteriuutetta käsiteltiin hiilellä, hiili suodatettiin, ja suodos haihdutettiin vakuumissa, jolloin saatiin 5,7 g trans-1-4-tert-pentyyli-sykloheksyyli-1-karboksyylihappoa, sp. 92-100°C. NMR-spektri osoitti sen olevan 95-97 %:sesti puhdasta trans-iso-meeria.

Esimerkki 1

2-(4'-t-butyylisykloheksyyli)-3-hydroksi-1,4-naftokinonin valmistus

2-kloori-1,4-naftokinonin (21 g), 4-t-butyylisykloheksaani-1-karboksyylihapon (19,8 g) ja hopeanitraatin (3,6 g) seosta pidettiin lämpötilassa 70-75°C sekoittaen voimakkaasti liuotinseoksessa, jossa oli 30 ml asetonitriiliä, 90 ml sulfolaania ja 210 vettä, ja lisättiin veteen (60 ml) liuotettu ammoniumpersulfaatti (34,2 g) pisaroittain 30 min aikana. Sekoitetusta ja lämmitystä jatkettiin vielä 1 h, seos jäähdytettiin jäähauteessa ja uutettiin dietyylieetterillä. Uutteet pestiin natriumbikarbonaatin vesiliuoksella, kuivattiin ja haihdutettiin alipaineessa puolikiinteäksi aineeksi, joka kiteytettiin kahdesti asetonitriilistä, jolloin saatiin 2-(4'-butyylisykloheksyyli)-3-kloori-1,4-naftokinoni, sp. 107-110°C. Siten saatu kloorikinoni (12,1 g) suspendoitiin kiehuvaan metanoliin (300 ml) ja lisättiin veteen (120 ml) liuotettu kaliumhydroksidi (12,1 g) pisaroittain 15 min. aikana. Seosta refluksoitiin vielä 1 h, ja se käsiteltiin sitten väkevöidyllä suolahapolla (60 ml). Seos jäähdytettiin jäähauteella, kiteinen aine kerättiin ja pestiin vedellä. Kiteyttämällä uudelleen asetonitriilistä saatiin 2-(4'-t-butyylisykloheksyyli)-3-hydroksi-1,4-naftokinonia (sp.

123-126°C). Tuotteen cis/trans-suhde oli noin 1:1.

Kun ensimmäisessä vaiheessa käytetty liuotinseos vaihdettiin asetonitriili-vesi-seokseen, saatiin lopputuote, jonka cis/trans-suhde oli 2:8 (sp. 126-128°C).

5 Esimerkki 2

2-(trans-4'-t-butyylisykloheksyyli)-3-hydroksi-1,4-naftokinonin valmistus

A. 1-trans-(4-t-butyylisykloheksyyli)-etikkahapon valmistus

10 4-t-butyylisykloheksaani-1-karboksyylihappoa
(50 g, cis- ja trans-isomeerien seos), kaliumhydroksidia (150 g) ja etyleeniglykolia (500 ml) refluksoitiin yön yli. Sitten reaktioseos kaadettiin murskattuihin jäihin (2000 g), tehtiin happamaksi väkevöidyllä suolahapolla, ja
15 syntynyt valkea sakka erotettiin suodattamalla. Märkä kiinteä aine liuotettiin etyyliasetattiin, vesikerros poistettiin, ja orgaaninen kerros kuivattiin magnesiumsulfaatilla. Poistettaessa liuotin alipaineessa saatiin valkea kiinteä aine, joka kiteytettiin uudelleen tolueenista,
20 jolloin saatiin 1-trans-(4-t-butyylisykloheksyyli)-karboksyylihappo (30,9 g sp. 172-174°C).

1-trans-(4-t-butyylisykloheksyyli)-karboksyylihappo (35 g) liuotettiin vedettömään eetteriin (250 ml), ja liuos lisättiin hitaasti vedettömään eetteriin (200 ml),
25 johon oli liuotettu 7,3 g litiumalumiinihydridiä, siten että seos kiehui hieman koko ajan. Kun lisäys oli saatu loppuun, seosta refluksoitiin sekoittaen vielä 1,5 h. Reaktioseos jäähdytettiin jäähauteella, ja lisättiin 200 ml jääkylmää 2N suolahappoa. Vesikerros erotettiin,
30 pestiin eetterillä (100 ml), yhdistetyt orgaaniset uutteet pestiin laimealla natriumhydroksidiliuoksella, sitten vedellä, kuivattiin (MgSO₄), ja liuotin poistettiin alipaineessa, jolloin saatiin väritön öljy (28 g). Edellä valmistettu 1-trans-(4-t-butyylisykloheksyyli)-metanoli
35 (28 g) liuotettiin kuivaan asetonitriiliin (330 ml), li-

sättiin 28,7 g vedetöntä litiumbromidia ja 44,5 g kloori-
trimetyylisilaania, ja seosta refluksoitettiin 60 h. Sitten
reaktioseoksen annettiin jäähtyä, ja liuotin poistettiin
alipaineessa. Jäännös liuotettiin eetteriin, pestiin ve-
dellä (100 ml), 10 % natriumbikarbonaattiliuoksella
(100 ml), vedellä (100 ml), kuivattiin (MgSO_4), ja liuo-
tin poistettiin alipaineessa. Puhdistettaessa raakatuote
pylväskromatograafisesti saatiin öljymäinen 1-trans-(4-t-
butyyylisykloheksyyli)-metaanibromidi (15,5 g).

- 10 Yllä mainittu bromidi (15 g) lisättiin heksametyy-
lifosforihappotriamidiin liuotettuun natriumsyanidiin
(4,83 g), ja seosta sekoitettiin ympäristön lämpötilassa
yön yli. Epäpuhtas reaktioseos laimennettiin vedellä (250
ml), ja uutettiin eetterillä (2 x 200 ml). Yhdistetyt or-
15 gaaniset kerrokset pestiin vedellä (3 x 100 ml), kuivat-
tiin (MgSO_4), ja liuotin poistettiin alipaineessa, jol-
loin saatiin 1-trans-(4-t-butyyylisykloheksyyli)-metaani-
nitriili värittömänä nesteenä (10,5 g).

- 1-trans-(4-t-butyyylisykloheksyyli)-metaaninitriiliä
20 (10 g), kaliumhydroksidia (20 g), etanolia (200 ml) ja
vettä (50 ml) refluksoitettiin 65 h. Suurin osa liuottimesta
poistettiin alipaineessa, ja jäännös liuotettiin veteen
(300 ml), ja uutettiin etyyliasetaatilla (100 ml). Vesi-
kerros tehtiin happamaksi suolahapolla ja uutettiin etyy-
25 liasetaatilla (2 x 100 ml). Yhdistetyt orgaaniset kerrok-
set pestiin vedellä (200 ml), kuivattiin (MgSO_4), ja yli-
määräinen liuotin poistettiin alipaineessa, ja kiinteä
jäännös trituroitiin kylmällä vedellä, jolloin saatiin 1-
trans-(4-t-butyyylisykloheksyyli)-etikkahappo (9,5 g, sp.
30 93-95°C).

B. 2-trans-(4-t-butyyylisykloheksyyli)metyyli-7-3-
hydroksi-1,4-naftokinonin valmistus

- Seosta, joka sisälsi 960 mg 2-kloori-1,4-naftokino-
nia, 990 mg 1-trans-(4-t-butyyylisykloheksyyli)-etikkahap-
35 poa (valmistettu julkaisun J. Amer. Chem. Soc. 92 (1970)

2800 mukaan) ja 250 mg hopeanitraattia asetonitrilissä (9 ml), refluksoitiin voimakkaasti sekoittaen, ja lisättiin veteen (12 ml) liuotettu ammoniumpersulfaatti (3,0 g) samanaikaisesti pisaroittain 1 h:n aikana. Seosta
5 refluksoitiin vielä 1 h, se jäähdytettiin jäähauteella, ja siten saatu keltainen kiinteä aine kerättiin ja pestiin vedellä. Kiinteä aine uutettiin kuumalla etyyliasetaatilla, josta saatiin jäähdytettäessä 2-[trans-(4-t-butyylisykloheksyyli)metyyli]-3-kloori-1,4-naftokinoni, sp. 154-
10 156°C. NMR-spektroskopiolla varmistettiin, että tuote oli 100 %:sesti trans-isomeeria.

Yllä kuvatulla tavalla valmistettua kloorikinonia (6 g) refluksoitiin dimetoksietaanissa (60 ml) ja vedessä (60 ml) lisäten samalla pisaroittain veteen (60 ml) liuotettu kaliumhydroksidi (6,0 g) 10 min:n aikana. Refluksointia jatkettiin vielä 15 min, seos jäähdytettiin nopeasti ympäristön lämpötilaan ja tehtiin happamaksi väke-
15 vöidyllä suolahapolla. Siten saatu kirkkaan keltainen kiinteä aine kerättiin, pestiin vedellä ja kuivattiin, jolloin saatiin 2-[trans-(4-t-butyylisykloheksyyli)-met-
20 yyli]-3-hydroksi-1,4-naftokinonia, sp. 180-182°C.

C. 2-(trans-4'-butyylisykloheksyyli)-3-hydroksi-1,4-naftokinonin valmistus

2-(trans-4'-butyylisykloheksyyli)-3-hydroksi-1,4-naftokinoni (4,36 g) liuotettiin dioksaaniin
25 (32 ml) ja lisättiin 1,6 g natriumkarbonaattia vedessä (32 ml) sekoittaen. Seos lämmitettiin 70°C:seen, lisättiin 3,0 ml 30 % vetyperoksidia ja jatkettiin lämmitystä. 30 min:n kuluttua lisättiin toinen annos (0,5 ml) 30 % vetyperoksidia ja jatkettiin lämmitystä, kunnes saatiin vaalean
30 keltainen liuos. Sitten seos jäähdytettiin jäissä ja käsiteltiin väkevädyllä suolahapolla (3,0 ml) ja sen jälkeen rikkidioksidilla kyllästetyllä vedellä (20 ml), ja pitäen lämpötila 0°C:ssa puhallettiin typpeä seoksen läpi voimak-
35 kaasti sekoittaen 2 h. Lisättiin 28 ml natriumhydroksidin

25 % vesiliuosta ja sen jälkeen veteen (68 ml) liuotettu kuparisulfaattipentahydraatti (13,2 g).

Seosta lämmitettiin välillä sekoittaen höyryhau-
teella 10 min, minkä jälkeen sitä sekoitettiin huoneen
5 lämpötilassa 10 min. Seos suodatettiin, ja kiinteä aine
pestiin dioksaanilla (2 x 10 ml), vedellä (2 x 10 min) ja
dioksaanilla (10 ml), ja yhdistetyt suodokset tehtiin hap-
pamiksi väkevöidyllä suolahapolla. Sakka kerättiin, pes-
tiin vedellä, kuivattiin ja kiteytettiin uudelleen petro-
10 lieetteristä (30 ml), jolloin saatiin 2-(trans-4'-t-butyylis-
isykloheksyyli)-3-hydroksi-1,4-naftokinonia, sp. 134-
136°C, jonka osoitettiin olevan puhdasta isomeeriä NMR-
spektroskopian avulla.

Esimerkki 3

15 2-(cis-4'-t-butyylisikloheksyyli)-3-hydroksi-1,4-
naftokinoni

Esimerkin 2 mukaisesti, mutta korvaamalla trans-
karboksyylihappo cis-karboksyylihapolla, valmistettiin 2-
(cis-4'-t-butyylisikloheksametyyli)-3-hydroksi-1,4-nafto-
20 kinoni (sp. 124-125°C) (välituote) ja 2-(cis-4'-t-butyylis-
isykloheksyyli)-3-hydroksi-1,4-naftokinoni (sp. 113-115°C),
joiden osoitettiin olevan puhtaita isomeerejä NMR-spek-
troskopian avulla. Välituotteena olevan 3-kloorijohdannai-
sen, 2-(cis-4'-t-butyylisikloheksyyli)-3-kloori-
25 1,4-naftokinonin sp. oli 111-113°C.

Esimerkki 4

2-hydroksi-3-(4'-t-pentyylisikloheksyyli)-1,4-naf-
tokinoni

Valmistettiin esimerkin 1 mukaisesti 2-hydroksi-3-
30 (4'-t-pentyylisikloheksyyli)-1,4-naftokinoni, sp. 79-81°C.
Cis/trans-isomeerien suhteen havaittiin olevan 2:3 NMR-
spektroskopian avulla. Välituote, 2-kloori-3-(4'-t-pentyy-
lisikloheksyyli)-1,4-naftokinoni oli jäykkäliikkeen
öljy.

Esimerkki 5

35 Cis-2-(4'-t-butyylisikloheksyyli)-3-hydroksi-1,4-

naftokinonin epimerointi

- 2-(4'-t-butyylisykloheksyyli)-3-hydroksi-1,4-naftokinonin cis- ja trans-isomeerien seos (noin 1:1, katso esimerkki 1) (10 g) liuotettiin väkevöityyn rikkihappoon (100 ml), ja liuosta pidettiin vaihtelevissa lämpötiloissa vaihtelevia aikoja alla olevan taulukon mukaisesti. Reaktion lopussa seos jäähdytettiin ja kaadettiin pisaroittain jää/vesi-seokseen, jolloin saatiin epäpuhtas tuote, joka puhdistettiin kiteyttämällä uudelleen edellä kuvatulla tavalla ja/tai pylväskromatografialla. Tuotteen isomeerisuhde määritettiin NMR:lla ja GLC:lla; tulokset ovat seuraavat:

	Lämpötila °C	Aika	Isomeerisuhde trans/cis
	50	4 vrk	93:7
15	56	24 h	96,5:3,5
	56	24 h	97,7:2,3 (uudelleen kiteytetty)
	70	4 h	92,0:8,0
	70	6 h	97,8:2,2
	70	6 h	99,2:0,8 (uudelleen kiteytetty)
20	70	21 h	99,4:0,6
	70	21 h	99,9:0, (uudelleen kiteytetty)

Esimerkkejä farmaseuttisista preparaateista

"Päälle kaadettava" valmiste

- "Päälle kaadettava" valmiste karjaa varten voidaan valmistaa seuraavasti:
- | | |
|---|--------------|
| Kaavan (I) mukaista yhdistettä | 4 paino-osaa |
| Dimetyylisulfoksidia | 10 " |
| Risiiniöljyä, täytetään 100 paino-osaan | |

Vesisuspensio

- Vesisuspensio voidaan valmistaa seuraavasti:
- | | |
|--------------------------------|-----------------|
| Kaavan (I) mukaista yhdistettä | 1,00 paino-osaa |
| Neosyl | 16,00 " |
| Bentoiittia | 3,20 " |
| Glyseriiniä | 15,00 " |
| 35 Natriumbentsoaattia | 1,00 " |
| Bevaloid 35/2 | 1,00 " |

Tymolia	0,04	"
Vettä	62,76	"
	100,00 paino-osaa	

Nuolukivi

- 5 Nuolukivi voidaan valmistaa sekoittamalla hienojakoinen kaavan (I) mukainen yhdiste (0,5 paino-osaa) natriumkloridiin (99,5 paino-osaa) ja puristamalla seos möhkäleiksi.

Tahna

Voidaan valmistaa seuraava tahna:

10	Kaavan (I) mukaista yhdistettä	3,0	paino-osaa
	Traganttikumia	4,0	"
	Bevaloid 35/3	1,0	"
	Nipagin "M"	0,1	"
	Glyseriiniä	19,0	"
15	Vettä	72,9	
		100,0 paino-osaa	

Injektioliuos

Ihon alle ruiskutettava liuos voidaan valmistaa sekoittamalla:

20	Kaavan (I) mukaista yhdistettä	4,5	paino-osaa
	Methocel	2,0	"
	Nipagin "M"	0,1	"
	Vettä	93,4	"
		100 paino-osaa	

25 Injektioliuos

Lihakseen ruiskutettava liuos voidaan valmistaa sekoittamalla:

	Kaavan (I) mukaista yhdistettä	9,5	paino-osaa
	Dimetyylisulfoksidia	19,0	"
30	Sorbitaanimononoleaattia	4,5	"
	Maissiöljyä	67,0	
		100,0 paino-osaa	

Injektioliuos

Valmistettiin seuraava injektioliuos:


35	Kaavan (I) mukaista yhdistettä	5	paino-osaa
	N-metyylipyrrolidonia	48,3	"

	Tween 80	2	"
	Span 80	4,7	"
	Miclyol 812	40	"
		100,0	paino-osaa
5	<u>Tablettivalmiste</u>		
	Kaavan (I) mukaista yhdistettä	100 mg	
	Laktoosia	100 mg	
	Maissitärkkelystä	30 mg	
	Magnesiumstearaattia	2 mg	
10		232 mg	
	<u>Suun kautta annettava suspensio</u>		
	Kaavan (I) mukaista yhdistettä	50 mg	
	Avicel RC 591	75 mg	
	Sakkarosisiirappia	3,5 ml	
15	Metyylihydroksibentsoaattia	5 mg	
	Väriainetta	0,01 g/100 ml	
	Kirsikka-aromia	0,1 g/100 ml	
	Tween 80	0,2 tilavuus-%	
	Vettä, täytetään 5 ml:ksi		
20	<u>Injektiosuspensio</u>		
	Kaavan (I) mukaista yhdistettä	100 mg	
	Polyvinyylipyrrolidiiniä (RVP)	170 mg	
	Tween 80	0,2 tilavuus-%	
	Metyylihydroksibentsoaattia	0,1 mg/100 ml	
25	Injektioon soveltuvaa vettä, täytetään 3 ml:ksi		
	<u>Kapseli</u>		
	Kaavan (I) mukaista yhdistettä	100 mg	
	Tärkkelys 1500	150 mg	
	Magnesiumstearaatti	2,5 mg	
30	pakataan pehmeään gelatiinikapseliin.		

Patenttivaatimukset

1. Menetelmä kaavan (I) mukaisten terapeuttisesti
 käyttökelpoisten naftokinonijohdannaisten ja niiden far-
 5 maseuttisesti hyväksyttävien suolojen valmistamiseksi,

10




jossa R on suoraketjuinen C_{1-4} -alkyyli, t u n n e t t u
 siitä, että

15

a) hydrolysoidaan yhdiste, jonka kaava on (II)

20




jossa R on suoraketjuinen C_{1-4} -alkyyli ja X on halogeeni;
 tai

25

b) suoritetaan kaavan (IB) mukaiselle yhdisteelle
 Hooker-hapetus

30



minkä jälkeen haluttaessa valmistetaan vaiheesta a) tai
 35 b) saadun kaavan (I) mukaisen yhdisteen trans-isomeeri
 epimeroimalla vastaava cis-isomeeri väkevöidyllä rikkiha-


polla.

2. Patenttivaatimuksen 1 mukainen menetelmä,
t u n n e t t u siitä, että valmistetaan kaavan (I) mukai-
nen yhdiste, jossa R on metyyli.

5 3. Patenttivaatimuksen 1 mukainen menetelmä,
t u n n e t t u siitä, että valmistetaan kaavan (I) mu-
kainen yhdiste, jossa R on etyyli.

4. Patenttivaatimuksen 1 mukainen menetelmä,
t u n n e t t u siitä, että kaavan (I) mukainen yhdiste
10 valmistetaan trans-isomeerinä.


5. Kaavan (IB) mukaiset 2-substituoidut 3-hydroksi-
1,4-naftokinonit,



20 jossa kaavassa R merkitsee suoraketjuista C₁₋₄-alkyyliä.

Patentkrav


1. Förfarande för framställning av terapeutiskt användbara naftokinonderivat med formeln (I) och farmaceutiskt godtagbara salter därav,



(I)

vari R är en rakkedjad C_{1-4} -alkyl, k ä n n e t e c k - n a t därav, att man


a) hydrolyserar en förening med formeln (II)



(II)

vari R är en rakkedjad C_{1-4} -alkyl och X är halogen; eller

b) Hooker-oxiderar en förening med formeln (IB)



(IB)

varefter, ifall önskvärt, framställs trans-isomeren av föreningen med formeln (I), som erhållits i steget a) eller b), genom epimeriserande av den motsvarande cis-isomeren med koncentrerad svavelsyra.


2. Förfarande enligt patentkravet 1, k ä n n e -

t e c k n a t därav, att man framställer en förening med formeln (I) där R är metyl.

3. Förfarande enligt patentkravet 1, k ä n n e -
t e c k n a t därav, att man framställer en förening med
5 formeln (I) där R är etyl.

4. Förfarande enligt patentkravet 1, k ä n n e -
t e c k n a t därav, att man framställer föreningen med
formeln (I) som trans-isomer.

5. 2-substituerade 3-hydroxi-1,4-naftokinoner med
10 formeln (IB),



i vilken formeln R betecknar en rakkedjad C_{1-4} -alkyl.

20 Viitejulkaisuja-Anförda publikationer

Hakemusjulkaisuja:-Ansökningspublikationer: EP 2228 (C 07 C 49/74).
Patenttijulkaisuja:-Patentskrifter: USA(US) 3 578 686 (C 07 C 49/00),
2 553 647, 2 553 648 (260-396).