

(12) 按照专利合作条约所公布的国际申请

(19) 世界知识产权组织
国际局



(10) 国际公布号

WO 2020/199860 A1

(43) 国际公布日

2020 年 10 月 8 日 (08.10.2020)

(51) 国际专利分类号:

C07K 16/28 (2006.01) A61K 47/68 (2017.01)
C07K 19/00 (2006.01) A61K 35/17 (2015.01)
G01N 33/68 (2006.01) A61P 35/00 (2006.01)
G01N 33/577 (2006.01) A61P 31/00 (2006.01)
G01N 33/574 (2006.01) A61P 37/02 (2006.01)
A61K 39/395 (2006.01) A61P 29/00 (2006.01)

LR, LS, LU, LY, MA, MD, ME, MG, MK, MN, MW, MX,
MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH, PL,
PT, QA, RO, RS, RU, RW, SA, SC, SD, SE, SG, SK, SL,
ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US,
UZ, VC, VN, WS, ZA, ZM, ZW。

(21) 国际申请号:

PCT/CN2020/078596

(22) 国际申请日:

2020 年 3 月 10 日 (10.03.2020)

(25) 申请语言:

中文

(26) 公布语言:

中文

(30) 优先权:

201910258182.5 2019年4月1日 (01.04.2019) CN

(71) 申请人: 华博生物医药技术(上海)有限公司(HUABO BIOPHARM (SHANGHAI) CO., LTD.)
[CN/CN]; 中国上海市浦东新区中国(上海)自由贸易试验区蔡伦路 538 号 1 幢 1 楼, Shanghai 201203 (CN)。

(72) 发明人: 于海佳(YU, Haijia); 中国上海市浦东新区中国(上海)自由贸易试验区蔡伦路 538 号 1 幢 1 楼, Shanghai 201203 (CN)。俞玲(YU, Ling); 中国上海市浦东新区中国(上海)自由贸易试验区蔡伦路 538 号 1 幢 1 楼, Shanghai 201203 (CN)。蔡明清(CAI, Mingqing); 中国上海市浦东新区中国(上海)自由贸易试验区蔡伦路 538 号 1 幢 1 楼, Shanghai 201203 (CN)。朱向阳(ZHU, Xiangyang); 中国上海市浦东新区中国(上海)自由贸易试验区蔡伦路 538 号 1 幢 1 楼, Shanghai 201203 (CN)。

(74) 代理人: 上海一平知识产权代理有限公司(XU & PARTNERS, LLC.); 中国上海市普陀区真北路 958 号天地科技广场 1 号楼 106 室, Shanghai 200333 (CN)。

(81) 指定国(除另有指明, 要求每一种可提供的国家保护): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BN, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DJ, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IR, IS, JO, JP, KE, KG, KH, KN, KP, KR, KW, KZ, LA, LC, LK,

(84) 指定国(除另有指明, 要求每一种可提供的地区保护): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SD, SL, ST, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), 欧亚 (AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM), 欧洲 (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, KM, ML, MR, NE, SN, TD, TG)。

本国际公布:

- 包括国际检索报告(条约第21条(3))。
- 包括说明书序列表部分(细则5.2(a))。

(54) Title: BINDER AGAINST PROGRAMMED DEATH-LIGAND AND APPLICATION THEREOF

(54) 发明名称: 针对程序性死亡配体的结合物及其应用

(57) Abstract: Provided is an anti-PD-L1 monoclonal antibody. The antibody can be used to prepare a drug for preventing or treating a disease related to PD-L1.

(57) 摘要: 提供了一种抗PD-L1单克隆抗体, 可用于制备预防或治疗PD-L1相关的疾病的药物。



WO 2020/199860 A1

针对程序性死亡配体的结合物及其应用

技术领域

本发明涉及医药领域，具体地涉及针对程序性死亡配体(PD-L1)的结合物及其应用。

5

背景技术

程序性死亡 1(PD-1)是 CD28 受体家族的成员，该家族包括 CD28、CTLA-4、ICOS、PD-1 和 BTLA。该家族的最初成员 CD28 和 ICOS 通过添加单克隆抗体后增强 T 细胞增殖的功能而发现(Hutloff 等(1999)，Nature 397：263-266；Hansen 等(1980)，Immunogenics10:247-260)。已经鉴定了 PD-1 的两种细胞表面糖蛋白配体 PD-L1 和 PD-L2，已经表明它们在与 PD-1 结合后下调 T 细胞活化和细胞因子分泌(Freeman 等(2000)，J Exp Med192: 1027-34；Latchman 等(2001)，Nat Immunol 2: 261-8；Cater 等(2002)，Eur J Immunol32: 634-43；Ohigashi 等(2000)，Cl in Cancer Res 11: 2947-53)。PD-L1(B7-H1)和 PD-L2(B7-DC)都是可与 PD-1 结合但是不与其他 CD28 家族成员结合的 B7 同源物(Blank 等 2004)。

15

PD-L1 的表达已经在几种人类癌症中发现，包括人肺癌、卵巢癌、结肠癌、黑色素瘤和各种骨髓瘤(Iwai 等(2002)，PNAS 99: 12293-7；Ohigashi 等(2000，Cl in Cancer Res 11: 2947-53)。已有的结果显示，肿瘤细胞高表达的 PD-L1 通过增加 T 细胞的凋亡从而在肿瘤的免疫逃逸中起着重要的作用。研究者发现，转染 PD-L1 基因的 P815 肿瘤细胞系在体外可抵制特异性 CTL 的裂解，将其接种小鼠体内后具有更强的致瘤性和侵袭性。这些生物学特性均可通过阻断 PD-L1 而逆转。敲除 PD-1 基因的小鼠，阻断 PD-L1 /PD-1 通路，则接种肿瘤细胞不能形成肿瘤(Dong 等(2002)，Nat Med 8: 793-800)。也已经提示 PD-L1 可能与肠粘膜炎症有关，并且 PD-L1 的抑制防止了与结肠炎有关的萎缩病(Kanai 等(2003)，JImmunol 171: 4156-63)。PD-1 是首先在激活的 T 细胞和 B 细胞上表达的免疫抑制性受体。该受体与其配体的相互作用在体外和体内一直显示减弱的 T 细胞应答。阻断 PD-1 与其配体之一 PD-L1 间的相互作用显示提高肿瘤特异性 CD8⁺T 细胞的免疫性，因此，可有助于免疫系统清除肿瘤细胞。

20

25

PD-1/PD-L1 途径是开发癌症治疗的抗体疗法的被充分证实的靶标。抗 PD-1 抗体还可用于慢性病毒性感染。在急性病毒性感染后产生的记忆 CD8⁺T 细胞具有很高功能，并构成保护性免疫的重要组分。与此相反，慢性感染的特征常常在于病毒特异性 T 细胞应答的不同程度的功能受损(衰竭)，这种缺陷是宿主不能消除持续的病原体的主要原因。

30

尽管在感染的早期阶段最初产生功能效应 T 细胞，但它们在慢性感染期间逐渐失去功能。Barber 等(Barber 等，Nature 439 : 682-687 (2006))显示，用 LCMV 实验室毒株感染的小鼠发展为导致血液和其它组织均有高水平病毒的慢性感染。这些小鼠最初会产生较强的 T 细胞应答，但随着 T 细胞衰竭而最终受到感染。作者发现在慢性感染小鼠中的效应 T 细胞的数量和功能下降可通过注射阻断 PD-1 和 PD-L1 之间相互作用的抗体来逆转。

35

最近，有研究显示 PD-1 在来自 HIV 感染的个体的 T 细胞中高度表达，并且受体表达与 T 细胞功能损伤和疾病进展相关(D 町等，Nature443 : 350-4(2006)；Trautmann L. 等，Nat. Med. 12 : 1198-202(2006))。在两项研究中，对配体 PD-L1 的阻断都显著增加了

HIV 特异性产 IFN γ 细胞的体外增殖。

总之，本领域仍需要能够与 PD-L1 高亲和力结合，并且能够阻断 PD-1 与 PD-L1 结合的抗 PD-L1 抗体。

5 发明内容

本发明目的是提供一种高亲和力高生物活性的 PD-L1 抗体及其应用，能够与 PD-L1 高亲和力结合，并且能够阻断 PD-1 与 PD-L1 结合。

本发明另一目的是提供一种程序性死亡配体 1 (PD-L1) 结合分子及其用途，特别是在治疗和/或预防、或诊断 PD-L1 相关疾病例如肿瘤中的用途。

10

本发明的第一方面，提供了一种抗体的重链可变区，所述的重链可变区包括以下三个互补决定区 CDR：

SEQ ID NO. : 3 所示的 CDR1，

SEQ ID NO. : 4 所示的 CDR2，和

15

SEQ ID NO. : 5 所示的 CDR3。

在另一优选例中，上述氨基酸序列中任意一种氨基酸序列还包括任选地经过添加、缺失、修饰和/或取代至少一个(如 1-3 个，较佳地 1-2 个，更佳地 1 个)氨基酸并能够保留 PD-L1 结合亲和力的衍生序列。

在另一优选例中，所述重链可变区还包括人源的 FR 区或鼠源的 FR 区。

20

在另一优选例中，所述重链可变区具有 SEQ ID NO. : 1 所示的氨基酸序列。

在另一优选例中，所述重链可变区具有 SEQ ID NO. : 8 所示的氨基酸序列。

本发明的第二方面，提供了一种抗体的重链，所述的重链具有如本发明第一方面所述的重链可变区。

25

在另一优选例中，所述的抗体的重链还包括重链恒定区。

在另一优选例中，所述的重链恒定区为人源、鼠源或兔源的。

本发明的第三方面，提供了一种抗体的轻链可变区，所述的轻链可变区包括以下三个互补决定区 CDR：

30

SEQ ID NO. : 6 所示的 CDR1'，

氨基酸序列为 GIS 的 CDR2'，和

SEQ ID NO. : 7 所示的 CDR3'。

在另一优选例中，上述氨基酸序列中任意一种氨基酸序列还包括任选地经过添加、缺失、修饰和/或取代至少一个(如 1-3 个，较佳地 1-2 个，更佳地 1 个)氨基酸并能够保留 PD-L1 结合亲和力的衍生序列。

35

在另一优选例中，所述轻链可变区还包括人源的 FR 区或鼠源的 FR 区。

在另一优选例中，所述轻链可变区具有 SEQ ID NO. : 2 所示的氨基酸序列。

在另一优选例中，所述轻链可变区具有 SEQ ID NO. : 9 所示的氨基酸序列。

本发明的第四方面，提供了一种抗体的轻链，所述的轻链具有如权本发明第三方面所述的轻链可变区。

在另一优选例中，所述的抗体的轻链还包括轻链恒定区。

在另一优选例中，所述的轻链恒定区为人源、鼠源或兔源的。

5

本发明的第五方面，提供了一种抗体，所述抗体具有：

(1) 如本发明第一方面所述的重链可变区；和/或

(2) 如本发明第三方面所述的轻链可变区；

或者，所述抗体具有：如本发明第二方面所述的重链；和/或如本发明第四方面所述的轻链。

10

在另一优选例中，所述抗体对人 PD-L1 蛋白(优选野生型)的亲力的 EC_{50} 为 30-80ng/ml。

在另一优选例中，所述抗体对人 PD-L1 蛋白(优选野生型)的亲力的 EC_{50} 为 40-50ng/ml。

15

在另一优选例中，所述抗体选自：动物源抗体、嵌合抗体、人源化抗体、或其组合。

在另一优选例中，所述的抗体为双链抗体、或单链抗体。

在另一优选例中，所述的抗体为单克隆抗体。

在另一优选例中，所述的抗体是部分或全人源化的单克隆抗体。

在另一优选例中，所述抗体的重链可变区序列如 SEQ ID NO. : 1 或 8 所示；和/或所述的抗体的轻链可变区序列如 SEQ ID NO. : 2 或 9 所示。

20

在另一优选例中，所述抗体的重链可变区序列如 SEQ ID NO. : 1 所示；并且所述的抗体的轻链可变区序列如 SEQ ID NO. : 2 所示。

在另一优选例中，所述抗体的重链可变区序列如 SEQ ID NO. : 8 所示；并且所述的抗体的轻链可变区序列如 SEQ ID NO. : 9 所示。

25

在另一优选例中，所述的抗体为药物偶联物形式。

本发明的第六方面，提供了一种重组蛋白，所述的重组蛋白具有：

(i) 如本发明第一方面所述的重链可变区、如本发明第二方面所述的重链、如本发明第三方面所述的轻链可变区、如本发明第四方面所述的轻链、或本发明第五方面所述的抗体；以及

30

(ii) 任选的协助表达和/或纯化的标签序列。

在另一优选例中，所述的标签序列包括 6His 标签。

在另一优选例中，所述的重组蛋白(或多肽)包括融合蛋白。

在另一优选例中，所述的重组蛋白为单体、二聚体、或多聚体。

35

本发明的第七方面，提供了一种 CAR 构建物，所述的 CAR 构建物的抗原结合区域包括特异性结合于 PD-L1 的 scFv，并且所述 scFv 具有如本发明第一方面所述的重链可变区和如本发明第三方面所述的轻链可变区。

本发明的第八方面，提供了一种重组的免疫细胞，所述的免疫细胞表达外源的如本发明第七方面所述的 CAR 构建物。

在另一优选例中，所述的免疫细胞选自下组：NK 细胞、T 细胞、NKT 细胞、或其组合。

在另一优选例中，所述的免疫细胞来自人或非人哺乳动物(如鼠)。

5

本发明的第九方面，提供了一种抗体药物偶联物，所述的抗体药物偶联物含有：

(a) 抗体部分，所述抗体部分选自下组：如本发明第一方面所述的重链可变区、如本发明第二方面所述的重链、如本发明第三方面所述的轻链可变区、如本发明第四方面所述的轻链、或本发明第五方面所述的抗体、或其组合；和

10 (b) 与所述抗体部分偶联的偶联部分，所述偶联部分选自下组：可检测标记物、药物、毒素、细胞因子、放射性核素、酶、或其组合。

在另一优选例中，所述的抗体部分与所述的偶联部分通过化学键或接头进行偶联。

在另一优选例中，所述偶联物部分选自：荧光或发光标记物、放射性标记物、MRI (磁共振成像)或 CT (电子计算机 X 射线断层扫描技术)造影剂、或能够产生可检测产物的酶、
15 放射性核素、生物毒素、细胞因子(如 IL-2 等)、抗体、抗体 Fc 片段、抗体 scFv 片段、金纳米颗粒/纳米棒、病毒颗粒、脂质体、纳米磁粒、前药激活酶(例如，DT-心肌黄酶(DTD)或联苯基水解酶-样蛋白质(BPHL))、化疗剂(例如，顺铂)或任何形式的纳米颗粒等。

本发明的第十方面，提供了一种活性成分的用途，所述活性成分选自下组：如本发明
20 第一方面所述的重链可变区、如本发明第二方面所述的重链、如本发明第三方面所述的轻链可变区、如本发明第四方面所述的轻链、或本发明第五方面所述的抗体、如本发明第六方面所述的重组蛋白、如本发明第八方面所述的免疫细胞、如本发明第九方面所述的抗体药物偶联物、或其组合，所述活性成分用于

(a) 制备检测试剂或试剂盒；

25 (b) 制备预防和/或治疗 PD-L1 相关疾病的药物或制剂；和/或

(c) 制备预防和/或治疗癌症或肿瘤的药物或制剂。

在另一优选例中，所述 PD-L1 相关疾病选自下组：肿瘤、炎症反应性疾病、或其组合。

在另一优选例中，所述药物或制剂为 PD-L1 抑制剂。

在另一优选例中，所述肿瘤选自下组：血液肿瘤、实体瘤、或其组合。

30 在另一优选例中，所述肿瘤选自下组：卵巢癌、结肠癌、直肠癌、黑色素瘤(例如转移的恶性黑色素瘤)、肾癌、膀胱癌、乳腺癌、肝癌、淋巴瘤、恶性血液病、头颈癌、胶质瘤、胃癌、鼻咽癌、喉癌、宫颈癌、子宫体瘤和骨肉瘤。可以用本发明的方法治疗的其他癌症的例子包括：骨癌、膜腺癌、皮肤癌、前列腺癌、皮肤或眼内恶性黑色素瘤、子宫癌、月工区癌、睾丸癌、输卵管癌、子宫内膜癌、阴道癌、阴户癌、何杰金病、非何杰金
35 氏淋巴瘤、食道癌、小肠癌、内分泌系统癌、甲状腺癌、甲状旁腺癌、肾上腺癌、软组织肉瘤、尿道癌、阴茎癌、慢性或急性白血病，包括急性髓细胞样白血病、慢性髓细胞样白血病、急性成淋巴细胞性白血病、慢性淋巴细胞性白血病、儿童实体瘤、淋巴细胞性淋巴瘤、膀胱癌、肾或输尿管癌、肾盂癌、中枢神经系统(CNS)肿瘤、原发性 CNS 淋巴瘤、肿瘤血管发生、脊柱肿瘤、脑干神经胶质瘤、垂体腺瘤、卡波因肉瘤、表皮状癌、鳞状细

胞癌、T 细胞淋巴瘤、环境诱发的癌症，包括石棉诱发的癌症，以及所述癌症的组合。

在另一优选例中，所述肿瘤为高表达 PD-L1 的肿瘤。

在另一优选例中，所述药物或制剂用于制备预防和/或治疗与 PD-L1 (表达阳性的) 相关的疾病的药物或制剂。

5 在另一优选例中，所述的抗体为药物偶联物 (ADC) 形式。

在另一优选例中，所述的检测试剂或试剂盒用于诊断 PD-L1 相关疾病。

在另一优选例中，所述检测试剂或试剂盒用于检测样品中 PD-L1 蛋白。

在另一优选例中，所述的检测试剂为检测片。

10 本发明的第十一方面，提供了一种药物组合物，所述的药物组合物含有：

(i) 活性成分，所述活性成分选自下组：如本发明第一方面所述的重链可变区、如本发明第二方面所述的重链、如本发明第三方面所述的轻链可变区、如本发明第四方面所述的轻链、或本发明第五方面所述的抗体、如本发明第六方面所述的重组蛋白、如本发明第八方面所述的免疫细胞、如本发明第九方面所述的抗体药物偶联物、或其组合；以及

15 (ii) 药学上可接受的载体。

在另一优选例中，所述的药物组合物为液态制剂。

在另一优选例中，所述的药物组合物为注射剂。

在另一优选例中，所述的药物组合物用于抑制 PD-L1，优选地下调或阻断 PD-L1 的免疫抑制作用。

20 在另一优选例中，所述的药物组合物用于增强免疫，优选地刺激免疫细胞 (如 T 细胞) 的活化、增殖、分泌细胞因子。

在另一优选例中，所述的药物组合物用于提高对肿瘤的免疫反应，优选地增强免疫细胞对肿瘤细胞的杀伤作用。

在另一优选例中，所述的药物组合物用于治疗肿瘤。

25 在另一优选例中，所述肿瘤为高表达 PD-L1 的肿瘤。

在另一优选例中，所述药物组合物中还含有额外的抗肿瘤剂。

在另一优选例中，所述药物组合物为单元剂型。

在另一优选例中，所述抗肿瘤剂包含紫杉醇、多柔比星、环磷酰胺、阿西替尼、乐伐替尼、或派姆单抗。

30 在另一优选例中，所述的抗肿瘤剂可以与所述抗体单独存在于独立 N:\2019 年\2019-0295-华博\Other 的包装内，或所述抗肿瘤剂可以与所述抗体偶联。

在另一优选例中，所述药物组合物的剂型包括胃肠给药剂型或胃肠外给药剂型。

在另一优选例中，所述的胃肠外给药剂型包括静脉注射、静脉滴注、皮下注射、局部注射、肌肉注射、瘤内注射、腹腔内注射、颅内注射、或腔内注射。

35

本发明的第十二方面，提供了一种多核苷酸，所述的多核苷酸编码选自下组的多肽：

(1) 如本发明第一方面所述的重链可变区、如本发明第二方面所述的重链、如本发明第三方面所述的轻链可变区、如本发明第四方面所述的轻链、或本发明第五方面所述的抗体；或

- (2) 如本发明第六方面所述的重组蛋白；
- (3) 如本发明第七方面所述的 CAR 构建物。

本发明的第十三方面，提供了一种载体，所述的载体含有如本发明第十二方面所述的多核苷酸。

在另一优选例中，所述的载体包括：细菌质粒、噬菌体、酵母质粒、植物细胞病毒、哺乳动物细胞病毒如腺病毒、逆转录病毒、或其他载体。

本发明的第十四方面，提供了一种遗传工程化的宿主细胞，所述的宿主细胞含有如本发明第十三方面所述的载体或基因组中整合有如本发明第十二方面所述的多核苷酸。

本发明的第十五方面，提供了一种体外检测(包括诊断性或非诊断性)样品中 PD-L1 蛋白的方法，所述方法包括步骤：

- (1) 在体外，将所述样品与如本发明第五方面所述的抗体接触；和
- (2) 检测是否形成抗原-抗体复合物，其中形成复合物就表示样品中存在 PD-L1 蛋白。

本发明的第十六方面，提供了一种检测板，所述的检测板包括：基片(支撑板)和测试条，所述的测试条含有如本发明第五方面所述的抗体或如本发明第九方面所述的免疫偶联物。

本发明的第十七方面，提供了一种试剂盒，其特征在于，所述试剂盒中包括：

- (1) 第一容器，所述第一容器中含有如本发明第五方面所述的抗体；和/或
 - (2) 第二容器，所述第二容器中含有抗如本发明第五方面所述的抗体的二抗；
- 或者，所述试剂盒含有如本发明第十六方面所述的检测板。

本发明的第十八方面，提供了一种重组多肽的制备方法，其特征在于，所述方法包括：

- (a) 在适合表达的条件下，培养如本发明第十四方面所述的宿主细胞；和
- (b) 从培养物中分离出重组多肽，所述的重组多肽是如本发明第五方面所述的抗体或如本发明第六方面所述的重组蛋白。

本发明的第十九方面，提供了一种 PD-L1 相关疾病的方法，其特征在于，所述方法包括：给需要的对象施用如本发明第五方面所述的抗体、所述抗体的抗体-药物偶联物、或表达所述抗体的 CAR-T 细胞、或其组合。

应理解，在本发明范围内中，本发明的上述各技术特征和在下文(如实施例)中具体描述的各技术特征之间都可以互相组合，从而构成新的或优选的技术方案。限于篇幅，在此不再一一累述。

附图说明

图 1 显示了 PD-L1 抗体对 PBMC 的激活作用。

图 2 显示了 PD-L1 抗体对 MLR 体系中 CD4+T 细胞的激活作用,上层细胞培养液中 IL-2 的分泌量。

图 3 显示了 PD-L1 抗体对 MLR 体系中 CD4+T 细胞的激活作用,上层细胞培养液中 IFN- γ 的分泌量。

5

具体实施方式

本发明人通过广泛而深入的研究,经过大量筛选,意外地获得一种具有极其优异的亲和力和特异性的抗 PD-L1 单克隆抗体,基于该抗体而获得的人源化抗体。本发明抗体能够高特异性地结合 PD-L1 抗原,其具有很高的亲和力和生物活性,并且显著抑制癌性肿瘤(尤其是 PD-L1 高表达的肿瘤)的生长,而对于哺乳动物本身没有可见的毒副作用。在此基础上完成了本发明。

10

术语

为了更容易理解本发明,以下具体定义了某些技术和科学术语。除非在本文中另有明确定义,本文使用的所有其它技术和科学术语都具有本发明所属领域的一般技术人员通常理解的含义。

15

本发明所用氨基酸三字母代码和单字母代码如 J. biol. chem, 243, p3558 (1968) 中所述。

如本文所用,术语“给予”和“处理”是指外源性药物、治疗剂、诊断剂或组合物应用于动物、人、受试者、细胞、组织、器官或生物流体。“给予”和“处理”可以指治疗、药物代谢动力学、诊断、研究和实验方法。细胞的处理包括试剂与细胞的接触、以及试剂与流体的接触、流体与细胞的接触。“给予”和“处理”还意指通过试剂、诊断、结合组合物或通过另一种细胞体外和离体处理。“处理”当应用于人、动物或研究受试者时,是指治疗处理、预防或预防性措施,研究和诊断;包括抗人 PD-L1 抗体与人或动物、受试者、细胞、组织、生理区室或生理流体的接触。如本文所用,术语“治疗”指给予患者内用或外用治疗剂,包含本发明的任何一种抗人 PD-L1 抗体及其组合物,所述患者具有一种或多种疾病症状,而已知所述治疗剂对这些症状具有治疗作用。通常,以有效缓解一种或多种疾病症状的治疗剂的量(治疗有效量)给予患者。

20

25

如本文所用,术语“任选”或“任选地”意味着随后所描述的事件或情况可以发生但不是必须发生。例如,“任选包含 1-3 个抗体重链可变区”是指特定序列的抗体重链可变区可以有但不是必须有,可以是 1 个、2 个或 3 个。

30

本发明所述的“序列同一性”表示当具有适当的替换、插入或缺失等突变的情况下最佳比对和比较时,两个核酸或两个氨基酸序列之间的同一性程度。本发明中所述的序列和其具有同一性的序列之间的序列同一性可以至少为 85%、90%或 95%,优选至少为 95%。非限制性实施例包括 85%, 86%, 87%, 88%, 89%, 90%, 91%, 92%, 93%, 94%, 95%, 96%, 97%, 98%, 99%, 100%。

35

本文所述的“结合物”是指能够与靶点结合的可溶性受体或其片段或其类似物,或抗体或其段或其类似物。本发明所述的“PD-L1 结合物”,是指能特异性识 PD-L1 并与 PD-L1 结合的抗体或其片段或其类似物。

术语“PD-L1”一般是指天然的或重组的人 PD-L1，以及人 PD-L1 的非人同源物。

PD-L1

程序性死亡 1(PD-1)是 CD28 受体家族的成员，该家族包括 CD28、CTLA-4、ICOS、PD-1 和 BTLA。该家族的最初成员 CD28 和 ICOS 通过添加单克隆抗体后增强 T 细胞增殖的功能而发现(Hutloff 等(1999)，Nature 397：263-266；Hansen 等(1980)，Immunogenics10:247-260)。已经鉴定了 PD-1 的两种细胞表面糖蛋白配体 PD-L1 和 PD-L2，已经表明它们在与 PD-1 结合后下调 T 细胞活化和细胞因子分泌(Freeman 等(2000)，J Exp Med192: 1027-34；Latchman 等(2001)，Nat Immunol 2: 261-8；Cater 等(2002)，Eur J Immunol32: 634-43；Ohigashi 等(2000)，Cl in Cancer Res 11: 2947-53)。PD-L1(B7-H1)和 PD-L2(B7-DC)都是可与 PD-1 结合但是不与其他 CD28 家族成员结合的 B7 同源物(Blank 等 2004)。

PD-L1 的表达已经在几种人类癌症中发现，包括人肺癌、卵巢癌、结肠癌、黑色素瘤和各种骨髓瘤(Iwai 等(2002)，PNAS 99: 12293-7；Ohigashi 等(2000，Cl in Cancer Res 11: 2947-53)。已有的结果显示，肿瘤细胞高表达的 PD-L1 通过增加 T 细胞的凋亡从而在肿瘤的免疫逃逸中起着重要的作用。研究者发现，转染 PD-L1 基因的 P815 肿瘤细胞系在体外可抵制特异性 CTL 的裂解，将其接种小鼠体内后具有更强的致瘤性和侵袭性。这些生物学特性均可通过阻断 PD-L1 而逆转。敲除 PD-1 基因的小鼠，阻断 PD-L1 /PD-1 通路，则接种肿瘤细胞不能形成肿瘤(Dong 等(2002)，Nat Med 8: 793-800)。也已经提示 PD-L1 可能与肠粘膜炎症有关，并且 PD-L1 的抑制防止了与结肠炎有关的萎缩病(Kanai 等(2003)，JImmunol 171: 4156-63)。PD-1 是首先在激活的 T 细胞和 B 细胞上表达的免疫抑制性受体。该受体与其配体的相互作用在体外和体内一直显示减弱的 T 细胞应答。阻断 PD-1 与其配体之一 PD-L1 间的相互作用显示提高肿瘤特异性 CD8⁺T 细胞的免疫性，因此，可有助于免疫系统清除肿瘤细胞。

PD-1/PD-L1 途径是开发癌症治疗的抗体疗法的被充分证实的靶标。抗 PD-1 抗体还可用于慢性病毒性感染。在急性病毒性感染后产生的记忆 CD8⁺T 细胞具有很高功能，并构成保护性免疫的重要组分。与此相反，慢性感染的特征常常在于病毒特异性 T 细胞应答的不同程度的功能受损(衰竭)，这种缺陷是宿主不能消除持续的病原体的主要原因。

尽管在感染的早期阶段最初产生功能效应 T 细胞，但它们在慢性感染期间逐渐失去功能。Barber 等(Barber 等，Nature 439 : 682-687 (2006))显示，用 LCMV 实验室毒株感染的小鼠发展为导致血液和其它组织均有高水平病毒的慢性感染。这些小鼠最初会产生较强的 T 细胞应答，但随着 T 细胞衰竭而最终受到感染。作者发现在慢性感染小鼠中的效应 T 细胞的数量和功能下降可通过注射阻断 PD-1 和 PD-L1 之间相互作用的抗体来逆转。

最近，有研究显示 PD-1 在来自 HIV 感染的个体的 T 细胞中高度表达，并且受体表达与 T 细胞功能损伤和疾病进展相关(D 町等，Nature443 : 350-4(2006)；Trautmann L. 等，Nat. Med. 12 : 1198-202(2006))。在两项研究中，对配体 PD-L1 的阻断都显著增加了 HIV 特异性产 IFN γ 细胞的体外增殖。

抗体

如本文所用，术语“抗体”指免疫球蛋白，是由两条相同的重链和两条相同的轻链通过链间二硫键连接而成的四肽链结构。免疫球蛋白重链恒定区的氨基酸组成和排列顺序不

同，故其抗原性也不同。据此，可将免疫球蛋白分为五类，或称为免疫球蛋白的同种型，即 IgM、IgD、IgG、IgA 和 IgE，其相应的重链分别为 μ 链、 δ 链、 γ 链、 α 链、和 ϵ 链。同一类 Ig 根据其较链区氨基酸组成和重链二硫键的数目和位置的差别，又可分为不同的亚类，如 IgG 可分为 IgG1，IgG2、IgG3，IgG4。轻链根据恒定区的不同分为 κ 链或 λ 链。

5 五类 Ig 中每类 Ig 都可以有 κ 链或 λ 链。不同类免疫球蛋白的亚单位结构和三维构型是本领域人员所熟知的。本发明所述的抗体轻链可进一步包含轻链恒定区，所述的轻链恒定区包含人源或鼠源的 κ 、 λ 链或其变体。

在本发明中，本发明所述的抗体重链可进一步包含重链恒定区，所述的重链恒定区包含人源或鼠源的 IgG1、IgG2、IgG3、IgG4 或其变体。抗体重链和轻链靠近 N 端的约 110
10 个氨基酸的序列变化很大，为可变区 (Fv 区)；靠近 C 端的其余氨基酸序列相对稳定，为恒定区。可变区包括 3 个高变区 (HVR) 和 4 个序列相对保守的骨架区 (FR)。3 个高变区决定抗体的特异性，又称为互补性决定区 (CDR)。每条轻链可变区 (LCVR) 和重链可变区 (HCVR) 由 3 个 CDR 区和 4 个 FR 区组成，从氨基端到竣基端依次排列的顺序为：FR1，CDR1，FR2，CDR2，FR3，CDR3 和 FR4。轻链的 3 个 CDR 区指 LCDR1、LCDR2 和 LCDR3；重链的 3 个 CDR
15 区指 HCDR1，HCDR2 和 HCDR3。

本发明的抗体包括鼠源抗体、嵌合抗体、人源化抗体，优选人源化抗体。术语“鼠源抗体”在本发明中为根据本领域知识和技能制备的抗人 PD-L1 的单克隆抗体。制备时用 PD-L1 抗原注射试验对象，然后分离表达具有所需序列或功能特性的抗体的杂交瘤。在本发明一个优选的实施方案中，所述的鼠源 PD-L1 抗体或其抗原结合片段，可进一步包含鼠源
20 κ 、 λ 链或其变体的轻链恒定区，或进一步包含鼠源 IgG1、IgG2、IgG3 或其变体的重链恒定区。

术语“嵌合抗体 (chimeric antibody)”是将鼠源性抗体的可变区与人抗体的恒定区融合而成的抗体，可以减轻鼠源性抗体诱发的免疫应答反应。嵌合抗体是由鼠源性抗体的 V 区基因与人抗体的 C 区基因拼接为嵌合基因，然后插入载体，转染骨髓瘤组织表达的抗体分子。既保留了亲本鼠抗体的高特异性和亲和力，又使其人源 Fc 段能有效介导生物学
25 效应功能。

术语“人源化抗体 (humanized antibody)”，也称为 CDR 移植抗体 (CDR-grafted antibody)，是指将鼠的 CDR 序列移植到人的抗体可变区框架，即不同类型的人种系抗体构架序列中产生的抗体。人源化抗体是本发明鼠抗的一种可变区改造形式，具有源自 (或基本上源自) 非人类抗体 (优选小鼠单克隆抗体) 的 CDR 区，和基本源自人源抗体序列的 FR 区和恒定区；即将鼠抗的 CDR 区序列嫁接到不同类型的人种系抗体构架序列上。因为 CDR 序列负责大部分的抗体-抗原相互作用，所以可以通过构建表达载体来表达模拟特定天然存在的抗体性质的重组抗体。人源化抗体可以克服嵌合抗体由于携带大量鼠蛋白成分，从而诱导的异源性反应。此类构架序列可以从包括种系抗体基因序列的公共 DNA 数据库或公开的参考文献获得。为避免免疫原性下降的同时，引起的活性下降，可对所述的人抗体可
30 变区框架序列进行最少反向突变或回复突变，以保持活性。

术语“抗体的抗原结合片段” (或简称“抗体片段”) 是指抗体的保持特异性结合抗原 (例如，PD-L1) 的能力的一个或多个片段。已显示可利用全长抗体的片段来进行抗体的抗原结合功能。术语“抗体的抗原结合片段”中包含的结合片段的实例包括

- (i) Fab 片段, 由 VL、VH、CL 和 CH1 结构域组成的单价片段;
- (ii) $F(ab')_2$ 片段, 包含通过较链区上的二硫桥连接的两个 Fab 片段的二价片段;
- (iii) 由 VH 和 CH1 结构域组成的 Fd 片段;
- (iv) 由抗体的单臂的 VH 和 VL 结构域组成的 Fv 片段。

5 Fv 抗体含有抗体重链可变区、轻链可变区, 但没有恒定区, 并具有全部抗原结合位点的最小抗体片段。一般的, Fv 抗体还包含 VH 和 VL 结构域之间的多肽接头, 且能够形成抗原结合所需的结构。

本发明的术语“抗原决定簇”指抗原上不连续的, 由本发明抗体或抗原结合片段识别的三维空间位点。

10 术语“CDR”是指抗体的可变结构域内主要促成抗原结合的 6 个高变区之一。所述 6 个 CDR 的最常用的定义之一由 Kabat E.A 等人, (1991) Sequences of proteins of immunological interest. NIH Publication 91-3242 提供。

术语“表位”或“抗原决定簇”是指抗原上免疫球蛋白或抗体特异性结合的部位(例如, PD-L1 分子上的特定部位)。表位通常以独特的空间构象包括至少 3, 4, 5, 6, 7, 8, 15 9, 10, 11, 12, 13, 14 或 15 个连续或非连续的氨基酸。

术语“特异性结合”、“选择性结合”、“选择性地结合”和“特异性地结合”是指抗体对预先确定的抗原上的表位的结合。通常, 抗体以大约小于 $10^{-7}M$, 例如大约小于 $10^{-8}M$ 、 $10^{-9}M$ 或 $10^{-10}M$ 或更小的亲和力(KD)结合。

术语“竞争结合”是指与本发明的单克隆抗体识别人 PD-L1 的胞外区上的相同表位(也称为抗原决定簇)或相同表位的一部分并与所述抗原结合的抗体。与本发明的单克隆抗体结合相同表位的抗体是指识别并结合于本发明的单克隆抗体所识别的人 PD-L1 的氨基酸序列的抗体。

术语“KD”或“Kd”是指特定抗体-抗原相互作用的解离平衡常数。通常, 本发明的抗体以小于大约 $10^{-7}M$, 例如小于大约 $10^{-8}M$ 、 $10^{-9}M$ 或 $10^{-10}M$ 或更小的解离平衡常数(KD)结合 PD-L1, 由使用表面等离子体共振 (SPR) 技术在 BIACORE 仪中测定的。

如本文所用, 术语“抗原决定簇”指抗原上不连续的, 由本发明抗体或抗原结合片段识别的三维空间位点。

本发明不仅包括完整的抗体, 还包括具有免疫活性的抗体的片段或抗体与其他序列形成的融合蛋白。因此, 本发明还包括所述抗体的片段、衍生物和类似物。

30 在本发明中, 抗体包括用本领域技术人员熟知技术所制备的鼠的、嵌合的、人源化的或者全人的抗体。重组抗体, 例如嵌合的和人源化的单克隆抗体, 包括人的和非人的部分, 可以采用本领域熟知的 DNA 重组技术制备。

如本文所用, 术语“单克隆抗体”指得自单个细胞来源的克隆分泌的抗体。单克隆抗体是高度特异性的, 针对单个抗原表位。所述的细胞可能是真核的、原核的或噬菌体的克隆细胞株。

在本发明中, 抗体可以是单特异性、双特异性、三特异性、或者更多的多重特异性。

在本发明中, 本发明的抗体还包括其保守性变体, 指与本发明抗体的氨基酸序列相比, 有至多 10 个, 较佳地至多 8 个, 更佳地至多 5 个, 最佳地至多 3 个氨基酸被性质相似或相近的氨基酸所替换而形成多肽。这些保守性变异多肽最好根据表 A 进行氨基酸替换

而产生。

表 A

最初的残基	代表性的取代	优选的取代
Ala (A)	Val; Leu; Ile	Val
Arg (R)	Lys; Gln; Asn	Lys
Asn (N)	Gln; His; Lys; Arg	Gln
Asp (D)	Glu	Glu
Cys (C)	Ser	Ser
Gln (Q)	Asn	Asn
Glu (E)	Asp	Asp
Gly (G)	Pro; Ala	Ala
His (H)	Asn; Gln; Lys; Arg	Arg
Ile (I)	Leu; Val; Met; Ala; Phe	Leu
Leu (L)	Ile; Val; Met; Ala; Phe	Ile
Lys (K)	Arg; Gln; Asn	Arg
Met (M)	Leu; Phe; Ile	Leu
Phe (F)	Leu; Val; Ile; Ala; Tyr	Leu
Pro (P)	Ala	Ala
Ser (S)	Thr	Thr
Thr (T)	Ser	Ser
Trp (W)	Tyr; Phe	Tyr
Tyr (Y)	Trp; Phe; Thr; Ser	Phe
Val (V)	Ile; Leu; Met; Phe; Ala	Leu

人 PD-L1 特异性抗体

5 本发明提供抗人 PD-L1 抗体(以下简称 PD-L1 抗体)。具体地, 本发明提供一种针对 PD-L1 的高特异性和高亲和力的抗体, 其包括重链和轻链, 所述重链含有重链可变区 (VH) 氨基酸序列, 所述轻链含有轻链可变区 (VL) 氨基酸序列。

优选地, 重链可变区 (VH) 氨基酸序列和轻链可变区 (VL) 氨基酸序列的各自 CDR 选自下组:

- 10 a1) SEQ ID NO. : 3;
- a2) SEQ ID NO. : 4;
- a3) SEQ ID NO. : 5;
- a4) SEQ ID NO. : 6;
- a5) GIS;
- a6) SEQ ID NO. : 7;
- 15 a7) 上述氨基酸序列中任意一种氨基酸序列经过添加、缺失、修饰和/或取代至少一个(如 1-5、1-3 个, 较佳地 1-2 个, 更佳地 1 个)氨基酸的具有 PD-L1 结合亲和力的序列。

在另一优选例中, 所述经过添加、缺失、修饰和/或取代至少一个氨基酸序列所形成的序列优选为同源性为至少 80%, 较佳地至少 85%, 更佳地至少为 90%, 最佳地至少 95% 的氨基酸序列。

20 本发明的抗体可以是双链或单链抗体, 并且可以是选自动物源抗体、嵌合抗体、人源化抗体, 更优选为人源化抗体、人-动物嵌合抗体, 更优选为全人源化抗体。

本发明所述抗体衍生物可以是单链抗体、和/或抗体片段，如：Fab、Fab'、(Fab')₂、或该领域内其他已知的抗体衍生物等，以及 IgA、IgD、IgE、IgG 以及 IgM 抗体或其他亚型的抗体中的任意一种或几种。

其中，所述动物优选为哺乳动物，如鼠。

5 本发明抗体可以是靶向人 PD-L1 的鼠源抗体、嵌合抗体、人源化抗体、CDR 嫁接和/或修饰的抗体。

在本发明的一种优选实施例中，上述 SEQ ID NO.：3、4 和 5 中任意一种或几种序列、或它们经过添加、缺失、修饰和/或取代至少一个氨基酸的具有 PD-L1 结合亲和力的序列，位于重链可变区 (VH) 的 CDR 区。

10 在本发明的一种优选实施例中，上述 SEQ ID NO.：6、氨基酸序列:GIS 和 SEQ ID NO.：7 中任意一种或几种序列、或它们经过添加、缺失、修饰和/或取代至少一个氨基酸的具有 PD-L1 结合亲和力的序列，位于轻链可变区 (VL) 的 CDR 区。

15 在本发明的一种更优选实施例中，VH CDR1、CDR2、CDR3 分别独立地选自 SEQ ID NO.：3、4 和 5 中任意一种或几种序列、或它们经过添加、缺失、修饰和/或取代至少一个氨基酸的具有 PD-L1 结合亲和力的序列；VL CDR1、CDR2、CDR3 分别独立地选自 SEQ ID NO.：6、氨基酸序列:GIS 和 SEQ ID NO.：7 中任意一种或几种序列、或它们经过添加、缺失、修饰和/或取代至少一个氨基酸的具有 PD-L1 结合亲和力的序列。

20 本发明上述内容中，所述添加、缺失、修饰和/或取代的氨基酸数量，优选为不超过初始氨基酸序列总氨基酸数量的 40%，更优选为不超过 35%，更优选为 1-33%，更优选为 5-30%，更优选为 10-25%，更优选为 15-20%。

在本发明中，所述添加、缺失、修饰和/或取代的氨基酸数量通常是 1、2、3、4 或 5 个，较佳地为 1-3 个，更佳地为 1-2 个，最佳地为 1 个。

25 根据本发明的一些实施方式，一种 PD-L1 抗体，其抗体重链可变区进一步包含重鼠源 IgG1、IgG2、IgG3、IgG4 或其变体的重链 FR 区。在一些实施方式中，所述的抗体重链可变区序列为：SEQ ID NO：1 或 8。进一步地，所述 PD-L1 抗体包含鼠源 IgG1、IgG2、IgG3、IgG4 或其变体的重链恒定区。

30 根据本发明的一些实施方式，一种 PD-L1 抗体，其抗体轻链可变区进一步包含鼠源 κ 、 λ 链或其变体的轻链 FR 区。在一些实施方式中，所述的抗体轻链可变区序列为：SEQ ID NO：2 或 9。进一步地，所述的 PD-L1 抗体包含鼠源 κ 、 λ 链或其变体的轻链恒定区。进一步地，所述的 PD-L1 抗体包含人源 κ 、 λ 链或其变体的轻链恒定区。

在另一优选例中，所述重链可变区的氨基酸序列如 SEQ ID NO.：1 或 8 所示，其中双下划线标注的依次为重链可变区 CDR1，CDR2，CDR3 的氨基酸序列。

QVQLQQSGAELVKPGASVKLSCKASGYAFTGYTIHWVKQRSLGLEWLGWFPYPGSGTLKYNEKFKDKATLTAD
KSSSTVYLELSRLTSEDSAVYFCARHGTGTLAMMDYWGQGTSTVTVSS (SEQ ID NO.：1)

35 QVQLVQSGAEVKKPGASVKVSCKASGYAFTGYTIHWVRQAPGQRLEWMGWFPYPGSGTLKYSEKFQGRVTITRD
KSLSTAYMELSSLRSEDTAVYYCARHGTGTLAMMDYWGQGTSLVTVSS (SEQ ID NO.：8)

在另一优选例中，所述轻链可变区的氨基酸序列如 SEQ ID NO.：2 或 9 所示，其中双下划线标注的依次为轻链可变区 CDR1'，CDR2'，CDR3' 的氨基酸序列。

DVVVTQTPLSLPVSFQDQVSI~~SCRSSQSLANSYGNTYLSWYLHKPGQSPQLLIYGISNRFSGVPDRFSGSGSG~~

TDFTLKISTIKPEDLGMYCYCLQGTHQPPTFGGGTKLEIK (SEQ ID NO. : 2)

DVVMQTQPLSLSVTPGQPASISCKSSQSLANSYGNTYLSWYLHKPGQSPQLLIYGISNRFSGVPDRFSGSGSG
TDFTLKISRVEAEDVGVYYCYCLQGTHQPPTFGGQTKLEIK (SEQ ID NO. : 9)

抗体的制备

5 任何适于产生单克隆抗体的方法都可用于产生本发明的 PD-L1 抗体。例如，可以用连接或天然存在的 PD-L1 蛋白或其片段免疫动物。可以使用合适的免疫接种方法，包括佐剂、免疫刺激剂、重复加强免疫接种，可以使用一种或多种途径。

10 任何合适形式的 PD-L1 都可以作为免疫原(抗原)，用于产生对 PD-L1 特异的非人抗体，筛选所述抗体的生物学活性。免疫原可以单独使用，或与本领域已知的一种或多种免疫原性增强剂组合使用。免疫原可以由天然来源纯化，或者在遗传修饰的细胞中产生。编码免疫原的 DNA 在来源上可以是基因组或非基因组的(例如 cDNA)。可以使用合适的遗传载体表达编码免疫原的 DNA，所述载体包括但不限于腺病毒载体、杆状病毒载体、质粒和非病毒载体。

生产本发明的 PD-L1 抗体的示例性方法描述于实施例 1。

15 人源化抗体可以选自任何种类的免疫球蛋白，包括 IgM、IgD、IgG、IgA 和 IgE。在本发明中，抗体是 IgG 抗体，使用 IgG1 亚型。通过用下文实施例中描述的生物学测定筛选抗体易于实现必需恒定结构域序列的最优化，以产生所需生物学活性。

同样，任一类轻链都可以在本文的化合物和方法中使用。具体地说， κ 、 λ 链或其变体在本发明的化合物和方法中是可以用的。

20 人源化本发明 PD-L1 抗体的示例性方法描述于实施例 2。

本发明提供了本发明所述 PD-L1 结合分子、核酸分子、宿主细胞、免疫缀合物及药物组合物在预防和/或治疗与 PD-L1 相关的疾病中用途和方法。可用本发明的 PD-L1 结合分子预防和/或治疗的 PD-L1 相关的疾病如下详述。

25 编码本发明的成熟多肽的多核苷酸包括：只编码成熟多肽的编码序列；成熟多肽的编码序列和各种附加编码序列；成熟多肽的编码序列(和任选的附加编码序列)以及非编码序列。

术语“编码多肽的多核苷酸”可以是包括编码此多肽的多核苷酸，也可以是还包括附加编码和/或非编码序列的多核苷酸。

30 本发明还涉及与上述的序列杂交且两个序列之间具有至少 50%，较佳地至少 70%，更佳地至少 80%相同性的多核苷酸。本发明特别涉及在严格条件下与本发明所述多核苷酸可杂交的多核苷酸。在本发明中，“严格条件”是指：(1)在较低离子强度和较高温度下的杂交和洗脱，如 0.2×SSC，0.1%SDS，60℃；或(2)杂交时加有变性剂，如 50%(v/v)甲酰胺，0.1%小牛血清/0.1% Ficoll，42℃等；或(3)仅在两条序列之间的相同性至少在 90%以上，更好是 95%以上时才发生杂交。并且，可杂交的多核苷酸编码的多肽与 SEQ ID NO. : 1、SEQ ID NO. : 2、SEQ ID NO. : 8 和/或 SEQ ID NO. : 9 所示的成熟多肽有相同的生物学功能和活性。

35 本发明的抗体的核苷酸全长序列或其片段通常可以用 PCR 扩增法、重组法或人工合成的方法获得。一种可行的方法是用人工合成的方法来合成有关序列，尤其是片段长度较短时。通常，通过先合成多个小片段，然后再进行连接可获得序列很长的片段。此外，还

可将轻链和重链的编码序列和表达标签(如 6His)融合在一起,形成融合蛋白。

一旦获得了有关的序列,就可以用重组法来大批量地获得有关序列。这通常是将其克隆入载体,再转入细胞,然后通过常规方法从增殖后的宿主细胞中分离得到有关序列。

此外,还可用人工合成的方法来合成有关序列,尤其是片段长度较短时。通常,通过
5 先合成多个小片段,然后再进行连接可获得序列很长的片段。然后可将该 DNA 序列引入本领域中已知的各种现有的 DNA 分子(或如载体)和细胞中。

术语“核酸分子”是指 DNA 分子和 RNA 分子。核酸分子可以是单链或双链的,但优选是双链 DNA。当将核酸与另一个核酸序列置于功能关系中时,核酸是“有效连接的”。例如,如果启动子或增强子影响编码序列的转录,那么启动子或增强子有效地连接至所述编
10 码序列。

术语“载体”是指能够运输已与其连接的另一个核酸的核酸分子。在一个实施方案中,载体是“质粒”,其是指可将另外的 DNA 区段连接至其中的环状双链 DNA 环。

本发明还涉及包含上述的适当 DNA 序列以及适当启动子或者控制序列的载体。这些载体可以用于转化适当的宿主细胞,以使其能够表达蛋白质。

15 术语“宿主细胞”是指已向其中引入了表达载体的细胞。宿主细胞可以是原核细胞,如细菌细胞;或是低等真核细胞,如酵母细胞;或是高等真核细胞,如植物或动物细胞(如哺乳动物细胞)。

本发明中所述的用重组 DNA 转化宿主细胞的步骤可用本领域熟知的技术进行。获得的转化子可用常规方法培养,转化子表达本发明的基因所编码的多肽。根据所用的宿主细胞,
20 用常规培养基在合适的条件下培养。

目前,已经可以完全通过化学合成来得到编码本发明蛋白(或其片段,或其衍生物)的 DNA 序列。然后可将该 DNA 序列引入本领域中已知的各种现有的 DNA 分子(或如载体)和细胞中。此外,还可通过化学合成将突变引入本发明蛋白序列中。

25 本发明还涉及包含上述的适当 DNA 序列以及适当启动子或者控制序列的载体。这些载体可以用于转化适当的宿主细胞,以使其能够表达蛋白质。

宿主细胞可以是原核细胞,如细菌细胞;或是低等真核细胞,如酵母细胞;或是高等真核细胞,如哺乳动物细胞。代表性例子有:大肠杆菌,链霉菌属;鼠伤寒沙门氏菌的细菌细胞;真菌细胞如酵母;果蝇 S2 或 Sf9 的昆虫细胞;CHO、COS7、293 细胞的动物细胞等。

30 用重组 DNA 转化宿主细胞可用本领域技术人员熟知的常规技术进行。当宿主为原核生物如大肠杆菌时,能吸收 DNA 的感受态细胞可在指数生长期后收获,用 CaCl₂ 法处理,所用的步骤在本领域众所周知。另一种方法是使用 MgCl₂。如果需要,转化也可用电穿孔的方法进行。当宿主是真核生物,可选用如下的 DNA 转染方法:磷酸钙共沉淀法,常规机械方法如显微注射、电穿孔,脂质体包装等。

35 获得的转化子可以用常规方法培养,表达本发明的基因所编码的多肽。根据所用的宿主细胞,培养中所用的培养基可选自各种常规培养基。在适于宿主细胞生长的条件下进行培养。当宿主细胞生长到适当的细胞密度后,用合适的方法(如温度转换或化学诱导)诱导选择的启动子,将细胞再培养一段时间。

在上面的方法中的重组多肽可在细胞内、或在细胞膜上表达、或分泌到细胞外。如果

需要,可利用其物理的、化学的和其它特性通过各种分离方法分离和纯化重组的蛋白。这些方法是本领域技术人员所熟知的。这些方法的例子包括但不限于:常规的复性处理、用蛋白沉淀剂处理(盐析方法)、离心、渗透破菌、超处理、超离心、分子筛层析(凝胶过滤)、吸附层析、离子交换层析、高效液相层析(HPLC)和其它各种液相层析技术及这些方法的结合。

所得单克隆抗体可用常规手段来鉴定。比如,单克隆抗体的结合特异性可用免疫沉淀或体外结合试验(如放射性免疫测定(RIA)或酶联免疫吸附测定(ELISA))来测定。

本发明的抗体可以单独使用,也可与可检测标记物(为诊断目的)、治疗剂、PK(蛋白激酶)修饰部分或任何以上这些物质的组合结合或偶联。

用于诊断目的的可检测标记物包括但不限于:荧光或发光标记物、放射性标记物、MRI(磁共振成像)或CT(电子计算机X射线断层扫描技术)造影剂、或能够产生可检测产物的酶。

可偶联的治疗剂包括但不限于:胰岛素、IL-2、干扰素、降钙素、GHRH 肽、肠肽类似物、白蛋白、抗体片段、细胞因子、和激素。

此外还可与本发明抗体结合或偶联的治疗剂包括但不限于: 1. 放射性核素; 2. 生物毒; 3. 细胞因子如 IL-2 等; 4. 金纳米颗粒/纳米棒; 5. 病毒颗粒; 6. 脂质体; 7. 纳米磁粒; 8. 前药激活酶; 10. 化疗剂(例如,顺铂)或任何形式的纳米颗粒等。

药物组合物

本发明还提供了一种组合物。在优选例中,所述的组合物是药物组合物,它含有上述的抗体或其活性片段或其融合蛋白或其 ADC 或相应的 CAR-T 细胞,以及药学上可接受的载体。通常,可将这些物质配制于无毒的、惰性的和药学上可接受的水性载体介质中,其中 pH 通常约为 5-8,较佳地 pH 约为 6-8,尽管 pH 值可随被配制物质的性质以及待治疗的病症而有所变化。配制好的药物组合物可以通过常规途径进行给药,其中包括(但不限于):瘤内、腹膜内、静脉内、或局部给药。

本发明所述抗体也可以是由核苷酸序列在细胞内表达用于的细胞治疗,比如,所述抗体用于嵌合抗原受体 T 细胞免疫疗法(CAR-T)等。

本发明的药物组合物可直接用于结合 PD-L1 蛋白分子,因而可用于预防和治疗 PD-L1 相关的疾病。此外,还可同时使用其他治疗剂。

本发明的药物组合物含有安全有效量(如 0.001-99wt%,较佳地 0.01-90wt%,更佳地 0.1-80wt%)的本发明上述的单克隆抗体(或其偶联物)以及药学上可接受的载体或赋形剂。这类载体包括(但不限于):盐水、缓冲液、葡萄糖、水、甘油、乙醇、及其组合。药物制剂应与给药方式相匹配。本发明的药物组合物可以被制成针剂形式,例如用生理盐水或含有葡萄糖和其他辅剂的水溶液通过常规方法进行制备。药物组合物如针剂、溶液宜在无茵条件下制造。活性成分的给药量是治疗有效量,例如每天约 1 微克/千克体重-约 5 毫克/千克体重。此外,本发明的多肽还可与其他治疗剂一起使用。

使用药物组合物时,是将安全有效量的药物组合物施用于哺乳动物,其中该安全有效量通常至少约 10 微克/千克体重,而且在大多数情况下不超过约 50 毫克/千克体重,较佳地该剂量是约 10 微克/千克体重-约 20 毫克/千克体重。当然,具体剂量还应考虑给药途径、病人健康状况等因素,这些都是熟练医师技能范围之内的。

检测用途和试剂盒

本发明的抗体可用于检测应用，例如用于检测样本，从而提供诊断信息。

本发明中，所采用的样本(样品)包括细胞、组织样本和活检标本。本发明使用的术语“活检”应包括本领域技术人员已知的所有种类的活检。因此本发明中使用的活检可以包

括例如通过内窥镜方法或器官的穿刺或针刺活检制备的组织样本。

本发明中使用的样本包括固定的或保存的细胞或组织样本。

本发明还提供了一种指含有本发明的抗体(或其片段)的试剂盒，在本发明的一个优选例中，所述的试剂盒还包括容器、使用说明书、缓冲剂等。在优选例中，本发明的抗体可以固定于检测板。

癌症

本发明的PD-L1结合分子对PD-L1的阻断可以增强患者中对癌细胞的免疫应答。PD-L1富含于多种人类癌中(Dong等(2002) Nat Med. 8: 78 7-9)。PD-1与PD-L1的相互作用导致浸润肿瘤的淋巴细胞减少，T细胞受体介导的增殖减少，以及癌细胞的免疫逃逸。CN 106397592 A说明书16/31页(Dong等(2003) J Mol Med 81:281-7; Konishi等(2004) Clin Cancer Res 10:5094-5100)。抑制PD-L1与PD-1的局部相互作用可以逆转免疫抑制，当PD-L2与PD-1的相互作用也被阻断时，效应是协同的(Iwai等(2002) PNAS 99:12293-7; Brown等(2003) J Immunol 170:1257-66)。本发明的PD-L1结合分子可以单独使用，以抑制癌性肿瘤的生长。或者如以下所述，本发明的PD-L1结合分子可以与其它抗肿瘤治疗手段联合使用，例如与其他免疫原性剂、标准癌症疗法或其他抗体分子联使用。

因此，在一个实施方案中，本发明提供一种预防和/或治疗癌症的方法，包括给该对象施用治疗有效量的本发明的PD-L1结合分子，抑制对象中的肿瘤细胞生长。

使用本发明的PD-L1结合分子可以预防和/或治疗的优选的癌症包括一般对免疫治疗有应答的癌症。可治疗的优选癌症的非限制性的例子包括肺癌、卵巢癌、结肠癌、直肠癌、黑色素瘤(例如转移的恶性黑色素瘤)、肾癌、膀胱癌、乳腺癌、肝癌、淋巴瘤、恶性血液病、头颈癌、胶质瘤、胃癌、鼻咽癌、喉癌、宫颈癌、子宫体瘤和骨肉瘤。可以用本发明的方法治疗的其他癌症的例子包括:骨癌、膜腺癌、皮肤癌、前列腺癌、皮肤或眼内恶性黑色素瘤、子宫癌、月工区癌、睾丸癌、输卵管癌、子宫内膜癌、阴道癌、阴户癌、何杰金病、非何杰金氏淋巴瘤、食道癌、小肠癌、内分泌系统癌、甲状腺癌、甲状旁腺癌、肾上腺癌、软组织肉瘤、尿道癌、阴茎癌、慢性或急性白血病，包括急性髓细胞样白血病、慢性髓细胞样白血病、急性成淋巴细胞性白血病、慢性淋巴细胞性白血病、儿童实体瘤、淋巴细胞性淋巴瘤、膀胱癌、肾或输尿管癌、肾盂癌、中枢神经系统(CNS)肿瘤、原发性CNS淋巴瘤、肿瘤血管发生、脊柱肿瘤、脑干神经胶质瘤、垂体腺瘤、卡波因肉瘤、表皮状癌、鳞状细胞癌、T细胞淋巴瘤、环境诱发的癌症，包括石棉诱发的癌症，以及所述癌症的组合。本发明也可用于治疗转移性癌，特别是表PD-L1的转移性癌(Iwai等(2005) Int Immunol 17:133-144)。

任选地，本发明的PD-L1结合分子可以与免疫原性剂如癌细胞、纯化的肿瘤抗原(包括重组蛋白、肽和碳水化合物分子)、用编码免疫刺激细胞因子的基因转染的细胞联用(He等(2004) J. Immunol 173:4919-28)。可以应用的免疫原性剂的非限制性实例包括黑色素瘤抗原的肽，如gp100的肽、MAGE抗原、Trp-2、MART1和/或酪氨酸酶，或转染后表达

细胞因子 GM-CSF 的肿瘤细胞。

在人类中,已经表明一些肿瘤是具有免疫原性的,如黑素瘤。预期通过使用本发明的 PD-L1 结合分子阻断 PD-L1 来促进 T 细胞活化,可以激活宿主中的肿瘤应答。当与肿瘤接种方案联合时,PD-L1 阻断剂(如抗 PD-L1 抗体,例如本发明的 PD-L1 结合分子)可能最有效。已经设计了针对肿瘤接种的许多实验策略(参见 Rosenberg, S, 2000, Development of Cancer Vaccines, ASCO Educational Book Spring: 60-62; Logothetis, C, 2000, ASCO Educational Book Spring: 300-302; Khayat, D, 2000, ASCO Educational Book Spring: 414-428; Foon, K. 2000, ASCO Educational Book Spring: 730-738 等)。在这些策略之一中,使用自体或异体肿瘤细胞制备疫苗。已经证明,当肿瘤细胞被转导且表达 GM-CSF 时,这些细胞疫苗最有效。已经表明 GM-CSF 是用于肿瘤接种的抗原呈递的强激活剂(Dranoff 等(1993) *Proc Natl Acad Sci U S A* 90: 3539-43)。

各种肿瘤中基因表达和大规模基因表达模式的研究鉴定出许多所谓的肿瘤特异性抗原(Rosenberg, SA (1999) *Immunity* 10: 281-7)。在许多情况下,这些肿瘤特异性抗原是在肿瘤和产生肿瘤的细胞中表达的分化抗原,例如 gp100、MAGE 抗原和 Trp-2。更重要的是,证明这些抗原中的许多是在宿主中发现的肿瘤特异性 T 细胞的靶标。本发明的 PD-L1 结合分子可以与重组产生的肿瘤特异性蛋白和/或肽组合使用,以产生针对这些蛋白质的免疫应答。这些蛋白质在正常情况下被免疫系统看作自身抗原,因此对其耐受。肿瘤抗原也可以包括蛋白质端粒酶,该酶是染色体的端粒合成所必需的,并且在 85% 以上的人类癌中表达,而仅在有限数量的自身组织中表达(Kim, N 等(1994) *Science* 266: 2011-2013)。肿瘤抗原也可以是癌细胞表达的“新抗原”,例如由于体细胞突变改变蛋白质序列或产生两种无关序列的融合蛋白(例如,Philadelphia 染色体中的 bcr-abl)。

其他肿瘤疫苗可以包括来自与人类癌症有关的病毒的蛋白质,如人类乳头瘤病毒(HPV)、肝炎病毒(HBV 和 HCV)和卡波西肉瘤病毒(KHSV)。可以与 PD-L1 阻断剂(如抗 PD-L1 抗体,例如本发明的 PD-L1 结合分子)联合应用的另外一种形式的肿瘤特异性抗原是从肿瘤组织本身中分离的纯化的热休克蛋白(HSP)。这些热休克蛋白含有来自肿瘤细胞的蛋白质的片段,这些 HSP 在向抗原呈递细胞递送以引发肿瘤免疫方面非常有效(Suot, R 和 Sri vastava, P(1995) *Science* 269: 1585-1588 ;Tamura, Y. 等(1997) *Science* 278:117-120)。

树突细胞(DC)是强抗原呈递细胞,可以用来引发抗原特异性应答。DC 可以在体外产生,并且载有各种蛋白质和肽抗原以及肿瘤细胞提取物(Nestle, F. 等(1998) *Nature Medicine* 4:328-332)。DC 也可以通过遗传手段转导,从而也表达这些肿瘤抗原。已经为了免疫而直接将 DC 融合到肿瘤细胞上(Kugler, A. 等(2000) *Nature Medicine* 6:332-336)。作为接种方法,DC 免疫可以与 PD-L1 阻断剂(如抗 PD-L1 抗体,例如本发明的 PD-L1 结合分子)有效地组合,以激活更强的抗肿瘤应答。

CAR-T, 全称是嵌合抗原受体 T 细胞免疫疗法(Chimeric Antigen Receptor T-Cell Immunotherapy) 是另一种有效的恶性肿瘤的细胞治疗方法。嵌合抗原受体 T 细胞(CAR-T 细胞)是将能识别某种肿瘤抗原的抗体的抗原结合部与 CD3- ζ 链或 Fc ϵ RI γ 的胞内部分在体外偶联为一个嵌合蛋白,通过基因转导的方法转染患者的 T 细胞,使其表达嵌合抗原受体(CAR)。同时,还可以引入共刺激分子信号序列以提高 T 细胞的细胞毒活性、增殖性

与存活时间,促进细胞因子的释放。患者的T细胞被“重编码”后,可在体外扩增生成大量肿瘤特异性的CAR-T细胞并回输患者体内,实现肿瘤治疗的目的。PD-L1阻断剂(如抗PD-L1抗体,例如本发明的PD-L1结合分子)可以与CAR-T细胞疗法联合,激活更强的抗肿瘤应答。

5 本发明的PD-L1结合分子也可以与标准癌症治疗组合。本发明的PD-L1结合分子可以与化疗方案有效地组合。在这些例子中,它可以减少施用的化疗剂的剂量(Mokyr, M.等(1998)Cancer Research 58 :5301-5304)。这种组合的一个例子是抗PD-L1抗体与氨烯咪胺联用治疗黑素瘤。这种组合的另外一个实例是抗PD-L1抗体与自介素-2(IL-2)联用治疗黑素瘤。本发明的PD-L1结合分子和化学疗法联用的科学原理是细胞死亡,这是大多数
10 化疗化合物的细胞毒性作用的结果,应会导致抗原呈递途径中的肿瘤抗原水平升高。可以通过细胞死亡与PD-L1阻断协同作用的其他联合治疗有放疗、手术和激素剥夺。这些方案都在宿主中产生肿瘤抗原的来源。血管发生抑制剂也可以与本发明的PD-L1结合分子组合。血管发生的抑制导致肿瘤细胞死亡,这可以将肿瘤抗原提供给宿主的抗原呈递途径。

本发明的PD-L1结合分子还可以与靶向其它肿瘤特异性抗原的抗体联合使用。所述靶
15 向其它肿瘤特异性抗原的抗体包括但不限于,抗EGFR抗体、抗EGFR变体的抗体、抗VEGF α 抗体、抗HER2抗体、或抗CMET抗体。优选所述抗体是单克隆抗体。

本发明的PD-L1结合分子也可以与将Fc α 或Fc γ 受体表达效应细胞靶向至肿瘤细胞的双特异性抗原联合应用(参见,例如US Patent Nos. 5, 922, 845和5, 837, 243)。也可以利用双特异性抗体靶向两种不同的抗原。例如,已经利用抗-Fc受体/抗肿瘤抗原
20 (例如Her-2/neu)双特异性抗体将巨噬细胞靶向肿瘤部位。这种靶向可以更有效地激活肿瘤特异性应答。利用PD-L1阻断剂可以加强这些应答的T细胞方面。或者可以利用结合肿瘤抗原和树突细胞特异性细胞表面标记的双特异性抗体将抗原直接递送至DC。

肿瘤通过多种机制逃避宿主的免疫监视。其中许多机制可以通过灭活肿瘤表达的免疫抑制性蛋白质来克服。尤其包括TGF- β (Kehrl, L.等(1986). Exp. Med. 163 :1037-1050),
25 IL-10 (Howard, M.和Garra, A. (1992) Immunology Today 13: 198-200)和Fas配体(Hahne, M.等(1996)Science 274 :1363-1365)。其中每种的抗体可以与本发明的PD-L1结合分子联用,来抵抗免疫抑制剂的作用,并且有利于宿主的肿瘤免疫应答。

可以用于激活宿主免疫应答的其他抗体可以与本发明的PD-L1结合分子联用。抗-CD40抗体能够有效地替代T细胞辅助活性(Ridge, 等(1998) Nature 393:474-478),并且可以与本发明的PD-L1结合分子联用。也可以为了提高T细胞活化的水平而联合对T
30 细胞共刺激分子如OX-40和ICOS的活化抗体以及阻断阴性共刺激分子如CTLA-4的活性的抗体。

骨髓移植当前用来治疗造血来源的多种肿瘤。移植物抗宿主疾病是这种治疗的一种后果,移植物对抗肿瘤的应答可以获得治疗性益处。可以利用PD-L1阻断剂提高肿瘤特异性
35 T细胞的有效性。也有几种实验治疗方案涉及抗原特异性T细胞的离体激活和扩增以及这些细胞向受体内的过继转移,以用抗原特异性T细胞对抗肿瘤。这些方法也可以用来激活T细胞对传染原如CMV的应答。预期在本发明的PD-L1结合分子存在下离体激活可以提高过继转移的T细胞的频率和活性。因此,本发明还提供了一种离体激活免疫细胞(如PBMC或T细胞)的方法,包括使所述免疫细胞与本发明的PD-L1结合分子接触。

感染性疾病

本发明的其他方法用于治疗暴露于特定毒素或病原体的患者。因此，本发明的另一方面提供一种预防和/或治疗对象中的感染性疾病的方法，包括给该对象施用本发明的PD-L1结合分子，使得所述对象的感染性疾病得到预防和/或治疗。

- 5 类似于对于如上所述的肿瘤的应用，PD-L1 阻断剂可以单独使用，或者作为佐剂与疫苗组合使用来刺激对病原体、毒素和自身抗原的免疫应答。特别可以应用该治疗方法的病原体的实例包括当前没有有效疫苗的病原体，或常规疫苗不完全有效的病原体。其中包括但不限于 HIV 、肝炎病毒(甲、乙、丙)、流感病毒、痛疹病毒、贾第虫、疟疾、利什曼原虫、金黄色葡萄球菌、绿脓杆菌。PD-L1 阻断剂特别可用于对抗诸如 HIV 等病原体已建立
- 10 的感染，其在感染过程中呈现改变的抗原。在抗人 PD-L1 抗体给药时，这些新的表位被作为外源物识别，从而引起不受 PD-L1 的负信号影响的强 T 细胞应答。

- 引起可用本发明的方法治疗的感染性疾病的病原体病毒的一些实例包括 HIV 、肝炎(甲、乙、丙)、痛疹病毒(例如 VZV 、 HSV-L HAV-6 , HSV-II 和 CMV 、 EB 病毒)、腺病毒、流感病毒、虫媒病毒、埃可病毒、鼻病毒、柯萨奇病毒、冠状病毒、呼吸道合胞病毒、
- 15 流行性腮腺炎病毒、轮状病毒、麻疹病毒、风疹病毒、细小病毒、痘苗病毒、HTLV 病毒、登革热病毒、军 L 头毒、软疣病毒、脊髓灰质炎病毒、狂犬病毒、JC 病毒和虫媒病毒脑炎病毒。

- 引起可用本发明的方法治疗的感染性疾病的病原体细菌的一些实例包括衣原体、立克次氏体菌、分枝杆菌、葡萄球菌、链球菌、肺炎球菌、脑膜炎球菌和淋球菌、克雷伯氏杆菌、变形菌、富氏菌、假单胞菌、军团杆菌、自喉杆菌、沙门氏菌、芽孢杆菌、霍乱菌、破伤风菌、肉毒杆菌、炭疽杆菌、鼠疫杆菌、钩端螺旋体、和莱姆病细菌。
- 20

自身免疫反应

- 抗 PD-L1 抗体可以激起和扩大自身免疫应答。因此，可以考虑利用抗 PD-L1 抗体联合多种自身蛋白质来设计接种方案，以有效地产生对抗这些自身蛋白质的免疫应答，用于疾病治疗。
- 25

慢性炎性疾病

- 抗 PD-L1 抗体也可以用来治疗如下疾病，如慢性炎性疾病，如扁平苔藓、T 细胞介导的慢性炎性皮肤病。因此，在一个方面，本发明提供一种用 T 细胞消除慢性炎性疾病的方法，包括给对象施用本发明的 PD-L1 结合分子。本发明提供抗 PD-L1 抗体及其治疗眼中疾病、自身免疫疾病的用途。所述的疾病包括但不限于银屑病、银屑病关节炎、强直性脊柱炎、多发性硬化症，炎性肠病(如克罗恩氏病、溃疡性结肠炎等)、骨关节炎、类风湿性关节炎(RA)、风湿性关节炎或骨质疏松症、炎性纤维化(例如硬皮病、肺纤维化和硬化)、哮喘(包括变应性哮喘)、变态反应以及癌症。
- 30

本发明的主要优点

- (a) 本发明抗体具有优异的生物活性和特异性。
- (b) 与鼠源抗体和嵌合抗体相比，本发明人源化抗体在保留与 PD-L1 相当的亲和力的同时，具有更低的免疫原性。
- (c) 本发明抗体对 PD-L1 的阻断可以显著增强患者中对癌细胞的免疫应答。

(d) 本发明抗体与某些非人哺乳动物(如猴)的 PD-L1 有与人 PD-L1 相当的亲和力,便于在动物模型中进行测试和进行质控检测。

(e) 本发明抗体通过解除 PD-L1 对免疫细胞(如 T 细胞)活性的抑制,能有效激活抗原特异性的 T 细胞的活性,显著增强 T 细胞的抗肿瘤作用,并且对人的 IFN- γ 和 IL-2 的分泌刺激更有效,从而提高患者自身对肿瘤的免疫系统反应,达到对肿瘤细胞进行杀伤的目的。

下面结合具体实施例,进一步阐述本发明。应理解,这些实施例仅用于说明本发明而并不用于限制本发明的范围。下列实施例中未注明具体条件的实验方法,通常按照常规条件,例如 Sambrook 等人, 分子克隆: 实验室手册 (New York: Cold Spring Harbor Laboratory Press, 1989) 中所述的条件,或按照制造厂商所建议的条件。除非另外说明,否则百分比和份数是重量百分比和重量份数。

本发明实施例或测试例中未注明具体条件的实验,通常按常规条件进行,或按照原料/商品制造商建议的条件;未注明具体来源的试剂,为市场购买的常规试剂。

实施例 1 抗人 PD-L1 的小鼠单克隆抗体的制备方法

制备鼠源单克隆抗体的方法采用 Kohler 和 Milstein 1975 年发明的杂交瘤制备技术 (Nature, 1975, 256: 495-497)。首先将人 PD-L1-His 蛋白 (Sino Biological, #10084-H08H) 与弗氏佐剂乳化,然后对 BALB/c、CD1、C57BL/6、SJL 每个品系各 5 只小鼠进行多点皮下免疫。三轮免疫后取血清用 ELISA 法检测效价,滴度达到预定标准后取脾细胞与 SP2/0 骨髓瘤细胞进行融合。经过 HAT 筛选杂交瘤多克隆细胞,采用 ELISA 方法,筛选出特异性结合人 PD-L1 的多克隆细胞株后进行单克隆化,再次使用 ELISA 方法筛选特异性结合的单克隆细胞株,并检测了与猴 PD-L1 结合力,使用 ES-2 细胞进行 FACS 筛选,对筛选出的单克隆细胞株进行亲和力 (SPR) 筛选,最终得到表达人 PD-L1 抗体的单克隆杂交瘤细胞 36C06/D8,筛选数据列举见表 1。

表 1. 杂交瘤筛选数据

克隆编号	多克隆 OD 值(人)	多克隆 OD 值(猴)	单克隆 OD 值(人)	单克隆 OD 值(猴)	单克隆 FACS	单克隆 KD (M)
36C06-D8	1.269	1.077	1.386	0.6685	99697	2.74E-09
2C12-F2	1.845	1.488	1.886	1.131	76175	2.53E-09
3C12-H10	2.325	1.630	2.108	1.938	88596	5.73E-11
3F08-G12	1.909	1.151	2.113	1.761	30400.5	4.46E-09
42-C02-F9	2.597	2.509	2.702	2.768	5229.5	6.73E-09
45-G11-E4	2.148	2.667	2.174	2.619	4621.5	4.27E-09
40-H10-B7	2.351	2.655	2.16	2.65	4681.5	7.40E-09
13H11-E7	1.927	1.776	2.428	1.791	79521	3.92E-10
9H05-C4	1.954	1.958	2.087	1.887	34077.5	4.47E-09
6G05-D4	1.586	1.987	1.855	1.397	78737	2.40E-09

由表 1 可以看出,经过筛选,在众多杂交瘤中,杂交瘤 36C06/D8 (或其产生的抗体)

与人 PD-L1 蛋白以及猴 PD-L1 蛋白均有很高的结合活性，并且在细胞结合水平的亲和力活性最高。

实施例 2 抗 PD-L1 抗体 V-基因序列克隆以及人源化

2.1 克隆杂交瘤细胞中免疫球蛋白的 cDNA 序列

用基于宝生物 5' RACE 技术原理，测定编码由杂交瘤 36C06/D8 表达的小鼠抗体可变区的 DNA 序列。简言之，用 SMART 5' RACE 合成试剂盒(TAKARA, #634859)按厂商用法说明制备重链和轻链的基因特异性 cDNA。由琼脂糖凝胶电泳分析 PCR 产物。重链和轻链二者的可变区扩增予的预期大小约为 500 个碱基对。将反应所得的条带大小合适的扩增 PCR 产物克隆到载体 pEASY-Blunt Simple vector(北京全式金, #CB111-02)中，并转化到 Stellar 大肠杆菌感受态细胞(TAKARA, #636763)中。通过用通用的 M13 正向或反向引物的菌落 PCR 筛选克隆，从每个反应选择 2-3 个克隆用于 DNA 测序分析。用 Expasy-translate tool(<http://web.expasy.org/translate/>)分析每个克隆的每个测序反应结果。测序结果显示 36C06/D8 表达的抗 PD-L1 抗体 V 区序列如下：

900289-VH SEQ ID NO: 1
QVQLQQSGAELVKPGASVKLSCKASGYAFTGYT¹IHWVKQRSGLGLEWLGW²FYPGSGTLKYNEKFKDKATLTA
DKSSSTVYLELSRLTSEDSAVYFCARHGTGTL³MAMDYWGQGTSTVTVSS
900289-VL SEQ ID NO: 2
DVVVTQTPLSLPVSGDQVSI⁴SCRSSQSLANSYGNTY⁵LSWYLHKPGQSPQLLIYGISNRFSGVPDRFSGSGS
GTDFTLKISTIKPEDLGMYYCLQ⁶GTHQPPTFGGGTKLEIK

其中，下划线区为 CDRs (IMGT 定义，单列如下)：

表 2. 鼠源抗 PD-L1 抗体 CDR 序列

结构域		序列	SEQ ID NO
VH	CDR1	GYAFTGYT	3
	CDR2	FYPGSGTL	4
	CDR3	ARHGTGTLAMDY	5
VL	CDR1	QSLANSYGNTY	6
	CDR2	GIS	-
	CDR3	LQGTHQPPT	7

2.2 构建和表达嵌合 900289 抗体

通过将 PCR 克隆的小鼠 36C06/D8 VH 和 VL 区 cDNA 分别与人 IgG1 和 k 恒定区连接，来构建嵌合重链和轻链。用 PCR 引物修饰小鼠 cDNA 序列的 5' 和 3' 端，所述引物设计成为各链增加合适的前导序列，并增加使得能克隆到现有重组抗体表达载体 pHB-Fc 上的限制性位点。pHB-Fc 质粒载体的制法如下：以 pcDNA/HA-FLAG(Accession, #FJ524378) 载体为出发质粒，在内切酶 EcoRI 后面加上了人 IgG1 或 k 的恒定区序列，在内切酶 HindIII 前面加上了人类巨细胞病毒 (HCMV) 促进子序列(Accession, #X17403)，在氨苄青霉素耐

受基因后面、HCMV 促进子前面加上了中国仓鼠谷氨酰胺合成酶基因(Accession, X03495)。

蛋白表达所用的宿主细胞为 CHO-S 细胞(赛默飞, #R80007)。通过将表达嵌合抗体重链载体与聚醚酰亚胺(PEI)混合形成脂质体复合物后，转染 CHO-S 细胞。放入培养箱中

培养 3-5 天。用间接 ELISA 测量来自 CHO-S 转染上清液的抗体浓度。这显示转染的 CHO-S 细胞分泌约 60 mg/L 的嵌合 IgG1-k 抗体(后文也称为 900289)。

2.3 鼠源抗人 PD-L1 抗体的人源化——人源化抗体的制备方法

抗体的人源化采用以下方法。将抗体的可变区序列与 NCBI 蛋白质数据库中的可用序列比较,通过鉴定和分析,最终确定了适合在其上构建 CDR 移植重链和轻链的人构架区。

改造时,根据人抗体 FR 区保守的氨基酸残基以及抗体 FR 区中重要的氨基酸残基,设计改造位点,对嵌合抗体的重轻链的可变区分别进行人源化突变设计,利用 PCR 技术扩增并构建人源化点突变抗体表达质粒。将人源化点突变抗体表达质粒分别经 CHO-S 细胞表达,纯化后得到人源化抗体蛋白。利用 ELISA,受体结合抑制实验,Biacore 和细胞活性检测等,获得了一种性能非常优异的人源化 PD-L1 单克隆抗体(后文也称为 900339)。所获得人源化 PD-L1 抗体的 VH 和 VL 序列分别如 SEQ ID NO.: 8 和 9 所示:

900339-VH SEQ ID NO: 8

QVQLVQSGAEVKKPGASVKVSCKASGYAFTGTYTHWVRQAPGQRLEWMGWFYPGSGTLKYSEKFQGRVTITRDKSLSTAYMELSSLRSEDTAVYYCARHGTGTLAMMDYWGQGTLLTVSS

900339-VL SEQ ID NO: 9

DVVMVTQTPLSLSVTPGQPASISCKSSQSLANSYGNTYLSWYLHKPGQSPQLLIYGISNRFSGVPDRFSGSGSGTDFTLTKISRVEAEDVGVYYCLQGTHQPPTFGQGTKLEIK

实施例 3: 鉴定嵌合抗体以及人源化抗体的功能

3.1 测试 PD-L1 抗体对来自不同物种的 PD-L1 蛋白的结合特异性(ELISA)

3.1.1 嵌合抗体 900289、人源化抗体 900339 以及对照 huIgG1(900201)与人 PD-L1 蛋白结合活性测试

具体地,将 huPD-L1-his 蛋白(购自 Sino Biological, #10084-H08H)以 1 ug/ml 50ul/孔加入酶标板,2~8℃包被 12 小时以上弃去包板残液,加入 3%牛奶,每孔 200 μL,室温封闭 1 小时。每孔加入不少于 200 μL 的 PBST 洗 1 次,将待检测抗体样品稀释至 100 μg/ml,再 5 倍稀释 11 个梯度,100 μL/孔加入酶标板。室温孵育 1 小时后,每孔加不少于 200 μL 的 PBST,洗涤 4 次后加入 3%牛奶-PBST 稀释 25000 倍的 HRP-conjugated Rabbit Anti-Human IgG Fc Antibody(洛阳佰奥通实验材料中心, #C030222),100 μL/孔加样。室温孵育 1 小时后,每孔加不少于 200 μL 的 PBST,洗涤 6 次,拍干。加入 TMB 显色液,每孔 100 μL。室温反应 5 分钟后加 2M H₂SO₄终止反应,50 μL/孔。将中止反应的酶标板置酶标仪上,450 nm 波长下读取吸光度 OD₄₅₀ 值。

结果(见表 3)表明嵌合抗体 900289 和人源化抗体 900339 均与人源 PD-L1 蛋白有很好的结合力。

表 3. 抗 PD-L1 抗体对人 PD-L1 结合活性

待测抗体	EC ₅₀ (ug/ml)
900201	NA
900289	0.04326
900339	0.04851

注: NA 表示没有结合活性

3.1.2 嵌合抗体 900289、人源化抗体 900339 以及对照 huIgG1 与猴或鼠 PD-L1 蛋白结合活性测试

实验方法与测试人 PD-L1 结合实验相似。将测试例中 huPD-L1-his 替换成 rhPD-L1-his 蛋白 (Sino Biological, #90251-C08H) 或 moPD-L1-his 蛋白 (Sino Biological, #50010-M8H), 其他步骤相同。

结果(见表 4)表明嵌合抗体 900289 和人源化抗体 900339 与猴 PD-L1 蛋白结合, 但不与鼠 PD-L1 蛋白结合或结合力很微弱。

表 4. 抗 PD-L1 抗体对猴或鼠 PD-L1 结合活性

待测抗体	EC ₅₀ (ug/ml)	
	rhPD-L1	moPD-L1
900201	NA	NA
900289	0.1399	NA
900339	0.1151	NA

注: NA 表示没有结合活性

3.2 嵌合抗体以及人源化抗体对人源 PD-L1 亲和力测定(Biacore)

本试验使用 SPR 方法测定抗体-抗原结合动力学及亲和力。

按照 Human Antibody Captrue Kit (GE, #BR-1008-39) 以及氨基偶联试剂盒 (GE, BR-1000-50) 偶联法准备 Anti-Human Capture-CM5 芯片 (GE, #BR-1005-30)。将芯片置室温平衡 20~30min, 装入 Biacore 8K 仪器; 用平衡缓冲液将 B5D1 稀释至实验工作浓度; 抗原用平衡缓冲液稀释至 50nM, 再 3 倍稀释度 7 个浓度梯度, 并设置 2 个零浓度(即平衡缓冲液)和一个重复浓度(一般为最低浓度重复); 按照抗体, 抗原 huPD-L1 (Sino Biological, #10084-H08H), 再生的次序, 循环往复对 10 个抗原浓度(2 个零浓度, 7 个梯度浓度及 1 个重复浓度)进行实验分析, 抗原进样流速 30 μL/分钟, 结合时间 120 秒, 解离时间 600 秒; 分析完成后, 选用对应的分析程序分析数据, 确认无明显 reference binding, 选用 Kinetics, 1:1 binding model, 拟合数据, 获得人鼠嵌合抗体和人源化抗体的动力学相关参数 Ka, Kd 和 KD 值(表 5)。

结果表明人源化抗体 900339 与嵌合抗体 900289 均具有很强的亲和力, 两者的结合力在同一水平。

表 5. 人鼠嵌合抗体与人重组 B7H1 亲和力检测结果

名称	Ka (1/Ms)	Kd (1/s)	KD (M)
900289	2.33E+05	3.12E-04	1.34E-09
900339	2.33E+05	2.19E-04	9.40E-10

3.3 测试 PD-L1 抗体阻断 PD-L1 抗原和 PD-1 分子结合的实验(竞争法)

将抗原 huPD-L1-moFc (800023, 华博生物)用含 1%BSA 的 PBS 溶液(1%BSA/PBS)稀释至 15 μg/ml, 每孔 20 μL 加入 96 孔 U 型板中, 与系列稀释的抗 PD-L1 抗体按体积比 1:1 混合均匀, 室温反应 15min, 同步设定阴性对照(只加 1%BSA/PBS), 阳性对照(只加 PD-L1-moFc)。取对数生长期表达人 PD-1 的细胞(3C2-huPD-1-6F4, 华博生物)悬液, 离心(1000rpm×5min)弃培养液, 用 1%BSA/PBS 重悬至活细胞密度为 1×10⁶/mL, 每孔 20 μL (2×10⁴ 个细胞)加入 PD-L1-moFc 与抗 PD-L1 抗体预孵育的 96 孔 U 型板中室温反应 15min。

将反应后的 96 孔 U 型板用 1%BSA/PBS 重悬，离心(300g×3min)弃上层液，如此洗涤 2 遍，加入 1:300 稀释的 Alexa488-羊抗鼠-Fc(Jackson ImmunoResearch, #115-545-071)，室温避光反应 15min；将反应后的 96 孔 U 型板用 1%BSA/PBS 重悬，离心(300g×3min)弃上层液，如此洗涤 3 遍，最终用每孔 100 μL 1%BSA/PBS 重悬，用流式细胞仪(BD, #Accuri C6)

5 检测第 1 通道的荧光强度。

结果表明(见表 6)，嵌合抗体 900289 和人源化抗体 900339 对人的 PD-L1/PD-1 均具有显著的阻断作用，且阻断作用力相当。

表 6. PD-L1 抗体的阻断活性

待测抗体	huPD-L1-moFc/huPD-1 结合 IC ₅₀ (ng/ml)	huPD-L1-moFc/huB7.1 结合 IC ₅₀ (ng/ml)
900201	NA	NA
900289	1.995	NA
900339	2.424	NA

注：NA 表示没有阻断活性

10 3.4 鉴定嵌合抗体以及人源化抗体非特异性结合实验 (SPR)

本试验使用 SPR 方法测定抗体与非靶标分子的非特异吸附效应。

将 Series S Sensor Chip CM5(GE, #BR-1005-30)芯片置室温平衡 20~30min，装入 Biacore 8K(GE)仪器。采用氨基偶联试剂盒(GE, #BR-1000-50)将来自鸡蛋的溶菌酶溶液(Sigma, #L3790)和来自大豆的胰蛋白酶抑制剂 1-S 型 (Sigma, #T-2327)分别固定到 CM5 芯片。进样缓冲液为 HBS-EP(1X)(GE, #BR-1006-69)，设置 4 个平衡循环。用平衡缓冲液将多克隆兔抗溶菌酶(ABcam, Ab391)，Anti-trypsin inhibitor antibody(LifeSpan Biosciences, #LS-C76609)，嵌合抗体和人源化抗体稀释至 1000 nM，设置流速 5 μL/min，进样通道 1,2 和 3,Flow Cell 1 和 2。结合时间 10min，解离时间 15min。再生流速 50 μL/min，先 0.85%磷酸溶液(ProteOn, 176-2260)再生 60s，再用 50mM 氢氧化钠溶液再生 30s。

20 结果表明(见表 7)，嵌合抗体 900289 和人源化抗体 900339 均没有明显的非特异性的静电和疏水结合作用。

表 7. 抗体与非靶分子非特异吸附检测结果

周期	名称	溶菌酶 (RU)	胰蛋白酶抑 制剂(RU)	去活的羧甲基 葡聚糖(RU)	羧甲基葡聚糖 (RU)
4	缓冲液	0	-1.9	2.5	0.6
5	抗溶菌酶多 克隆抗体	7477.4	22.7	34.8	20.5
6	抗胰蛋白酶 抑制剂	23.4	9594	23.9	18.1
8	900339	9.2	11.5	10.9	9.4
10	900289	1.8	0	2.4	-2.5

11	抗溶菌酶多克隆抗体	6735.1	30.3	38.1	25.5
12	抗胰蛋白酶抑制剂	41.3	9286	35.9	29

注：20RU 以下相互作用较弱，可以忽略；超过 20RU 即认为有明显的相互作用；100RU 以上则是很强的相互作用。

3.5 嵌合抗体以及人源化抗体在对 PBMC 的激活作用

5 在无菌状态下，将 $1\mu\text{g/ml}$ 待测试抗体与 $1\mu\text{g/ml}$ 抗人 CD3 的抗体(BioLegend, #300314)联合包被在 96 孔细胞培养板中， $200\mu\text{L/孔}$ ， $2-8^{\circ}\text{C}$ 包被过夜。次日，弃去包被液，用 PBS 洗涤 2 次后用移液器吸干孔内残余液体。用培养基将 PBMC 稀释至活细胞密度为 $5\times 10^5/\text{mL}$ ，每孔 $200\mu\text{L}$ (1×10^5 个细胞/孔)，加入到预包被的 96 孔细胞培养板， 37°C 、 $5\%\text{CO}_2$ 的条件下培养 5 天。培养结束后，离心 96 孔细胞培养板， $300\text{g}\times 10\text{min}$ ，用人 IFN- γ ELISA MAXTM Standard 试剂盒(BioLegend, #430101)检测上层细胞培养液中人 IFN- γ 的
10 分泌量。

结果如图 1 所示，相较于阴性对照 900201，加入嵌合抗体 900289 或者人源抗体 900339 后，对细胞因子 IFN- γ 的分泌的刺激更有效。

3.6 在混合淋巴反应中测定嵌合抗体以及人源化抗体对 T 细胞的激活作用

15 用 EasySepTM Human Monocyte Enrichment Kit without CD16 Depletion 试剂盒 (STEMCELLTM, #19058) 从 PBMC 中分离单核细胞，按照 ImmunoCultTM Dendritic Cell Culture Kit (STEMCELLTM, #10985) 进行培养，收获成熟的树突细胞备用。用 EasySepTM Human CD4+T Cell Enrichment Kit (STEMCELLTM, #19052) 从另一个体来源的 PBMC 中分离 CD4+T 淋巴细胞备用。用培养基将成熟树突细胞重悬成活细胞密度为 $2\times 10^5/\text{mL}$ 的细胞悬液，每孔加 $50\mu\text{L}$ (1×10^4 个细胞/孔) 至 96 孔细胞培养板中；同时用培养基将
20 CD4+T 淋巴细胞重悬成活细胞密度为 $2\times 10^6/\text{mL}$ 的细胞悬液，每孔加 $50\mu\text{L}$ (1×10^5 个细胞/孔) 至含有树突细胞的 96 孔细胞培养板中充分混合，得到 MLR 反应体系。在 MLR 体系中加入终浓度为 $1\mu\text{g/ml}$ 抗 PD-L1 的抗体充分混合于 37°C 、 $5\%\text{CO}_2$ 的条件下培养 5 天。培养结束后，离心 96 孔细胞培养板， $300\text{g}\times 10\text{min}$ ，用 Human IFN- γ ELISA MAXTM Standard 试剂盒(BioLegend, #430101)和 Human IL-2 ELISA MAXTM Standard 试剂盒(BioLegend, #431801)分别检测上层细胞培养液中人 IFN- γ 和 IL-2 的分泌量。
25

结果如图 2 和图 3 所示，图中 900233 是作为阳性对照的 Roche 人源化 PD-L1 抗体，根据专利 US20160319022 提供的人源化序列进行克隆，并瞬时转染进行表达。结果表明，相较于阴性对照 900201，嵌合抗体 900289 和人源化抗体 900339 对人的 IFN- γ 和 IL-2 的分泌刺激更有效。

30 在本发明提及的所有文献都在本申请中引用作为参考，就如同每一篇文献被单独引用作为参考那样。此外应理解，在阅读了本发明的上述讲授内容之后，本领域技术人员可以对本发明作各种改动或修改，这些等价形式同样落于本申请所附权利要求书所限定的范围。

权 利 要 求

1. 一种抗体的重链可变区，其特征在于，所述的重链可变区包括以下三个互补决定区 CDR：
 - 5 SEQ ID NO. : 3 所示的 CDR1，
 - SEQ ID NO. : 4 所示的 CDR2，和
 - SEQ ID NO. : 5 所示的 CDR3。
2. 一种抗体的重链，其特征在于，所述的重链具有如权利要求 1 所述的重链可变区。
3. 一种抗体的轻链可变区，其特征在于，所述的轻链可变区包括以下三个互补决定区 CDR：
 - 10 SEQ ID NO. : 6 所示的 CDR1'，
 - 氨基酸序列为 GIS 的 CDR2'，和
 - SEQ ID NO. : 7 所示的 CDR3'。
4. 一种抗体的轻链，其特征在于，所述的轻链具有如权利要求 3 所述的轻链可变区。
- 15 5. 一种抗体，其特征在于，所述抗体具有：
 - (1) 如权利要求 1 所述的重链可变区；和/或
 - (2) 如权利要求 3 所述的轻链可变区；或者，所述抗体具有：如权利要求 2 所述的重链；和/或如权利要求 4 所述的轻链。
6. 如权利要求 5 所述的抗体，其特征在于，所述抗体选自：动物源抗体、嵌合抗体、
 - 20 人源化抗体、或其组合。
7. 如权利要求 5 所述的抗体，其特征在于，所述抗体的重链可变区序列如 SEQ ID NO. : 1 或 8 所示；和/或
 所述抗体的轻链可变区序列如 SEQ ID NO. : 2 或 9 所示。
8. 一种重组蛋白，其特征在于，所述的重组蛋白具有：
 - 25 (i) 如权利要求 1 所述的重链可变区、如权利要求 2 所述的重链、如权利要求 3 所述的轻链可变区、如权利要求 4 所述的轻链、或如权利要求 5 所述的抗体；以及
 - (ii) 任选的协助表达和/或纯化的标签序列。
9. 一种 CAR 构建物，其特征在于，所述的 CAR 构建物的抗原结合区域包括特异性结合于 PD-L1 的 scFv，并且所述 scFv 具有如权利要求 1 所述的重链可变区和如权利要求 3 所述的轻链可变区。
 - 30 10. 一种活性成分的用途，所述活性成分选自下组：如权利要求 1 所述的重链可变区、如权利要求 2 所述的重链、如权利要求 3 所述的轻链可变区、如权利要求 4 所述的轻链、或如权利要求 5 所述的抗体、如权利要求 8 所述的重组蛋白、或其组合，其特征在于，所述活性成分用于
- 35 (a) 制备检测试剂或试剂盒；
 (b) 制备预防和/或治疗 PD-L1 相关疾病的药物或制剂；和/或
 (c) 制备预防和/或治疗癌症或肿瘤的药物或制剂。




图 1




图 2




图 3

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/CN2020/078596

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER

C07K 16/28(2006.01)i; C07K 19/00(2006.01)i; G01N 33/68(2006.01)i; G01N 33/577(2006.01)i; G01N 33/574(2006.01)i; A61K 39/395(2006.01)i; A61K 47/68(2017.01)i; A61K 35/17(2015.01)i; A61P 35/00(2006.01)i; A61P 31/00(2006.01)i; A61P 37/02(2006.01)i; A61P 29/00(2006.01)i

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)

C07K G01N A61K A61P

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practicable, search terms used)

CNABS, CNKI, CNTXT, DWPI, SIPOABS, EPTXT, USTXT, WOTXT, JPTXT, NCBI, 中国专利生物序列检索系统, China Patent Biological Sequence Search System, Genbank, EMBL, STN and search items: PD-L1, 抗体, 程序性死亡配体, 结合, antibody, bind, SEQ ID Nos: 1-9

C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
X	CN 104749372 A (SINO BIOLOGICAL, INC.) 01 July 2015 (2015-07-01) see abstract, claim 1, description, paragraphs 7-8, embodiment 1, and sequence tables	3, 4, 5, 6, 8, 10 (partially)
A	CN 105461808 A (CHANGCHUN GENESCENCE PHARMACEUTICALS CO., LTD.) 06 April 2016 (2016-04-06) claims 1-8	1-10
A	CN 106103482 A (REGENERON PHARMACEUTICALS INC.) 09 November 2016 (2016-11-09) abstract, and claims 4-13	1-10
A	CN 105968200 A (REYOUNG (SUZHOU) BIOPHARMACEUTICALS., LTD.) 28 September 2016 (2016-09-28) claims 1-15	1-10
PX	CN 109929037 A (HUABO BIOPHARM CO., LTD.) 25 June 2019 (2019-06-25) claims 1-10	1-10



Further documents are listed in the continuation of Box C.



See patent family annex.

* Special categories of cited documents:

“A” document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance
 “E” earlier application or patent but published on or after the international filing date
 “L” document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)
 “O” document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means
 “P” document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed

“T” later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention
 “X” document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone
 “Y” document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art
 “&” document member of the same patent family

Date of the actual completion of the international search

17 April 2020

Date of mailing of the international search report

13 May 2020

Name and mailing address of the ISA/CN

China National Intellectual Property Administration
 No. 6, Xitucheng Road, Jimenqiao Haidian District, Beijing
 100088
 China

Facsimile No. (86-10)62019451

Authorized officer

Telephone No.

INTERNATIONAL SEARCH REPORT
Information on patent family members

International application No.

PCT/CN2020/078596

Patent document cited in search report			Publication date (day/month/year)	Patent family member(s)			Publication date (day/month/year)
CN	104749372	A	01 July 2015	CN	104749372	B	05 October 2016
CN	105461808	A	06 April 2016	CN	105461808	B	19 March 2019
CN	106103482	A	09 November 2016	DK	3097120	T3	18 March 2019
				HU	E043672	T2	30 September 2019
				MX	2016009444	A	16 January 2017
				EA	201691487	A1	30 December 2016
				US	2018186883	A1	05 July 2018
				JP	2017507650	A	23 March 2017
				EP	3473648	A1	24 April 2019
				RS	58638	B1	31 May 2019
				HR	P20190749	T1	23 August 2019
				PL	3097120	T3	31 July 2019
				WO	2015112805	A1	30 July 2015
				CA	2937343	A1	30 July 2015
				TW	I680138	B	21 December 2019
				EP	3097120	B1	23 January 2019
				PT	3097120	T	08 May 2019
				LT	3097120	T	25 April 2019
				TW	201620936	A	16 June 2016
				CL	2016001879	A1	25 August 2017
				AU	2015209238	B2	12 September 2019
				UY	35965	A	31 August 2015
				IL	246661	A	30 May 2019
				US	2015203580	A1	23 July 2015
				WO	2015112805	A8	28 July 2016
				IL	246661	D0	31 August 2016
				PH	12016501384	A1	15 August 2016
				KR	20160128309	A	07 November 2016
				AU	2015209238	A1	21 July 2016
				EP	3097120	A1	30 November 2016
				SG	11201605908W	A	30 August 2016
				SI	3097120	T1	29 March 2019
				ES	2711450	T3	03 May 2019
				US	9938345	B2	10 April 2018
CN	105968200	A	28 September 2016	EP	3459973	A1	27 March 2019
				JP	2019514853	A	06 June 2019
				EP	3459973	A4	25 December 2019
				WO	2017197667	A1	23 November 2017
				CN	105968200	B	15 March 2019
				US	2019077867	A1	14 March 2019
CN	109929037	A	25 June 2019	None			

A. 主题的分类 C07K 16/28(2006.01)i; C07K 19/00(2006.01)i; G01N 33/68(2006.01)i; G01N 33/577(2006.01)i; G01N 33/574(2006.01)i; A61K 39/395(2006.01)i; A61K 47/68(2017.01)i; A61K 35/17(2015.01)i; A61P 35/00(2006.01)i; A61P 31/00(2006.01)i; A61P 37/02(2006.01)i; A61P 29/00(2006.01)i 按照国际专利分类(IPC)或者同时按照国家分类和IPC两种分类																				
B. 检索领域 检索的最低限度文献(标明分类系统和分类号) C07K G01N A61K A61P 包含在检索领域中的除最低限度文献以外的检索文献 在国际检索时查阅的电子数据库(数据库的名称, 和使用的检索词(如使用)) CNABS, CNKI, CNTXT, DWPI, SIPOABS, EPTXT, USTXT, WOTXT, JPTXT, NCBI, 中国专利生物序列检索系统, Genbank, EMBL, STN和检索项: PD-L1, 抗体, 程序性死亡配体, 结合, antibody, bind, SEQ ID Nos: 1-9																				
C. 相关文件 <table border="1"> <thead> <tr> <th>类 型*</th> <th>引用文件, 必要时, 指明相关段落</th> <th>相关的权利要求</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>X</td> <td>CN 104749372 A (北京义翘神州生物技术有限公司) 2015年 7月 1日 (2015 - 07 - 01) 参见摘要, 权利要求1, 说明书第7-8段, 实施例1, 序列表</td> <td>3, 4, 5、6、 8、10 (部分)</td> </tr> <tr> <td>A</td> <td>CN 105461808 A (长春金赛药业有限责任公司) 2016年 4月 6日 (2016 - 04 - 06) 权利要求1-8</td> <td>1-10</td> </tr> <tr> <td>A</td> <td>CN 106103482 A (瑞泽恩制药公司) 2016年 11月 9日 (2016 - 11 - 09) 摘要, 权利要求4-13</td> <td>1-10</td> </tr> <tr> <td>A</td> <td>CN 105968200 A (瑞阳苏州生物科技有限公司) 2016年 9月 28日 (2016 - 09 - 28) 权利要求1-15</td> <td>1-10</td> </tr> <tr> <td>PX</td> <td>CN 109929037 A (华博生物医药技术上海有限公司) 2019年 6月 25日 (2019 - 06 - 25) 权利要求1-10</td> <td>1-10</td> </tr> </tbody> </table>			类 型*	引用文件, 必要时, 指明相关段落	相关的权利要求	X	CN 104749372 A (北京义翘神州生物技术有限公司) 2015年 7月 1日 (2015 - 07 - 01) 参见摘要, 权利要求1, 说明书第7-8段, 实施例1, 序列表	3, 4, 5、6、 8、10 (部分)	A	CN 105461808 A (长春金赛药业有限责任公司) 2016年 4月 6日 (2016 - 04 - 06) 权利要求1-8	1-10	A	CN 106103482 A (瑞泽恩制药公司) 2016年 11月 9日 (2016 - 11 - 09) 摘要, 权利要求4-13	1-10	A	CN 105968200 A (瑞阳苏州生物科技有限公司) 2016年 9月 28日 (2016 - 09 - 28) 权利要求1-15	1-10	PX	CN 109929037 A (华博生物医药技术上海有限公司) 2019年 6月 25日 (2019 - 06 - 25) 权利要求1-10	1-10
类 型*	引用文件, 必要时, 指明相关段落	相关的权利要求																		
X	CN 104749372 A (北京义翘神州生物技术有限公司) 2015年 7月 1日 (2015 - 07 - 01) 参见摘要, 权利要求1, 说明书第7-8段, 实施例1, 序列表	3, 4, 5、6、 8、10 (部分)																		
A	CN 105461808 A (长春金赛药业有限责任公司) 2016年 4月 6日 (2016 - 04 - 06) 权利要求1-8	1-10																		
A	CN 106103482 A (瑞泽恩制药公司) 2016年 11月 9日 (2016 - 11 - 09) 摘要, 权利要求4-13	1-10																		
A	CN 105968200 A (瑞阳苏州生物科技有限公司) 2016年 9月 28日 (2016 - 09 - 28) 权利要求1-15	1-10																		
PX	CN 109929037 A (华博生物医药技术上海有限公司) 2019年 6月 25日 (2019 - 06 - 25) 权利要求1-10	1-10																		
☐ 其余文件在C栏的续页中列出。 ☒ 见同族专利附件。																				
* 引用文件的具体类型: “A” 认为不特别相关的表示了现有技术一般状态的文件 “E” 在国际申请日的当天或之后公布的在先申请或专利 “L” 可能对优先权要求构成怀疑的文件, 或为确定另一篇引用文件的公布日而引用的或者因其他特殊理由而引用的文件(如具体说明的) “O” 涉及口头公开、使用、展览或其他方式公开的文件 “P” 公布日先于国际申请日但迟于所要求的优先权日的文件 “T” 在申请日或优先权日之后公布, 与申请不相抵触, 但为了理解发明之理论或原理的在后文件 “X” 特别相关的文件, 单独考虑该文件, 认定要求保护的发明不是新颖的或不具有创造性 “Y” 特别相关的文件, 当该文件与另一篇或者多篇该类文件结合并且这种结合对于本领域技术人员为显而易见时, 要求保护的发明不具有创造性 “&” 同族专利的文件																				
国际检索实际完成的日期 2020年 4月 17日		国际检索报告邮寄日期 2020年 5月 13日																		
ISA/CN的名称和邮寄地址 中国国家知识产权局(ISA/CN) 中国北京市海淀区蓟门桥西土城路6号 100088 传真号 (86-10)62019451		受权官员 王翔宇 电话号码 62411992																		

国际检索报告
关于同族专利的信息

国际申请号

PCT/CN2020/078596

检索报告引用的专利文件			公布日 (年/月/日)	同族专利			公布日 (年/月/日)
CN	104749372	A	2015年 7月 1日	CN	104749372	B	2016年 10月 5日
CN	105461808	A	2016年 4月 6日	CN	105461808	B	2019年 3月 19日
CN	106103482	A	2016年 11月 9日	DK	3097120	T3	2019年 3月 18日
				HU	E043672	T2	2019年 9月 30日
				MX	2016009444	A	2017年 1月 16日
				EA	201691487	A1	2016年 12月 30日
				US	2018186883	A1	2018年 7月 5日
				JP	2017507650	A	2017年 3月 23日
				EP	3473648	A1	2019年 4月 24日
				RS	58638	B1	2019年 5月 31日
				HR	P20190749	T1	2019年 8月 23日
				PL	3097120	T3	2019年 7月 31日
				WO	2015112805	A1	2015年 7月 30日
				CA	2937343	A1	2015年 7月 30日
				TW	1680138	B	2019年 12月 21日
				EP	3097120	B1	2019年 1月 23日
				PT	3097120	T	2019年 5月 8日
				LT	3097120	T	2019年 4月 25日
				TW	201620936	A	2016年 6月 16日
				CL	2016001879	A1	2017年 8月 25日
				AU	2015209238	B2	2019年 9月 12日
				UY	35965	A	2015年 8月 31日
				IL	246661	A	2019年 5月 30日
				US	2015203580	A1	2015年 7月 23日
				WO	2015112805	A8	2016年 7月 28日
				IL	246661	D0	2016年 8月 31日
				PH	12016501384	A1	2016年 8月 15日
				KR	20160128309	A	2016年 11月 7日
				AU	2015209238	A1	2016年 7月 21日
				EP	3097120	A1	2016年 11月 30日
				SG	11201605908W	A	2016年 8月 30日
				SI	3097120	T1	2019年 3月 29日
				ES	2711450	T3	2019年 5月 3日
				US	9938345	B2	2018年 4月 10日
CN	105968200	A	2016年 9月 28日	EP	3459973	A1	2019年 3月 27日
				JP	2019514853	A	2019年 6月 6日
				EP	3459973	A4	2019年 12月 25日
				WO	2017197667	A1	2017年 11月 23日
				CN	105968200	B	2019年 3月 15日
				US	2019077867	A1	2019年 3月 14日
CN	109929037	A	2019年 6月 25日	无			