

[19] 中华人民共和国国家知识产权局



[12] 发明专利申请公布说明书

[21] 申请号 200710023748.3

[51] Int. Cl.

A61K 36/484 (2006.01)

A61P 1/02 (2006.01)

A61K 31/045 (2006.01)

A61K 33/12 (2006.01)

A61K 33/28 (2006.01)

A61K 33/36 (2006.01)

[43] 公开日 2008年1月30日

[11] 公开号 CN 101112413A

[51] Int. Cl. (续)

A61K 35/64 (2006.01)

[22] 申请日 2007.7.10

[21] 申请号 200710023748.3

[71] 申请人 尹克华

地址 221135 江苏省铜山县茅村镇洞山村四组

[72] 发明人 尹克华

权利要求书1页 说明书2页

[54] 发明名称

专治牙周炎的中药

[57] 摘要

一种专治牙周炎的中药，属于治疗牙周炎的药物。滑石粉18克、甘草3克、朱砂末0.9克、雄黄末1.5克、冰片末1.5克、生蜜50克；配制方法：将甘草研成粉末，再把滑石粉、朱砂末、雄黄末、冰片和甘草粉末按比例混合在一起，并混合均匀，制成药粉，然后装瓶，使用时将药粉与生蜜调匀。该中草药配伍简单，药物配方中所使用的药物完全使用天然草药，取、用方便，制作方法简单，服用治疗效果好，药物价格低廉，特别能够适应居住在远离乡镇、较边远的村落的人们使用，对患有牙周炎疾病的人们治疗费用低廉，解决了由于家庭收入低，生活贫穷，当地缺少医疗条件治病的问题。

1、一种专治牙周炎的中药，其特征是：滑石粉 18 克、甘草 3 克、朱砂末 0.9 克、雄黄末 1.5 克、冰片末 1.5 克、生蜜 50 克；

配制方法：将甘草研成粉末，再把滑石粉、朱砂末、雄黄末、冰片和甘草粉末按比例混合在一起，并混合均匀，制成药粉，然后装瓶，使用时将药粉与生蜜调匀。

专治牙周炎的中药

技术领域

本发明涉及一种治疗牙周炎的药，特别是一种专治牙周炎的中药。

背景技术

目前，人们患有牙周炎疾病时，都是到医院治疗，在医院里医生对患者经诊断后，一般都是开具西药或者打针进行治疗，病情严重者还可以接受住院治疗，在医疗条件较发达的城市，人们生病时到医院能够得到及时的治疗。而在乡镇，特别是一些远离乡镇、较边远的村落，人们患有牙周炎疾病时，由于家庭收入低，生活贫穷，当地缺少医疗条件，如果想要治病需要花费很多的路费去医疗条件较发达的城市去求医，加之医院的治疗费用及医药费用昂贵，人们往往不去看病治疗，任其自然痊愈，有些病疾者由于延误了治疗时机，造成终身遗憾。

发明内容

本发明的目的是要提供一种：费用低廉的专治牙周炎的中药。

解决其技术问题采用的工艺技术方案是：滑石粉 18 克、甘草 3 克、朱砂末 0.9 克、雄黄末 1.5 克、冰片末 1.5 克、生蜜 50 克；

配制方法：将甘草研成粉末，再把滑石粉、朱砂末、雄黄末、冰片和甘草粉末按比例混合在一起，并混合均匀，制成药粉，然后装瓶，使用时将药粉与生蜜调匀。

有益效果：由于采用了上述方案，药方中的配药物质全部使用天然的中草药，然后加上传统的炮制方法制作而成，材料易取，配方及制备方法简单，制备药物费用低廉，达到了本发明的目的。该中草药配伍简单，药物配方中所使用的药物完全使用天然草药，取、用方便，制作方法简单，服用治疗效果好，药物价格低廉，特别能够适应居住在远离乡镇、较边远的村落的人们使用，对患有牙周炎疾病的人们治疗费用低廉，解决了由于家庭收入低，生活贫穷，当地缺少医疗条件治病的问题。

该中草药为祖传方剂，功效：清热解毒、消肿止痛，化腐生肌，收敛止血，10 天一个疗程。使用该方剂治疗了牙周炎病疾者 110 例，其中使用一个疗程治愈 26 例，占 23.6%；使用二个疗程治愈 42 例，占 38.2%；使用三个以上疗程治愈 31 例，占 28.2%；控制病情 9 例，占 8.2%；没有治疗效果 2 例，占 1.8%，对牙周炎疾病治愈率效果明显，没有治疗效果的病疾者仅占 1.8%，患者使用该方剂的治疗过程中，没有产生不良反应。

具体实施方式

实施例 1：滑石粉 18 克、甘草 3 克、朱砂末 0.9 克、雄黄末 1.5 克、冰片末 1.5 克、生蜜 50 克；

配制方法：将甘草研成粉末，再把滑石粉、朱砂末、雄黄末、冰片和甘草粉末按比例

混合在一起，并混合均匀，制成药粉，然后装瓶，使用时将药粉与生蜜调匀。

使用方法：用牙刷蘸药粉刷患处，每次 10 分钟，然后用药粉与生蜜调制的药物涂于患处，早晚各一次。

病例 1：牙周炎病疾者，黄书强，男，42 岁时患牙病，用多种药物治疗效果不显著，53 岁时病情更加严重，经常出血，使用本中草药治疗用药 6 天，病情减轻，用药 20 日即不再出血，用药到 26 天停药，迄今 1 年多未见复发。