



Государственный комитет
СССР
по делам изобретений
и открытий

О П И С А Н И Е ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ

(11) 856445

(61) Дополнительное к авт. свид-ву -

(22) Заявлено 16.11.79 (21) 2839967/28-13

с присоединением заявки № -

(23) Приоритет -

Опубликовано 23.08.81. Бюллетень № 31

Дата опубликования описания 26.08.81

(51) М. Кл.³

A 61 B 17/00

(53) УДК 616.72:


7001.6
(088.8)

(72) Авторы
изобретения

В. Н. Левенец, Л. Д. Прошкин и Я. И. Крыжановский

(71) Заявитель

Киевский государственный институт усовершенствования
врачей



(54) СПОСОБ ЛЕЧЕНИЯ ПРИВЫЧНОГО ВЫВИХА ПЛЕЧА

1

Изобретение относится к медицине, а именно к травматологии и ортопедии.

Известен способ лечения привычного вывиха плеча путем Z-образного рассечения подлопаточной мышцы, перемещения медиально сухожилия длинной головки двухглавой мышцы плеча и последующего сшивания над ним с удлинением концов сухожилия подлопаточной мышцы [1].

Недостатком известного способа является возможность рецидива вывиха.

Цель изобретения - предупреждение рецидива вывиха.

Указанная цель достигается тем, что при осуществлении способа лечения привычного вывиха плеча путем Z-образного рассечения подлопаточной мышцы, перемещения медиально сухожилия длинной головки двухглавой мышцы плеча и последующего сшивания над ним с удлинением концов сухожилия подлопаточной мышцы, отсекают клювовидный отросток лопатки с прикрепленными к нему короткой головкой двухглавой и клювовидно-плечевой мыш-

2

цами, затем проводят эти мышцы вначале под сухожилием длинной головки двухглавой мышцы плеча и далее над ним, после чего клювовидный отросток фиксируют на прежнее место.

На чертеже изображена схема осуществления предлагаемого способа лечения привычного вывиха плеча.

Способ осуществляют следующим образом.

Доступом по борозде между дельтовидной и большой грудной мышцами обнажают короткую головку двухглавой мышцы 1. клювовидно-плечевую мышцу 2, вскрывают межбугорковую борозду 3 и обнажают сухожилие длинной головки двухглавой мышцы плеча 4, которое медленно перемещают. Долотом отсекают клювовидный отросток 5 с прикрепляющимися мышцами и отводят их книзу, затем Z-образно пересекают сухожилие подлопаточной мышцы 6. Под сухожилием длинной головки двухглавой мышцы плеча 4 подводят короткую головку двухглавой мыш-

цы 1 и клювовидно-плечевая мышца 2 таким образом, что они его огибают снаружи и спереди, образуя петлю. Затем фиксируют отсеченный клювовидный отросток 5 к прежнему месту. Поверх сухожилия длинной головки и короткой головки двухглавой мышцы плеча и клювовидно-плечевой мышцы сшивается с удлинением сухожилие подлопаточной мышцы 6.

П р и м е р. Способ опробирован на 11 больных с привычным вывихом плеча. Прослежены отдаленные результаты лечения у всех оперированных, функции плечевого сустава полностью восстановились, привычных вывихов больше не было.

Предлагаемый способ лечения привычного вывиха плеча обеспечивает предупреждение рецидива вывиха, что подтверждено апробацией способа на 11 больных.

Ф о р м у л а и з о б р е т е н и я 20

Способ лечения привычного вывиха плеча путем Z-образного рассечения подло-

паточной мышцы, перемещения медиально сухожилия длинной головки двухглавой мышцы плеча и последующего сшивания над ним с удлинением концов сухожилия подлопаточной мышцы, о т л и ч а ю - щ и й с я тем, что, с целью предупреждения рецидива вывиха, отсекают клювовидный отросток лопатки с прикрепленными к нему короткой головкой двухглавой и клювовидно-плечевой мышцами, затем проводят эти мышцы вначале под сухожилием длинной головки двухглавой мышцы плеча и далее над ним, после чего клювовидный отросток фиксируют на прежнее место.

Источники информации,
принятые во внимание при экспертизе

1. Чаклин В. Д. Основы оперативной ортопедии и травматологии. М., "Медицина", 1964, с. 310-311.

