(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)发明专利申请

(10)申请公布号 CN 107094711 A
(43)申请公布日 2017.08.29

(21)申请号 201710463529.0

(22)申请日 2017.06.08

(71)申请人 刘翔峰
地址 417600 湖南省娄底市新化县上梅镇天华中路科家巷131号

(72)发明人 刘翔峰

(51)Int.Cl.
A01K 67/02(2006.01)
A23K 50/30(2016.01)
A23K 10/30(2016.01)
A23K 10/20(2016.01)
A23K 20/20(2016.01)
A23K 20/22(2016.01)
A23K 20/163(2016.01)
A23K 20/174(2016.01)
A23K 10/37(2016.01)
A23K 10/26(2016.01)
A23K 10/22(2016.01)

权利要求书1页 说明书4页

(54)发明名称

一种黑猪的饲养方法

(57)摘要

本发明公开了一种黑猪的饲养方法，包括猪舍准备、猪舍消毒、幼猪饲养、成长期饲养、育肥期饲养、猪舍管理，本发明黑猪饲料配方中的玉米、豆粕、青菜粉、胡萝卜冻干粉、贝壳粉可以提供黑猪生长所需的糖类、蛋白质、脂肪、维生素、纤维素等营养物质和钙等微量元素；本发明根据黑猪不同生长阶段消化吸收功能，饲喂不同的食物，但以粗粮和纤维素为主食，后期放养过程中每天都有很大的运动量，运动使得猪更健康，免疫力增强，这样喂养的黑猪营养价值高，肉质更加鲜美。

CN 107094711 A

1.一种黑猪的饲养方法，其特征在于，包括以下步骤：

(1)猪舍准备：选择地势平坦、背风向阳、水源充足、植被丰富、周围1km无交通干道的地址作为猪场，坐北朝南建造猪舍，两两猪舍的间隔大于10m，猪舍高度为2-3m，猪舍内分割成单元间，每个单元间面积为5-10平米，每个单元间两侧设有排水沟；

(2)猪舍消毒：使用生石灰洒在上述猪舍的地面上，每个猪舍使用1kg的生石灰，之后使用清水清洗猪舍，曝晒3天后在猪舍地面上铺上干草方可使用；

(3)幼猪饲养：选择刚出生的、活动性抢、健康的猪仔放于恒温箱中，箱内温度控制在24-30℃，湿度控制在60-65％，每天为猪仔喂养奶水三次，每100g奶水中含有3g中药粉、1鸭蛋黄；7-8日龄开始补喂乳猪料，12日龄后补充全价配合饲料；仔猪18-30日龄开始断奶；出生第18-19天，将硫酸镁加入蒸馏水中，配置成硫酸镁溶液，并给仔猪灌服，灌服后将饲料和活性炭混合均匀，喂食仔猪，每天1-2次，周期3-5天；仔猪27-29日龄，将小苏打、碘盐和葡萄糖加入到蒸馏水中，配置成开胃溶液，喂食仔猪，每天1-2次，周期3-5天；仔猪35-40日龄，将电解多维、黄芪多糖和维生素C加入到蒸馏水中，配置成营养溶液，喂食仔猪，每天1次，周期5-7天；

(4)成长期饲养：41-80日龄，使用成长期饲料喂养，每天喂食的成长期饲料的重量为幼猪体重的3-5％，每天喂食3次，分别在早晨6点、中午2点和晚上10点进行喂食；所述成长期饲料由以下重量份数的成分组成：玉米粉50-60份、中草药5-8份、豆粕15-20份、米糠20-26份、松针粉10-15份、贝壳粉4-6份、青菜粉6-10份、水果碎块3-5份、胡萝卜冻干粉5-8份、酵母多糖1-2份；

(5)育肥期饲养：81-130日龄，开始进行放牧，每天下午3点至5点期间打开猪舍的门任其自由跑动和自由觅食，保持干净、安静的环境，每天喂食育肥期饲料，每天每只喂食2.5-3kg，在早晨10点和晚上5点各喂食一次；

(6)猪舍管理：每1-2周消毒猪舍一次，每次对猪舍冲洗并进行通风换气，用白醋对猪舍杀菌消毒，然后再用野艾和水蜡烛燃烧的烟气对猪舍熏蒸。

2.根据权利要求1所述的黑猪的饲养方法，其特征在于，所述中草药由以下重量份数的成分组成：大青叶8份、金钱草12份、党参4份、黄芪4份、甘草3份、艾叶6份、贯仲12份、槐花5份、金银花7份、车前草3份、牛蒡子4份。

3.根据权利要求1所述的黑猪的饲养方法，其特征在于，所述育肥期饲料由以下重量份的成分组成：玉米100-120份，米糠30-40份，菜籽饼25-30份，蚕蛹粉10-15份，燕麦壳15-20份，鱼粉10-15份，菜粕8-15份，食盐3-6份。

一种黑猪的饲养方法

技术领域

[0001] 本发明涉及畜牧领域，具体是一种黑猪的饲养方法。

背景技术

[0002] 畜牧业发展水平可反映一个国家的农业发达程度和居民生活水平，我国是世界养殖业大国，全世界50％的猪、23％的羊、18％的禽和10％的牛饲养在我国，肉类和蛋类总产量连续多年稳居世界第一，但生产技术水平与养殖业发达国家存在10-15年的差距。因此，加快推广健康养殖模式在我国养猪产业领域的建设，将是我国农业经济可持续发展的重要内容和有效保证；黑猪肉质细腻且营养价值丰富，肉中的不饱和脂肪酸的含量为8.87％，特别是亚麻酸能保护肝脏，能提高人体免疫能力，同时还可以改善人体内SOD的活性，抑制MDA的生成，延缓机体衰老，细胞老化，含量显著高于其他猪种，对人体有极高的营养价值及保健作用。但是现有技术下黑猪的饲养方式普遍存在管理粗放、饲料单一、免疫力低下、生长期缓慢、体重低等问题，一些养猪场为了追求经济利益最大化，使用添加抗生素的饲料来防治某些疾病，造成药物残留和环境污染，严重威胁到人民群众的身体健康。

发明内容

[0003] 本发明的目的在于提供一种黑猪的饲养方法，黑猪抗病能力强，生长速度快，肉质好。

[0004] 为实现上述目的，本发明采用如下的技术方案：

[0005] 一种黑猪的饲养方法，其特征在于，包括以下步骤：

[0006] (1)猪舍准备：选择地势平坦、背风向阳、水源充足、植被丰富、周围1km无交通干道的地址作为猪场，坐北朝南建造猪舍，两两猪舍的间隔大于10m，猪舍高度为2-3m，猪舍内分割成单元间，每个单元间面积为5-10平米，每个单元间两侧设有排水沟；

[0007] (2)猪舍消毒：使用生石灰洒在上述猪舍的地面上，每个猪舍使用1kg的生石灰，之后使用清水清洗猪舍，曝晒3天后在猪舍地面上铺上干草方可使用；

[0008] (3)幼猪饲养：选择刚出生的、活动性抢、健康的猪仔放于恒温箱中，箱内温度控制在24-30℃，湿度控制在60-65％，每天为猪仔喂养奶水三次，每100g奶水中含有3g中药粉、1鸭蛋黄；7-8日龄开始补喂乳猪料，12日龄后补充全价配合饲料；仔猪18-30日龄开始断奶；出生第18-19天，将硫酸镁加入蒸馏水中，配置成硫酸镁溶液，并给仔猪灌服，灌服后将饲料和活性炭混合均匀，喂食仔猪，每天1-2次，周期3-5天；仔猪27-29日龄，将小苏打、碘盐和葡萄糖加入到蒸馏水中，配置成开胃溶液，喂食仔猪，每天1-2次，周期3-5天；仔猪35-40日龄，将电解多维、黄芪多糖和维生素C加入到蒸馏水中，配置成营养溶液，喂食仔猪，每天1次，周期5-7天；

[0009] (4)成长期饲养：41-80日龄，使用成长期饲料喂养，每天喂食的成长期饲料的重量为幼猪体重的3-5％，每天喂食3次，分别在早晨6点、中午2点和晚上10点进行喂食；所述成长期饲料由以下重量份数的成分组成：玉米粉50-60份、中草药5-8份、豆粕15-20份、米糠

20-26份、松针粉10-15份、贝壳粉4-6份、青菜粉6-10份、水果碎块3-5份、胡萝卜冻干粉5-8份、酵母多糖1-2份；

[0010] (5)育肥期饲养：81-130日龄，开始进行放牧，每天下午3点至5点期间打开猪舍的门任其自由跑动和自由觅食，保持干净、安静的环境，每天喂食育肥期饲料，每天每只喂食2.5-3kg，在早晨10点和晚上5点各喂食一次；

[0011] (6)猪舍管理：每1-2周消毒猪舍一次，每次对猪舍冲洗并进行通风换气，用白醋对猪舍杀菌消毒，然后再用野艾和水蜡烛燃烧的烟气对猪舍熏蒸。

[0012] 优选地，所述中草药由以下重量份数的成分组成：大青叶8份、金钱草12份、党参4份、黄芪4份、甘草3份、艾叶6份、贯仲12份、槐花5份、金银花7份、车前草3份、牛蒡子4份。

[0013] 优选地，所述育肥期饲料由以下重量份的成分组成：玉米100-120份，米糠30-40份，菜籽饼25-30份，蚕蛹粉10-15份，燕麦壳15-20份，鱼粉10-15份，菜粕8-15份，食盐3-6份。

[0014] 本发明的有益效果：本发明黑猪饲料配方中的玉米、豆粕、青菜粉、胡萝卜冻干粉、贝壳粉可以提供黑猪生长所需的糖类、蛋白质、脂肪、维生素、纤维素等营养物质和钙等微量元素；本发明根据黑猪不同生长阶段消化吸收功能，饲喂不同的食物，但以粗粮和纤维素为主食，后期放养过程中每天都有很大的运动量，运动使得猪更健康，免疫力增强，这样喂养的黑猪营养价值高，肉质更加鲜美；在仔猪的旺食期，仔猪食量大，会需要大量营养为其快速增重，给仔猪喂食含电解多维、黄芪多糖和维生素C的蒸馏水，是因为电解多维中含有大量的维生素避免仔猪在快速增重中缺乏维生素，提高抗病力；黄芪多糖主要是黄芪发挥作用，仔猪食用之后可显著增强仔猪的非特异性免疫功能和体液免疫功能，黄芪对正常机体的抗体生成功能有明显促进作用，增强仔猪体质；而维生素C可以提高免疫力，维持机体正常生长，仔猪食用之后，可以避免仔猪生长阶段缺乏维生素C；所以仔猪在快速增重中既不会缺乏营养又可以使免疫力大幅度提升，增强仔猪体质。

具体实施方式

[0015] 下面结合具体实施例对本发明进一步详述，以下实施例只是描述性的，不是限定性的，不能以此限定本发明的保护范围。

[0016] 实施例1

[0017] 一种黑猪的饲养方法，包括以下步骤：

[0018] (1)猪舍准备：选择地势平坦、背风向阳、水源充足、植被丰富、周围1km无交通干道的地址作为猪场，坐北朝南建造猪舍，两两猪舍的间隔大于10m，猪舍高度为2-3m，猪舍内分割成单元间，每个单元间面积为5-10平米，每个单元间两侧设有排水沟；

[0019] (2)猪舍消毒：使用生石灰洒在上述猪舍的地面上，每个猪舍使用1kg的生石灰，之后使用清水清洗猪舍，曝晒3天后在猪舍地面上铺上干草方可使用；

[0020] (3)幼猪饲养：选择刚出生的、活动性抢、健康的猪仔放于恒温箱中，箱内温度控制在24-30℃，湿度控制在60-65％，每天为猪仔喂养奶水三次，每100g奶水中含有3g中药粉、1鸭蛋黄；7-8日龄开始补喂乳猪料，12日龄后补充全价配合饲料；仔猪18-30日龄开始断奶；出生第18-19天，将硫酸镁加入蒸馏水中，配置成硫酸镁溶液，并给仔猪灌服，灌服后将饲料和活性炭混合均匀，喂食仔猪，每天1-2次，周期3-5天；仔猪27-29日龄，将小苏打、碘盐和葡

葡糖加入到蒸馏水中，配置成开胃溶液，喂食仔猪，每天1-2次，周期3-5天；仔猪35-40日龄，将电解多维、黄芪多糖和维生素C加入到蒸馏水中，配置成营养溶液，喂食仔猪，每天1次，周期5-7天；

[0021] (4)成长期饲养：41-80日龄，使用成长期饲料喂养，每天喂食的成长期饲料的重量为幼猪体重的3-5％，每天喂食3次，分别在早晨6点、中午2点和晚上10点进行喂食；所述成长期饲料由以下重量份数的成分组成：玉米粉50份、中草药5份、豆粕15份、米糠20份、松针粉10份、贝壳粉4份、青菜粉6份、水果碎块3份、胡萝卜冻干粉5份、酵母多糖1份；

[0022] 所述中草药由以下重量份数的成分组成：大青叶8份、金钱草12份、党参4份、黄芪4份、甘草3份、艾叶6份、贯仲12份、槐花5份、金银花7份、车前草3份、牛蒡子4份；

[0023] (5)育肥期饲养：81-130日龄，开始进行放牧，每天下午3点至5点期间打开猪舍的门任其自由跑动和自由觅食，保持干净、安静的环境，每天喂食育肥期饲料，每天每只喂食2.5-3kg，在早晨10点和晚上5点各喂食一次；所述育肥期饲料由以下重量份的成分组成：玉米100份，米糠30份，菜籽饼25份，蚕蛹粉10份，燕麦壳15份，鱼粉10份，菜粕8份，食盐3份；

[0024] (6)猪舍管理：每1-2周消毒猪舍一次，每次对猪舍冲洗并进行通风换气，用白醋对猪舍杀菌消毒，然后再用野艾和水蜡烛燃烧的烟气对猪舍熏蒸。

[0025] 实施例2

[0026] 一种黑猪的饲养方法，包括以下步骤：

[0027] (1)猪舍准备：选择地势平坦、背风向阳、水源充足、植被丰富、周围1km无交通干道的地址作为猪场，坐北朝南建造猪舍，两两猪舍的间隔大于10m，猪舍高度为2-3m，猪舍内分割成单元间，每个单元间面积为5-10平米，每个单元间两侧设有排水沟；

[0028] (2)猪舍消毒：使用生石灰洒在上述猪舍的地面上，每个猪舍使用1kg的生石灰，之后使用清水清洗猪舍，曝晒3天后在猪舍地面上铺上干草方可使用；

[0029] (3)幼猪饲养：选择刚出生的、活动性抢、健康的猪仔放于恒温箱中，箱内温度控制在24-30℃，湿度控制在60-65％，每天为猪仔喂养奶水三次，每100g奶水中含有3g中药粉、1鸭蛋黄；7-8日龄开始补喂乳猪料，12日龄后补充全价配合饲料；仔猪18-30日龄开始断奶；出生第18-19天，将硫酸镁加入蒸馏水中，配置成硫酸镁溶液，并给仔猪灌服，灌服后将饲料和活性炭混合均匀，喂食仔猪，每天1-2次，周期3-5天；仔猪27-29日龄，将小苏打、碘盐和葡萄糖加入到蒸馏水中，配置成开胃溶液，喂食仔猪，每天1-2次，周期3-5天；仔猪35-40日龄，将电解多维、黄芪多糖和维生素C加入到蒸馏水中，配置成营养溶液，喂食仔猪，每天1次，周期5-7天；

[0030] (4)成长期饲养：41-80日龄，使用成长期饲料喂养，每天喂食的成长期饲料的重量为幼猪体重的3-5％，每天喂食3次，分别在早晨6点、中午2点和晚上10点进行喂食；所述成长期饲料由以下重量份数的成分组成：玉米粉60份、中草药8份、豆粕20份、米糠26份、松针粉15份、贝壳粉6份、青菜粉10份、水果碎块5份、胡萝卜冻干粉8份、酵母多糖2份；所述中草药由以下重量份数的成分组成：大青叶8份、金钱草12份、党参4份、黄芪4份、甘草3份、艾叶6份、贯仲12份、槐花5份、金银花7份、车前草3份、牛蒡子4份；

[0031] (5)育肥期饲养：81-130日龄，开始进行放牧，每天下午3点至5点期间打开猪舍的门任其自由跑动和自由觅食，保持干净、安静的环境，每天喂食育肥期饲料，每天每只喂食2.5-3kg，在早晨10点和晚上5点各喂食一次；所述育肥期饲料由以下重量份的成分组成：玉

米120份，米糠40份，菜籽饼30份，蚕蛹粉15份，燕麦壳20份，鱼粉15份，菜15份，食盐6份；

[0032] (6)猪舍管理：每1-2周消毒猪舍一次，每次对猪舍冲洗并进行通风换气，用白醋对猪舍杀菌消毒，然后再用野艾和水蜡烛燃烧的烟气对猪舍熏蒸。