



(12) 发明专利申请

(10) 申请公布号 CN 104523975 A

(43) 申请公布日 2015.04.22

(21) 申请号 201510051262.5

(22) 申请日 2015.02.02

(71) 申请人 冯波

地址 250000 山东省济南市历城区七里堡路
15号

(72) 发明人 范晓华

(51) Int. Cl.

A61K 36/808(2006.01)

A61K 9/08(2006.01)

A61P 19/04(2006.01)

A61P 29/00(2006.01)

A61K 33/26(2006.01)

A61K 35/583(2015.01)

权利要求书1页 说明书7页

(54) 发明名称

一种治疗肩周炎的酊剂及制备

(57) 摘要

本发明公开了一种治疗肩周炎的酊剂，主要由下列原料药制备而成，均为重量份：乌蛇 10-20；川芎 10-20；四块瓦 8-12；党参 10-15；川乌头 15-20；升麻 9-16；代赭石 8-12；玄参 10-16；夏枯草 9-12；牡丹皮 10-15；葛根 15-30；五香血藤 6-9；水苏 6-9；红花 10-15；伸筋草 10-15。本发明提供的酊剂具有温经散寒、消肿止痛等功效，能快速的减轻肩周炎患者的痛苦。

1. 一种治疗肩周炎的酊剂,其特征在于,主要由下列原料药制备而成,均为重量份:乌蛇 10-20;川芎 10-20;四块瓦 8-12;党参 10-15;川乌头 15-20;升麻 9-16;代赭石 8-12;玄参 10-16;夏枯草 9-12;牡丹皮 10-15;葛根 15-30;五香血藤 6-9;水苏 6-9;红花 10-15;伸筋草 10-15。

2. 如权利要求 1 所述的一种治疗肩周炎的酊剂,其特征在于,乌蛇 12-18;川芎 12-18;四块瓦 9-11;党参 11-14;川乌头 16-19;升麻 11-14;代赭石 9-11;玄参 12-14;夏枯草 10-11;牡丹皮 11-14;葛根 20-25;五香血藤 7-8;水苏 7-8;红花 11-14;伸筋草 11-14。

3. 如权利要求 1 所述的一种治疗肩周炎的酊剂,其特征在于,乌蛇 15;川芎 15;四块瓦 10;党参 12.5;川乌头 17.5;升麻 12.5;代赭石 10;玄参 13;夏枯草 10.5;牡丹皮 12.5;葛根 22.5;五香血藤 7.5;水苏 7.5;红花 12.5;伸筋草 12.5。

4. 如权利要求 1-3 任一所述的一种治疗肩周炎的酊剂的制备方法,其特征在于,步骤如下:

(1) 取乌蛇洗净切段,加入黄酒浸润,密封闷透,取出后隔水蒸 30-40 分钟(优选的:隔水蒸 32-38 分钟;更加优选的:隔水蒸 35 分钟),取出晾干;

(2) 将代赭石除杂洗净,加入醋与水(醋与水的比例为 1:1)一起煎煮,小火慢慢熬干,取出、砸成小块;

(3) 取川乌头拣去杂质,洗净灰屑,用甘草汁没过原料药 3cm 浸泡,取出与豆腐一起加水煎煮至熟透,去除豆腐后切片、晒干;

(4) 将除去乌蛇、代赭石和川乌头以外的其他原料药除杂、洗净、烘干后,与步骤(1)、(2)和(3)所制原料药一起粉碎,加入 75% 浓度的乙醇浸泡,密封振荡,浸渍 3-5 天(优选的:浸渍 3.5-4.5 天;更加优选的:浸渍 4 天),倾取上清液;

(5) 将步骤(4) 剩余药渣,再次加入 75% 浓度的乙醇,继续浸渍,合并两次浸出液,静置 24 小时,过滤即得酊剂。

5. 如权利要求 4 所述的一种治疗肩周炎的酊剂的制备方法,其特征在于,步骤(1)中黄酒的量为乌蛇重量的 5-8 倍(优选的:黄酒的量为乌蛇重量的 6-7 倍;更加优选的:黄酒的量为乌蛇重量的 6.5 倍)。

6. 如权利要求 4 所述的一种治疗肩周炎的酊剂的制备方法,其特征在于,步骤(2)中加入醋与水的量为代赭石重量的 8-12 倍(优选的:加入醋与水的量为代赭石重量的 9-11 倍;更加优选的:加入醋与水的量为代赭石重量的 10 倍)。

7. 如权利要求 4 所述的一种治疗肩周炎的酊剂的制备方法,其特征在于,步骤(3)中浸泡 40-60 分钟(优选的:浸泡 45-55 分钟;更加优选的:浸泡 50 分钟)。

8. 如权利要求 4 所述的一种治疗肩周炎的酊剂的制备方法,其特征在于,步骤(4)粉碎过 80-120 目筛(优选的:粉碎过 90-110 目筛;更加优选的:粉碎过 100 目筛)。

9. 如权利要求 4 所述的一种治疗肩周炎的酊剂的制备方法,其特征在于,步骤(4)加入乙醇的量为总原料药重量的 7-10 倍(优选的:加入乙醇的量为总原料药重量的 8-9 倍;更加优选的:加入乙醇的量为总原料药重量的 8.5 倍)。

10. 如权利要求 4 所述的一种治疗肩周炎的酊剂的制备方法,其特征在于,步骤(5)中继续浸渍 2-4 天(优选的:继续浸渍 2.5-3.5 天;更加优选的:继续浸渍 3 天)。

一种治疗肩周炎的酏剂及制备

技术领域

[0001] 本发明涉及中医中药领域,特别是涉及一种治疗肩周炎的酏剂及制备。

背景技术

[0002] 肩周炎,全称为肩关节周围炎,是肩关节周围肌肉、韧带、肌腱、滑囊、关节囊等软组织损伤、退变而引起的关节囊和关节周围软组织的一种慢性无菌性炎症。炎症导致关节内外粘连,从而影响肩关节的活动。它的临床表现为起病缓慢,病程较长,病程一般在1年以内,较长者可达到1-2年。发病年龄大多40岁以上,女性发病率略高于男性,且多见于体力劳动者。由于50岁左右的人易患此病,所以本病又称为五十肩。肩周炎祖国医学称之为“漏肩风”、“冻结肩”、“五十肩”等,是以肩关节疼痛为主,先呈阵发性酸痛,继之发生运动障碍的一种常见病、多发病。患有肩周炎的患者,自觉有冷气进入肩部,也有患者感觉有凉气从肩关节内部向外冒出,故又称“漏肩风”。因患病以后,肩关节不能运动,仿佛被冻结或凝固,故称“冻结肩”、“肩凝症”。其病变特点是广泛,即疼痛广泛、功能受限广泛、压痛广泛。药物治疗主要是一般是服用止痛、镇定剂来减轻患者的痛苦,亦或者采用针灸、推拿的方式,促进血液循环、缓解肌肉紧张。

[0003] 公开号 CN 104138540 A (申请号 201410338361.7)的中国专利文献公开了肩周炎贴膏,原料组成有:透骨草、蒲公英、大黄、没药、白芍、紫荆皮 10-20 份,大青叶、香附、肉桂、丁香、桑白皮、防己 5-10 份,羌活、威灵仙、虎杖、茯苓 10-15 份,菟丝子、穿山甲、玉米须、升麻、夜交藤、当归 15-20 份。公开号 CN 104096162 A (申请号 201310115168.2)的中国专利文献公开了一种治疗肩周炎的药贴,主要由威灵仙、伸筋草、透骨草、续断、延胡索、桑枝、苏木等 11 种原料药构成。公开号 CN 104056059 A (申请号 201410223874.3)的中国专利文献公开了一种治疗肩周炎的外用中药,原药组成有桔梗 10-12、甘草 5-8、大黄 2-4、山慈姑 5-7、七叶一枝花 2-4、楮实子 1-3、天花粉 4-6、乳香 2-4、僵蚕 1-3、荆芥 5-6、威灵仙 3-5、细辛 2-4、川断 1-3、自然铜 2-4、骨碎补 7-9、六棱麻 2-3、过江藤 1-3、白三百棒 2-4 和羊屎条根 3-5。

[0004] 现代医学中对于肩周炎的治疗,服用镇定止痛药物只能减轻患者痛苦,易复发,不能从根本上治愈,而部分中药制剂,因中医理念不同导致配方亦有差别,所以需要提高中药治疗效果,进一步优化配方。

发明内容

[0005] 针对现有技术的问题,本发明的目的是提供一种效果显著、使用安全适用性广的一种治疗肩周炎的酏剂及制备。

[0006] 本发明的技术方案是:

一种治疗肩周炎的酏剂,主要由下列原料药制备而成,均为重量份:乌蛇 10-20;川芎 10-20;四块瓦 8-12;党参 10-15;川乌头 15-20;升麻 9-16;代赭石 8-12;玄参 10-16;夏枯草 9-12;牡丹皮 10-15;葛根 15-30;五香血藤 6-9;水苏 6-9;红花 10-15;伸筋草 10-15。

[0007] 优选的是,乌蛇 12-18 ;川芎 12-18 ;四块瓦 9-11 ;党参 11-14 ;川乌头 16-19 ;升麻 11-14 ;代赭石 9-11 ;玄参 12-14 ;夏枯草 10-11 ;牡丹皮 11-14 ;葛根 20-25 ;五香血藤 7-8 ;水苏 7-8 ;红花 11-14 ;伸筋草 11-14。

[0008] 更加优选的是,乌蛇 15 ;川芎 15 ;四块瓦 10 ;党参 12.5 ;川乌头 17.5 ;升麻 12.5 ;代赭石 10 ;玄参 13 ;夏枯草 10.5 ;牡丹皮 12.5 ;葛根 22.5 ;五香血藤 7.5 ;水苏 7.5 ;红花 12.5 ;伸筋草 12.5。

[0009] 所述的一种治疗肩周炎的酏剂的制备方法,其步骤如下:

(1) 取乌蛇洗净切段,加入黄酒浸润,密封闷透,取出后隔水蒸 30-40 分钟(优选的:隔水蒸 32-38 分钟;更加优选的:隔水蒸 35 分钟),取出晾干;

(2) 将代赭石除杂洗净,加入醋与水(醋与水的比例为 1:1)一起煎煮,小火慢慢熬干,取出、砸成小块;

(3) 取川乌头拣去杂质,洗净灰屑,用甘草汁没过原料药 3cm 浸泡,取出与豆腐一起加水煎煮至熟透,去除豆腐后切片、晒干;

(4) 将除去乌蛇、代赭石和川乌头以外的其他原料药除杂、洗净、烘干后,与步骤(1)、(2)和(3)所制原料药一起粉碎,加入 75% 浓度的乙醇浸泡,密封振荡,浸渍 3-5 天(优选的:浸渍 3.5-4.5 天;更加优选的:浸渍 4 天),倾取上清液;

(5) 将步骤(4) 剩余药渣,再次加入 75% 浓度的乙醇,继续浸渍,合并两次浸出液,静置 24 小时,过滤即得酏剂。

[0010] 所述的一种治疗肩周炎的酏剂的制备方法,步骤(1) 中黄酒的量为乌蛇重量的 5-8 倍(优选的:黄酒的量为乌蛇重量的 6-7 倍;更加优选的:黄酒的量为乌蛇重量的 6.5 倍)。

[0011] 所述的一种治疗肩周炎的酏剂的制备方法,步骤(2) 中加入醋与水的量为代赭石重量的 8-12 倍(优选的:加入醋与水的量为代赭石重量的 9-11 倍;更加优选的:加入醋与水的量为代赭石重量的 10 倍)。

[0012] 所述的一种治疗肩周炎的酏剂的制备方法,步骤(3) 中浸泡 40-60 分钟(优选的:浸泡 45-55 分钟;更加优选的:浸泡 50 分钟)。

[0013] 所述的一种治疗肩周炎的酏剂的制备方法,步骤(4) 粉碎过 80-120 目筛(优选的:粉碎过 90-110 目筛;更加优选的:粉碎过 100 目筛)。

[0014] 所述的一种治疗肩周炎的酏剂的制备方法,步骤(4) 加入乙醇的量为总原料药重量的 7-10 倍(优选的:加入乙醇的量为总原料药重量的 8-9 倍;更加优选的:加入乙醇的量为总原料药重量的 8.5 倍)。

[0015] 所述的一种治疗肩周炎的酏剂的制备方法,步骤(5) 中继续浸渍 2-4 天(优选的:继续浸渍 2.5-3.5 天;更加优选的:继续浸渍 3 天)。

[0016] 本发明提供的一种治疗肩周炎的酏剂配方科学,制备方法简单。除此之外,它的优良之处还表现在:

- 1、本发明依据中医药理论,君臣佐使,合理选择药材,保证疗效确切;
- 2、本发明组方具有温经散寒、消肿止痛等功效,有效缓解不适症状;
- 3、本发明疗程短、见效快,能更快速的减轻肩周炎患者的痛苦。

具体实施方式

[0017] 下面结合实施例和实验例详细说明本发明的技术方案,但保护范围不限于此。

[0018] 实施例 1 一种治疗肩周炎的酏剂,主要由下列原料药制备而成,每份 4g:乌蛇 10 份,川芎 10 份,四块瓦 8 份,党参 10 份,川乌头 15 份,升麻 9 份,代赭石 8 份,玄参 10 份,夏枯草 9 份,牡丹皮 10 份,葛根 15 份,五香血藤 6 份,水苏 6 份,红花 10 份,伸筋草 10 份。上述一种治疗肩周炎的酏剂的制备方法是:

(1)取乌蛇洗净切段,加入乌蛇重量 5 倍的黄酒浸润,密封闷透,取出后隔水蒸 30 分钟,取出晾干;

(2)将代赭石除杂洗净,加入代赭石重量 8 倍的醋与水(醋与水的比例为 1:1)一起煎煮,小火慢慢熬干,取出、砸成小块;

(3)取川乌头拣去杂质,洗净灰屑,用甘草汁没过原料药 3cm 浸泡 40 分钟,取出与豆腐一起加水煎煮至熟透,去除豆腐后切片、晒干;

(4)将除去乌蛇、代赭石和川乌头以外的其他原料药除杂、洗净、烘干后,与步骤(1)、(2)和(3)所制原料药一起粉碎过 80 目筛,加入总原料药重量 7 倍的 75% 浓度的乙醇浸泡,密封振荡,浸渍 3 天,倾取上清液;

(5)将步骤(4)剩余药渣,再次加入 75% 浓度的乙醇,继续浸渍 2 天,合并两次浸出液,静置 24 小时,过滤即得酏剂。

[0019] 实施例 2 一种治疗肩周炎的酏剂,主要由下列原料药制备而成,每份 4g:乌蛇 20 份,川芎 20 份,四块瓦 12 份,党参 15 份,川乌头 20 份,升麻 16 份,代赭石 12 份,玄参 16 份,夏枯草 12 份,牡丹皮 15 份,葛根 30 份,五香血藤 9 份,水苏 9 份,红花 15 份,伸筋草 15 份。上述一种治疗肩周炎的酏剂的制备方法是:

(1)取乌蛇洗净切段,加入乌蛇重量 8 倍的黄酒浸润,密封闷透,取出后隔水蒸 40 分钟,取出晾干;

(2)将代赭石除杂洗净,加入代赭石重量 12 倍的醋与水(醋与水的比例为 1:1)一起煎煮,小火慢慢熬干,取出、砸成小块;

(3)取川乌头拣去杂质,洗净灰屑,用甘草汁没过原料药 3cm 浸泡 60 分钟,取出与豆腐一起加水煎煮至熟透,去除豆腐后切片、晒干;

(4)将除去乌蛇、代赭石和川乌头以外的其他原料药除杂、洗净、烘干后,与步骤(1)、(2)和(3)所制原料药一起粉碎过 120 目筛,加入总原料药重量 10 倍的 75% 浓度的乙醇浸泡,密封振荡,浸渍 5 天,倾取上清液;

(5)将步骤(4)剩余药渣,再次加入 75% 浓度的乙醇,继续浸渍 4 天,合并两次浸出液,静置 24 小时,过滤即得酏剂。

[0020] 典型病例:xxx,男性,48 岁。病史:患者长期伏案工作,运动量小,导致肩部酸胀湿疼,在药店买了几贴膏药,贴过之后,病情有所缓解,近一周来,酸痛加剧,活动不利,胳膊不能上举,手不能提重物,去医院检查,确诊为肩周炎。

[0021] 听人说中药治疗安全无副作用,便使用本实例所得酏剂,每天三次,将其直接涂抹或喷于患处,七天为一个疗程,患者使用一个疗程后,明显感觉肩部发热,疼痛缓解,坚持使用三个疗程,不适症全部消除,胳膊可自由伸展,患者痊愈。

[0022] 实施例 3 一种治疗肩周炎的酏剂,主要由下列原料药制备而成,每份 4g:乌蛇 12

份,川芎 12 份,四块瓦 9 份,党参 11 份,川乌头 16 份,升麻 11 份,代赭石 9 份,玄参 12 份,夏枯草 10 份,牡丹皮 11 份,葛根 20 份,五香血藤 7 份,水苏 7 份,红花 11 份,伸筋草 11 份。上述一种治疗肩周炎的酏剂的制备方法是:

(1)取乌蛇洗净切段,加入乌蛇重量 6 倍的黄酒浸润,密封闷透,取出后隔水蒸 32 分钟,取出晾干;

(2)将代赭石除杂洗净,加入代赭石重量 9 倍的醋与水(醋与水的比例为 1:1)一起煎煮,小火慢慢熬干,取出、砸成小块;

(3)取川乌头拣去杂质,洗净灰屑,用甘草汁没过原料药 3cm 浸泡 45 分钟,取出与豆腐一起加水煎煮至熟透,去除豆腐后切片、晒干;

(4)将除去乌蛇、代赭石和川乌头以外的其他原料药除杂、洗净、烘干后,与步骤(1)、(2)和(3)所制原料药一起粉碎过 90 目筛,加入总原料药重量 8 倍的 75% 浓度的乙醇浸泡,密封振荡,浸渍 3.5 天,倾取上清液;

(5)将步骤(4) 剩余药渣,再次加入 75% 浓度的乙醇,继续浸渍 2.5 天,合并两次浸出液,静置 24 小时,过滤即得酏剂。

[0023] 实施例 4 一种治疗肩周炎的酏剂,主要由下列原料药制备而成,每份 4g:乌蛇 18 份,川芎 18 份,四块瓦 11 份,党参 14 份,川乌头 19 份,升麻 14 份,代赭石 11 份,玄参 14 份,夏枯草 11 份,牡丹皮 14 份,葛根 25 份,五香血藤 8 份,水苏 8 份,红花 14 份,伸筋草 14 份。上述一种治疗肩周炎的酏剂的制备方法是:

(1)取乌蛇洗净切段,加入乌蛇重量 7 倍的黄酒浸润,密封闷透,取出后隔水蒸 38 分钟,取出晾干;

(2)将代赭石除杂洗净,加入代赭石重量 11 倍的醋与水(醋与水的比例为 1:1)一起煎煮,小火慢慢熬干,取出、砸成小块;

(3)取川乌头拣去杂质,洗净灰屑,用甘草汁没过原料药 3cm 浸泡 55 分钟,取出与豆腐一起加水煎煮至熟透,去除豆腐后切片、晒干;

(4)将除去乌蛇、代赭石和川乌头以外的其他原料药除杂、洗净、烘干后,与步骤(1)、(2)和(3)所制原料药一起粉碎过 110 目筛,加入总原料药重量 9 倍的 75% 浓度的乙醇浸泡,密封振荡,浸渍 4.5 天,倾取上清液;

(5)将步骤(4) 剩余药渣,再次加入 75% 浓度的乙醇,继续浸渍 3.5 天,合并两次浸出液,静置 24 小时,过滤即得酏剂。

[0024] 典型病例:xxx,女性,61 岁。病史:患者为退休清洁工人,患有肩周炎有五年了,肩部疼痛逐渐加重,放射至肘、手及肩胛区,呈持续性疼痛,夜间无法睡觉,长期靠贴膏药缓解,近期病情加重,严重影响正常生活。

[0025] 在家人的建议下,抱着试试看的态度使用本实例所得酏剂,每天三次,将其直接涂抹或喷于患处,七天为一个疗程,患者使用两个疗程后,疼痛明显减轻,晚间可正常睡觉,遂又继续使用两个疗程,肩功能恢复正常,身体康复,随访一年内,未出现复发。

[0026] 实施例 5 一种治疗肩周炎的酏剂,主要由下列原料药制备而成,每份 4g:乌蛇 15 份,川芎 15 份,四块瓦 10 份,党参 12.5 份,川乌头 17.5 份,升麻 12.5 份,代赭石 10 份,玄参 13 份,夏枯草 10.5 份,牡丹皮 12.5 份,葛根 22.5 份,五香血藤 7.5 份,水苏 7.5 份,红花 12.5 份,伸筋草 12.5 份。上述一种治疗肩周炎的酏剂的制备方法是:

(1) 取乌蛇洗净切段,加入乌蛇重量 6.5 倍的黄酒浸润,密封闷透,取出后隔水蒸 35 分钟,取出晾干;

(2) 将代赭石除杂洗净,加入代赭石重量 10 倍的醋与水(醋与水的比例为 1:1)一起煎煮,小火慢慢熬干,取出、砸成小块;

(3) 取川乌头拣去杂质,洗净灰屑,用甘草汁没过原料药 3cm 浸泡 50 分钟,取出与豆腐一起加水煎煮至熟透,去除豆腐后切片、晒干;

(4) 将除去乌蛇、代赭石和川乌头以外的其他原料药除杂、洗净、烘干后,与步骤(1)、(2)和(3)所制原料药一起粉碎过 100 目筛,加入总原料药重量 8.5 倍的 75% 浓度的乙醇浸泡,密封振荡,浸渍 4 天,倾取上清液;

(5) 将步骤(4) 剩余药渣,再次加入 75% 浓度的乙醇,继续浸渍 3 天,合并两次浸出液,静置 24 小时,过滤即得酊剂。

[0027] 本发明所用主要中药原料的药理如下:

乌蛇:基原:为游蛇科动物乌梢蛇除去内脏的全体。性味:甘咸,平。归经:《雷公炮制药性解》:"入肺、脾二经。"功能主治:祛风湿,通经络。治风湿顽痹,肌肤不仁,骨、关节结核,风疹疥癣,麻风,破伤风,小儿麻痹症。

[0028] 川芎:性味与归经:辛,温。归肝、胆、心包经。功能主治:行气开郁,祛风燥湿,活血止痛。治风冷头痛眩晕,胁痛腹疼,寒痹筋挛,经闭,难产,产后瘀阻块痛,痈疽疮疡。用于月经不调,经闭痛经,痈腹痛,胸胁刺痛,跌扑肿痛,头痛,风湿痹痛。

[0029] 四块瓦:基原:为报春花科植物落地梅的全草。化学成份:含有重楼排草甙,甙元为仙客来甙元 D。性味:辛;苦;性温。功能主治:祛风除湿;活血止痛;止咳;解毒。主风湿疼痛;脘腹疼痛;咳嗽;跌打损伤;疔肿疮疔;毒蛇咬伤。

[0030] 党参:性味与归经:甘,平。归脾、肺经。功能与主治:健脾益肺,养血生津。用于脾肺气虚,食少倦怠,咳嗽虚喘,气血不足,面色萎黄,心悸气短,津伤口渴,内热消渴。

[0031] 川乌头:基原:为毛茛科植物乌头(栽培品)的母根。性味:辛;苦;热;大毒。归经:心;肝;脾;肾经。祛风除湿;温经;散寒止痛。主风寒湿痹;关节疼痛;肢体麻木;半身不遂;头风头痛;心腹冷痛;寒疝作痛;跌打瘀痛;阴疽肿毒;并可用于麻醉止痛。

[0032] 升麻:基原:为毛茛科植物升麻、兴安升麻和大三叶升麻的根状茎。性味与归经:辛、微甘,微寒。归肺、脾、胃、大肠经。功能与主治:发表透疹,清热解毒,升举阳气。用于风热头痛,齿痛,口疮,咽喉肿痛,麻疹不透,阳毒发斑,子宫脱垂。

[0033] 代赭石:基原:为氧化物类矿物刚玉族赤铁矿。成分:主含三氧化二铁(Fe_2O_3),其中铁 70%,氧 30%,并含有硅、铝、钛、镁、锰、钙、铅、砷等杂质。性味与归经:苦,寒。归肝、心经。有平肝潜阳,降逆,止血的功效。用于眩晕耳鸣,呕吐,噎气,呃逆,喘息,吐血,衄血,崩漏下血。

[0034] 玄参:味苦咸,性微寒。无毒。有清热凉血、泻火解毒、养阴清热的功效。用于热病伤阴、舌绛烦渴、温毒发斑、津伤便秘、骨蒸劳嗽、目赤、咽痛、瘰疬、白喉、痈肿疮毒。

[0035] 夏枯草:基原:为唇形科植物夏枯草的果穗。性味与归经:辛、苦,寒。归肝、胆经。有清肝泻火,明目,散结消肿的功效。用于目赤肿痛,目珠夜痛,头痛眩晕,瘰疬,癭瘤,乳痛,乳癖,乳房胀痛。

[0036] 牡丹皮:基原:为毛茛科植物牡丹的根皮。化学成份:根含牡丹酚、牡丹酚甙、牡丹

酚原甙、芍药甙。尚含挥发油 0.15 ~ 0.4% 及植物甾醇等。性味：辛苦，凉。归经：入心、肝、肾经。功能主治：清热，凉血，和血，消瘀。治热入血分，发斑，惊痫，吐、衄、便血，骨蒸劳热，经闭，症瘕，痲疹，扑损。

[0037] 葛根：性味：甘、辛，凉。归经：归脾、胃经。功效：解肌退热，生津，透疹，升阳止泻。主治：用于外感发热头痛、项背强痛，口渴，消渴，麻疹不透，热痢，泄泻；高血压颈项强痛。

[0038] 五香血藤：基原：为五味子科植物华五味子的藤茎及根。性味：酸；性温。归经：肝、肺、胃经。功能主治：舒筋活血；理气止痛；健脾消食；敛肺生津。主跌打损伤；骨折；劳伤；风湿腰痛；关节酸痛；食积停滞；胃痛；腹胀；久咳气短；津少口渴；月经不调；小儿遗尿；烫伤。

[0039] 水苏：基原：为唇形科植物水苏、华水苏或毛水苏的全草或根。性味：味辛；性凉。归经：归肺；胃经。功能主治：清热解毒；止咳利咽；止血消肿。主感冒；痧症；肺痿；肺痈；头风目眩；咽痛；失音；吐血；咯血；衄血；崩漏；痢疾；淋证；跌打肿痛。

[0040] 红花：基原：菊科、红花属植物，干燥的管状花，橙红色。化学成分：含有红花醌苷、新红花苷、红花苷、红花黄色素和黄色素。另含红花油，油中包括棕榈酸、肉豆蔻酸、月桂酸、硬脂酸、花生酸、油酸等。药理作用：有轻度兴奋心脏、降低冠脉阻力、增加冠脉流量和心肌营养性血流量的作用；保护和改善心肌缺血，缩小心肌梗死范围；红黄色素分离物能对抗心律失常；煎剂、水提液、红花黄色素等能扩张周围血管、降低血压。能抑制血小板聚集，增强纤维蛋白溶解，降低全血粘度。注射液、醇提物、红花苷能显著提高耐缺氧能力，对缺血缺氧性脑病有保护作用。性味与归经：辛，温。归心、肝经。有活血通经、祛瘀止痛的功效。用于治经闭，症瘕，难产，死胎，产后恶露不行、瘀血作痛，痲疹，跌扑损伤。

[0041] 伸筋草：基原：为石松科植物石松、华中石松及灯笼草的全草。性味：苦；辛；温；无毒；平。归经：肝；脾；肾经。功能主治：祛风散寒；除湿消肿；舒筋活血；止咳；解毒。主风寒湿痹；关节酸痛；皮肤麻木；四肢软弱；水肿；跌打损伤；黄疸；咳嗽；疮疡；疱疹；烫伤。

[0042] 试验例 1 本发明所得一种治疗肩周炎的酊剂(实施例 5)的临床应用：

选取人群：按照肩周炎的诊断标准(① 40 ~ 50 岁以上中老年，常有风湿寒邪侵袭史或外伤史。② 肩部疼痛及活动痛，夜间加重，可放射到手，但无感觉异常。③ 肩关节活动尤以上举、外展、内、外旋受限。④ 肩周压痛，特别是肱二头肌长头腱沟。⑤ 肩周肌肉痉挛或肌萎缩。⑥ X 线及化验检查一般无异常发现。)，从多家医院筛选肩周炎患者 407 例，其中女性 213 例，男性 194 例，年龄范围 40-70 岁，病程最短半年，最长为 10 年，患者均自愿接受试验。

[0043] 试验前，将患者随机分为两组，实验组 245 例和对照组 162 例，两组在性别、年龄、病程、病情等方面无显著差异。实验组使用本发明所得酊剂，每天三次，将其直接涂抹或喷于患处，七天为一个疗程；对照组使用其他常规药物(万通筋骨片、肩周炎贴、舒筋活血片或消炎痛等)。用药期间对两组患者进行连续观察，记录症状及变化。

[0044] 疗效判定标准：参照文献疗效标准，(1) 治愈：肩部疼痛消失，肩关节功能完全恢复；(2) 显效：肩部疼痛基本消失，肩关节功能基本恢复；(3) 有效：肩部疼痛减轻，肩关节功能有所改善，但仍活动受限；(4) 无效：症状与体征均无改善。

[0045] 临床结果：经过四个疗程的治疗，两组的治疗结果如表 1 所示：

组别	标准		治愈		显效		有效		无效	
	人数	百分比	人数	百分比	人数	百分比	人数	百分比	人数	百分比
实验组	158	64.5%	47	19.2%	32	13.1%	8	3.2%		
对照组	86	53.1%	36	22.2%	19	11.7%	21	13.0%		

由表 1 可得,实验组的总有效率为 96.8%,远高于对照组的 87.0%,且治疗期间,使用本发明所得酞剂的患者,疗程短、见效快,治疗后患者的身体较之前有明显提高。

[0046] 本发明所使用的中药,有祛风通络的乌蛇,祛风止痛的川芎,活血止痛的四块瓦,养血生津的党参,散寒止痛的川乌头,清热解毒的升麻,降逆止血的代赭石,清热凉血的玄参,散结消肿的夏枯草,凉血消瘀的牡丹皮,解肌退热的葛根,舒筋活血的五香血藤,止血消肿的水苏,祛瘀止痛的红花,祛风散寒、消肿止痛的伸筋草,多种药材协同合作,使得药效最大限度的发挥,针对肩周炎具有显著的治疗效果。

[0047] 应当指出的是,具体实施方式只是本发明比较有代表性的例子,显然本发明的技术方案不限于上述实施例,还可以有很多变形。本领域的普通技术人员,以本发明所明确公开的或根据文件的书面描述毫无异议的得到的,均应认为是本专利所要保护的范围。