

ROYAUME DE BELGIQUE

BREVET D'INVENTION



MINISTERE DES AFFAIRES ECONOMIQUES

NUMERO DE PUBLICATION : 1008751A3

NUMERO DE DEPOT : 09500448

Classif. Internat. : C12N A23L D21C

Date de délivrance le : 02 Juillet 1996

Le Ministre des Affaires Economiques,

Vu la Convention de Paris du 20 Mars 1883 pour la Protection de la propriété industrielle;

Vu la loi du 28 Mars 1984 sur les brevets d'invention, notamment l'article 22;

Vu l'arrêté royal du 2 Décembre 1986 relatif à la demande, à la délivrance et au maintien en vigueur des brevets d'invention, notamment l'article 28;

Vu le procès verbal dressé le 17 Mai 1995 à 14H25 à l'Office de la Propriété Industrielle

ARRETE:

ARTICLE 1.- Il est délivré à : SOLVAY (Société Anonyme)
rue du Prince Albert 33, B-1050 BRUXELLES(BELGIQUE)

représenté(e)(s) par : MEYERS Liliane, SOLVAY - Département Prop. Indus., Rue de Ransbeek, 310 - 1120 BRUXELLES.

un brevet d'invention d'une durée de 20 ans, sous réserve du paiement des taxes annuelles, pour : XYLANASE, MICROORGANISMES LA PRODUISANT, MOLECULES D'ADN, PROCEDES DE PREPARATION DE CETTE XYLANASE ET UTILISATIONS DE CELLE-CI.

PRIORITE(S) 26.07.94 BE BEA 9400706

ARTICLE 2.- Ce brevet est délivré sans examen préalable de la brevetabilité de l'invention, sans garantie du mérite de l'invention ou de l'exactitude de la description de celle-ci et aux risques et périls du(des) demandeurs(s).

Bruxelles, le 02 Juillet 1996
PAR DELEGATION SPECIALE :

L. WUYTS
CONSEILLER

Xylanase, microorganismes la produisant, molécules d'ADN, procédés de préparation de cette xylanase et utilisations de celle-ci

L'invention concerne une nouvelle xylanase. L'invention concerne également les procédés de préparation de cette xylanase, les utilisations de celle-ci et les compositions comprenant celle-ci.

5 L'invention concerne également une nouvelle souche de microorganismes produisant cette xylanase et une molécule d'ADN comprenant la séquence de nucléotides qui code pour cette xylanase. L'invention concerne également des vecteurs contenant cette molécule d'ADN et les souches transformées par ces vecteurs.

10 L'invention concerne également le promoteur dérivé du gène qui code pour la xylanase de *Bacillus pumilus* PRL B12 et la préséquence qui code pour le peptide signal de la xylanase de *Bacillus pumilus* PRL B12. L'invention concerne également des vecteurs, qui contiennent ce promoteur et cette préséquence, et également la molécule d'ADN comprenant la séquence de nucléotides qui code pour la partie mature de la xylanase de l'invention. L'invention concerne également des souches transformées par ces vecteurs.

15 Des xylanases thermostables, actives dans une large gamme de pH sont connues, telles que notamment des xylanases produites par des souches de bacille alcalophile, (Gupta, et al. BIOTECHNOLOGY LETTERS, 1992, 14 (11), pages 1045-1046 et demande de brevet international WO 94/04664). Cependant, malgré ces propriétés, ces enzymes sembleraient peu efficaces en blanchiment de pâte à papier.

20 En conséquence, il y a actuellement un besoin pour une xylanase utilisable lors du traitement de la pâte à papier, très stable et également très active dans une large gamme de température et de pH basique et acide.

25 La présente invention a pour but de fournir une nouvelle xylanase, active dans une large gamme de pH, aussi bien à pH alcalin qu'à pH acide.

30 La présente invention a également pour but d'identifier, isoler et fournir une souche, en particulier une souche de *Bacillus*, qui produit naturellement ladite xylanase.

La présente invention a également pour but d'isoler et de fournir une

molécule d'ADN comprenant une séquence de nucléotides qui code pour ladite xylanase.

La présente invention a également pour but de préparer et fournir un vecteur d'expression contenant la séquence de nucléotides codant pour ladite xylanase.

La présente invention a également pour but de préparer et fournir un vecteur d'intégration contenant la séquence de nucléotides codant pour ladite xylanase.

La présente invention a également pour but de préparer et fournir le promoteur dérivé du gène qui code pour la xylanase de *Bacillus pumilus* PRL B12. La présente invention a également pour but de préparer et fournir la préséquence qui code pour le peptide signal de la xylanase de *Bacillus pumilus* PRL B12. Les vecteurs, qui comprennent ce promoteur et/ou cette préséquence, contiennent également la molécule d'ADN comprenant la séquence de nucléotides qui code pour la partie mature de la xylanase de l'invention. Les souches transformées par ces vecteurs produisent la xylanase de l'invention de façon hétérologue.

La présente invention a également pour but de préparer et fournir un hôte de *Bacillus* transformé avec le vecteur d'expression qui contient la molécule d'ADN comprenant la séquence de nucléotides de la souche de *Bacillus* codant pour ladite xylanase.

La présente invention a également pour but de préparer et fournir un hôte de *Bacillus* transformé avec le vecteur d'intégration qui contient la molécule d'ADN comprenant la séquence de nucléotides de la souche de *Bacillus* codant pour ladite xylanase.

La présente invention a également pour but de préparer et fournir une composition contenant cette xylanase.

La présente invention a également pour but de préparer et fournir une xylanase utilisable dans le traitement de la pâte à papier, et des pâtes ayant un pH basique, neutre ou acide, et notamment des pâtes ayant un pH particulièrement basique, et des pâtes à papier de diverses provenances, telles que les pâtes provenant d'arbres résineux, les pâtes provenant d'arbres feuillus, et particulièrement la pâte d'eucalyptus.

A cet effet, l'invention concerne une xylanase provenant d'un *Bacillus*, et plus particulièrement d'un microorganisme aérobique et non thermophile.

On utilise de préférence la souche de *Bacillus* sp. 720/1 ou un dérivé ou

mutant de cette souche. La xylanase de l'invention est dérivée de (naturellement produite par) la souche de *Bacillus* sp. 720/1. La xylanase est classifiée dans le système international sous le numéro E.C. 3.2.1.8. Il s'agit d'une endo-1,4-bêta-xylanase.

5 De préférence la xylanase, isolée et purifiée, est constituée d'un seul type de polypeptide, ayant un poids moléculaire d'environ 25 kDa.

L'invention concerne une xylanase, isolée et purifiée, comprenant la séquence d'acides aminés de 1 à 221 acides aminés (SEQ ID NO:3) ou une séquence modifiée dérivée de celle-ci. La séquence d'acides aminés et la
10 séquence de nucléotides (SEQ ID NO:1) codant pour la xylanase mature, ainsi que sa traduction en acides aminés (SEQ ID NO:2), est donnée à la figure 1 (figures 1a et 1b).

La xylanase de l'invention est synthétisée sous forme d'un précurseur. Le précurseur contient 248 acides aminés : (SEQ ID NO:6). On identifie la
15 séquence de nucléotides (SEQ ID NO:4) codant pour le précurseur de la xylanase, ainsi que sa traduction en acides aminés (SEQ ID NO:5).

Le précurseur contient la séquence de 221 acides aminés (SEQ ID NO:3) de la xylanase mature et la séquence de 27 acides aminés (SEQ ID NO:9) de la préséquence.

20 La séquence de la xylanase mature est précédée d'une préséquence. Il s'agit d'une séquence additionnelle de 27 acides aminés (SEQ ID NO:9). On identifie la séquence de nucléotides correspondante (SEQ ID NO:7), ainsi que sa traduction en acides aminés (SEQ ID NO:8). Cette préséquence code pour le peptide signal de la xylanase de l'invention.

25 De manière particulièrement préférée, ladite xylanase a un point isoélectrique déterminé compris entre environ 9,5 et environ 9,7.

La xylanase selon l'invention est thermostable et active dans une large gamme de pH. De préférence, la xylanase selon l'invention est alcaline.

30 La xylanase selon l'invention possède par ailleurs toutes les propriétés adéquates compatibles avec les conditions industrielles réelles de traitement enzymatique de la pâte à papier. Selon les multiples étapes des divers traitements de la pâte à papier mis en oeuvre industriellement, ces propriétés sont une bonne stabilité vis-à-vis du pH et de la température, une activité enzymatique dans une large gamme de pH et de température, tels
35 que notamment un pH compris entre environ 5 et 10 et une température comprise entre environ 50 et 80 °C.

La xylanase de l'invention est active dans une gamme de pH supérieure ou égale à environ 5. La xylanase de l'invention est active dans une gamme de pH inférieure ou égale à environ 11. La xylanase développe une activité enzymatique de plus de 50 % de l'activité maximale, mesurée à une
5 température d'environ 50 °C et en présence de xylane, dans une gamme de pH supérieure ou égale à environ 5,0. La xylanase développe une activité enzymatique de plus de 50 % de l'activité maximale, mesurée à une température d'environ 50 °C et en présence de xylane, dans une gamme de pH inférieure à environ 10,5.

10 La xylanase de l'invention est active dans une gamme de température supérieure ou égale à environ 50 °C. La xylanase de l'invention est active dans une gamme de température inférieure ou égale à environ 80 °C. La xylanase développe une activité enzymatique de plus de 50 % de l'activité maximale, mesurée à un pH d'environ 9 et en présence de xylane, dans une
15 gamme de température supérieure ou égale à environ 50 °C. La xylanase développe une activité enzymatique de plus de 50 % de l'activité maximale, mesurée à un pH d'environ 9 et en présence de xylane, dans une gamme de température inférieure à environ 80 °C.

L'invention concerne également une xylanase modifiée, c'est-à-dire une
20 enzyme dont la séquence en acides aminés diffère de celle de l'enzyme sauvage par au moins un acide aminé. Ces modifications peuvent être obtenues par des techniques classiques de mutagenèse sur l'ADN, telles que l'exposition à des rayonnements ultraviolets, à des produits chimiques, tels que l'éthyl méthane sulfonate (EMS), le N-méthyl-N-nitro-N-
25 nitrosoguanidine (MNNG), le nitrite de sodium ou l'O-méthylhydroxylamine ou par des techniques de génie génétique, comme, par exemple, la mutagenèse dirigée ou la mutagenèse aléatoire. Ces techniques sont connues de l'homme du métier et sont notamment décrites dans MOLECULAR
CLONING - a laboratory manual - SAMBROOK, FRITSCH, MANIATIS -
30 second edition, 1989, chapitre 15.

L'invention concerne également une xylanase ayant des propriétés immunochimiques identiques ou partiellement identiques à la xylanase obtenue à partir de la souche de Bacillus sp. 720/1. Les propriétés immunochimiques peuvent être déterminées de façon immunologique par des
35 tests d'identité, notamment en utilisant des anticorps spécifiques, polyclonaux ou monoclonaux. Des tests d'identité sont connus de l'homme

du métier, tels que notamment la méthode d'immunodiffusion d'Ouchterlony, ou la méthode d'immunoélectrophorèse. Des exemples de telles méthodes sont décrits par Axelsen N.H., Handbook of Immunoprecipitation Gel Techniques, Blackwell Scientific Publications, 1983, chapitres 5 et 14, les termes "identité antigénique" et "identité antigénique partielle" sont décrits dans ce document aux chapitres 5, 19 et 20. Un serum contenant l'anticorps spécifique est préparé selon la méthode décrite en immunisant des animaux (par exemples souris, lapin ou chèvre) avec une préparation de xylanase purifiée. Cette préparation peut être mélangée avec un additif, tel que l'adjuvant de Freund, et le mélange obtenu est injecté à des animaux. L'anticorps polyclonal est obtenu après une ou plusieurs immunisations. Un exemple consiste à injecter, de façon sous cutanée à deux semaines d'intervalle, quatre fractions contenant chacune 150 microgrammes de xylanase purifiée, l'immunisation dure alors 8 semaines. Le sérum est prelevé après la période d'immunisation et l'immunoglobuline peut être isolée selon la méthode décrite par Axelsen N.H. (1983).

La présente invention concerne également l'identification et la fourniture d'une nouvelle bactérie, isolée et purifiée, aérobie produisant la xylanase. Généralement elle appartient à la famille de Bacillaceae. De préférence elle appartient au genre Bacillus. De manière particulièrement préférée, ledit Bacillus est la souche de Bacillus sp. 720/1 ou un dérivé ou mutant de cette souche.

Par dérivé de cette souche, on entend toute bactérie modifiée naturellement. Les dérivés de cette souche peuvent être obtenus par les techniques connues de modification telles que culture sur milieu spécifique, rayonnement ultraviolet, rayons X. Par mutant de cette souche, on entend toute bactérie modifiée artificiellement. Les mutants de cette souche peuvent être obtenus par les techniques connues de modification telles que l'exposition à des agents mutagènes, et les techniques de génie génétique. Ces techniques sont connues de l'homme du métier et sont notamment décrites dans SAMBROOK et al., 1989, chapitre 15.

La souche de Bacillus sp. 720/1 a été déposée à la collection nommée BELGIAN COORDINATED COLLECTIONS OF MICROORGANISMS (LMG culture collection, Université de Gand, Laboratoire de Microbiologie - K.L. Ledeganckstraat 35, B-9000 Gand, Belgique) conformément au

Traité de Budapest sous le numéro LMG P-14798 le 9 juin 1994.

L'invention concerne une culture isolée et purifiée de la souche de *Bacillus* sp. 720/1 et une culture dérivée ou mutée de celle-ci.

5 La souche de la présente invention a été identifiée par ses caractéristiques biochimiques : bactérie Gram positif, aérobique, qui se présente sous la forme de bâtonnet, elle forme une endospore. Elle est oligosporogène.

L'invention concerne également l'isolement et la fourniture d'une molécule d'ADN comprenant la séquence de nucléotides
10 (SEQ ID NO:1) qui code pour la xylanase mature de *Bacillus* sp. 720/1 (LMG P-14798) ou une séquence modifiée dérivée de celle-ci. De préférence cette molécule d'ADN comprend tout le gène de la xylanase de *Bacillus* sp. 720/1. Par tout le gène de la xylanase (SEQ ID NO:10), on entend au moins le (ou les) promoteur(s) de transcription, la (ou les)
15 séquence(s) signal, la séquence de nucléotides codant pour la xylanase mature et le (ou les) terminateur(s) de transcription.

Par séquence modifiée dérivée de la molécule d'ADN, on entend toute molécule d'ADN obtenue par modification d'un ou de plusieurs nucléotides du gène qui code pour la xylanase de l'invention. Les techniques d'obtention
20 de telles séquences sont connues de l'homme du métier et sont notamment décrites dans MOLECULAR CLONING - a laboratory manual - SAMBROOK, FRITSCH, MANIATIS - second edition, 1989, chapitre 15. Habituellement, la séquence modifiée dérivée de la molécule d'ADN comprend au moins 70 % d'homologie avec la séquences de nucléotides
25 (SEQ ID NO:1) du gène qui code pour la xylanase de l'invention, c'est-à-dire au moins 70 % de nucléotides identiques et ayant la même position dans la séquence. De préférence, la séquence modifiée dérivée de la molécule d'ADN comprend au moins 80 % d'homologie avec la séquence de nucléotides (SEQ ID NO:1) du gène qui code pour la xylanase de
30 l'invention. De manière particulièrement préférée, la séquence modifiée dérivée de la molécule d'ADN comprend au moins 90 % d'homologie avec la séquences de nucléotides (SEQ ID NO:1) du gène qui code pour la xylanase de l'invention.

La séquence complète de nucléotides codant pour la xylanase mature,
35 ainsi que sa traduction en acides aminés (SEQ ID NO:2), est donnée à la figure 1 (figures 1a et 1b).

Habituellement, la molécule d'ADN, selon l'invention, comprend au moins la séquence de nucléotides (SEQ ID N0:4) qui code pour le précurseur de la xylanase ou une séquence modifiée dérivée de celle-ci. Cette séquence de nucléotides (SEQ ID N0:4) comprend la séquence de

5 nucléotides (SEQ ID N0:1) codant pour la xylanase mature de *Bacillus* sp. 720/1 (LMG P-14798) et sa séquence signal (préséquence) (SEQ ID N0:7). De préférence, cette molécule d'ADN comprend tout le gène de la xylanase de *Bacillus* sp. 720/1 et, de manière particulièrement préférée, la séquence de nucléotides (SEQ ID NO:10). La séquence de nucléotides

10 (SEQ ID NO:10) est constituée de, dans le sens amino-carboxy et de gauche à droite, la séquence de nucléotides (SEQ ID NO:12) qui comprend le promoteur de la xylanase, la séquence de nucléotides de la préséquence (SEQ ID NO:7), la séquence de nucléotides de la xylanase mature (SEQ ID NO:1) et la séquence de nucléotides (SEQ ID NO:13) qui comprend le

15 terminateur de la xylanase. La figure 2 (figure 2a et figure 2b) représente la séquence de nucléotides du gène codant pour la xylanase ainsi que sa traduction en acides aminés (SEQ ID NO:11).

Dans une variante, l'invention concerne également une molécule d'ADN qui comprend le promoteur dérivé du gène qui code pour la

20 xylanase de *Bacillus pumilus* PRL B12, une préséquence et la séquence de nucléotides (SEQ ID N0:1) qui code pour la xylanase de *Bacillus* sp. 720/1 ou une séquence modifiée dérivée de celle-ci. Dans une autre variante, l'invention concerne également une molécule d'ADN qui comprend un

25 promoteur, la préséquence qui code pour le peptide signal de la xylanase de *Bacillus pumilus* PRL B12 et la séquence de nucléotides (SEQ ID N0:1) qui code pour la xylanase de *Bacillus* sp. 720/1 ou une séquence modifiée dérivée de celle-ci. De préférence, l'invention concerne une molécule

30 d'ADN qui comprend le promoteur (SEQ ID NO:26) dérivé du gène qui code pour la xylanase de *Bacillus pumilus* PRL B12, la préséquence (SEQ ID NO:27) qui code pour le peptide signal de la xylanase de *Bacillus pumilus* PRL B12 et la séquence de nucléotides (SEQ ID N0:1) qui code pour la xylanase de *Bacillus* sp. 720/1 ou une séquence modifiée dérivée de celle-ci.

L'invention concerne également le promoteur (SEQ ID NO:26) dérivé

35 du gène qui code pour la xylanase de *Bacillus pumilus* PRL B12. La séquence du promoteur est illustrée à la figure 11.

L'invention concerne également la préséquence (SEQ ID NO:27) qui code pour le peptide signal de la xylanase de *Bacillus pumilus* PRL B12. La séquence correspondante de 27 acides aminés a été identifiée (SEQ ID NO:29). Cette séquence de nucléotides, ainsi que sa traduction en acides aminés, (SEQ ID NO:28) est illustrée à la figure 12.

Le procédé d'obtention et de préparation du promoteur dérivé du gène qui code pour la xylanase de *Bacillus pumilus* PRL B12 et de la préséquence qui code pour le peptide signal de la xylanase de *Bacillus pumilus* PRL B12 est décrit à l'exemple 17 et à la figure 1 de la demande de brevet européen 0 634 490 qui est incorporée par référence dans cette demande.

La souche de *Bacillus pumilus* PRL B12 a été déposée à la collection ATCC (American Type Culture Collection, 12301 Parklawn Drive, Rockville, Maryland, 20852, Etats-Unis) conformément au Traité de Budapest sous le numéro ATCC 55443 le 24 juin 1993.

L'invention concerne également une molécule d'ADN mutée, et la xylanase mutée qui en dérive (pour laquelle la molécule d'ADN mutée code), obtenue par modification de la séquence de nucléotides du gène qui code pour la xylanase définie ci-dessus. Les techniques d'obtention de telles xylanases mutées sont connues de l'homme du métier et sont notamment décrites dans MOLECULAR CLONING - a laboratory manual - SAMBROOK, FRITSCH, MANIATIS - second edition, 1989, chapitre 15.

La présente invention concerne également un vecteur d'expression ou vecteur d'intégration chromosomique contenant une molécule d'ADN, telle que définie ci-dessus. Généralement, le vecteur d'expression ou le vecteur d'intégration chromosomique contient la molécule d'ADN qui comprend la séquence de nucléotides (SEQ ID NO:1) qui code pour la xylanase de *Bacillus* sp. 720/1 ou une séquence modifiée dérivée de celle-ci. Habituellement, le vecteur d'expression ou le vecteur d'intégration chromosomique contient une molécule d'ADN qui comprend le gène qui code pour la xylanase ou une séquence modifiée dérivée de celle-ci. De préférence, le vecteur d'expression ou le vecteur d'intégration chromosomique contient la molécule d'ADN qui comprend la séquence de nucléotides (SEQ ID NO:10) qui code pour la xylanase de *Bacillus* sp. 720/1 ou une séquence modifiée dérivée de celle-ci. De manière particulièrement préférée, ce vecteur est le vecteur d'expression pUBRD-720X11. De bons

résultats ont également été obtenus avec le vecteur d'expression pUBR-720X11.

Une variante de l'invention concerne un vecteur d'expression ou un vecteur d'intégration chromosomique qui contient une molécule d'ADN comprenant le gène qui code pour la partie mature de la xylanase ou une séquence modifiée dérivée de celle-ci. Généralement, le vecteur d'expression ou le vecteur d'intégration chromosomique contient la molécule d'ADN qui comprend la séquence de nucléotides (SEQ ID N0:1) qui code pour la xylanase de *Bacillus* sp. 720/1 ou une séquence modifiée dérivée de celle-ci. Habituellement, le vecteur d'expression ou le vecteur d'intégration chromosomique contient une molécule d'ADN qui comprend le promoteur dérivé du gène (SEQ ID NO:26) qui code pour la xylanase de *Bacillus pumilus* PRL B12, une préséquence et la séquence de nucléotides (SEQ ID N0:1) qui code pour la xylanase de *Bacillus* sp. 720/1 ou une séquence modifiée dérivée de celle-ci. Dans une variante habituelle, le vecteur d'expression contient une molécule d'ADN qui comprend un promoteur, la préséquence (SEQ ID NO:27) qui code pour le peptide signal de la xylanase de *Bacillus pumilus* PRL B12 et la séquence de nucléotides (SEQ ID N0:1) qui code pour la xylanase de *Bacillus* sp. 720/1 ou une séquence modifiée dérivée de celle-ci. De préférence, le vecteur d'expression ou le vecteur d'intégration chromosomique contient une molécule d'ADN qui comprend le promoteur dérivé du gène (SEQ ID NO:26) qui code pour la xylanase de *Bacillus pumilus* PRL B12, la préséquence (SEQ ID NO:27) qui code pour le peptide signal de la xylanase de *Bacillus pumilus* PRL B12 et la séquence de nucléotides (SEQ ID N0:1) qui code pour la xylanase de *Bacillus* sp. 720/1 ou une séquence modifiée dérivée de celle-ci. De manière particulièrement préférée, ce vecteur est le vecteur d'expression pBPXD-PRE-720X. De bons résultats ont également été obtenus avec le vecteur d'expression pC-BPX-PRE-720X.

L'invention concerne également un système d'expression utilisable pour la production d'un polypeptide.

Ce système d'expression comprend :

- la séquence du promoteur (SEQ ID NO:26) dérivé du gène qui code pour la xylanase de *Bacillus pumilus* PRL B12,
- une séquence codant pour un peptide signal, et
- la séquence du polypeptide d'intérêt.

Généralement, le système d'expression comprend la séquence d'un terminateur.

Dans une variante, ce système d'expression comprend :

- la séquence d'un promoteur,
- 5 - la préséquence (SEQ ID NO:27) qui code pour le peptide signal de la xylanase de *Bacillus pumilus* PRL B12, et
- la séquence du polypeptide d'intérêt.

Généralement, le système d'expression comprend la séquence d'un terminateur.

10 Habituellement, ce système d'expression comprend :

- la séquence du promoteur (SEQ ID NO:26) dérivé du gène qui code pour la xylanase de *Bacillus pumilus* PRL B12,
- la préséquence (SEQ ID NO:27) qui code pour le peptide signal de la xylanase de *Bacillus pumilus* PRL B12,
- 15 - la séquence du polypeptide d'intérêt, et
- la séquence d'un terminateur.

De préférence, le polypeptide d'intérêt est une enzyme, telle qu'une hydrolase. De manière particulièrement préférée, le polypeptide d'intérêt est une protéase, une lipase, une xylanase, une cellulase, une amylase, une pullulanase. De bons résultats ont été obtenus avec la xylanase naturellement produite par la souche de *Bacillus* sp. 720/1, c'est à dire lorsque, dans le système d'expression, la séquence du polypeptide correspond à la séquence de nucléotides (SEQ ID NO:1) qui code pour la xylanase de *Bacillus* sp. 720/1.

25 La présente invention concerne également des souches recombinantes dans lesquelles le gène codant pour une xylanase est introduit par les techniques de génie génétique. Le gène peut être introduit par le biais d'un vecteur réplcatif ou intégré dans le chromosome de l'hôte en une ou plusieurs copies par le biais d'un vecteur intégratif; la séquence de

30 nucléotides codant pour une xylanase peut être introduite par transformation, soit sous forme intégrée dans l'ADN chromosomique, soit sous forme autoréplcatif (plasmide).

L'invention concerne également les souches de microorganismes différentes de l'organisme producteur de départ, dans lesquelles la séquence

35 de nucléotides codant pour une xylanase est introduite par transformation, soit sous forme intégrée dans l'ADN chromosomique, soit sous forme

autorépliquative (plasmide), le gène codant pour une xylanase peut être introduit par le biais d'un vecteur répliquatif ou intégré dans le chromosome de l'hôte en une ou plusieurs copies par un vecteur d'intégratif.

5 L'invention concerne une souche transformée comprenant la molécule d'ADN qui contient le gène de structure qui code pour la xylanase mature de *Bacillus* sp. 720/1. Généralement, la souche transformée est une souche de bactérie. Habituellement, la souche transformée est choisie parmi les souches d'*Escherichia*, de *Pseudomonas* ou de *Bacillus*. De préférence, la souche transformée est une souche de *Bacillus*. De manière particulièrement
10 préférée, la souche transformée de *Bacillus* est une souche de *Bacillus licheniformis*, une souche de *Bacillus pumilus*, une souche de *Bacillus alcalophilus* ou une souche de *Bacillus* sp. 720/1. De bons résultats ont été obtenus avec une souche de *Bacillus licheniformis* et avec une souche de *Bacillus pumilus*.

15 L'invention concerne la souche transformée de *Bacillus* comprenant le vecteur d'expression ou le vecteur d'intégration chromosomique qui comprend cette molécule d'ADN. De préférence, la souche transformée de *Bacillus* est une souche de *Bacillus licheniformis*. De préférence, également, la souche transformée de *Bacillus* est une souche de *Bacillus* sp.
20 720/1.

La présente invention concerne également la xylanase produite par une souche transformée telle que définie ci-dessus.

La présente invention concerne également un procédé pour la production d'une xylanase comprenant la culture d'une bactérie aérobie
25 capable de produire la xylanase dans un milieu nutritif approprié contenant des sources de carbone et d'azote et des sels minéraux sous condition d'aérobiose et la récolte de la xylanase ainsi obtenue. Ce milieu de culture peut être solide ou liquide. De préférence le milieu de culture est liquide. De préférence la bactérie aérobie est une souche de *Bacillus* ou un dérivé de
30 cette souche capable de produire la xylanase.

La présente invention concerne également un procédé pour la production d'une xylanase comprenant la culture de la souche de *Bacillus* sp. 720/1 ou un dérivé de cette souche capable de produire la xylanase dans un milieu nutritif approprié contenant des sources de carbone et d'azote et
35 des sels minéraux sous condition d'aérobiose et la récolte de la xylanase ainsi obtenue.

L'invention concerne également un procédé pour la préparation d'une xylanase à partir d'un organisme recombinant, le procédé comprenant l'isolement d'un fragment d'ADN codant pour la xylanase, l'insertion de ce fragment d'ADN dans un vecteur approprié, l'introduction de ce vecteur dans un hôte approprié ou l'introduction de ce fragment d'ADN dans le chromosome d'un hôte approprié, la culture de cet hôte, l'expression de la xylanase et la récolte de la xylanase. L'hôte approprié est choisi généralement parmi le groupe constitué des microorganismes *Escherichia coli*, *Bacillus* ou *Aspergillus*. Habituellement, l'hôte est choisi parmi les *Bacillus*. De préférence, l'hôte est choisi parmi les microorganismes du genre *Bacillus* (aérobies). De manière particulièrement préférée, l'hôte est choisi parmi les microorganismes *Bacillus subtilis*, *Bacillus licheniformis*, *Bacillus alcalophilus*, *Bacillus pumilus*, *Bacillus lentus*, *Bacillus amyloliquefaciens* ou *Bacillus* sp. 720/1. De bons résultats ont été obtenus lorsque l'hôte pour l'expression de la xylanase selon la présente invention est une souche recombinante dérivée de *Bacillus licheniformis*, et de préférence la souche de *Bacillus licheniformis* SE2 delap1 et la souche de *Bacillus licheniformis* SE2 delap6. La souche de *Bacillus licheniformis* SE2 delap1 et la souche de *Bacillus licheniformis* SE2 delap6 sont décrites dans la demande de brevet européen 0 634 490, qui est incorporée par référence dans cette demande.

L'invention concerne également une xylanase produite, de façon hétérologue, par un microorganisme du genre *Bacillus*. Habituellement, le microorganisme du genre *Bacillus* contient un gène codant pour une protéase alcaline lorsqu'il est à l'état sauvage. De préférence ce microorganisme est une souche de *Bacillus licheniformis* comprenant la molécule d'ADN qui comprend la séquence de nucléotides qui code pour la xylanase de *Bacillus* sp. 720/1. De manière particulièrement préférée, le gène codant pour la protéase alcaline a été enlevé par délétion de cette souche de *Bacillus*. Cette souche est de préférence la souche de *Bacillus licheniformis* SE2 delap1 ou la souche de *Bacillus licheniformis* SE2 delap6.

Par produite de façon hétérologue, on entend une production qui n'est pas effectuée par le microorganisme naturel, c'est-à-dire le microorganisme qui contient à l'état sauvage le gène qui code pour la xylanase.

Les conditions de culture de ces bactéries telles que composants du milieu nutritif, paramètres de culture, température, pH, aération, agitation,

sont bien connues de l'homme du métier. Des exemples de telles techniques sont notamment décrits dans ULLMANN'S ENCYCLOPEDIA OF INDUSTRIAL CHEMISTRY, 1987, 5ième édition, Vol. A9, pages 363-390.

5 Les techniques de récolte de la xylanase sont bien connues de l'homme du métier et sont choisies selon les utilisations envisagées de la xylanase. Habituellement, on emploie la centrifugation, la filtration, l'ultrafiltration, l'évaporation, la microfiltration, la cristallisation ou une combinaison de l'une ou l'autre de ces techniques telle qu'une centrifugation suivie d'une
10 ultrafiltration. Des exemples de telles techniques sont notamment décrits par R. SCRIBAN, Biotechnologie, (Technique et Documentation Lavoisier), 1982, p. 267-276 et dans ULLMANN'S ENCYCLOPEDIA OF INDUSTRIAL CHEMISTRY, 1987, 5ième édition, Vol. A9, pages 363-390.

15 La xylanase peut ensuite être purifiée, si nécessaire et selon les utilisations envisagées. Les techniques de purification d'enzymes sont bien connues de l'homme du métier, telles que la précipitation à l'aide d'un sel, tel que le sulfate d'ammonium, ou de solvant, tel que l'acétone ou un alcool. Des exemples de telles techniques sont notamment décrits par
20 R. SCRIBAN, Biotechnologie, (Technique et Documentation Lavoisier), 1982, p. 267-276.

La xylanase peut également être séchée par atomisation ou lyophilisation. Des exemples de telles techniques sont notamment décrits par R. Scriban, Biotechnologie, (Technique et Documentation Lavoisier), 1982, p. 267-276 et dans ULLMANN'S ENCYCLOPEDIA OF INDUSTRIAL
25 CHEMISTRY, 1987, 5ième édition, Vol. A9, pages 363-390.

La présente invention concerne également des compositions enzymatiques comprenant la xylanase selon l'invention et au moins un additif. Ces additifs sont connus de l'homme du métier et sont choisis selon
30 l'utilisation envisagée de la composition. Ils doivent être compatibles avec la xylanase et ne pas affecter, ou peu, l'activité enzymatique de la xylanase. Habituellement, ces additifs sont des stabilisants de l'enzyme, des agents de conservation et des agents de formulation.

Les compositions comprenant la xylanase de la présente invention
35 peuvent être utilisées sous forme solide ou liquide.

La xylanase est formulée selon les utilisations prévues. Des stabilisants

ou des agents de conservation peuvent également être ajoutés aux compositions enzymatiques comprenant la xylanase selon l'invention. Par exemple on peut stabiliser la xylanase par l'addition de propylène glycol, d'éthylène glycol, de glycérol, d'amidon, de xylane, d'un sucre tel que du glucose et du sorbitol, d'un sel tel que du chlorure de sodium, du chlorure de calcium, du sorbate de potassium et du benzoate de sodium ou d'un mélange de deux ou plusieurs de ces produits. De bons résultats ont été obtenus avec du propylène glycol. De bons résultats ont été obtenus avec du sorbitol.

La xylanase selon l'invention a des débouchés multiples dans diverses industries, telles que, par exemples, les industries alimentaires, les industries pharmaceutiques ou les industries chimiques.

La xylanase peut notamment être utilisée en boulangerie. Un exemple d'une utilisation d'une xylanase en boulangerie est, en particulier, décrit dans la demande de brevet international WO 94/04664.

La xylanase peut notamment être utilisée pour le traitement de la pâte à papier. Un exemple d'une utilisation d'une xylanase pour le traitement de la pâte à papier est, en particulier, décrit dans la demande de brevet européen 0 634 490. La xylanase de la présente invention est notamment efficace sur la pâte venant du bois d'eucalyptus, comme l'illustre l'exemple 13 de la présente demande de brevet.

La xylanase peut notamment être utilisée en alimentation animale. Un exemple d'une utilisation d'une xylanase en alimentation animale est, en particulier, décrit dans la demande de brevet européen 0 507 723.

La figure 1 (figure 1a et figure 1b) représente la séquence de nucléotides (SEQ ID NO:2) codant pour la xylanase mature ainsi que sa traduction en acides aminés.

La figure 2 (figure 2a et figure 2b) représente la séquence de nucléotides (SEQ ID NO:11) du gène codant pour la xylanase ainsi que sa traduction en acides aminés.

La figure 3 représente la carte de restriction du plasmide pUBR2002.

La figure 4 représente la carte de restriction du plasmide pUBR-720X1.

La figure 5 représente la carte de restriction du plasmide pUBR-720X11.

La figure 6 représente la carte de restriction du plasmide pUBRD-720X11.

La figure 7 représente la carte de restriction du plasmide pUBC2001.

La figure 8 représente la carte de restriction du plasmide pC-BPX-PRE-2003.

5 La figure 9 représente la carte de restriction du plasmide pC-BPX-PRE-720X.

La figure 10 représente la carte de restriction du plasmide pBPXD-PRE-720X.

La figure 11 représente le promoteur (SEQ ID NO:26) dérivé du gène qui code pour la xylanase de *Bacillus pumilus* PRL B12.

10 La figure 12 représente la préséquence (SEQ ID NO:28) qui code pour le peptide signal de la xylanase de *Bacillus pumilus* PRL B12.

La signification des abréviations et symboles utilisés dans ces figures est rassemblée dans le tableau suivant.

Symbole Abréviation	Signification
OriEC	origine de réplication dans <i>E. coli</i>
REP	protéine nécessaire pour la réplication dans <i>Bacillus</i>
Ori+	origine de réplication du brin + dans <i>Bacillus</i>
Ori-	origine de réplication du brin - dans <i>Bacillus</i>
AmpR	gène apportant la résistance à l'ampicilline
KmR	gène apportant la résistance à la kanamycine
BlmR	gène apportant la résistance à la bléomycine
5'720XYL	séquence 5' située en amont de la séquence codant pour la xylanase de <i>Bacillus</i> sp. 720/1
3'720XYL	séquence 3' située en aval de la séquence codant pour la xylanase de <i>Bacillus</i> sp. 720/1
720XYL	séquence codant pour le précurseur de la xylanase de <i>Bacillus</i> sp. 720/1
5'BPUXYL-PRE	promoteur, et site de fixation au ribosome, de la xylanase de <i>Bacillus pumilus</i> PRL B12, suivi de la préséquence de la xylanase de <i>Bacillus pumilus</i> PRL B12.
720XYL-MAT	séquence codant pour la partie mature de la xylanase de <i>Bacillus</i> sp. 720/1

La présente invention est illustrée par les exemples suivants.

Exemple 1

Isolement et caractérisation de la souche de Bacillus sp. 720/1

5 La souche de Bacillus sp. 720/1 a été isolée d'un échantillon de sol, prélevé en Argentine, sur un milieu nutritif gélosé et sélectionnée pour sa capacité de dégrader un dérivé coloré du xylane connu sous le nom de l'AZCL-xylane et vendu par la Société MEGAZYME.

10 Cette souche a été mise en culture à 37 °C dans le milieu de croissance LBS/C dont la composition est la suivante : son de blé 10 g/l, TRYPTONE (DIFCO) 10 g/l, extrait de levure 5 g/l, NaCl 10 g/l, Na₂CO₃ 5,3 g/l, NaHCO₃ 4,2 g/l.

15 Le carbonate et le bicarbonate de sodium sont stérilisés séparément, puis ajoutés aseptiquement aux autres composants du milieu stérile. Le milieu gélosé contient en outre 20 g/l d'agar. La souche de la présente invention a été identifiée par ses caractéristiques biochimiques : bactérie Gram positif, aérobie qui se présente sous la forme de bâtonnet, elle forme une endo-spore. Elle appartient donc au genre Bacillus.

20 Les cellules végétatives de cette souche en culture sur le milieu LBS/C gélosé à 37 °C ont une forme de bacille de taille 0,8 x 3,0-5 µm. La mobilité des cellules végétatives est positive.

Après une croissance de 13 jours à 37 °C sur le milieu TSA gélosé, l'observation microscopique révèle la présence de sporanges. Le milieu TSA gélosé contient 15 g/l de TRYPTONE (DIFCO), 5 g/l de peptone de soja; 5 g/l de NaCl et 15 g/l de gélose.

25 La souche est oligosporogène.

Le test de la catalase est positif en présence de 10 % (v/v) de peroxyde d'hydrogène. Le test de l'oxydase est positif en présence de 1 % (p/v) de tétraméthyl-1,4-phénylène-diammoniumdichlorure.

30 Cette souche est aérobie, c'est-à-dire qu'elle se développe en aérobiose. Elle ne se développe pas en anaérobiose, c'est-à-dire sous une atmosphère de 84 % (v/v) N₂, 8 % (v/v) CO₂, 8 % (v/v) H₂ à 37 °C. L'abréviation % (v/v) représente un pourcentage exprimé en volume par volume.

35 Cette souche n'est pas thermophile. Elle présente un développement normal après incubation en milieu LBS/C gélosé à 20 °C, 30 °C, 37 °C et 45 °C, par contre elle ne se développe pas à 50 °C et 55 °C, ni à 10 °C.

Elle présente un développement normal après incubation en milieu

LBS/C gélosé en présence de NaCl aux concentrations de 2,0 % (p/v) et de 3,5 % (p/v), présente un développement faible en présence de 5,0 % (p/v) et de 7,0 % (p/v) de NaCl. L'abréviation % (p/v) représente un pourcentage exprimé en poids par volume.

5 La souche de *Bacillus* sp. 720/1 n'acidifie pas le glucose.

La souche de *Bacillus* sp. 720/1 a été identifiée au moyen de la galerie API 50 CHB et de la galerie API 20 E en suivant les instructions d'utilisation du fournisseur (API SYSTEM, France). La souche de *Bacillus* sp. 720/1 utilise le glycérol, le N-acétylglucosamine, l'arbutine, le citrate, 10 la galactose, l'amygdaline, le melibiose et hydrolyse la gélatine. Ces caractéristiques différencient nettement la souche de *Bacillus* sp. 720/1 d'une souche de *Bacillus pumilus*. En effet, une souche de *Bacillus pumilus* ne présente aucune de ces caractéristiques.

La souche de *Bacillus* sp. 720/1 a également été identifiée au moyen du 15 système BIOLOG (USA). La banque de données analysant les résultats de ce système donne un score de 0,564 pour le *Bacillus coagulans*, de 0,097 pour le *Bacillus subtilis*, de 0,057 pour le *Bacillus licheniformis* et de 0,00 pour le *Bacillus pumilus*. Ces caractéristiques différencient nettement la souche de *Bacillus* sp. 720/1 d'une souche de *Bacillus coagulans*, d'une 20 souche de *Bacillus subtilis*, d'une souche de *Bacillus licheniformis* et d'une souche de *Bacillus pumilus*.

La bactérie isolée appartient donc au genre *Bacillus*, aucune espèce connue n'a pu être déterminée.

La souche de *Bacillus* sp. 720/1 a été déposée à la collection nommée 25 BELGIAN COORDINATED COLLECTIONS OF MICROORGANISMS (LMG culture collection) sous le numéro LMG P-14798.

Exemple 2

Production de la xylanase par le *Bacillus* sp. 720/1

La souche de *Bacillus* sp. 720/1 est mise en culture sur boîte de Pétri 30 contenant un milieu LBS/C, gélosé, à 37 °C durant 48 heures (culture A).

Puis, à partir de la culture A, on réalise une culture dans un milieu LB/C liquide dont la composition est identique à celle du milieu LBS/C mais sans son de blé, à 37 °C durant 24 heures sous agitation orbitale à raison de 250 révolutions par minute (culture B) avec une amplitude 35 d'environ 2,54 cm.

500 ml de la culture B sont ensuite transférés dans un fermenteur de

20 l contenant 14 l de milieu LBS/C. Le pH est laissé libre, la vitesse d'agitation et le débit d'air insufflé dans le fermenteur sont tels que la pression partielle en oxygène dissous dans le milieu de culture ne soit pas inférieur à 30 % de la saturation.

5 Après 72 heures de culture à 37 °C, on sépare la xylanase et la biomasse cellulaire par centrifugation (BECKMAN J21, rotor JA10) à 8 000 tours par minute pendant 30 minutes. La xylanase produite par la souche de *Bacillus* sp. 720/1 est extracellulaire. Puis on sépare les matières insolubles résiduelles de la xylanase, à partir du surnageant de centrifugation, par
10 microfiltration (cartouche KROS FLOII 0,2 µ de porosité, Société MICROGON).

On lave le rétentat de microfiltration avec 1 l d'eau déminéralisée. On effectue ce lavage trois fois.

15 Ensuite, on concentre, environ 20 fois, le perméat de cette microfiltration par ultrafiltration sur une cartouche PALL MICROZA SIP 1013 en polysulfone, ayant un seuil de coupure de 6 kD (Société PALL).

On mesure l'activité enzymatique sur le rétentat (produit R) et sur le perméat (produit P) d'ultrafiltration obtenus.

20 Une unité enzymatique de la xylanase (IU) est définie comme la quantité d'enzyme qui, à un pH de 8,0, à une température de 50 °C et en présence de xylane, catalyse la libération d'équivalents glucose à raison de 1 µmole de glucose par minute (µM/minute).

25 La mesure de l'activité enzymatique xylanase est réalisée selon le protocole décrit par BAILEY, BIELY et POUTANEN, J. BIOTECHNOLOGY, 1992, 23, pages 257-270; à l'exception que le tampon citrate-phosphate cité par BAILEY et al. a été remplacé par le tampon Tris(hydroxyméthylaminoéthane)-HCl, 50 mM (pH de 8,0).

30 On ajoute au rétentat d'ultrafiltration (produit R) suffisamment de polyéthylène glycol (polyéthylène glycol de MERCK référence 807490) pour obtenir une concentration de 40 % (p/p). Après solubilisation du polyéthylène glycol, on incube la solution obtenue 30 minutes à 25 °C.

35 Puis, on centrifuge la solution, contenant le polyéthylène glycol et la xylanase, 10 minutes à 8 000 tours par minute (centrifugeuse BECKMAN J21, rotor JA10). On élimine le surnageant de centrifugation. On ajoute au culot de centrifugation suffisamment d'une solution de NaCl (0,9 % v/v) pour retrouver le volume initial du rétentat mis en oeuvre (produit R).

Ensuite, on ajoute à cette suspension contenant la xylanase et du NaCl suffisamment d'acétone pour arriver à une concentration de 40 % (v/v). On incube cette suspension acétonique durant 45 minutes à 4 °C.

Après cette incubation, on centrifuge cette suspension acétonique 10 minutes à 8 000 tours par minute (BECKMAN J21, rotor JA10).

On conserve le surnageant de centrifugation. A ce surnageant de centrifugation, on ajoute de l'acétone à une concentration de 80 % (v/v). On incube cette suspension acétonique 45 minutes à 4 °C.

Après cette incubation, on centrifuge cette suspension acétonique 10 minutes à 8 000 tours par minute (BECKMAN J21, rotor JA10).

On conserve le culot de centrifugation. Celui-ci est mis en suspension dans un volume suffisant d'une solution de NaCl 0,9 % (v/v) pour être solubilisé (produit N).

Exemple 3

Purification de la xylanase

Une fraction du rétentat d'ultrafiltration (produit N) obtenu à l'exemple 2, est conditionnée par passage sur colonne de chromatographie de perméation sur gel (colonne BIO-RAD ECONOPAC 10DG) équilibrée avec un tampon Bis-Tris (bis(2-hydroxyéthyl)imino-tris(hydroxyméthyl)méthane) 20mM, pH 6,2 (tampon A). On obtient ainsi une solution nommée produit X.

1 ml de la solution produit X est alors déposé sur une colonne échangeuse de cation S SEPHAROSE HP 16/10 (PHARMACIA) préalablement équilibré avec le tampon A. Le débit est de 2,5 ml par minute, avec une élution isocratique pendant 10 minutes, suivie d'un gradient de concentration en NaCl (de 10 à 50 minutes, la teneur en NaCl passe de 0 à 0,7 M). Un pic unique est détecté pendant le gradient, correspondant à l'élution de la xylanase.

On recueille les fractions contenant l'activité xylanase (solution A).

On vérifie que ces fractions contiennent de la xylanase en déposant 10 µl de chaque fraction sur un milieu gélosé comprenant du xylane (milieu contenant 0,5 g/l d'AZCL-xylane, tampon TRIS 50 mM (pH = 8,0) et 15 g/l d'agar). Un halo se forme autour des fractions qui contiennent de la xylanase.

Exemple 4

Séquence d'acides aminés

La séquence d'acides aminés de la xylanase de la présente invention est indirectement déterminée à partir de la séquence de nucléotides (SEQ ID NO:10) du gène qui code pour cette xylanase, dont l'obtention est décrite à l'exemple 14. Ceci est réalisé à l'aide du programme d'ordinateur

5 IntelliGenetics Suite Software for Molecular Biology (Release #5.4) d'IntelliGenetics, Inc. USA. La figure 2 (figure 2a et figure 2b) représente la séquence de nucléotides (SEQ ID NO:10) du gène codant pour la xylanase ainsi que sa traduction en acides aminés (SEQ ID NO:11).

10 La xylanase est synthétisée sous forme d'un précurseur. Le précurseur de la xylanase contient 248 acides aminés (SEQ ID NO:6). On identifie la séquence de nucléotides (SEQ ID NO:4) codant pour le précurseur de la xylanase ainsi que sa traduction en acides aminés (SEQ ID NO:5).

On identifie la préséquence de la xylanase synthétisée sous forme d'un précurseur. Il s'agit d'une séquence de 27 acides aminés (SEQ ID NO:9).

15 On identifie la séquence de nucléotides correspondante (SEQ ID NO:7).

Ensuite, on identifie la séquence en acides aminés de la xylanase mature. La xylanase mature contient 221 acides aminés (SEQ ID NO:3).

20 La figure 1 (figure 1a et figure 1b) représente la séquence de nucléotides (SEQ ID NO:1) codant pour la xylanase mature ainsi que sa traduction en acides aminés (SEQ ID NO:2).

Exemple 5

Distribution en acides aminés

25 La distribution en acides aminés de la xylanase mature, déterminée à partir de la séquence en acides aminés (SEQ ID NO:3) de la xylanase (exemple 4), est résumée dans le tableau 1.

TABLEAU 1

Symbole	Acides aminés	Nombre	% (en poids moléculaire)
N	asparagine	25	11,6
Y	tyrosine	13	8,6
T	thréonine	18	7,4
S	serine	19	6,7
I	isoleucine	14	6,4
V	valine	14	5,6
G	glycine	24	5,5
W	tryptophane	7	5,3
K	lysine	10	5,2
R	arginine	8	5,1
Q	glutamine	9	4,7
D	acide aspartique	10	4,7
L	leucine	10	4,6
E	acide glutamique	8	4,2
F	phénylalanine	7	4,2
P	proline	7	2,8
M	méthionine	5	2,7
A	alanine	8	2,3
H	histidine	4	2,2
C	cystéine	1	0,4
B	acide aspartique/ asparagine	0	0,0
X	inconnu	0	0,0
Z	glutamine acide glutamique	0	0,0

Exemple 6**Estimation du poids moléculaire**

On estime, par calcul, le poids moléculaire de la xylanase à partir de la séquence en acides aminés de la forme mature de la xylanase, comme décrit

On déduit par calcul un poids moléculaire de 24698,61 Daltons.

Exemple 7

Détermination du poids moléculaire

5 On effectue sur la solution A contenant la xylanase, telle qu'obtenue à l'exemple 3, une concentration sur un dispositif CENTRICON 10 kD (AMICON).

10 100 μ l de la solution concentrée sont déposés sur une colonne de chromatographie de perméation sur gel SUPERDEX 75 HR 10/30 (PHARMACIA). La colonne a été préalablement calibrée au moyen des marqueurs de poids moléculaire (PHARMACIA) GEL FILTRATION LMW calibration kit code 17-0442-01. L'élution a lieu à 0,25 ml/minute au moyen d'un tampon CAPSO (acide 3-(cyclohexylamino)-2-hydroxy-1-propane sulfonique) 25mM, pH 9,2 additionné de NaCl 0,2M.

15 Le chromatogramme obtenu montre un pic unique correspondant à l'activité xylanase. On en déduit un poids moléculaire apparent de la protéine d'environ 13,5 kD.

20 On effectue également sur la fraction issue de ce pic unique une électrophorèse en gel de polyacrylamide en conditions dénaturantes (SDS-PAGE). Le système de gel utilisé est le système PHASTSYSTEM de PHARMACIA LKB BIOTECHNOLOGY, avec des gels contenant un gradient de polyacrylamide de 10-15 % (v/v). Les conditions d'électrophorèse sont celles prescrites par le fournisseur. On utilise comme témoin les marqueurs de poids moléculaire PHARMACIA LMW (Low Molecular Weight), référence 17-0446-01. Les marqueurs mis en oeuvre
25 sont la phosphorylase b (94 kD), l'albumine (67 kD), l'ovalbumine (43 kD), la carboanhydrase (30 kD), l'inhibiteur de la trypsine (20,1 kD) et l'alpha-lactalbumine (14,4 kD).

Une coloration au bleu de Coomassie fait apparaître un polypeptide d'un poids moléculaire d'environ 25,7 kD.

Exemple 8

Estimation du point isoélectrique

On estime le point isoélectrique de la xylanase à partir de la séquence en acides aminés de la forme mature de la xylanase, comme décrit à l'exemple 4.

35 Le point isoélectrique estimé est représentatif de la charge nette de la protéine sous forme dénaturée.

On déduit un point isoélectrique de 7,46 pour la xylanase sous forme dénaturée.

Exemple 9

Détermination du point isoélectrique

5 On dépose une fraction de la solution A, telle qu'obtenue à l'exemple 3, sur une colonne de chromatofocalisation MONO P 5/20 (PHARMACIA) en suivant les recommandations du fournisseur, et préalablement équilibrée avec un tampon diéthanolamine 25 mM, pH 9,9.

10 La colonne est éluée au moyen de la solution d'ampholytes POLYBUFFER 96 (PHARMACIA) diluée 10 fois dans l'eau déminéralisée.

Le pH de la fraction contenant l'activité xylanase est de 9,5.

15 On vérifie que cette fraction contient la xylanase en déposant 10 µl de celle-ci sur un milieu gélosé comprenant du xylane (milieu contenant 0,5 g/l d'AZCL-xylane, tampon TRIS 50 mM (pH = 8,0) et 15 g/l d'agar). Un halo, qui se présente sous la forme d'une zone d'hydrolyse de l'AZCL-xylane, se forme autour de la fraction qui contient la xylanase.

On réalise sur une fraction de la solution A, telle qu'obtenue à l'exemple 3, une focalisation isoélectrique.

20 Pour réaliser cela, on réhydrate le gel PHARMACIA DRYIEF par un mélange constitué de 2 ml d'eau déminéralisée, de 150 µl de produit BIOLYTE 8-10 (BIORAD) et de 75 µl de produit PHARMALYTE 8-10,5 (PHARMACIA). On dépose environ 200 nanogrammes de protéines (fraction de la solution A) sur le gel. On suit le protocole décrit par le fournisseur.

25 On en déduit que la xylanase a un point isoélectrique légèrement supérieur à 9,6, point isoélectrique du marqueur ayant le point isoélectrique le plus élevé mis en oeuvre.

Le point isoélectrique observé expérimentalement est représentatif de la charge de surface de la protéine sous sa forme native.

30 Exemple 10

Profil d'activité en fonction du pH pour la xylanase produite par la souche naturelle (Bacillus sp. 720/1)

35 On mesure, selon la méthode décrite à l'exemple 2, l'activité enzymatique de la xylanase en présence de xylane (ROTH, référence 7500, xylane de bouleau), à une température de 50 °C et à différents pH (de 5,6 à 10,35) dans différents tampons choisis pour obtenir le pH souhaité. On met

en oeuvre la solution comprenant la xylanase, telle qu'obtenue à l'exemple 2 (produit N).

Les résultats sont rassemblés dans le tableau 2. On note que la marge d'erreur est estimée à environ 25 % dans ce type de mesure.

5 Au cours de cet essai, l'activité enzymatique maximale a été mesurée pour l'échantillon placé à un pH d'environ 6,2 et à une température d'environ 50 °C durant 15 minutes. Par définition on a donc attribué à cet échantillon une activité enzymatique relative de 100 %.

10 Cet exemple montre que la xylanase selon l'invention développe une activité enzymatique importante dans une gamme de pH compris entre environ 5,6 et environ 10.

TABLEAU 2

pH	Tampon utilisé (50 mM)	Activité relative %
5,6	Tris-maléate	85
6,2	Tris-maléate	100
6,8	Tris-maléate	96
7,5	Tris-maléate/Tris *	88
8,7	Tris/Capso *	92
9,5	Capso/Caps *	76
10	Caps	50
10,35	Caps	19

Tris = tris(hydroxyméthyl)aminométhane

15 Tris-maléate = tampon formé de tris(hydroxyméthyl)aminométhane (50 mM) et d'acide maléique (50 mM) dont la proportion entre les composants est choisie en fonction du pH souhaité, le pH étant ajusté au moyen de NaOH (1 M).

Capso = acide 3-(cyclohexylamino)-2-hydroxy-1-propane sulfonique

20 Caps = acide 3-(cyclohexylamino)-1-propane sulfonique

Le symbole * signifie que la valeur obtenue est la moyenne des mesures effectuées au même pH mais obtenues avec les deux tampons.

Cet exemple montre que la xylanase selon l'invention développe une

activité enzymatique élevée dans une très large gamme de pH.

Exemple 11

Effet du pH sur l'activité de la xylanase produite par la souche de *Bacillus* sp. 720/1 en aide au blanchiment de la pâte de résineux

- 5 On prépare trois suspensions aqueuses d'une pâte de pin (en provenance de la société SCA) ayant 2,5 % (en poids de matière sèche) de consistance et ayant un indice Kappa initial de 17.

On ajuste le pH de ces suspensions à pH 5 avec H_2SO_4 .

1e étape : étape à l'enzyme (étape X)

- 10 On dilue la solution nommée produit N, telle qu'obtenue à l'exemple 2, avec de l'eau déminéralisée pour obtenir une solution d'enzyme ayant une activité enzymatique de 25 UI/ml (comme décrit à l'exemple 2).

- 15 On ajoute cette solution d'enzyme, contenant la xylanase, à une suspension de pâte de pin de telle sorte que la suspension de pâte soit traitée au moyen de 5 UI/g de pâte sèche

Aux deux autres suspensions de pâte de pin, on ajoute de l'eau déminéralisée à la place de la solution d'enzyme dans des proportions identiques.

- 20 Puis on incube les trois suspensions pendant 2 heures à 50 °C sans agitation.

2e étape : étape au chlore (étape C)

- 25 Ensuite, chaque suspension de pâte, ainsi obtenue, est soumise à un traitement de blanchiment qui consiste en une chloration avec de l'eau chlorée. Ce traitement a lieu sur une pâte ayant une consistance de 3 % en poids de matière sèche.

- 30 Pour cela, on ajoute à la suspension de pâte traitée enzymatiquement et à une suspension de pâte non traitée enzymatiquement une quantité de chlore de 2,89 ($= 0,17 \times 17$) % (poids/poids de pâte sèche). On ajoute à l'autre suspension de pâte non traitée enzymatiquement une quantité de chlore de 3,40 ($(0,20 \times 17)$ % (poids/poids).

On incube les 3 suspensions pendant 1 heure à température ambiante. Puis, on lave la pâte avec 40 volumes d'eau déminéralisée.

3e étape : étape à la soude (étape E)

- 35 Ensuite, on effectue une extraction alcaline qui consiste à ajouter 2 % (poids/poids de pâte sèche) de NaOH aux trois suspensions obtenues

ci-dessus et qui ont une consistance de 5 % en poids de matière sèche.

On incube les trois suspensions pendant 1 heure 30 à une température de 60 °C. Puis, on lave la pâte avec 40 volumes d'eau déminéralisée et on la récupère sous forme de feuille à une blancheur d'environ 45 ° ISO (+/- 3 ° ISO).

On mesure l'indice Kappa des trois feuilles obtenues.

L'indice Kappa est relatif à la mesure de la quantité de lignine présente dans la pâte. L'indice Kappa est un nombre qui représente le volume (en millilitre) d'une solution de permanganate de potassium 0,1 N (KMnO_4) consommé par un gramme de pâte sèche dans les conditions spécifiées et en suivant les procédures décrites dans la norme TAPPI (Technical Committee of the Association of the Pulp and Paper industry) #T236cm-85 (1985).

Le degré ISO est relatif à la mesure de brillance du papier obtenu à partir de la pâte. Cette valeur est un facteur de la réflectance du papier obtenu à partir de la pâte dans les conditions spécifiées et en suivant les procédures décrites dans la norme ISO (The International Organization for Standardization) #2469 publiée dans la norme #ISO 2470-1977 (F) en complément de la norme #2470.

On réalise quatre essais identiques à l'exception de la mise à pH initiale à pH 5. En effet, on réalise quatre essais avec une suspension aqueuse de pâte de pin dont le pH a été ajusté respectivement à pH 6, à pH 7, à pH 8, à pH 9 au lieu de pH 5.

Les résultats sont rassemblés dans le tableau 3.

TABLEAU 3

Quantité d'enzymes mises en oeuvre (UI/g)	5	0	0
Quantité de chlore mis en oeuvre (% en poids/poids de pâte sèche)	2,89	2,89	3,40
pH initial	Indice Kappa		
5	4,63	5,01	4,18
6	3,81	/	4,11
7	3,81	5,01	4,06
8	3,55	/	4,21
9	3,71	4,91	4,07

Le symbole / signifie que la suspension de pâte n'a pas été testée.

Ces résultats montrent que la xylanase selon l'invention permet une réduction d'environ 15 à 20 % de la quantité de chlore pour une pâte blanchie à 45 ° ISO. De plus, ces résultats sont obtenus aussi bien à un pH alcalin qu'à un pH acide. Ces bons résultats sont également obtenus à un pH d'environ 9.

Cet exemple montre que la xylanase selon l'invention présente une activité dans une large gamme de pH. En effet, la xylanase selon l'invention est active dans une gamme de pH compris entre environ 5 et environ 10. Elle est particulièrement active pour des valeurs de pH supérieures ou égales à environ 6. Elle est particulièrement active pour des valeurs de pH inférieures ou égales à environ 9.

Exemple 12

Effet de la température sur l'activité de la xylanase produite par la souche de *Bacillus* sp. 720/1 en aide au blanchiment de la pâte de résineux

On reproduit l'exemple 11 avec 5 suspensions de pâte de résineux à pH 8. L'étape de traitement enzymatique est réalisée à un pH de 8 et à différentes températures (55, 60 et 65 °C).

Les résultats sont rassemblés dans le tableau 4.

TABLEAU 4

Quantité d'enzymes mises en oeuvre (UI/g)	5	0	0
Quantité de chlore mis en oeuvre (% en poids/poids de pâte sèche)	2,89	2,89	3,40
Température °C	Indice Kappa		
55	3,89	/	/
60	3,64	4,77	4,09
65	3,49	/	/

Le symbole / signifie que la suspension de pâte n'a pas été testée.

On observe que la pâte est blanchie à environ 45 ° ISO.

Ces résultats montrent que l'indice Kappa des échantillons de pâte traitée enzymatiquement reste largement inférieur à l'indice de l'échantillon non traité enzymatiquement.

Cet exemple montre que la xylanase selon l'invention est active dans une large gamme de température. Elle est active à une température d'environ 65 °C.

Cet exemple montre également que la xylanase selon l'invention est stable à une température d'environ 60 °C.

Exemple 13

Activité de la xylanase produite par la souche de Bacillus sp. 720/1 en aide au blanchiment de la pâte d'eucalyptus dans la séquence ECF

Pour cet exemple, on met en oeuvre une pâte d'eucalyptus venant de la société CEASA MILL (Espagne). La pâte est traitée en suivant une séquence ECF ("Elemental Chlorine Free"), c'est-à-dire que la succession d'étapes constituant la séquence ne fait pas appel à du chlore élémentaire.

1^{re} étape : étape à l'oxygène (étape O)

La pâte est traitée par un procédé mettant en oeuvre de l'oxygène tel que décrit dans le brevet U.S. 4,462,864, de telle sorte qu'une pâte ayant un indice Kappa initial de 12,3 et un degré ISO initial de 33,4 est obtenue.

Deux suspensions aqueuses sont préparées à partir de cette pâte traitée

par l'oxygène ayant une consistance de 4 % en poids de matière sèche.

On ajuste le pH de ces suspensions à pH 9 avec HCl.

2e étape : étape à l'enzyme (étape X)

On dilue la solution nommée produit N, telle qu'obtenue à l'exemple 2,
5 avec de l'eau déminéralisée pour obtenir une solution d'enzyme ayant une
activité enzymatique de 25 UI/ml.

On ajoute cette solution d'enzyme, contenant la xylanase, à une
suspension de pâte de pin de telle sorte que la suspension de pâte soit traitée
au moyen de 10 UI/g de pâte sèche.

10 Aux deux autres suspensions de pâte de pin, on ajoute de l'eau
déminéralisée à la place de la solution d'enzyme.

Puis on incube les 3 suspensions pendant 1 heure 30 minutes à 50 °C
sans agitation.

3e étape : étape au dioxyde de chlore (étape D)

15 Ensuite, chaque suspension de pâte, ainsi obtenue, est soumise à un
traitement de blanchiment qui consiste en une chloration avec du dioxyde de
chlore. Ce traitement a lieu sur une pâte ayant une consistance de 3 % en
poids de matière sèche.

Pour cela, on ajoute à la suspension de pâte traitée enzymatiquement et
20 à une suspension de pâte non traitée enzymatiquement une quantité de
dioxyde de chlore de 0,6 % (poids/poids de pâte sèche). On ajoute à l'autre
suspension de pâte non traitée enzymatiquement une quantité de dioxyde de
chlore de 1 % (poids/poids).

On incube les 3 suspensions pendant 30 minutes à 50 °C. Puis, on lave
25 la pâte avec 40 volumes d'eau déminéralisée.

4e étape : étape à la soude et au peroxyde d'hydrogène (étape E/P).

Ensuite, on effectue une extraction alcaline qui consiste à ajouter 1,8 %
(poids/poids de pâte sèche) de NaOH et 0,5 % (poids/poids de pâte sèche)
de peroxyde d'hydrogène aux trois suspensions obtenues ci-dessus et qui ont
30 une consistance de 12 % en poids de matière sèche.

On incube les trois suspensions pendant 1 heure 30 à une température
de 70 °C. Puis, on lave la pâte avec 40 volumes d'eau déminéralisée.

5e étape : étape au dioxyde de chlore (étape D)

Ensuite, chaque suspension de pâte, ainsi obtenue, est soumise de
35 nouveau à un traitement de blanchiment qui consiste en une chloration avec
du dioxyde de chlore. Ce traitement a lieu sur une pâte ayant une

consistance de 12 %.

On ajoute à ces trois suspensions une quantité de dioxyde de chlore de 0,5 % (poids/poids de pâte sèche).

5 On incube les 3 suspensions pendant 2 heures à 75 °C. Puis, on lave la pâte avec 40 volumes d'eau déminéralisée.

6e étape : étape à la soude et au peroxyde d'hydrogène (étape E/P)

10 Ensuite, on effectue une extraction alcaline qui consiste à ajouter 0,6 % (poids/poids de pâte sèche) de NaOH et 0,3 % (poids/poids de pâte sèche) de peroxyde d'hydrogène aux trois suspensions obtenues ci-dessus et qui ont une consistance de 12 % en poids de matière sèche.

On incube les trois suspensions pendant 1 heure 30 à une température de 70 °C. Puis, on lave la pâte avec 40 volumes d'eau déminéralisée.

7e étape : étape au dioxyde de chlore (étape D)

15 Ensuite, chaque suspension de pâte, ainsi obtenue, est soumise à un traitement de blanchiment qui consiste en une chloration avec du dioxyde de chlore. Ce traitement a lieu sur une pâte ayant une consistance de 12 %.

On ajoute à ces trois suspensions une quantité de dioxyde de chlore de 0,3 % (poids/poids).

20 On incube les 3 suspensions pendant 2 heures 30 minutes à 75 °C. Puis, on lave la pâte avec 40 volumes d'eau déminéralisée et on la récupère sous forme de feuille.

On mesure le degré ISO des trois feuilles obtenues.

Les résultats sont rassemblés dans le tableau 5.

TABLEAU 5

Quantité d'enzymes mises en oeuvre à l'étape 2 en UI/g	10	0	0
Quantité de dioxyde de chlore mis en oeuvre à l'étape 3 en % (poids/poids de pâte sèche)	0,6	0,6	1,0
°ISO	88,5	85,5	87,9

Cet exemple montre que la xylanase selon l'invention est efficace sur la pâte d'eucalyptus. De plus, elle ne nécessite aucun ajustement de pH, puisqu'elle présente l'avantage d'être active au pH de la pâte, c'est-à-dire à un pH d'environ 9. Cet exemple montre que la xylanase selon l'invention est une xylanase alcaline.

Cet exemple montre également qu'en comparaison de ce qui est obtenu sans xylanase, l'utilisation de la xylanase selon l'invention entraîne une augmentation de la brillance d'au moins 3 ° ISO pour une quantité de ClO₂ fixée.

Cet exemple montre également que l'utilisation de la xylanase selon l'invention permet de réduire la quantité de ClO₂ d'environ 4 à 5 kg/tonne de pâte, ce qui représente environ 25 à 30 % de la quantité totale de ClO₂ nécessaire.

Exemple 14

Détermination de la séquence nucléotidique et protéique de la xylanase de Bacillus sp. 720/1

1. Extraction de l'ADN chromosomique à partir de la souche de Bacillus sp. 720/1

A partir de la culture B, telle qu'obtenue à l'exemple 2, une culture de 200 ml de la souche de Bacillus sp. 720/1 est réalisée en milieu LB/C durant 16 heures à 37 °C. Le milieu LB/C est identique au milieu LBS/C, décrit à l'exemple 1, sans l'addition de son de blé.

Lorsque cette culture est réalisée et qu'elle est en phase stationnaire, elle est centrifugée (BECKMAN J 21, rotor JA10) à 5 000 tours par minute

pendant 10 minutes. Le culot de centrifugation ainsi obtenu est repris dans 9 ml de tampon TRIS-HCl (tris(hydroxyméthyl)aminométhane acidifié avec HCl 0,1 M), à un pH de 8, EDTA (acide éthylènediaminetétraacétique) 0,1 M, NaCl 0,15 M contenant 18 mg de lysozyme, la suspension ainsi obtenue est incubée 15 minutes à 37 °C.

Le lysat ainsi obtenu est ensuite traité par 200 µl d'une solution de RNase à 10 mg/ml pendant 20 minutes à 50 °C. 1 ml d'une solution de SDS (sodium dodécyl sulfate) à 10 % (p/v) est alors ajoutée à ce lysat. Ensuite on incube ce lysat durant 30 minutes à 70 °C.

Puis le lysat est refroidi aux environs de 45 °C, on y ajoute ensuite 0,5 ml d'une solution de protéinase K (vendue par BOEHRINGER Mannheim) à 20 mg/ml (préparée extemporanément).

Le lysat est incubé à 45 °C sous agitation jusqu'à l'obtention d'une solution transparente.

On effectue à partir de cette solution transparente plusieurs extractions au phénol sous les conditions et en suivant les procédures décrites dans Molecular Cloning - a laboratory manual - SAMBROOK, FRITSCH, MANIATIS - second edition, 1989, à la page E.3, jusqu'à l'obtention d'une interface propre, comme cela y est décrit.

L'ADN est précipité par 20 ml d'éthanol. Le précipité est récupéré par centrifugation à 5 000 tours par minute (BECKMAN J21, rotor JA10) pendant 5 minutes, puis mis en suspension dans 2 ml de tampon TE à pH 8,0 (10 mM TRIS-HCl, 1mM EDTA à pH 8,0). Cette suspension contient l'ADN chromosomique.

2. Construction du vecteur pUBR2002

Le vecteur pUBR2002 (E. coli - Bacillus subtilis) a été obtenu à partir du plasmide pBR322 qui est vendu par la société BIOLABS (CLONTECH LABORATORIES catalogue n° 6210-1) et du vecteur pUB131.

On construit deux oligonucléotides synthétiques par la technique décrite dans BEAUCAGE et al. (1981), Tetrahedron Letters, 22, pages 1859-1882 et en utilisant des β-cyanoéthyl phosphoramidites dans un appareil de BIOSEARCH CYCLONE SYNTHESIZER.

Les séquences de ces deux oligonucléotides sont les suivantes :

SEQ ID NO:14

5'- CCCCCCTACGTAGCGGCCGCCCCGGCCGGTAACCTAGGAAGTCAGCGCCCTGCACC - 3'

et SEQ ID NO:15

5' - CCCCCCTACGTAGGCCGGGGCGGCCGCGTTACCTAGGGCCTCGTGATACGCCTAT - 3'

Ces deux oligonucléotides sont utilisés pour effectuer une amplification par PCR à partir du plasmide pBR322 selon la technique décrite dans Molecular Cloning, a laboratory Manual - SAMBROOK et al., second edition, 1989, pages 14.18-14.19.

5 Le fragment amplifié par PCR contient le réplicon E. coli limité de part et d'autre par les sites de restriction AvrII, BstEII, NotI, SfiI, SnaBI.

Le fragment SnaBI-SnaBI d'environ 2,8 kpb (kpb = 1000 paires de bases) est ligaturé avec le vecteur pUB131 qui a préalablement fait l'objet d'une digestion avec SnaBI. La construction du vecteur pUB131 est décrite à l'exemple 10 et à la figure 7 du brevet Etats-Unis 5,352,603 (demande de brevet européen 0 415 296), qui est incorporé par référence.

La technique de la ligation est décrite par SAMBROOK et al (pages 1.68-1.69). Toutes les ligations réalisées dans les exemples de cette demande ont été effectuées en suivant cette technique.

15 La ligation ainsi obtenue est transformée dans des cellules d'E. coli MC1061 [CLONTECH LABORATORIES, catalogue n° C-1070-1] par électroporation (SAMBROOK et al, pages 1.75-1.81). Les cellules transformées sont mises en culture sur boîte de Pétri contenant le milieu LB gélosé, 100 µg/ml d'ampicilline et 10 µg/ml de kanamycine, à 37 °C pendant environ 18 heures.

20 Les plasmides sont extraits des colonies isolées par la méthode de la lyse alcaline (SAMBROOK et al., pages 1.25-1.28) et sont soumis à une analyse par restriction, analyse décrite dans Molecular Cloning, a laboratory Manual - MANIATIS et al., 1982, Cold Spring Harbor Laboratory, pages 374-379.

25 On obtient une souche dont on extrait le vecteur qui est dénommé pUBR2002 (figure 3).

3. Construction d'une collection de gènes de Bacillus sp. 720/1

30 A partir de la suspension le contenant, l'ADN chromosomique est clivé partiellement par l'enzyme de restriction Sau3AI. Les conditions de restriction sont celles décrites par SAMBROOK et al. (pages 5.28-5.32), à part que ces conditions de restriction sont augmentées d'un facteur 10, afin d'obtenir une quantité d'ADN suffisante pour les étapes de purification suivantes.

Le rapport entre la quantité d'ADN mise en oeuvre et la quantité d'enzyme est ajusté afin d'obtenir un maximum de fragments de taille comprise entre 4 et 7 kpb (kpb : 10^3 paires de bases).

5 L'ensemble des fragments ainsi obtenus est ensuite soumis à une électrophorèse en gel d'agarose (0,8 % p/v), comme décrit par SAMBROOK et al., pages 6.01-6.19, et les fragments de taille comprise entre 4 et 7 kpb sont isolés et purifiés par la méthode de filtration suivie d'une centrifugation décrite dans ZHU et al., Bio/Technology 3, 1985, pages 1014-1016.

10 Les fragments d'ADN ainsi purifiés sont ensuite ligaturés (selon la méthode décrite par SAMBROOK et al. (pages 1.68-1.69) avec le plasmide pUBR2002 (E. coli - Bacillus subtilis), préalablement coupé au site BamHI et déphosphorylé comme décrit par SAMBROOK et al. (pages 1.60-1.61).

15 La ligation ainsi obtenue est utilisée pour transformer des cellules de E. coli MC1061 par électroporation (SAMBROOK et al., pages 1.75-1.81).

4. Criblage de la collection de gènes

20 Les cellules transformées de E. coli sont mises en culture sur boîte de Pétri contenant le milieu LB gélosé, 0,8 g/l d'AZCL-xylane et 100 μ g/ml d'ampicilline, durant environ 24 heures à 37 °C. On isole une colonie présentant une zone d'hydrolyse.

Le plasmide présent dans cette colonie est extrait et isolé par la technique de la lyse alcaline décrite dans SAMBROOK et al., pages 1.25-1.28.

25 On effectue une analyse par restriction (SAMBROOK et al., page 1.85). Cette analyse indique que le fragment d'ADN obtenu qui contient le gène de la xylanase a une taille d'environ 3,5 kpb (kpb = 1 000 paires de bases). Il est porté par le vecteur pUBR2002 qui a été ligaturé.

On obtient ainsi le plasmide pUBR-720X1 (figure 4).

5. Clonage d'un fragment chromosomique contenant le gène de la xylanase

30 Le plasmide pUBR-720X1 est digéré par des enzymes de restriction aux sites SmaI et SpeI. Le gène de la xylanase est ainsi obtenu sur un fragment d'ADN SmaI-SpeI d'environ 1,5 kpb.

35 Ce fragment d'ADN SmaI-SpeI est soumis à un traitement avec le fragment Klenow de l'ADN polymérase (SAMBROOK et al., pages F.2-F.3).

La préparation d'ADN ainsi obtenue est ligaturée avec le vecteur

pUBR2002, qui a été préalablement digéré avec EcoRV et déphosphorylé.

La ligation est ensuite transformée dans des cellules d'E. coli MC1061 par électroporation.

Les souches transformées sont sélectionnées sur boîte de Pétri contenant le milieu LB (Luria-Bertani) gélosé, 0,8 g/l d'AZCL-xylane (MEGAZYME) et 100 µg/ml d'ampicilline, après croissance à 37 °C pendant environ 24 heures.

Les colonies présentant une zone d'hydrolyse sont isolées. Les plasmides sont extraits des colonies isolées par la technique de la lyse alcaline (SAMBROOK et al., pages 1.25-1.28) et sont soumis à une analyse par restriction (MANIATIS et al., 1982, pages 374-379). Cette analyse par restriction montre que le plasmide isolé, pUBR-720X11 (figure 5), contient le gène de la xylanase sur un fragment d'environ 1,5 kpb de l'ADN chromosomique du *Bacillus* sp. 720/1.

Le plasmide pUBR-720X11 est ensuite utilisé pour transformer les cellules d'E. coli JM109 (CLONTECH LABORATORIES catalogue n° C1005-1) par la technique au CaCl₂ (SAMBROOK et al., pages 1.82-1.84).

Les cellules transformées de E. coli sont cultivées sur boîte de Pétri contenant le milieu LB gélosé, 0,8 g/l d'AZCL-xylane et 100 µg/ml d'ampicilline. Après croissance à 37 °C pendant environ 24 heures, on observe une zone d'hydrolyse autour des colonies. Ceci montre que les cellules transformées de E. coli expriment bien la xylanase.

La technique permettant de déphosphoryler les fragments d'ADN ou de linéariser les vecteurs est décrite par SAMBROOK et al. (pages 1.60-1.61).

On isole une colonie présentant une zone d'hydrolyse. Le plasmide présent dans cette colonie est extrait et isolé par la technique de la lyse alcaline.

On établit la séquence de la xylanase à partir de la méthode décrite dans SAMBROOK et al. pages 13.15 et 13.17 (figure 13.3B) en utilisant le plasmide pUBR-720X11 comme matrice.

Pour initier la détermination de la séquence, des oligonucléotides synthétiques sont préparés pour s'hybrider avec le plasmide pUBR2002. Les séquences de ces oligonucléotides synthétiques sont les suivantes :

SEQ ID NO:16

5' - ACGAGGAAAGATGCTGTTCTTGTAATGAGT - 3'

et

SEQ ID NO:17

5' - TACCTTGTCTACAAACCCC - 3'

Le reste de la séquence est déterminé par l'utilisation d'autres oligonucléotides synthétiques en se basant sur les parties de la séquence nouvellement déterminées.

5 La séquence de nucléotides du gène complet qui code pour la xylanase (SEQ ID NO:10) est ainsi obtenue (figure 2). Le gène de la xylanase est obtenu comme un fragment d'environ 1,5 kpb

Exemple 15

Construction du vecteur d'expression pUBRD-720X11

10 Le vecteur d'expression pUBRD-720X11 (Figure 6) est un plasmide dérivé du plasmide pUBR-720X11, dont on a éliminé le réplicon de E. coli.

La construction du plasmide pUBRD-720X11 à partir du plasmide pUBR-720X11, tel qu'obtenu à l'exemple 14, est décrite ci-après.

15 Le plasmide pUBR-720X11 est digéré par l'enzyme de restriction aux sites SnaBI, en vue d'éliminer l'origine de répllication de E. coli, en suivant la technique décrite à l'exemple 14. Un fragment d'environ 5 kpb est ainsi obtenu, il est ligaturé sur lui-même, en suivant la technique décrite à l'exemple 14, pour obtenir le plasmide pUBRD-720X11.

20 La ligation ainsi obtenue est utilisée pour transformer des cellules compétentes de Bacillus subtilis SE3 en suivant la technique décrite dans DNA Cloning, vol. II, ED. Glover, D.M., IRL Press Oxford, 1985, pages 9-11.

25 La souche de Bacillus subtilis SE3 a été déposée le 21 juin 1993 à la collection nommée BELGIAN COORDINATED COLLECTIONS OF MICROORGANISMS (LMG culture collection, Gand, Belgique) conformément au Traité de Budapest sous le numéro LMG P-14035.

Les cellules transformées sont mises en culture sur boîte de Pétri contenant le milieu LB (Luria-Bertani) gélosé, 0,8 g/l d'AZCL-xylane et 25 µg/ml de kanamycine, à 37°C pendant environ 18 heures. Après croissance, les colonies présentant une zone d'hydrolyse sont isolées.

30 Les colonies isolées sont soumises à une analyse du plasmide par restriction enzymatique, en vue de vérifier que la construction du plasmide est correcte, en suivant la technique décrite à l'exemple 14.

On obtient une souche dont on peut isoler le vecteur qui est dénommé

pUBRD-720X11.

Exemple 16

Transformation de la souche de Bacillus licheniformis SE2 delap6 avec le vecteur d'expression pUBRD-720X11

5 Le plasmide pUBRD-720X11, décrit à l'exemple 15, est extrait de son hôte, isolé et purifié (SAMBROOK et al., 1989, p. 1.25-1.28).

On prépare une culture de la souche de Bacillus licheniformis SE2 delap6. La souche de Bacillus licheniformis SE2 delap6 et la culture de celle-ci sont décrites aux exemples 27 et 28 de la demande de brevet européen 0 634 490, qui est incorporée par référence.

10 La souche de Bacillus licheniformis SE2 delap6 a été préparée à partir de la souche de Bacillus licheniformis SE2 qui a été déposée le 21 juin 1993 à la collection nommée BELGIAN COORDINATED COLLECTIONS OF MICROORGANISMS (LMG culture collection, Gand, Belgique) conformément au Traité de Budapest sous le numéro LMG P-14034.

15 Puis, on transforme la souche de Bacillus licheniformis SE2 delap6 avec le plasmide pUBRD-720X11 selon la technique des protoplastes (MANIATIS et al., p. 150-151).

20 La souche transformée [Bacillus licheniformis SE2 delap6 (pUBRD-720X11)] est sélectionnée sur boîte de Pétri contenant le milieu LB gélosé, 0,8 g/l d'AZCL-xylane et 25 µg/ml de kanamycine. Puis, elle est isolée et purifiée par criblage, c'est-à-dire en étant déposée et étalée sous forme de stries épuisantes à la surface du milieu LB gélosé (Luria Bertani) qui est décrit dans Molecular Cloning - Laboratory Manual (Sambrook et

25 al.), 1989, p. A.4.

Exemple 17

Production de la xylanase par B. licheniformis SE2 delap6 (pUBRD-720X11)

30 La souche de B. licheniformis SE2 delap6 transformée par le plasmide pUBRD-720X11, telle qu'obtenue à l'exemple 16, est mise en culture pendant 17 heures à 37 °C dans un milieu de culture LB supplémenté de 0,5 % (p/v) de glucose et 20 µg/ml de kanamycine.

Cette culture est transférée (5 % v/v) dans 50 ml de milieu M2 supplémenté de 20 µg/ml de kanamycine.

35 Le milieu M2 contient 30 g de farine de soja, 75 g d'amidon soluble, 2 g de sulfate de sodium, 5 mg de chlorure de magnésium, 3 g de

NaH_2PO_4 , 0,2 g de $\text{CaCl}_2 \cdot \text{H}_2\text{O}$ et 1000 ml d'eau. Le pH de ce milieu M2 est ajusté à 5,8 avec NaOH 10 N avant sa stérilisation.

La culture est incubée sous agitation orbitale, à raison de 250 révolutions par minute avec une amplitude d'environ 2,54 cm, pendant 80 heures à 37 °C. Après 80 heures, la biomasse est éliminée par centrifugation (BECKMAN J21, rotor JA10) à 5000 tours par minutes pendant 10 minutes. Le surnageant de centrifugation est conservé. On mesure l'activité enzymatique sur ce surnageant, selon la technique décrite à l'exemple 2, et on note la présence d'une activité xylanase.

10 Exemple 18

Construction du vecteur pUBC2001

Le vecteur pUBC2001 (*E. coli*-*Bacillus*) (figure 7) est un plasmide dérivé du plasmide pUBC131, comportant comme seule différence la présence de deux sites de restriction supplémentaires : BstEII et PacI. La construction du vecteur pUBC131 est décrite à l'exemple 11 et à la figure 8 du brevet Etats-Unis 5,352,603 (demande de brevet européen 0 415 296), qui est incorporé par référence.

La construction de ce plasmide est décrite ci-après.

On construit quatre oligonucléotides synthétiques en suivant la technique décrite à l'exemple 14.

Les séquences de ces quatre oligonucléotides sont les suivantes :

SEQ ID NO: 18

5'- CGGTCGCCGCATACACTA - 3'

SEQ ID NO: 19

5'- CCCCCCCCCGGTAACCTGCATTAATGAATCGGCCAA - 3'

SEQ ID NO: 20

5'- CCCCCCCCCGGTTACCGTATTTATTAACCTTCTCCTAGTA - 3'

SEQ ID NO: 21

5'- CCCCCCTCTAGATTAATTAACCAAGCTTGGGATCCGTCGACCTGCAGATC - 3'

Les deux oligonucléotides ayant les séquences SEQ ID NO: 18 et 19 sont utilisés pour effectuer une amplification par PCR à partir du vecteur pUBC131, en suivant la technique PCR décrite à l'exemple 14. Le fragment amplifié par PCR, contenant une partie du gène de résistance à l'ampicilline et les fonctions nécessaires à la répllication dans *E. coli*, est soumis à une restriction par ScaI et BstEII, générant un fragment d'environ 1,5 - 1,6 kpb.

Une seconde amplification PCR est réalisée à partir du vecteur

pUBC131, en utilisant les oligonucléotides ayant les séquences SEQ ID NO: 20 et 21 et en suivant la technique décrite à l'exemple 14. Le fragment amplifié par PCR contient une partie du vecteur pUBC131. Ce fragment est soumis à une restriction par BstEII et EcoRI, générant un fragment d'environ 1,4 - 1,5 kpb.

Les deux fragments ainsi obtenus sont ligaturés ensemble, selon la technique décrite à l'exemple 14, avec le vecteur pUBC131 qui a préalablement fait l'objet d'une double digestion avec EcoRI et ScaI, en suivant la technique décrite à l'exemple 14.

La ligation ainsi obtenue est utilisée pour transformer des cellules d'E. coli MC1061 par électroporation, en suivant la technique décrite à l'exemple 14. Les cellules transformées sont mises en culture sur boîte de Pétri contenant le milieu LB gélosé, 100 µg/ml d'ampicilline et 10 µg/ml de kanamycine, à 37°C pendant environ 18 heures.

Après croissance, les colonies isolées sont soumises à une analyse du plasmide par restriction enzymatique, en suivant la technique décrite à l'exemple 14.

On obtient une souche dont on peut extraire le vecteur qui est dénommé pUBC2001.

Exemple 19

Construction du vecteur d'expression pC-BPX-PRE-2003

Le vecteur d'expression pC-BPX-PRE-2003 (E. coli-Bacillus) (Figure 8) est un vecteur d'expression dérivé du plasmide pUBC2001. Il contient le promoteur dérivé du gène qui code pour la xylanase de *Bacillus pumilus* PRL B12 et la préséquence qui code pour le peptide signal de la xylanase de *Bacillus pumilus* PRL B12. Le procédé de préparation et d'obtention du promoteur dérivé du gène qui code pour la xylanase de *Bacillus pumilus* PRL B12 et la préséquence qui code pour le peptide signal de la xylanase de *Bacillus pumilus* PRL B12 est décrit à l'exemple 17 et à la figure 1 de la demande de brevet européen 0 634 490 qui est incorporée par référence dans cette demande.

La séquence du promoteur dérivé du gène qui code pour la xylanase de *Bacillus pumilus* PRL B12 est décrite dans la présente demande sous le numéro SEQ ID NO: 26. La séquence de la préséquence qui code pour le peptide signal de la xylanase de *Bacillus pumilus* PRL B12 est décrite dans la présente demande sous le numéro SEQ ID NO: 27.

La construction du plasmide pC-BPX-PRE-2003 est décrite ci-après.

On construit deux oligonucléotides synthétiques en suivant la technique décrite à l'exemple 14.

Les séquences de ces deux oligonucléotides sont les suivantes :

SEQ ID NO: 22

5'- CCCCCCTGAAATCAGCTGGACTAAAAGGGATGCAATTTC - 3'

SEQ ID NO: 23

5'- CCCCCGTCGACCGCATGCGCCGGCACAGC - 3'

5 Ces deux oligonucléotides sont utilisés pour effectuer une amplification par PCR à partir du plasmide pUB-BPX12, selon la technique décrite à l'exemple 14. La construction du plasmide pUB-BPX12 est décrite à l'exemple 17 et à la figure 4 de la demande de brevet européen 0 634 490, qui est incorporée par référence.

10 L'utilisation de l'oligonucléotide ayant la séquence SEQ ID NO: 22 permet, par le changement d'un nucléotide d'éliminer, en amont du promoteur de la xylanase de *B. pumilus* PRL B12, le site de restriction SphI, situé à environ 5,5 kpb, présent normalement dans pUBC2001. Le changement de nucléotide est représenté par le nucléotide souligné dans la
15 séquence SEQ ID NO: 22 ci-avant et concerne la substitution de C par G pour le site SphI (SphI = GCATGC).

La séquence SEQ ID NO: 23 permet de créer un nouveau site SphI à la fin de la préséquence qui code pour le peptide signal de la xylanase de *B. pumilus* PRL B12 en changeant seulement un nucléotide du codon Ala [25],
20 c'est-à-dire en changeant GCG en GCT.

Le fragment amplifié par PCR, contenant le promoteur dérivé du gène qui code pour la xylanase de *B. pumilus* PRL B12 et la préséquence qui code pour le peptide signal de la xylanase de *B. pumilus* PRL B12, est soumis à une restriction par PvuII et SphI, générant un fragment d'environ
25 0,7 kpb, en suivant la technique décrite à l'exemple 14.

Le fragment PvuII-SphI, d'environ 0,7 kpb, est ligaturé avec le vecteur pUBC2001 qui a préalablement fait l'objet d'une double digestion avec PvuII et SphI, en suivant les techniques décrites à l'exemple 14.

La ligation ainsi obtenue est utilisée pour transformer des cellules
30 d'*E. coli* MC1061 par électroporation, en suivant la technique décrite à l'exemple 14. Les cellules transformées sont mises en culture sur boîte de Pétri contenant le milieu LB gélosé, 100 µg/ml d'ampicilline, à 37°C

pendant environ 18 heures.

Après croissance, les colonies isolées sont soumises à une analyse du plasmide par restriction enzymatique, en suivant la technique décrite à l'exemple 14.

5 On obtient une souche dont on peut extraire le vecteur qui est dénommé pC-BPX-PRE-2003.

Exemple 20

Construction du vecteur d'expression pC-BPX-PRE-720X

10 Le vecteur d'expression pC-BPX-PRE-720X (E. coli-Bacillus) (Figure 9) est un vecteur d'expression comportant le promoteur dérivé du gène qui code pour la xylanase de B. pumilus PRL B12 et la préséquence qui code pour le peptide signal de la xylanase de B. pumilus PRL B12 et la séquence du gène qui code pour la partie mature de la xylanase de Bacillus sp. 720/1.

15 Le vecteur d'expression pC-BPX-PRE-720X comporte la séquence SEQ ID NO:1, séquence de nucléotides du gène qui code pour la partie mature de la xylanase de Bacillus sp. 720/1.

La construction du plasmide pC-BPX-PRE-720X est décrite ci-après.

On construit deux oligonucléotides synthétiques en suivant la technique décrite à l'exemple 14.

20 Les séquences de ces deux oligonucléotides sont les suivantes :

SEQ ID NO: 24

5'- CCCCCCGCATGCGCAAATCGTCACCGACAATTCCATTGG - 3'

SEQ ID NO: 25

5'- TACCTTGTCTACAAACCCC - 3'

Ces deux oligonucléotides sont utilisés pour effectuer une amplification par PCR à partir du plasmide pUBR-720X11, tel qu'obtenu à l'exemple 14, et selon la technique décrite à l'exemple 14.

25 Le fragment amplifié par PCR, contenant la séquence du gène qui code pour la partie mature de la xylanase de Bacillus sp. 720/1, est soumis à une restriction par SphI et SacI, générant un fragment d'environ 0,8 kpb, selon la technique décrite à l'exemple 14.

30 Le fragment SphI-SacI est ligaturé avec le vecteur pC-BPX-PRE-2003 qui a préalablement fait l'objet d'une double digestion avec SphI et SacI, selon les techniques décrites à l'exemple 14. La ligature au niveau du site de restriction SphI permet de créer une fusion traductionnelle de la séquence signal du gène qui code pour la xylanase de B. pumilus PRL B12 avec la

séquence du gène qui code pour la partie mature de la xylanase de *Bacillus* sp. 720/1.

La ligation ainsi obtenue est utilisée pour transformer des cellules d'*E. coli* MC1061 par électroporation, selon la technique décrite à l'exemple 14.
5 Les cellules transformées sont mises en culture sur boîte de Pétri contenant le milieu LB gélosé, 0,8 g/l d'AZCL-xylane et 100 µg/ml d'ampicilline, à 37°C pendant environ 18 heures. On isole les colonies présentant une zone d'hydrolyse.

Après croissance, les colonies isolées sont soumises à une analyse du
10 plasmide par restriction enzymatique, selon la technique décrite à l'exemple 14.

On obtient une souche dont on peut extraire le vecteur qui est dénommé pC-BPX-PRE-720X.

Exemple 21

15 Construction du vecteur pBPXD-PRE-720X

Le vecteur pBPXD-PRE-720X (*Bacillus*) (Figure 10) est un vecteur d'expression dérivé du plasmide pUB131. Il comporte le promoteur dérivé du gène qui code pour la xylanase de *B. pumilus* PRL B12 et la
20 préséquence qui code pour le peptide signal de la xylanase de *B. pumilus* PRL B12 et la séquence du gène qui code pour la partie mature de la xylanase de *Bacillus* sp. 720/1.

La construction du plasmide pBPXD-PRE-720X est décrite ci-après.

Le plasmide pC-BPX-PRE-720X, obtenu à l'exemple 20, est soumis à une restriction par PvuII et EcoRI, générant un fragment d'environ 1,5 kpb,
25 selon la technique décrite à l'exemple 14.

Le fragment d'environ 1,5 kpb est ligaturé avec le vecteur pUB131, qui a préalablement fait l'objet d'une double digestion avec PvuII et EcoRI, selon les techniques décrites à l'exemple 14.

La ligation ainsi obtenue est utilisée pour transformer des cellules de *B. subtilis* SE3, selon la technique d'électroporation décrite à l'exemple 14.
30 Les cellules transformées sont mises en culture sur boîte de Pétri contenant le milieu LB gélosé, 0,8 g/l d'AZCL-xylane et 25 µg/ml de kanamycine, à 37°C pendant environ 18 heures. On isole les colonies présentant une large zone d'hydrolyse.

Après croissance, les colonies isolées sont soumises à une analyse du
35 plasmide par restriction enzymatique, selon la technique décrite à l'exemple

14.

On obtient ainsi une souche dont on peut extraire le vecteur qui est dénommé pBPXD-PRE-720X.

Exemple 22

5 Transformation de *Bacillus licheniformis* SE2 delap6 avec le vecteur d'expression pBPXD-PRE-720X

Le plasmide pBPXD-PRE-720X (Figure 10), décrit à l'exemple 21, est extrait de son hôte, isolé et purifié.

10 On prépare une culture de la souche de *B. licheniformis* SE2 delap6, selon la technique décrite à l'exemple 16. Puis, on transforme cette souche avec ce plasmide selon la technique des protoplastes décrite à l'exemple 16.

15 La souche transformée [*B. licheniformis* SE2 delap6 (pBPXD-PRE-720X)] est sélectionnée sur boîte de Pétri contenant le milieu LB gélosé, 0,8 g/l d'AZCL-xylane et 25 µg/ml de kanamycine. La souche est isolée et purifiée par criblage, selon la technique décrite à l'exemple 16.

Exemple 23

Production de la xylanase par *B. licheniformis* SE2 delap6 (pBPXD-PRE-720X)

20 On effectue un essai identique à celui décrit à l'exemple 17, mais avec la souche de *B. licheniformis* SE2 delap6 transformée par le plasmide pBPXD-PRE-720X, telle qu'obtenue à l'exemple 22.

On mesure, selon la technique décrite à l'exemple 2, l'activité enzymatique sur le surnageant obtenu et on note la présence d'une activité xylanase.

25 Exemple 24

Préparation et isolement de la xylanase produite par la souche de *B. licheniformis* SE2 delap6 (pBPXD-PRE-720X)

30 On isole et purifie la xylanase produite par la souche de *B. licheniformis* SE2 delap6 transformée par le plasmide pBPXD-PRE-720X, telle qu'obtenue à l'exemple 22. On met en culture cette souche en suivant le protocole décrit dans l'exemple 23.

La xylanase obtenue est isolée et purifiée suivant le protocole décrit à l'exemple 3 de la demande de brevet européen 0 634 490, qui est incorporée par référence dans cette demande.

35 Exemple 25

Séquence d'acides aminés de la xylanase produite par la souche de *B.*

licheniformis SE2 delap6 (pBPXD-PRE-720X)

La séquence des 50 premiers acides aminés de la xylanase produite par la souche de *B. licheniformis* SE2 delap6 (pBPXD-PRE-720X) est déterminée en utilisant un appareil séquenceur (HP G1000A,

5 HEWLETT-PACKARD) et en suivant la notice d'emploi de cet appareil.

On met en oeuvre la xylanase isolée et purifiée telle que décrite à l'exemple 24.

On vérifie que la séquence obtenue est identique à celle décrite à l'exemple 4 pour la xylanase produite par la souche de *Bacillus* sp. 720/1.

10 Exemple 26

Détermination du poids moléculaire de la xylanase produite par la souche de *B. licheniformis* SE2 delap6 (pBPXD-PRE-720X)

Le poids moléculaire de la xylanase produite par la souche de *B. licheniformis* SE2 delap6 (pBPXD-PRE-720X) est déterminé en suivant le
15 protocole décrit à l'exemple 7 et en mettant en oeuvre la xylanase isolée et purifiée telle que décrite à l'exemple 24.

Une coloration au bleu de Coomassie fait apparaître un polypeptide d'un poids moléculaire compris entre 25 et 26 kD, qui est identique à celui de la xylanase produite par la souche de *Bacillus* sp. 720/1.

LISTE DE SEQUENCES

(1) INFORMATIONS GENERALES :

(i) DEPOSANT :

- (A) NOM : SOLVAY (Société Anonyme)
- (B) RUE : rue du Prince Albert, 33
- (C) VILLE : Bruxelles
- (E) PAYS : Belgique
- (F) CODE POSTAL : 1050
- (G) TELEPHONE : (02) 509.61.11

(ii) TITRE DE L'INVENTION : xylanase, microorganismes la produisant, molécule d'ADN, procédés de préparation de cette xylanase et utilisations de celle-ci

(iii) NOMBRE DE SEQUENCES : 29

(iv) FORME LISIBLE PAR ORDINATEUR :

- (A) TYPE DE SUPPORT : Floppy disk
- (B) ORDINATEUR : IBM PC compatible
- (C) SYSTEME D'EXPLOITATION : PC-DOS:MS-DOS

(2) INFORMATION POUR LA SEQ ID NO:1:

(i) CARACTERISTIQUES DE LA SEQUENCE :

- (A) LONGUEUR : 663 paires de bases
- (B) TYPE : acide nucléique
- (C) NOMBRE DE BRINS : simple
- (D) CONFIGURATION : linéaire

(ii) TYPE DE MOLECULE : ADN génomique

(xi) DESCRIPTION DE LA SEQUENCE: SEQ ID NO:1:

CAAATCGTCA CCGACAATTC CATTGGCAAC CACGATGGCT ATGATTATGA ATTTTGGAAA

GATAGCGGTG GCTCTGGGAC AATGATTCTC AATCATGGCG GTACGTTTCTG TGCCCAATGG	120
AACAATGTTA ACAACATATT ATTCCGTAAA GGTAAGAAAT TCAATGAAAC ACAAACACAC	180
CAACAAGTTG GTAACATGTC CATAAACTAC GGAGCCAAC TCCAACCAA TGTAATGCG	240
TATTTATGCG TCTATGGTTG GACTGTTGAC CCTCTTGTCG AATATTATAT TGTCGACAGT	300
TGGGGCAACT GCGTCCACC AGGAGCAACG CCTAAGGGGA CCATCACTGT TGATGGAGGA	360
ACATATGATA TCTACGAGAC TCTTAGAGTC AATCAACCCT CCATTAAGGG GATTGCCACA	420
TTTAAACAAT ATTGGAGTGT TCGAAGATCG AAACGCACGA GTGGCAGCAT TTCTGTCAGC	480
AACCACTTTA GAGCGTGGGA AAACCTAGGG ATGAATATGG GGAAATGTA TGAAGTCGCG	540
CTTACTGTAG AAGGCTATCA AAGTAGCGGA AGTGCTAATG TATATAGCAA TACTAAGA	600
ATTAACGGTA ACCCTCTCTC AACTATTAGT AATGACGAGA GCATAACTTT GGATAAAAC	660
AAT	663

(2) INFORMATION POUR LA SEQ ID NO:2:

(i) CARACTERISTIQUES DE LA SEQUENCE :

- (A) LONGUEUR : 663 paires de bases
- (B) TYPE : acide nucléique
- (C) NOMBRE DE BRINS : simple
- (D) CONFIGURATION : linéaire

(ii) TYPE DE MOLECULE : ADN génomique

(xi) DESCRIPTION DE LA SEQUENCE: SEQ ID NO:2:

CAA ATC GTC ACC GAC AAT TCC ATT GGC AAC CAC GAT GGC TAT GAT TAT	48
Gln Ile Val Thr Asp Asn Ser Ile Gly Asn His Asp Gly Tyr Asp Tyr	
1 5 10 15	
GAA TTT TGG AAA GAT AGC GGT GGC TCT GGG ACA ATG ATT CTC AAT CAT	96
Glu Phe Trp Lys Asp Ser Gly Gly Ser Gly Thr Met Ile Leu Asn His	
20 25 30	
GGC GGT ACG TTC AGT GCC CAA TGG AAC AAT GTT AAC AAC ATA TTA TTC	144
Gly Gly Thr Phe Ser Ala Gln Trp Asn Asn Val Asn Asn Ile Leu Phe	
35 40 45	
CGT AAA GGT AAA AAA TTC AAT GAA ACA CAA ACA CAC CAA CAA GTT GGT	192
Arg Lys Gly Lys Lys Phe Asn Glu Thr Gln Thr His Gln Gln Val Gly	
50 55 60	
AAC ATG TCC ATA AAC TAC GGA GCC AAC TTC CAA CCA AAT GGT AAT GCG	240
Asn Met Ser Ile Asn Tyr Gly Ala Asn Phe Gln Pro Asn Gly Asn Ala	
65 70 75 80	
TAT TTA TGC GTC TAT GGT TGG ACT GTT GAC CCT CTT GTC GAA TAT TAT	288
Tyr Leu Cys Val Tyr Gly Trp Thr Val Asp Pro Leu Val Glu Tyr Tyr	
85 90 95	
ATT GTC GAC AGT TGG GGC AAC TGG CGT CCA CCA GGA GCA ACG CCT AAG	336
Ile Val Asp Ser Trp Gly Asn Trp Arg Pro Pro Gly Ala Thr Pro Lys	
100 105 110	
GGG ACC ATC ACT GTT GAT GGA GGA ACA TAT GAT ATC TAC GAG ACT CTT	384
Gly Thr Ile Thr Val Asp Gly Gly Thr Tyr Asp Ile Tyr Glu Thr Leu	
115 120 125	
AGA GTC AAT CAA CCC TCC ATT AAG GGG ATT GCC ACA TTT AAA CAA TAT	432
Arg Val Asn Gln Pro Ser Ile Lys Gly Ile Ala Thr Phe Lys Gln Tyr	
130 135 140	

TGG AGT GTT CGA AGA TCG AAA CGC ACG AGT GGC ACG ATT TCT GTC AGC	480
Trp Ser Val Arg Arg Ser Lys Arg Thr Ser Gly Thr Ile Ser Val Ser	
145 150 155 160	
AAC CAC TTT AGA GCG TGG GAA AAC TTA GGG ATG AAT ATG GGG AAA ATG	528
Asn His Phe Arg Ala Trp Glu Asn Leu Gly Met Asn Met Gly Lys Met	
165 170 175	
TAT GAA GTC GCG CTT ACT GTA GAA GGC TAT CAA AGT AGC GGA AGT GCT	576
Tyr Glu Val Ala Leu Thr Val Glu Gly Tyr Gln Ser Ser Gly Ser Ala	
180 185 190	
AAT GTA TAT AGC AAT ACA CTA AGA ATT AAC GGT AAC CCT CTC TCA ACT	624
Asn Val Tyr Ser Asn Thr Leu Arg Ile Asn Gly Asn Pro Leu Ser Thr	
195 200 205	
ATT AGT AAT GAC GAG AGC ATA ACT TTG GAT AAA AAC AAT	663
Ile Ser Asn Asp Glu Ser Ile Thr Leu Asp Lys Asn Asn	
210 215 220	

(2) INFORMATION POUR LA SEQ ID NO:3:

(i) CARACTERISTIQUES DE LA SEQUENCE :

- (A) LONGUEUR : 221 acides aminés
- (B) TYPE : acide aminé
- (D) CONFIGURATION : linéaire

(ii) TYPE DE MOLECULE : protéine

(v) TYPE DE FRAGMENT : fragment interne

(vi) ORIGINE :

- (A) ORGANISME : Bacillus
- (B) SOUCHE : 720/1

(xi) DESCRIPTION DE LA SEQUENCE: SEQ ID NO:3:

- 49 -

Gln Ile Val Thr Asp Asn Ser Ile Gly Asn His Asp Gly Tyr Asp Tyr
 1 5 10 15
 Glu Phe Trp Lys Asp Ser Gly Gly Ser Gly Thr Met Ile Leu Asn His
 20 25 30
 Gly Gly Thr Phe Ser Ala Gln Trp Asn Asn Val Asn Asn Ile Leu Phe
 35 40 45
 Arg Lys Gly Lys Lys Phe Asn Glu Thr Gln Thr His Gln Gln Val Gly
 50 55 60
 Asn Met Ser Ile Asn Tyr Gly Ala Asn Phe Gln Pro Asn Gly Asn Ala
 65 70 75 80
 Tyr Leu Cys Val Tyr Gly Trp Thr Val Asp Pro Leu Val Glu Tyr Tyr
 85 90 95
 Ile Val Asp Ser Trp Gly Asn Trp Arg Pro Pro Gly Ala Thr Pro Lys
 100 105 110
 Gly Thr Ile Thr Val Asp Gly Gly Thr Tyr Asp Ile Tyr Glu Thr Leu
 115 120 125
 Arg Val Asn Gln Pro Ser Ile Lys Gly Ile Ala Thr Phe Lys Gln Tyr
 130 135 140
 Trp Ser Val Arg Arg Ser Lys Arg Thr Ser Gly Thr Ile Ser Val Ser
 145 150 155 160
 Asn His Phe Arg Ala Trp Glu Asn Leu Gly Met Asn Met Gly Lys Met
 165 170 175
 Tyr Glu Val Ala Leu Thr Val Glu Gly Tyr Gln Ser Ser Gly Ser Ala
 180 185 190

- 50 -

Asn Val Tyr Ser Asn Thr Leu Arg Ile Asn Gly Asn Pro Leu Ser Thr
 195 200 205

Ile Ser Asn Asp Glu Ser Ile Thr Leu Asp Lys Asn Asn
 210 215 220

(2) INFORMATION POUR LA SEQ ID NO:4:

(i) CARACTERISTIQUES DE LA SEQUENCE :

- (A) LONGUEUR : 744 paires de bases
- (B) TYPE : acide nucléique
- (C) NOMBRE DE BRINS : simple
- (D) CONFIGURATION : linéaire

(ii) TYPE DE MOLECULE : ADN génomique

(xi) DESCRIPTION DE LA SEQUENCE: SEQ ID NO:4:

ATGAGACAAA AGAAATTGAC GTTGATTTTA GCCTTTTGTAG TTTGTTTGTG ACTAACCTTA	60
CCTGCAGAAA TAATTCAGGC ACAAATCGTC ACCGACAATT CCATTGGCAA CCACGATGGC	120
TATGATTATG AATTTTGGAA AGATAGCGGT GGCTCTGGGA CAATGATTCT CAATCATGGC	180
GGTACGTTCA GTGCCCAATG GAACAATGTT AACAACATAT TATTCGTAA AGGTAAAAAA	240
TTCAATGAAA CACAAACACA CCAACAAGTT GGTAACATGT CCATAAACTA CGGAGCCAAC	300
TTCCAACCAA ATGGTAATGC GTATTTATGC GTCTATGGTT GGACTGTTGA CCCTCTTGTC	360
GAATATTATA TTGTCGACAG TTGGGGCAAC TGGCGTCCAC CAGGAGCAAC GCCTAAGGGG	420
ACCATCACTG TTGATGGAGG AACATATGAT ATCTACGAGA CTCTTAGAGT CAATCAACCC	480
TCCATTAAGG GGATTGCCAC ATTTAAACAA TATTGGAGTG TTCGAAGATC GAAACGCACG	540

- 51 -

AGTGGCACGA TTTCTGTCAG CAACCACTTT AGAGCGTGGG AAAACTTAGG GATGAATATG 600

GGGAAAATGT ATGAAGTCGC GCTTACTGTA GAAGGCTATC AAAGTAGCGG AAGTGCTAAT 660

GTATATAGCA ATACACTAAG AATTAACGGT AACCTCTCT CAACTATTAG TAATGACGAG 720

AGCATAACTT TGGATAAAAA CAAT 744

(2) INFORMATION POUR LA SEQ ID NO:5:

(i) CARACTERISTIQUES DE LA SEQUENCE :

- (A) LONGUEUR : 744 paires de bases
- (B) TYPE : acide nucléique
- (C) NOMBRE DE BRINS : simple
- (D) CONFIGURATION : linéaire

(ii) TYPE DE MOLECULE : ADN génomique

(xi) DESCRIPTION DE LA SEQUENCE: SEQ ID NO:5:

ATG AGA CAA AAG AAA TTG ACG TTG ATT TTA GCC TTT TTA GTT TGT TTT 48
Met Arg Gln Lys Lys Leu Thr Leu Ile Leu Ala Phe Leu Val Cys Phe
-25 -20 -15

GCA CTA ACC TTA CCT GCA GAA ATA ATT CAG GCA CAA ATC GTC ACC GAC 96
Ala Leu Thr Leu Pro Ala Glu Ile Ile Gln Ala Gln Ile Val Thr Asp
-10 -5 -1 1 5

AAT TCC ATT GGC AAC CAC GAT GGC TAT GAT TAT GAA TTT TGG AAA GAT 144
Asn Ser Ile Gly Asn His Asp Gly Tyr Asp Tyr Glu Phe Trp Lys Asp
10 15 20

AGC GGT GGC TCT GGG ACA ATG ATT CTC AAT CAT GGC GGT ACG TTC AGT 92
Ser Gly Gly Ser Gly Thr Met Ile Leu Asn His Gly Gly Thr Phe Ser
25 30 35

- 52 -

GCC CAA TGG AAC AAT GTT AAC AAC ATA TTA TTC CGT AAA GGT AAA AAA	240
Ala Gln Trp Asn Asn Val Asn Asn Ile Leu Phe Arg Lys Gly Lys Lys	
40 45 50	
TTC AAT GAA ACA CAA ACA CAC CAA CAA GTT GGT AAC ATG TCC ATA AAC	288
Phe Asn Glu Thr Gln Thr His Gln Gln Val Gly Asn Met Ser Ile Asn	
55 60 65	
TAC GGA GCC AAC TTC CAA CCA AAT GGT AAT GCG TAT TTA TGC GTC TAT	336
Tyr Gly Ala Asn Phe Gln Pro Asn Gly Asn Ala Tyr Leu Cys Val Tyr	
70 75 80 85	
GGT TGG ACT GTT GAC CCT CTT GTC GAA TAT TAT ATT GTC GAC AGT TGG	384
Gly Trp Thr Val Asp Pro Leu Val Glu Tyr Tyr Ile Val Asp Ser Trp	
90 95 100	
GGC AAC TGG CGT CCA CCA GGA GCA ACG CCT AAG GGG ACC ATC ACT GTT	432
Gly Asn Trp Arg Pro Pro Gly Ala Thr Pro Lys Gly Thr Ile Thr Val	
105 110 115	
GAT GGA GGA ACA TAT GAT ATC TAC GAG ACT CTT AGA GTC AAT CAA CCC	480
Asp Gly Gly Thr Tyr Asp Ile Tyr Glu Thr Leu Arg Val Asn Gln Pro	
120 125 130	
TCC ATT AAG GGG ATT GCC ACA TTT AAA CAA TAT TGG AGT GTT CGA AGA	528
Ser Ile Lys Gly Ile Ala Thr Phe Lys Gln Tyr Trp Ser Val Arg Arg	
135 140 145	
TCG AAA CGC ACG AGT GGC ACG ATT TCT GTC AGC AAC CAC TTT AGA GCG	576
Ser Lys Arg Thr Ser Gly Thr Ile Ser Val Ser Asn His Phe Arg Ala	
150 155 160 165	
TGG GAA AAC TTA GGG ATG AAT ATG GGG AAA ATG TAT GAA GTC GCG CTT	624
Trp Glu Asn Leu Gly Met Asn Met Gly Lys Met Tyr Glu Val Ala Leu	
170 175 180	

- 53 -

ACT GTA GAA GGC TAT CAA AGT AGC GGA AGT GCT AAT GTA TAT AGC AAT 672
 Thr Val Glu Gly Tyr Gln Ser Ser Gly Ser Ala Asn Val Tyr Ser Asn
 185 190 195

ACA CTA AGA ATT AAC GGT AAC CCT CTC TCA ACT ATT AGT AAT GAC GAG 720
 Thr Leu Arg Ile Asn Gly Asn Pro Leu Ser Thr Ile Ser Asn Asp Glu
 200 205 210

AGC ATA ACT TTG GAT AAA AAC AAT 744
 Ser Ile Thr Leu Asp Lys Asn Asn
 215 220

(2) INFORMATION POUR LA SEQ ID NO:6:

(i) CARACTERISTIQUES DE LA SEQUENCE :

- (A) LONGUEUR : 248 acides aminés
- (B) TYPE : acide aminé
- (D) CONFIGURATION : linéaire

(ii) TYPE DE MOLECULE : protéine

(v) TYPE DE FRAGMENT : fragment interne

(vi) ORIGINE :

- (A) ORGANISME : Bacillus
- (B) SOUCHE : 720/1

(xi) DESCRIPTION DE LA SEQUENCE: SEQ ID NO:6:

Met Arg Gln Lys Lys Leu Thr Leu Ile Leu Ala Phe Leu Val Cys Phe
 -25 -20 -15

Ala Leu Thr Leu Pro Ala Glu Ile Ile Gln Ala Gln Ile Val Thr Asp
 -10 -5 -1 1 5

- 54 -

Asn Ser Ile Gly Asn His Asp Gly Tyr Asp Tyr Glu Phe Trp Lys Asp
10 15 20

Ser Gly Gly Ser Gly Thr Met Ile Leu Asn His Gly Gly Thr Phe Ser
25 30 35

Ala Gln Trp Asn Asn Val Asn Asn Ile Leu Phe Arg Lys Gly Lys Lys
40 45 50

Phe Asn Glu Thr Gln Thr His Gln Gln Val Gly Asn Met Ser Ile Asn
55 60 65

Tyr Gly Ala Asn Phe Gln Pro Asn Gly Asn Ala Tyr Leu Cys Val Tyr
70 75 80 85

Gly Trp Thr Val Asp Pro Leu Val Glu Tyr Tyr Ile Val Asp Ser Trp
90 95 100

Gly Asn Trp Arg Pro Pro Gly Ala Thr Pro Lys Gly Thr Ile Thr Val
105 110 115

Asp Gly Gly Thr Tyr Asp Ile Tyr Glu Thr Leu Arg Val Asn Gln Pro
120 125 130

Ser Ile Lys Gly Ile Ala Thr Phe Lys Gln Tyr Trp Ser Val Arg Arg
135 140 145

Ser Lys Arg Thr Ser Gly Thr Ile Ser Val Ser Asn His Phe Arg Ala
150 155 160 165

Trp Glu Asn Leu Gly Met Asn Met Gly Lys Met Tyr Glu Val Ala Leu
170 175 180

Thr Val Glu Gly Tyr Gln Ser Ser Gly Ser Ala Asn Val Tyr Ser Asn
185 190 195

- 55 -

Thr Leu Arg Ile Asn Gly Asn Pro Leu Ser Thr Ile Ser Asn Asp Glu
 200 205 210

Ser Ile Thr Leu Asp Lys Asn Asn
 215 220

(2) INFORMATION POUR LA SEQ ID NO:7:

(i) CARACTERISTIQUES DE LA SEQUENCE :

- (A) LONGUEUR : 81 paires de bases
- (B) TYPE : acide nucléique
- (C) NOMBRE DE BRINS : simple
- (D) CONFIGURATION : linéaire

(ii) TYPE DE MOLECULE : ADN génomique

(xi) DESCRIPTION DE LA SEQUENCE: SEQ ID NO:7:

ATGAGACAAA AGAAATTGAC GTTGATTTTA GCCTTTTGTAG TTTGTTTTGC ACTAACCTTA 60

CCTGCAGAAA TAATTCAGGC A 81

(2) INFORMATION POUR LA SEQ ID NO:8:

(i) CARACTERISTIQUES DE LA SEQUENCE :

- (A) LONGUEUR : 81 paires de bases
- (B) TYPE : acide nucléique
- (C) NOMBRE DE BRINS : simple
- (D) CONFIGURATION : linéaire

(ii) TYPE DE MOLECULE : ADN génomique

(xi) DESCRIPTION DE LA SEQUENCE: SEQ ID NO:8:

- 56 -

ATG AGA CAA AAG AAA TTG ACG TTG ATT TTA GCC TTT TTA GTT TGT TTT 48
 Met Arg Gln Lys Lys Leu Thr Leu Ile Leu Ala Phe Leu Val Cys Phe
 1 5 10 15

GCA CTA ACC TTA CCT GCA GAA ATA ATT CAG GCA 81
 Ala Leu Thr Leu Pro Ala Glu Ile Ile Gln Ala
 20 25

(2) INFORMATION POUR LA SEQ ID NO:9:

(i) CARACTERISTIQUES DE LA SEQUENCE :

(A) LONGUEUR : 27 acides aminés

(B) TYPE : acide aminé

(D) CONFIGURATION : linéaire

(ii) TYPE DE MOLECULE : peptide

(v) TYPE DE FRAGMENT : fragment interne

(vi) ORIGINE :

(A) ORGANISME : Bacillus

(B) SOUCHE : 720/1

(xi) DESCRIPTION DE LA SEQUENCE: SEQ ID NO:9:

Met Arg Gln Lys Lys Leu Thr Leu Ile Leu Ala Phe Leu Val Cys Phe
 1 5 10 15

Ala Leu Thr Leu Pro Ala Glu Ile Ile Gln Ala
 20 25

(2) INFORMATION POUR LA SEQ ID NO:10:

(i) CARACTERISTIQUES DE LA SEQUENCE :

(A) LONGUEUR : 1513 paires de bases

(B) TYPE : acide nucléique

- 57 -

(C) NOMBRE DE BRINS : simple

(D) CONFIGURATION : linéaire

(ii) TYPE DE MOLECULE : ADN génomique

(xi) DESCRIPTION DE LA SEQUENCE: SEQ ID NO:10:

AAATTGAATT GTGTATATCT AATGATAACG ACAAATCGTC ACTGTTTTTA AACTAATCTC	60
AAACCAATAC TTCTTTATTT AACGCTAACC ACTTGCAATC TTATCACAAG AACATTCTTT	120
ATAGGAACTT TCCCATTGTC AAGACGATAA AAAATCTTTT TCCCCTATTT TATCTTATCG	180
CCTTGATCGG TTTAATTTGT AAACCTTTATT TTAGTTTACG TGATGTTCCC TCATTCATAC	240
CATTAATCAC AGTTAACGCT AGAGTCATCT TTTTTCGGTT CTCAAAAATA CCTGAAGAAC	300
ATTTATGTCA TATTTTCTCA CGCCGCTCCA TAATGGAATA TATATACTCT TTTATACATA	360
TTAAGTAAAT TAGTATATAC TTGCGTTATC AAAATGTGAG ATAATCTAAT TGATCAAACA	420
AGCAGCTATC CAAAAACAC TGATGTTGAC CTCTTAAAGA AGTGTCAC TA TCTATGAAAA	480
GATAATTATC CAGTTTCAAA ATTTGAAATA GTGTGTATGG AATAGTTTGA ATGTCAACTG	540
CTGTGAAAGG AGGGTAGGTA GTACCGTAGA CTTCATTACC AAAAATTAGT TGTAACAAAA	600
TTAAAAGGAG GAATGCCTAA TGAGACAAAA GAAATTGACG TTGATTTTAG CCTTTTTAGT	660
TTGTTTTGCA CTAACCTTAC CTGCAGAAAT AATTCAGGCA CAAATCGTCA CCGACAATTC	720
CATTGGCAAC CACGATGGCT ATGATTATGA ATTTTGGAAA GATAGCGGTG GCTCTGGGAC	780
AATGATTCTC AATCATGGCG GTACGTTTCA TGCCCAATGG AACAATGTTA ACAACATATT	840
ATTCCGTAAA GGTAAAAAAT TCAATGAAAC ACAAACACAC CAACAAGTTG GTAACATGTC	900

- 58 -

CATAAACTAC GGAGCCAACT TCCAACCAAA TGGTAATGCG TATTTATGCG TCTATGGTTG	960
GACTGTTGAC CCTCTTGTCG AATATTATAT TGTCGACAGT TGGGGCAACT GCGTCCACC	1020
AGGAGCAACG CCTAAGGGGA CCATCACTGT TGATGGAGGA ACATATGATA TCTACGAGAC	1080
TCTTAGAGTC AATCAACCCT CCATTAAGGG GATTGCCACA TTTAAACAAT ATTGGAGTGT	1140
TCGAAGATCG AAACGCACGA GTGGCACGAT TTCTGTCAGC AACCACTTTA GAGCGTGGGA	1200
AAACTTAGGG ATGAATATGG GGAAAATGTA TGAAGTCGCG CTTACTGTAG AAGGCTATCA	1260
AAGTAGCGGA AGTGCTAATG TATATAGCAA TACACTAAGA ATTAACGGTA ACCCTCTCTC	1320
AACTATTAGT AATGACGAGA GCATAACTTT GGATAAAAAC AATTAAAAAT CCTTATCTCT	1380
TTCGGTTTCAG TTCTCATTAT TTTCAAATAA CCTCCCGGTT GGATCTTTTC CAACGGGAGG	1440
TTTTATTGGA AAGGTTAAGT ATAGTATACT CCGATTCCAT CCAGAGGAAT GCTTGAAACA	1500
CCTCCGTCAC TAG	1513

(2) INFORMATION POUR LA SEQ ID NO:11:

(i) CARACTERISTIQUES DE LA SEQUENCE :

- (A) LONGUEUR : 1513 paires de bases
- (B) TYPE : acide nucléique
- (C) NOMBRE DE BRINS : simple
- (D) CONFIGURATION : linéaire

(ii) TYPE DE MOLECULE : ADN génomique

(xi) DESCRIPTION DE LA SEQUENCE: SEQ ID NO:11:

AAATTGAATT GTGTATATCT AATGATAACG ACAAATCGTC ACTGTTTTTA AACTAATCTC	60
---	----

- 59 -

AAACCAATAC TTCTTTATTT AACGCTAACC ACTTGCAATC TTATCACAAG AACATTCTTT	120
ATAGGAACTT TCCCATTGTC AAGACGATAA AAAATCTTTT TCCCCTATTT TATCTTATCG	180
CCTTGATCGG TTTAATTTGT AAACCTTTATT TTAGTTTACG TGATGTTCCC TCATTTCATAC	240
CATTAATCAC AGTTAACGCT AGAGTCATCT TTTTTCGGTT CTCAAAAATA CCTGAAGAAC	300
ATTTATGTCA TATTTTCTCA CGCCGCTCCA TAATGGAATA TATATACTCT TTTATACATA	360
TTAAGTAAAT TAGTATATAC TTGCGTTATC AAAATGTGAG ATAATCTAAT TGATCAAACA	420
AGCAGCTATC CAAAAACAC TGATGTTGAC CTCTTAAAGA AGTGTCACCTA TCTATGAAAA	480
GATAATTATC CAGTTTCAAA ATTTGAAATA GTGTGTATGG AATAGTTTGA ATGTCAACTG	540
CTGTGAAAGG AGGGTAGGTA GTACCGTAGA CTTCAATTACC AAAAATTAGT TGTAAAAAAA	600
TTAAAAGGAG GAATGCCTA ATG AGA CAA AAG AAA TTG ACG TTG ATT TTA GCC	652
Met Arg Gln Lys Lys Leu Thr Leu Ile Leu Ala	
-25 -20	
TTT TTA GTT TGT TTT GCA CTA ACC TTA CCT GCA GAA ATA ATT CAG GCA	700
Phe Leu Val Cys Phe Ala Leu Thr Leu Pro Ala Glu Ile Ile Gln Ala	
-15 -10 -5 -1	
CAA ATC GTC ACC GAC AAT TCC ATT GGC AAC CAC GAT GGC TAT GAT TAT	748
Gln Ile Val Thr Asp Asn Ser Ile Gly Asn His Asp Gly Tyr Asp Tyr	
1 5 10 15	
GAA TTT TGG AAA GAT AGC GGT GGC TCT GGG ACA ATG ATT CTC AAT CAT	796
Glu Phe Trp Lys Asp Ser Gly Gly Ser Gly Thr Met Ile Leu Asn His	
20 25 30	

GGC GGT ACG TTC AGT GCC CAA TGG AAC AAT GTT AAC AAC ATA TTA TTC	844
Gly Gly Thr Phe Ser Ala Gln Trp Asn Asn Val Asn Asn Ile Leu Phe	
35 40 45	
CGT AAA GGT AAA AAA TTC AAT GAA ACA CAA ACA CAC CAA CAA GTT GGT	892
Arg Lys Gly Lys Lys Phe Asn Glu Thr Gln Thr His Gln Gln Val Gly	
50 55 60	
AAC ATG TCC ATA AAC TAC GGA GCC AAC TTC CAA CCA AAT GGT AAT GCG	940
Asn Met Ser Ile Asn Tyr Gly Ala Asn Phe Gln Pro Asn Gly Asn Ala	
65 70 75 80	
TAT TTA TGC GTC TAT GGT TGG ACT GTT GAC CCT CTT GTC GAA TAT TAT	988
Tyr Leu Cys Val Tyr Gly Trp Thr Val Asp Pro Leu Val Glu Tyr Tyr	
85 90 95	
ATT GTC GAC AGT TGG GGC AAC TGG CGT CCA CCA GGA GCA ACG CCT AAG	1036
Ile Val Asp Ser Trp Gly Asn Trp Arg Pro Pro Gly Ala Thr Pro Lys	
100 105 110	
GGG ACC ATC ACT GTT GAT GGA GGA ACA TAT GAT ATC TAC GAG ACT CTT	1084
Gly Thr Ile Thr Val Asp Gly Gly Thr Tyr Asp Ile Tyr Glu Thr Leu	
115 120 125	
AGA GTC AAT CAA CCC TCC ATT AAG GGG ATT GCC ACA TTT AAA CAA TAT	1132
Arg Val Asn Gln Pro Ser Ile Lys Gly Ile Ala Thr Phe Lys Gln Tyr	
130 135 140	
TGG AGT GTT CGA AGA TCG AAA CGC ACG AGT GGC ACG ATT TCT GTC AGC	1180
Trp Ser Val Arg Arg Ser Lys Arg Thr Ser Gly Thr Ile Ser Val Ser	
145 150 155 160	
AAC CAC TTT AGA GCG TGG GAA AAC TTA GGG ATG AAT ATG GGG AAA ATG	1228
Asn His Phe Arg Ala Trp Glu Asn Leu Gly Met Asn Met Gly Lys Met	
165 170 175	

- 61 -

TAT GAA GTC GCG CTT ACT GTA GAA GGC TAT CAA AGT AGC GGA AGT GCT	1276
Tyr Glu Val Ala Leu Thr Val Glu Gly Tyr Gln Ser Ser Gly Ser Ala	
180 185 190	
AAT GTA TAT AGC AAT ACA CTA AGA ATT AAC GGT AAC CCT CTC TCA ACT	1324
Asn Val Tyr Ser Asn Thr Leu Arg Ile Asn Gly Asn Pro Leu Ser Thr	
195 200 205	
ATT AGT AAT GAC GAG AGC ATA ACT TTG GAT AAA AAC AAT TAAAAATCCT	1373
Ile Ser Asn Asp Glu Ser Ile Thr Leu Asp Lys Asn Asn	
210 215 220	
TATCTCTTTC GGTTTCAGTTC TCATTATTTT CAAATAACCT CCCGGTTGGA TCTTTTCCAA	1433
CGGGAGGTTT TATTGGAAAG GTTAAGTATA GTATACTCCG ATTCCATCCA GAGGAATGCT	1493
TGAAACACCT CCGTCACTAG	1513

(2) INFORMATION POUR LA SEQ ID NO:12:

(i) CARACTERISTIQUES DE LA SEQUENCE :

- (A) LONGUEUR : 619 paires de bases
- (B) TYPE : acide nucléique
- (C) NOMBRE DE BRINS : simple
- (D) CONFIGURATION : linéaire

(ii) TYPE DE MOLECULE : ADN génomique

(xi) DESCRIPTION DE LA SEQUENCE: SEQ ID NO:12:

AAATTGAATT GTGTATATCT AATGATAACG ACAAATCGTC ACTGTTTTTA AACTAATCTC	60
AAACCAATAC TTCTTTATTT AACGCTAACC ACTTGCAATC TTATCACAAG AACATTCTTT	120
ATAGGAACTT TCCCATTTGC AAGACGATAA AAAATCTTTT TCCCCTATTT TATCTTATCG	180

- 62 -

CCTTGATCGG TTTAATTTGT AAACCTTTATT TTAGTTTACG TGATGTTCCC TCATTCATAC	240
CATTAATCAC AGTTAACGCT AGAGTCATCT TTTTTCGGTT CTCAAAAATA CCTGAAGAAC	300
ATTTATGTCA TATTTTCTCA CGCCGCTCCA TAATGGAATA TATATACTCT TTTATACATA	360
TTAAGTAAAT TAGTATATAC TTGCGTTATC AAAATGTGAG ATAATCTAAT TGATCAAACA	420
AGCAGCTATC CAAAAACAC TGATGTTGAC CTCTTAAAGA AGTGTCAC TA TCTATGAAAA	480
GATAATTATC CAGTTTCAAA ATTTGAAATA GTGTGTATGG AATAGTTTGA ATGTCAACTG	540
CTGTGAAAGG AGGGTAGGTA GTACCGTAGA CTTTATTACC AAAAATTAGT TGTAACAAAA	600
TTAAAAGGAG GAATGCCTA	619

(2) INFORMATION POUR LA SEQ ID NO:13:

(i) CARACTERISTIQUES DE LA SEQUENCE :

- (A) LONGUEUR : 150 paires de bases
- (B) TYPE : acide nucléique
- (C) NOMBRE DE BRINS : simple
- (D) CONFIGURATION : linéaire

(ii) TYPE DE MOLECULE : ADN génomique

(xi) DESCRIPTION DE LA SEQUENCE: SEQ ID NO:13:

TAAAAATCCT TATCTCTTTC GGTTTCAGTTC TCATTATTTT CAAATAACCT CCCGGTTGGA	60
TCTTTTCCAA CGGGAGGTTT TATTGGAAAG GTTAAGTATA GTATACTCCG ATTCCATCCA	120
GAGGAATGCT TGAAACACCT CCGTCACTAG	150

(2) INFORMATION POUR LA SEQ ID NO:14:

- 63 -

(i) CARACTERISTIQUES DE LA SEQUENCE :

- (A) LONGUEUR : 56 paires de bases
- (B) TYPE : acide nucléique
- (C) NOMBRE DE BRINS : simple
- (D) CONFIGURATION : linéaire

(ii) TYPE DE MOLECULE : acide nucléique (oligonucléotide synthétique)

(xi) DESCRIPTION DE LA SEQUENCE: SEQ ID NO:14:

CCCCCCTACG TAGCGGCCGC CCCGGCCGGT AACCTAGGAA GTCAGCGCCC TGCACC

56

(2) INFORMATION POUR LA SEQ ID NO:15:

(i) CARACTERISTIQUES DE LA SEQUENCE :

- (A) LONGUEUR : 56 paires de bases
- (B) TYPE : acide nucléique
- (C) NOMBRE DE BRINS : simple
- (D) CONFIGURATION : linéaire

(ii) TYPE DE MOLECULE : acide nucléique (oligonucléotide synthétique)

(xi) DESCRIPTION DE LA SEQUENCE: SEQ ID NO:15:

CCCCCCTACG TAGGCCGGGG CGGCCGCGGT TACCTAGGGC CTCGTGATAC GCCTAT

56

(2) INFORMATION POUR LA SEQ ID NO:16:

(i) CARACTERISTIQUES DE LA SEQUENCE :

- (A) LONGUEUR : 31 paires de bases
- (B) TYPE : acide nucléique
- (C) NOMBRE DE BRINS : simple
- (D) CONFIGURATION : linéaire

- 64 -

(ii) TYPE DE MOLECULE : acide nucléique (oligonucléotide synthétique)

(xi) DESCRIPTION DE LA SEQUENCE: SEQ ID NO:16:

ACGAGGAAAG ATGCTGTTCT TGTAATGAG T

31

(2) INFORMATION POUR LA SEQ ID NO:17:

(i) CARACTERISTIQUES DE LA SEQUENCE :

- (A) LONGUEUR : 19 paires de bases
- (B) TYPE : acide nucléique
- (C) NOMBRE DE BRINS : simple
- (D) CONFIGURATION : linéaire

(ii) TYPE DE MOLECULE : acide nucléique (oligonucléotide synthétique)

(xi) DESCRIPTION DE LA SEQUENCE: SEQ ID NO:17:

TACCTTGTCT ACAAACCCC

19

(2) INFORMATION POUR LA SEQ ID NO:18:

(i) CARACTERISTIQUES DE LA SEQUENCE :

- (A) LONGUEUR : 18 paires de bases
- (B) TYPE : acide nucléique
- (C) NOMBRE DE BRINS : simple
- (D) CONFIGURATION : linéaire

(ii) TYPE DE MOLECULE : acide nucléique (oligonucléotide synthétique)

(xi) DESCRIPTION DE LA SEQUENCE: SEQ ID NO:18:

CGGTCGCCGC ATACACTA

18

- 65 -

(2) INFORMATION POUR LA SEQ ID NO:19:

(i) CARACTERISTIQUES DE LA SEQUENCE :

- (A) LONGUEUR : 36 paires de bases
- (B) TYPE : acide nucléique
- (C) NOMBRE DE BRINS : simple
- (D) CONFIGURATION : linéaire

(ii) TYPE DE MOLECULE : acide nucléique (oligonucléotide synthétique)

(xi) DESCRIPTION DE LA SEQUENCE: SEQ ID NO:19:

CCCCCCCCCG GTAACCTGCA TTAATGAATC GGCCAA

36

(2) INFORMATION POUR LA SEQ ID NO:20:

(i) CARACTERISTIQUES DE LA SEQUENCE :

- (A) LONGUEUR : 39 paires de bases
- (B) TYPE : acide nucléique
- (C) NOMBRE DE BRINS : simple
- (D) CONFIGURATION : linéaire

(ii) TYPE DE MOLECULE : acide nucléique (oligonucléotide synthétique)

(xi) DESCRIPTION DE LA SEQUENCE: SEQ ID NO:20:

CCCCCCCCCG GTTACCGTAT TTATTAACCTT CTCCTAGTA

39

(2) INFORMATION POUR LA SEQ ID NO:21:

(i) CARACTERISTIQUES DE LA SEQUENCE :

- (A) LONGUEUR : 50 paires de bases
- (B) TYPE : acide nucléique
- (C) NOMBRE DE BRINS : simple

(D) CONFIGURATION : linéaire

(ii) TYPE DE MOLECULE : acide nucléique (oligonucléotide synthétique)

(xi) DESCRIPTION DE LA SEQUENCE: SEQ ID NO:21:

CCCCCCTCTA GATTAATTAA CCAAGCTTGG GATCCGTCGA CCTGCAGATC

50

(2) INFORMATION POUR LA SEQ ID NO:22:

(i) CARACTERISTIQUES DE LA SEQUENCE :

(A) LONGUEUR : 39 paires de bases

(B) TYPE : acide nucléique

(C) NOMBRE DE BRINS : simple

(D) CONFIGURATION : linéaire

(ii) TYPE DE MOLECULE : acide nucléique (oligonucléotide synthétique)

(xi) DESCRIPTION DE LA SEQUENCE: SEQ ID NO:22:

CCCCCCTGAA ATCAGCTGGA CTAAAAGGGA TGCAATTTC

39

(2) INFORMATION POUR LA SEQ ID NO:23:

(i) CARACTERISTIQUES DE LA SEQUENCE :

(A) LONGUEUR : 30 paires de bases

(B) TYPE : acide nucléique

(C) NOMBRE DE BRINS : simple

(D) CONFIGURATION : linéaire

(ii) TYPE DE MOLECULE : acide nucléique (oligonucléotide synthétique)

(xi) DESCRIPTION DE LA SEQUENCE: SEQ ID NO:23:

CCCCCGTCG ACCGCATGCG CCGGCACAGC

30

(2) INFORMATION POUR LA SEQ ID NO:24:

(i) CARACTERISTIQUES DE LA SEQUENCE :

- (A) LONGUEUR : 39 paires de bases
- (B) TYPE : acide nucléique
- (C) NOMBRE DE BRINS : simple
- (D) CONFIGURATION : linéaire

(ii) TYPE DE MOLECULE : acide nucléique (oligonucléotide synthétique)

(xi) DESCRIPTION DE LA SEQUENCE: SEQ ID NO:24:

CCCCCGCAT GCGCAAATCG TCACCGACAA TTCCATTGG

39

(2) INFORMATION POUR LA SEQ ID NO:25:

(i) CARACTERISTIQUES DE LA SEQUENCE :

- (A) LONGUEUR : 19 paires de bases
- (B) TYPE : acide nucléique
- (C) NOMBRE DE BRINS : simple
- (D) CONFIGURATION : linéaire

(ii) TYPE DE MOLECULE : acide nucléique (oligonucléotide synthétique)

(xi) DESCRIPTION DE LA SEQUENCE: SEQ ID NO:25:

TACCTTGTCT ACAAACCCC

19

(2) INFORMATION POUR LA SEQ ID NO:26:

(i) CARACTERISTIQUES DE LA SEQUENCE :

- 68 -

- (A) LONGUEUR : 185 paires de bases
- (B) TYPE : acide nucléique
- (C) NOMBRE DE BRINS : simple
- (D) CONFIGURATION : linéaire

(ii) TYPE DE MOLECULE : ADN génomique

(xi) DESCRIPTION DE LA SEQUENCE: SEQ ID NO:26:

TCATGTAAC	CGCCTTGATC	TATTTCA	TTTGTATCAAAGG	ATTTATACAC	AAACAAGAGA	60
CATCCATGCC	GGGTTAAAGC	AGTATCGTTC	CATCTAACAG	AGAAGGNCTG	CATGAAAGGA	120
GGTGATGGGT	TTTTCATCTT	AGGGATGACA	GAACAATACG	GATGAAAAAA	GGAGAGGGAT	180
GGAAA						

(2) INFORMATION POUR LA SEQ ID NO:27:

(i) CARACTERISTIQUES DE LA SEQUENCE :

- (A) LONGUEUR : 81 paires de bases
- (B) TYPE : acide nucléique
- (C) NOMBRE DE BRINS : simple
- (D) CONFIGURATION : linéaire

(ii) TYPE DE MOLECULE : ADN génomique

(xi) DESCRIPTION DE LA SEQUENCE: SEQ ID NO:27:

ATGAATTTGA	AAAGATTGAG	GCTGTTGTTT	GTGATGTGTA	TTGGATTTGT	GCTGACACTG	60
ACGGCTGTGC	CGGCTCATGC	G				81

(2) INFORMATION POUR LA SEQ ID NO:28:

(i) CARACTERISTIQUES DE LA SEQUENCE :

- (A) LONGUEUR : 81 paires de bases
- (B) TYPE : acide nucléique
- (C) NOMBRE DE BRINS : simple
- (D) CONFIGURATION : linéaire

Val Leu Thr Leu Thr Ala Val Pro Ala His Ala
20 25

RE V E N D I C A T I O N S

- 1 - Xylanase, caractérisée en ce qu'elle provient d'une souche de Bacillus et qu'elle est active dans une gamme de pH compris entre environ 5 et 10 et dans une gamme de température comprise entre environ 50 et 80 °C.
- 2 - Xylanase, caractérisée en ce qu'elle provient de la souche de Bacillus sp. 720/1 (LMG P-14798) ou d'un dérivé ou mutant de cette souche.
- 3 - Xylanase isolée et purifiée, caractérisée en ce qu'elle comprend la séquence d'acides aminés de 1 à 221 acides aminés (SEQ ID N0:3) ou une séquence modifiée dérivée de celle-ci.
- 4 - Xylanase selon la revendication 3, caractérisée en ce qu'elle est synthétisée sous forme d'un précurseur contenant 248 acides aminés (SEQ ID N0:6).
- 5 - Xylanase, caractérisée en ce qu'elle est constituée d'un seul polypeptide ayant un poids moléculaire d'environ 25 kDa et qu'elle a un point isoélectrique, déterminé, compris entre environ 9,5 et environ 9,7.
- 6 - Xylanase, caractérisée en ce qu'elle est produite, de façon hétérologue, par un microorganisme du genre Bacillus.
- 7 - Une culture isolée et purifiée de Bacillus sp. 720/1 (LMG P-14798) et culture dérivée ou mutée de celle-ci.
- 8 - Molécule d'ADN comprenant la séquence de nucléotides (SEQ ID N0:1) qui code pour la xylanase mature de Bacillus sp. 720/1 (LMG P-14798) ou une séquence modifiée dérivée de celle-ci.
- 9 - Molécule d'ADN selon la revendication 8, caractérisée en ce qu'elle comprend la séquence de nucléotides (SEQ ID N0:4) qui code pour le précurseur de la xylanase de Bacillus sp. 720/1 ou une séquence modifiée dérivée de celle-ci.
- 10 - Molécule d'ADN selon la revendication 8 ou 9, caractérisée en ce

qu'elle comprend tout le gène (SEQ ID NO:10) de la xylanase de *Bacillus* sp. 720/1.

5 11 - Molécule d'ADN selon la revendication 8, caractérisée en ce qu'elle comprend le promoteur (SEQ ID NO:26) dérivé du gène qui code pour la xylanase de *Bacillus pumilus* PRL B12, la préséquence (SEQ ID NO:27) qui code pour le peptide signal de la xylanase de *Bacillus pumilus* PRL B12 et la séquence de nucléotides (SEQ ID NO:1) qui code pour la xylanase de *Bacillus* sp. 720/1.

10 12 - Vecteur d'expression ou vecteur d'intégration chromosomique contenant la molécule d'ADN selon la revendication 8, 9, 10 ou 11.

13 - Vecteur d'expression pUBRD-720X11.

14 - Vecteur d'expression pBPXD-PRE-720X.

15 15 - Souche transformée comprenant la molécule d'ADN selon la revendication 8, 9, 10 ou 11.

16 - Souche transformée comprenant le vecteur d'expression ou le vecteur d'intégration chromosomique selon la revendication 12, 13 ou 14.

17 - Souche transformée selon la revendication 15 ou 16, caractérisée en ce qu'il s'agit d'une souche de *Bacillus*.

20 18 - Souche transformée selon la revendication 17, caractérisée en ce qu'il s'agit d'une souche de *Bacillus licheniformis* ou de *Bacillus pumilus*.

19 - Xylanase produite par la souche transformée selon la revendication 15, 16, 17 ou 18.

25 20 - Procédé pour la production d'une xylanase selon l'une quelconque des revendications 1 à 6 ou selon la revendication 19, caractérisé en ce qu'il comprend la culture d'une souche capable de produire la xylanase, dans un milieu nutritif approprié contenant des sources de carbone et d'azote et des sels minéraux sous condition d'aérobiose et la récolte de la xylanase ainsi obtenue.

21 - Procédé pour la préparation d'une xylanase selon l'une quelconque

des revendications 1 à 6, caractérisé en ce qu'il comprend l'isolement d'un fragment d'ADN codant pour la xylanase, l'insertion de ce fragment d'ADN dans un vecteur approprié, l'introduction de ce vecteur dans un hôte approprié ou l'introduction de ce fragment d'ADN dans le chromosome d'un hôte approprié, la culture de cet hôte, l'expression de la xylanase et la récolte de la xylanase.

22 - Utilisation d'une xylanase selon l'une quelconque des revendications 1 à 6 ou selon la revendication 19 pour le traitement de la pâte à papier.

23 - Utilisation d'une xylanase selon l'une quelconque des revendications 1 à 6 ou selon la revendication 19 en alimentation animale.

24 - Une composition enzymatique contenant une xylanase selon l'une quelconque des revendications 1 à 6 ou selon la revendication 19, et au moins un additif.

25 - Promoteur (SEQ ID NO:26) dérivé du gène qui code pour la xylanase de *Bacillus pumilus* PRL B12.

26 - Préséquence (SEQ ID NO:27) qui code pour le peptide signal de la xylanase de *Bacillus pumilus* PRL B12.

27 - Système d'expression utilisable pour la production d'un polypeptide, caractérisé en ce qu'il comprend :

- la séquence du promoteur (SEQ ID NO:26) dérivé du gène qui code pour la xylanase de *Bacillus pumilus* PRL B12,
- une séquence codant pour un signal peptide, et
- la séquence du polypeptide d'intérêt.

28 - Système d'expression utilisable pour la production d'un polypeptide, caractérisé en ce qu'il comprend :

- la séquence d'un promoteur,
- la préséquence (SEQ ID NO:27) qui code pour le peptide signal de la xylanase de *Bacillus pumilus* PRL B12, et
- la séquence du polypeptide d'intérêt.

29 - Système d'expression utilisable pour la production d'un

polypeptide, caractérisé en ce qu'il comprend :

- la séquence du promoteur (SEQ ID NO:26) dérivé du gène qui code pour la xylanase de *Bacillus pumilus* PRL B12,
- la préséquence (SEQ ID NO:27) qui code pour le peptide signal de la xylanase de *Bacillus pumilus* PRL B12,
- la séquence du polypeptide d'intérêt, et
- la séquence d'un terminateur.

30 - Système d'expression selon la revendication 27, 28 ou 29, caractérisé en ce que la séquence du polypeptide d'intérêt correspond à la séquence de nucléotides (SEQ ID NO:1) qui code pour la xylanase de *Bacillus* sp. 720/1.

FIG. 1a

CAA	ATC	GTC	ACC	GAC	AAT	TCC	ATT	GGC	AAC	CAC	GAT	GGC	TAT	GAT	TAT
Gln	Ile	Val	Thr	Asp	Asn	Ser	Ile	Gly	Asn	His	Asp	Gly	Tyr	Asp	Tyr
1				5					10					15	
GAA	TTT	TGG	AAA	GAT	AGC	GGT	GGC	TCT	GGG	ACA	ATG	ATT	CTC	AAT	CAT
Glu	Phe	Trp	Lys	Asp	Ser	Gly	Gly	Ser	Gly	Thr	Met	Ile	Leu	Asn	His
			20					25					30		
GGC	GGT	ACG	TTC	AGT	GCC	CAA	TGG	AAC	AAT	GTT	AAC	AAC	ATA	TTA	TTC
Gly	Gly	Thr	Phe	Ser	Ala	Gln	Trp	Asn	Asn	Val	Asn	Asn	Ile	Leu	Phe
		35					40					45			
CGT	AAA	GGT	AAA	AAA	TTC	AAT	GAA	ACA	CAA	ACA	CAC	CAA	CAA	GTT	GGT
Arg	Lys	Gly	Lys	Lys	Phe	Asn	Glu	Thr	Gln	Thr	His	Gln	Gln	Val	Gly
	50					55					60				
AAC	ATG	TCC	ATA	AAC	TAC	GGA	GCC	AAC	TTC	CAA	CCA	AAT	GGT	AAT	GCG
Asn	Met	Ser	Ile	Asn	Tyr	Gly	Ala	Asn	Phe	Gln	Pro	Asn	Gly	Asn	Ala
65					70					75					80
TAT	TTA	TGC	GTC	TAT	GGT	TGG	ACT	GTT	GAC	CCT	CTT	GTC	GAA	TAT	TAT
Tyr	Leu	Cys	Val	Tyr	Gly	Trp	Thr	Val	Asp	Pro	Leu	Val	Glu	Tyr	Tyr
				85					90					95	
ATT	GTC	GAC	AGT	TGG	GGC	AAC	TGG	CGT	CCA	CCA	GGA	GCA	ACG	CCT	AAG
Ile	Val	Asp	Ser	Trp	Gly	Asn	Trp	Arg	Pro	Pro	Gly	Ala	Thr	Pro	Lys
			100					105					110		
GGG	ACC	ATC	ACT	GTT	GAT	GGA	GGA	ACA	TAT	GAT	ATC	TAC	GAG	ACT	CTT
Gly	Thr	Ile	Thr	Val	Asp	Gly	Gly	Thr	Tyr	Asp	Ile	Tyr	Glu	Thr	Leu
		115					120					125			
AGA	GTC	AAT	CAA	CCC	TCC	ATT	AAG	GGG	ATT	GCC	ACA	TTT	AAA	CAA	TAT
Arg	Val	Asn	Gln	Pro	Ser	Ile	Lys	Gly	Ile	Ala	Thr	Phe	Lys	Gln	Tyr
	130					135					140				
TGG	AGT	GTT	CGA	AGA	TCG	AAA	CGC	ACG	AGT	GGC	ACG	ATT	TCT	GTC	AGC
Trp	Ser	Val	Arg	Arg	Ser	Lys	Arg	Thr	Ser	Gly	Thr	Ile	Ser	Val	Ser
145					150					155					160

- 75 -

FIG. 1b

AAC	CAC	TTT	AGA	GCG	TGG	GAA	AAC	TTA	GGG	ATG	AAT	ATG	GGG	AAA	ATG
Asn	His	Phe	Arg	Ala	Trp	Glu	Asn	Leu	Gly	Met	Asn	Met	Gly	Lys	Met
				165					170					175	

TAT	GAA	GTC	GCG	CTT	ACT	GTA	GAA	GGC	TAT	CAA	AGT	AGC	GGA	AGT	GCT
Tyr	Glu	Val	Ala	Leu	Thr	Val	Glu	Gly	Tyr	Gln	Ser	Ser	Gly	Ser	Ala
			180					185					190		

AAT	GTA	TAT	AGC	AAT	ACA	CTA	AGA	ATT	AAC	GGT	AAC	CCT	CTC	TCA	ACT
Asn	Val	Tyr	Ser	Asn	Thr	Leu	Arg	Ile	Asn	Gly	Asn	Pro	Leu	Ser	Thr
			195				200					205			

ATT	AGT	AAT	GAC	GAG	AGC	ATA	ACT	TTG	GAT	AAA	AAC	AAT
Ile	Ser	Asn	Asp	Glu	Ser	Ile	Thr	Leu	Asp	Lys	Asn	Asn
	210						215				220	

- 76 -

FIG. 2a

AAATTGAATT GTGTATATCT AATGATAACG ACAAATCGTC ACTGTTTTTA AACTAATCTC
 AAACCAATAC TTCTTTATTT AACGCTAACC ACTTGCAATC TTATCACAAG AACATTCTTT
 ATAGGAACTT TCCCATTTCG AAGACGATAA AAAATCTTTT TCCCCTATTT TATCTTATCG
 CCTTGATCGG TTTAATTTGT AAACCTTTATT TTAGTTTACG TGATGTTCCC TCATTTCATAC
 CATTAATCAC AGTTAACGCT AGAGTCATCT TTTTTCGGTT CTCAAAAATA CCTGAAGAAC
 ATTTATGTCA TATTTTCTCA CGCCGCTCCA TAATGGAATA TATATACTCT TTTATACATA
 TTAAGTAAAT TAGTATATAC TTGCGTTATC AAAATGTGAG ATAATCTAAT TGATCAAACA
 AGCAGCTATC CAAAAAACAC TGATGTTGAC CTCTTAAAGA AGTGTCACCTA TCTATGAAAA
 GATAATTATC CAGTTTCAAA ATTTGAAATA GTGTGTATGG AATAGTTTGA ATGTCAACTG
 CTGTGAAAGG AGGGTAGGTA GTACCGTAGA CTTTATTACC AAAAATTAGT TGTAACAAAA

TTAAAAGGAG GAATGCCTA ATG AGA CAA AAG AAA TTG ACG TTG ATT TTA GCC
 Met Arg Gln Lys Lys Leu Thr Leu Ile Leu Ala
 -25 -20

TTT TTA GTT TGT TTT GCA CTA ACC TTA CCT GCA GAA ATA ATT CAG GCA
 Phe Leu Val Cys Phe Ala Leu Thr Leu Pro Ala Glu Ile Ile Gln Ala
 -15 -10 -5

CAA ATC GTC ACC GAC AAT TCC ATT GGC AAC CAC GAT GGC TAT GAT TAT
 Gln Ile Val Thr Asp Asn Ser Ile Gly Asn His Asp Gly Tyr Asp Tyr
 1 5 10 15

GAA TTT TGG AAA GAT AGC GGT GGC TCT GGG ACA ATG ATT CTC AAT CAT
 Glu Phe Trp Lys Asp Ser Gly Gly Ser Gly Thr Met Ile Leu Asn His
 20 25 30

GGC GGT ACG TTC AGT GCC CAA TGG AAC AAT GTT AAC AAC ATA TTA TTC
 Gly Gly Thr Phe Ser Ala Gln Trp Asn Asn Val Asn Asn Ile Leu Phe
 35 40 45

CGT AAA GGT AAA AAA TTC AAT GAA ACA CAA ACA CAC CAA CAA GTT GGT
 Arg Lys Gly Lys Lys Phe Asn Glu Thr Gln Thr His Gln Gln Val Gly
 50 55 60

AAC ATG TCC ATA AAC TAC GGA GCC AAC TTC CAA CCA AAT GGT AAT GCG
 Asn Met Ser Ile Asn Tyr Gly Ala Asn Phe Gln Pro Asn Gly Asn Ala
 65 70 75 80

- 77 -

FIG. 2b

TAT TTA TGC GTC TAT GGT TGG ACT GTT GAC CCT CTT GTC GAA TAT TAT
 Tyr Leu Cys Val Tyr Gly Trp Thr Val Asp Pro Leu Val Glu Tyr Tyr
 85 90 95

ATT GTC GAC AGT TGG GGC AAC TGG CGT CCA CCA GGA GCA ACG CCT AAG
 Ile Val Asp Ser Trp Gly Asn Trp Arg Pro Pro Gly Ala Thr Pro Lys
 100 105 110

GGG ACC ATC ACT GTT GAT GGA GGA ACA TAT GAT ATC TAC GAG ACT CTT
 Gly Thr Ile Thr Val Asp Gly Gly Thr Tyr Asp Ile Tyr Glu Thr Leu
 115 120 125

AGA GTC AAT CAA CCC TCC ATT AAG GGG ATT GCC ACA TTT AAA CAA TAT
 Arg Val Asn Gln Pro Ser Ile Lys Gly Ile Ala Thr Phe Lys Gln Tyr
 130 135 140

TGG AGT GTT CGA AGA TCG AAA CGC ACG AGT GGC ACG ATT TCT GTC AGC
 Trp Ser Val Arg Arg Ser Lys Arg Thr Ser Gly Thr Ile Ser Val Ser
 145 150 155 160

AAC CAC TTT AGA GCG TGG GAA AAC TTA GGG ATG AAT ATG GGG AAA ATG
 Asn His Phe Arg Ala Trp Glu Asn Leu Gly Met Asn Met Gly Lys Met
 165 170 175

TAT GAA GTC GCG CTT ACT GTA GAA GGC TAT CAA AGT AGC GGA AGT GCT
 Tyr Glu Val Ala Leu Thr Val Glu Gly Tyr Gln Ser Ser Gly Ser Ala
 180 185 190

AAT GTA TAT AGC AAT ACA CTA AGA ATT AAC GGT AAC CCT CTC TCA ACT
 Asn Val Tyr Ser Asn Thr Leu Arg Ile Asn Gly Asn Pro Leu Ser Thr
 195 200 205

ATT AGT AAT GAC GAG AGC ATA ACT TTG GAT AAA AAC AAT TAAAAATCCT
 Ile Ser Asn Asp Glu Ser Ile Thr Leu Asp Lys Asn Asn
 210 215 220

TATCTCTTTC GGTTCA GTTC TCATTATTTT CAAATAACCT CCCGGTTGGA TCTTTTCCAA
 CGGGAGGTTT TATTGGAAAG GTTAAGTATA GTATACTCCG ATTCCATCCA GAGGAATGCT
 TGAAACACCT CCGTCACTAG




Fig. 4





Fig. 5






FIG. 6




FIG. 7




FIG. 8




FIG. 9




FIG. 10

- 86 -

FIG. 11

TCATGTA ACT CGCCTTGATC TATTTCA TTT GTATCAAAGG ATTTATACAC AAACAAGAGA
CATCCATGCC GGGTTAAAGC AGTATCGTTC CATCTAACAG AGAAGGNCTG CATGAAAGGA
GGTGATGGGT TTTTCATCTT AGGGATGACA GAACAATACG GATGAAAAAA GCAGAGGGAT
GGAAA

- 87 -

FIG. 12

ATG	AAT	TTG	AAA	AGA	TTG	AGG	CTG	TTG	TTT	GTG	ATG	TGT	ATT	GGA	TTT
Met	Asn	Leu	Lys	Arg	Leu	Arg	Leu	Leu	Phe	Val	Met	Cys	Ile	Gly	Phe
1				5					10					15	
GTG	CTG	ACA	CTG	ACG	GCT	GTG	CCG	GCT	CAT	GCG					
Val	Leu	Thr	Leu	Thr	Ala	Val	Pro	Ala	His	Ala					
			20					25							



Office européen
des brevets

RAPPORT DE RECHERCHE
établi en vertu de l'article 21 § 1 et 2
de la loi belge sur les brevets d'invention
du 28 mars 1984

Numero de la demande
nationale

BO 5603
BE 9500448

DOCUMENTS CONSIDERES COMME PERTINENTS			
Catégorie	Citation du document avec indication, en cas de besoin, des parties pertinentes	Revendication concernée	CLASSEMENT DE LA DEMANDE (Int.Cl.6)
X	BIOSCIENCE, BIOTECHNOLOGY, AND BIOCHEMISTRY, vol. 58, Janvier 1994 pages 78-81, NAKAMURA S. ET AL. 'Thermophilic alkaline xylanase from newly isolated alkaliphilic and thermophilic Bacillus sp. strain TAR-1' * le document en entier * ---	1,2, 20-24	C12N15/56 C12N9/24 A23L3/34 D21C3/00 C12N1/21
X	AGRICULTURAL AND BIOLOGICAL CHEMISTRY, vol. 49, 1985 TOKYO JP, pages 2033-2039, OKAZAKI W. ET AL. 'Purification and characterization of xylanases from alkalophilic thermophilic Bacillus spp.' * le document en entier * ---	1,2, 20-24	
X	APPLIED AND ENVIRONMENTAL MICROBIOLOGY, vol. 60, no. 3, Mars 1994 pages 763-770, IRWIN D. ET AL. 'Characterization and sequence of Thermomonospora fusca xylanase' * le document en entier * ---	5,20-24	DOMAINES TECHNIQUES RECHERCHES (Int.Cl.6) C12N A23L D21C
E	WO-A-95 18219 (GIST BROCADES NV ;SOLINGEN PIETER VAN (NL); WILLIAMS DIANE P (US);) 6 Juillet 1995 * page 42-45 * ---	3,4,8-10	
P,X	EP-A-0 634 490 (SOLVAY) 18 Janvier 1995 * page 56 - page 59; exemples 6-9 * --- -/--	5-7, 25-29	
Date d'achèvement de la recherche		Examineur	
30 Novembre 1995		Espan, J	
CATEGORIE DES DOCUMENTS CITES			
X : particulièrement pertinent à lui seul Y : particulièrement pertinent en combinaison avec un autre document de la même catégorie A : arrière-plan technologique O : divulgation non-écrite P : document intercalaire		T : théorie ou principe à la base de l'invention E : document de brevet antérieur, mais publié à la date de dépôt ou après cette date D : cité dans la demande L : cité pour d'autres raisons & : membre de la même famille, document correspondant	

1

EPO FORM 1503 01.82 (PM/CM)

BO 5603
BE 9500448

DOCUMENTS CONSIDERES COMME PERTINENTS

Catégorie	Citation du document avec indication, en cas de besoin, des parties pertinentes	Revendication concernée	CLASSEMENT DE LA DEMANDE (Int.Cl.6)
X	WO-A-94 01532 (NOVONORDISK AS ;OUTTRUP HELLE (DK); DAMBMANN CLAUS (DK); OLSEN ARN) 20 Janvier 1994 * revendications 8,9 * ---	5-7, 20-24	DOMAINES TECHNIQUES RECHERCHES (Int.Cl.6)
X	WO-A-94 04664 (NOVO NORDISK) 3 Mars 1994 * page 11, ligne 17 - ligne 24 * ---	5-7, 20-22	
X	JOURNAL OF MICROBIOLOGY AND BIOTECHNOLOGY, vol. 3, no. 3, 1993 pages 139-145, YU JU-HYUN ET AL. 'Nucleotide sequence and analysis of a xylanase gene (xynS) from alkali-tolerant Bacillus sp. YA-14 and comparison with other xylanases' * figure 3 * ---	5,8-10	
X	FEBS LETTERS, vol. 171, no. 2, 1984 AMSTERDAM NL, pages 197-201, FUKUSAKI E. ET AL. 'The complete nucleotide sequence of the xylanase gene (xynA) of Bacillus pumilus' * figure 2 * -----	26,28	
Date d'achèvement de la recherche		Examineur	
30 Novembre 1995		Espin, J	
CATEGORIE DES DOCUMENTS CITES X : particulièrement pertinent à lui seul Y : particulièrement pertinent en combinaison avec un autre document de la même catégorie A : arrière-plan technologique O : divulgation non-écrite P : document intercalaire T : théorie ou principe à la base de l'invention E : document de brevet antérieur, mais publié à la date de dépôt ou après cette date D : cité dans la demande L : cité pour d'autres raisons & : membre de la même famille, document correspondant			

**ANNEXE AU RAPPORT DE RECHERCHE
RELATIF A LA DEMANDE DE BREVET BELGE NO.**

BO 5603
BE 9500448

La présente annexe indique les membres de la famille de brevets relatifs aux documents brevets cités dans le rapport de recherche visé ci-dessus.

Lesdits membres sont contenus au fichier informatique de l'Office européen des brevets à la date du

Les renseignements fournis sont donnés à titre indicatif et n'engagent pas la responsabilité de l'Office européen des brevets.

30-11-1995

Document brevet cité au rapport de recherche	Date de publication	Membre(s) de la famille de brevet(s)		Date de publication
WO-A-9518219	06-07-95	AU-B-	1415095	17-07-95
		FI-A-	953920	21-08-95
		NO-A-	953312	19-10-95

EP-A-0634490	18-01-95	GB-A-	2279955	18-01-95
		AU-B-	6743294	27-01-95
		BR-A-	9402834	13-06-95
		CA-A-	2128050	16-01-95
		FI-A-	943389	16-01-95
		JP-A-	7067637	14-03-95
		NO-A-	942652	16-01-95
		NZ-A-	260989	28-08-95

WO-A-9401532	20-01-94	AU-B-	4417193	31-01-94
		EP-A-	0651785	10-05-95
		FI-A-	946186	30-12-94
		JP-T-	7509125	12-10-95

WO-A-9404664	03-03-94	AU-B-	4944693	15-03-94
		CA-A-	2142818	03-03-94
		EP-A-	0663949	26-07-95
		FI-A-	950852	24-02-95
