

(12) 特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局

(43) 国際公開日
2015年6月25日(25.06.2015)



(10) 国際公開番号

WO 2015/093485 A1

- (51) 国際特許分類:
A61K 49/00 (2006.01) C12Q 1/68 (2006.01)
C12N 15/00 (2006.01) G01N 24/00 (2006.01)
- (21) 国際出願番号: PCT/JP2014/083278
- (22) 国際出願日: 2014年12月16日(16.12.2014)
- (25) 国際出願の言語: 日本語
- (26) 国際公開の言語: 日本語
- (30) 優先権データ:
特願 2013-259334 2013年12月16日(16.12.2013) JP
- (71) 出願人: 国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学(JAPAN ADVANCED INSTITUTE OF SCIENCE AND TECHNOLOGY) [JP/JP]; 〒9231292 石川県能美市旭台一丁目1番地 Ishikawa (JP).
- (72) 発明者: 藤本 健造(FUJIMOTO, Kenzo); 〒9231292 石川県能美市旭台一丁目1番地 国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学 マテリアルサイエンス研究科内 Ishikawa (JP). 中村 重孝(NAKAMURA, Shigetaka); 〒9231292 石川県能美市旭台一丁目1番地 国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学 マテリアルサイエンス研究科内 Ishikawa (JP).
- (74) 代理人: アクシス国際特許業務法人, 外 (AXIS PATENT INTERNATIONAL et al.); 〒1050004 東京都港区新橋二丁目6番2号 新橋アイマークビル Tokyo (JP).
- (81) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BN, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IR, IS, JP, KE, KG, KN, KP, KR, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LU, LY, MA, MD, ME, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH, PL, PT, QA, RO, RS, RU, RW, SA, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, ZA, ZM, ZW.
- (84) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SD, SL, ST, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーロパ (AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, KM, ML, MR, NE, SN, TD, TG).
- 添付公開書類:
— 国際調査報告 (条約第21条(3))
— 明細書の別個の部分として表した配列リスト (規則 5.2(a))

(54) Title: METHOD FOR CAUSING CHANGE IN ¹⁹F CHEMICAL SHIFT BY PHOTOCROSSLINKING FORMATION

(54) 発明の名称: 光架橋形成によって¹⁹Fケミカルシフトの変化を生じさせる方法

(57) Abstract: Provided is a highly sensitive detection means, suited to measurement in vivo, for detecting photocrosslinking formed by photoresponsive bases by using a method for causing a change in the ¹⁹F chemical shift detectable by nuclear magnetic resonance spectroscopy in a comparison of before and after photocrosslinking formation, the change being caused by forming photocrosslinking between a photoresponsive base having a photocrosslinkable vinyl structure and a photocrosslinkable fluorine-containing modified pyrimidine base by using a fluorine-containing modified pyrimidine base in which position 5 of the pyrimidine rings of thymine (T) or uracil (U) bases, which are photocrosslinkable to a photoresponsive base having a photocrosslinkable vinyl structure, has been substituted by group R (where group R is a fluorine atom or a C1-C4 fluoroalkyl group in which one or more hydrogen atoms have been substituted by fluorine atoms).

(57) 要約: 光架橋性のビニル構造を有する光応答性塩基に対して光架橋可能なチミン (T) 又はウラシル (U) の塩基の、ピリミジン環の5位を、R基 (ただし、R基は、フッ素原子、又は1個以上の水素原子がフッ素原子で置換されたC1~C4のフルオロアルキル基である) に置換したフッ素含有修飾ピリミジン塩基を使用することによって、光架橋性のビニル構造を有する光応答性塩基と、光架橋可能なフッ素含有修飾ピリミジン塩基との間に光架橋を形成させて、光架橋形成の前後の比較において核磁気共鳴法によって検出可能な¹⁹Fケミカルシフトの変化を生じさせる方法によって、光応答性塩基によって形成される光架橋を検出するための、生体内での計測に適した、高感度な検出手段を提供する。

WO 2015/093485 A1

明 細 書

発明の名称：

光架橋形成によって ^{19}F ケミカルシフトの変化を生じさせる方法

技術分野

[0001] 本発明は、光架橋性のビニル構造を有する光応答性塩基と、光架橋可能なフッ素含有修飾ピリミジン塩基との間に光架橋を形成させて、光架橋形成の前後の比較において核磁気共鳴法によって検出可能な ^{19}F ケミカルシフトの変化を生じさせる方法に関する。

背景技術

[0002] 核酸の塩基配列の検出は、生命工学のあらゆる分野で使用される基本的な技術である。核酸の相補性による塩基配列の検出に特に有用であり、生命工学のあらゆる分野で使用可能な基本的な技術に、核酸の架橋技術がある。

[0003] 核酸の光架橋技術として、本発明者の研究グループによって、光応答性塩基が開発され、特許出願が行われている（特許文献1）。この技術によれば、例えば、相補性による二重鎖の形成とそれに続く光架橋によって、所望の塩基配列の核酸を高感度に検出することができる。この検出には、例えば、蛍光標識、発色酵素標識などの手段が、適宜使用される。しかし、これらの手段は、生体内での計測には、必ずしも適したものではない。

[0004] 生体内の様々な情報を得る手段の一つとして、NMR、MRIなど、核磁気共鳴法を用いたイメージング技術が挙げられる。核磁気共鳴法のターゲットとなる原子（分子）は主に ^1H であり、水が生体内に多く存在し高い強度が得られることに由来する。核磁気共鳴法のターゲットとなるその他の原子としては、 ^{19}F （フッ素19）が研究されている。フッ素19は天然存在比がほぼ100%であること、生体内にほとんど存在しないことなどが、利点として挙げられる。

先行技術文献

特許文献

[0005] 特許文献1：国際公開第2009/066447号

発明の概要

発明が解決しようとする課題

[0006] したがって、本発明の目的は、光応答性塩基によって形成される光架橋を検出するための、生体内での計測に適した、高感度な検出手段を、提供することにある。

課題を解決するための手段

[0007] 本発明者は、鋭意研究の結果、光応答性塩基に対して光架橋可能なチミン（T）又はウラシル（U）の塩基の、ピリミジン環の5位を、 ^{19}F （フッ素19原子）含有置換基に置換したフッ素含有修飾ピリミジン塩基を使用して、光応答性塩基との光架橋を照射によって光架橋を形成させると、顕著な ^{19}F ケミカルシフトの変化が生じることを見いだして、本発明に到達した。

[0008] ^{19}F をターゲットとした核磁気共鳴法は、従来から研究されていたが、イメージング可能なほどに十分なケミカルシフトの変化を得ることは困難であったところ、本発明者は、上記フッ素含有修飾ピリミジン塩基を使用すると、これが通常のT又はUと同様に光架橋可能であること、そして、光架橋の結果として、大きな ^{19}F ケミカルシフトの変化を生じさせることを見いだして、本発明に到達したものである。

[0009] したがって、本発明は、次の（1）～にある。

（1）

光架橋性のビニル構造を有する光応答性塩基に対して光架橋可能なチミン（T）又はウラシル（U）の塩基の、ピリミジン環の5位を、R基（ただし、R基は、フッ素原子、

1個以上の水素原子がフッ素原子で置換されたC1～C4のフルオロアルキル基、

又は、

1個以上の水素原子が、フッ素原子、又は1個以上の水素原子がフッ素原子で置換されたC1～C4のフルオロアルキル基、で置換された、単環式、

二環式又は三環式のフルオロアリール基である)

に置換したフッ素含有修飾ピリミジン塩基を使用することによって、


光架橋性のビニル構造を有する光応答性塩基と、光架橋可能なフッ素含有修飾ピリミジン塩基との間に光架橋を形成させて、光架橋形成の前後の比較において核磁気共鳴法によって検出可能な¹⁹F ケミカルシフトの変化を生じさせる方法。

(2)

フッ素含有修飾ピリミジン塩基が、

次の式 (1) :

[化1]



(ただし、式 (1) において、

R は、フッ素原子、

1 個以上の水素原子がフッ素原子で置換された C 1 ~ C 4 のフルオロアルキル基、又は、

1 個以上の水素原子が、フッ素原子、又は 1 個以上の水素原子がフッ素原子で置換された C 1 ~ C 4 のフルオロアルキル基、で置換された、単環式、二環式又は三環式のフルオロアリール基であり、

R 1 は、式 (1) で R 1 に結合している O と一体となって形成されたリン

酸基を表し、

R 2 は、水酸基を表し、

R 3 は、水素又は水酸基である)

で表される修飾ピリミジンヌクレオチドの塩基部分であり、

光架橋が、

上記修飾ピリミジンヌクレオチドがリン酸ジエステル結合して導入されてなる被光架橋性核酸中の、上記フッ素含有修飾ピリミジン塩基と、


光架橋性のビニル構造を有する光応答性塩基との間に形成される光架橋である、(1)に記載の方法。

(3)

光架橋性のビニル構造を有する光応答性塩基が、

次の式(11)：

[化2]



(ただし、式(11)中、R11は、シアノ基、アミド基、カルボキシル基、C2～C7のアルコキシカルボニル基、又は水素であり、

R12及びR13は、それぞれ独立に、シアノ基、アミド基、カルボキシル基、C2～C7のアルコキシカルボニル基、又は水素であり、

R 1 は、式 (1) で R 1 に結合している O と一体となって形成されたリン酸基を表し、

R 2 は、水酸基を表し、

R 3 は、水素又は水酸基である)

で表される光応答性修飾ヌクレオチドの塩基部分であり、


光架橋が、

上記光応答性修飾ヌクレオチドがリン酸ジエステル結合して導入されてなる光応答性核酸中の、上記光応答性塩基と、

被光架橋性核酸中のフッ素含有修飾ピリミジン塩基との間に形成される光架橋である、(2) に記載の方法。

(4)

C 1 ~ C 4 のフルオロアルキル基が、



(ただし、n は 1 以上 4 以下の整数、m は 1 以上の整数、 $2n + 1 - m$ は 0 以上の整数である)

である、(1) ~ (3) のいずれかに記載の方法。

(5)

C 1 ~ C 4 のフルオロアルキル基が、

$-CF_3$ 、 $-CH_2-CF_3$ 、又は $-C(CF_3)_3$ である、(1) ~ (3) のいずれかに記載の方法。

(6)

単環式、二環式又は三環式のフルオロアリール基が、

1 個以上の水素原子が、フッ素原子、 $-CF_3$ 、 $-CH_2-CF_3$ 、又は $-C(CF_3)_3$ で置換された、フルオロフェニル基又はフルオロナフチル基である、

(1) ~ (3) のいずれかに記載の方法。

(7)

単環式、二環式又は三環式のフルオロアリール基が、

3, 5-ビス(トリフルオロメチル)フェニル基である、(1) ~ (3)

のいずれかに記載の方法。

[0010] さらに、本発明は、次の（１１）～にある。

（１１）

（１）～（７）のいずれかに記載の方法によって、核磁気共鳴法によって検出可能な¹⁹F ケミカルシフトの変化を生じた、光架橋を製造する方法。

（１２）

（１）～（７）のいずれかに記載の方法によって、核磁気共鳴法によって検出可能な¹⁹F ケミカルシフトの変化を生じた、光架橋された核酸を製造する方法。

（１３）

（１）～（７）のいずれかに記載の方法によって形成された光架橋を、核磁気共鳴法における¹⁹F ケミカルシフトの変化によって、検出する方法。

（１４）

光架橋が、

光応答性核酸と被光架橋性核酸との間の二重鎖形成によって、光架橋可能に配置されて形成された光架橋である、（３）～（７）のいずれかに記載の方法。

（１５）

（１４）に記載の方法によって形成された光架橋を、核磁気共鳴法における¹⁹F ケミカルシフトの変化によって検出することによって、


光応答性核酸と被光架橋性核酸との間の二重鎖形成を検出する方法。

[0011] さらに、本発明は、次の（２１）～にある。

（２１）

次の式（１）：

[化3]



(ただし、式 (I) において、

R は、フッ素原子、

1 個以上の水素原子がフッ素原子で置換された C 1 ～ C 4 のフルオロアルキル基、又は、

1 個以上の水素原子が、フッ素原子、又は 1 個以上の水素原子がフッ素原子で置換された C 1 ～ C 4 のフルオロアルキル基、で置換された、単環式、二環式又は三環式のフルオロアリアル基であり、

R 1 は、式 (I) で R 1 に結合している O と一体となって形成されたリン酸基を表し、

R 2 は、水酸基を表し、

R 3 は、水素又は水酸基である)


で表される修飾ピリミジンヌクレオチドがリン酸ジエステル結合して導入されてなる被光架橋性核酸からなる、光架橋形成検出剤。

(22)

光架橋形成の前後の比較において核磁気共鳴法によって検出可能な¹⁹F ケミカルシフトの変化を生じさせる、(21)に記載の光架橋形成検出剤。

(23)

C 1 ～ C 4 のフルオロアルキル基が、




(ただし、n は 1 以上 4 以下の整数、m は 1 以上の整数、 $2n + 1 - m$ は 0 以上の整数である)

である、(2 1) ～ (2 2) のいずれかに記載の光架橋形成検出剤。

(2 4)

C 1 ～ C 4 のフルオロアルキル基が、



のいずれかに記載の光架橋形成検出剤。

(2 5)

単環式、二環式又は三環式のフルオロアリール基が、

1 個以上の水素原子が、フッ素原子、 $-CF_3$ 、 $-CH_2-CF_3$ 、又は $-C(CF_3)_3$ で置換された、フルオロフェニル基又はフルオロナフチル基である、

(2 1) ～ (2 4) のいずれかに記載の光架橋形成検出剤。

(2 6)

単環式、二環式又は三環式のフルオロアリール基が、

3, 5-ビス(トリフルオロメチル)フェニル基である、(2 1) ～ (2 4) のいずれかに記載の光架橋形成検出剤。

[0012] さらに、本発明は、次の(3 1) ～にある。

(3 1)

式(1)で表される修飾ピリミジンヌクレオチドがリン酸ジエステル結合して導入されてなる被光架橋性核酸と、

式(11)で表される光応答性修飾ヌクレオチドがリン酸ジエステル結合して導入されてなる光応答性核酸とを、

ハイブリダイズさせる工程、

ハイブリダイズさせた被光架橋性核酸と光応答性核酸に、光照射する工程、

を含む、光架橋された核酸を製造する方法。

(32)

(31)に記載の方法によって製造された、

式(1)で表される修飾ピリジンヌクレオチドがリン酸ジエステル結合して導入されてなる被光架橋性核酸と、

式(11)で表される光応答性修飾ヌクレオチドがリン酸ジエステル結合して導入されてなる光応答性核酸とが、

光架橋されてなる、光架橋された核酸。

発明の効果

[0013] 本発明によれば、光応答性塩基による光架橋の形成を、核磁気共鳴法による¹⁹Fケミカルシフトによって、検出することができる。この核磁気共鳴法による検出は、生体内の三次元イメージングに特に適しており、時間的にある時点のスナップショットを撮影することにも特に適しているため、光応答性核酸を使用した所望の相補的核酸配列の検出を、生体内の三次元リアルタイムスナップショット映像によって行うという、医療的に価値の高い新しい応用を実現するものである。

図面の簡単な説明

[0014] [図1]図1は、Tと^{TF}Tの光反応性を比較した変性PAGE結果を示す図である。

[図2]図2は、^{CNV}Kと^{TF}Tのクロスリンク反応のHPLC解析(A)、及びODN2(T)とODN3(^{TF}T)の光反応性の比較(B)を示すグラフである。

[図3]図3は、光架橋に伴うケミカルシフトの変化を表す図である。

[図4]図4は、NMRのシフトしたピークの割合とHPLCでのピークの減少量から求めた光架橋率の相関を示すグラフである。

[図5]図5は、312nmの光照射による開裂を確認した変性PAGE結果を示す図である。

[図6]図6は、光架橋反応に伴う可逆的なF-NMRケミカルシフトの変化の結果を示す図である。

[図7]図7は、トロンビンアプタマーによるカリウムイオンのセンシングを示

す説明図である。

[図8]図8は、カリウムイオンの添加によるNMRピークの変化を示す図である。

発明を実施するための形態

[0015] 具体的な実施の形態をあげて、以下に本発明を詳細に説明する。本発明は、以下にあげる具体的な実施の形態に限定されるものではない。


[0016] [光架橋形成によるケミカルシフトの変化]

本発明によれば、光架橋性のビニル構造を有する光応答性塩基に対して光架橋可能なチミン（T）又はウラシル（U）の塩基の、ピリミジン環の5位を、R基（ただし、R基は、フッ素原子、又は1個以上の水素原子がフッ素原子で置換されたC1～C4のフルオロアルキル基である）に置換したフッ素含有修飾ピリミジン塩基を使用することによって、光架橋性のビニル構造を有する光応答性塩基と、光架橋可能なフッ素含有修飾ピリミジン塩基との間に光架橋を形成させて、光架橋形成の前後の比較において核磁気共鳴法によって検出可能な¹⁹Fケミカルシフトの変化を生じさせることができる。

[0017] [フッ素含有修飾ピリミジン塩基]

本発明のフッ素含有修飾ピリミジン塩基は、次の式（I）：

[化4]



(ただし、式 (I) において、

R は、フッ素原子、

1 個以上の水素原子がフッ素原子で置換された C 1 ～ C 4 のフルオロアルキル基、又は、

1 個以上の水素原子が、フッ素原子、又は 1 個以上の水素原子がフッ素原子で置換された C 1 ～ C 4 のフルオロアルキル基、で置換された、単環式、二環式又は三環式のフルオロアリール基であり、


R 1 は、式 (I) で R 1 に結合している O と一体となって形成されたリン酸基を表し、

R 2 は、水酸基を表し、

R 3 は、水素又は水酸基である)

で表される修飾ピリミジンヌクレオチドの塩基部分であり、次の式 (III) :

[化5]



(ただし、式 (III) において、

R は、フッ素原子、


1 個以上の水素原子がフッ素原子で置換された C 1 ～ C 4 のフルオロアルキル基、又は、

1 個以上の水素原子が、フッ素原子、又は 1 個以上の水素原子がフッ素原子で置換された C 1 ～ C 4 のフルオロアルキル基、で置換された、単環式、二環式又は三環式のフルオロアリール基である)

で表されるチミン誘導体である。

[0018] [フルオロアルキル基]

好適な実施の態様において、上記R基として、1個以上の水素原子がフッ素原子で置換されたC1～C4のフルオロアルキル基を使用することができる。このフルオロアルキル基としては、例えば、次の式：



(ただし、nは1以上4以下の整数、mは1以上の整数、 $2n+1-m$ は0以上の整数である)

で表される基である。


[0019] 好ましいフルオロアルキル基としては、例えば、 $-CF_3$ 、 $-CH_2-CF_3$ 、 $-C(CF_3)_3$ を挙げることができ、特に $-CF_3$ 、又は $-C(CF_3)_3$ が好ましい。

[0020] [フルオロアリール基]

好適な実施の態様において、上記R基として、1個以上の水素原子が、フッ素原子、又は1個以上の水素原子がフッ素原子で置換されたC1～C4のフルオロアルキル基、で置換された、単環式、二環式又は三環式のフルオロアリール基を使用することができる。このフルオロアリール基としては、例えば、1個以上の水素原子が、フッ素原子、 $-CF_3$ 、 $-CH_2-CF_3$ 、又は $-C(CF_3)_3$ で置換された、フルオロフェニル基又はフルオロナフチル基を使用することができる。

[0021] 好ましいフルオロアリール基としては、3，5-ビス（トリフルオロメチル）フェニル基：

[化6]




(ただし、上記構造式中の点線は、遊離基の位置を表す)
 を使用することができる。

[0022] [光応答性塩基]

光架橋性のビニル構造を有する光応答性塩基としては、次の式(II)：

[化7]



(ただし、式(II)中、R11は、シアノ基、アミド基、カルボキシル基、C2～C7のアルコキシカルボニル基、又は水素であり、

R12及びR13は、それぞれ独立に、シアノ基、アミド基、カルボキシ

ル基、C 2～C 7のアルコキシカルボニル基、又は水素であり、

R 1は、式(1)でR 1に結合しているOと一体となって形成されたリン酸基を表し、

R 2は、水酸基を表し、

R 3は、水素又は水酸基である)

で表される光応答性修飾ヌクレオチドの塩基部分を挙げることができ、このビニルカルバゾール構造を有する人工塩基は、特許文献1(国際公開第2009/066447号)に開示されているものである。

[0023] 好適な実施の態様において、式(11)のR 11は、シアノ基、アミド基、カルボキシ基、アルコキシカルボニル基、又は水素であり、好ましくは、シアノ基、アミド基、カルボキシ基、アルコキシカルボニル基、又は水素であり、さらに好ましくは、シアノ基、アミド基、カルボキシ基、又はアルコキシカルボニル基である。アルコキシカルボニル基は、好ましくはC 2～C 7、さらに好ましくはC 2～C 6、さらに好ましくはC 2～C 5、さらに好ましくはC 2～C 4、さらに好ましくはC 2～C 3、特に好ましくはC 2のものを使用することができる。

[0024] 好適な実施の態様において、式(11)のR 12及びR 13は、それぞれ独立に、シアノ基、アミド基、カルボキシ基、アルコキシカルボニル基、又は水素であり、好ましくは、シアノ基、アミド基、カルボキシ基、アルコキシカルボニル基、又は水素であり、さらに好ましくは、シアノ基、アミド基、カルボキシ基、又はアルコキシカルボニル基である。アルコキシカルボニル基は、好ましくはC 2～C 7、さらに好ましくはC 2～C 6、さらに好ましくはC 2～C 5、さらに好ましくはC 2～C 4、さらに好ましくはC 2～C 3、特に好ましくはC 2のものを使用することができる。

[0025] [光架橋の形成]

上記の光架橋性のビニル構造を有する光応答性塩基と、フッ素含有修飾ピリミジン塩基との間には、光架橋を形成することができる。すなわち、上記修飾ピリミジンヌクレオチドがリン酸ジエステル結合して導入されてなる被

光架橋性核酸中の、上記フッ素含有修飾ピリミジン塩基と、上記光応答性修飾ヌクレオチドがリン酸ジエステル結合して導入されてなる光応答性核酸中の、上記光応答性塩基との間には、光架橋を形成することができる。本発明によれば、この構造変化を核磁気共鳴法による ^{19}F ケミカルシフトの変化として検出することができる。

[0026] [光架橋形成のための二重鎖形成]

光応答性塩基と、フッ素含有修飾ピリミジン塩基との間の光架橋は、照射に先立って、光応答性塩基を含む塩基配列と、フッ素含有修飾ピリミジン塩基を含む塩基配列とが、その相補性によって二重鎖を形成して、光架橋反応が進行可能に配置されて、その状態で光照射を受けることによって、光反応が好適に進行して、形成される。二重鎖形成の条件としては、核酸の二重鎖形成の条件及び手段として、当業者に公知の条件及び手段を使用することができる。そこで、好適な実施の態様において、光応答性塩基を含む光応答性核酸の塩基配列中の光応答性塩基を含む塩基配列に対して、フッ素含有修飾ピリミジン塩基を含む被光架橋性核酸中の塩基配列は、相補的な塩基配列である。好適な実施の態様において、光応答性塩基配列と、相補的塩基配列とは、二重鎖の領域を形成できるよう相補性を有しており、ただし、光応答性塩基と相補的位置にある塩基については、ビニルカルバゾール構造を有する人工塩基が相補的な水素結合を形成しない構造であることから、特に制限なく、種々の塩基を選択することができる。

[0027] 好適な実施の対応において、光応答性塩基を含む光応答性核酸と、フッ素含有修飾ピリミジン塩基を含む被光架橋性核酸とが、同じ核酸分子であってもよく、この場合には、光応答性塩基を含む塩基配列とフッ素含有修飾ピリミジン塩基を含む塩基配列とによって、自己の分子中に二重鎖構造をとって、自己架橋を形成させることができ、この構造変化を核磁気共鳴法による ^{19}F ケミカルシフトの変化として検出することができる。

[0028] [光反応の条件]

光架橋のための光反応には、上記光応答性塩基について従来から知られて

いる光架橋形成の条件を使用することができる。例えば、光架橋のために照射される光は、一般に350～380 nmの範囲、好ましくは360～370 nmの範囲、さらに好ましくは366 nmの波長を含む光が好ましく、特に好ましくは、366 nmの単波長のレーザー光である。光照射時間は、数秒間、例えば、1～9秒間、1～7秒間、1～5秒間、又は1～3秒間の時間の光照射によって、光反応を進行させて光架橋を形成することができる。そして、光反応であることから、溶媒等についても、水溶液、緩衝液、生理的pHや塩濃度の使用を含めて、種々の条件を広く使用することができる。

[0029] また、上記の光架橋の形成は、可逆的なものである。すなわち、光照射によって光架橋した後に、さらに光照射によって光開裂をすることができる。光開裂のために照射される光は、例えば、330～370 nmの範囲の波長を含む光を使用することができ、例えば、366 nmの単波長のレーザー光を使用することができ、あるいは、例えば、300～330 nmの範囲の波長を含む光を使用することができ、例えば、312 nmの波長の光を使用することができる。

[0030] [¹⁹F ケミカルシフト]

光架橋によって生じた¹⁹F ケミカルシフトの変化は、核磁気共鳴法によって検出することができる。このために使用可能な手段、条件、装置等としては、公知の手段、条件、装置等を使用することができる。本発明によって生じる¹⁹F ケミカルシフトの変化は、従来技術による各種プローブでの¹⁹F ケミカルシフトの変化よりも、大きなものであるために、本発明は、高感度の¹⁹F ケミカルシフトイメージングを可能にするものとなっている。例えば、カリウムイオンを中心としてGuanine Quadruplex（グアニン四重鎖構造）として知られるDNAの高次構造をとらせることによって、DNAに結合させた¹⁹Fのケミカルシフトの変化を研究した報告があるが、従来のプローブによれば、この場合のΔppmは、0.15 ppmとされており、本願の¹⁹F ケミカルシフトの変化はこの50倍以上にあたる。本願の¹⁹F ケミカルシフトの変化は、例えば、2.0 ppm以上、3.0 ppm以上、4.

0 p p m以上、5. 0 p p m以上、6. 0 p p m以上、7. 0 p p m以上、8. 0 p p m以上であり、例えば、5 0 p p m以下、4 0 p p m以下、3 0 p p m以下、2 0 p p m以下、1 5 p p m以下である。

[0031] [¹⁹F ケミカルシフトの可逆性]

上記光架橋の形成は、可逆的なものであり、この可逆的な光架橋の形成に伴って、¹⁹F ケミカルシフトもまた、可逆的に変化する。したがって、¹⁹F ケミカルシフトの変化による光架橋の検出と、これを利用した二重鎖形成の検出は、その可逆性を利用して、同じプローブ分子（被光架橋性核酸）によって、繰り返し行うことができる。

実施例

[0032] 実施例をあげて、以下に本発明を詳細に説明する。本発明は、以下にあげる実施例に限定されるものではない。

[0033] [^{CNV}K 含有ODNと^{TF}T 含有ODNの合成]


研究室で合成した光応答性人工核酸 3-cyanovinylcarbazole nucleotide (^{CNV}K) のアミダイト体、Trifluorothymidine (^{TF}T) (5-trifluoromethyl-2'-deoxyuridine) のアミダイト体をアセトニトリルで 100 mM に調整し、ABI 3400 にて ODN を合成した。合成した ODN 配列は下記表 1 に示す。合成後、^{CNV}K 含有 ODN は 28% アンモニア水を用いて 55℃ で 8 時間脱保護を行った。^{TF}T 含有 ODN は 50 mM K₂CO₃ メタノール溶液を用いて室温で 4 時間脱保護を行った。その後、HPLC にて精製を行い、質量分析により目的配列であることを確認した。

[0034] [表1]


表 1：実験に使用した ODN

	配列(5'-3')	塩基数
ODN 1	TGCA ^{CNV} KACGT	9
ODN 2	ACGTGTGCA	9
ODN 3	ACGTG ^{TF} TGCA	9
ODN 4	TGGTGGTGTGGT ^{TF} TGG	16

[0035] [化8]

**3-cyanovinylcarbazole(CNV K)**

[0036] [化9]

**5-trifluoromethyl-2'-deoxyuridine
(TFU)**

[0037] [CNV KとCN Tの光反応性の解析]

20 μ M ODN1と20 μ M ODN2もしくは20 μ M ODN3をbuffer (100 mM NaCl、50 mM カコジル酸ナトリウム)中で90℃で5分間加熱した後、ゆっくり4℃までアニーリングを行った。その後、UV-LED照射機を用い、366 nmのUV照射を4℃で行い、光照射による光架橋体の確認を変性PAGEにより解析した。この結果を図1に示す。

[0038] 図1は、Tと^{TF}Tの光反応性を比較した変性PAGE結果を示す図である。

図1において、レーンM：10 DNAラダーマーカー、レーン1～5：ターゲット塩基がTの場合、レーン6～10：ターゲット塩基が^{CN}Tの場合であり、光照射時間はそれぞれ0 s（秒）、0.1 s、0.5 s、1 s、2 sである。

[0039] ターゲット塩基がTの場合には、1秒の光照射で原料となる9merのバンドがほぼ消失している。一方、ターゲットが^{TF}Tの場合には2秒の光照射で原料のバンドが消失していた。この結果より^{TF}Tは^{CNV}Kとの光架橋反応が、ほぼTと同様に進行することがわかった。質量分析の結果からもODN1とODN3の架橋体のピークが得られている。

[0040] [^{TF}Tと^{CNV}Kの光架橋反応速度の解析]

次に^{TF}Tと^{CNV}Kの光架橋反応がどれくらいの速度で進行するのかをHPLC解析より求めた。この結果を、図2に示す。

[0041] 図2の(A)は、^{CNV}Kと^{TF}Tのクロスリンク反応のHPLC解析である。横軸はリテンション時間（分）を表し、光照射時間0 s（秒）、0.1 s、0.5 s、1 s、2 s、5 sのそれぞれについてのチャートを示している。図2の(B)はODN2（T）とODN3（^{TF}T）の光反応性の比較である。横軸は光照射時間（秒）を表し、縦軸は光架橋率（%）を表す。グラフの上側の曲線がターゲット塩基がTの場合を表し、グラフの下側の曲線がターゲット塩基が^{TF}Tの場合を表す。

[0042] HPLC解析の結果^{TF}Tと^{CNV}Kの光架橋反応はTよりも遅く、約4分の1の速度で光架橋反応が進行していることが確認された。

[0043] [¹⁹F-NMR測定]

次に光架橋前後での¹⁹F-NMR測定を行い、光架橋による[2+2]光環化反応に伴うCF₃基の周辺環境の変化によるケミカルシフトの変化の確認を行った。

¹⁹F-NMR測定は20 μM ODNを100 mM NaCl、50 mM Cacodylate buffer中で測定を行った。内部標準として1

0 μ M TFA、10% D_2O とした。光照射時間を延ばしていき、その変化をNMRとHPLCにより解析した。この結果を、図3に示す。

[0044] 図3は、光架橋に伴うケミカルシフトの変化を表す図である。図3の(A)は、光照射時間による ^{19}F -NMRスペクトルの変化を表す。光照射時間0 s (秒)、1 s、2 s、5 s、10 s、20 sのそれぞれについてのチャートを示している。図3の(B)は、各NMRサンプルに対応したHPLCチャートを表す。横軸はリテンション時間(分)を表し、光照射時間0 s (秒)、1 s、2 s、5 s、10 s、20 sのそれぞれについてのチャートを示している。

[0045] まず、光架橋を行っていないサンプルではフッ素のピークが-63.2 ppm付近に確認できる。その状態から光照射時間を延ばしていくに従って-71.2 ppm付近のピークが現れる。最終的には-63.2 ppm付近のピークが消え、-71.2 ppmのピークのみになる。この変化をHPLCで解析すると ^{TF}T 含有のピークが減少し、クロスリンク体のピークが増加していることが確認された。NMRでのシフトしたピークの割合とHPLCでの ^{TF}T 含有ODNの減少率から求めた光架橋率をプロットしたところ、図4のようになった。

[0046] 図4は、NMRのシフトしたピークの割合とHPLCでのピークの減少量から求めた光架橋率の相関を示すグラフである。NMR解析、HPLC解析から求めた光架橋率が一致していることより、確認できているケミカルシフトの変化は光架橋による CF_3 周辺の環境が変化したためだと考えられる。

[0047] [光照射による開裂(変性PAGE)]

次に312 nmの光照射による開裂実験を行った。312 nmの各光照射時間でサンプリングし、変性PAGEによる解析を行った。この結果を、次の図5に示す。

[0048] 図5は、312 nmの光照射による開裂を確認した変性PAGE結果を示す図である。変性PAGEの結果、加熱条件下での312 nmの光照射によって、 ^{TF}T と ^{CNV}K の光架橋体の開裂が確認された。Tと比較すると開裂のスปี

ードは少し遅いものの、ゲル結果から、30分の光照射で開裂していることが確認された。

[0049] [光照射による開裂 (^{19}F - NMR 測定)]

$^{\text{CNV}}$ K と $^{\text{TF}}$ T の光架橋も T の場合と同様に 366 nm で架橋、312 nm で開裂という操作が可能であるため、それを ^{19}F - NMR のケミカルシフトにより読み取ることが可能かどうかを ^{19}F - NMR により確認した。この結果を、次の図 6 に示す。

[0050] 図 6 は、光架橋反応に伴う可逆的な $^{\text{F}}$ - NMR ケミカルシフトの変化の結果を示す図である。

4℃で 366 nm の光照射によりケミカルシフトは -71.2 ppm に変化し、60℃で 312 nm の光照射により -63.2 ppm に変化していることが確認できた。さらに 4℃で 366 nm の光照射によりケミカルシフトは -71.2 ppm に変化した。これらの結果より、366 nm と 312 nm の光照射によりケミカルシフトの変化が可逆的に操作可能であること、これを利用してイメージングが可能であることが示された。

[0051] [$^{\text{TF}}$ T を用いたケミカルシフトによる構造のセンシング技術]

核酸には通常の B 型の二重螺旋だけでなく、特定の配列が存在する条件下での形成する高次構造が存在する。それらは小分子のアプタマーなどとしても利用可能である。高次構造は通常の二重螺旋と比較して構造が大きく変化するために、 $^{\text{TF}}$ T を用いたケミカルシフトによるイメージングが可能ではないかと考え実験を行った。

[0052] ターゲットとしたのはトロンピンアプタマーとして報告されている配列であり、T を $^{\text{TF}}$ T に置換した配列 ODN4 を用いて実験を行った。カリウムイオン存在下で G-quadruplex 構造を取るというものである。この変化を、次の図 7 で説明する。

[0053] 図 7 は、トロンピンアプタマーによるカリウムイオンのセンシングを示す説明図である。20 μM ODN を 10 mM Tris-HCl 中で ^{19}F - NMR で測定を行った。内部標準として 10 μM TFA、10% D_2O と

した。NMR測定結果を図8に示す。

[0054] 図8は、カリウムイオンの添加によるNMRピークの変化を示す図である。19F-NMR測定の結果、カリウムイオンを加える前では、-63.1 ppmにピークが確認できた。これが1本鎖状態のピークである。次にKClを50 mM加えた際に-64.0 ppmに新たなピークが確認できた。このピークがカリウムイオン存在下でのみとるG-quadruplex由来のピークだと考えられる。最終的にKClの濃度を十分に挙げるとすべてのODNがG-quadruplex構造を形成し、-64.0 ppmのピークのみとなる。この結果から、TF Tをアプタマー配列に導入することによってカリウムイオンのセンシングがケミカルシフトの変化から読み取ることが可能である。

[0055] TF Tを用いたケミカルシフトによる構造のセンシング技術は、カリウムイオンのセンシングを実現する技術であり、光架橋を伴うものではない。この技術は、次の(1)以下のような発明として、把握することができる。

(1)

核酸アプタマーに、式Iで表される修飾ピリミジンヌクレオチドを導入して使用し、核酸アプタマーとリガンドとを結合させて、結合の前後の比較において核磁気共鳴法によって検出可能な¹⁹Fケミカルシフトを生じさせる方法。

(2)

核酸アプタマーに、式Iで表される修飾ピリミジンヌクレオチドを導入して使用し、核酸アプタマーとリガンドとの結合を、核磁気共鳴法における¹⁹Fケミカルシフトによって検出する方法。

(3)

核酸アプタマーが、カリウムイオン結合可能なアプタマー配列と、式Iで表される修飾ピリミジンヌクレオチドを配列中に有し、

リガンドがカリウムイオンである、(1)～(2)のいずれかに記載の方法。

(4)

核磁気共鳴法における¹⁹Fケミカルシフトによって、カリウムイオンを検出する方法である、(3)に記載の方法。

(5)

式(1)で表される修飾ピリミジンヌクレオチドが導入された核酸アプタマー。

(6)

式(1)で表される修飾ピリミジンヌクレオチドが核酸アプタマーに導入されてなる、アプタマーリガンド検出剤。

(7)

式(1)で表される修飾ピリミジンヌクレオチドが、カリウムイオン結合可能なアプタマー配列を有する核酸アプタマーに導入されてなる、カリウムイオン検出剤。


産業上の利用可能性

[0056] 本発明によれば、光応答性塩基による光架橋の形成を、核磁気共鳴法による¹⁹Fケミカルシフトによって、検出することができる。本発明は産業上有用な発明である。

請求の範囲

- [請求項1] 光架橋性のビニル構造を有する光応答性塩基に対して光架橋可能なチミン（T）又はウラシル（U）の塩基の、ピリミジン環の5位を、R基
- （ただし、R基は、フッ素原子、
- 1個以上の水素原子がフッ素原子で置換されたC1～C4のフルオロアルキル基、
- 又は、
- 1個以上の水素原子が、フッ素原子、又は1個以上の水素原子がフッ素原子で置換されたC1～C4のフルオロアルキル基、で置換された、単環式、二環式又は三環式のフルオロアリアル基である）
- に置換したフッ素含有修飾ピリミジン塩基を使用することによって、
- 光架橋性のビニル構造を有する光応答性塩基と、光架橋可能なフッ素含有修飾ピリミジン塩基との間に光架橋を形成させて、光架橋形成の前後の比較において核磁気共鳴法によって検出可能な¹⁹Fケミカルシフトの変化を生じさせる方法。
- [請求項2] フッ素含有修飾ピリミジン塩基が、
- 次の式（I）：

[化1]



(ただし、式 (I) において、

R は、フッ素原子、

1 個以上の水素原子がフッ素原子で置換された C 1 ～ C 4 のフルオロアルキル基、又は、

1 個以上の水素原子が、フッ素原子、又は 1 個以上の水素原子がフッ素原子で置換された C 1 ～ C 4 のフルオロアルキル基、で置換された、単環式、二環式又は三環式のフルオロアリアル基であり、

R 1 は、式 (I) で R 1 に結合している O と一体となって形成されたリン酸基を表し、

R 2 は、水酸基を表し、

R 3 は、水素又は水酸基である)

で表される修飾ピリミジンヌクレオチドの塩基部分であり、

光架橋が、

上記修飾ピリミジンヌクレオチドがリン酸ジエステル結合して導入されてなる被光架橋性核酸中の、上記フッ素含有修飾ピリミジン塩基と、


光架橋性のビニル構造を有する光応答性塩基との間に形成される光

架橋である、請求項 1 に記載の方法。

[請求項 3] 光架橋性のビニル構造を有する光応答性塩基が、

次の式 (I I) :

[化 2]



(ただし、式 (I I) 中、R 1 1 は、シアノ基、アミド基、カルボキシル基、C 2 ~ C 7 のアルコキシカルボニル基、又は水素であり、

R 1 2 及び R 1 3 は、それぞれ独立に、シアノ基、アミド基、カルボキシル基、C 2 ~ C 7 のアルコキシカルボニル基、又は水素であり、

、

R 1 は、式 (I) で R 1 に結合している O と一体となって形成されたリン酸基を表し、

R 2 は、水酸基を表し、

R 3 は、水素又は水酸基である)


で表される光応答性修飾ヌクレオチドの塩基部分であり、

光架橋が、

上記光応答性修飾ヌクレオチドがリン酸ジエステル結合して導入されてなる光応答性核酸中の、上記光応答性塩基と、

被光架橋性核酸中のフッ素含有修飾ピリミジン塩基との間に形成される光架橋である、請求項2に記載の方法。

[請求項4] C1～C4のフルオロアルキル基が、



(ただし、nは1以上4以下の整数、mは1以上の整数、 $2n+1-m$ は0以上の整数である)

である、請求項1～3のいずれかに記載の方法。

[請求項5] C1～C4のフルオロアルキル基が、

$-CF_3$ 、 $-CH_2-CF_3$ 、又は $-C(CF_3)_3$ である、請求項1～3のいずれかに記載の方法。

[請求項6] 単環式、二環式又は三環式のフルオロアリール基が、

1個以上の水素原子が、フッ素原子、 $-CF_3$ 、 $-CH_2-CF_3$ 、又は $-C(CF_3)_3$ で置換された、フルオロフェニル基又はフルオロナフチル基である、請求項1～3のいずれかに記載の方法。

[請求項7] 単環式、二環式又は三環式のフルオロアリール基が、

3,5-ビス(トリフルオロメチル)フェニル基である、請求項1～3のいずれかに記載の方法。

[請求項8] 請求項1～7のいずれかに記載の方法によって、核磁気共鳴法によって検出可能な ^{19}F ケミカルシフトの変化を生じた、光架橋を製造する方法。

[請求項9] 請求項1～7のいずれかに記載の方法によって形成された光架橋を、核磁気共鳴法における ^{19}F ケミカルシフトの変化によって、検出する方法。

[請求項10] 光架橋が、

光応答性核酸と被光架橋性核酸との間の二重鎖形成によって、光架橋可能に配置されて形成された光架橋である、請求項3～7のいずれかに記載の方法。

[請求項11] 請求項10に記載の方法によって形成された光架橋を、核磁気共鳴

法における ^{19}F ケミカルシフトの変化によって検出することによって


、

光応答性核酸と被光架橋性核酸との間の二重鎖形成を検出する方法

。

[請求項12] 次の式 (I) :

[化3]



(ただし、式 (I) において、

R は、フッ素原子、

1 個以上の水素原子がフッ素原子で置換された C 1 ～ C 4 のフルオロアルキル基、又は、

1 個以上の水素原子が、フッ素原子、又は 1 個以上の水素原子がフッ素原子で置換された C 1 ～ C 4 のフルオロアルキル基、で置換された、単環式、二環式又は三環式のフルオロアリアル基であり、

R 1 は、式 (I) で R 1 に結合している O と一体となって形成されたリン酸基を表し、

R 2 は、水酸基を表し、

R 3 は、水素又は水酸基である)

で表される修飾ピリミジンヌクレオチドがリン酸ジエステル結合して

導入されてなる被光架橋性核酸からなる、光架橋形成検出剤。

[請求項13] 光架橋形成の前後の比較において核磁気共鳴法によって検出可能な¹⁹Fケミカルシフトの変化を生じさせる、請求項12に記載の光架橋形成検出剤。

[請求項14] 式(Ⅰ)で表される修飾ピリミジンヌクレオチドがリン酸ジエステル結合して導入されてなる被光架橋性核酸と、

式(ⅠⅠ)で表される光応答性修飾ヌクレオチドがリン酸ジエステル結合して導入されてなる光応答性核酸とを、

ハイブリダイズさせる工程、

ハイブリダイズさせた被光架橋性核酸と光応答性核酸に、光照射する工程、

を含む、光架橋された核酸を製造する方法。


[請求項15] 請求項14に記載の方法によって製造された、

式(Ⅰ)で表される修飾ピリミジンヌクレオチドがリン酸ジエステル結合して導入されてなる被光架橋性核酸と、



式(ⅠⅠ)で表される光応答性修飾ヌクレオチドがリン酸ジエステル結合して導入されてなる光応答性核酸とが、

光架橋されてなる、光架橋された核酸。


[図1]




[図2]

(A) ^{CNV}Kと^{TF}Tの光反応性のHPLC解析(B) Tと^{TF}Tの光反応性の比較


[図3]




[図4]




[図5]




[図6]



[図7]



[図8]



INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/JP2014/083278

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER

A61K49/00(2006.01)i, C12N15/00(2006.01)i, C12Q1/68(2006.01)i, G01N24/00(2006.01)i

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)

A61K49/00, C12N15/00, C12Q1/68, G01N24/00

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Jitsuyo Shinan Koho	1922-1996	Jitsuyo Shinan Toroku Koho	1996-2015
Kokai Jitsuyo Shinan Koho	1971-2015	Toroku Jitsuyo Shinan Koho	1994-2015

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practicable, search terms used)

JSTPlus/JMEDPlus/JST7580(JDreamIII), CAPLUS/MEDLINE/EMBASE/BIOSIS(STN)

C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
A	WO 2009/066447 A1 (Japan Advanced Institute of Science and Technology), 28 May 2009 (28.05.2009), claims 1 to 8; paragraphs [0030] to [0042]; examples & US 2010/0274000 A1 & EP 2216338 A1 & WO 2009/066447 A1	1-15
A	FUJIMOTO, K. et al., Details of the ultrafast DNA photo-cross-linking reaction of 3-cyanovinylcarbazole nucleoside: cis-trans isomeric effect and the application for SNP-based genotyping, J Am Chem Soc., 2013.10, Vol.135, p.16161-16167	1-15

☒ Further documents are listed in the continuation of Box C.

☐ See patent family annex.

* Special categories of cited documents:

"A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance

"E" earlier application or patent but published on or after the international filing date

"L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)

"O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means

"P" document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed

"T" later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention

"X" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone

"Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art

"&" document member of the same patent family

Date of the actual completion of the international search
05 February 2015 (05.02.15)

Date of mailing of the international search report
17 February 2015 (17.02.15)

Name and mailing address of the ISA/
Japan Patent Office
3-4-3, Kasumigaseki, Chiyoda-ku,
Tokyo 100-8915, Japan

Authorized officer

Telephone No.

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/JP2014/083278

C (Continuation). DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
A	GMEINER, WH. et al., Synthesis, annealing properties, fluorine-19 NMR characterization, and detection limits of a trifluorothymidine-labeled antisense oligodeoxyribonucleotide 21 mer, The Journal of Organic Chemistry, 1991, Vol.56, p.3602-3608	1-15
A	Takuya TSUDA et al., "Trifluoromethyl Ki o Donyu shita DNA no Gosei to ¹⁹ F-NMR Spectrum ni yoru DNA Kozo Henka no Tsuiseki", CSJ: The Chemical Society of Japan Dai 92 Shunki Nenkai (2012) Koen Yokoshu III, 2012, page 829, 2D7-31	1-15

A. 発明の属する分野の分類 (国際特許分類 (I P C))

Int.Cl. A61K49/00(2006.01)i, C12N15/00(2006.01)i, C12Q1/68(2006.01)i, G01N24/00(2006.01)i

B. 調査を行った分野

調査を行った最小限資料 (国際特許分類 (I P C))

Int.Cl. A61K49/00, C12N15/00, C12Q1/68, G01N24/00

最小限資料以外の資料で調査を行った分野に含まれるもの

日本国実用新案公報	1 9 2 2 - 1 9 9 6 年
日本国公開実用新案公報	1 9 7 1 - 2 0 1 5 年
日本国実用新案登録公報	1 9 9 6 - 2 0 1 5 年
日本国登録実用新案公報	1 9 9 4 - 2 0 1 5 年

国際調査で使用した電子データベース (データベースの名称、調査に使用した用語)

JSTPlus/JMEDPlus/JST7580(JDreamIII), CAlus/MEDLINE/EMBASE/BIOSIS(STN)

C. 関連すると認められる文献

引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求項の番号
A	WO 2009/066447 A1 (国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学) 2009.05.28, 請求項 1-8, [0030]-[0042], 実施例 & US 2010/0274000 A1 & EP 2216338 A1 & WO 2009/066447 A1	1-15
A	FUJIMOTO, K. et al., Details of the ultrafast DNA photo-cross-linking reaction of 3-cyanovinylcarbazole nucleoside: cis-trans isomeric effect and the application for SNP-based genotyping, J Am Chem Soc., 2013.10, Vol.135, p.16161-16167	1-15

☒ C 欄の続きにも文献が列挙されている。☐ パテントファミリーに関する別紙を参照。

* 引用文献のカテゴリー

「A」特に関連のある文献ではなく、一般的技術水準を示すもの
「E」国際出願日前の出願または特許であるが、国際出願日以後に公表されたもの
「L」優先権主張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行日若しくは他の特別な理由を確立するために引用する文献 (理由を付す)
「O」口頭による開示、使用、展示等に言及する文献
「P」国際出願日前で、かつ優先権の主張の基礎となる出願

の日の後に公表された文献

「T」国際出願日又は優先日後に公表された文献であって出願と矛盾するものではなく、発明の原理又は理論の理解のために引用するもの
「X」特に関連のある文献であって、当該文献のみで発明の新規性又は進歩性がないと考えられるもの
「Y」特に関連のある文献であって、当該文献と他の 1 以上の文献との、当業者にとって自明である組合せによって進歩性がないと考えられるもの
「&」同一パテントファミリー文献

国際調査を完了した日

0 5 . 0 2 . 2 0 1 5

国際調査報告の発送日

1 7 . 0 2 . 2 0 1 5

国際調査機関の名称及びあて先

日本国特許庁 (I S A / J P)

郵便番号 1 0 0 - 8 9 1 5

東京都千代田区霞が関三丁目 4 番 3 号

特許庁審査官 (権限のある職員)

高橋 樹理

電話番号 0 3 - 3 5 8 1 - 1 1 0 1 内線 3 4 5 2

4 C

4 4 9 8

C (続き) . 関連すると認められる文献		
引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求項の番号
A	GMEINER, WH. et al., Synthesis, annealing properties, fluorine-19 NMR characterization, and detection limits of a trifluorothymidine-labeled antisense oligodeoxyribonucleotide 21 mer, The Journal of Organic Chemistry, 1991, Vol.56, p. 3602-3608	1-15
A	津田拓哉ら, トリフルオロメチル基を導入した DNA の合成と ^{19}F -NMR スペクトルによる DNA 構造変化の追跡, 日本化学会第 92 春季年会 (2012) 講演予稿集 III, 2012, p. 829 2D7-31	1-15