



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

(12) ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ К ПАТЕНТУ

(52) СПК

A61K 31/5025 (2020.08); A61K 31/519 (2020.08); A61P 35/00 (2020.08); C12Q 1/68 (2020.08); G01N 33/574 (2020.08)

(21)(22) Заявка: 2018118967, 26.10.2016

(24) Дата начала отсчета срока действия патента:
26.10.2016

Дата регистрации:
16.03.2021

Приоритет(ы):

(30) Конвенционный приоритет:
26.10.2015 US 62/246,580;
27.01.2016 US 62/287,778;
15.04.2016 US 62/323,586

(43) Дата публикации заявки: 04.12.2019 Бюл. № 34

(45) Опубликовано: 16.03.2021 Бюл. № 8

(85) Дата начала рассмотрения заявки РСТ на
национальной фазе: 28.05.2018

(86) Заявка РСТ:
US 2016/058951 (26.10.2016)

(87) Публикация заявки РСТ:
WO 2017/075107 (04.05.2017)

Адрес для переписки:
119019, Москва, б-р Гоголевский, 11, "Гоулинг
ВЛГ (Интернэшнл) Инк.", Парамоновой К.В.

(72) Автор(ы):

ЭНДРЮС, Стивен В. (US),
КОЛАКОВСКИ, Габриэль Р. (US),
ДОУБЕЛ, Роберт К. (US),
НАНДА, Ниша (US),
БАЙЛЕНКЕР, Джош Х. (US),
БЛЕЙК, Джеймс Ф. (US),
БРЭНДХУБЕР, Барбара Дж. (US),
ЧЖАО, Цюинь (US)

(73) Патентообладатель(и):

ЛОКСО ОНКОЛОДЖИ, ИНК. (US),
ДЗЕ РИДЖЕНТС ОФ ДЗЕ
ЮНИВЕРСИТИ ОФ КОЛОРАДО, Э
БОДИ КОРПОРЕЙТ (US),
АРРЭЙ БАЙОФАРМА ИНК. (US)

(56) Список документов, цитированных в отчете
о поиске: WO 2010048314 A1, 29.04.2010. WO
2010033941 A1, 25.03.2010. WO 2011006074 A1,
13.01.2011. WO 2011146336 A1, 24.11.2011. WO
2004082458 A2, 30.09.2004.

(54) ТОЧЕЧНЫЕ МУТАЦИИ В УСТОЙЧИВЫХ К ИНГИБИТОРУ TRK ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ
ОПУХОЛЯХ И СВЯЗАННЫЕ С НИМИ СПОСОБЫ

(57) Реферат:

Группа изобретений относится к способам
лечения злокачественной опухоли. Способ
лечения субъекта, имеющего ассоциированную с
Trk злокачественную опухоль, включает (а)
введение одной или нескольких доз первого
ингибитора Trk субъекту в течение некоторого
периода времени, где первый ингибитор Trk
представляет собой сульфат (S)- N-(5-((R)-2-(2,5-
дифторфенил)пирролидин-1-ил)пиразоло[1,5-a]

пиримидин-3-ил)-3-гидроксипирролидин-1-
карбоксамид; и (б) после (а) подвергание
лечению, включающему второй ингибитор Trk,
субъекта, где второй ингибитор Trk представляет
собой (6R,15R)-9-фтор-15-метил-2,11,16,20,21,24-
гексаазапентацикло[16.5.2.02,6.07,12.021,25]
пентакоза-1(24),7,9,11,18(25),19,22-гептен-17-он,
где ассоциированная с Trk злокачественная
опухоль является устойчивой к первому

ингибитору Tgk. Также раскрыты другие варианты лечения субъекта, имеющего ассоциированную с Tgk злокачественную опухоль.

Группа изобретений обеспечивает лечение ассоциированных с Tgk злокачественных опухолей. 11 н. и 53 з.п. ф-лы, 17 ил., 7 табл., 4 пр.

R U 2 7 4 4 8 5 2 C 2

R U 2 7 4 4 8 5 2 C 2



FEDERAL SERVICE
FOR INTELLECTUAL PROPERTY

(51) Int. Cl.

A61K 31/5025 (2006.01)*A61K 31/519* (2006.01)*A61P 35/00* (2006.01)*C12Q 1/68* (2006.01)*G01N 33/574* (2006.01)(12) **ABSTRACT OF INVENTION**

(52) CPC

A61K 31/5025 (2020.08); *A61K 31/519* (2020.08); *A61P 35/00* (2020.08); *C12Q 1/68* (2020.08); *G01N 33/574* (2020.08)

(21)(22) Application: **2018118967, 26.10.2016**

(24) Effective date for property rights:
26.10.2016

Registration date:
16.03.2021

Priority:

(30) Convention priority:
26.10.2015 US 62/246,580;
27.01.2016 US 62/287,778;
15.04.2016 US 62/323,586

(43) Application published: **04.12.2019 Bull. № 34**(45) Date of publication: **16.03.2021 Bull. № 8**(85) Commencement of national phase: **28.05.2018**

(86) PCT application:
US 2016/058951 (26.10.2016)

(87) PCT publication:
WO 2017/075107 (04.05.2017)

Mail address:

**119019, Moskva, b-r Gogolevskij, 11, "Gouling
VLG (Interneshnl) Ink.", Paramonovoj K.V.**

(72) Inventor(s):

ENDRYUS, Stiven V. (US),
KOLAKOVSKI, Gabriell R. (US),
DOUBEL, Robert K. (US),
NANDA, Nisha (US),
BAJLENKER, Dzhosh KH. (US),
BLEJK, Dzhejms F. (US),
BRENDKHUBER, Barbara Dzh. (US),
CHZHAO, Tsyuin (US)

(73) Proprietor(s):

LOKSO ONKOLODZHI, INK. (US),
DZE RIDZHENTS OF DZE YUNIVERSITI
OF KOLORADO, E BODI KORPOREJT (US),
ARREJ BAJOFARMA INK. (US)

(54) **POINT MUTATIONS IN TRK INHIBITOR-RESISTANT MALIGNANT TUMORS AND RELATED METHODS**

(57) Abstract:

FIELD: medicine.

SUBSTANCE: set of inventions relates to methods for treating a malignant tumor. A method for treating a subject with a Trk-associated malignant tumor involves (a) administering one or more doses of the first Trk inhibitor to the subject over a period of time where the first Trk inhibitor is sulfate (S)- N-(5-((R)-2-(2,5-difluorophenyl)pyrrolidine-1-yl)pyrazolo[1,5-a]pyrimidine-3-yl)-3-hydroxypyrrolidine-1-carboxamide; and (b) treatment after (a) involving a second Trk

inhibitor of the subject where the second Trk inhibitor is (6R, 15R)-9-fluoro-15-methyl-2,11,16,20,21,24-hexaazapentacyclo[16.5.2.02,6.07,12.021,25]pentacose-1(24),7,9,11,18(25),19,22-hepten-17-on where the Trk-associated malignant tumor is resistant to the first Trk inhibitor. Disclosed are also other treatment options for a subject with a Trk-associated malignant tumor.

EFFECT: set of inventions enables treatment of Trk-associated malignant tumors.

64 cl, 17 dwg, 7 tbl, 4 ex

ПЕРЕКРЕСТНАЯ ССЫЛКА НА РОДСТВЕННЫЕ ЗАЯВКИ

По настоящей заявке испрашивается приоритет Предварительных патентных заявок США серийных No. 62/246580, поданной 26 октября 2015 г., 62/287778, поданной 27 января 2016 г., и 62/323586, поданной 15 апреля 2016 г., полное содержание всех из

ОБЛАСТЬ ТЕХНИКИ

Это изобретение относится к способам генетики, фармакогенетики и биологии злокачественных опухолей.

УРОВЕНЬ ТЕХНИКИ

Родственная тропомиозину киназа (TRK) представляет собой семейство рецепторных тирозинкиназ из рецепторов нейтрофина, обнаруженных во множестве типов тканей. Описано три члена семейства протоонкогенов TRK: TrkA, TrkB и TrkC, кодируемые генами *NTRK1*, *NTRK2* и *NTRK3*, соответственно. Семейство рецепторов TRK вовлечено в развитие нейронов, включая рост и функционирование нейронных синапсов, развитие и поддержание памяти, и защиту нейронов после ишемии или других типов повреждения (Nakagawara, Cancer Lett. 169:107-114, 2001).

TRK исходно идентифицирована в линии клеток колоректального рака в форме слитого онкогена, содержащего 5'-последовательности из гена тропомиозина-3 (TPM3) и киназный домен, кодируемый 3'-областью гена нейротрофной тирозинкиназы, рецепторной, типа 1 (NTRK1) (Pulciani et al., Nature 300:539-542, 1982; Martin-Zanca et al., Nature 319:743-748, 1986). Слияния с геном TRK следуют хорошо разработанной концепции других слитых онкогенов, таких как включающие ALK и ROS1, которые, как показано, управляют ростом опухолей, и которые можно успешно ингибировать в клинике посредством нацеленных лекарственных средств (Shaw et al., New Engl. J. Med. 371:1963-1971, 2014; Shaw et al., New Engl. J. Med. 370:1189-1197, 2014). Слитые онкогены с TRK индуцируют пролиферацию злокачественных клеток и привлекают критические связанные с злокачественными опухолями нижестоящие пути передачи сигналов, такие как пути активируемой митогеном протеинкиназы (MAPK) и АКТ (Vaishnavi et al., Cancer Discov. 5:25-34, 2015). Описаны многочисленные онкогенные реаранжировки, включающие *NTRK1* и родственные ему члены семейства TRK *NTRK2* и *NTRK3* (Vaishnavi et al., Cancer Disc. 5:25-34, 2015; Vaishnavi et al., Nature Med. 19:1469-1472, 2013). Хотя идентифицированы различные партнеры по слиянию с 5'-концом гена, все разделяют находящийся в рамке, интактный киназный домен TRK. Множество различных ингибиторов Trk разработано для лечения злокачественных опухолей (см., например, Публикацию патентной заявки США No. 62/080374, Публикации международных патентных заявок No. WO 11/006074, WO 11/146336, WO 10/033941, и WO 10/048314 и Патенты США No. 8933084, 8791123, 8637516, 8513263, 8450322, 7615383, 7384632, 6153189, 6027927, 6025166, 5910574, 5877016 и 5844092).

СУЩНОСТЬ ИЗОБРЕТЕНИЯ

Настоящее изобретение основано на открытии придающих устойчивость к ингибитору Trk мутаций NTRK1, NTRK2 и NTRK3. Принимая во внимание это открытие, настоящее изобретение относится к способам лечения субъекта, имеющего злокачественную опухоль, к способам выбора лечения для субъекта, имеющего злокачественную опухоль, к способам выбора субъекта, имеющего злокачественную опухоль, для лечения, не включающего ингибитор Trk, способы определения того, что субъект, имеющий злокачественную опухоль, будет иметь положительный ответ на лечение ингибитором Trk, к способам прогнозирования эффективности ингибитора Trk у субъекта, имеющего злокачественную опухоль, способы определения для субъекта риска развития устойчивой

к ингибитору Trk злокачественной опухоли и способы определения присутствия устойчивой к ингибитору Trk злокачественной опухоли у субъекта. В некоторых вариантах осуществления, способы, представленные в настоящем описании, основаны, частично, на определении того, имеет ли субъект клетку, имеющую (i) по меньшей мере одну точечную мутацию в гене NTRK1, приводящую к экспрессии белка TrkA, содержащего мутацию в одном или нескольких положениях(положениях) аминокислот, выбранных из группы, состоящей из: 517, 542, 568, 573, 589, 595, 599, 600, 602, 646, 656, 657, 667 и 676, и/или (ii) по меньшей мере одну точечную мутацию в гене NTRK2, приводящую к экспрессии белка TrkB, содержащего мутацию в одном или нескольких положениях(положениях) аминокислот, выбранных из группы, состоящей из: 545, 570, 596, 601, 617, 623, 624, 628, 630, 672, 682, 683, 693 и 702, и/или (iii) по меньшей мере одну точечную мутацию в гене NTRK3, приводящую к экспрессии белка TrkC, содержащего мутацию в одном или нескольких положениях(положениях) аминокислот, выбранных из группы, состоящей из: 545, 570, 596, 601, 617, 623, 624, 628, 630, 675, 685, 686, 696 и 705. Представлены также наборы, позволяющие детекцию по меньшей мере одной из точечных мутаций в NTRK1 и/или NTRK2, и/или NTRK3.

Детекция и идентификация субъекта, имеющего клетки, имеющие придающую устойчивость к ингибитору Trk мутацию, как описано в настоящем описании (например, (i) по меньшей мере одну точечную мутацию в гене NTRK1, приводящую к экспрессии белка TrkA, содержащего мутацию в одном или нескольких положениях(положениях) аминокислот, выбранных из группы, состоящей из: 517, 542, 568, 573, 589, 595, 599, 600, 602, 646, 656, 657, 667 и 676, и/или (ii) по меньшей мере одну точечную мутацию в гене NTRK2, приводящую к экспрессии белка TrkB, содержащего мутацию в одном или нескольких положениях(положениях) аминокислот, выбранных из группы, состоящей из: 545, 570, 596, 601, 617, 623, 624, 628, 630, 672, 682, 683, 693 и 702, и/или (iii) по меньшей мере одну точечную мутацию в гене NTRK3, приводящую к экспрессии белка TrkC, содержащего мутацию в одном или нескольких положениях(положениях) аминокислот, выбранных из группы, состоящей из: 545, 570, 596, 601, 617, 623, 624, 628, 630, 675, 685, 686, 696 и 705), могут улучшать лечение субъекта, например, посредством изменения режима лечения (например, изменения ингибитора Trk, вводимого субъекту, или добавления дополнительного противоракового средства или противораковой терапии) или посредством введения ингибитора Trk, который является эффективным в присутствии придающей устойчивость к ингибитору Trk мутации (например, одного или нескольких соединений из таблицы 5, или их фармацевтически приемлемых солей).

Настоящее изобретение относится к способам лечения субъекта, имеющего злокачественную опухоль (например, любую из злокачественных опухолей, описанных в настоящем описании или известных в данной области), включающим: идентификацию субъекта, имеющего клетку злокачественной опухоли, имеющую по меньшей мере одну точечную мутацию в гене NTRK, приводящую к экспрессии белка Trk, содержащего мутацию в одном или нескольких положениях аминокислот (например, мутацию в одном или нескольких из положений аминокислот, показанных в таблицах 1, 2 или 3); и подвергание идентифицированного субъекта лечению, не включающему первый ингибитор Trk в качестве монотерапии.

Настоящее изобретение относится также к способам лечения субъекта, имеющего злокачественную опухоль (например, любую из злокачественных опухолей, описанных в настоящем описании или известных в данной области), включающим: идентификацию субъекта, имеющего клетку злокачественной опухоли, имеющую по меньшей мере одну точечную мутацию в гене NTRK, приводящую к экспрессии белка Trk, содержащего

мутацию в одном или нескольких положениях аминокислот (например, мутацию в одном или нескольких из положений аминокислот, показанных в таблицах 1, 2 или 3); и подвергание идентифицированного субъекта лечению, включающему одно или несколько соединений из таблицы 5, или их фармацевтически приемлемые соли.

5 Настоящее изобретение относится также к способам лечения субъекта, имеющего злокачественную опухоль (например, любую из злокачественных опухолей, описанных в настоящем описании или известных в данной области), включающим: идентификацию субъекта, имеющего клетку злокачественной опухоли, имеющую по меньшей мере одну точечную мутацию в гене NTRK, приводящую к экспрессии белка Trk, содержащего

10 мутацию в одном или нескольких положениях аминокислот (например, мутацию в одном или нескольких из положений аминокислот, показанных в таблицах 1, 2 или 3); и подвергание идентифицированного субъекта лечению, включающему одно или несколько соединений из таблицы 5, или их фармацевтически приемлемые соли, и другое противораковое средство или противораковую терапию.

15 Настоящее изобретение относится также к способам лечения субъекта, идентифицированного как имеющего клетку злокачественной опухоли, имеющую по меньшей мере одну точечную мутацию в гене NTRK, приводящую к экспрессии белка Trk, содержащего мутацию в одном или нескольких положениях аминокислот (например, мутацию в одном или нескольких из положений аминокислот, показанных в таблицах

20 1, 2 или 3), включающим: подвергание субъекта лечению, не включающему первый ингибитор Trk в качестве монотерапии.

Настоящее изобретение относится также к способам лечения субъекта, идентифицированного как имеющего клетку злокачественной опухоли, имеющую по меньшей мере одну точечную мутацию в гене NTRK, приводящую к экспрессии белка

25 Trk, содержащего мутацию в одном или нескольких положениях аминокислот (например, мутацию в одном или нескольких из положений аминокислот, показанных в таблицах 1, 2 или 3), включающим подвергание субъекта лечению, включающему одно или несколько соединений из таблицы 5, или их фармацевтически приемлемые соли.

Настоящее изобретение относится также к способам лечения субъекта,

30 идентифицированного как имеющего клетку злокачественной опухоли, имеющую по меньшей мере одну точечную мутацию в гене NTRK, приводящую к экспрессии белка Trk, содержащего мутацию в одном или нескольких положениях аминокислот (например, мутацию в одном или нескольких из положений аминокислот, показанных в таблицах 1, 2 или 3), включающим подвергание субъекта лечению, включающему одно или

35 несколько соединений из таблицы 5, или их фармацевтически приемлемые соли, и другое противораковое средство или противораковую терапию.

Настоящее изобретение относится также к способам лечения субъекта, включающим введение терапевтически эффективного количества лекарственного средства, не включающего первый ингибитор Trk в качестве монотерапии, субъекту, имеющему

40 медицинскую карту, показывающую, что субъект имеет клетку злокачественной опухоли, имеющую по меньшей мере одну точечную мутацию в гене NTRK, приводящую к экспрессии белка Trk, содержащего мутацию в одном или нескольких положениях аминокислот (например, мутацию в одном или нескольких из положений аминокислот, показанных в таблицах 1, 2 или 3).

45 Настоящее изобретение относится также к способам лечения субъекта, включающим введение терапевтически эффективного количества лекарственного средства, включающего одно или несколько соединений из таблицы 5, или их фармацевтически приемлемые соли, субъекту, имеющему анамнез, показывающий, что субъект имеет

клетку злокачественной опухоли, имеющую по меньшей мере одну точечную мутацию в гене NTRK, приводящую к экспрессии белка Trk, содержащего мутацию в одном или нескольких положений аминокислот (например, мутацию в одном или нескольких из положений аминокислот, показанных в таблицах 1, 2 или 3).

- 5 Настоящее изобретение относится также к способам лечения субъекта, включающим введение терапевтически эффективного количества лекарственного средства, включающего одно или несколько соединений из таблицы 5, или их фармацевтически приемлемые соли, и другого противоракового средства или противораковую терапию, для субъекта, имеющего анамнез, показывающий, что субъект имеет клетку
- 10 злокачественной опухоли, имеющую по меньшей мере одну точечную мутацию в гене NTRK, приводящую к экспрессии белка Trk, содержащего мутацию в одном или нескольких положений аминокислот (например, мутацию в одном или нескольких из положений аминокислот, показанных в таблицах 1, 2 или 3).

- Настоящее изобретение относится также к способам лечения субъекта, имеющего
- 15 злокачественную опухоль, включающим: (а) введение одной или нескольких доз первого ингибитора Trk субъекту в течение некоторого периода времени; (b) после (а), определения того, имеет ли клетка злокачественной опухоли в образце, полученном от субъекта, по меньшей мере одну точечную мутацию в гене NTRK, приводящую к экспрессии белка Trk, содержащего мутацию в одном или нескольких положений
- 20 аминокислот (например, мутацию в одном или нескольких из положений аминокислот, показанных в таблицах 1, 2 или 3); и (с) введение второго ингибитора Trk или проведение лечения, не включающего первый ингибитор Trk со стадии (а) в качестве монотерапии, для субъекта, имеющего клетку злокачественной опухоли, имеющую по меньшей мере одну точечную мутацию в гене NTRK, приводящую к экспрессии белка Trk, содержащего
- 25 мутацию в одном или нескольких положений аминокислот (например, мутацию в одном или нескольких из положений аминокислот, показанных в таблицах 1, 2 или 3); или (d) введение дополнительных доз первого ингибитора Trk со стадии (а) субъекту, имеющему клетку злокачественной опухоли, не имеющую по меньшей мере одну точечную мутацию в гене NTRK, приводящую к экспрессии белка Trk, содержащего мутацию в одном или
- 30 нескольких положений аминокислот (например, мутацию в одном или нескольких из положений аминокислот, показанных в таблицах 1, 2 или 3).

- Настоящее изобретение относится также к способам лечения субъекта, имеющего злокачественную опухоль, включающим: (а) введение одной или нескольких доз первого ингибитора Trk субъекту в течение некоторого периода времени; (b) после (а),
- 35 определения того, имеет ли клетка злокачественной опухоли в образце, полученном от субъекта, по меньшей мере одну точечную мутацию в гене NTRK, приводящую к экспрессии белка Trk, содержащего мутацию в одном или нескольких положений аминокислот (например, мутацию в одном или нескольких из положений аминокислот, показанных в таблицах 1, 2 или 3); и (с) введение лекарственного средства, включающего
- 40 одно или несколько соединений из таблицы 5 или их фармацевтически приемлемые соли, субъекту, имеющему клетку злокачественной опухоли, имеющую по меньшей мере одну точечную мутацию в гене NTRK, приводящую к экспрессии белка Trk, содержащего мутацию в одном или нескольких положений аминокислот (например, мутацию в одном или нескольких из положений аминокислот, показанных в таблицах
- 45 1, 2 или 3); или (d) введение дополнительных доз первого ингибитора Trk субъекту, имеющему клетку злокачественной опухоли, не имеющую по меньшей мере одну точечную мутацию в гене NTRK, приводящую к экспрессии белка Trk, содержащего мутацию в одном или нескольких положений аминокислот (например, мутацию в одном

или нескольких из положений аминокислот, показанных в таблицах 1, 2 или 3).

Настоящее изобретение относится также к способам лечения субъекта, имеющего злокачественную опухоль, включающим: (а) введение одной или нескольких доз первого ингибитора Trk субъекту в течение некоторого периода времени; (b) после (а),
 5 определение того, имеет ли клетка злокачественной опухоли в образце, полученном от субъекта, (i) по меньшей мере одну точечную мутацию в гене NTRK, приводящую к экспрессии белка Trk, содержащего мутацию в одном или нескольких положений аминокислот (например, мутацию в одном или нескольких из положений аминокислот, показанных в таблицах 1, 2 или 3); и (с) проведение лечения, включающего одно или
 10 несколько соединений из таблицы 5 или их фармацевтически приемлемые соли, и другое противораковое средства или противораковую терапию, для субъекта, имеющего клетку злокачественной опухоли, имеющую по меньшей мере одну точечную мутацию в гене NTRK, приводящую к экспрессии белка Trk, содержащего мутацию в одном или нескольких положений аминокислот (например, мутацию в одном или нескольких из
 15 положений аминокислот, показанных в таблицах 1, 2 или 3); или (d) введение дополнительных доз первого ингибитора Trk субъекту, имеющему клетку злокачественной опухоли, не имеющую по меньшей мере одну точечную мутацию в гене NTRK, приводящую к экспрессии белка Trk, содержащего мутацию в одном или нескольких положений аминокислот (например, мутацию в одном или нескольких из
 20 положений аминокислот, показанных в таблицах 1, 2 или 3).

Настоящее изобретение относится также к способам лечения субъекта, имеющего злокачественную опухоль, включающим: (а) определение того, имеет ли клетка злокачественной опухоли в образце, полученном от субъекта, который имеет злокачественную опухоль, и которому ранее вводили одну или несколько доз первого
 25 ингибитора Trk, по меньшей мере одну точечную мутацию в гене NTRK, приводящую к экспрессии белка Trk, содержащего мутацию в одном или нескольких положений аминокислот (например, мутацию в одном или нескольких из положений аминокислот, показанных в таблицах 1, 2 или 3); и (b) введение второго ингибитора Trk или второго лекарственного средства, не включающего первый ингибитор Trk со стадии (а) в качестве
 30 монотерапии, субъекту, имеющему клетку злокачественной опухоли, имеющую по меньшей мере одну точечную мутацию в гене NTRK, приводящую к экспрессии белка Trk, содержащего мутацию в одном или нескольких положений аминокислот (например, мутацию в одном или нескольких из положений аминокислот, показанных в таблицах 1, 2 или 3); или (с) введение дополнительных доз ингибитора Trk со стадии (а) субъекту,
 35 имеющему клетку злокачественной опухоли, не имеющую по меньшей мере одну точечную мутацию в гене NTRK, приводящую к экспрессии белка Trk, содержащего мутацию в одном или нескольких положений аминокислот (например, мутацию в одном или нескольких из положений аминокислот, показанных в таблицах 1, 2 или 3).

Некоторые варианты осуществления этих способов включают введение второго
 40 ингибитора Trk или второго лекарственного средства, не включающего первый ингибитор Trk со стадии (а), в качестве монотерапии, субъекту, имеющему клетку злокачественной опухоли, имеющую по меньшей мере одну точечную мутацию в гене NTRK, приводящую к экспрессии белка Trk, содержащего мутацию в одном или нескольких положений аминокислот (например, мутацию в одном или нескольких из
 45 положений аминокислот, показанных в таблицах 1, 2 или 3). Некоторые варианты осуществления этих способов включают введение дополнительных доз первого ингибитора Trk со стадии (а) субъекту, имеющему клетку злокачественной опухоли, не имеющую по меньшей мере одну точечную мутацию в гене NTRK, приводящую к

экспрессии белка Trk, содержащего мутацию в одном или нескольких положений аминокислот (например, мутацию в одном или нескольких из положений аминокислот, показанных в таблицах 1, 2 или 3).

Настоящее изобретение относится также к способам лечения субъекта, имеющего злокачественную опухоль, включающим: (а) определение того, имеет ли клетка злокачественной опухоли в образце, полученном от субъекта, который имеет злокачественную опухоль, и которому ранее вводили одну или несколько доз первого ингибитора Trk, по меньшей мере одну точечную мутацию в гене NTRK, приводящую к экспрессии белка Trk, содержащего мутацию в одном или нескольких положений аминокислот (например, мутацию в одном или нескольких из положений аминокислот, показанных в таблицах 1, 2 или 3); (b) введение лекарственного средства, включающего одно или несколько соединений из таблицы 5, или их фармацевтически приемлемые соли, субъекту, имеющему клетку злокачественной опухоли, имеющую по меньшей мере одну точечную мутацию в гене NTRK, приводящую к экспрессии белка Trk, содержащего мутацию в одном или нескольких положений аминокислот (например, мутацию в одном или нескольких из положений аминокислот, показанных в таблицах 1, 2 или 3); или (с) введение дополнительных доз первого ингибитора Trk субъекту, имеющему клетку злокачественной опухоли, не имеющую по меньшей мере одну точечную мутацию в гене NTRK, приводящую к экспрессии белка Trk, содержащего мутацию в одном или нескольких положений аминокислот (например, мутацию в одном или нескольких из положений аминокислот, показанных в таблицах 1, 2 или 3).

Настоящее изобретение относится также к способам лечения субъекта, имеющего злокачественную опухоль, включающим: (а) определение того, имеет ли клетка злокачественной опухоли в образце, полученном от субъекта, который имеет злокачественную опухоль, и которому ранее вводили одну или несколько доз первого ингибитора Trk, по меньшей мере одну точечную мутацию в гене NTRK, приводящую к экспрессии белка Trk, содержащего мутацию в одном или нескольких положений аминокислот (например, мутацию в одном или нескольких из положений аминокислот, показанных в таблицах 1, 2 или 3); (b) проведение лечения, включающего одно или несколько соединений из таблицы 5, или их фармацевтически приемлемые соли, и другое противораковое средство или противораковую терапию, для субъекта, имеющего клетку злокачественной опухоли, имеющую по меньшей мере одну точечную мутацию в гене NTRK, приводящую к экспрессии белка Trk, содержащего мутацию в одном или нескольких положений аминокислот (например, мутацию в одном или нескольких из положений аминокислот, показанных в таблицах 1, 2 или 3); или (с) введение дополнительных доз первого ингибитора Trk субъекту, имеющему клетку злокачественной опухоли, не имеющую по меньшей мере одну точечную мутацию в гене NTRK, приводящую к экспрессии белка Trk, содержащего мутацию в одном или нескольких положений аминокислот (например, мутацию в одном или нескольких из положений аминокислот, показанных в таблицах 1, 2 или 3).

Настоящее изобретение относится также к способам выбора лечения для субъекта, имеющего злокачественную опухоль (например, любую из злокачественных опухолей, описанных в настоящем описании или известных в данной области), включающим: идентификацию субъекта, имеющего клетку злокачественной опухоли, имеющую по меньшей мере одну точечную мутацию в гене NTRK, приводящую к экспрессии белка Trk, содержащего мутацию в одном или нескольких положений аминокислот (например, мутацию в одном или нескольких из положений аминокислот, показанных в таблицах 1, 2 или 3); и выбор лечения, не включающего первый ингибитор Trk в качестве

монотерапии, для идентифицированного субъекта.

Настоящее изобретение относится также к способам выбора лечения для субъекта, имеющего злокачественную опухоль (например, любую из злокачественных опухолей, описанных в настоящем описании или известных в данной области), включающим:

- 5 идентификацию субъекта, имеющего клетку злокачественной опухоли, имеющую по меньшей мере одну точечную мутацию в гене NTRK, приводящую к экспрессии белка Trk, содержащего мутацию в одном или нескольких положениях аминокислот (например, мутацию в одном или нескольких из положений аминокислот, показанных в таблицах 1, 2 или 3); и выбор лечения, включающего одно или несколько соединений из таблицы
- 10 5 или их фармацевтически приемлемые соли, для идентифицированного субъекта.

- Настоящее изобретение относится также к способам выбора лечения для субъекта, имеющего злокачественную опухоль (например, любую из злокачественных опухолей, описанных в настоящем описании или известных в данной области), включающим: идентификацию субъекта, имеющего клетку злокачественной опухоли, имеющую по
- 15 меньшей мере одну точечную мутацию в гене NTRK, приводящую к экспрессии белка Trk, содержащего мутацию в одном или нескольких положениях аминокислот (например, мутацию в одном или нескольких из положений аминокислот, показанных в таблицах 1, 2 или 3); и выбор лечения, включающего одно или несколько соединений из таблицы 5 или их фармацевтически приемлемые соли, и другое противораковое средство или
- 20 противораковую терапию, для идентифицированного субъекта.

- Настоящее изобретение относится также к способам выбора лечения для субъекта, имеющего злокачественную опухоль, включающим: выбор лечения, не включающего первый ингибитор Trk в качестве монотерапии, для субъекта, идентифицированного как имеющего клетку злокачественной опухоли, имеющую по меньшей мере одну
- 25 точечную мутацию в гене NTRK, приводящую к экспрессии белка Trk, содержащего мутацию в одном или нескольких положениях аминокислот (например, мутацию в одном или нескольких из положений аминокислот, показанных в таблицах 1, 2 или 3).
- Настоящее изобретение относится также к способам выбора лечения для субъекта, имеющего злокачественную опухоль, включающим: выбор лечения, включающего
- 30 одно или несколько соединений из таблицы 5 или их фармацевтически приемлемые соли, для субъекта, идентифицированного как имеющего клетку злокачественной опухоли, имеющую по меньшей мере одну точечную мутацию в гене NTRK, приводящую к экспрессии белка Trk, содержащего мутацию в одном или нескольких положениях аминокислот (например, мутацию в одном или нескольких из положений аминокислот,
- 35 показанных в таблицах 1, 2 или 3).

- Настоящее изобретение относится также к способам выбора лечения для субъекта, имеющего злокачественную опухоль, включающим: выбор лечения, включающего одно или несколько соединений из таблицы 5 или их фармацевтически приемлемые соли, и другое противораковое средство или противораковую терапию, для субъекта,
- 40 идентифицированного как имеющего клетку злокачественной опухоли, имеющую по меньшей мере одну точечную мутацию в гене NTRK, приводящую к экспрессии белка Trk, содержащего мутацию в одном или нескольких положениях аминокислот (например, мутацию в одном или нескольких из положений аминокислот, показанных в таблицах 1, 2 или 3).

- Настоящее изобретение относится также к способам выбора субъекта, имеющего злокачественную опухоль, для лечения, не включающего первый ингибитор Trk в качестве монотерапии, включающим: идентификацию субъекта, имеющего клетку злокачественной опухоли, имеющую по меньшей мере одну точечную мутацию в гене

NTRK, приводящую к экспрессии белка Trk, содержащего мутацию в одном или нескольких положениях аминокислот (например, мутацию в одном или нескольких из положений аминокислот, показанных в таблицах 1, 2 или 3); и выбор идентифицированного субъекта для лечения, не включающего первый ингибитор Trk в качестве монотерапии.

Настоящее изобретение относится также к способам выбора субъекта, имеющего злокачественную опухоль, для лечения, включающего одно или несколько соединений из таблицы 5, или их фармацевтически приемлемые соли, включающим: идентификацию субъекта, имеющего клетку злокачественной опухоли, имеющую по меньшей мере одну точечную мутацию в гене NTRK, приводящую к экспрессии белка Trk, содержащего мутацию в одном или нескольких положениях аминокислот (например, мутацию в одном или нескольких из положений аминокислот, показанных в таблицах 1, 2 или 3); и выбор идентифицированного субъекта для лечения, включающего одно или несколько соединений из таблицы 5, или их фармацевтически приемлемые соли.

Настоящее изобретение относится также к способам выбора субъекта, имеющего злокачественную опухоль, для лечения, включающего одно или несколько соединений из таблицы 5, или их фармацевтически приемлемые соли, и другое противораковое средство или противораковую терапию, включающим: идентификацию субъекта, имеющего клетку злокачественной опухоли, имеющую по меньшей мере одну точечную мутацию в гене NTRK, приводящую к экспрессии белка Trk, содержащего мутацию в одном или нескольких положениях аминокислот (например, мутацию в одном или нескольких из положений аминокислот, показанных в таблицах 1, 2 или 3); и выбор идентифицированного субъекта для лечения, включающего одно или несколько соединений из таблицы 5, или их фармацевтически приемлемые соли, и другое противораковое средство или противораковую терапию.

Настоящее изобретение относится также к способам выбора субъекта, имеющего злокачественную опухоль, для лечения, не включающего первый ингибитор Trk в качестве монотерапии, включающим: выбор субъекта, идентифицированного как имеющего клетку злокачественной опухоли, имеющую по меньшей мере одну точечную мутацию в гене NTRK, приводящую к экспрессии белка Trk, содержащего мутацию в одном или нескольких положениях аминокислот (например, мутацию в одном или нескольких из положений аминокислот, показанных в таблицах 1, 2 или 3), для лечения, не включающего первый ингибитор Trk в качестве монотерапии.

Настоящее изобретение относится также к способам выбора субъекта, имеющего злокачественную опухоль, для лечения, включающего одно или несколько соединений из таблицы 5, или их фармацевтически приемлемые соли, включающим: выбор субъекта, идентифицированного как имеющего клетку злокачественной опухоли, имеющую по меньшей мере одну точечную мутацию в гене NTRK, приводящую к экспрессии белка Trk, содержащего мутацию в одном или нескольких положениях аминокислот (например, мутацию в одном или нескольких из положений аминокислот, показанных в таблицах 1, 2 или 3), для лечения, включающего одно или несколько соединений из таблицы 5, или их фармацевтически приемлемые соли.

Настоящее изобретение относится также к способам выбора субъекта, имеющего злокачественную опухоль, для лечения, включающего одно или несколько соединений из таблицы 5, или их фармацевтически приемлемые соли, и другое противораковое средство или противораковую терапию, включающим: выбор субъекта, идентифицированного как имеющего клетку злокачественной опухоли, имеющую по меньшей мере одну точечную мутацию в гене NTRK, приводящую к экспрессии белка

Trk, содержащего мутацию в одном или нескольких положениях аминокислот (например, мутацию в одном или нескольких из положений аминокислот, показанных в таблицах 1, 2 или 3); и выбор идентифицированного субъекта для лечения, включающего одно или несколько соединений из таблицы 5, или их фармацевтически приемлемые соли, и другое противораковое средство или противораковую терапию.

Некоторые варианты осуществления этих способов дополнительно включают проведение выбранного лечения для идентифицированного субъекта.

Некоторые варианты осуществления этих способов дополнительно включают регистрацию выбранного лечения в медицинской карте идентифицированного субъекта (например, на машиночитаемом носителе). Например, регистрацию того, что субъект выбран для лечения, включающего одно или несколько соединений из таблицы 5, или их фармацевтически приемлемые соли. В некоторых вариантах осуществления, эти способы дополнительно включают регистрацию того, что субъект выбран для лечения, включающего одно или несколько соединений из таблицы 5, или их фармацевтически приемлемые соли, и другое противораковое средство или противораковую терапию, в медицинской карте субъекта (например, на машиночитаемом носителе). В некоторых вариантах осуществления, эти способы дополнительно включают регистрацию того, что субъект выбран для лечения, не включающего первый ингибитор Trk в качестве монотерапии, в медицинской карте субъекта (например, на машиночитаемом носителе).

Настоящее изобретение относится также к способам определения вероятности того, что субъект, имеющий злокачественную опухоль, будет иметь положительный ответ на лечение первым ингибитором Trk в качестве монотерапии, включающим: определение того, имеет ли клетка злокачественной опухоли в образце, полученном от субъекта, по меньшей мере одну точечную мутацию в гене NTRK, приводящую к экспрессии белка Trk, содержащего мутацию в одном или нескольких положениях аминокислот (например, мутацию в одном или нескольких из положений аминокислот, показанных в таблицах 1, 2 или 3); и определение того, что субъект, имеющий клетку злокачественной опухоли, имеющую по меньшей мере одну точечную мутацию в гене NTRK, приводящую к экспрессии белка Trk, содержащего мутацию в одном или нескольких положениях аминокислот (например, мутацию в одном или нескольких из положений аминокислот, показанных в таблицах 1, 2 или 3), имеет уменьшенную вероятность наличия положительного ответа на лечение первым ингибитором Trk в качестве монотерапии.

Настоящее изобретение относится также к способам определения вероятности того, что субъект, имеющий злокачественную опухоль, будет иметь положительный ответ на лечение, включающее одно или несколько соединений из таблицы 5, или их фармацевтически приемлемые соли, включающим: определение того, имеет ли клетка злокачественной опухоли в образце, полученном от субъекта, по меньшей мере одну точечную мутацию в гене NTRK, приводящую к экспрессии белка Trk, содержащего мутацию в одном или нескольких положениях аминокислот (например, мутацию в одном или нескольких из положений аминокислот, показанных в таблицах 1, 2 или 3); и определение того, что субъект, имеющий клетку злокачественной опухоли, имеющую по меньшей мере одну точечную мутацию в гене NTRK, приводящую к экспрессии белка Trk, содержащего мутацию в одном или нескольких положениях аминокислот (например, мутацию в одном или нескольких из положений аминокислот, показанных в таблицах 1, 2 или 3) имеет увеличенную вероятность наличия положительного ответа на лечение, включающее одно или несколько соединений из таблицы 5, или их фармацевтически приемлемые соли.

Настоящее изобретение относится также к способам определения вероятности того,

что субъект, имеющий злокачественную опухоль, будет иметь положительный ответ на лечение первым ингибитором Trk в качестве монотерапии, включающим: определение того, что субъект, имеющий клетку злокачественной опухоли, имеющую по меньшей мере одну точечную мутацию в гене NTRK, приводящую к экспрессии белка Trk, содержащего мутацию в одном или нескольких положениях аминокислот (например, мутацию в одном или нескольких из положений аминокислот, показанных в таблицах 1, 2 или 3), имеет уменьшенную вероятность наличия положительного ответа на лечение первым ингибитором Trk в качестве монотерапии.

Настоящее изобретение относится также к способам определения вероятности того, что субъект, имеющий злокачественную опухоль, будет иметь положительный ответ на лечение, включающее одно или несколько соединений из таблицы 5, или их фармацевтически приемлемые соли, включающим: определение того, что субъект, имеющий клетку злокачественной опухоли, имеющую по меньшей мере одну точечную мутацию в гене NTRK, приводящую к экспрессии белка Trk, содержащего мутацию в одном или нескольких положениях аминокислот (например, мутацию в одном или нескольких из положений аминокислот, показанных в таблицах 1, 2 или 3), имеет увеличенную вероятность наличия положительного ответа на лечение, включающее одно или несколько соединений из таблицы 5, или их фармацевтически приемлемые соли.

Некоторые варианты осуществления этих способов дополнительно включают: подвергание лечению, не включающему первый ингибитор Trk в качестве монотерапии, субъекта, определенного как обладающего уменьшенной вероятностью наличия положительного ответа на лечение первым ингибитором Trk в качестве монотерапии. Некоторые варианты осуществления этих способов дополнительно включают: введение лекарственного средства, включающего одно или несколько соединений из таблицы 5 или их фармацевтически приемлемые соли, субъекту, определенному как обладающему увеличенной вероятностью наличия положительного ответа на лечение, включающее одно или несколько соединений из таблицы 5, или их фармацевтически приемлемые соли.

Настоящее изобретение относится также к способам прогнозирования эффективности лечения первым ингибитором Trk в качестве монотерапии у субъекта, имеющего злокачественную опухоль, включающим: определение, имеет ли клетка злокачественной опухоли в образце, полученном от субъекта, по меньшей мере одну точечную мутацию в гене NTRK, приводящую к экспрессии белка Trk, содержащего мутацию в одном или нескольких положениях аминокислот (например, мутацию в одном или нескольких из положений аминокислот, показанных в таблицах 1, 2 или 3); и определение того, что лечение первым ингибитором Trk в качестве монотерапии с меньшей вероятностью будет являться эффективным у субъекта, имеющего клетку злокачественной опухоли в образце, полученном от субъекта, имеющую по меньшей мере одну точечную мутацию в гене NTRK, приводящую к экспрессии белка Trk, содержащего мутацию в одном или нескольких положениях аминокислот (например, мутацию в одном или нескольких из положений аминокислот, показанных в таблицах 1, 2 или 3).

Настоящее изобретение относится также к способам прогнозирования эффективности лечения, включающего одно или несколько соединений из таблицы 5, или их фармацевтически приемлемые соли, у субъекта, имеющего злокачественную опухоль, включающим: определение того, имеет ли клетка злокачественной опухоли в образце, полученном от субъекта, по меньшей мере одну точечную мутацию в гене NTRK, приводящую к экспрессии белка Trk, содержащего мутацию в одном или нескольких

положений аминокислот (например, мутацию в одном или нескольких из положений аминокислот, показанных в таблицах 1, 2 или 3); и определение того, что лечение, включающее одно или несколько соединений из таблицы 5, или их фармацевтически приемлемые соли, с большей вероятностью будет являться эффективным у субъекта, имеющего клетку злокачественной опухоли в образце, полученном от субъекта, имеющую по меньшей мере одну точечную мутацию в гене NTRK, приводящую к экспрессии белка Trk, содержащего мутацию в одном или нескольких положений аминокислот (например, мутацию в одном или нескольких из положений аминокислот, показанных в таблицах 1, 2 или 3).

Настоящее изобретение относится также к способам прогнозирования эффективности лечения первым ингибитором Trk в качестве монотерапии у субъекта, имеющего злокачественную опухоль, включающим: определение того, что лечение первым ингибитором Trk в качестве монотерапии с меньшей вероятностью будет являться эффективным у субъекта, имеющего клетку злокачественной опухоли в образце, полученном от субъекта, имеющую по меньшей мере одну точечную мутацию в гене NTRK, приводящую к экспрессии белка Trk, содержащего мутацию в одном или нескольких положений аминокислот (например, мутацию в одном или нескольких из положений аминокислот, показанных в таблицах 1, 2 или 3). Некоторые варианты осуществления этих способов дополнительно включают подвергание субъекта лечению, не включающему первый ингибитор Trk в качестве монотерапии.

Настоящее изобретение относится также к способам прогнозирования эффективности лечения, включающего одно или несколько соединений из таблицы 5, или их фармацевтически приемлемые соли, у субъекта, имеющего злокачественную опухоль, включающим: определение того, что лечение, включающее одно или несколько соединений из таблицы 5, или их фармацевтически приемлемые соли, с большей вероятностью будет являться эффективным у субъекта, имеющего клетку злокачественной опухоли в образце, полученном от субъекта, имеющую по меньшей мере одну точечную мутацию в гене NTRK, приводящую к экспрессии белка Trk, содержащего мутацию в одном или нескольких положений аминокислот (например, мутацию в одном или нескольких из положений аминокислот, показанных в таблицах 1, 2 или 3). Некоторые варианты осуществления этих способов дополнительно включают введение субъекту одного или нескольких соединений из таблицы 5 или их фармацевтически приемлемых солей.

Настоящее изобретение относится также к способам выбора лечения для субъекта, имеющего злокачественную опухоль, включающим: (a) введение одной или нескольких доз первого ингибитора Trk субъекту в течение некоторого периода времени; (b) после (a), определения того, имеет ли клетка злокачественной опухоли в образце, полученном от субъекта, по меньшей мере одну точечную мутацию в гене NTRK, приводящую к экспрессии белка Trk, содержащего мутацию в одном или нескольких положений аминокислот (например, мутацию в одном или нескольких из положений аминокислот, показанных в таблицах 1, 2 или 3); и (c) выбор второго ингибитора Trk или лечения, не включающего первый ингибитор Trk со стадии (a) в качестве монотерапии, для субъекта, имеющего клетку злокачественной опухоли, имеющую по меньшей мере одну точечную мутацию в гене NTRK, приводящую к экспрессии белка Trk, содержащего мутацию в одном или нескольких положений аминокислот (например, мутацию в одном или нескольких из положений аминокислот, показанных в таблицах 1, 2 или 3); или (d) выбор дополнительных доз первого ингибитора Trk со стадии (a) для субъекта, имеющего злокачественную опухоль, клетки которой не имеют по меньшей мере одну точечную

мутацию в гене NTRK, приводящую к экспрессии белка Trk, содержащего мутацию в одном или нескольких положениях аминокислот (например, мутацию в одном или нескольких из положений аминокислот, показанных в таблицах 1, 2 или 3).

Настоящее изобретение относится также к способам выбора лечения для субъекта, имеющего злокачественную опухоль, включающим: (а) введение одной или нескольких доз первого ингибитора Trk субъекту в течение некоторого периода времени; (b) после (а), определения того, имеет ли клетка злокачественной опухоли в образце, полученном от субъекта, по меньшей мере одну точечную мутацию в гене NTRK, приводящую к экспрессии белка Trk, содержащего мутацию в одном или нескольких положениях аминокислот (например, мутацию в одном или нескольких из положений аминокислот, показанных в таблицах 1, 2 или 3); и (с) выбор лечения, включающего одно или несколько соединений из таблицы 5, или их фармацевтически приемлемые соли, для субъекта, имеющего клетку злокачественной опухоли, имеющую по меньшей мере одну точечную мутацию в гене NTRK, приводящую к экспрессии белка Trk, содержащего мутацию в одном или нескольких положениях аминокислот (например, мутацию в одном или нескольких из положений аминокислот, показанных в таблицах 1, 2 или 3); или (d) выбор дополнительных доз первого ингибитора Trk для субъекта, имеющего клетку злокачественной опухоли, не имеющую по меньшей мере одну точечную мутацию в гене NTRK, приводящую к экспрессии белка Trk, содержащего мутацию в одном или нескольких положениях аминокислот (например, мутацию в одном или нескольких из положений аминокислот, показанных в таблицах 1, 2 или 3).

Настоящее изобретение относится также к способам выбора лечения для субъекта, имеющего злокачественную опухоль, включающим: (а) введение одной или нескольких доз первого ингибитора Trk субъекту в течение некоторого периода времени; (b) после (а), определение того, имеет ли клетка злокачественной опухоли в образце, полученном от субъекта, по меньшей мере одну точечную мутацию в гене NTRK, приводящую к экспрессии белка Trk, содержащего мутацию в одном или нескольких положениях аминокислот (например, мутацию в одном или нескольких из положений аминокислот, показанных в таблицах 1, 2 или 3); и (с) выбор лечения, включающего одно или несколько соединений из таблицы 5, или их фармацевтически приемлемые соли, и другое противораковое средство или противораковую терапию, для субъекта, имеющего клетку злокачественной опухоли, имеющую по меньшей мере одну точечную мутацию в гене NTRK, приводящую к экспрессии белка Trk, содержащего мутацию в одном или нескольких положениях аминокислот (например, мутацию в одном или нескольких из положений аминокислот, показанных в таблицах 1, 2 или 3); или (d) выбор дополнительных доз первого ингибитора Trk для субъекта, имеющего клетку злокачественной опухоли, не имеющую по меньшей мере одну точечную мутацию в гене NTRK, приводящую к экспрессии белка Trk, содержащего мутацию в одном или нескольких положениях аминокислот (например, мутацию в одном или нескольких из положений аминокислот, показанных в таблицах 1, 2 или 3).

Настоящее изобретение относится также к способам выбора лечения для субъекта, имеющего злокачественную опухоль, включающим: (а) определение того, имеет ли клетка злокачественной опухоли в образце, полученном от субъекта, который имеет злокачественную опухоль, и которому ранее вводили одну или несколько доз первого ингибитора Trk, по меньшей мере одну точечную мутацию в гене NTRK, приводящую к экспрессии белка Trk, содержащего мутацию в одном или нескольких положениях аминокислот (например, мутацию в одном или нескольких из положений аминокислот, показанных в таблицах 1, 2 или 3); (b) выбор второго ингибитора Trk или лечения, не

включающего первый ингибитор Trk со стадии (а) в качестве монотерапии, для субъекта, имеющего клетку злокачественной опухоли, имеющую по меньшей мере одну точечную мутацию в гене NTRK, приводящую к экспрессии белка Trk, содержащего мутацию в одном или нескольких положений аминокислот (например, мутацию в одном или нескольких из положений аминокислот, показанных в таблицах 1, 2 или 3); или (с) выбор дополнительных доз первого ингибитора Trk со стадии (а) для субъекта, имеющего клетку злокачественной опухоли, не имеющую по меньшей мере одну точечную мутацию в гене NTRK, приводящую к экспрессии белка Trk, содержащего мутацию в одном или нескольких положений аминокислот (например, мутацию в одном или нескольких из положений аминокислот, показанных в таблицах 1, 2 или 3).

Некоторые варианты осуществления этих способов включают выбор второго ингибитора Trk или лечения, не включающего первый ингибитор Trk со стадии (а) в качестве монотерапии, для субъекта, имеющего клетку злокачественной опухоли, имеющую по меньшей мере одну точечную мутацию в гене NTRK, приводящую к экспрессии белка Trk, содержащего мутацию в одном или нескольких положений аминокислот (например, мутацию в одном или нескольких из положений аминокислот, показанных в таблицах 1, 2 или 3). Некоторые варианты осуществления этих способов включают выбор дополнительных доз первого ингибитора Trk со стадии (а) для субъекта, имеющего клетку злокачественной опухоли, не имеющую (по меньшей мере одну точечную мутацию в гене NTRK, приводящую к экспрессии белка Trk, содержащего мутацию в одном или нескольких положений аминокислот (например, мутацию в одном или нескольких из положений аминокислот, показанных в таблицах 1, 2 или 3).

Настоящее изобретение относится также к способам выбора лечения для субъекта, имеющего злокачественную опухоль, включающим: (а) определение того, имеет ли клетка злокачественной опухоли в образце, полученном от субъекта, который имеет злокачественную опухоль, и которому ранее вводили одну или несколько доз первого ингибитора Trk, по меньшей мере одну точечную мутацию в гене NTRK, приводящую к экспрессии белка Trk, содержащего мутацию в одном или нескольких положений аминокислот (например, мутацию в одном или нескольких из положений аминокислот, показанных в таблицах 1, 2 или 3); (b) выбор лечения, включающего одно или несколько соединений из таблицы 5 или их фармацевтически приемлемые соли, для субъекта, имеющего клетку злокачественной опухоли, имеющую по меньшей мере одну точечную мутацию в гене NTRK, приводящую к экспрессии белка Trk, содержащего мутацию в одном или нескольких положений аминокислот (например, мутацию в одном или нескольких из положений аминокислот, показанных в таблицах 1, 2 или 3); или (с) выбор дополнительных доз первого ингибитора Trk для субъекта, имеющего клетку злокачественной опухоли, не имеющую по меньшей мере одну точечную мутацию в гене NTRK, приводящую к экспрессии белка Trk, содержащего мутацию в одном или нескольких положений аминокислот (например, мутацию в одном или нескольких из положений аминокислот, показанных в таблицах 1, 2 или 3).

Настоящее изобретение относится также к способам выбора лечения для субъекта, имеющего злокачественную опухоль, включающим: (а) определение того, имеет ли клетка злокачественной опухоли в образце, полученном от субъекта, который имеет злокачественную опухоль, и которому ранее вводили одну или несколько доз первого ингибитора Trk, по меньшей мере одну точечную мутацию в гене NTRK, приводящую к экспрессии белка Trk, содержащего мутацию в одном или нескольких положений аминокислот (например, мутацию в одном или нескольких из положений аминокислот, показанных в таблицах 1, 2 или 3); (b) выбор лечения, включающего одно или несколько

соединений из таблицы 5 или их фармацевтически приемлемые соли, и другое противораковое средство или противораковую терапию, для субъекта, имеющего клетку злокачественной опухоли, имеющую по меньшей мере одну точечную мутацию в гене NTRK, приводящую к экспрессии белка Trk, содержащего мутацию в одном или нескольких положений аминокислот (например, мутацию в одном или нескольких из положений аминокислот, показанных в таблицах 1, 2 или 3); или (с) выбор дополнительных доз первого ингибитора Trk для субъекта, имеющего клетку злокачественной опухоли, не имеющую по меньшей мере одну точечную мутацию в гене NTRK, приводящую к экспрессии белка Trk, содержащего мутацию в одном или нескольких положений аминокислот (например, мутацию в одном или нескольких из положений аминокислот, показанных в таблицах 1, 2 или 3).

Некоторые варианты осуществления любого из способов, описанных в настоящем описании, дополнительно включают регистрацию выбранного лечения в медицинской карте субъекта (например, на машиночитаемом носителе). Некоторые варианты осуществления любого из способов, описанных в настоящем описании, дополнительно включают подвергание субъекта выбранному лечению.

В некоторых вариантах осуществления любого из способов, описанных в настоящем описании, субъекта ранее идентифицировали или диагностировали как имеющего злокачественную опухоль.


В некоторых вариантах осуществления способов, описанных в настоящем описании, лечение, не включающее первый ингибитор Trk в качестве монотерапии, выбрано из лечения, включающего одно или несколько из: хирургии, радиотерапии, химиотерапии, иммунотерапии, гормонотерапии, низкомолекулярных лекарственных средств, нацеленных на другие киназы в пути передачи сигналов Trk, рекомбинантных антител и трансплантата стволовых клеток. В некоторых вариантах осуществления способов, описанных в настоящем описании, лечение, не включающее первый ингибитор Trk в качестве монотерапии, включает: одно или несколько из хирургии, радиотерапии, химиотерапии, иммунотерапии, гормонотерапии, низкомолекулярных лекарственных средств, нацеленных на другие киназы в пути передачи сигналов Trk, рекомбинантных антител и трансплантата стволовых клеток; и один или несколько ингибиторов Trk. В некоторых вариантах осуществления способов, описанных в настоящем описании, лечение, не включающее первый ингибитор Trk в качестве монотерапии, включает одно или несколько соединений из таблицы 5, или их фармацевтически приемлемые соли, в качестве монотерапии.

Настоящее изобретение относится также к способам определения для субъекта риска развития устойчивой к ингибитору Trk злокачественной опухоли, включающим: определение того, имеет ли клетка в образце, полученном от субъекта, по меньшей мере одну точечную мутацию в гене NTRK, приводящую к экспрессии белка Trk, содержащего мутацию в одном или нескольких положений аминокислот (например, мутацию в одном или нескольких из положений аминокислот, показанных в таблицах 1, 2 или 3); и идентификацию субъекта, имеющего клетку, имеющую по меньшей мере одну точечную мутацию в гене NTRK, приводящую к экспрессии белка Trk, содержащего мутацию в одном или нескольких положений аминокислот (например, мутацию в одном или нескольких из положений аминокислот, показанных в таблицах 1, 2 или 3), как имеющего увеличенную вероятность развития устойчивой к ингибитору Trk злокачественной опухоли. Настоящее изобретение относится также к способам определения для субъекта риска развития устойчивой к ингибитору Trk злокачественной опухоли, включающим: идентификацию субъекта, имеющего клетку, имеющую по

меньшей мере одну точечную мутацию в гене NTRK, приводящую к экспрессии белка Trk, содержащего мутацию в одном или нескольких положений аминокислот (например, мутацию в одном или нескольких из положений аминокислот, показанных в таблицах 1, 2 или 3), как имеющего увеличенную вероятность развития устойчивой к ингибитору Trk злокачественной опухоли. Некоторые варианты осуществления этих способов дополнительно включают подтверждение диагноза устойчивой к ингибитору Trk злокачественной опухоли у субъекта, определенного как имеющего увеличенную вероятность развития устойчивой к ингибитору Trk злокачественной опухоли.

Настоящее изобретение относится также к способам определения присутствия устойчивой к ингибитору Trk злокачественной опухоли у субъекта, включающим: определение того, имеет ли клетка злокачественной опухоли в образце, полученном от субъекта, по меньшей мере одну точечную мутацию в гене NTRK, приводящую к экспрессии белка Trk, содержащего мутацию в одном или нескольких положений аминокислот (например, мутацию в одном или нескольких из положений аминокислот, показанных в таблицах 1, 2 или 3); и определение того, что субъект, имеющий клетку злокачественной опухоли, имеющую по меньшей мере одну точечную мутацию в гене NTRK, приводящую к экспрессии белка Trk, содержащего мутацию в одном или нескольких положений аминокислот (например, мутацию в одном или нескольких из положений аминокислот, показанных в таблицах 1, 2 или 3), имеет устойчивую к ингибитору Trk злокачественную опухоль. Настоящее изобретение относится также к способам определения присутствия устойчивой к ингибитору Trk злокачественной опухоли у субъекта, включающим: определение того, что субъект имеет клетку злокачественной опухоли, имеющую по меньшей мере одну точечную мутацию в гене NTRK, приводящую к экспрессии белка Trk, содержащего мутацию в одном или нескольких положений аминокислот (например, мутацию в одном или нескольких из положений аминокислот, показанных в таблицах 1, 2 или 3).

В некоторых вариантах осуществления любого из способов, описанных в настоящем описании, первый ингибитор Trk (например, первый ингибитор Trk на стадии (а)) выбран из группы, состоящей из: энтректиниба (N-[5-(3,5-дифторбензил)-1H-индазол-3-ил]-4-(4-метилпиперазин-1-ил)-2-(тетрагидропиран-4-иламино)-бензамида); сульфата (S)-N-(5-((R)-2-(2,5-дифторфенил)пирролидин-1-ил)пиразоло[1,5-а]пиримидин-3-ил)-3-гидроксипирролидин-1-карбоксамид; кабозантиниба ((N-(4-((6,7-диметоксихинолин-4-ил)окси)фенил)-N'-(4-фторфенил)циклопропан-1,1-дикарбоксамид)); доватиниба (гидрата моно-2-гидроксипропаноата 4-амино-5-фтор-3-[6-(4-метилпиперазин-1-ил)-1H-бензимидазол-2-ил]хинолин-2(1H)-она); белизатиниба (4-фтор-N-(6-((4-(2-гидроксипропан-2-ил)пиперидин-1-ил)метил)-1-((1s,4s)-4-(изопропилкарбамоил)циклогексил)-1H-бензо[d]имидазол-2-ил)бензамида); ситраватиниба (N-(3-фтор-4-((2-(5-(((2-метоксиэтил)амино)метил)пиридин-2-ил)тиено[3,2-b]пиридин-7-ил)окси)фенил)-N-(4-фторфенил)циклопропан-1,1-дикарбоксамид); PLX7486; алтиратиниба (N-(4-((2-(циклопропанкарбоксамидо)пиридин-4-ил)окси)-2,5-дифторфенил)-N-(4-фторфенил)циклопропан-1,1-дикарбоксамид); AZD7451 ((S)-N-(1-(5-фторпиримидин-2-ил)этил)-3-(5-изопропокси-1H-пиразол-3-ил)-3H-имидазо[4,5-b]пиридин-5-амин). В некоторых вариантах осуществления, первый ингибитор Trk (например, первый ингибитор Trk на стадии (а)) представляет собой энтректиниб. В некоторых вариантах осуществления, первый ингибитор Trk (например, первый ингибитор Trk на стадии (а)) представляет собой соединение формулы I:



или его соль гидросульфат. В некоторых вариантах осуществления, первый ингибитор Trk (например, первый ингибитор Trk на стадии (а)) представляет собой кристаллическую форму соединения формулы I или его соли гидросульфата (например, соединение формулы I-HS).

В некоторых вариантах осуществления любого из способов, описанных в настоящем описании, второй ингибитор Trk выбран из группы, состоящей из: замещенного (R)-2-фенилпирролидином имидазопиридазина, AZD6918, GNF-4256, GTx-186, GNF-5837, AZ623, AG-879, алтиратиниба, CT327, ARRY-470, AR-772, AR-523, AR-786, AR-256, AR-618, AZ-23, AZD7451, кабозантиниба, CEP-701, CEP-751, PHA-739358, довитибиба, энтректиниба (N-[5-(3,5-дифторбензил)-1H-индазол-3-ил]-4-(4-метилпиперазин-1-ил)-2-(тетрагидропиран-4-иламино)-бензамида), PLX7486, Gö 6976, GW441756, MGCD516, ONO-5390556, PHA-848125AC, регорафениба, сорафениба, сунитиниба, TSR-011, VM-902A, K252a, 4-аминопиразолилпиримидина и замещенного соединения пиразоло[1,5-а]пиримидина. В некоторых вариантах осуществления любого из способов, описанных в настоящем описании, второй ингибитор Trk выбран из соединения из таблицы 5 или его фармацевтически приемлемой соли.

В некоторых вариантах осуществления любого из способов, описанных в настоящем описании, подозревают, что субъект имеет злокачественную опухоль. В некоторых вариантах осуществления любого из способов, описанных в настоящем описании, субъект имеет один или несколько симптомов злокачественной опухоли. В некоторых вариантах осуществления любого из способов, описанных в настоящем описании, субъекта ранее идентифицировали или диагностировали как имеющего злокачественную опухоль.

В некоторых вариантах осуществления любого из способов, описанных в настоящем описании, стадия определения того, имеет ли клетка в образце, полученном от субъекта, по меньшей мере одну точечную мутацию в гене NTRK, приводящую к экспрессии белка Trk, содержащего мутацию в одном или нескольких положений аминокислот (например, мутацию в одном или нескольких из положений аминокислот, показанных в таблицах 1, 2 или 3), включает проведение анализа для определения присутствия по меньшей мере одной точечной мутации в гене NTRK1 и/или в гене NTRK2, и/или в гене NTRK3 в клетке в образце. В некоторых вариантах осуществления любого из способов, описанных в настоящем описании, стадия определения того, имеет ли клетка злокачественной опухоли в образце, полученном от субъекта, по меньшей мере одну точечную мутацию в гене NTRK, приводящую к экспрессии белка Trk, содержащего мутацию в одном или нескольких положений аминокислот (например, мутацию в одном или нескольких из положений аминокислот, показанных в таблицах 1, 2 или 3), включает проведение анализа для определения присутствия по меньшей мере одной точечной мутации в гене NTRK1 и/или в гене NTRK2, и/или в гене NTRK3 в злокачественной клетке в образце. В некоторых вариантах осуществления любого из способов, описанных в настоящем описании, анализ выбран из группы, состоящей из: электрофореза в денатурирующем градиентном геле (DGGE), электрофореза в геле с градиентом температур (TGGE), капиллярного электрофореза с градиентом температур, анализа

одноцепочечного конформационного полиморфизма, анализа молекулярных маяков, динамического анализа гибридизации, анализа на основе ПЦР, денатурирующей высокоэффективной жидкостной хроматографии. В некоторых вариантах осуществления любого из способов, описанных в настоящем описании, анализ включает секвенирование

5 фрагмента гена NTRK1 и/или гена NTRK2, и/или гена NTRK3, содержащего по меньшей мере одну точечную мутацию.

В некоторых вариантах осуществления любого из способов, описанных в настоящем описании, злокачественная опухоль выбрана из группы, состоящей из: аденокарциномы, адренокортикальной карциномы, нейробластомы надпочечника, плоскоклеточной

10 карциномы ануса, аденокарциномы аппендикса, уротелиальной карциномы мочевого пузыря, аденокарциномы желчных протоков, карциномы мочевого пузыря, уротелиальной карциномы мочевого пузыря, хордомы кости, хронического лимфоцитарного лейкоза костного мозга, острого не лимфоцитарного миелоцитарного лейкоза костного мозга, лимфопролиферативного заболевания костного мозга,

15 множественной миеломы костного мозга, саркомы кости, астроцитомы головного мозга, глиобластомы головного мозга, медуллобластомы головного мозга, менингиомы головного мозга, олигодендроглиомы головного мозга, аденокистозной карциномы молочной железы, карциномы молочной железы, карциномы протоков молочной железы *in situ*, инвазивной карциномы протоков молочной железы, инвазивной

20 лобулярной карциномы молочной железы, метастатической карциномы молочной железы, нейроэндокринной карциномы шейки матки, плоскоклеточной карциномы шейки матки, аденокарциномы ободочной кишки, карциноидной опухоли ободочной кишки, аденокарциномы двенадцатиперстной кишки, эндометриоидной опухоли, аденокарциномы пищевода, внутриглазной меланомы, внутриглазной плоскоклеточной

25 карциномы, карциномы слезных протоков глаза, серозной карциномы фаллопиевой трубы, аденокарциномы желчного пузыря, гломусной опухоли желчного пузыря, аденокарциномы желудочно-пищеводного соединения, аденокистозной карциномы головы и шеи, карциномы головы и шеи, нейробластомы головы и шеи, плоскоклеточной карциномы головы и шеи, хромоформной карциномы почки, медуллярной карциномы

30 почки, почечноклеточной карциномы, папиллярной карциномы почки, саркоматоидной карциномы почки, уротелиальной карциномы почки, лимфоцитарного лейкоза, холангиокарциномы печени, печеночноклеточной карциномы, аденокарциномы легких, аденосквамозной карциномы легких, атипичного карциноида легких, карциносаркомы легких, крупноклеточной нейроэндокринной карциномы легких, немелкоклеточной

35 карциномы легких, саркомы легких, саркоматоидной карциномы легких, мелкоклеточной карциномы легких, недифференцированной мелкоклеточной карциномы легких, плоскоклеточной карциномы легких, диффузной крупноклеточной В-клеточной лимфомы лимфатических узлов, фолликулярной лимфомы лимфатических узлов, медиастинальной В-клеточной лимфомы лимфатических узлов, плазмобластной

40 лимфомы лимфатических узлов, аденокарциномы легких, фолликулярной лимфомы, неходжжкинской лимфомы, недифференцированной карциномы носоглотки и околоносовых пазух, карциномы яичников, карциносаркомы яичников, светлоклеточной карциномы яичников, эпителиальной карциномы яичников, гранулезоклеточной опухоли яичников, серозной карциномы яичников, карциномы поджелудочной железы,

45 аденокарциномы протоков поджелудочной железы, нейроэндокринной карциномы поджелудочной железы, перитонеальной мезотелиомы, перитонеальной серозной карциномы, хориокарциномы плаценты, мезотелиомы плевры, ацинарной аденокарциномы предстательной железы, карциномы предстательной железы,

аденокарциномы прямой кишки, плоскоклеточной карциномы прямой кишки, аднексальной карциномы кожи, базальноклеточной карциномы кожи, меланомы кожи, карциномы кожи из клеток Меркеля, плоскоклеточной карциномы кожи, аденокарциномы тонкого кишечника, стромальных опухолей желудочно-кишечного тракта (GIST) с локализацией в тонком кишечнике, ангиосаркомы мягких тканей, саркомы Юинга мягких тканей, гемангиоэндотелиомы мягких тканей, воспалительной миофибробластической опухоли мягких тканей, лейомиосаркомы мягких тканей, липосаркомы мягких тканей, нейробластомы мягких тканей, параганглиомы мягких тканей, опухоли из периваскулярных эпителиоидных клеток мягких тканей, саркомы мягких тканей, синовиальной саркомы мягких тканей, аденокарциномы желудка, аденокарциномы желудка диффузного типа, аденокарциномы желудка кишечного типа, аденокарциномы желудка кишечного типа, лейомиосаркомы желудка, карциномы тимуса, лимфоцитарной тимомы, папиллярной карциномы щитовидной железы, неизвестной первичной аденокарциномы, неизвестной первичной карциномы, неизвестного первичного злокачественного новообразования, неизвестной первичной меланомы, неизвестной первичной саркоматоидной карциномы, неизвестной первичной плоскоклеточной карциномы, неизвестной недифференцированной нейроэндокринной карциномы, неизвестной первичной недифференцированной мелкоклеточной карциномы, карциносаркомы матки, эндометриальной аденокарциномы матки, эндометриальной эндометриоидной аденокарциномы матки, папиллярной серозной эндометриальной аденокарциномы матки и лейомиосаркомы матки.

В некоторых вариантах осуществления любого из способов, описанных в настоящем описании, по меньшей мере одна точечная мутация в гене NTRK, приводящая к экспрессии белка Trk, содержащего мутацию в одном или нескольких положениях аминокислот, может быть выбрана из (i) по меньшей мере одной точечной мутации в гене NTRK1, приводящей к экспрессии белка TrkA, содержащего мутацию в одном или нескольких положениях(положениях) аминокислот, выбранных из группы, состоящей из: 517, 542, 568, 573, 589, 595, 599, 600, 602, 646, 656, 657, 667 и 676, и/или (ii) по меньшей мере одной точечной мутации в гене NTRK2, приводящей к экспрессии белка TrkB, содержащего мутацию в одном или нескольких положениях(положениях) аминокислот, выбранных из группы, состоящей из: 545, 570, 596, 601, 617, 623, 624, 628, 630, 672, 682, 683, 693 и 702, и/или (iii) по меньшей мере одной точечной мутации в гене NTRK3, приводящей к экспрессии белка TrkC, содержащего мутацию в одном или нескольких положениях(положениях) аминокислот, выбранных из группы, состоящей из: 545, 570, 596, 601, 617, 623, 624, 628, 630, 675, 685, 686, 696 и 705. В некоторых вариантах осуществления любого из способов, описанных в настоящем описании, белок TrkA содержит одну или несколько из следующих аминокислотных замен: G517R, A542V, V573M, F589L, F589C, G595S, G595R, D596V, F600L, F646V, C656Y, C656F, L657V, G667S, G667C, и Y676S. В некоторых вариантах осуществления любого из способов, описанных в настоящем описании, белок TrkB содержит одну или несколько из следующих аминокислотных замен: G545R, A570V, Q596E, Q596P, V601G, F617L, F617C, F617I, G623S, G623R, D624V, R630K, C682Y, C682F, L683V, G693S, и G713S. В некоторых вариантах осуществления любого из способов, описанных в настоящем описании, белок TrkC содержит одну или несколько из следующих аминокислотных замен: G545R, A570V, F617L, G623R, D624V, C685Y, C685F, L686V и G696A.

Настоящее изобретение относится также к наборам, содержащим: один или несколько зондов, каждый из которых специфически гибридизуется с фрагментом гена NTRK1, кодирующим мутацию в одном из положений аминокислот 517, 542, 568, 573, 589, 595,

599, 600, 602, 646, 656, 657, 667 и 676 в белке TrkA; и/или один или несколько зондов, каждый из которых специфически гибридизуется с фрагментом гена NTRK2, кодирующим мутацию в одном из положений аминокислот 545, 570, 596, 601, 617, 623, 624, 628, 630, 672, 682, 683, 693 и 702 в белке TrkB; и/или один или несколько зондов, каждый из которых специфически гибридизуется с фрагментом гена NTRK3, кодирующим мутацию в одном из положений аминокислот 545, 570, 596, 601, 617, 623, 624, 628, 630, 675, 685, 686, 696 и 705 в белке TrkC. Некоторые варианты осуществления этих наборов включают: один или несколько зондов, каждый из которых специфически гибридизуется с фрагментом гена NTRK1, кодирующим мутацию, выбранную из группы, состоящей из: G517R, A542V, V573M, F589L, F589C, G595S, G595R, D596V, F600L, F646V, C656Y, C656F, L657V, G667S, G667C, и Y676S в белке TrkA; и/или один или несколько зондов, каждый из которых специфически гибридизуется с фрагментом гена NTRK2, кодирующим мутацию, выбранную из группы, состоящей из: G545R, A570V, Q596E, Q596P, V601G, F617L, F617C, F617I, G623S, G623R, D624V, R630K, C682Y, C682F, L683V, G693S, и G713S в белке TrkB; и/или один или несколько зондов, каждый из которых специфически гибридизуется с фрагментом гена NTRK3, кодирующим мутацию, выбранную из группы, состоящей из: G545R, A570V, F617L, G623R, D624V, C685Y, C685F, L686V, и G696A в белке TrkC. В некоторых вариантах осуществления любого из наборов, описанных в настоящем описании, один или несколько зондов являются мечеными поддающимся детекции зондом. В некоторых вариантах осуществления любого из наборов, описанных в настоящем описании, один или несколько зондов являются ковалентно присоединенными к субстрату (например, пленке, планшету или бусине).

В рамках изобретения, существительное в единственном числе представляет собой одно или несколько конкретных существительных. Например, фраза «клетка» представляет собой «одну или несколько клеток».

Термин «субъект» обозначает позвоночного, включая любого члена класса млекопитающих, включая человека, спортивных или домашних животных, таких как лошадь (например, беговая лошадь) или собака (например, гончая собака), и высших приматов. В некоторых вариантах осуществления, субъект представляет собой человека.

Термин «лечение» или «положительный ответ на лечение» обозначает улучшение состояния субъекта, имеющего злокачественную опухоль, например, одно или несколько из уменьшения размера одной или нескольких опухолей(опухолей) у субъекта, уменьшение или отсутствие значительных изменений скорости роста одной или нескольких опухолей(опухолей) у субъекта, уменьшение метастазирования у субъекта, и увеличение периода ремиссии для субъекта (например, по сравнению с одним или несколькими показателем(показателями) у субъекта, имеющего сходную опухоль в отсутствие лечения или при другом лечении, или по сравнению с одним или несколькими показателем(показателями) у того же самого субъекта до лечения). Дополнительные показатели для оценки ответа на лечение у субъекта, имеющего злокачественную опухоль, известны в данной области.

Термин «точечная мутация» обозначает изменение в нуклеотидной последовательности гена, приводящее к изменению одной аминокислоты в белке, кодируемом геном. Например, точечная мутация в гене может приводить к делеции одной аминокислоты в белке, кодируемом геном, или может приводить к замене аминокислоты в варианте кодируемого белка дикого типа на другую аминокислоту. Неограничивающие примеры точечных мутаций в гене NTRK1, гене NTRK2 и гене NTRK3 описаны в настоящем описании.

Фраза «значительный уровень канцерогена» означает уровень воздействия канцерогена, как известно, увеличивающий (например, статистически значимо увеличивающий) вероятность развития злокачественной опухоли у субъекта (например, по сравнению с субъектом, не подвергавшегося такому же уровню воздействия канцерогена или подвергавшегося воздействию не поддающегося детекции количества канцерогена).

В рамках изобретения, «первый ингибитор киназы Trk» или «первый ингибитор Trk» представляет собой ингибитор Trk, как описано в настоящем описании, но не включает соединения из таблицы 5 или их фармацевтически приемлемые соли, как определено в настоящем описании. В рамках изобретения, «второй ингибитор киназы Trk» или «второй ингибитор Trk» представляет собой ингибитор Trk, как описано в настоящем описании, и включает соединения из таблицы 5, или их фармацевтически приемлемые соли, как описано в настоящем описании. Когда первый и второй ингибитор Trk оба присутствуют в способе, представленном в настоящем описании, первый и второй ингибиторы киназы Trk являются различными.

Термин «монотерапия» обозначает использование единственного лекарственного средства для лечения конкретного нарушения или заболевания.

Если не указано иное, все технические и научные термины, используемые в настоящем описании, обладают таким же значением, какое является общепринятым для специалиста в области, к которой относится это изобретение. Способы и материалы описаны в настоящем описании для использования по настоящему изобретению; другие, пригодные способы и материалы, известные в данной области, также можно использовать. Материалы, способы и примеры являются только иллюстративными и не являются ограничивающими. Полное содержание всех публикаций, патентных заявок, патентов, последовательностей, записей в базе данных, и других ссылок, упомянутых в настоящем описании, приведено в качестве ссылки. В случае конфликта, настоящее описание, включая определения, имеет преимущество.

Другие признаки и преимущества изобретения очевидны из следующего подробного описания и фигур, и из формулы изобретения.

ОПИСАНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ

Фигура 1 представляет собой блок-схему экспериментальных способов, использованных в примере 1.

Фигура 2 представляет собой кристаллическую структуру TrkA, показывающую локализацию некоторых из придающих устойчивость к ингибитору Trk аминокислотных замен.

Фигура 3 представляет собой схему, показывающую положение некоторых из придающих устойчивость к ингибитору Trk аминокислотных замен.

Фигура 4 представляет собой график РОС для клеток, экспрессирующих слитый белок MPRIP-NTRK1, содержащий одну из придающих устойчивость к ингибитору Trk мутаций, при различных концентрациях сульфата (S)-N-(5-((R)-2-(2,5-дифторфенил)пирролидин-1-ил)пиразоло[1,5-a]пиримидин-3-ил)-3-гидроксипирролидин-1-карбоксамида (соединения А).

Фигура 5 представляет собой блок-схему экспериментальных способов, использованных в примере 3.

Фигура 6А представляет собой график, представляющий частоту мутаций и дозу сульфата (S)-N-(5-((R)-2-(2,5-дифторфенил)пирролидин-1-ил)пиразоло[1,5-a]пиримидин-3-ил)-3-гидроксипирролидин-1-карбоксамида (соединения А), при которой они выделены.

Фигура 6В представляет собой схему RIP-TRKA (кодированного MPRIP-NTRK1) с

избранными доменами белка и идентифицированными придающими устойчивость мутациями.

Фигура 6С представляет собой ленточное представление кристаллографической структуры киназного домена TRKA в комплексе с ингибитором TRK AZ-23 (PDB 4AOJ), показывающее локализацию идентифицированных мутаций.

Фигура 7 представляет собой график процента от контроля для клеток, экспрессирующих слитый белок MPRIP-NTRK1, содержащий конкретные идентифицированные придающие устойчивость к ингибитору TrkA мутации при различных концентрациях сульфата (S)-N-(5-((R)-2-(2,5-дифторфенил)пирролидин-1-ил)пиразоло[1,5-а]пиримидин-3-ил)-3-гидроксипирролидин-1-карбоксамид (соединения А).

Фигура 8 представляет собой фотографию для анализа Вестерн-блоттингом клеток NIH3T3, обработанных указанными концентрациями сульфата (S)-N-(5-((R)-2-(2,5-дифторфенил)пирролидин-1-ил)пиразоло[1,5-а]пиримидин-3-ил)-3-гидроксипирролидин-1-карбоксамид (соединения А) в течение 2 часов.

Фигура 9А представляет собой график, представляющий частоту мутаций и дозу сульфата (S)-N-(5-((R)-2-(2,5-дифторфенил)пирролидин-1-ил)пиразоло[1,5-а]пиримидин-3-ил)-3-гидроксипирролидин-1-карбоксамид (соединения А), при которой они выделены.

Фигура 9В представляет собой схему TRIM24-TRKB (кодированного TRIM24-NTRK1) с избранными доменами белка и идентифицированными придающими устойчивость мутациями.

Фигура 9С представляет собой ленточное представление кристаллографической структуры киназного домена TRKB в комплексе с ингибитором TRK AZ-23 (PDB 4AOJ), показывающее локализацию идентифицированных мутаций.

Фигура 10 представляет собой график процента от контроля для клеток, экспрессирующих слитый белок TRIM24-NTRK2, содержащий конкретные идентифицированные придающие устойчивость к ингибитору TrkB мутации при различных концентрациях сульфата (S)-N-(5-((R)-2-(2,5-дифторфенил)пирролидин-1-ил)пиразоло[1,5-а]пиримидин-3-ил)-3-гидроксипирролидин-1-карбоксамид (соединения А).

Фигура 11 представляет собой фотографию для анализа Вестерн-блоттингом клеток NIH3T3, обработанных указанными концентрациями сульфата (S)-N-(5-((R)-2-(2,5-дифторфенил)пирролидин-1-ил)пиразоло[1,5-а]пиримидин-3-ил)-3-гидроксипирролидин-1-карбоксамид (соединения А) в течение 2 часов.

Фигура 12 представляет собой таблицу, показывающую IC₅₀ для конкретных идентифицированных мутаций TrkA и TrkB.

Фигура 13 представляет собой выравнивание киназных доменов из избранных онкогенов с известными придающими устойчивость мутациями. Полученные *in vitro* (выделены зеленым) или от пациентов (выделены желтым) придающие устойчивость мутации показаны для других киназ, на которые нацелены лекарственные средства, для сравнения.

ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ

Открыты придающие устойчивость к ингибитору Trk мутации в гене NTRK1, в гене NTRK2 и в гене NTRK3. В свете настоящего описания, настоящее изобретение относится к способам лечения субъекта, имеющего злокачественную опухоль, к способам выбора лечения для субъекта, имеющего злокачественную опухоль, к способам выбора субъекта, имеющего злокачественную опухоль, для лечения, не включающего ингибитор Trk, к способам определения того, что субъект, имеющий злокачественную опухоль, будет

иметь положительный ответ на лечение ингибитором Trk, к способам прогнозирования эффективности ингибитора Trk у субъекта, имеющего злокачественную опухоль, к способам определения для субъекта риска развития устойчивой к ингибитору Trk злокачественной опухоли и к способам определения присутствия устойчивой к ингибитору Trk злокачественной опухоли у субъекта, на основании определения того, имеет ли субъект клетку, имеющую (i) по меньшей мере одну точечную мутацию в гене NTRK1, приводящую к экспрессии белка TrkA, содержащего мутацию в одном или нескольких положении(положениях) аминокислот, выбранных из группы, состоящей из: 517, 542, 568, 573, 589, 595, 599, 600, 602, 646, 656, 657, 667 и 676, и/или (ii) по меньшей мере одну точечную мутацию в гене NTRK2, приводящую к экспрессии белка TrkB, содержащего мутацию в одном или нескольких положении(положениях) аминокислот, выбранных из группы, состоящей из: 545, 570, 596, 601, 617, 623, 624, 628, 630, 672, 682, 683, 693 и 702, и/или (iii) по меньшей мере одну точечную мутацию в гене NTRK3, приводящую к экспрессии белка TrkC, содержащего мутацию в одном или нескольких положении(положениях) аминокислот, выбранных из группы, состоящей из: 545, 570, 596, 601, 617, 623, 624, 628, 630, 675, 685, 686, 696 и 705. Настоящее изобретение относится также к наборам, позволяющим детекцию по меньшей мере одной из точечных мутаций в NTRK1 и/или NTRK2, и/или NTRK3.

Детекция и идентификация субъекта, имеющего клетки, имеющие придающую устойчивость к ингибитору Trk мутацию, как описано в настоящем описании (например, (i) по меньшей мере одну точечную мутацию в гене NTRK1, приводящую к экспрессии белка TrkA, содержащего мутацию в одном или нескольких положении(положениях) аминокислот, выбранных из группы, состоящей из: 517, 542, 568, 573, 589, 595, 599, 600, 602, 646, 656, 657, 667 и 676, и/или (ii) по меньшей мере одну точечную мутацию в гене NTRK2, приводящую к экспрессии белка TrkB, содержащего мутацию в одном или нескольких положении(положениях) аминокислот, выбранных из группы, состоящей из: 545, 570, 596, 601, 617, 623, 624, 628, 630, 672, 682, 683, 693 и 702, и/или (iii) по меньшей мере одну точечную мутацию в гене NTRK3, приводящую к экспрессии белка TrkC, содержащего мутацию в одном или нескольких положении(положениях) аминокислот, выбранных из группы, состоящей из: 545, 570, 596, 601, 617, 623, 624, 628, 630, 675, 685, 686, 696 и 705) может улучшать лечение субъекта, например, посредством изменения режима лечения (например, изменения ингибитора Trk, вводимого субъекту, или добавления дополнительного противоракового средства или противораковой терапии) или посредством введения ингибитора Trk, который является эффективным в присутствии придающей устойчивость к ингибитору Trk мутации (например, одного или нескольких из соединений из таблицы 5, или их фармацевтически приемлемых солей).

Как известно в данной области, различные аспекты, описанные ниже, можно использовать в любой комбинации без ограничения.

Родственные тропомиозину рецепторные киназы (Trk)

Включены три различных гена NTRK как играющие роль в злокачественных опухолях (например, в результате открытия хромосомных транслокаций, приводящих к конститутивно активным слитым белкам Trk): NTRK1, NTRK2 и NTRK3. Гены NTRK1, NTRK2 и NTRK3 кодируют TrkA, TrkB и TrkC, соответственно.

Неограничивающие иллюстративные аминокислотные последовательности и последовательности кДНК для TrkA дикого типа представлены ниже. Иллюстративные последовательности белка дикого типа и последовательности кДНК дикого типа, представленные ниже, можно использовать для идентификации точечной мутации в гене NTRK1, или можно использовать для определения мутации в белке TrkA, вызванной

точечной мутацией в гене NTRK1, соответственно. Дополнительные последовательности белка и кДНК дикого типа для TrkA известны в данной области.

Положения аминокислот, используемые для описания замен в TrkA в настоящем описании основаны на последовательности TrkA дикого типа из SEQ ID NO: 1.

- 5 Соответствующее положение аминокислоты в последовательности дикого типа другой изоформы TrkA (SEQ ID NO: 3) можно идентифицировать посредством проведения выравнивания последовательностей между SEQ ID NO: 1 и SEQ ID NO: 3. Сходный способ (например, выравнивание SEQ ID NO: 1 с аминокислотной последовательностью любой другой изоформы TrkA) можно использовать для нахождения совпадения
- 10 положений аминокислот замен в TrkA, описанных в настоящем описании, с соответствующими положениями аминокислот в других изоформах TrkA, известных в данной области.

Изоформа А белка TrkA человека дикого типа (NP_002520) (SEQ ID NO: 1)

Изоформа А кДНК TrkA человека дикого типа (NM_002529) (SEQ ID NO: 2)

- 15 Изоформа В белка TrkA человека дикого типа (NP_001007793) (SEQ ID NO: 3)

Изоформа В кДНК TrkA человека дикого типа (NM_001007792) (SEQ ID NO: 4)

Выравнивание изоформ TrkA (SEQ ID NO: 1 и SEQ ID NO: 3)

S1 68 LTEL YIENQQHLQHLELRDLRGLGELRNLTIVKSGLR FVAPDAFHFTPRLSRLNLSFNAL 127

- 20 L YIENQQHLQHLELRDLRGLGELRNLTIVKSGLR FVAPDAFHFTPRLSRLNLSFNAL
S3 38 LAASYIENQQHLQHLELRDLRGLGELRNLTIVKSGLR FVAPDAFHFTPRLSRLNLSFNAL 97

S1 128 ESLSWKTVQGLSLQELVLSGNPLHCSCALRWLQRWEEEG LGGVPEQKLQCHGQGPLAHMP 187

- 25 ESLSWKTVQGLSLQELVLSGNPLHCSCALRWLQRWEEEG LGGVPEQKLQCHGQGPLAHMP

S3 98 ESLSWKTVQGLSLQELVLSGNPLHCSCALRWLQRWEEEG LGGVPEQKLQCHGQGPLAHMP 157

- 30 S1 188 NASCGVPTLKVQVPNASVDVGDDVLLRCQVEGRGLEQAGWILTELEQSATVMKSGGLPSL 247

NASCGVPTLKVQVPNASVDVGDDVLLRCQVEGRGLEQAGWILTELEQSATVMKSGGLPSL

S3 158 NASCGVPTLKVQVPNASVDVGDDVLLRCQVEGRGLEQAGWILTELEQSATVMKSGGLPSL 217

- 35 S1 248 GLTLANVTSDLNRKNVTCWAENDVGRAEVSQVNV SFPASVQLHTAVEMHHWCIPFSVDG 307

GLTLANVTSDLNRKNVTCWAENDVGRAEVSQVNV SFPASVQLHTAVEMHHWCIPFSVDG

- 40 S3 218 GLTLANVTSDLNRKNVTCWAENDVGRAEVSQVNV SFPASVQLHTAVEMHHWCIPFSVDG 277

S1 308 QPAPSLRWLFNGSVLNETS FIFTEFLEPAANETVRHGCLRLNQPTHVNNGNYTLLAANPF 367

QPAPSLRWLFNGSVLNETS FIFTEFLEPAANETVRHGCLRLNQPTHVNNGNYTLLAANPF

- 45 S3 278 QPAPSLRWLFNGSVLNETS FIFTEFLEPAANETVRHGCLRLNQPTHVNNGNYTLLAANPF 337

S1 368 GQASASIMAAFMDNPFEPNPEDPIPV SFSPVDTNSTSGDPVEKKDET PFGVSVAVGLAVF 427

GQASASIMAAFMNDNPFEPNPEDPIP DTNSTSGDPVEKKDETPFGVSVAVGLAVF
S3 338 GQASASIMAAFMNDNPFEPNPEDPIP-----

DTNSTSGDPVEKKDETPFGVSVAVGLAVF 391

S1 428 ACLFLSTLLVLNKCGRRNKFGINRPAVLAPEDGLAMSLHFMTLGGSSLSPT
5 GKSGSLQ 487

ACLFLSTLLVLNKCGRRNKFGINRPAVLAPEDGLAMSLHFMTLGGSSLSPT
GLQ

S3 392 ACLFLSTLLVLNKCGRRNKFGINRPAVLAPEDGLAMSLHFMTLGGSSLSPT
GKSGSLQ 451

10 S1 488 GHIIENPQYFSDACVHHIKRRDIVLKWELGEGAFGKVFLAECHNLLPEQDKM
LVAVKALK 547

GHIIENPQYFSDACVHHIKRRDIVLKWELGEGAFGKVFLAECHNLLPEQDKMLVAVK
ALK

S3 452 GHIIENPQYFSDACVHHIKRRDIVLKWELGEGAFGKVFLAECHNLLPEQDKM
15 LVAVKALK 511

S1 548 EASESARQDFQREAE LLTMLQHQHIVRFFGVCTEGRPLLMVFEYMRHGDLNR
FLRSHGPD 607

EASESARQDFQREAE LLTMLQHQHIVRFFGVCTEGRPLLMVFEYMRHGDLNRFLRSH
GPD

20 S3 512 EASESARQDFQREAE LLTMLQHQHIVRFFGVCTEGRPLLMVFEYMRHGDLNR
FLRSHGPD 571

S1 608 AKLLAGGEDVAPGPLGLGQLLAVASQVAAGMVYLAGLHFVHRDLATRNC
VGQGLVVKIG 667

AKLLAGGEDVAPGPLGLGQLLAVASQVAAGMVYLAGLHFVHRDLATRNC
25 VVKIG

S3 572 AKLLAGGEDVAPGPLGLGQLLAVASQVAAGMVYLAGLHFVHRDLATRNC
VGQGLVVKIG 631

S1 668 DFGMSRDIYSTDYRVGGRTMLPIRWMPPE S ILYRKFTTESDVWSFGVVLWE
IFTYGKQP 727

30 DFGMSRDIYSTDYRVGGRTMLPIRWMPPE S ILYRKFTTESDVWSFGVVLWEIFTYG
KQP

S3 632 DFGMSRDIYSTDYRVGGRTMLPIRWMPPE S ILYRKFTTESDVWSFGVVLWE
IFTYGKQP 691

S1 728 WYQLSNTEAIDCITQGRELERPRACPPEVYAIMRGCWQREPQQRHSIKDVHA
35 RLQALAAQA 787

WYQLSNTEAIDCITQGRELERPRACPPEVYAIMRGCWQREPQQRHSIKDVHARLQAL
AQA

S3 692 WYQLSNTEAIDCITQGRELERPRACPPEVYAIMRGCWQREPQQRHSIKDVHA
RLQALAAQA 751

40 S1 788 PPVYLDVLG 796

PPVYLDVLG

S3 752 PPVYLDVLG 760

Неограничивающие иллюстративные аминокислотные последовательности и
последовательности кДНК для TrkB дикого типа представлены ниже. Иллюстративные
45 последовательности белка дикого типа и последовательности кДНК дикого типа,
представленные ниже, можно использовать для идентификации точечной мутации в
гене NTRK2 или можно использовать для определения мутации в белке TrkB, вызванной
точечной мутацией в гене NTRK2, соответственно. Дополнительные последовательности

белка и кДНК дикого типа для TrkB известны в данной области.

Положения аминокислот, используемые для описания замен в TrkB в настоящем описании основаны на последовательности TrkB дикого типа из SEQ ID NO: 5.

Соответствующее положение аминокислоты в последовательности дикого типа другой изоформы TrkB можно идентифицировать посредством проведения выравнивания последовательностей между SEQ ID NO: 5 и аминокислотной последовательности другой изоформы TrkB.

Изоформа А белка TrkB человека дикого типа (AAB33109.1) (SEQ ID NO: 5)

Изоформа А кДНК TrkB человека дикого типа (S76473.1) (SEQ ID NO: 6)

Неограничивающие иллюстративные аминокислотные последовательности и последовательности кДНК для TrkC дикого типа представлены ниже. Иллюстративные последовательности белка дикого типа и последовательности кДНК дикого типа, представленные ниже, можно использовать для идентификации точечной мутации в гене NTRK3, или можно использовать для определения мутации в белке TrkC, вызванной точечной мутацией в гене NTRK3, соответственно. Дополнительные последовательности белка и кДНК дикого типа для TrkC известны в данной области.

Положения аминокислот, используемые для описания замен в TrkC в настоящем описании основаны на последовательности TrkC дикого типа из SEQ ID NO: 7.

Соответствующее положение аминокислоты в последовательности дикого типа другой изоформы TrkC можно идентифицировать посредством проведения выравнивания последовательностей между SEQ ID NO: 7 и аминокислотной последовательностью другой изоформы TrkC.

Белок TrkC человека дикого типа (AAB33111.1) (SEQ ID NO: 7)

кДНК TrkC человека дикого типа (S76475.1) (SEQ ID NO: 8)

Точечные мутации NTRK

Точечные мутации в гене NTRK1, в гене NTRK2 и в гене NTRK3 открыты в устойчивых к ингибитору Trk клетках злокачественных опухолей. Точечная мутация в гене NTRK1 может приводить к белку TrkA, содержащему замену аминокислоты в варианте белка TrkA дикого типа на другую аминокислоту. В других примерах, точечная мутация в гене NTRK1 может приводить к белку TrkA с делецией аминокислоты в варианте белка TrkA дикого типа. Иллюстративные придающие устойчивость к ингибитору Trk точечные мутации в белке TrkA перечислены в таблице 1.

Таблица 1. Иллюстративные придающие устойчивость к ингибитору Trk точечные мутации в белке TrkA

	Положение аминокислоты 517 (например, G517R)
	Положение аминокислоты 542 (например, A542V)
	Положение аминокислоты 568 (например, Q568x)
	Положение аминокислоты 573 (например, V573M)
	Положение аминокислоты 589 (например, F589L, F589C)
	Положение аминокислоты 595 (например, G595S, G595R ¹)
	Положение аминокислоты 599 (например, D596V)
	Положение аминокислоты 600 (например, F600L)
	Положение аминокислоты 602 (например, R602x)
	Положение аминокислоты 646 (например, F646V)
	Положение аминокислоты 656 (например, C656Y, C656F)
	Положение аминокислоты 657 (например, L657V)
	Положение аминокислоты 667 (например, G667C ¹ , G667S)
	Положение аминокислоты 676 (например, Y676S)

Буква «x» при использовании для описания мутации аминокислоты в конкретном

положении аминокислоты обозначает (i) замену аминокислоты, присутствующей в том же самом положении аминокислоты в соответствующем белке дикого типа, на другую природную аминокислоту, или (ii) делецию аминокислоты, присутствующей в том же самом положении аминокислоты в соответствующем белке дикого типа.

5 Точечная мутация в гене NTRK2 может приводить к белку TrkB, содержащему замену аминокислоты в варианте белка TrkB дикого типа на другую аминокислоту. В других примерах, точечная мутация в гене NTRK2 может приводить к белку TrkB с делецией аминокислоты в варианте белка TrkB дикого типа. Иллюстративные придающие устойчивость к ингибитору Trk точечные мутации в белке TrkB перечислены в таблице 2.

Таблица 2. Иллюстративные придающие устойчивость к ингибитору Trk точечные мутации в белке TrkB

15	Положение аминокислоты 545 (например, G545R)
	Положение аминокислоты 570 (например, A570V)
	Положение аминокислоты 596 (например, Q596E, Q596P)
	Положение аминокислоты 601 (например, V601G)
	Положение аминокислоты 617 (например, F617L, F617C, F617I)
	Положение аминокислоты 623 (например, G623S, G623R)
	Положение аминокислоты 624 (например, D624V)
20	Положение аминокислоты 628 (например, F628x)
	Положение аминокислоты 630 (например, R630K)
	Положение аминокислоты 672 (например, F672x)
	Положение аминокислоты 682 (например, C682Y, C682F)
	Положение аминокислоты 683 (например, L683V)
	Положение аминокислоты 693 (например, G693S)
25	Положение аминокислоты 702 (например, Y702x)

Буква «x» при использовании для описания мутации аминокислоты в конкретном положении аминокислоты обозначает (i) замену аминокислоты, присутствующей в том же самом положении аминокислоты в соответствующем белке дикого типа на другую природную аминокислоту, или (ii) делецию аминокислоты, присутствующей в том же самом положении аминокислоты в соответствующем белке дикого типа.

30 Точечная мутация в гене NTRK3 может приводить к белку TrkC, содержащему замену аминокислоты в варианте белка TrkC дикого типа на другую аминокислоту. В других примерах, точечная мутация в гене NTRK3 может приводить к белку TrkC с делецией аминокислоты в варианте белка TrkC дикого типа. Иллюстративные придающие устойчивость к ингибитору Trk мутации в белке NTRK3 перечислены в таблице 3.

Таблица 3. Иллюстративные придающие устойчивость к ингибитору Trk точечные мутации в белке TrkC

40	Положение аминокислоты 545 (например, G545R)
	Положение аминокислоты 570 (например, A570V)
	Положение аминокислоты 596 (например, Q596x)
	Положение аминокислоты 601 (например, V601)
	Положение аминокислоты 617 (например, F617x) F617L
	Положение аминокислоты 623 (например, G623R ¹)
	Положение аминокислоты 624 (например, D624V)
45	Положение аминокислоты 628 (например, F628x)
	Положение аминокислоты 630 (например, R630x)
	Положение аминокислоты 675 (например, F675x)
	Положение аминокислоты 685 (например, C685Y, C684F)
	Положение аминокислоты 686 (например, L686V)

Положение аминокислоты 696 (например, G696х) G696A
Положение аминокислоты 705 (например, Y705х)

Буква «х» при использовании для описания мутации аминокислоты в конкретном положении аминокислоты обозначает (i) замену аминокислоты, присутствующей в том же самом положении аминокислоты в соответствующем белке дикого типа на другую природную аминокислоту, или (ii) делецию аминокислоты, присутствующей в том же самом положении аминокислоты в соответствующем белке дикого типа.

Неограничивающие примеры конкретных положений аминокислот, как обнаружено, имеющие мутации (например, замены или делеции) в TrkA в устойчивых к ингибитору Trk клетках злокачественных опухолей, имеющих точечную мутацию NTRK1, are перечислены ниже. Также перечислены ниже различные конкретные мутации аминокислот (например, замены), присутствующие в белках TrkA, присутствующие в устойчивых к ингибитору Trk клетках злокачественных опухолей, имеющих точечную мутацию NTRK1,.

Обнаружено, что устойчивые к ингибитору Trk клетки злокачественных опухолей имеют точечные мутации в гене NTRK1, приводящие к белку TrkA, включающему одну или несколько (например, две, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать или пятнадцать) аминокислотных замен или делеций в положениях аминокислот: 517, 542, 568, 573, 589, 595, 599, 600, 602, 646, 656, 657, 667 и 676 (например, положениях аминокислот, соответствующих положениям в последовательности NP_002520 дикого типа (SEQ ID NO: 1)). Различные конкретные аминокислотные замены, присутствующие в белке TrkA, образованном в устойчивой к ингибитору Trk клетке злокачественной опухоли, включают одну или несколько (например, две, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать или двенадцать) из следующих: G517R, A542V, V573M, F589L, F589C, G595S, G595R, D596V, F600L, F646V, C656Y, C656F, L657V, G667S, G667C и Y676S (например, по сравнению с последовательностью NP_002520 дикого типа (SEQ ID NO: 1)).

Обнаружено, что устойчивые к ингибитору Trk клетки злокачественных опухолей имеют точечные мутации в гене NTRK2, приводящие к белку TrkB, включающему одну или несколько (например, две, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать или пятнадцать) аминокислотных замен или делеций в положениях аминокислот: 545, 570, 596, 601, 617, 623, 624, 628, 630, 672, 682, 683, 693 и 702 (например, положениях аминокислот, соответствующих положениям в последовательности AAB33109.1 дикого типа (SEQ ID NO: 5)). Различные конкретные аминокислотные замены, присутствующие в белке TrkB, образованном в устойчивой к ингибитору Trk клетке злокачественной опухоли, включают одну или несколько (например, две, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, одиннадцать или двенадцать) из следующих: G545R, A570V, Q596E, Q596P, V601G, F617L, F617C, F617I, G623S, G623R, D624V, R630K, C682Y, C682F, L683V, G693S и G713S (например, по сравнению с последовательностью AAB33109.1 дикого типа (SEQ ID NO: 5)).

Обнаружено, что устойчивые к ингибитору Trk клетки злокачественных опухолей имеют точечные мутации в гене NTRK3, приводящие к белку TrkC, включающему одну или несколько (например, две, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать или пятнадцать) аминокислотных замен или делеций в положениях аминокислот: 545, 570, 596, 601, 617, 623, 624, 628, 630, 675, 685, 686, 696 и 705 (например, положениях аминокислот, соответствующих положениям в последовательности дикого типа (SEQ ID NO: 7)). Различные конкретные

аминокислотные замены, присутствующие в белке TrkC, образованном в устойчивой к ингибитору Trk клетке злокачественной опухоли, включают одну или несколько (например, две, три, четыре, пять, шесть или семь, или восемь) из следующих: G545R, A570V, F617L, G623R, D624V, C685Y, C685F, L686V, и G696A (например, по сравнению с последовательностью дикого типа (SEQ ID NO: 7)).

Как понятно специалисту в данной области, конкретные замены, перечисленные выше, являются иллюстративными. Например, когда природная аминокислота в одном положении аминокислоты заменена на другую аминокислоту, понятно, что замена на аминокислоту, имеющую химически родственную боковую цепь аминокислоты, также может присутствовать (и быть детектированной в клетке злокачественной опухоли). Аминокислоты, имеющие химически родственные боковые цепи аминокислот, перечислены в таблице 4.

Таблица 4. Химически родственные боковые цепи аминокислот

Положительно заряженные боковые цепи	Лизин, аргинин, гистидин
Отрицательно заряженные боковые цепи	Глутамат и аспартат
Неполярные и/или Алифатические боковые группы	Глицин, аланин, валин, лейцин, изолейцин и пролин
Полярные, незаряженные боковые группы	Серин, треонин, цистеин, метионин, аспарагин, глутамин
Ароматические боковые группы	Фенилаланин, тирозин и триптофан

Любая из точечных мутаций, описанных в настоящем описании, может приводить, например, к увеличенной каталитической активности киназы TrkA или киназы TrkB, или киназы TrkC. Любая из точечных мутаций, описанных в настоящем описании, может приводить, например, к уменьшению присутствия аутоингибированной конформации киназы Trk (например, киназы TrkA или киназы TrkB, или киназы TrkC). Любая из точечных мутаций, описанных в настоящем описании, может приводить, например, к увеличению присутствия активированной конформации киназы Trk (например, киназы TrkA или киназы TrkB, или киназы TrkC). Любая из точечных мутаций, описанных в настоящем описании, может приводить, например, к измененной третичной структуре киназы TrkA (по сравнению с киназой TrkA дикого типа), которая уменьшает связывание ингибитора Trk с киназой TrkA, или к измененной третичной структуре киназы TrkB (по сравнению с киназой TrkB дикого типа), которая уменьшает связывание ингибитора Trk с киназой TrkB, или к измененной третичной структуре киназы TrkC (по сравнению с киназой TrkC дикого типа), которая уменьшает связывание ингибитора Trk с киназой TrkC. Любая из точечных мутаций, описанных в настоящем описании, может приводить, например, к увеличению значения K_{off} и/или к уменьшению значения K_{on} ингибитора Trk, когда он взаимодействует с белком TrkA (по сравнению с киназой TrkA дикого типа) или с белком TrkB (по сравнению с киназой TrkB дикого типа) или с белком TrkC (по сравнению с киназой TrkC дикого типа).

Выделение геномной ДНК из образца биоптата

Способы выделения геномной ДНК из образца биоптата хорошо известны в данной области. Например, можно использовать ряд коммерчески доступных наборов для выделения геномной ДНК из образца, содержащего клетки млекопитающих (например, образец биоптата). Неограничивающие примеры коммерчески доступных наборов для выделения геномной ДНК из образца, содержащего клетки млекопитающих, включают: ChargeSwitch® gDNA Tissue Kit (Life Technologies), Genomic DNA Isolation Kit (Norgen Biotek Corp., Ontario, Canada), QIAmp DNA FFPE (Qiagen), QIASymphony DSP DNA kits (Qiagen), REPLI-g Mini Kit (Qiagen), Generation Capture Plate Kit (Qiagen), QI Amp 96 DNA Blood Kit (Qiagen), QIAmp DNA Mini kit (Qiagen), Biosprint 15 DNA Blood Kit (Qiagen), Biosprint 96 DNA Blood Kit (Qiagen), MagAttract DNA Mini M48 Kit (Qiagen), QIAmp DNA

Blood BioRobot 9604 Kit (Qiagen), QIAmp DNA Investigator Kit (Qiagen), QIAmp DNA Micro Kit, Xtreme DNA Isolation Kit (Isohelix; Harrietsham, Kent, UK), DDK DNA Isolation Kit (Isohelix) и XtraClean DNA kit (Isohelix). Геномную ДНК можно выделять из образца (например, образца биоптата) с использованием этих и других коммерчески доступных наборов для выделения геномной ДНК, следуя инструкциям производителя.

Иллюстративный способ выделения геномной ДНК из образца (например, образца биоптата) включает стадии: лизиса клеток млекопитающих, присутствующих в образце, преципитации белков в лизате, удаления супернатанта, преципитации геномной ДНК из супернатанта, промывки осадка геномной ДНК этанолом и регидратации осадка геномной ДНК в фармацевтически приемлемом буфере (например, в стерильной или фильтрованной воде, или в забуференном растворе).

Анализы для определения присутствия точечных мутаций

Некоторые из способов, представленных в настоящем описании, включают стадию проведения анализа для определения присутствия (i) по меньшей мере одной (например, двух, трех, четырех, пяти, шести, семи, восьми, девяти, десяти, одиннадцати, двенадцати, тринадцати, четырнадцати или пятнадцати) точечной мутации в гене NTRK1 (например, любой из точечных мутаций в NTRK1, описанных в настоящем описании), и/или (ii) по меньшей мере одной (например, двух, трех, четырех, пяти, шести, семи, восьми, девяти, десяти, одиннадцати, двенадцати, тринадцати, четырнадцати или пятнадцати) точечной мутации в гене NTRK2, и/или (iii) по меньшей мере одной (например, двух, трех, четырех, пяти, шести, семи, восьми, девяти, десяти, одиннадцати, двенадцати, тринадцати, четырнадцати или пятнадцати) точечной мутации в гене NTRK3 (например, любой из точечных мутаций в гене NTRK3, описанных в настоящем описании), в клетке (например, в клетке злокачественной опухоли) в образце от субъекта (например, образец биоптата).

Множество анализов для определения присутствия одной или нескольких точечных мутаций в клетке (например, в клетке злокачественной опухоли) are известны в данной области. Неограничивающие примеры таких анализов (которые можно использовать в любом из способов, описанных в настоящем описании), включают: электрофорез в денатурирующем градиентном геле (DGGE) (Nollau et al., Clin. Chem. 43:1114-1128, 1997), электрофорез в геле с градиентом температур (TGGE) (Nollau et al., Clin. Chem. 43:1114-1128, 1997), капиллярный электрофорез с градиентом температур, анализы одноцепочечного конформационного полиморфизма (см., например, Tahira et al., Human Mutat. 26:69-77, 2005), анализы молекулярных маяков (см., например, Totowa, NJ, Vol. 212, pp. 111-128, 2003), динамическую гибридизацию (см., например, Howell et al., Nature Biotechnol. 17:87-88, 1999), анализы на основе ПЦР (например, ARMS-ПЦР с четырьмя праймерами (см., например, Zhang et al., Plos One 8:e62126, 2013), ПЦР с детекцией в реальном времени, аллелеспецифическую ПЦР (см., например, Gaudet et al., Methods Mol. Biol. 578:415-424, 2009), и анализ генотипирования TaqMan (см., например, Woodward, Methods Mol. Biol. 1145:67-74, 2014, и планшеты для генотипирования TaqMan®OpenArray® от Life Technologies)), анализы с использованием эндонуклеазы Flap (называемые также анализами Invader) (см., например, Olivier et al., Mutat. Res. 573:103-110, 2005), анализы лигирования олигонуклеотидов (см., например, Bruse et al., Biotechniques 45:559-571, 2008) или денатурирующую высокоэффективную жидкостную хроматографию (см., например, Yu et al., J. Clin. Pathol. 58:479-485, 2005), высокоразрешающий анализ плавления амплифицированной последовательности, содержащей точечную мутацию (см., например, Wittwer et al., Clinical Chemistry 49:853-860, 2003), или секвенирование (например, секвенирование по методу Максаму-Гилберта, способы терминции цепи, секвенирование способом дробовика, мостовая ПЦР и способы секвенирования нового

поколения (например, массивно-параллельное опознавательное секвенирование, полони-секвенирование, пиросеквенирование 454, секвенирование Illumina (Solexa), секвенирование SOLiD, полупроводниковое секвенирование с потоком ионов, секвенирование ДНК на наносферах, секвенирование отдельных молекул heliscope, и секвенирование отдельных молекул с детекцией в реальном времени)). Дополнительные детали и обобщение различных способов секвенирования нового поколения описаны в Koboldt et al., Cell 155:27-38, 2013.

В некоторых вариантах осуществления, анализ, используемый для определения присутствия (i) по меньшей мере одной точечной мутации в NTRK1, и/или (ii) по меньшей мере одной точечной мутации в NTRK2, и/или (iii) по меньшей мере одной точечной мутации в NTRK3, включает анализ ПЦР (например, анализ ПЦР с детекцией в реальном времени, например, анализ генотипирования на основе ПЦР с детекцией в реальном времени) (со стадией предварительной амплификации или без нее). В некоторых вариантах осуществления любого из способов, описанных в настоящем описании, анализ, используемый для определения присутствия (i) по меньшей мере одной точечной мутации в NTRK1, и/или (ii) по меньшей мере одной точечной мутации в NTRK2, и/или (iii) по меньшей мере одной точечной мутации в NTRK3, проводят с использованием секвенирования на основе TaqMan® (например, секвенирования OpenArray® на основе TaqMan®, например, высокопроизводительного секвенирования OpenArray® на основе TaqMan®) (со стадией предварительной амплификации или без нее). Способы разработки праймеров для использования в анализах, описанных в настоящем описании, хорошо известны в данной области. Например, несколько поставщиков предоставляют свободное программное обеспечение для дизайна прямых и обратных праймеров для использования в одном из анализов, описанных в настоящем описании. Прямой или обратный праймер для использования в любом из анализов, описанных в настоящем описании, может содержать по меньшей мере 10 (например, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 или 50 нуклеотидов). В некоторых примерах, прямой или обратный праймер, используемый в любом из анализов, описанных в настоящем описании, может включать метку (например, любую из иллюстративных меток, описанных в настоящем описании) или может включать непрерывную последовательность метки (например, между приблизительно 5 нуклеотидами и приблизительно 25 нуклеотидами, между приблизительно 10 нуклеотидами и приблизительно 25 нуклеотидами, между приблизительно 10 нуклеотидами и 20 нуклеотидами, между приблизительно 5 нуклеотидами и приблизительно 20 нуклеотидами), которая не гибридизуется с последовательностью в геноме субъекта (например, в геноме человека).

В некоторых вариантах осуществления, анализ включает использование: одного или нескольких зондов (например, зондов, меченных поддающейся детекции меткой), которые специфически гибридизуются с одним или несколькими фрагментами гена NTRK1, включающими точечную мутацию (например, любую из точечных мутаций в NTRK1, описанных в настоящем описании); и/или одного или нескольких зондов (например, зондов, меченных поддающейся детекции меткой), которые специфически гибридизуются с одним или несколькими фрагментами гена NTRK2, включающими точечную мутацию (например, любую из точечных мутаций в NTRK2, описанных в настоящем описании); и/или одного или нескольких зондов (например, зондов, меченных поддающейся детекции меткой), которые специфически гибридизуются с одним или несколькими фрагментами гена NTRK3, включающими точечную мутацию (например, любую из точечных мутаций в NTRK3, описанных в настоящем описании). Например,

один или нескольких зондов может иметь 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 или 35 нуклеотидов. Дополнительное описание зондов, которые можно использовать в иллюстративных анализах, описано в настоящем описании.

5 Субъекты

В различных вариантах осуществления способов, описанных в настоящем описании, субъект может быть ранее идентифицированным или диагностированным как имеющий злокачественную опухоль (например, любую из злокачественных опухолей, описанных в настоящем описании). Субъект может, например, быть ранее идентифицированным как имеющий клетку злокачественной опухоли, имеющую по меньшей мере одну точечную мутацию в гене NTRK, приводящую к экспрессии белка Trk, содержащего мутацию в одном или нескольких положений аминокислот. Например, (i) по меньшей мере одну (например, две, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать или пятнадцать) точечную мутацию в гене NTRK1 (например, любую из точечных мутаций в NTRK1, описанных в настоящем описании), и/или (ii) по меньшей мере одну (например, две, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать или пятнадцать) точечную мутацию в гене NTRK2 (например, любую из точечных мутаций в NTRK2, описанных в настоящем описании), и/или (iii) по меньшей мере одну (например, две, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать или пятнадцать) точечную мутацию в гене NTRK3 (например, любую из точечных мутаций в NTRK3, описанных в настоящем описании). В некоторых вариантах осуществления, субъект может быть ранее идентифицированным как имеющий (i) по меньшей мере одну (например, две, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать или пятнадцать) точечную мутацию в гене NTRK1, приводящую к экспрессии белка TrkA, содержащего мутацию (например, замену) в одном или нескольких (например, двух, трех, четырех, пяти, шести, семи, восьми, девяти, десяти, одиннадцати, двенадцати, тринадцати, четырнадцати или пятнадцати) положении(положениях) аминокислот, выбранных из группы, состоящей из: 517, 542, 568, 573, 589, 595, 599, 600, 602, 646, 656, 657, 667 и 676 (например, белка TrkA, содержащего одну или несколько (например, две, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать или двенадцать) из G517R, A542V, V573M, F589L, F589C, G595S, G595R, D596V, F600L, F646V, C656Y, C656F, L657V, G667S, G667C и Y676S); и/или (ii) по меньшей мере одну (например, две, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать или пятнадцать) точечную мутацию в гене NTRK2, приводящую к экспрессии TrkB, содержащую мутацию (например, замену) в одном или нескольких (например, двух, трех, четырех, пяти, шести, семи, восьми, девяти, десяти, одиннадцати, двенадцати, тринадцати, четырнадцати или пятнадцати) положении(положениях) аминокислот, выбранных из группы, состоящей из: 545, 570, 596, 601, 617, 623, 624, 628, 630, 672, 682, 683, 693 и 702 (например, белка TrkB, содержащего одну или несколько (например, две, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать или двенадцать) из G545R, A570V, Q596E, Q596P, V601G, F617L, F617C, F617I, G623S, G623R, D624V, R630K, C682Y, C682F, L683V, G693S и G713S; и/или (iii) по меньшей мере одну (например, две, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать или пятнадцать) точечную мутацию в гене NTRK3, приводящую к экспрессии белка TrkC, содержащего мутацию в одном или нескольких (например, двух, трех, четырех, пяти, шести, семи, восьми, девяти, десяти, одиннадцати,

двенадцати, тринадцати, четырнадцати или пятнадцати) положения(положений) аминокислот, выбранных из группы, состоящей из: 545, 570, 596, 601, 617, 623, 624, 628, 630, 675, 685, 686, 696 и 705 (например, белка TrkC, содержащего одну или несколько (например, две, три, четыре, пять, шесть, семь или восемь) из G545R, A570V, F617L, G623R, D624V, C685Y, C685F, L686V и G696A).

В способах определения для субъекта риска развития устойчивой к ингибитору Trk злокачественной опухоли и способах определения присутствия устойчивой к ингибитору Trk злокачественной опухоли у субъекта, субъект может представлять собой недиагностированного субъекта, которого идентифицируют как подвергавшегося воздействию значительного уровня канцерогена(канцерогенов), где у субъекта можно подозревать наличие злокачественной опухоли (например, любой из злокачественных опухолей, описанных в настоящем описании), у субъекта могут присутствовать один или несколько (например, два, три, четыре или пять) симптомов злокачественной опухоли (например, любые из симптомов злокачественной опухоли, описанных в настоящем описании), и/или известно, что субъект подвержен повышенному риску развития злокачественной опухоли (например, при злокачественной опухоли в семейном анамнезе).

В некоторых вариантах осуществления, субъект представляет собой субъекта детского возраста.

Термин «субъект детского возраста», в рамках изобретения относится к пациенту в возрасте менее 21 года на время диагностики или лечения. Термин «детский возраст» можно далее разделить на различные субпопуляции, включая: новорожденных (от рождения и на протяжении первого месяца жизни); младенцев (в возрасте от 1 месяца вплоть до двух лет); детей (в возрасте от двух лет вплоть до 12 лет); и подростков (в возрасте от 12 лет до 21 года (вплоть до двадцать второго дня рождения, но не включая его)). Berhman RE, Kliegman R, Arvin AM, Nelson WE. Nelson Textbook of Pediatrics, 15th Ed. Philadelphia: W.B. Saunders Company, 1996; Rudolph AM, et al. Rudolph's Pediatrics, 21st Ed. New York: McGraw-Hill, 2002; и Avery MD, First LR. Pediatric Medicine, 2nd Ed. Baltimore: Williams & Wilkins; 1994. В некоторых вариантах осуществления, субъект детского возраста представляет собой субъекта от рождения и на протяжении первых 28 суток жизни, в возрасте от 29 суток до менее двух лет, в возрасте от двух лет до менее 12 лет, или в возрасте от 12 лет до 21 года (вплоть до двадцать второго дня рождения, но не включая его). В некоторых вариантах осуществления, субъект детского возраста представляет собой субъекта от рождения и на протяжении первых 28 суток жизни, в возрасте от 29 суток до менее 1 года, в возрасте от одного месяца до менее четырех месяцев, в возрасте от трех месяцев до менее семи месяцев, в возрасте от шести месяцев до менее 1 года, в возрасте от 1 года до менее 2 лет, в возрасте от 2 лет до менее 3 лет, в возрасте от 3 лет до менее 5 лет, в возрасте от 5 лет до менее 10 лет, в возрасте от 6 лет до менее 13 лет, в возрасте от 10 лет до менее 15 лет, или в возрасте от 15 лет до менее 22 лет.

Злокачественные опухоли

Настоящее изобретение относится к способам лечения злокачественных опухолей. Точечные мутации в NTRK1, NTRK2 и NTRK3 обнаружены в устойчивых к ингибитору Trk клетках злокачественных опухолей. Неограничивающие примеры злокачественных опухолей (например, ассоциированных с Trk злокачественных опухолей) включают аденокарциному, аденокарциному, аденокарциному, нейробластому надпочечника, плоскоклеточную карциному ануса, аденокарциному аппендикса, уротелиальную карциному мочевого пузыря, аденокарциному желчных протоков, карциному мочевого

пузыря, уротелиальную карциному мочевого пузыря, хордому кости, хронический лимфоцитарный лейкоз костного мозга, острый не лимфоцитарный миелоцитарный лейкоз костного мозга, лимфопролиферативное заболевание костного мозга, множественную миелому костного мозга, саркому кости, астроцитому головного мозга, 5 глиобластому головного мозга, медуллобластому головного мозга, менингиому головного мозга, олигодендроглиому головного мозга, аденокистозную карциному молочной железы, карциному молочной железы, карциному протоков молочной железы *in situ*, инвазивную карциному протоков молочной железы, инвазивную лобулярную карциному молочной железы, метapластическую карциному молочной железы, 10 нейроэндокринную карциному шейки матки, плоскоклеточной карциномы шейки матки, аденокарциномы ободочной кишки, карциноидную опухоль ободочной кишки, аденокарциному двенадцатиперстной кишки, эндометриоидную опухоль, аденокарциному пищевода, внутриглазную меланому, внутриглазную плоскоклеточную карциному, карциному слезных протоков глаза, серозную карциному фаллопиевой 15 трубы, аденокарциному желчного пузыря, гломусную опухоль желчного пузыря, аденокарциному желудочно-пищеводного соединения, аденокистозную карциному головы и шеи, карциному головы и шеи, нейробластому головы и шеи, плоскоклеточную карциномы головы и шеи, хромоформную карциному почки, медуллярную карциному почки, почечноклеточный рак, папиллярную карциному почки, саркоматоидную 20 карциному почки, уротелиальную карциному почки, лимфоцитарный лейкоз, холангиокарциному печени, печеночноклеточную карциному, аденокарциному легких, аденосквамозную карциному легких, атипичный карциноид легких, карциносаркому легких, крупноклеточную нейроэндокринную карциномы легких, немелкоклеточную карциному легких, саркому легких, саркоматоидную карциному легких, мелкоклеточную 25 карциному легких, недифференцированную мелкоклеточную карциному легких, плоскоклеточную карциному легких, диффузную крупноклеточную В-клеточную лимфому лимфатических узлов, фолликулярную лимфому лимфатических узлов, медиастинальную В-клеточную лимфому лимфатических узлов, плазмобластную лимфому лимфатических узлов, аденокарциному легких, фолликулярную лимфому, 30 лимфому, неходжжискую лимфому, недифференцированную карциному носоглотки и околоносовых пазух, карциному яичников, карциносаркому яичников, светлоклеточную карциному яичников, эпителиальную карциному яичников, гранулезоклеточную опухоль яичников, серозную карциному яичников, карциномы поджелудочной железы, аденокарциномы протоков поджелудочной железы, 35 нейроэндокринную карциному поджелудочной железы, перитонеальную мезотелиому, перитонеальную серозную карциному, хориокарциному плаценты, мезотелиому плевры, ацинарную аденокарциному предстательной железы, карциному предстательной железы, аденокарциному прямой кишки, плоскоклеточную карциному прямой кишки, аднексальную карциному кожи, базальноклеточную карциному кожи, меланому кожи, 40 карциному кожи из клеток Меркеля, плоскоклеточную карциному кожи, аденокарциному тонкого кишечника, стромальные опухоли желудочно-кишечного тракта (GIST) с локализацией в тонком кишечнике, ангиосаркому мягких тканей, саркому Юинга мягких тканей, гемангиоэндотелиому мягких тканей, воспалительную миофибробластическую опухоль мягких тканей, лейомиосаркому мягких тканей, липосаркому мягких тканей, 45 нейробластому мягких тканей, параганглиому мягких тканей, опухоль из периваскулярных эпителиоидных клеток мягких тканей, саркому мягких тканей, синовиальную саркому мягких тканей, аденокарциному желудка, аденокарциному желудка диффузного типа, аденокарциному

желудка кишечного типа, лейомиосаркому желудка, карциному тимуса, лимфоцитарную тимому, папиллярную карциному щитовидной железы, неизвестную первичную аденокарциному, неизвестную первичную карциному, неизвестное первичное злокачественное новообразование, неизвестную первичную меланому, неизвестную
 5 первичную саркоматоидную карциному, неизвестную первичную плоскоклеточную карциному, неизвестную недифференцированную нейроэндокринную карциному, неизвестную первичную недифференцированную мелкоклеточную карциному, карциносаркому матки, эндометриальную аденокарциному матки, эндометриальную эндометриоидную аденокарциному матки, папиллярную серозную эндометриальную
 10 аденокарциному матки и лейомиосаркому матки.

Дополнительные примеры злокачественных опухолей (например, устойчивых к ингибитору Ttk злокачественных опухолей) включают: адренокортикальную карциному, злокачественную опухоль анального канала, злокачественную опухоль аппендикса, атипичную тератоидно-рабдоидную опухоль (например, атипичную тератоидно-
 15 рабдоидную опухоль центральной нервной системы), В-клеточную злокачественную опухоль, злокачественную опухоль желчных протоков, рак мочевого пузыря, злокачественную опухоль кости (например, остеосаркому и злокачественную фиброзную гистиоцитому), злокачественную опухоль мозга (например, опухоль головного и спинного мозга, глиому ствола мозга, эмбриональные опухоли центральной нервной
 20 системы, эмбрионально-клеточные опухоли центральной нервной системы, краниофарингиому и эпендимому), рак молочной железы, бронхогенную карциному, злокачественную опухоль бронхов, злокачественную опухоль гематологических тканей, злокачественную опухоль полости рта или глотки, карциноидную опухоль, рак шейки матки, злокачественные опухоли у детей, хордома, хронический лимфоцитарный лейкоз,
 25 хронические миелопролиферативные неоплазии, рак толстого кишечника, колоректальный рак, Т-клеточную лимфому кожи, карциному протоков *in situ*, эмбриональную опухоль, рак эндометрия, рак пищевода, эстезионейробластому, экстракраниальную эмбрионально-клеточную опухоль, внегонадную эмбрионально-клеточную опухоль, злокачественную опухоль внепеченочных желчных протоков,
 30 злокачественную опухоль глаза (например, ретинобластому), злокачественную опухоль фаллопиевой трубы, фибросаркому, фиброзную гистиоцитому кости, рак желчного пузыря, рак желудка, карциноидную опухоль желудочно-кишечного тракта, эмбрионально-клеточную опухоль, гестационное трофобластическое заболевание, мультиформную глиобластому, глиому (например, глиому низкой степени
 35 злокачественности), рак головы и шеи, злокачественную опухоль сердца, гистиоцитоз, гипогарингеальный рак, воспалительные миофибробластические опухоли, внутрипеченочную холангиокарциному, опухоль островков поджелудочной железы, рак почки (например, почечноклеточный рак), гистиоцитоз клеток Лангерганса, крупноклеточную нейроэндокринную злокачественную опухоль, рак гортани, лейкоз
 40 (например, острый лимфобластный лейкоз, острый миелоидный лейкоз, хронический миелогенный лейкоз и волосатоклеточный лейкоз), злокачественную опухоль губы, рак печени, рак легкого, лимфому Беркитта, лимфому Ходжкина и первичную лимфому центральной нервной системы), медуллобластому, мезотелиому, злокачественную опухоль полости рта, множественную миелому, миелодиспластические синдромы,
 45 злокачественную опухоль полости носа и околоносовых пазух, злокачественную опухоль носоглотки, неоплазию (например, меланоцитарную неоплазию), нефрому, нейробластому, немелкоклеточный рак легкого, злокачественную опухоль полости рта, злокачественную опухоль ротоглотки, рак яичника, рак поджелудочной железы,

параганглиому, злокачественную опухоль паращитовидной железы, глиому у детей, рак полового члена, фарингеальный рак, феохромоцитому, пилоцитарную астроцитому, опухоль гипофиза, неоплазию плазматических клеток, первичную перитонеальную злокачественную опухоль, рак предстательной железы, карциному прямой кишки, злокачественную опухоль слюнной железы, саркому (например, саркому Юинга, рабдомиосаркому, саркому матки и недифференцированную саркому), секреторную карциному молочной железы, синдром Сезари, рак кожи, злокачественную опухоль тонкого кишечника, мелкоклеточный рак легкого, злокачественную опухоль тонкого кишечника, невусы Шпиц, опухоли Шпиц, шпицоидную меланому, рак желудка, плоскоклеточную карциному, плоскоклеточный рак шеи, рак яичка, злокачественную опухоль горла, тимому и карциному тимуса, карцинома щитовидной железы, злокачественную опухоль мочеиспускательного канала, рак тела матки, рак мочевого пузыря, рак влагалища, рак вульвы и опухоль Вильмса.

В некоторых вариантах осуществления, злокачественная опухоль представляет собой злокачественную опухоль у детей. В некоторых вариантах осуществления, злокачественная опухоль у детей представляет собой мезенхимальную злокачественную опухоль. Например, мезенхимальная злокачественная опухоль может быть выбрана из группы, состоящей из: нефромы у детей, врожденной фибросаркомы (CFS), глиомы высокой степени злокачественности у детей (HGG), мезенхимальных злокачественных опухолей (фибросаркомы у младенцев (IF), врожденной мезобластной нефромы, врожденной фибросаркомы у младенцев (CIFIS); пилоцитарной астроцитомы, опухолей мозга, острого лейкоза у детей, подобного лейкозу с Ph острого лимфобластного лейкоза, врожденной клеточной мезобластной нефромы (CMN); фибросаркомы у младенцев, глиомы высокой степени злокачественности у детей (HGG), врожденных диффузных понтинных глиом (DIPG), внестволовых HGG (NBS-HGG), анапластической крупноклеточной лимфомы (ALCL), неходжжкинской лимфомы (NHL), папиллярной карциномы щитовидной железы у детей, саркомы мягких тканей, шпицоидной меланомы, гемангиоперицитомоподобной саркомы у детей, веретенноклеточной саркомы, NOS с мио/гемангиоперицитарным характером роста, рака легкого, солидных опухолей на поздних стадиях у детей, опухолей нейроэктодермального происхождения, колоректального рака у детей, нейробластомы надпочечников и опухолей центральной нервной системы.

В некоторых вариантах осуществления, злокачественная опухоль у детей представляет собой фибросаркому, такую как фибросаркома у младенцев.

В некоторых вариантах осуществления, злокачественная опухоль у детей представляет собой глиому. Например, злокачественная опухоль у детей выбрана из группы, состоящей из: глиомы высокой степени злокачественности у детей (HGG), врожденных диффузных понтинных глиом (DIPG) и внестволовых HGG (NBS-HGG).

Способы диагностики злокачественной опухоли (например, любой из злокачественных опухолей, описанных в настоящем описании) известны в данной области. Например, медицинский работник (например, терапевт) может диагностировать субъекта как имеющего злокачественную опухоль посредством наблюдения одного или нескольких симптомов злокачественной опухоли у субъекта. Неограничивающие примеры симптомов злокачественной опухоли включают лихорадку, утомляемость, боль, гиперпигментацию, желтуху, покраснение, прурит, избыточный рост волос, длительную констипацию, диарею, изменение объема стула, боль при мочеиспускании, кровь в моче, изменение функции мочевого пузыря, незаживающие язвы, белые пятна в ротовой полости или на языке, необычные кровотечения или испражнения, несварение,

трудности с глотанием, изменения бородавок, родинок или веснушек, непрекращающийся кашель, хрипоту, шишку или область утолщения, которые можно почувствовать под кожей, изменения массы, затрудненное дыхание, дискомфорт после еды, персистирующую, необъяснимую боль в мышцах или суставах, персистирующую, необъяснимую лихорадку и ночную потливость, и необъяснимые гематомы. Диагностика злокачественной опухоли медицинским работником (например, терапевтом) может также включать проведение лабораторных исследований (например, анализов мочи или крови, например, полного анализа крови), анализов визуализации (например, компьютерной томографии (СТ), остеосцинтиграфии, магнитно-резонансной томографии (MRI), сканирования с использованием позитронной эмиссионной томографии (PET), ультразвукового и рентгеновского исследования) и получения и/или исследования образца биоптата от субъекта.

Устойчивая к ингибитору Trk клетка злокачественной опухоли может иметь, например, увеличенную скорость роста в присутствии по меньшей мере одного ингибитора Trk (например, любого из ингибиторов Trk, описанных в настоящем описании или известных в данной области) по сравнению со скоростью роста контрольной клетки от контрольного субъекта, имеющего такой же тип злокачественной опухоли и не имеющего одной или нескольких из точечных мутаций в гене NTRK1, описанных в настоящем описании, или одной или нескольких из точечных мутаций в гене NTRK2, описанных в настоящем описании, или точечной мутации в гене NTRK3, описанной в настоящем описании, при приведении в контакт по меньшей мере с одним ингибитором Trk (например, первым ингибитором Trk). Специалисту в данной области понятно, что устойчивую к ингибитору Trk клетку злокачественной опухоли и контрольную клетку приводят в контакт с одной и той же концентрацией по меньшей мере одного ингибитора Trk. Например, скорость роста устойчивой к ингибитору Trk клетки злокачественной опухоли увеличена на от приблизительно 1% до приблизительно 100%, приблизительно 95%, приблизительно 90%, приблизительно 85%, приблизительно 80%, приблизительно 75%, приблизительно 70%, приблизительно 65%, приблизительно 60%, приблизительно 55%, приблизительно 50%, приблизительно 45%, приблизительно 40%, приблизительно 35%, приблизительно 30%, приблизительно 25%, приблизительно 20%, приблизительно 15, приблизительно 10% или приблизительно 5%; на от приблизительно 5% до приблизительно 100%, приблизительно 95%, приблизительно 90%, приблизительно 85%, приблизительно 80%, приблизительно 75%, приблизительно 70%, приблизительно 65%, приблизительно 60%, приблизительно 55%, приблизительно 50%, приблизительно 45%, приблизительно 40%, приблизительно 35%, приблизительно 30%, приблизительно 25%, приблизительно 20%, приблизительно 15 или приблизительно 10%; на от приблизительно 10% до приблизительно 100%, приблизительно 95%, приблизительно 90%, приблизительно 85%, приблизительно 80%, приблизительно 75%, приблизительно 70%, приблизительно 65%, приблизительно 60%, приблизительно 55%, приблизительно 50%, приблизительно 45%, приблизительно 40%, приблизительно 35%, приблизительно 30%, приблизительно 25%, приблизительно 20% или приблизительно 15%; на от приблизительно 15% до приблизительно 100%, приблизительно 95%, приблизительно 90%, приблизительно 85%, приблизительно 80%, приблизительно 75%, приблизительно 70%, приблизительно 65%, приблизительно 60%, приблизительно 55%, приблизительно 50%, приблизительно 45%, приблизительно 40%, приблизительно 35%, приблизительно 30%, приблизительно 25% или приблизительно 20%; на от приблизительно 20% до приблизительно 100%, приблизительно 95%, приблизительно 90%, приблизительно 85%, приблизительно 80%, приблизительно 75%, приблизительно

70%, приблизительно 65%, приблизительно 60%, приблизительно 55%, приблизительно 50%, приблизительно 45%, приблизительно 40%, приблизительно 35%, приблизительно 30% или приблизительно 25%; на от приблизительно 25% до приблизительно 100%, приблизительно 95%, приблизительно 90%, приблизительно 85%, приблизительно 80%,
 5 приблизительно 75%, приблизительно 70%, приблизительно 65%, приблизительно 60%, приблизительно 55%, приблизительно 50%, приблизительно 45%, приблизительно 40%, приблизительно 35% или приблизительно 30%; на от приблизительно 30% до приблизительно 100%, приблизительно 95%, приблизительно 90%, приблизительно 85%, приблизительно 80%, приблизительно 75%, приблизительно 70%, приблизительно
 10 65%, приблизительно 60%, приблизительно 55%, приблизительно 50%, приблизительно 45%, приблизительно 40% или приблизительно 35%; на от приблизительно 35% до приблизительно 100%, приблизительно 95%, приблизительно 90%, приблизительно 85%, приблизительно 80%, приблизительно 75%, приблизительно 70%, приблизительно 65%, приблизительно 60%, приблизительно 55%, приблизительно 50%, приблизительно
 15 45% или приблизительно 40%; на от приблизительно 40% до приблизительно 100%, приблизительно 95%, приблизительно 90%, приблизительно 85%, приблизительно 80%, приблизительно 75%, приблизительно 70%, приблизительно 65%, приблизительно 60%, приблизительно 55%, приблизительно 50% или приблизительно 45%; на от приблизительно 45% до приблизительно 100%, приблизительно 95%, приблизительно
 20 90%, приблизительно 85%, приблизительно 80%, приблизительно 75%, приблизительно 70%, приблизительно 65%, приблизительно 60%, приблизительно 55%, до приблизительно 50%; на от приблизительно 50% до приблизительно 100%, приблизительно 95%, приблизительно 90%, приблизительно 85%, приблизительно 80%, приблизительно 75%, приблизительно 70%, приблизительно 65%, приблизительно 60%, до приблизительно
 25 55%; на от приблизительно 55% до приблизительно 100%, приблизительно 95%, приблизительно 90%, приблизительно 85%, приблизительно 80%, приблизительно 75%, приблизительно 70%, приблизительно 65% или приблизительно 60%; на от приблизительно 60% до приблизительно 100%, приблизительно 95%, приблизительно 90%, приблизительно 85%, приблизительно 80%, приблизительно 75%, приблизительно
 30 70% или приблизительно 65%; на от приблизительно 65% до приблизительно 100%, приблизительно 95%, приблизительно 90%, приблизительно 85%, приблизительно 80%, приблизительно 75% или приблизительно 70%; на от приблизительно 70% до приблизительно 100%, приблизительно 95%, приблизительно 90%, приблизительно 85%, приблизительно 80%, приблизительно 75%; на от приблизительно 75% до
 35 приблизительно 100%, приблизительно 95%, приблизительно 90%, приблизительно 85% или приблизительно 80%; на от приблизительно 80% до приблизительно 100%, приблизительно 95%, приблизительно 90% или приблизительно 85%; на от приблизительно 85% до приблизительно 100%, приблизительно 95% или приблизительно 90%; на от приблизительно 90% до приблизительно 100% или приблизительно 95%; или
 40 на от приблизительно 95% до приблизительно 100% (по сравнению со скоростью роста контрольной клетки от контрольного субъекта, имеющего такой же тип злокачественной опухоли и не имеющего одной или нескольких из точечных мутаций в гене NTRK1, описанных в настоящем описании, или одной или нескольких из точечных мутаций в гене NTRK2, описанных в настоящем описании, или одной или нескольких из точечных мутаций в гене NTRK3, описанных в настоящем описании, при приведении в контакт
 45 по меньшей мере с одним ингибитором Trk).

В некоторых вариантах осуществления, устойчивая к ингибитору Trk злокачественная опухоль может являться устойчивой к лечению с использованием сульфата (S)-N-(5-(

(R)-2-(2,5-дифторфенил)пирролидин-1-ил)пиразоло[1,5-а]пиримидин-3-ил)-3-гидроксипирролидин-1-карбоксамид (или его полиморфа), но устойчивая к ингибитору Trk злокачественная опухоль все еще является чувствительной к лечению, включающему одно или несколько соединений из таблицы 5, или их фармацевтически приемлемые соли. В некоторых вариантах осуществления, устойчивая к ингибитору Trk злокачественная опухоль может являться устойчивой к лечению энтректинибом, но устойчивая к ингибитору Trk злокачественная опухоль все еще является чувствительной к лечению, включающему одно или несколько соединений из таблицы 5, или их фармацевтически приемлемые соли.

Устойчивая к ингибитору Trk злокачественная опухоль у субъекта может иметь, например, увеличенную скорость роста солидной опухоли при лечении субъекта с использованием по меньшей мере одного ингибитора Trk (например, первого ингибитора Trk) по сравнению со скоростью роста контрольной солидной опухоли у контрольного субъекта, подвергнутого лечению с использованием по меньшей мере одного ингибитора Trk и имеющего такой же тип злокачественной опухоли и не имеющего одной или нескольких из точечных мутаций в гене NTRK1, описанных в настоящем описании, или одной или нескольких из точечных мутаций в гене NTRK2, описанных в настоящем описании, или точечной мутации в гене NTRK3, описанной в настоящем описании). Специалисту в данной области понятно, что субъекту и контрольному субъекту вводят одну и ту же концентрацию по меньшей мере одного ингибитора Trk. Например, скорость роста солидной опухоли у субъекта, имеющего устойчивую к ингибитору Trk злокачественную опухоль и подвергнутого введению по меньшей мере одного ингибитора Trk, увеличена на от приблизительно 1% до приблизительно 100%, приблизительно 95%, приблизительно 90%, приблизительно 85%, приблизительно 80%, приблизительно 75%, приблизительно 70%, приблизительно 65%, приблизительно 60%, приблизительно 55%, приблизительно 50%, приблизительно 45%, приблизительно 40%, приблизительно 35%, приблизительно 30%, приблизительно 25%, приблизительно 20%, приблизительно 15, приблизительно 10% или приблизительно 5%; на от приблизительно 5% до приблизительно 100%, приблизительно 95%, приблизительно 90%, приблизительно 85%, приблизительно 80%, приблизительно 75%, приблизительно 70%, приблизительно 65%, приблизительно 60%, приблизительно 55%, приблизительно 50%, приблизительно 45%, приблизительно 40%, приблизительно 35%, приблизительно 30%, приблизительно 25%, приблизительно 20%, приблизительно 15 или приблизительно 10%; на от приблизительно 10% до приблизительно 100%, приблизительно 95%, приблизительно 90%, приблизительно 85%, приблизительно 80%, приблизительно 75%, приблизительно 70%, приблизительно 65%, приблизительно 60%, приблизительно 55%, приблизительно 50%, приблизительно 45%, приблизительно 40%, приблизительно 35%, приблизительно 30%, приблизительно 25%, приблизительно 20% или приблизительно 15%; на от приблизительно 15% до приблизительно 100%, приблизительно 95%, приблизительно 90%, приблизительно 85%, приблизительно 80%, приблизительно 75%, приблизительно 70%, приблизительно 65%, приблизительно 60%, приблизительно 55%, приблизительно 50%, приблизительно 45%, приблизительно 40%, приблизительно 35%, приблизительно 30%, приблизительно 25% или приблизительно 20%; на от приблизительно 20% до приблизительно 100%, приблизительно 95%, приблизительно 90%, приблизительно 85%, приблизительно 80%, приблизительно 75%, приблизительно 70%, приблизительно 65%, приблизительно 60%, приблизительно 55%, приблизительно 50%, приблизительно 45%, приблизительно 40%, приблизительно 35%, приблизительно 30% или приблизительно 25%; на от приблизительно 25% до приблизительно 100%,

приблизительно 95%, приблизительно 90%, приблизительно 85%, приблизительно 80%, приблизительно 75%, приблизительно 70%, приблизительно 65%, приблизительно 60%, приблизительно 55%, приблизительно 50%, приблизительно 45%, приблизительно 40%, приблизительно 35% или приблизительно 30%; на от приблизительно 30% до

5 приблизительно 100%, приблизительно 95%, приблизительно 90%, приблизительно 85%, приблизительно 80%, приблизительно 75%, приблизительно 70%, приблизительно 65%, приблизительно 60%, приблизительно 55%, приблизительно 50%, приблизительно 45%, приблизительно 40% или приблизительно 35%; на от приблизительно 35% до

10 приблизительно 100%, приблизительно 95%, приблизительно 90%, приблизительно 85%, приблизительно 80%, приблизительно 75%, приблизительно 70%, приблизительно 65%, приблизительно 60%, приблизительно 55%, приблизительно 50%, приблизительно 45% или приблизительно 40%; на от приблизительно 40% до приблизительно 100%, приблизительно 95%, приблизительно 90%, приблизительно 85%, приблизительно 80%, приблизительно 75%, приблизительно 70%, приблизительно 65%, приблизительно 60%,

15 приблизительно 55%, приблизительно 50% или приблизительно 45%; на от приблизительно 45% до приблизительно 100%, приблизительно 95%, приблизительно 90%, приблизительно 85%, приблизительно 80%, приблизительно 75%, приблизительно 70%, приблизительно 65%, приблизительно 60%, приблизительно 55%, приблизительно 50%; на от приблизительно 50% до приблизительно 100%, приблизительно 95%,

20 приблизительно 90%, приблизительно 85%, приблизительно 80%, приблизительно 75%, приблизительно 70%, приблизительно 65%, приблизительно 60%, до приблизительно 55%; на от приблизительно 55% до приблизительно 100%, приблизительно 95%, приблизительно 90%, приблизительно 85%, приблизительно 80%, приблизительно 75%, приблизительно 70%, приблизительно 65% или приблизительно 60%; на от

25 приблизительно 60% до приблизительно 100%, приблизительно 95%, приблизительно 90%, приблизительно 85%, приблизительно 80%, приблизительно 75%, приблизительно 70% или приблизительно 65%; на от приблизительно 65% до приблизительно 100%, приблизительно 95%, приблизительно 90%, приблизительно 85%, приблизительно 80%, приблизительно 75% или приблизительно 70%; на от приблизительно 70% до

30 приблизительно 100%, приблизительно 95%, приблизительно 90%, приблизительно 85%, приблизительно 80%, приблизительно 75%; на от приблизительно 75% до приблизительно 100%, приблизительно 95%, приблизительно 90%, приблизительно 85% или приблизительно 80%; на от приблизительно 80% до приблизительно 100%, приблизительно 95%, приблизительно 90% или приблизительно 85%; на от

35 приблизительно 85% до приблизительно 100%, приблизительно 95% или приблизительно 90%; на от приблизительно 90% до приблизительно 100% или приблизительно 95%; или на от приблизительно 95% до приблизительно 100% (по сравнению со скоростью роста солидной опухоли у контрольного субъекта, имеющего такой же тип злокачественной опухоли и не имеющего одной или нескольких из точечных мутаций в гене NTRK1,

40 описанных в настоящем описании, или одной или нескольких из точечных мутаций в гене NTRK2, описанных в настоящем описании, или точечной мутации в гене NTRK3, описанной в настоящем описании, и подвергнутого введению такого же по меньшей мере одного ингибитора Trk).

Устойчивая к ингибитору Trk злокачественная опухоль у субъекта может иметь,

45 например, уменьшенную скорость апоптоза в солидной опухоли при лечении субъекта с использованием по меньшей мере одного ингибитора Trk (например, первого ингибитора Trk) по сравнению со скоростью апоптоза контрольной солидной опухоли у контрольного субъекта, подвергнутого лечению с использованием по меньшей мере

одного ингибитора Trk и имеющего такой же тип злокачественной опухоли, и не имеющего одной или нескольких из точечных мутаций в гене NTRK1, описанных в настоящем описании, или одной или нескольких из точечных мутаций в гене NTRK2, описанных в настоящем описании, или одной или нескольких из точечных мутаций в гене NTRK3, описанных в настоящем описании). Специалисту в данной области понятно, что субъекту и контрольному субъекту вводят одну и ту же концентрацию по меньшей мере одного ингибитора Trk. Например, скорость апоптоза солидной опухоли у субъекта, имеющего устойчивую к ингибитору Trk злокачественную опухоль и подвергнутого введению по меньшей мере одного ингибитора Trk, уменьшена на от приблизительно 1% до приблизительно 100%, приблизительно 95%, приблизительно 90%, приблизительно 85%, приблизительно 80%, приблизительно 75%, приблизительно 70%, приблизительно 65%, приблизительно 60%, приблизительно 55%, приблизительно 50%, приблизительно 45%, приблизительно 40%, приблизительно 35%, приблизительно 30%, приблизительно 25%, приблизительно 20%, приблизительно 15, приблизительно 10% или приблизительно 5%; на от приблизительно 5% до приблизительно 100%, приблизительно 95%, приблизительно 90%, приблизительно 85%, приблизительно 80%, приблизительно 75%, приблизительно 70%, приблизительно 65%, приблизительно 60%, приблизительно 55%, приблизительно 50%, приблизительно 45%, приблизительно 40%, приблизительно 35%, приблизительно 30%, приблизительно 25%, приблизительно 20%, приблизительно 15 или приблизительно 10%; на от приблизительно 10% до приблизительно 100%, приблизительно 95%, приблизительно 90%, приблизительно 85%, приблизительно 80%, приблизительно 75%, приблизительно 70%, приблизительно 65%, приблизительно 60%, приблизительно 55%, приблизительно 50%, приблизительно 45%, приблизительно 40%, приблизительно 35%, приблизительно 30%, приблизительно 25%, приблизительно 20% или приблизительно 15%; на от приблизительно 15% до приблизительно 100%, приблизительно 95%, приблизительно 90%, приблизительно 85%, приблизительно 80%, приблизительно 75%, приблизительно 70%, приблизительно 65%, приблизительно 60%, приблизительно 55%, приблизительно 50%, приблизительно 45%, приблизительно 40%, приблизительно 35%, приблизительно 30%, приблизительно 25% или приблизительно 20%; на от приблизительно 20% до приблизительно 100%, приблизительно 95%, приблизительно 90%, приблизительно 85%, приблизительно 80%, приблизительно 75%, приблизительно 70%, приблизительно 65%, приблизительно 60%, приблизительно 55%, приблизительно 50%, приблизительно 45%, приблизительно 40%, приблизительно 35%, приблизительно 30% или приблизительно 25%; на от приблизительно 25% до приблизительно 100%, приблизительно 95%, приблизительно 90%, приблизительно 85%, приблизительно 80%, приблизительно 75%, приблизительно 70%, приблизительно 65%, приблизительно 60%, приблизительно 55%, приблизительно 50%, приблизительно 45%, приблизительно 40%, приблизительно 35% или приблизительно 30%; на от приблизительно 30% до приблизительно 100%, приблизительно 95%, приблизительно 90%, приблизительно 85%, приблизительно 80%, приблизительно 75%, приблизительно 70%, приблизительно 65%, приблизительно 60%, приблизительно 55%, приблизительно 50%, приблизительно 45%, приблизительно 40% или приблизительно 35%; на от приблизительно 35% до приблизительно 100%, приблизительно 95%, приблизительно 90%, приблизительно 85%, приблизительно 80%, приблизительно 75%, приблизительно 70%, приблизительно 65%, приблизительно 60%, приблизительно 55%, приблизительно 50%, приблизительно 45% или приблизительно 40%; на от приблизительно 40% до приблизительно 100%, приблизительно 95%, приблизительно 90%, приблизительно 85%, приблизительно 80%, приблизительно 75%, приблизительно 70%, приблизительно

65%, приблизительно 60%, приблизительно 55%, приблизительно 50% или приблизительно 45%; на от приблизительно 45% до приблизительно 100%, приблизительно 95%, приблизительно 90%, приблизительно 85%, приблизительно 80%, приблизительно 75%, приблизительно 70%, приблизительно 65%, приблизительно 60%,
 5 приблизительно 55%, до приблизительно 50%; на от приблизительно 50% до приблизительно 100%, приблизительно 95%, приблизительно 90%, приблизительно 85%, приблизительно 80%, приблизительно 75%, приблизительно 70%, приблизительно 65%, приблизительно 60%, до приблизительно 55%; на от приблизительно 55% до приблизительно 100%, приблизительно 95%, приблизительно 90%, приблизительно 85%,
 10 приблизительно 80%, приблизительно 75%, приблизительно 70%, приблизительно 65% или приблизительно 60%; на от приблизительно 60% до приблизительно 100%, приблизительно 95%, приблизительно 90%, приблизительно 85%, приблизительно 80%, приблизительно 75%, приблизительно 70% или приблизительно 65%; на от приблизительно 65% до приблизительно 100%, приблизительно 95%, приблизительно 90%,
 15 приблизительно 85%, приблизительно 80%, приблизительно 75% или приблизительно 70%; на от приблизительно 70% до приблизительно 100%, приблизительно 95%, приблизительно 90%, приблизительно 85%, приблизительно 80%, до приблизительно 75%; на от приблизительно 75% до приблизительно 100%, приблизительно 95%, приблизительно 90%, приблизительно 85% или приблизительно 80%,
 20 приблизительно 80%; на от приблизительно 80% до приблизительно 100%, приблизительно 95%, приблизительно 90% или приблизительно 85%; на от приблизительно 85% до приблизительно 100%, приблизительно 95% или приблизительно 90%; на от приблизительно 90% до приблизительно 100% или приблизительно 95%; или на от приблизительно 95% до приблизительно 100% (по сравнению со скоростью апоптоза
 25 в солидной опухоли у контрольного субъекта, имеющего такой же тип злокачественной опухоли и не имеющего одной или нескольких из точечных мутаций в гене NTRK1, описанных в настоящем описании, или одной или нескольких из точечных мутаций в гене NTRK2, описанных в настоящем описании или одной или нескольких из точечных мутаций в гене NTRK3, описанных в настоящем описании, и подвергнутого введению
 30 такого же по меньшей мере одного ингибитора Trk).

Иллюстративные способы определения присутствия устойчивой к ингибитору Trk злокачественной опухоли у субъекта представлены в настоящем описании.

Ингибиторы Trk

Множество ингибиторов Trk известно в данной области. Способность ингибитора Trk действовать в качестве ингибитора Trk можно тестировать с использованием одного
 35 или обеих из анализов, описанных в примерах А и В в Патенте США No. 8513263, содержание которого приведено в настоящем описании в качестве ссылки.

Ингибитор Trk может иметь IC₅₀ от приблизительно 0,1 нМ до приблизительно 50 мкМ, приблизительно 45 мкМ, приблизительно 40 мкМ, приблизительно 35 мкМ,
 40 приблизительно 30 мкМ, приблизительно 25 мкМ, приблизительно 20 мкМ, приблизительно 15 мкМ, приблизительно 10 мкМ, приблизительно 5 мкМ, приблизительно 1 мкМ, приблизительно 950 нМ, приблизительно 900 нМ, приблизительно 850 нМ, приблизительно 800 нМ, приблизительно 750 нМ, приблизительно 700 нМ, приблизительно 650 нМ, приблизительно 600 нМ,
 45 приблизительно 550 нМ, приблизительно 500 нМ, приблизительно 450 нМ, приблизительно 400 нМ, приблизительно 350 нМ, приблизительно 300 нМ, приблизительно 250 нМ, приблизительно 200 нМ, приблизительно 150 нМ, приблизительно 100 нМ, приблизительно 80 нМ, приблизительно 60 нМ, приблизительно

[illegible]

[illegible]

[illegible]


приблизительно 40 мкМ, приблизительно 35 мкМ, приблизительно 30 мкМ, приблизительно 25 мкМ, приблизительно 20 мкМ, приблизительно 15 мкМ, приблизительно 10 мкМ, приблизительно 5 мкМ, приблизительно 1 мкМ, или приблизительно 950 нМ; от приблизительно 950 нМ до приблизительно 50 мкМ, приблизительно 45 мкМ, приблизительно 40 мкМ, приблизительно 35 мкМ, приблизительно 30 мкМ, приблизительно 25 мкМ, приблизительно 20 мкМ, приблизительно 15 мкМ, приблизительно 10 мкМ, приблизительно 5 мкМ, или приблизительно 1 мкМ; от приблизительно 1 мкМ до приблизительно 50 мкМ, приблизительно 45 мкМ, приблизительно 40 мкМ, приблизительно 35 мкМ, приблизительно 30 мкМ, приблизительно 25 мкМ, приблизительно 20 мкМ, приблизительно 15 мкМ, приблизительно 10 мкМ, или приблизительно 5 мкМ; от приблизительно 5 мкМ до приблизительно 50 мкМ, приблизительно 45 мкМ, приблизительно 40 мкМ, приблизительно 35 мкМ, приблизительно 30 мкМ, приблизительно 25 мкМ, приблизительно 15 мкМ, или приблизительно 10 мкМ; от приблизительно 10 мкМ до приблизительно 50 мкМ, приблизительно 45 мкМ, приблизительно 40 мкМ, приблизительно 35 мкМ, приблизительно 30 мкМ, приблизительно 25 мкМ, приблизительно 20 мкМ, или приблизительно 15 мкМ; от приблизительно 15 мкМ до приблизительно 50 мкМ, приблизительно 45 мкМ, приблизительно 40 мкМ, приблизительно 35 мкМ, приблизительно 30 мкМ, приблизительно 25 мкМ, или приблизительно 20 мкМ; от приблизительно 20 мкМ до приблизительно 50 мкМ, приблизительно 45 мкМ, приблизительно 40 мкМ, приблизительно 35 мкМ, или приблизительно 30 мкМ; от приблизительно 30 мкМ до приблизительно 50 мкМ, приблизительно 45 мкМ, приблизительно 40 мкМ, или приблизительно 35 мкМ; от приблизительно 35 мкМ до приблизительно 50 мкМ, приблизительно 45 мкМ, или приблизительно 40 мкМ; от приблизительно 40 мкМ до приблизительно 50 мкМ или приблизительно 45 мкМ; или приблизительно 45 мкМ до приблизительно 50 мкМ. В некоторых вариантах осуществления, ингибитор Trk также ингибирует один или оба из TrkB и TrkC, в дополнение к TrkA.

Ингибитор Trk может связываться с одним или несколькими из участков TrkA: внеклеточной богатой цистеином областью (доменом 1), внеклеточной богатой лейцином областью (доменом 2), внеклеточной богатой цистеином областью (доменом 3), внеклеточной иммуноглобулиноподобной областью (доменом 4), внеклеточной иммуноглобулиноподобной областью (доменом 5), трансмембранной областью, внутриклеточным киназным доменом, аминокислотой в активном центре, связывающим АТФ карманом, участком связывания тирозинового субстрата, петель активации (например, мотивом DFG из петли активации), областью домена вставки киназы (KID) (например, аминокислотами 603-623), шарнирной областью киназы, спиралью α -С в каталитическом домене, лизином N-выступа, ответственным за стабилизацию α -фосфата в субстрате АТФ, С-концом (см., например, Bertrand et al., J. Mol. Biol. 423:439-453, 2012), спиралью α -D на С-конце, спиралью α -E на С-конце, аминокислотой в киназном домене, взаимодействующей с лигандом в участке связывания АТФ (см., например, Cherry et al., Curr. Med. Chem. 11:663-673, 2004). Например, ингибитор Trk может связываться с доменом 5 или внутриклеточным киназным доменом TrkA.

Неограничивающие примеры ингибиторов Trk описаны ниже.

Примером ингибитора Trk является соединение формулы I (например, его

кристаллическая форма, содержащий его жидкий состав):



I

или его фармацевтически приемлемая соль. Другим примером ингибитора Trk является кристаллическая форма, включая соль гидросульфат соединения формулы I в форме стабильного полиморфа, обозначенной как кристаллическая форма (формула I-HS), которую можно характеризовать, например, по ее паттерну рентгенодифракции (см., Патентные заявки США серийные No. 62/080374 и 14/943014, полное содержание обеих из которых приведено в настоящем описании в качестве ссылки). Дополнительные физические свойства ингибитора Trk формулы I и способы получения ингибитора Trk формулы I описаны в Патентных заявках США серийные No. 62/080374 и 14/943014 (полное содержание обеих из которых приведено в настоящем описании в качестве ссылки). В некоторых вариантах осуществления, соединение формулы I представляет собой сульфат (S)-N-(5-((R)-2-(2,5-дифторфенил)пирролидин-1-ил)пиразоло[1,5-a]пиримидин-3-ил)-3-гидрокси-пирролидин-1-карбоксамида или его полиморф.


В некоторых вариантах осуществления, кристаллическая форма (I-HS) характеризуется наличием пиков дифракции XRPD (2θ градусов) при $18,4 \pm 0,2$, $20,7 \pm 0,2$, $23,1 \pm 0,2$ и $24,0 \pm 0,2$. В некоторых вариантах осуществления, кристаллическая форма (I-HS) характеризуется наличием пиков дифракции XRPD (2θ градусов) при $10,7 \pm 0,2$, $18,4 \pm 0,2$, $20,7 \pm 0,2$, $23,1 \pm 0,2$ и $24,0 \pm 0,2$. В некоторых вариантах осуществления, кристаллическая форма (I-HS) характеризуется наличием пиков дифракции XRPD (2θ градусов) при $10,7 \pm 0,2$, $18,4 \pm 0,2$, $19,2 \pm 0,2$, $20,2 \pm 0,2$, $20,7 \pm 0,2$, $21,5 \pm 0,2$, $23,1 \pm 0,2$ и $24,0 \pm 0,2$. В некоторых вариантах осуществления, кристаллическая форма (I-HS) характеризуется наличием пиков дифракции XRPD (2θ градусов) при $10,7 \pm 0,2$, $15,3 \pm 0,2$, $16,5 \pm 0,2$, $18,4 \pm 0,2$, $19,2 \pm 0,2$, $19,9 \pm 0,2$, $20,2 \pm 0,2$, $20,7 \pm 0,2$, $21,5 \pm 0,2$, $22,1 \pm 0,2$, $23,1 \pm 0,2$, $24,0 \pm 0,2$, $24,4 \pm 0,2$, $25,6 \pm 0,2$, $26,5 \pm 0,2$, $27,6 \pm 0,2$, $28,2 \pm 0,2$, $28,7 \pm 0,2$, $30,8 \pm 0,2$ и $38,5 \pm 0,2$.

В некоторых вариантах осуществления, для кристаллической формы показано возникновение при максимум от приблизительно 193 до приблизительно 205° Цельсия, как измерено посредством дифференциальной сканирующей калориметрии. В некоторых вариантах осуществления, для кристаллической формы (I-HS) показана теплота плавления приблизительно $2,415$ мВт, как измерено посредством дифференциальной сканирующей калориметрии.

В некоторых вариантах осуществления, ингибитор Trk выбран из группы, состоящей из: сульфата (S)-N-(5-((R)-2-(2,5-дифторфенил)пирролидин-1-ил)пиразоло[1,5-a]пиримидин-3-ил)-3-гидрокси-пирролидин-1-карбоксамида; (R)-N-циклопропил-5-(2-(5-фторпиридин-3-ил)пирролидин-1-ил)пиразоло[1,5-a]пиримидин-3-карбоксамида; (6R,13S)-9-фтор-13-метил-2,11,15,19,20,23-гексаазапентацикло[15.5.2.17,11.02,6.020,24]пентакоза-1(23),7,9,17(24),18,21-гексен-16,25-диола; и (6R)-9-фтор-15-метил-2,11,16,20,21,24-гексаазапентацикло[16.5.2.02,6.07,12.021,25]пентакоза-1(24),7,9,11,18(25),19,22-гептен-17-она.

Неограничивающие примеры ингибиторов Trk описаны в Патенте США No. 8513263 и Международной публикации No. WO 2010/048314, полное содержание обоих из которых приведено в настоящем описании в качестве ссылки, и включают соединение формулы

I:



I

или его фармацевтически приемлемую соль, где:

10 R¹ представляет собой H или (1-6C алкил);

R² представляет собой NR^bR^c, (1-4C)алкил, (1-4C)фторалкил, CF₃, (1-4C)

гидроксиалкил, -(1-4C алкил)hetAr¹, -(1-4C алкил)NH₂, -(1-4C алкил)NH(1-4C алкил), -
 (1-4C алкил)N(1-4C алкил)₂, hetAr², hetCyc¹, hetCyc², фенил, который, необязательно,
 15 является замещенным NHSO₂(1-4C алкилом), или (3-6C)^eциклоалкил, который,
 необязательно, является замещенным (1-4C алкилом), CN, OH, OMe, NH₂, NHMe, N
 (CH₃)₂, F, CF₃, CO₂(1-4C алкилом), CO₂H, C(=O)NR^eR^f или C(=O)OR^g;

20 R^b представляет собой H или (1-6C алкил);

R^c представляет собой H, (1-4C)алкил, (1-4C)гидроксиалкил, hetAr³, или фенил, где
 указанный фенил, необязательно, является замещенным одним или несколькими
 заместителями, независимо выбранными из галогена, CN, CF₃ и -O(1-4C алкила),

25 или NR^bR^c формирует 4-членное гетероциклическое кольцо, имеющее в кольце атом
 азота, где указанное гетероциклическое кольцо, необязательно, является замещенным
 одним или несколькими заместителями, независимо выбранными из галогена, OH, (1-
 4C алкила), (1-4 C)алкокси, -OC(=O)(1-4C алкила), NH₂, -NHC(=O)O(1-4C алкила) и (1-
 4C)гидроксиалкила,

30 или NR^bR^c формирует 5-6-членное гетероциклическое кольцо, имеющее в кольце
 гетероатом, который является азотом, и необязательно, имеющее в кольце второй
 гетероатом или группу, выбранные из N, O и SO₂, где гетероциклическое кольцо,
 необязательно, является замещенным одним или несколькими заместителями, независимо
 35 выбранными из OH, галогена, CF₃, (1-4C)алкила, CO₂(1-4C алкила), CO₂H, NH₂, NHC(=O)
 O(1-4C алкила) и оксо,

или NR^bR^c формирует 7-8-членное гетероциклическое кольцо с мостиком, имеющее
 в кольце атом азота, и необязательно имеющее в кольце второй гетероатом, выбранный
 из N и O, где указанное кольцо, необязательно, является замещенным CO₂(1-4C
 40 алкилом);

hetAr¹ представляет собой 5-членное гетероарильное кольцо, имеющее в кольце 1-3
 атома азота;

45 hetAr² представляет собой 5-6 членное гетероарильное кольцо, имеющее в кольце
 по меньшей мере один атом азота и необязательно, имеющее в кольце второй
 гетероатом, независимо выбранный из N и S, где указанное гетероарильное кольцо,
 необязательно, является замещенным одним или несколькими заместителями, независимо
 выбранными из (1-4C алкила), галогена, -(1-4 C)алкокси и NH(1-4C алкила);

hetCyc¹ представляет собой присоединенное по атому углерода 4-6-членное азациклическое кольцо, необязательно, замещенное одним или несколькими заместителями, независимо выбранными из (1-4C алкила) и CO₂(1-4C алкила);

hetCyc² представляет собой пиридиновое или пиридазиновое кольцо, которое, необязательно, является замещенным заместителем, выбранным из (1-4C)алкила;

hetAr³ представляет собой 5-6 членное гетероарильное кольцо, имеющее в кольце 1-2 гетероатома, независимо выбранных из N и O, и необязательно замещенное одним или несколькими заместителями, независимо выбранными из (1-4C)алкила;

R^e представляет собой H или (1-4C)алкил;

R^f представляет собой H, (1-4C)алкил или (3-6C)циклоалкил;

или NR^eR^f формирует 5-6-членное азациклическое кольцо, необязательно, имеющее в кольце дополнительный гетероатом, выбранный из N и O, где азациклическое кольцо, необязательно, является замещенным OH;

R^g представляет собой H или (1-6C)алкил;

Y представляет собой (i) фенил, необязательно замещенный одним или несколькими заместителями, независимо выбранными из галоген, (1-4C)алкокси, CF₃ и CHF₂, или (ii) 5-6 членное гетероарильное кольцо, имеющее в кольце гетероатом, выбранный из N и S, где указанное гетероарильное кольцо, необязательно, является замещенным одним или несколькими атомами галогена;

X отсутствует, представляет собой -CH₂-, -CH₂CH₂-, -CH₂O- или -CH₂NR^d-;

R^d представляет собой H или (1-4C алкил);

R³ представляет собой H или (1-4C алкил);

каждый из R⁴ независимо выбран из галогена, (1-4C)алкила, OH, (1-4C)алкокси, NH₂, NH(1-4C алкила) и CH₂OH; и

n представляет собой 0, 1, 2, 3, 4, 5 или 6.

Например, ингибитор Trk может включать одно или несколько соединений, выбранных из группы, состоящей из:

(R)-N-(5-(2-(2,5-дифторфенил)пирролидин-1-ил)пиразоло[1,5-a]пиримидин-3-ил)-3-гидроксиазетидин-1-карбоксамида;

N-(5-(2-(3-фторфенил)-2-метилпирролидин-1-ил)пиразоло[1,5-a]пиримидин-3-ил)-3-гидроксиазетидин-1-карбоксамида;

(R)-1-(5-(2-(2,5-дифторфенил)пирролидин-1-ил)пиразоло[1,5-a]пиримидин-3-ил)-3-фенилмочевины;

(R)-N-(5-(2-(2-(дифторметил)-5-фторфенил)пирролидин-1-ил)пиразоло[1,5-a]пиримидин-3-ил)-3-гидроксиазетидин-1-карбоксамида;

(R)-N-(5-(2-(3-фторфенил)пирролидин-1-ил)пиразоло[1,5-a]пиримидин-3-ил)-1-метил-6-оксо-1,6-дигидропиридазин-3-карбоксамида;

(S)-N-(5-((R)-2-(2,5-дифторфенил)пирролидин-1-ил)пиразоло[1,5-a]пиримидин-3-ил)-3-гидрокси-1-карбоксамида;

(3R,4R)-N-(5-((R)-2-(2,5-дифторфенил)пирролидин-1-ил)пиразоло[1,5-a]пиримидин-3-ил)-3,4-дигидрокси-1-карбоксамида;

(S)-N-(5-((R)-2-(2-хлор-5-фторфенил)пирролидин-1-ил)пиразоло[1,5-a]пиримидин-3-ил)-3-метилпиперазин-1-карбоксамида;


(R)-N-(5-(2-(2,5-дифторфенил)пирролидин-1-ил)пиразоло[1,5-а]пиримидин-3-ил)-3-гидрокси-3-метилазетидин-1-карбоксамида;

(R)-N-(5-(2-(3-фторфенил)пирролидин-1-ил)пиразоло[1,5-а]пиримидин-3-ил)-3-гидроксиазетидин-1-карбоксамида; и

(R)-1-(4-хлорфенил)-3-(5-(2-(2,5-дифторфенил)пирролидин-1-ил)пиразоло[1,5-а]пиримидин-3-ил)мочевины,

или его фармацевтически приемлемую соль.

Дополнительными примерами ингибиторов Trk являются замещенные пиразоло[1,5-а]пиримидиновые соединения, описанные в Патенте США No. 8791123 и Международной публикации No. WO 2011/006074, полное содержание обоих из которых приведено в настоящем описании в качестве ссылки. Например, ингибиторы Trk, представляющие собой замещенные пиразоло[1,5-а]пиримидиновые соединения, могут иметь общую формулу II:



II

или представлять собой ее соль, где:

R¹ представляет собой H или (1-6C алкил);

R² представляет собой H, (1-6C)алкил, -(1-6C)фторалкил, -(1-6C)дифторалкил, -(1-6C)трифторалкил, -(1-6C)хлоралкил, -(2-6C)хлорфторалкил, -(2-6C)дифторхлоралкил, -(2-6C)хлоргидроксиалкил, -(1-6C)гидроксиалкил, -(2-6C)дигидроксиалкил, -(1-6C алкил) CN, -(1-6C алкил)SO₂NH₂, -(1-6C алкил)NHSO₂(1-3C алкил), -(1-6C алкил)NH₂, -(1-6C алкил)NH(1-4C алкил), -(1-6C алкил)N(1-4C алкил)₂, -(1-6C алкил)NHC(=O)O(1-4C алкил), -(1-6C алкил)hetCys¹, -(1-6C алкил)hetAr¹, hetAr², hetCys², -O(1-6C алкил), необязательно, являющийся замещенным галогеном, OH или (1-4C)алкокси, -O(3-6C циклоалкил), Cys¹, -(1-6C алкил)(3-6C циклоалкил), -(1-6C алкил)(1-4C алкокси), -(1-6C гидроксиалкил)(1-4C алкокси), 7-членное циклоалкильное кольцо с мостиком, необязательно, замещенное (1-6C)гидроксиалкилом, или 7-8-членное гетероциклическое кольцо с мостиком, имеющее в кольце 1-2 атома азота;

или NR¹R² формирует 4-6-членное азициклическое кольцо, необязательно, замещенное одним или несколькими заместителями, независимо выбранными из (1-6C)алкила, OH, CO₂H, (1-3C алкил)CO₂H, -O(1-6C алкила) и (1-6C)гидроксиалкила;

hetCys¹ представляет собой 5-6-членное гетероциклическое кольцо, имеющее в кольце 1-2 гетероатома, независимо выбранных из N и O, где hetCys¹, необязательно, является замещенным оксо, OH, галогеном или (1-6C)алкилом;

hetCys² представляет собой 6-членное присоединенное по атому углерода гетероциклическое кольцо, имеющее в кольце 1-2 гетероатома, независимо выбранных

из N и O, где hetCyc^2 , необязательно, является замещенным F, SO_2NH_2 , $\text{SO}_2(1-3\text{C}$ алкилом), или галогеном;

hetAr^1 представляет собой 5-членное гетероарильное кольцо, имеющее в кольце 1-2 гетероатома, независимо выбранных из N и O, и необязательно, замещенное (1-4C) алкилом;

hetAr^2 представляет собой 5-6-членное гетероарильное кольцо, имеющее в кольце 1-2 атома азота и, необязательно, замещенное одним или несколькими заместителями, независимо выбранными из (1-4C)алкила, (3-6C)циклоалкила, галогена и OH;

Cyc^1 представляет собой 3-6-членное циклоалкильное кольцо, которое, необязательно, является замещенным одним или несколькими заместителями, независимо выбранными из -(1-4C алкила), -OH, -OMe, - CO_2H , -(1-4C алкила)OH, галогена и CF_3 ;

Y представляет собой (i) фенил, необязательно, замещенный одним или несколькими заместителями, независимо выбранными из галогена, (1-4C)алкокси, - CF_3 , - CHF_2 , -O(1-4C алкил) hetCyc^3 , -(1-4C алкил) hetCyc^3 , -O(1-4C алкил)O(1-3C алкила) и -O(3-6C дигидроксиалкила), или (ii) 5-6-членное гетероарильное кольцо, имеющее в кольце гетероатом, выбранный из N и S, где гетероарильное кольцо, необязательно, является замещенным одним или несколькими заместителями, независимо выбранными из галогена, -O(1-4C алкила), (1-4C)алкила и NH_2 , или (iii) пирид-2-он-3-ильное кольцо, необязательно, замещенное одним или несколькими заместителями, независимо выбранными из галогена и (1-4C)алкила;

hetCyc^3 представляет собой 5-6-членное гетероциклическое кольцо, имеющее в кольце 1-2 гетероатома, независимо выбранных из N и O и необязательно, замещенное (1-6C) алкилом;

X представляет собой - CH_2 -, - CH_2CH_2 -, - CH_2O -, или - CH_2NR^d -;

R^d представляет собой H или -(1-4C алкил);

R^3 представляет собой H или -(1-4C алкил);

каждый из R^4 независимо выбран из галогена, -(1-4C)алкила, -OH, -(1-4C)алкокси, - NH_2 , -NH(1-4C алкила) и - CH_2OH ; и

n представляет собой 0, 1, 2, 3, 4, 5 или 6.

Например, ингибитор Trk может включать одно или несколько соединений, выбранных из группы, состоящей из:

(R)-5-(2-(2,5-дифторфенил)пирролидин-1-ил)-N-(пиридин-2-ил)пиразоло[1,5-a]пиримидин-3-карбоксамида;

(R)-5-(2-(2,5-дифторфенил)пирролидин-1-ил)-N-(2-морфолиноэтил)пиразоло[1,5-a]пиримидин-3-карбоксамида;

N-((2S)-бицикло[2,2,1]гептан-2-ил)-5-((R)-2-(2,5-дифторфенил)пирролидин-1-ил)пиразоло[1,5-a]пиримидин-3-карбоксамида;

(R)-5-(2-(2,5-дифторфенил)пирролидин-1-ил)-N-(2-(2-оксоимидазолидин-1-ил)этил)пиразол[1,5-a]пиримидин-3-карбоксамида;

5-((R)-2-(2,5-дифторфенил)пирролидин-1-ил)-N-((R)-2,3-дигидроксипропил)пиразоло[1,5-a]пиримидин-3-карбоксамида;

(R)-N-циклопропил-5-(2-(5-фторпиридин-3-ил)пирролидин-1-ил)пиразоло[1,5-a]пиримидин-3-карбоксамида;

(R)-N-трет-бутил-5-(2-(5-фторпиридин-3-ил)пирролидин-1-ил)пиразоло[1,5-a]

пиримидин-3-карбоксамида;


(R)-5-(2-(2,5-дифторфенил)пирролидин-1-ил)пиразоло[1,5-a]пиримидин-3-карбоксамида;

(R)-5-(2-(5-фторпиридин-3-ил)пирролидин-1-ил)-N-(1-метилциклобутил)пиразоло[1,5-a]пиримидин-3-карбоксамида; и

5-((R)-2-(5-фторпиридин-3-ил)пирролидин-1-ил)-N-((S)-1,1,1-трифторпропан-2-ил)пиразоло[1,5-a]пиримидин-3-карбоксамида;


или их фармацевтически приемлемых солей.

Дополнительными примерами ингибиторов Trk являются макроциклические соединения, описанные в Патенте США No. 8933084 и Международной публикации No. WO 2011/146336, полное содержание каждого из которых приведено в настоящем описании в качестве ссылки. Например, ингибиторы Trk, представляющие собой макроциклические соединения, могут иметь общую формулу III:




III,


или представлять собой ее фармацевтически приемлемую соль, где: кольцо А выбрано из колец А-1, А-2 и А-3, имеющих структуры:



A-1



A-2



A-3


, где волнистая линия, отмеченная 1, показывает точку присоединения кольца А к кольцу В, и волнистая линия, отмеченная 2, показывает точку присоединения кольца А к W;

Х представляет собой N или CH;


Y представляет собой H или F;

R¹ представляет собой H, (1-3C)алкокси или галоген;

кольцо В выбрано из колец В-1 и В-2, имеющих структуры:



B-1



B-2

, где волнистая линия, отмеченная 3, показывает точку присоединения к кольцу А и волнистая линия, отмеченная 4 показывает точку присоединения к пиразоло[1,5-а] пиримидиновому кольцу из формулы III;

W представляет собой О, NH или CH₂, где, когда кольцо А представляет собой А-2, тогда W представляет собой CH₂;

m представляет собой 0, 1 или 2;

D представляет собой углерод, R² и R^{2a} независимо представляют собой H, F, (1-3 C) алкил или OH (при условии, что R² и R^{2a} оба не представляют собой OH), и R³ и R^{3a} независимо представляют собой H, (1-3 C) алкил или гидрокси(1-3 C) алкил, или

D представляет собой углерод или азот, R² и R³ отсутствуют, и R^{2a} и R^{3a} вместе с атомами, к которым они присоединены, формируют 5-6 членное гетероарильное кольцо, имеющее в кольце 1-2 гетероатома;

Z представляет собой *-NR^{4a}C(=O)-, *-ONHC(=O)-, *-NR^{4b}CH₂- или *-OC(=O)-, где звездочка показывает точку присоединения Z к атому углерода, несущему R³;

R^{4a} представляет собой H, (1-6C) алкил, фтор(1-6C) алкил, дифтор(1-6C) алкил, трифтор(1-6C) алкил, гидрокси(1-6C алкил) или дигидрокси(2-6C алкил);

R^{4b} представляет собой H, (1-6C) алкил, фтор(1-6C) алкил, дифтор(1-6C) алкил, трифтор(1-6C) алкил, гидрокси(1-6C алкил), дигидрокси(2-6C алкил), (1-6C алкил)C(O)-, (3-6C циклоалкил)C(O)-, Ar¹C(O)-, HOCH₂C(O)-, (1-6C алкил)сульфонил, (3-6C циклоалкил)

сульфонил, Ar²(SO₂)-, NO₂CCH₂- или (1-6C алкил)NH(CO)-;

Ar¹ представляет собой фенил, необязательно, замещенный одним или несколькими заместителями независимо выбранными из галогена, (1-6C) алкила и (1-6C) алкокси;

Ar² представляет собой фенил, необязательно, замещенный одним или несколькими заместителями, независимо выбранными из галогена, (1-6C) алкила и (1-6C) алкокси; и

R⁵ и R⁶ независимо представляют собой H, галоген, OH, (1-6C) алкил или гидрокси (1-6C) алкил.

Например, ингибитор Trk может включать одно или несколько соединений, выбранных из группы, состоящей из:

(6R)-9-фтор-13-окса-2,11,17,21,22,25-гексазапентацикло

[17.5.2.0^{2,6}.0^{7,12}.0^{22,26}]гексакоза-1(25),7,9,11,19(26),20,23-гептен-18-она;

(6R)-9-фтор-15-гидрокси-13-окса-2,11,17,21,22,25-гексазапентацикло

[17.5.2.0^{2,6}.0^{7,12}.0^{22,26}]гексакоза-1(25),7,9,11,19(26),20,23-гептен-18-она;
(6*R*,15*R*)-9-фтор-15-гидрокси-13-окса-2,11,17,21,22,25-гексаазапентацикло-

[17.5.2.0^{2,6}.0^{7,12}.0^{22,26}]гексакоза-1(25),7,9,11,19(26),20,23-гептен-18-она;
(6*R*)-9-фтор-13-окса-2,11,16,20,21,24-гексаазапентацикло

[16.5.2.0^{2,6}.0^{7,12}.0^{21,25}]пентакоза-1(24),7,9,11,18(25),19,22-гептен-17-она;
(6*R*)-9-фтор-13-окса-2,11,18,22,23,26-гексаазапентацикло

[18.5.2.0^{2,6}.0^{7,12}.0^{23,27}]гептакоза-1(26),7,9,11,20(27),21,24-гептен-19-она;
(6*R*,13*S*)-9-фтор-13-метил-2,11,15,19,20,23-гексаазапентацикло

[15.5.2.1^{7,11}.0^{2,6}.0^{20,24}]пентакоза-1(23),7,9,17(24),18,21-гексен-16,25-диона;
(6*R*)-9-фтор-2,11,13,16,20,21,24-гептаазапентацикло[16.5.2.0^{2,6}.0^{7,12}.0^{21,25}]пентакоза-
1(24),7,9,11,18(25),19,22-гептен-17-она;

(6*R*)-9-фтор-2,11,13,17,21,22,25-гептаазапентацикло[17.5.2.0^{2,6}.0^{7,12}.0^{22,26}]гексакоза-
1(25),7,9,11,19(26),20,23-гептен-18-она;

(6*R*)-9-фтор-17-метил-13-окса-2,11,17,21,22,25-гексаазапентацикло

[17.5.2.0^{2,6}.0^{7,12}.0^{22,26}]гексакоза-1(25),7,9,11,19(26),20,23-гептен-18-она;
(6*R*)-9,15,15-трифтор-13-окса-2,11,17,21,22,25-гексаазапентацикло

[17.5.2.0^{2,6}.0^{7,12}.0^{22,26}]гексакоза-1(25),7,9,11,19(26),20,23-гептен-18-она;
(6*R*)-9-фтор-2,11,16,20,21,24-гексаазапентацикло[16.5.2.0^{2,6}.0^{7,12}.0^{21,25}]пентакоза-1
(24),7,9,11,18(25),19,22-гептен-17-она;

(6*R*)-9-фтор-15-метил-2,11,16,20,21,24-гексаазапентацикло

[16.5.2.0^{2,6}.0^{7,12}.0^{21,25}]пентакоза-1(24),7,9,11,18(25),19,22-гептен-17-она;
(6*R*)-9-фтор-(15*R*)-метил-2,11,16,20,21,24-гексаазапентацикло

[16.5.2.0^{2,6}.0^{7,12}.0^{21,25}]пентакоза-1(24),7,9,11,18(25),19,22-гептен-17-она;
(6*R*)-9-фтор-15-метил-2,11,16,20,21,24-гексаазапентацикло


[16.5.2.0^{2,6}.0^{7,12}.0^{21,25}]пентакоза-1(24),7,9,11,18(25),19,22-гептен-17-она;
(6*R*)-9-фтор-15,15-диметил-13-окса-2,11,17,21,22,25-гексаазапентацикло

[17.5.2.0^{2,6}.0^{7,12}.0^{22,26}]гексакоза-1(25),7,9,11,19(26),20,23-гептен-18-она; и
(6*R*)-9-фтор-15,15-диметил-2,11,16,20,21,24-гексаазапентацикло

[16.5.2.0^{2,6}.0^{7,12}.0^{21,25}]пентакоза-1(24),7,9,11,18(25),19,22-гептен-17-она;

или их фармацевтически приемлемых солей.

Дополнительными примерами ингибиторов Tgk являются замещенные имидазо[1,2-
b]пиридазиновые соединения, описанные в Патенте США No. 8450322 и Международной
публикации No. WO 2010/033941, полное содержание обоих из которых приведено в
настоящем описании в качестве ссылки. Например, ингибиторы Tgk, представляющие
собой замещенн имидазо[1,2b]пиридазиновые соединения, могут иметь общую формулу
IV:



IV

или представлять собой ее фармацевтически приемлемую соль, где:

R^1 представляет собой H или (1-6C алкил);

R^2 представляет собой NR^bR^c , (1-4C)алкил, (1-4C)фторалкил, CF_3 , (1-4C)гидроксиалкил, -(1-4C алкил)hetAr¹, -(1-4C алкил)NH(1-4C алкил), hetAr², hetCyc¹, hetCyc², фенил, который является, необязательно, замещенным $NHSO_2$ (1-4C алкилом), или (3-6C)циклоалкил, который является, необязательно, замещенным (1-4C алкилом), CN, OH, CF_3 , CO_2 (1-4C алкилом) или CO_2H ;

R^b представляет собой H или (1-6C алкил);

R^c представляет собой H, (1-4C)алкил, (1-4C)гидроксиалкил, hetAr³ или фенил, где указанный фенил, необязательно, является замещенным одним или несколькими заместителями, независимо выбранными из галогена, CN, CF_3 и -O(1-4C алкила),

или NR^bR^c формирует 4-членное гетероциклическое кольцо, имеющее в кольце атом азота, где указанное гетероциклическое кольцо, необязательно, является замещенным одним или несколькими заместителями, независимо выбранными из галогена, OH, (1-4C алкила), (1-4 C)алкокси, -OC(=O)(1-4C алкил), NH_2 , -NHC(=O)O(1-4C алкила) и (1-4C)гидроксиалкила,

или NR^bR^c формирует 5-6-членное гетероциклическое кольцо, имеющее в кольце гетероатом, представляющий собой азот, и необязательно, имеющее в кольце второй гетероатом или группу, выбранные из N, O и SO_2 , где гетероциклическое кольцо, необязательно, является замещенным одним или несколькими заместителями, независимо выбранными из OH, галогена, CF_3 , (1-4C)алкил, CO_2 (1-4C алкила), CO_2H , NH_2 , NHC(=O)O(1-4C алкила) и оксо,

или NR^bR^c формирует 7-8-членное гетероциклическое кольцо с мостиком, имеющее в кольце 1-2 атома азота, и необязательно, замещенного CO_2 (1-4C алкилом);

hetAr¹ представляет собой 5-членное гетероарильное кольцо, имеющее в кольце 1-3 атома азота;

hetAr² представляет собой 5-6 членное гетероарильное кольцо, имеющее в кольце по меньшей мере один атом азота и

необязательно, имеющее в кольце второй гетероатом, независимо выбранный из N и S,

где указанное гетероарильное кольцо, необязательно, является замещенным одним или несколькими заместителями, независимо выбранными из (1-4C алкила), галогена, -(1-4 C)алкокси и NH(1-4C алкила);

hetCyc¹ представляет собой присоединенное по атому углерода 4-6-членное азациклическое кольцо, необязательно, замещенное одним или несколькими заместителями, независимо выбранными из (1-4C алкила), CO_2H и CO_2 (1-4C алкила);

hetCyc² представляет собой пиридиновое или пиридазиновое кольцо, замещенное заместителем, выбранным из (1-4C)алкила;

hetAr³ представляет собой 5-6-членное гетероарильное кольцо, имеющее в кольце 1-2 гетероатома, независимо выбранных из N и O, и необязательно, замещенное одним или несколькими заместителями, независимо выбранными из (1-4C)алкила;

Y представляет собой фенильное кольцо, необязательно, замещенное одним или несколькими заместителями, независимо выбранными из галогена, (1-4C)алкокси, CF₃ и CHF₂, или 5-6-членное гетероарильное кольцо, имеющее в кольце гетероатом, выбранный из N и S;

X отсутствует, представляет собой -CH₂-, -CH₂CH₂-, -CH₂O-, или -CH₂NR^d-;


R^d представляет собой H или (1-4C алкил);

R³ представляет собой H или (1-4C алкил);

каждый из R⁴ независимо выбран из галогена, (1-4C)алкила, OH, (1-4C)алкокси, NH₂, NH(1-4C алкила) и CH₂OH; и

n представляет собой 0, 1, 2, 3, 4, 5 или 6.

Дополнительными примерами ингибиторов Trk являются замещенные пиразоло[1,5-a]пиримидиновые соединения, описанные в WO 10/048314, полное содержание которой приведено в настоящем описании в качестве ссылки. Например, ингибиторы Trk, представляющие собой замещенные пиразоло[1,5-a]пиримидиновые соединения, могут иметь общую формулу V:



V

или представлять собой ее фармацевтически приемлемую соль, где:

R¹ представляет собой H или (1-6C алкил);

R² представляет собой NR^bR^c, (1-4C)алкил, (1-4C)фторалкил, CF₃, (1-4C)гидроксиалкил, -(1-4C алкил)hetAr¹, -(1-4C алкил)NH₂, -(1-4C алкил)NH(1-4C алкил), -(1-4C алкил)N(1-4C алкил)₂, hetAr², hetCys¹, hetCys², фенил, который, необязательно, является замещенным NHSO₂(1-4C алкилом), или (3-6C)циклоалкил, который, необязательно, является замещенным (1-4C алкилом), CN, OH, OMe, NH₂, NHMe, N(CH₃)₂, F, CF₃, CO₂(1-4C алкилом), CO₂H, C(=O)NR^eR^f или C(=O)OR^g;

R^b представляет собой H или (1-6C алкил);

R^c представляет собой H, (1-4C)алкил, (1-4C)гидроксиалкил, hetAr³ или фенил, где указанный фенил, необязательно, является замещенным одним или несколькими заместителями, независимо выбранными из галогена, CN, CF₃ и -O(1-4C алкила),

или NR^bR^c формирует 4-членное гетероциклическое кольцо, имеющее в кольце атом азота, где указанное гетероциклическое кольцо, необязательно, является замещенным одним или несколькими заместителями, независимо выбранными из галогена, OH, (1-4C алкила), (1-4C)алкокси, -OC(=O)(1-4C алкила), NH₂, -NHC(=O)O(1-4C алкила) и (1-4C)гидроксиалкила,

или NR^bR^c формирует 5-6-членное гетероциклическое кольцо, имеющее в кольце

гетероатом, который является азотом, и необязательно, имеющее в кольце второй гетероатом или группу, выбранные из N, O и SO₂, где гетероциклическое кольцо, необязательно, является замещенным одним или несколькими заместителями, независимо выбранными из OH, галогена, CF₃, (1-4C)алкила, CO₂(1-4C алкила), CO₂H, NH₂, NHC(=O)O(1-4C алкила) и оксо,

или NR^bR^c формирует 7-8-членное гетероциклическое кольцо с мостиком, имеющее в кольце атом азота, и необязательно, имеющее в кольце второй гетероатом, выбранный из N и O, где кольцо, необязательно, является замещенным CO₂(1-4C алкилом);

hetAr¹ представляет собой 5-членное гетероарильное кольцо, имеющее в кольце 1-3 атома азота;

hetAr² представляет собой 5-6 членное гетероарильное кольцо, имеющее в кольце по меньшей мере один атом азота и необязательно, имеющее в кольце второй гетероатом, независимо выбранный из N и S, где указанное гетероарильное кольцо, необязательно, является замещенным одним или несколькими заместителями, независимо выбранными из (1-4C алкила), галогена, -(1-4 C)алкокси и NH(1-4C алкила);

hetCyc¹ представляет собой присоединенное по атому углерода 4-6-членное азациклическое кольцо, необязательно, замещенное одним или несколькими заместителями, независимо выбранными из (1-4C алкила) и CO₂(1-4C алкила);

hetCyc² представляет собой пиридиновое или пиридазиновое кольцо, которое, необязательно, является замещенным заместителем, выбранным из (1-4C)алкила;

hetAr³ представляет собой 5-6 членное гетероарильное кольцо, имеющее в кольце 1-2 гетероатома, независимо выбранных из N и O, и необязательно, замещенное одним или несколькими заместителями, независимо выбранными из (1-4C)алкила;

R^e представляет собой H или (1-4C)алкил;

R^f представляет собой H, (1-4C)алкил или (3-6C)циклоалкил;

или NR^eR^f формирует 4-6-членное азациклическое кольцо, необязательно, имеющее в кольце дополнительный гетероатом, выбранный из N и O, где азациклическое кольцо, необязательно, является замещенным OH;

R^g представляет собой H или (1-6C)алкил;

Y представляет собой (i) фенил, необязательно замещенный одним или несколькими заместителями, независимо выбранными из галогена, (1-4C)алкокси, CF₃ и CHF₂, или (ii) 5-6-членное гетероарильное кольцо, имеющее в кольце гетероатом, выбранный из N и S, где указанное гетероарильное кольцо, необязательно, является замещенным одним или несколькими атомами галогена;

X отсутствует, представляет собой -CH₂-, -CH₂CH₂-, -CH₂O-, или -CH₂NR^d-;

R^d представляет собой H или (1-4C алкил);

R³ представляет собой H или (1-4C алкил);

каждый из R⁴ независимо выбран из галогена, (1-4C)алкила, OH, (1-4 C)алкокси, NH₂, NH(1-4C алкил) и CH₂OH; и

n представляет собой 0, 1, 2, 3, 4, 5 или 6.

Например, ингибитор Trk может включать одно или несколько соединений, выбранных из группы, состоящей из:

(R)-5-(2-(2,5-дифторфенил)пирролидин-1-ил)-N-(пиридин-2-ил)пиразоло[1,5-a]пиримидин-3-карбоксамида;

(R)-5-(2-(2,5-дифторфенил)пирролидин-1-ил)-N-(2-морфолиноэтил)пиразоло[1,5-a]пиримидин-3-карбоксамида;

5 N-((2S)-бицикло[2,2,1]гептан-2-ил)-5-((R)-2-(2,5-дифторфенил)пирролидин-1-ил)пиразоло[1,5-a]пиримидин-3-карбоксамида;

(R)-5-(2-(2,5-дифторфенил)пирролидин-1-ил)-N-(2-(2-оксоимидазолидин-1-ил)этил)пиразол[1,5-a]пиримидин-3-карбоксамида;

10 5-((R)-2-(2,5-дифторфенил)пирролидин-1-ил)-N-((R)-2,3-дигидроксипропил)пиразоло[1,5-a]пиримидин-3-карбоксамида;

(R)-N-циклопропил-5-(2-(5-фторпиридин-3-ил)пирролидин-1-ил)пиразоло[1,5-a]пиримидин-3-карбоксамида;

(R)-N-трет-бутил-5-(2-(5-фторпиридин-3-ил)пирролидин-1-ил)пиразоло[1,5-a]пиримидин-3-карбоксамида;


15 (R)-5-(2-(2,5-дифторфенил)пирролидин-1-ил)пиразоло[1,5-a]пиримидин-3-карбоксамида;

(R)-5-(2-(5-фторпиридин-3-ил)пирролидин-1-ил)-N-(1-метилциклобутил)пиразоло[1,5-a]пиримидин-3-карбоксамида; и

20 5-((R)-2-(5-фторпиридин-3-ил)пирролидин-1-ил)-N-((S)-1,1,1-трифторпропан-2-ил)пиразоло[1,5-a]пиримидин-3-карбоксамида;

или их фармацевтически приемлемых солей.

Дополнительные ингибиторы Trk можно обнаружить в Патентных публикациях U.S. No. 2015/0166564 и WO 2012/158413, полное содержание обеих из которых приведено в настоящем описании в качестве ссылки. Например, ингибитор Trk может представлять собой соединение формулы I:



I

Или его стереоизомеры, таутомеры или фармацевтически приемлемые соли, сольваты, или пролекарства, где:

45 группа Y-B и группа NH-C(=X)-NH находятся в транс-конфигурации;

R^a, R^b, R^c и R^d независимо выбраны из H и (1-3C)алкила;

X представляет собой O, S или NH;

R^1 представляет собой (1-3С алкокси)(1-6С)алкил, (трифторметокси)(1-6С)алкил, (1-3С сульфанил)(1-6С)алкил, монофтор(1-6С)алкил, дифтор(1-6С)алкил, трифтор(1-6С) алкил, тетрафтор(2-6С)алкил, пентафтор(2-6С)алкил, циано(1-6С)алкил, аминокарбонил (1-6С)алкил, гидрокси(1-6С)алкил, дигидрокси(2-6С)алкил, (1-6С)алкил, (1-3С алкиламино)(1-3С)алкил, (1-4С алкоксикарбонил)(1-6С)алкил, amino(1-6С)алкил, гидрокси(1-3С алкокси)(1-6С)алкил, ди(1-3С алкокси)(1-6С)алкил, (1-3С алкокси)трифтор (1-6С)алкил, гидрокситрифтор(1-6С)алкил, (1-4С алкоксикарбонил)(1-3С алкокси)(1-6С)алкил, гидроксикарбонил(1-3С алкокси)(1-6С)алкил, $\text{hetAr}^5(\text{CH}_2)_{0-1}$ или $\text{Ar}^5(\text{CH}_2)_{0-1}$;

R^2 представляет собой H, F, или OH;




Y представляет собой связь, -O- или -OCH₂-;

В представляет собой Ar^1 , hetAr^1 , 1-6С алкил или (1-6С)алкокси;

Ar^1 представляет собой фенил, необязательно, замещенный одним или несколькими заместителями, независимо выбранными из галогена, CF₃, CF₃O-, (1-4С)алкокси, гидрокси (1-4С)алкила, (1-6С)алкила и CN;

hetAr^1 представляет собой 5-6-членный гетероарил, имеющий в кольце 1-3 гетероатома, независимо выбранных из N, S и O, и необязательно, замещенный 1-2 группами, независимо выбранными из (1-6С)алкила, галогена, OH, CF₃, NH₂ и гидрокси (1-2С)алкила;

Кольцо С представляет собой формулу C-1, C-2 или C-3



, R^3 представляет собой H, (1-6С)алкил, гидрокси(1-6С)алкил, Ar^2 , hetCyc^1 , (3-7С) циклоалкил или hetAr^2 ;

Ar^2 представляет собой фенил, необязательно, замещенный одной или несколькими группами, независимо выбранными из галогена, (1-6С)алкила и гидроксиметила;

hetCyc^1 представляет собой 5-6-членное насыщенное или частично ненасыщенное гетероциклическое кольцо, имеющее в кольце 1-2 гетероатома, независимо выбранных из N и O;

hetAr^2 представляет собой 5-6 членное гетероарильное кольцо, имеющее в кольце 1-3 гетероатома, независимо выбранных из N, O и S, и необязательно, замещенное одной или несколькими группами, независимо выбранными из (1-6С)алкила и галогена;

R^4 представляет собой H, OH, (1-6С)алкил, монофтор(1-6С)алкил, дифтор(1-6С)алкил,

трифтор(1-6С)алкил, тетрафтор(2-6С)алкил, пентафтор(2-6С)алкил, циано(1-6С)алкил, гидрокси(1-6С)алкил, дигидрокси(2-6С)алкил, (1-3С алкокси)(1-6С)алкил, amino(1-6С) алкил, amino-карбонил(1-6С)алкил, (1-3С)алкилсульфонамидо(1-6С)алкил, сульфонамидо (1-6С)алкил, гидроксил-карбонил(1-6С)алкил, hetAr^3 (1-6С)алкил, Ar^3 (1-6С)алкил, (1-6С) алкокси, монофтор(1-6С)алкокси, дифтор(1-6С)алкокси трифтор(1-6С)алкокси, тетрафтор(2-6С)алкокси, пентафтор(2-6С)алкокси циано(1-6С)алкокси, гидрокси(1-6С) алкокси, дигидрокси(2-6С)алкокси, amino(2-6С)алкокси, аминокарбонил(1-6С)алкокси, гидроксикарбонил(1-6С)алкокси, hetCys^2 (1-6С)алкокси, hetAr^3 (1-6С)алкокси, Ar^3 (1-6С) алкокси, (1-4С алкокси)(1-6С)алкокси, (1-3С алкилсульфонил)(1-6С)алкокси, (3-6С) циклоалкил [необязательно, замещенный F, OH, (1-6С алкилом), (1-6С) алкокси, или (1-3С алкокси)(1-6С)алкил], hetAr^4 , Ar^4 , $\text{hetCys}^2(\text{O})\text{CH}_2$ -, (1-4С алкоксикарбонил)(1-6С) алкокси, гидроксикарбонил(1-6С)алкокси, аминокарбонил(1-6С)алкокси, $\text{hetCys}^2\text{C}(=\text{O})$ (1-6С)алкокси, гидрокси(1-3С алкокси)(1-6С)алкокси, гидрокситрифтор(1-6С)алкокси, (1-3С)алкилсульфонамидо(1-6С)алкокси, (1-3С)алкиламидо(1-6С)алкокси, ди(1-3С алкил) аминокарбокси, $\text{hetCys}^2\text{C}(=\text{O})\text{O}$ -, гидроксидифтор(1-6С)алкил, (1-4С алкилкарбокси)(1-6С)алкил, (1-6С)алкоксикарбонил, гидроксикарбонил, аминокарбонил, (1-3С алкокси) аминокарбонил, hetCys^3 , галоген, CN, трифторметилсульфонил, N-(1-3С алкил) пиридинонил, N-(1-3С трифторалкил)пиридинонил, (1-4С алкилсилокси)(1-6С)алкокси, изоиндолин-1,3-дионил(1-6С)алкокси или N-(1-3С алкил)оксадиазолонил;

hetCys^2 представляет собой 4-6-членное гетероциклическое кольцо, имеющее в кольце 1-2 гетероатома, независимо выбранных из N и O, и optionally, замещенное 1-2 группами, независимо выбранными из (1-6С)алкила, (1-4С алкилкарбокси)(1-6С)алкила и (1-6С)ацила;

hetCys^3 представляет собой 4-7 членный гетероцикл, имеющий в кольце 1-2 гетероатома, независимо выбранных из N и O, и optionally замещенный одним или несколькими заместителями, независимо выбранными из F, CN, CF_3 , (1-6С)алкила, гидрокси(1-6С)алкила, (1-3С алкокси)(1-6С)алкила, (1-6С)ацила-, (1-6С)алкилсульфонила, трифторметилсульфонила и (1-4С алкокси)карбонила;

hetAr^3 представляет собой 5-членное гетероарильное кольцо, имеющее в кольце 1-3 атома, независимо выбранных из N, O и S, и optionally, замещенное (1-6С)алкилом;

Ar^3 представляет собой фенил, optionally, замещенный (1-4С)алкокси;

hetAr^4 представляет собой 5-6 членное гетероарильное кольцо, имеющее в кольце 1-3 гетероатома, независимо выбранных из N, S и O, и optionally, замещенное 1-2 заместителями, независимо выбранными из (1-6С)алкила, галогена, CN, гидрокси(1-6С) алкила, трифтор(1-6С)алкила, (3-6С)циклоалкила, (3-6С циклоалкил) CH_2 - (3-6С циклоалкил) $\text{C}(=\text{O})$ -, (1-3С алкокси)(1-6С)алкила, (1-6С)алкокси, (1-6С)алкилсульфонила, NH_2 , (1-6С алкил)амино, ди(1-6С алкил)амино, (1-3С трифторалкокси), (1-3С) трифторалкила и метоксибензила; или 9-10-членный бициклический гетероарил, имеющий в кольце 1-3 атома азота;

Ar^4 представляет собой фенил, optionally, замещенный одной или несколькими группами, независимо выбранными из (1-6С)алкил, галоген, CN, CF_3 , CF_3O -, (1-6С) алкокси, (1-6С алкил) $\text{OC}(=\text{O})$ -, аминокарбонил, (1-6С)алкилтио, гидрокси(1-6С)алкил, (1-6С алкил) SO_2 -, $\text{HOC}(=\text{O})$ - и (1-3С алкокси)(1-3С алкил) $\text{OC}(=\text{O})$ -;

R^5 представляет собой H, (1-6C)алкил, монофтор(1-6C)алкил, дифтор(1-6C)алкил, трифтор(1-6C)алкил, тетрафтор(2-6C)алкил, пентафтор(2-6C)алкил, галоген, CN, (1-4C) алкокси, гидроксид(1-4C)алкил, (1-3C алкокси)(1-4C)алкил, (1-4C алкил)OC(=O)-, (1-6C) алкилтио, фенил [необязательно, замещенный одной или несколькими группами, независимо выбранными из галогена, (1-6C)алкила и (1-6C)алкокси], (3-4C)циклоалкил, amino, аминокарбонил или трифтор(1-3C алкил)амидо; или

R^4 и R^5 вместе с атомами, к которым они присоединены, формируют 5-6-членное насыщенное, частично ненасыщенное или ненасыщенное карбоциклическое кольцо обязательно замещенное одним или несколькими заместителями, независимо выбранными из (1-6C)алкила, или

R^4 и R^5 вместе с атомами, к которым они присоединены, формируют 5-6-членное насыщенное, частично ненасыщенное или ненасыщенное гетероциклическое кольцо, имеющее в кольце гетероатом, выбранный из N, O или S, где указанное гетероциклическое кольцо, обязательно, является замещенным одним или двумя заместителями, независимо выбранными из (1-6C алкил)C(=O)O-, (1-6)ацила, (1-6C)алкил и оксо, и указанный атом серы в кольце, обязательно, является окисленным до S(=O) или SO₂;

hetAr⁵ представляет собой 5-6 членное гетероарильное кольцо, имеющее в кольце 1-3 гетероатома, независимо выбранных из N, O или S, где кольцо, обязательно, является замещенным одним или несколькими заместителями, независимо выбранными из галогена, (1-6C)алкила, (1-6C)алкокси и CF₃;

Ar⁵ представляет собой фенил, обязательно, замещенный одной или несколькими группами, независимо выбранными из галогена, (1-6C)алкила, (1-6C)алкокси, CF₃O-, (1-4C)алкоксикарбонила и аминокарбонила;

R^{3a} представляет собой водород, галоген, (1-6C)алкил, трифтор(1-6C)алкил, (3-6C) циклоалкил, фенил, обязательно, замещенный одним или несколькими заместителями, независимо выбранными из галогена, (1-6C)алкила и гидроксиметила, или 5-6 членное гетероарильное кольцо, имеющее в кольце 1-3 гетероатома, независимо выбранных из N, O и S, и обязательно замещенное одной или несколькими группами, независимо выбранными из (1-6C)алкила и галогена;


R^{3b} представляет собой водород, (1-6C)алкил, трифтор(1-6C)алкил, (3-6C)циклоалкил, фенил, обязательно, замещенный одним или несколькими заместителями, независимо выбранными из галогена, (1-6C)алкила и гидроксиметила, или 5-6 членное гетероарильное кольцо, имеющее в кольце 1-3 гетероатома, независимо выбранных из N, O и S, и обязательно, замещенное одной или несколькими группами, независимо выбранными из (1-6C)алкила и галогена;

R^{4a} представляет собой водород, (1-6C)алкил, трифтор(1-6C)алкил, фенил [необязательно, замещенный одной или несколькими группами, независимо выбранными из (1-6C)алкила, галогена, CN, CF₃, CF₃O-, (1-6C)алкокси, (1-6C)алкил)OC(=O)-, аминокарбонила, (1-6C)алкилтио, гидроксид(1-6C)алкила, (1-6C алкил)SO₂-, HOC(=O)- и (1-3C алкокси)(1-3C алкил)OC(=O)-], или 5-6 членное гетероарильное кольцо, имеющее в кольце 1-3 гетероатома, независимо выбранных из N, S и O, и обязательно, замещенное 1-2 заместителями, независимо выбранными из (1-6C)алкила, гидроксид(1-6C)алкила, трифтор(1-6C)алкила, (3-6C)циклоалкила, (3-6C циклоалкил)CH₂-, (3-6C

циклоалкил)C(=O)-, (1-3C алкокси)(1-6C)алкила, (1-6C)алкокси, (1-6C)алкилсульфонила, NH₂, (1-6C алкил)амино, ди(1-6C алкил)амино, (1-3C трифторалкокси)(1-3C) трифторалкила и метоксибензила; и

R^{5a} представляет собой водород, галоген, (1-6C)алкил, трифтор(1-6C)алкил, (3-6C) циклоалкил, фенил, необязательно замещенный одним или несколькими заместителями, независимо выбранными из галогена, (1-6C)алкила и гидроксиметила, или 5-6 членное гетероарильное кольцо, имеющее в кольце 1-3 гетероатома, независимо выбранных из N, O и S, и необязательно, замещенных одной или несколькими группами, независимо выбранными из (1-6C)алкила и галогена.



Дополнительные примеры ингибиторов Trk можно обнаружить в Международной публикации No. WO 2014078454, полное содержание которой приведено в настоящем описании в качестве ссылки. Например, ингибитор Trk может представлять собой соединение формулы I:



или его стереоизомеры, таутомеры или фармацевтически приемлемые соли или сольваты, где:

X представляет собой O, S, NH или N-CN;

Кольцо A представляет собой формулу A-1 или A-2



Y представляет собой H, галоген, (1-3C алкокси)(1-6C)алкил, (1-6C)алкил [необязательно, замещенный 1-5 атомами фтора], циано(1-6C)алкил, гидроксид(1-6C) алкил, дигидроксид(2-6C)алкил, аминокарбонил(1-6C)алкил, (1-6C)алкокси [необязательно, замещенный 1-5 атомами фтора], CN, аминокарбонил или (1-4C алкокси) карбонил;

R^a, R^b и R^c независимо выбраны из H, галогена, (1-3C)алкила, (1-3C)алкокси и CN;

B представляет собой NR¹, O, связь, CR^dR^e, S или SO₂;

D представляет собой NR¹, O, связь, CR^fR^g, S или SO₂;

E представляет собой NR¹, O, связь или CR^hRⁱ или SO₂;

F представляет собой CR^jR^k;

при условии, что кольцо, сформированное В, D, E, и F вместе с атомами, к которым они присоединены, содержит по меньшей мере пять атомов, и ноль или один из В, D или E представляет собой NR^1 или O;

G представляет собой CR^mR^n ;

K представляет собой NR^1 ; R^1 представляет собой (1-6C)алкил [необязательно, замещенный от одного до пяти атомами фтора], (1-6C)циклоалкил [необязательно, замещенный от одного до пяти атомами фтора], (1-3C алкокси)(2-6C)алкил [необязательно, замещенный от одного до пяти атомами фтора], (1-6C)алкилC(=O)- или (1-6C алкокси)C=O-;

R^d , R^e , R^f , R^g , R^h , R^i и R^k независимо представляют собой H, OH, (1-6C)алкил [необязательно, замещенный от одного до пяти атомами фтора], (3-6C)циклоалкил [необязательно, замещенный от одного до пяти атомами фтора], (1-3C алкокси)(2-6C)алкил [необязательно, замещенный от одного до пяти атомами фтора], гидрокси(2-6C)алкил [необязательно, замещенный от одного до пяти атомами фтора], (2-6C)цианоалкил, (1-6C)алкокси [необязательно, замещенный от одного до пяти атомами фтора], или (1-3C алкокси)(2-6C)алкокси [необязательно, замещенный от одного до пяти атомами фтора],

или одна из пар R^d и R^e , или R^f и R^g , или R^h и R^i , или R^* и R^k , вместе с атомом углерода, к которому они присоединены, формируют (3-6C)циклоалкильное, оксетанильное или азетидинильное кольцо, или одна из пар R^d и R^e , или R^f и R^g , или R^h и R^i , или R^j и R^k формирует оксо-группу,

и где только один из R^d и R^e может представлять собой OH, и ни один не представляет собой OH, если В связан с гетероатомом, и только один из R^f и R^g может представлять собой OH, и ни один не представляет собой OH, если D связан с гетероатомом, и только один из R^h и R^i может представлять собой OH, и ни один не представляет собой OH, если E связан с гетероатомом, и только один из R^j и R^k может представлять собой OH, и ни один не представляет собой OH, если F связан с гетероатомом;


R^m представляет собой H, (1-3C)алкил [необязательно, замещенный 1-5 атомами фтора], циклопропил или циклобутил, и

R^n представляет собой H или (1-3C)алкил [необязательно, замещенный 1-5 атомами фтора], или


R^m и R^n вместе формируют оксо-группу;

R^p представляет собой H, (1-6C)алкил [необязательно, замещенный от одного до пяти атомами фтора], (3-6C)циклоалкил [необязательно, замещенный от одного до пяти атомами фтора], (1-3C алкокси)(2-6C)алкил [необязательно, замещенный от одного до пяти атомами фтора], гидрокси(2-6C)алкил [необязательно, замещенный от одного до пяти атомами фтора], или (2-6C)цианоалкил;

Кольцо С представляет собой формулу C-1 или C-2



C-1



C-2

;

R^3 представляет собой (1-6C)алкил, гидрокси(1-6C)алкил, Ar^2 , $hetCyc^1$, (3-7C) циклоалкил или $hetAr^2$;

Ar^2 представляет собой фенил, необязательно, замещенный одной или несколькими группами, независимо выбранными из галогена и (1-6C)алкила; $hetCyc^1$ представляет собой 5-6-членное насыщенное или частично ненасыщенное гетероциклическое кольцо, имеющее в кольце 1-2 гетероатома, независимо выбранных из N и O;

$hetAr^2$ представляет собой 5-6 членное гетероарильное кольцо, имеющее в кольце 1-3 гетероатома, независимо выбранных из N, O и S, и необязательно, замещенное одной или несколькими группами, независимо выбранными из (1-6C)алкила и галогена;

R^4 представляет собой OH, (1-6C)алкил, монофтор(1-6C)алкил, дифтор(1-6C)алкил, трифтор(1-6C)алкил, тетрафтор(2-6C)алкил, пентафтор(2-6C)алкил, циано(1-6C)алкил, гидрокси(1-6C)алкил, дигидрокси(2-6C)алкил, (1-3C алкокси)(1-6C)алкил, amino(1-6C) алкил, аминокарбонил(1-6C)алкил, (1-3 C)алкилсульфонамидо(1-6C)алкил, сульфонамидо (1-6C)алкил, гидроксикарбонил(1-6C)алкил, $hetAr^3$ (1-6C)алкил, Ar^3 (1-6C)алкил, (1-6C) алкокси, монофтор(1-6C)алкокси, дифтор(1-6C)алкокси, трифтор(1-6C)алкокси, тетрафтор(2-6C)алкокси, пентафтор(2-6C)алкокси, циано(1-6C)алкокси, гидрокси(1-6C) алкокси, дигидрокси(2-6C)алкокси, amino(2-6C)алкокси, гидроксикарбонил(1-6C) алкокси, $hetCyc^2$ (1-6C)алкокси, $hetAr^3$ (1-6C)алкокси, Ar^3 (1-6C)алкокси, (1-4C алкокси) (1-6C)алкокси, (1-3C алкилсульфонил)(1-6C)алкокси, (3-6C)циклоалкил [необязательно, замещенный F, OH, (1-6C алкилом), (1-6C) алкокси, или (1-3C алкокси)(1-6C)алкилом], $hetAr^4$, $hetAr^4$ -0-, Ar^4 , $hetCyc^2$ (O)CH₂-, (1-4C алкоксикарбонил)(1-6C)алкокси,

гидроксикарбонил(1-6C)алкокси, аминокарбонил(1-6C)алкокси, $hetCyc^2$ C(=O)(1-6C) алкокси, гидрокси(1-3C алкокси)(1-6C)алкокси, гидрокситрифтор(1-6C)алкокси, (1-3C) алкилсульфонамидо(1-6C)алкокси, (1-3C)алкиламидо(1-6C)алкокси, ди(1-3C алкил) аминокарбокси, $hetCyc^2$ C(=O)O-, гидроксидифтор(1-6C)алкил, (1-4C алкилкарбокси)(1-6C)алкил, (1-6C)алкоксикарбонил, гидроксикарбонил, аминокарбонил, (1-3C алкокси) аминокарбонил, $hetCyc^3$, галоген, CN, трифторметилсульфонил, N-(1-3C алкил) оксадиазолонил, $hetAr^5$ или $hetCyc^4$ -0-;

$hetCyc$ представляет собой 4-6-членное гетероциклическое кольцо, имеющее в кольце 1-2 гетероатома, независимо выбранных из N и O, и необязательно, замещенное 1-2 группами, независимо выбранными из (1-6C)алкила, (1-4C алкилкарбокси)(1-6C)алкила и (1-6C)ацила;


$hetCyc^3$ представляет собой 4-7-членный гетероцикл, имеющий в кольце 1-2 гетероатома, независимо выбранных из N и O, и необязательно замещенное одним или несколькими заместителями, независимо выбранными из F, CN, (1-6C)алкила, трифтор (1-6C)алкила, гидрокси(1-6C)алкила, (1-3C алкокси)(1-6C)алкила, (1-6C)ацила-, (1-6C)

алкилсульфонила, трифторметилсульфонила и (1-4С алкокси)карбонила; hetAr^3 представляет собой 5-членное гетероарильное кольцо, имеющее в кольце 1-3 атомов, независимо выбранных из N, O и S, и необязательно, замещенное (1-6С)алкилом;

Ar^3 представляет собой фенил, необязательно, замещенный (1-4С)алкокси;

hetAr^4 представляет собой 5-6 членное гетероарильное кольцо, имеющее в кольце 1-3 гетероатома, независимо выбранных из N, S и O, и необязательно, замещенное одним или несколькими заместителями, независимо выбранными из (1-6С)алкила, галогена, CN, гидроксигруппы(1-6С)алкила, трифтор(1-6С)алкила, дифтор(1-6С)алкила, фтор(1-6С)алкила, (3-6С)циклоалкила, (3-6С циклоалкил)CH₂-, (3-6С циклоалкил)C(=O)-, (1-3С алкокси)(1-6С)алкила, (1-6С)алкокси, (1-6С)алкилсульфонила, NH₂, (1-6С алкил)амино, ди(1-6С алкил)амино, (1-3С трифторалкокси), фтор(1-6С алкил)амино, дифтор(1-6С алкил)амино, трифтор(1-6С алкил)амино и (3-4С циклоалкил)амино;

hetAr^5 представляет собой группу, выбранную из структур:



, где R^Z представляет собой (3-4С)циклоалкил или (1-3С)алкил (необязательно, замещенный 1-3 атомами фтора), где каждая из указанных групп hetAr^5 , необязательно, является дополнительно замещенной одной или несколькими группами, независимо выбранными из F и (1-3С)алкила, необязательно, замещенного 1-3 атомами фтора;

hetCys^4 представляет собой 7-8-членный гетероцикл с мостиком, имеющим в кольце атом азота, и необязательно, замещенный одной или несколькими группами, независимо выбранными из (1-6С)алкила и галогена;

Ar^4 представляет собой фенил, необязательно, замещенный одной или несколькими группами, независимо выбранными из (1-6С)алкила, галогена, CN, CF₃, CF₃O-, (1-6С)алкокси, (1-6С алкил)OC(=O)-, аминокарбонила, (1-6С)алкилтио, гидроксигруппы(1-6С)алкила, (1-6С алкил)SO₂-, НОС(=О)- и (1-3С алкокси)(1-3С алкил)OC(=O)-;

R^5 представляет собой (1-6С)алкил, монофтор(1-6С)алкил, дифтор(1-6С)алкил, трифтор(1-6С)алкил, тетрафтор(2-6С)алкил, пентафтор(2-6С)алкил, галоген, CN, (1-4С)алкокси, гидроксигруппы(1-4С)алкил, (1-3С алкокси)(1-4С)алкил, (1-4С алкил)OC(=O)-, (1-6С)алкилтио, (3-4С)циклоалкил, amino, аминокарбонил, трифтор(1-3С алкил)амидо, или фенил (необязательно, замещенный одной или несколькими группами, независимо выбранными из галогена, (1-6С)алкила и (1-6С)алкокси); или

R^4 и R^5 вместе с атомами, к которым они присоединены, формируют 5-6-членное насыщенное, частично ненасыщенное или ненасыщенное карбоциклическое кольцо, необязательно, замещенное одним или несколькими заместителями, независимо

выбранными из (1-6C)алкила, или


R^4 и R^5 вместе с атомами, к которым они присоединены, формируют 5-6-членное насыщенное, частично ненасыщенное или ненасыщенное гетероциклическое кольцо, имеющее в кольце гетероатом, выбранный из N, O или S, где указанное гетероциклическое кольцо, необязательно, является замещенным одним или двумя заместителями, независимо выбранными из (1-6C алкил)C(=O)O-, (1-6C)ацила, (1-6C) алкила и оксо, и указанный атом серы в кольце, необязательно, является окисленным до S(=O) или SO₂;

R^{3a} представляет собой галоген, (1-6C)алкил, трифтор(1-6C)алкил, (3-6C)циклоалкил, фенил, необязательно замещенный одним или несколькими заместителями, независимо выбранными из галогена и (1-6C)алкила, или 5-6 членное гетероарильное кольцо, имеющее в кольце 1-3 гетероатома, независимо выбранных из N, O и S, и необязательно, замещенное одной или несколькими группами, независимо выбранными из (1-6C)алкила и галогена;

R^{4a} представляет собой водород, (1-6C)алкил, трифтор(1-6C)алкил, фенил [необязательно, замещенный одной или несколькими группами, независимо выбранными из (1-6C)алкила, галогена, CN, CF₃, CF₃O-, (1-6C)алкокси, (1-6C)алкил)OC(=O)-, аминокарбонила, (1-6C)алкилтио, гидрокси(1-6C)алкила, (1-6C алкил)SO₂-, НОC(=O)- и (1-3C алкокси)(1-3C алкил)OC(=O)-], или 5-6 членное гетероарильное кольцо, имеющее в кольце 1-3 гетероатома, независимо выбранных из N, S и O, и необязательно, замещенное 1-2 заместителями, независимо выбранными из (1-6C)алкила, гидрокси(1-6C)алкила, трифтор(1-6C)алкила, (3-6C)циклоалкила, (3-6C циклоалкил)CH₂- (3-6C циклоалкил)C(=O)-, (1-3C алкокси)(1-6C)алкила, (1-6C)алкокси, (1-6C)алкилсульфонила, NH₂, (1-6C алкил)амино, ди(1-6C алкил)амино и (1-3C трифторалкокси)(1-3C) трифторалкила; и

R^{5a} представляет собой галоген, (1-6C)алкил, трифтор(1-6C)алкил, (3-6C)циклоалкил, фенил, необязательно, замещенный одним или несколькими заместителями, независимо выбранными из галогена и (1-6C)алкила, или 5-6 членное гетероарильное кольцо, имеющее в кольце 1-3 гетероатома, независимо выбранных из N, O и S, и необязательно, замещенное одной или несколькими группами, независимо выбранными из (1-6C)алкила и галогена.

Дополнительные примеры ингибиторов Trk можно обнаружить в Международной публикации No. WO 2014078417, полное содержание которой приведено в настоящем описании в качестве ссылки. Например, ингибитор Trk может представлять собой соединение формулы I:




или его стереоизомеры, таутомеры или фармацевтически приемлемые соли, сольваты

или пролекарства, где:

X представляет собой O, S, NH или N-CN;

Кольцо A представляет собой




10 R^1 представляет собой фенил, необязательно, замещенный одним или несколькими заместителями, независимо выбранными из галогена и (1-3C)алкила;


R^2 представляет собой (1-3C)алкил [необязательно, замещенный 1-5 атомами фтора] или (3-4C)циклоалкил [необязательно, замещенный одним или двумя атомами фтора];

15 R^6 представляет собой H или CH_3 ;

Кольцо C представляет собой формулу C-1 или C-2



C-1



C-2 ;

25 R^3 представляет собой (1-6C)алкил, гидрокси(1-6C)алкил, Ar^2 , $hetCyc^1$, (3-7C) циклоалкил, или $hetAr^2$;

Ar^2 представляет собой фенил, необязательно, замещенный одним или несколькими заместителями, независимо выбранными из галогена и (1-6C)алкила;


30 $hetCyc^1$ представляет собой 5-6-членное насыщенное или частично ненасыщенное гетероциклическое кольцо, имеющее в кольце 1-2 гетероатома, независимо выбранных из N и O;

35 $hetAr^2$ представляет собой 5-6 членное гетероарильное кольцо, имеющее в кольце 1-3 гетероатома, независимо выбранных из N, O и S и необязательно, замещенное одним или несколькими заместителями, независимо выбранными из (1-6C)алкила и галогена;

R^4 представляет собой $HetAr^4$, $hetAr^5$ или гидрокси(1-6C)алкокси;

40 $hetAr^4$ представляет собой 5-6 членное гетероарильное кольцо, имеющее в кольце 1-3 гетероатома, независимо выбранных из N, S и O, и замещенное одним или несколькими заместителями, независимо выбранными из (1-6C)алкила, галогена, CN, гидрокси(1-6C)алкила, трифтор(1-6C)алкила, дифтор(1-6C)алкила, фтор(1-6C)алкила, (3-6C)циклоалкила, (3-6C циклоалкил) CH_2 -, (3-6C циклоалкил) $C(=O)$ -, (1-3C алкокси)(1-6C)алкила, (1-6C)алкокси, (1-6C)алкилсульфонила, NH_2 , (1-6C алкил)амино, ди(1-6C алкил)амино, (1-3C трифторалкокси), фтор(1-6C алкил)амино, дифтор(1-6C алкил)амино, трифтор(1-6C алкил)амино, и (3-4C циклоалкил)амино;

45 $hetAr^5$ представляет собой группу, выбранную из структур:



, где R^Z представляет собой (3-4C)циклоалкил или (1-3C)алкил, (необязательно, замещенный 1-3 атомами фтора), где каждая из указанных групп $hetAr^5$, необязательно, является дополнительно замещенной одним или несколькими заместителями, независимо выбранными из F и (1-3C)алкила, необязательно, замещенного 1-3 атомами фтора;

R^5 представляет собой (1-6C)алкил, монофтор(1-6C)алкил, дифтор(1-6C)алкил, трифтор(1-6C)алкил, тетрафтор(2-6C)алкил, пентафтор(2-6C)алкил, галоген, CN, (1-4C)алкокси, гидрокси(1-4C)алкил, (1-3C алкокси)(1-4C)алкил, (1-4C алкил)OC(=O)-, (1-6C)алкилтио, (3-4C)циклоалкил, amino, аминокарбонил, трифтор(1-3C алкил)амидо или фенил (необязательно, замещенный одним или несколькими заместителями, независимо выбранными из галогена, (1-6C)алкила и (1-6C)алкокси); или

R^4 и R^5 вместе с атомами, к которым они присоединены, формируют 5-6-членное насыщенное, частично ненасыщенное или ненасыщенное карбоциклическое кольцо, необязательно, замещенное одним или несколькими заместителями, независимо выбранными из (1-6C)алкила, или


R^4 и R^5 вместе с атомами, к которым они присоединены, формируют 5-6-членное насыщенное, частично ненасыщенное или ненасыщенное гетероциклическое кольцо, имеющее в кольце гетероатом, выбранный из N, O или S, где указанное гетероциклическое кольцо, необязательно, является замещенным одним или двумя заместителями, независимо выбранными из (1-6C алкил)C(=O)O-, (1-6C)ацила, (1-6C)алкила и оксо, и указанный атом серы в кольце, необязательно, является окисленным до S(=O) или SO₂; R представляет собой водород, галоген, (1-6C)алкил, трифтор(1-6C)алкил, (3-6C)циклоалкил, фенил, необязательно, замещенный одним или несколькими заместителями, независимо выбранными из галогена и (1-6C)алкила, или 5-6 членное гетероарильное кольцо, имеющее в кольце 1-3 гетероатома, независимо выбранных из N, O и S, и необязательно, замещенное одним или несколькими заместителями, независимо выбранными из (1-6C)алкила и галогена;

R^{4a} представляет собой водород, (1-6C)алкил, трифтор(1-6C)алкил, фенил [необязательно, замещенный одним или несколькими заместителями, независимо выбранными из (1-6C)алкила, галогена, CN, CF₃, CF₃O-, (1-6C)алкокси, (1-6C)алкил)OC(=O)-, аминокарбонила, (1-6C)алкилтио, гидрокси(1-6C)алкила, (1-6C алкил)SO₂-, НОС(=O)- и (1-3C алкокси)(1-3C алкил)OC(=O)-], или 5-6 членное гетероарильное кольцо, имеющее в кольце 1-3 гетероатома, независимо выбранных из N, S и O, и необязательно, замещенное 1-2 заместителями, независимо выбранными из (1-6C)алкила, гидрокси(1-6C)алкила, трифтор(1-6C)алкила, (3-6C)циклоалкила, (3-6C циклоалкил)CH₂-, (3-6C циклоалкил)C(=O)-, (1-3C алкокси)(1-6C)алкила, (1-6C)алкокси, (1-6C)алкилсульфонила,

NH₂, (1-6C алкил)амино, ди(1-6C алкил)амино и (1-3C трифторалкокси)(1-3C) трифторалкила; и

R^{5a} представляет собой водород, галоген, (1-6C)алкил, трифтор(1-6C)алкил, (3-6C) циклоалкил, фенил, необязательно, замещенный одним или несколькими заместителями, независимо выбранными из галогена и (1-6C)алкила, или 5-6 членное гетероарильное кольцо, имеющее в кольце 1-3 гетероатома, независимо выбранных из N, O и S, и необязательно, замещенное одним или несколькими заместителями, независимо выбранными из (1-6C)алкила и галогена.





Дополнительные примеры ингибиторов Ttk можно обнаружить в Международной публикации No. WO 2014078408, полное содержание которой приведено в настоящем описании в качестве ссылки. Например, ингибитор Ttk может представлять собой соединение формулы I:



или его стереоизомеры, таутомеры или фармацевтически приемлемые соли, сольваты или пролекарства, где:

X представляет собой O, S, NH или -N-CN;

Кольцо A представляет собой формулу A-1, A-2, A-3 или A-4




R¹ представляет собой H, галоген, (1-3C)алкил [необязательно, замещенный 1-5 атомами фтора], (1-3C)алкокси [необязательно, замещенный 1-5 атомами фтора] или (3-5C)циклоалкил;

Y представляет собой Ar¹ или hetAr¹;


Ar¹ представляет собой фенил, необязательно, замещенный одним или несколькими заместителями, независимо выбранными из галогена, (1-3C)алкила [необязательно, замещенного 1-5 атомами фтора], и (1-3C)алкокси [необязательно, замещенного 1-5 атомами фтора];

hetAr¹ представляет собой пиридил, необязательно, замещенный одним или несколькими заместителями, независимо выбранными из галогена, (1-3C)алкила [необязательно, замещенного 1-5 атомами фтора] и (1-3C)алкокси [необязательно, замещенного 1-5 атомами фтора];

Кольцо C представляет собой формулу C-1 или C-2



C-1



C-2

;

R^3 представляет собой (1-6C)алкил, гидрокси(1-6C)алкил, Ar^2 , $hetCyc^1$, (3-7C)

циклоалкил или $hetAr^2$; Ar представляет собой фенил, необязательно, замещенный одним или несколькими заместителями, независимо выбранными из галогена и (1-6C)алкила; $hetCyc^1$ представляет собой 5-6-членное насыщенное или частично ненасыщенное гетероциклическое кольцо, имеющее в кольце 1-2 гетероатома, независимо выбранных из N и O;

$hetAr^2$ представляет собой 5-6 членное гетероарильное кольцо, имеющее в кольце 1-3 гетероатома, независимо выбранных из N, O и S, и необязательно, замещенное одним или несколькими заместителями, независимо выбранными из (1-6C)алкила и галогена;

R^4 представляет собой OH, (1-6C)алкил, монофтор(1-6C)алкил, дифтор(1-6C)алкил, трифтор(1-6C)алкил, тетрафтор(2-6C)алкил, пентафтор(2-6C)алкил, циано(1-6C)алкил, гидрокси(1-6C)алкил, дигидрокси(2-6C)алкил, (1-3C алкокси)(1-6C)алкил, amino(1-6C) алкил, аминокарбонил(1-6C)алкил, (1-3C)алкилсульфонамидо(1-6C)алкил, сульфонамидо (1-6C)алкил, гидроксикарбонил(1-6C)алкил, $hetAr^3$ (1-6C)алкил, Ar^3 (1-6C)алкил, (1-6C) алкокси, монофтор(1-6C)алкокси, дифтор(1-6C)алкокси, трифтор(1-6C)алкокси, тетрафтор(2-6C)алкокси, пентафтор(2-6C)алкокси, циано(1-6C)алкокси, гидрокси(1-6C) алкокси, дигидрокси(2-6C)алкокси, amino(2-6C)алкокси, гидроксикарбонил(1-6C) алкокси, $hetCyc^2$ (1-6C)алкокси, $hetAr^3$ (1-6C)алкокси, Ar^3 (1-6C)алкокси, (1-4C алкокси) (1-6C)алкокси, (1-3C алкилсульфонил)(1-6C)алкокси, (3-6C)циклоалкил [необязательно, замещенный F, OH, (1-6C алкилом), (1-6C) алкокси, или (1-3C алкокси)(1-6C)алкилом], $hetAr^4$, $hetAr^4-O-$, Ar^4 , $hetCyc^2(O)CH_2-$, (1-4C алкоксикарбонил)(1-6C)алкокси,

гидроксикарбонил(1-6C)алкокси, аминокарбонил(1-6C)алкокси, $hetCyc^2C(=O)(1-6C)$ алкокси, гидрокси(1-3C алкокси)(1-6C)алкокси, гидрокситрифтор(1-6C)алкокси, (1-3C) алкилсульфонамидо(1-6C)алкокси, (1-3C)алкиламидо(1-6C)алкокси, ди(1-3C алкил) amino-карбоксии, $hetCyc^2C(=O)O-$, гидроксидифтор(1-6C)алкил, (1-4C алкилкарбоксии)(1-6C)алкил, (1-6C)алкоксикарбонил, гидроксикарбонил, аминокарбонил, (1-3C алкокси) аминокарбонил, $hetCyc^3$, галоген, CN, трифторметилсульфонил, N-(1-3C алкил)

оксадиазолонил, или $hetAr^5$;

$hetCyc$ представляет собой 4-6-членное гетероциклическое кольцо, имеющее в кольце 1-2 гетероатома, независимо выбранных из N и O, и необязательно, замещенное 1-2 группами, независимо выбранными из (1-6C)алкила, (1-4C алкилкарбоксии)(1-6C)алкила и (1-6C)ацила;

$hetCyc$ представляет собой 4-7-членный гетероцикл, имеющий в кольце 1-2 гетероатома, независимо выбранных из N и O, и необязательно, замещенный одним или несколькими заместителями, независимо выбранными из F, CN, (1-6C)алкила, трифтор(1-6C)алкила, гидрокси(1-6C)алкила, (1-3C алкокси)(1-6C)алкила, (1-6C)ацила-,


(1-6C)алкилсульфонила, трифторметилсульфонила и (1-4C алкокси)карбонила;

hetAr³ представляет собой 5-членное гетероарильное кольцо, имеющее в кольце 1-3 атома, независимо выбранных из N, O и S, и необязательно, замещенное (1-6C)алкилом;

AT³ представляет собой фенил, необязательно, замещенный (1-4C)алкокси;

hetAr⁴ представляет собой 5-6 членное гетероарильное кольцо, имеющее в кольце 1-3 гетероатома, независимо выбранных из N, S и O, и необязательно, замещенное одним или несколькими заместителями, независимо выбранными из (1-6C)алкила, галогена, CN, гидроксигруппы(1-6C)алкила, трифтор(1-6C)алкила, дифтор(1-6C)алкила, фтор(1-6C)алкила, (3-6C)циклоалкила, (3-6C циклоалкил)CH₂-, (3-6C циклоалкил)C(=O)-, (1-3C алкокси)(1-6C)алкила, (1-6C)алкокси, (1-6C)алкилсульфонила, NH₂, (1-6C алкил)амино, ди(1-6C алкил)амино, (1-3C трифторалкокси), фтор(1-6C алкил)амино, дифтор(1-6C алкил)амино, трифтор(1-6C алкил)амино и (3- 4C циклоалкил)амино;

hetAr⁵ представляет собой группу, выбранную из структур:



, где R² представляет собой (3-4C)циклоалкил или (1-3C)алкил, (необязательно, замещенный 1-3 атомами фтора), где каждая из указанных групп hetAr⁵, необязательно, является дополнительно замещенной одним или несколькими заместителями, независимо выбранными из F и (1-3C)алкила, необязательно, замещенного 1-3 атомами фтора;

Ar⁴ представляет собой фенил, необязательно, замещенный одним или несколькими заместителями, независимо выбранными из (1-6C)алкила, галогена, CN, CF₃, CF₃O-, (1-6C)алкокси, (1-6C)алкил)OC(=O)-, аминокарбонила, (1-6C)алкилтио, гидроксигруппы(1-6C)алкила, (1-6C алкил)SO₂-, НОС(=O)- и (1-3C алкокси)(1-3C алкил)OC(=O)-;

R⁵ представляет собой (1-6C)алкил, монофтор(1-6C)алкил, дифтор(1-6C)алкил, трифтор(1-6C)алкил, тетрафтор(2-6C)алкил, пентафтор(2-6C)алкил, галоген, CN, (1-4C) алкокси, гидроксигруппы(1-4C)алкил, (1-3C алкокси)(1-4C)алкил, (1-4C алкил)OC(=O)-, (1-6C) алкилтио, (3-4C)циклоалкил, амино, аминокарбонил, трифтор(1-3C алкил)амидо, или фенил (необязательно, замещенный одним или несколькими заместителями, независимо выбранными из галогена, (1-6C)алкила и (1-6C)алкокси); или

R⁴ и R⁵ вместе с атомами, к которым они присоединены, формируют 5-6-членное насыщенное, частично ненасыщенное или ненасыщенное карбоциклическое кольцо, необязательно, замещенное одним или несколькими заместителями, независимо выбранными из (1-6C)алкила, или R⁴ и R⁵ вместе с атомами, к которым они присоединены, формируют 5-6-членное насыщенное, частично ненасыщенное или ненасыщенное гетероциклическое кольцо, имеющее в кольце гетероатом, выбранный из N, O или S, где указанное гетероциклическое кольцо, необязательно, является замещенным одним или двумя заместителями, независимо выбранными из (1-6C алкил)


S(=O)O-, (1-6C)ацила, (1-6C)алкила и оксо, и указанный атом серы в кольце, необязательно, является окисленным до S(=O) или SO₂;

R^{3a} представляет собой водород, галоген, (1-6C)алкил, трифтор(1-6C)алкил, (3-6C)циклоалкил, фенил, необязательно, замещенный одним или несколькими заместителями, независимо выбранными из галогена и (1-6C)алкила, или 5-6 членное гетероарильное кольцо, имеющее в кольце 1-3 гетероатома, независимо выбранных из N, O и S, и необязательно, замещенное одним или несколькими заместителями, независимо выбранными из (1-6C)алкила и галогена;

R^{4a} представляет собой водород, (1-6C)алкил, трифтор(1-6C)алкил, фенил [необязательно, замещенный одним или несколькими заместителями, независимо выбранными из (1-6C)алкила, галогена, CN, CF₃, CF₃O-, (1-6C)алкокси, (1-6C)алкил)OC(=O)-, аминокарбонила, (1-6C)алкилтио, гидрокси(1-6C)алкила, (1-6C)алкил)SO₂-, НОC(=O)- и (1-3C)алкокси(1-3C)алкил)OC(=O)-], или 5-6 членное гетероарильное кольцо, имеющее в кольце 1-3 гетероатома, независимо выбранных из N, S и O, и необязательно, замещенное 1-2 заместителями, независимо выбранными из (1-6C)алкил, гидрокси(1-6C)алкил, трифтор(1-6C)алкил, (3-6C)циклоалкила, (3-6C)циклоалкил)CH₂-, (3-6C)циклоалкил)C(=O)-, (1-3C)алкокси(1-6C)алкила, (1-6C)алкокси, (1-6C)алкилсульфонила, NH₂, (1-6C)алкил)амино, ди(1-6C)алкил)амино и (1-3C)трифторалкокси(1-3C)трифторалкила; и

R^{5a} представляет собой водород, галоген, (1-6C)алкил, трифтор(1-6C)алкил, (3-6C)циклоалкил, фенил, необязательно замещенный одним или несколькими заместителями, независимо выбранными из галогена и (1-6C)алкила, или 5-6 членное гетероарильное кольцо, имеющее в кольце 1-3 гетероатома, независимо выбранных из N, O и S, и необязательно, замещенное одним или несколькими заместителями, независимо выбранными из (1-6C)алкила и галогена.

Дополнительные примеры ингибиторов Trk можно обнаружить в Международной публикации No. WO 2014078378, полное содержание которой приведено в настоящем описании в качестве ссылки. Например, ингибитор Trk может представлять собой соединение формулы I:



или его стереоизомеры, таутомеры или фармацевтически приемлемые соли, сольваты или пролекарства, где:

Кольцо В и группа NH-C(=X)-NH находятся в транс-конфигурации;

R^a, R^b, R^c и R^d независимо выбраны из H и (1-3C)алкила,

или R^c и R^d независимо выбраны из H и (1-3C)алкила, и R^a и R^b вместе с атомом, к которому они присоединены, формируют циклопропильное кольцо;

X представляет собой O, S, NH или N-CN;


R^1 представляет собой (1-3C алкокси)(1-6C)алкил, (трифторметокси)(1-6C)алкил, (1-3C сульфанил)(1-6C)алкил, монофтор(1-6C)алкил, дифтор(1-6C)алкил, трифтор(1-6C)алкил, тетрафтор(2-6C)алкил, пентафтор(2-6C)алкил, циано(1-6C)алкил, аминокарбонил (1-6C)алкил, гидроксид(1-6C)алкил, дигидроксид(2-6C)алкил, (1-6C)алкил, (1-3C алкиламино)(1-3C)алкил, (1-4C алкоксикарбонил)(1-6C)алкил, амино(1-6C)алкил, гидроксид(1-3C алкокси)(1-6C)алкил, ди(1-3C алкокси)(1-6C)алкил, (1-3C алкокси)трифтор (1-6C)алкил, гидрокситрифтор(1-6C)алкил, (1-4C алкоксикарбонил)(1-3C алкокси)(1-6C)алкил, или гидроксикарбонил(1-3C алкокси)(1-6C)алкил;

R^2 представляет собой H, F или OH;


Кольцо В представляет собой Ar^1 или $hetAr^1$;

Ar^1 представляет собой фенил, необязательно, замещенный одним или несколькими заместителями, независимо выбранными из галогена, CF_3 , CF_3O -, (1-4C)алкокси, гидроксид (1-4C)алкила, (1-6C)алкила и CN; $hetAr^1$ представляет собой 5-6-членный гетероарил, имеющий в кольце 1-3 кольцевых гетероатома, независимо выбранных из N, S и O, и необязательно, замещенный одной или несколькими группами, независимо выбранными из (1-6C)алкила, галогена, OH, CF_3 , NH_2 и гидроксид(1-2C)алкила;


Кольцо С выбрано из формул C-1 - C-13:




C-1




C-2




C-3




C-4




C-5




C-6




C-7




C-8




C-9




C-10



C-11



C-12



C-13

R представляет собой H, NH_2 , CN, галоген, (1-3C)алкил [необязательно, замещенный 1-3 атомами фтора], $H_2NC(=O)-$, (1-3C алкил) $NHC(=O)-$, ди(1-3C алкил) $NHC(=O)K$ гидроксид

(1-3C)алкил, $\text{CH}_3\text{OCH}_2\text{CH}_2$, (3-4C)циклоалкил или (1-3C)алкокси;

R^{3a} представляет собой H, (1-3C)алкил, $\text{CF}_3\text{CH}_2\text{CH}_2$, $\text{HCF}_2\text{CH}_2\text{CH}_2$, $\text{H}_2\text{FCCH}_2\text{CH}_2$, CF_3CH_2 , HOCH_2CH_2 , $\text{MeOCH}_2\text{CH}_2$ или (3-4C)циклоалкил;

5 R^4 представляет собой H, OH, (1-6C)алкил [необязательно, замещенный 1-5 атомами фтора], циано(1-6C)алкил, гидрокси(1-6C)алкил, дигидрокси(2-6C)алкил, (1-3C алкокси) (1-6C)алкил, амина(1-6C)алкил, аминакарбонил(1-6C)алкил, (1-3C)алкилсульфонамидо (1-6C)алкил, сульфамидо(1-6C)алкил, гидроксикарбонил(1-6C)алкил, hetAr^3 (1-6C)алкил, 10 Ar^3 (1-6C)алкил, (1-6C)алкокси [необязательно, замещенный 1-5 атомами фтора], циано (1-6C)алкокси, гидрокси(1-6C)алкокси, дигидрокси(2-6C)алкокси, амина(2-6C)алкокси, гидроксикарбонил(1-6C)алкокси, hetCys (1-6C)алкокси, hetAr^3 (1-6C)алкокси, Ar^3 (1-6C) алкокси, (1-4C алкокси)(1-6C)алкокси, (1-3C алкилсульфонил)(1-6C)алкокси, (3-6C) циклоалкил [необязательно, замещенный F, OH, (1-6C алкилом)], (1-6C) алкокси, или (1- 15 3C алкокси)(1-6C)алкилом], hetAr^4 , hetAr^4 -O-, Ar^4 , $\text{hetCys}^2(\text{O})\text{CH}_2$ -, (1-4C алкоксикарбонил) (1-6C)алкокси, гидроксикарбонил(1-6C)алкокси, аминакарбонил(1-6C)алкокси, hetCys^2C (=O)(1-6C)алкокси, гидрокси(1-3 C алкокси)(1-6C)алкокси, гидрокситрифтор(1-6C) алкокси, (1-3C)алкилсульфонамидо(1-6C)алкокси, (1-3C)алкиламидо(1-6C)алкокси, ди 20 (1-3C алкил)аминакарбокси, $\text{hetCys C}(=\text{O})\text{O}$ -, гидроксидифтор(1-6C)алкил, (1-4C алкилкарбокси)(1-6C)алкил, (1-6C)алкоксикарбонил, гидроксилкарбонил, аминакарбонил, (1-3C алкокси)аминакарбонил, hetCys , галоген, CN, трифторметилсульфонил, N-(1-3C алкил)оксадиазолонил или hetAr^5 ;

25 R^{4a} представляет собой H, (1-6C)алкил, $\text{CF}_3\text{CH}_2\text{CH}_2$, $\text{HCF}_2\text{CH}_2\text{CH}_2$, $\text{H}_2\text{FCCH}_2\text{CH}_2$, CF_3CH_2 , циано(1-6C)алкил, гидрокси(1-6C)алкил, дигидрокси(2-6C)алкил, (1-3C алкокси) (1-6C)алкил, амина(1-6C)алкил, аминакарбонил(1-6C)алкил, (1-3C)алкилсульфонамидо (1-6C)алкил, сульфамидо(1-6C)алкил, гидроксикарбонил(1-6C)алкил, hetAr^3 (1-6C)алкил, 30 Ar^3 (1-6C)алкил, (3-6C)циклоалкил [необязательно, замещенный F, OH, (1-6C алкилом)], (1-6C) алкокси или (1-3 C алкокси)(1-6C)алкилом], hetAr^4 , Ar^4 , гидроксидифтор(1-6C) алкил, (1-4C алкилкарбокси)(1-6C)алкил, hetCys^3 , N-(1-3C алкил)оксадиазолонил или hetAr^5 ;

35 hetCys представляет собой 4-6-членное гетероциклическое кольцо, имеющее в кольце 1-2 гетероатома, независимо выбранных из N и O, и необязательно, замещенное 1-2 группами, независимо выбранными из (1-6C)алкила, (1-4C алкилкарбокси)(1-6C)алкила и (1-6C)ацила;

40 hetCys представляет собой 4-7-членный гетероцикл, имеющий в кольце 1-2 гетероатома, независимо выбранных из N и O, и необязательно, замещенный одним или несколькими заместителями, независимо выбранными из F, CN, (1-6C)алкила, трифтор(1-6C)алкила, гидрокси(1-6C)алкила, (1-3C алкокси)(1-6C)алкила, (1-6C)ацила-, (1-6C)алкилсульфонила, трифторметилсульфонила и (1-4C алкокси)карбонила;







45 hetAr представляет собой 5-членное гетероарильное кольцо, имеющее в кольце 1-3 атома, независимо выбранных из N, O и S, и необязательно, замещенное (1-6C)алкилом;

Ar представляет собой фенил, необязательно, замещенный (1-4C)алкокси;

hetAr^4 независимо представляет собой 5-6 членное гетероарильное кольцо, имеющее в кольце 1-3 гетероатома, независимо выбранных из N, S и O, и необязательно,

замещенное одним или несколькими заместителями, независимо выбранными из (1-6С) алкила [необязательно, замещенного 1-3 атомами фтора], галогена, CN, гидрокс(1-6С)алкил, (3-6С)циклоалкила, (3-6С циклоалкил)CH₂-, (3-6С циклоалкил)C(=O)-, (1-3С алкокси)(1-6С)алкил, (1-6С)алкокси, (1-6С)алкилсульфонила, NH₂, (1-6С алкил)амино, ди(1-6С алкил)амино, (1-3С трифторалкокси), фтор(1-6С алкил)амино, дифтор(1-6С алкил)амино, трифтор(1-6С алкил)амино и (3-4С циклоалкил)амино;

hetAr⁵ представляет собой группу, выбранную из структур:



где R^Z представляет собой (3-4С)циклоалкил или (1-3С)алкил (необязательно, замещенный 1-3 атомами фтора), где каждая из указанных групп hetAr⁵, необязательно, является дополнительно замещенной одной или несколькими группами, независимо выбранными из F и (1-3С)алкила, необязательно, замещенного 1-3 атомами фтора;

Ar⁴ представляет собой фенил, необязательно, замещенный одной или несколькими группами, независимо выбранными из (1-6С)алкила, галогена, CN, CF₃, CF₃O-, (1-6С)алкокси, (1-6С алкил)OC(=O)-, аминокарбонила, (1-6С)алкилтио, гидрокс(1-6С)алкила, (1-6С алкил)SO₂-, НОС(=O)- и (1-3С алкокси)(1-3С алкил)OC(=O)-;

R⁵ представляет собой H, (1-6С)алкил [необязательно, замещенный 1-5 атомами фтора], галоген, CN, (1-4С)алкокси, гидрокс(1-4С)алкил, (1-3С алкокси)(1-4С)алкил, (1-4С алкил)OC(=O)-, (1-6С)алкилтио, (3-4С)циклоалкил, amino, аминокарбонил, трифтор(1-3С алкил)амидо, или фенил [необязательно, замещенный одной или несколькими группами, независимо выбранными из галогена, (1-6С)алкила и (1-6С)алкокси];

R^{5a} представляет собой H, (1-6С)алкил, CF₃CH₂CH₂, HCF₂CH₂CH₂, H₂FCCH₂CH₂, CF₃CH₂, гидрокс(1-4С)алкил, (1-3С алкокси)(1-4С)алкил, (3-4С)циклоалкил, или фенил [необязательно, замещенный одной или несколькими группами, независимо выбранными из галогена, (1-6С)алкила и (1-6С)алкокси];

R представляет собой (1-6С)алкил, (3-6С)циклоалкил или фенил [необязательно, замещенный одной или несколькими группами, независимо выбранными из галогена, (1-6С)алкила, (1-6С)алкокси, (3-4С)циклоалкила, amino, аминокарбонила и трифтор(1-3С)алкиламида];


R^{8a} и R^{8b} независимо представляют собой H, галоген, CN, NH₂, (1-6С)алкил [необязательно, замещенный 1-5 атомами фтора], (1-6С)алкокси, (1-3С алкокси)(1-6С)алкил, (1-3С алкокси)(1-6С)алкокси, (1-6С алкил)сульфонил, (3-6С циклоалкил)сульфонил, (3-4С)циклоалкил, amino, (1-6С)алкилNH-, фенил [необязательно, замещенный (1-6С

алкил)SO₂-] или hetAr⁴, где только один из R^{8a} и R^{8b} может представлять собой фенил [необязательно, замещенный (1-6C алкил)SO₂-] или hetAr⁴;

R⁹ представляет собой H, (1-6C)алкил, CF₃CH₂-, CF₃CH₂CH₂-, (1-3C алкокси)(1-6C) алкил или (3- 4C)циклоалкил; и

R¹⁰ представляет собой (3-6C)циклоалкил или фенил, [необязательно, замещенный одним или несколькими заместителями, независимо выбранными из галогена, (1-6C) алкила, (1-6C)алкокси, (3-4C)циклоалкила, amino, аминокарбонила и трифтор(1-3C алкил)амидо].

Дополнительные примеры ингибиторов Trk можно обнаружить в Международной публикации No. WO 2014078372, полное содержание которой приведено в настоящем описании в качестве ссылки. Например, ингибитор Trk может представлять собой соединение формулы I:



или его стереоизомеры, таутомеры или фармацевтически приемлемые соли, сольваты или пролекарства, где:

Кольцо B и группа NH-C(=X)-NH находятся в транс-конфигурации;

R^a, R^b, R^c и R^d независимо выбраны из H и (1-3C)алкила,

или R^c и R^d независимо выбраны из H и (1-3C)алкила, и R^a и R^b вместе с атомами, к которым они присоединены, формируют циклопропильное кольцо;

X представляет собой O, S, NH или N-CN;

R¹ представляет собой (1-3C алкокси)(1-6C)алкил, (трифторметокси)(1-6C)алкил, (1-3C сульфанил)(1-6C)алкил, монофтор(1-6C)алкил, дифтор(1-6C)алкил, трифтор(1-6C) алкил, тетрафтор(2- 6C)алкил, пентафтор(2-6C)алкил, циано(1-6C)алкил, аминокарбонил (1-6C)алкил, гидроксид(1-6C)алкил, дигидроксид(2-6C)алкил, (1-6C)алкил, (1-3C) алкиламино(1-3C)алкил, (1-4C) алкоксикарбонил(1-6C)алкил, amino(1-6C)алкил, гидроксид(1-3C алкокси)(1-6C)алкил, ди(1-3C алкокси)(1-6C)алкил, (1-3C алкокси)трифтор (1-6C)алкил, гидроксидтрифтор(1-6C)алкил, (1-4C алкоксикарбонил)(1-3C алкокси)(1-6C)алкил или гидроксикарбонил(1-3C алкокси)(1-6C)алкил;


R² представляет собой H, F или OH;

Кольцо B представляет собой Ar¹ или hetAr¹;


Ar¹ представляет собой фенил, необязательно, замещенный одним или несколькими

заместителями, независимо выбранными из галогена, CF_3 , CF_3O -, (1-4C)алкокси, гидрокси (1-4C)алкила, (1-6C)алкила и CN; hetAr^1 представляет собой 5-6-членный гетероарил, имеющий в кольце 1-3 гетероатомов, независимо выбранных из N, S и O, и необязательно, замещенный одной или несколькими группами, независимо выбранными из (1-6C) алкила, галогена, OH, CF_3 , NH_2 и гидрокси(1-2C)алкила;


Кольцо С выбрано из формул C-1 - C-9




C-1




C-2




C-3




C-4




C-5




C-6



C-7



C-8



C-9

R представляет собой H, галоген или фенил [необязательно, замещенный одним или несколькими заместителями, независимо выбранными из галогена и (1-3C)алкила];


R^{7a} и R^{7b} независимо представляют собой H, (1-6C)алкил или фенил [необязательно, замещенный одним или несколькими заместителями, независимо выбранными из галогена и (1-3C)алкила], где только один из R^{7a} и R^{7b} может представлять собой фенил, необязательно, замещенный одним или несколькими заместителями, независимо выбранными из галогена и (1-3C)алкила;

R^8 представляет собой фенил, необязательно, замещенный одним или несколькими заместителями, независимо выбранными из галогена, (1-3C)алкила и (3-6C)циклоалкила;

R^9 представляет собой H, галоген, (1-6C)алкил [необязательно, замещенный от одного до пяти атомами фтора] или (1- 6C)алкокси; и

R^{10} представляет собой H или (1-6C)алкил.



Дополнительные примеры ингибиторов Trk можно обнаружить в Международной публикации No. WO 2014078331, полное содержание которой приведено в настоящем описании в качестве ссылки. Например, ингибитор Trk может представлять собой соединение формулы I-C:



или его стереоизомеры, таутомеры или фармацевтически приемлемые соли, сольваты или пролекарства, где:

X представляет собой O, S, NH или N-CN;

Кольцо A представляет собой формулу A-1 или A-2



, где пунктирные линии представляют собой необязательные двойные связи;

n представляет собой 0 или 1, когда кольцо A представляет собой формулу A-1, и n представляет собой 0, когда кольцо A представляет собой формулу A-2;

G^1 , G^2 и G^3 независимо представляют собой CR^X или N, где не более 2 из G^1 , G^2 и G^3 могут представлять собой N;

каждый из R^X независимо представляет собой H, галоген, (1-4C)алкил или (1-4C)алкокси;

R^1 представляет собой H, галоген, (1-3C)алкокси(1-3C)алкил (необязательно, замещенный 1-5 атомами фтора), (1-3C алкил)сульфанил(1-3C)алкил (необязательно, замещенный 1-5 атомами фтора), (1-3C)алкил (необязательно, замещенный 1-5 атомами фтора), (1-3C)алкокси (необязательно, замещенный 1-5 атомами фтора), (1-3C алкил)сульфанил (необязательно, замещенный 1-5 атомами фтора), циано(1-3C)алкил (необязательно, замещенный 1-5 атомами фтора), гидроксид(1-3C)алкил (необязательно, замещенный 1-5 атомами фтора), (1-4C)алкил (необязательно, замещенный 1-5 атомами фтора), $CH_3CH_2NR^y$, $CF_3CH_2NR^y$, $HCF_2CH_2NR^y$, $H_2CFCH_2NR^y$, $CH_3NR^yCH_2$, $R^yR^yNCH_2CH_2$, $R^yR^yNCH_2CFH$, или $R^yR^yNCH_2CF_2$;

каждый из R^y независимо представляет собой Н или метил;

когда n представляет собой 0, R выбран из группы, состоящей из Н, галогена, (1-6C) алкила [необязательно, замещенного 1-5 атомами фтора], (1-6C)алкокси [необязательно, замещенного 1-5 атомами фтора], (1-3C алкокси)(1-4C)алкила, (3-6C циклоалкил)CH₂O-,
 5 амино(1-3C)алкила, CF₃CH₂NHCH₂, HCF₂CH₂NHCH₂, C5-C8 циклоалкила с мостиком, hetCyc³, hetCyc^aCH₂, Cys^a, hetAr¹ и Ar¹, и

когда n представляет собой 1, R выбран из группы, состоящей из Н, галогена, CF₃,
 10 F₂CH, FCH₂, метила и метокси.

hetCyc³ представляет собой 4-6-членное гетероциклическое кольцо, имеющее в кольце гетероатом, выбранный из N, O и S, и необязательно, замещенное 1-3 группами, независимо выбранными из OH, F, (1-6C)алкокси или (1-6C)алкила [необязательно, замещенного 1-3 атомами фтора];

15 Cys^a представляет собой (3-6C)циклоалкил, необязательно замещенный (1-4C)алкокси, (1-4C)алкилом, F или OH;

hetAr¹ представляет собой 5-6-членный гетероарил, имеющий в кольце 1-3 гетероатомов, независимо выбранных из N, S и O, и необязательно, замещенный 1-2 группами, независимо выбранными из (1-6C)алкила, галогена, OH, CF₃, NH₂ и гидроксид (1-2C)алкила;

20 Ar¹ представляет собой фенил, необязательно, замещенный одним или несколькими заместителями, независимо выбранными из галогена, CF₃, CF₃O-, (1-4C)алкокси, (1-4C)сульфанил, гидроксид(1-4C)алкила, (1-6C)алкила и CN;

25 R^a представляет собой Н, (1-3C)алкил, циклопропил, циклобутил или CF₃, и


R^b представляет собой Н, метил или этил,

или R^a и R^b вместе с атомом углерода, к которому они присоединены, формируют
 30 3-6-членное циклоалкильное кольцо;


R^c представляет собой Н, метил или этил

R^d представляет собой CF₃CH₂CH₂, фенил или фенилCH₂-, где каждое фенильное кольцо, необязательно, является замещенным одним или несколькими заместителями,
 35 независимо выбранными из галогена, метокси и метоксиметила;

Кольцо С представляет собой формулу C-1 или C-2



C-1



C-2

R³ представляет собой (1-6C)алкил, гидроксид(1-6C)алкил, Ar², hetCyc¹, (3-7C) циклоалкил, C5-C8 циклоалкил с мостиком или hetAr²;

45 Ar² представляет собой фенил, необязательно, замещенный одной или несколькими группами, независимо выбранными из галогена и (1-6C)алкила;

hetCyc¹ представляет собой 5-6-членное насыщенное или частично ненасыщенное

гетероциклическое кольцо, имеющее в кольце 1-2 гетероатома, независимо выбранных из N и O;

hetAr представляет собой 5-6 членное гетероарильное кольцо, имеющее в кольце 1-3 гетероатома, независимо выбранных из N, O и S, и необязательно, замещенное одной или несколькими группами, независимо выбранными из (1-6C)алкила и галогена;

R⁴ представляет собой OH, (1-6C)алкил, монофтор(1-6C)алкил, дифтор(1-6C)алкил, трифтор(1-6C)алкил, тетрафтор(2-6C)алкил, пентафтор(2-6C)алкил, циано(1-6C)алкил, гидрокси(1-6C)алкил, дигидрокси(2-6C)алкил, (1-3C алкокси)(1-6C)алкил, amino(1-6C) алкил, аминокарбонил(1-6C)алкил, (1-3C)алкилсульфонамидо(1-6C)алкил, сульфонамидо (1-6C)алкил, гидроксикарбонил(1-6C)алкил, hetAr³(1-6C)алкил, Ar³(1-6C)алкил, (1-6C) алкокси, монофтор(1-6C)алкокси, дифтор(1-6C)алкокси, трифтор(1-6C)алкокси, тетрафтор(2-6C)алкокси, пентафтор(2-6C)алкокси, циано(1-6C)алкокси, гидрокси(1-6C) алкокси, дигидрокси(2-6C)алкокси, amino(2-6C)алкокси, гидроксил-карбонил(1-6C) алкокси, hetCys²(1-6C)алкокси, hetAr³(1-6C)алкокси, Ar³(1-6C)алкокси, (1-4C алкокси) (1-6C)алкокси, (1-3C алкилсульфонил)(1-6C)алкокси, (3-6C)циклоалкил [необязательно, замещенный F, OH, (1-6C алкилом), (1-6C) алкокси, или (1-3C алкокси)(1-6C)алкилом], hetAr⁴, hetAr⁴-O-, Ar⁴, hetCys²(O)CH₂-, (1-4C алкоксикарбонил)(1-6C)алкокси,

гидроксикарбонил(1-6C)алкокси, аминокарбонил(1-6C)алкокси, hetCys²C(=O)(1-6C) алкокси, гидрокси(1-3C алкокси)(1-6C)алкокси, гидрокситрифтор(1-6C)алкокси, (1-3C) алкилсульфонамидо(1-6C)алкокси, (1-3 C)алкиламидо(1-6C)алкокси, ди(1-3C алкил) amino-карбоксы, hetCys²C(=O)O-, гидроксидифтор(1-6C)алкил, (1-4C алкилкарбоксы) (1-6C)алкил, (1-6C)алкоксикарбонил, гидроксилкарбонил, аминокарбонил, (1-3C алкокси) аминокарбонил, hetCys³, галоген, CN, трифторметилсульфонил, N-(1-3C алкил) оксадиазолонил, hetAr⁵, Ar⁴-O-, hetCys⁴-O-, Cys'-O-, или аминогидрокси(1-6C)алкокси; hetCys² представляет собой 4-6-членное гетероциклическое кольцо, имеющее в кольце 1-2 гетероатома, независимо выбранных из N и O, и необязательно, замещенных 1-2 группами, независимо выбранными из (1-6C)алкила, 1-4C алкокси)карбонила, (1-6C) ацила, галогена и оксо;

hetCys представляет собой 4-7-членный гетероцикл, имеющий 1-2 кольцевых гетероатома, независимо выбранных из N и O, и необязательно, замещенный одним или несколькими заместителями, независимо выбранными из F, CN, (1-6C)алкила, трифтор(1-6C)алкила, гидрокси(1-6C)алкила, (1-3C алкокси)(1-6C)алкила, (1-6C)ацила-, (1-6C)алкилсульфонила, трифторметилсульфонила и (1-4C алкокси)карбонила;

hetCys⁴ представляет собой 5-8-членный моноциклический, спироциклический или имеющий мостик гетероцикл, имеющий в кольце атом азота и необязательно, замещенный одной или несколькими группами, независимо выбранными из (1-6C)алкила и галогена;


Cys¹ представляет собой 3-6-членный карбоцикл, необязательно, замещенный аминогруппой; hetAr³ представляет собой 5-членное гетероарильное кольцо, имеющее в кольце 1-3 атомов, независимо выбранных из N, O и S, и необязательно, замещенное (1-6C)алкилом;

Ar представляет собой фенил, необязательно, замещенный (1-4C)алкокси;

hetAr⁴ представляет собой 5-6 членное гетероарильное кольцо, имеющее в кольце 1-3 гетероатома, независимо выбранных из N, S и O, и необязательно, замещенное

одним или несколькими заместителями, независимо выбранными из (1-6C)алкила, галогена, CN, гидроксид(1-6C)алкила, трифтор(1-6C)алкила, дифтор(1-6C)алкила, фтор(1-6C)алкила, (3-6C)циклоалкила, (3-6C циклоалкил)CH₂-, (3-6C циклоалкил)C(=O)-, (1-3C алкокси)(1-6C)алкила, (1-6C)алкокси, (1-6C)алкилсульфонила, NH₂, (1-6C алкил)амино, ди(1-6C алкил)амино, (1-3C трифторалкокси), фтор(1-6C алкил)амино, дифтор(1-6C алкил)амино, трифтор(1-6C алкил)амино и (3-4C циклоалкил)амино;

hetAr⁵ представляет собой группу, выбранную из структур:



где R^Z представляет собой (3-4C)циклоалкил или (1-3C)алкил (необязательно замещенный 1-3 атомами фтора), где каждая из указанных групп hetAr⁵, необязательно, является дополнительно замещенной одной или несколькими группами, независимо выбранными из F и (1-3C)алкила, необязательно, замещенного 1-3 атомами фтора;

Ar⁴ представляет собой фенил, необязательно, замещенный одной или несколькими группами, независимо выбранными из (1-6C)алкила, галогена, CN, CF₃, CF₃O-, (1-6C)алкокси, (1-6Cалкил)OC(=O)-, аминокарбонила, (1-6C)алкилтио, гидроксид(1-6C)алкила, (1-6C алкил)SO₂-, HOC(=O)- и (1-3C алкокси)(1-3C алкил)OC(=O)-;

R⁵ представляет собой (1-6C)алкил, монофтор(1-6C)алкил, дифтор(1-6C)алкил, трифтор(1-6C)алкил, тетрафтор(2-6C)алкил, пентафтор(2-6C)алкил, галоген, CN, (1-4C)алкокси, гидроксид(1-4C)алкил, (1-3C алкокси)(1-4C)алкил, (1-4C алкил)OC(=O)-, (1-6C)алкилтио, (3-4C)циклоалкил, амино, аминокарбонил, трифтор(1-3C алкил)амидо, или фенил (необязательно, замещенный одной или несколькими группами, независимо выбранными из галогена, (1-6C)алкила и (1-6C)алкокси); или

R⁴ и R⁵ вместе с атомами, к которым они присоединены, формируют 5-6-членное насыщенное, частично ненасыщенное или ненасыщенное карбоциклическое кольцо, необязательно, замещенное одним или несколькими заместителями, независимо выбранными из (1-6C)алкила, или

R⁴ и R⁵ вместе с атомами, к которым они присоединены, формируют 5-6-членное насыщенное, частично ненасыщенное или ненасыщенное гетероциклическое кольцо, имеющее в кольце гетероатом, выбранный из N, O или S, где указанное гетероциклическое кольцо, необязательно, является замещенным одним или двумя заместителями, независимо выбранными из (1-6C алкил)C(=O)O-, (1-6C)ацила, (1-6C)алкила и оксо, и указанный атом серы в кольце, необязательно, является окисленным до S(=O) или SO₂;


R^{3a} представляет собой галоген, (1-6C)алкил, трифтор(1-6C)алкил, (3-6C)циклоалкил,

фенил, необязательно замещенный одним или несколькими заместителями, независимо
выбранными из галогена и (1-6C)алкила, или 5-6 членное гетероарильное кольцо,
имеющее в кольце 1-3 гетероатома, независимо выбранных из N, O и S, и необязательно
замещенное одной или несколькими группами, независимо выбранными из (1-6C)алкила
и галоген;

R^{4a} представляет собой водород, (1-6C)алкил, трифтор(1-6C)алкил, фенил
[необязательно, замещенный одной или несколькими группами, независимо выбранными
из (1-6C)алкила, галогена, CN, CF_3 , CF_3O- , (1-6C)алкокси, (1-6C)алкил)OC(=O)-,
аминокарбонила, (1-6C)алкилтио, гидрокси(1-6C)алкила, (1-6C)алкил)SO₂-, HOC(=O)-
и (1-3C)алкокси(1-3C)алкил)OC(=O)-], или 5-6 членное гетероарильное кольцо, имеющее
в кольце 1-3 гетероатома, независимо выбранных из N, S и O, и необязательно,
замещенное 1-2 заместителями, независимо выбранными из (1-6C)алкила, гидрокси(1-
6C)алкила, трифтор(1-6C)алкила, (3-6C)циклоалкила, (3-6C)циклоалкил)CH₂-, (3-6C
циклоалкил)C(=O)-, (1-3C)алкокси(1-6C)алкила, (1-6C)алкокси, (1-6C)алкилсульфонила,
NH₂, (1-6C)алкил)амино, ди(1-6C)алкил)амино и (1-3C)трифторалкокси(1-3C)
трифторалкила; и

R^{5a} представляет собой галоген, (1-6C)алкил, трифтор(1-6C)алкил, (3-6C)циклоалкил,
фенил, необязательно, замещенный одним или несколькими заместителями, независимо
выбранными из галогена и (1-6C)алкила, или 5-6 членное гетероарильное кольцо,
имеющее в кольце 1-3 гетероатома, независимо выбранных из N, O и S, и необязательно,
замещенное одной или несколькими группами, независимо выбранными из (1-6C)алкила
и галогена.


Дополнительные примеры ингибиторов Trk можно обнаружить в Международной
публикации No. WO 2014078328, полное содержание которой приведено в настоящем
описании в качестве ссылки. Например, ингибитор Trk может представлять собой
соединение формулы I-1:



I-1

или его стереоизомеры, таутомеры или фармацевтически приемлемые соли, сольваты
или пролекарства, где:

Кольцо A выбрано из формул A-1, A-2, A-3 или A-4:



R^1 представляет собой H, галоген, (1-3C)алкокси(1-3C)алкил [необязательно,
замещенный 1-5 атомами фтора], (1-3C)алкил)сульфанил(1-3C)алкил [необязательно,
замещенный 1-5 атомами фтора], (1-3C)алкокси [необязательно, замещенный 1-5

атомами фтора], (1-3C алкил)сульфанил [необязательно, замещенный 1-5 атомами фтора], циано(1-3C)алкил [необязательно, замещенный 1-5 атомами фтора], гидроксид (1-3C)алкил [необязательно, замещенный 1-5 атомами фтора], (1-4C)алкил [необязательно, замещенный 1-5 атомами фтора], $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{NR}^a$, $\text{CF}_3\text{CH}_2\text{NR}^a$, $\text{HCF}_2\text{CH}_2\text{NR}^a$, $\text{H}_2\text{CFCH}_2\text{NR}^a$, $\text{CH}_3\text{NR}^a\text{CH}_2$, $\text{R}^a\text{CH}_2\text{CH}_2\text{S}$ или $\text{R}^a\text{CH}_2\text{CF}_3$;

каждый из R^a независимо представляет собой H или метил;


R^x и R^y независимо выбраны из H, галогена, (1-3C)алкила [необязательно, замещенного 1-5 атомами фтора] или (1-3C)алкокси [необязательно, замещенного 1-5 атомами фтора];

n представляет собой 0, 1 или 2;


m представляет собой 0, 1 или 2;

X представляет собой O, S, NH или N-CN;

Кольцо C представляет собой формулу C-1 или C-2



C-1



C-2

R^3 представляет собой (1-6C)алкил, гидроксид(1-6C)алкил, Ar^2 , hetCyc^1 , (3-7C) циклоалкил или hetAr^2 ;

Ar представляет собой фенил, необязательно, замещенный одной или несколькими группами, независимо выбранными из галогена и (1-6C)алкила;

hetCyc^1 представляет собой 5-6-членное насыщенное или частично ненасыщенное гетероциклическое кольцо, имеющее в кольце 1-2 гетероатома, независимо выбранных из N и O;

hetAr представляет собой 5-6 членное гетероарильное кольцо, имеющее в кольце 1-3 гетероатома, независимо выбранных из N, O и S, и необязательно, замещенное одной или несколькими группами, независимо выбранными из (1-6C)алкила и галогена;

R^4 представляет собой OH, (1-6C)алкил, монофтор(1-6C)алкил, дифтор(1-6C)алкил, трифтор(1-6C)алкил, тетрафтор(2-6C)алкил, пентафтор(2-6C)алкил, циано(1-6C)алкил, гидроксид(1-6C)алкил, дигидроксид(2-6C)алкил, (1-3C алкокси)(1-6C)алкил, амино(1-6C) алкил, аминокарбонил(1-6C)алкил, (1-3C)алкилсульфонамидо(1-6C)алкил, сульфамидо (1-6C)алкил, гидроксикарбонил(1-6C)алкил, hetAr^3 (1-6C)алкил, Ar^3 (1-6C)алкил, (1-6C) алкокси, монофтор(1-6C)алкокси, дифтор(1-6C)алкокси, трифтор(1-6C)алкокси, тетрафтор(2-6C)алкокси, пентафтор(2-6C)алкокси, циано(1-6C)алкокси, гидроксид(1-6C) алкокси, дигидроксид(2-6C)алкокси, амино(2-6C)алкокси, гидроксил-карбонил(1-6C) алкокси, hetCyc^2 (1-6C)алкокси, hetAr^3 (1-6C)алкокси, Ar^3 (1-6C)алкокси, (1-4C алкокси) (1-6C)алкокси, (1-3C алкилсульфонил)(1-6C)алкокси, (3-6C)циклоалкил [необязательно, замещенный F, OH, (1-6C алкилом), (1-6C) алкокси или (1-3C алкокси)(1-6C)алкилом], hetAr^4 , hetAr^4 -O-, Ar^4 , hetCyc^2 (O) CH_2 -, (1-4C алкоксикарбонил)(1-6C)алкокси,

гидроксикарбонил(1-6C)алкокси, аминокарбонил(1-6C)алкокси, $\text{hetCyc}^2\text{C}(=\text{O})(1-6\text{C})$ алкокси, гидроксид(1-3C алкокси)(1-6C)алкокси, гидрокситрифтор(1-6C)алкокси, (1-3C)


алкилсульфонамидо(1-6C)алкокси, (1-3C)алкиламидо(1-6C)алкокси, ди(1-3C алкил)амино-карбокси, $\text{hetCyc}^2\text{C}(=\text{O})\text{O}-$, гидроксидифтор(1-6C)алкил, (1-4C алкилкарбокси)(1-6C)алкил, (1-6C)алкоксикарбонил, гидроксилкарбонил, аминокарбонил, (1-3C алкокси)аминокарбонил, hetCyc^3 , галоген, CN, трифторметилсульфонил, N-(1-3C алкил)оксадиазолонил или hetAr^5 ;

hetCyc представляет собой 4-6-членное гетероциклическое кольцо, имеющее в кольце 1-2 гетероатома, независимо выбранных из N и O, и необязательно, замещенное 1-2 группами, независимо выбранными из (1-6C)алкила, (1-4C алкилкарбокси)(1-6C)алкила и (1-6C)ацила; hetCyc представляет собой 4-7-членный гетероцикл, имеющий в кольце 1-2 гетероатома, независимо выбранных из N и O, и необязательно, замещенный одним или несколькими заместителями, независимо выбранными из F, CN, (1-6C)алкила, трифтор(1-6C)алкила, гидрокси(1-6C)алкила, (1-3C алкокси)(1-6C)алкила, (1-6C)ацила-, (1-6C)алкилсульфонила, трифторметилсульфонила и (1-4C алкокси)карбонила; hetAr^3 представляет собой 5-членное гетероарильное кольцо, имеющее в кольце 1-3 атома, независимо выбранных из N, O и S, и необязательно, замещенное (1-6C)алкилом;

Ar^3 представляет собой фенил, необязательно, замещенный (1-4C)алкокси;

hetAr^4 представляет собой 5-6 членное гетероарильное кольцо, имеющее в кольце 1-3 гетероатома, независимо выбранных из N, S и O, и необязательно, замещенное одним или несколькими заместителями, независимо выбранными из (1-6C)алкила, галогена, CN, гидрокси(1-6C)алкила, трифтор(1-6C)алкила, дифтор(1-6C)алкила, фтор(1-6C)алкила, (3-6C)циклоалкила, (3-6C циклоалкил) CH_2- (3-6C циклоалкил) $\text{C}(=\text{O})-$, (1-3C алкокси)(1-6C)алкила, (1-6C)алкокси, (1-6C)алкилсульфонила, NH_2 , (1-6C алкил)амино, ди(1-6C алкил)амино, (1-3C трифторалкокси), фтор(1-6C алкил)амино, дифтор(1-6C алкил)амино, трифтор(1-6C алкил)амино и (3-4C циклоалкил)амино;

hetAr^5 представляет собой группу, выбранную из структур:



, где R^Z представляет собой (3-4C)циклоалкил или (1-3C)алкил (необязательно, замещенный 1-3 атомами фтора), где каждая из указанных групп hetAr^5 , необязательно, является дополнительно замещенной одной или несколькими группами, независимо выбранными из F и (1-3C)алкила, необязательно, замещенного 1-3 атомами фтора;

Ar^4 представляет собой фенил, необязательно, замещенный одной или несколькими группами, независимо выбранными из (1-6C)алкила, галогена, CN, CF_3 , $\text{CF}_3\text{O}-$, (1-6C)алкокси, (1-6C)алкил) $\text{OC}(=\text{O})-$, аминокарбонила, (1-6C)алкилтио, гидрокси(1-6C)алкила, (1-6C алкил) SO_2- , $\text{HOC}(=\text{O})-$ и (1-3C алкокси)(1-3C алкил) $\text{OC}(=\text{O})-$;

R^5 представляет собой (1-6C)алкил, монофтор(1-6C)алкил, дифтор(1-6C)алкил, трифтор(1-6C)алкил, тетрафтор(2-6C)алкил, пентафтор(2-6C)алкил, галоген, CN, (1-4C) алкокси, гидроксид(1-4C)алкил, (1-3C алкокси)(1-4C)алкил, (1-4C алкил)OC(=O)-, (1-6C) алкилтио, (3-4C)циклоалкил, amino, аминокарбонил, трифтор(1-3C алкил)амидо или фенил (необязательно, замещенный одной или несколькими группами, независимо
5 выбранными из галогена, (1-6C)алкила и (1-6C)алкокси); или


R^4 и R^5 вместе с атомами, к которым они присоединены, формируют 5-6-членное насыщенное, частично ненасыщенное или ненасыщенное карбоциклическое кольцо
10 обязательно, замещенное одним или несколькими заместителями, независимо выбранными из (1-6C)алкила, или R^4 и R^5 вместе с атомами, к которым они присоединены, формируют 5-6-членное насыщенное, частично ненасыщенное или ненасыщенное гетероциклическое кольцо, имеющее в кольце гетероатом, выбранный из N, O или S, где указанное гетероциклическое кольцо, обязательно, является
15 замещенным одним или двумя заместителями, независимо выбранными из (1-6C алкил) C(-O)O-, (1-6C)ацила, (1-6C)алкила и оксо, и указанный атом серы в кольце, обязательно, является окисленным до S(=O) или SO₂;

R^{3a} представляет собой галоген, (1-6C)алкил, трифтор(1-6C)алкил, (3-6C)циклоалкил, фенил, обязательно, замещенный одним или несколькими заместителями, независимо
20 выбранными из галогена и (1-6C)алкила, или 5-6 членное гетероарильное кольцо, имеющее в кольце 1-3 гетероатома, независимо выбранных из N, O и S, и обязательно, замещенное одной или несколькими группами, независимо выбранными из (1-6C)алкила и галогена;

R^{4a} представляет собой (1-6C)алкил, трифтор(1-6C)алкил, фенил [необязательно, замещенный одной или несколькими группами, независимо выбранными из (1-6C) алкила, галогена, CN, CF₃, CF₃O-, (1-6C)алкокси, (1-6C алкил)OC(=O)-, аминокарбонила, (1-6C)алкилтио, гидроксид(1-6C)алкила, (1-6C алкил)SO₂-, HOC(=O)- и (1-3C алкокси)(1-3C алкил)OC(=O)-], или 5-6 членное гетероарильное кольцо, имеющее в кольце 1-3
30 гетероатома, независимо выбранных из N, S и O, и обязательно, замещенное 1-2 заместителями, независимо выбранными из (1-6C)алкила, гидроксид(1-6C)алкила, трифтор (1-6C)алкила, (3-6C)циклоалкила, (3-6C циклоалкил)CH₂- (3-6C циклоалкил)C(=O)-, (1-3C алкокси)(1-6C)алкил, (1-6C)алкокси, (1-6C)алкилсульфонил, NH₂, (1-6C алкил)амино, ди(1-6C алкил)амино и (1-3C трифторалкокси)(1-3C)трифторалкила; и
35

R^{5a} представляет собой галоген, (1-6C)алкил, трифтор(1-6C)алкил, (3-6C)циклоалкил, фенил, обязательно, замещенный одним или несколькими заместителями, независимо
40 выбранными из галогена и (1-6C)алкила, или 5-6 членное гетероарильное кольцо, имеющее в кольце 1-3 гетероатома, независимо выбранных из N, O и S, и обязательно, замещенное одной или несколькими группами, независимо выбранными из (1-6C)алкила и галогена.


Дополнительные примеры ингибиторов Trk можно обнаружить в Международной публикации No. WO 2014078325, полное содержание которой приведено в настоящем описании в качестве ссылки. Например, ингибитор Trk может представлять собой
45 соединение формулы I:



I-2

или его стереоизомер, таутомер или фармацевтически приемлемую соль, сольват или пролекарство, где:

Кольцо А представляет собой формулу А-1, А-2, А-3, А-4, А-5 или А-6




m представляет собой 0, 1, 2, 3 или 4;

n представляет собой 0, 1, 2 или 3;

p представляет собой 0, 1 или 2;

R¹ представляет собой формулу R¹-1, R¹-2 или R¹-3



Y¹ представляет собой CH₃CH₂-, CF₃CH₂-, CH₃O-, F₃CO-, F₂CHO-, FCH₂O-, CH₃S-, F₃CS-, F₂CHS- или FCH₂S-;

Y² представляет собой O, S, NH, MeN- или CH₂;


Y³ представляет собой CH₃O-, CH₃S-, MeNH- или Me₂N-;

Y⁴ представляет собой CH₂, и Y⁵ представляет собой S или O, или Y⁴ представляет собой S или O, и Y⁵ представляет собой CH₂;


R² представляет собой галоген, (1-3C)алкил (необязательно, замещенный 1-3 атомами фтора), (1-3C)алкокси (необязательно, замещенный 1-3 атомами фтора), CH₃OCH₂- (необязательно, замещенный 1-3 атомами фтора), (1-3C алкил)сульфанил, ди(1-3C) алкиламино, циклопропил, циклобутил или азетидинил, где каждый из указанных циклопропила, циклобутила и азетидинила, необязательно, является замещенным 1-2 атомами фтора;

X представляет собой O, S, NH или N-CN;

Кольцо С представляет собой формулу C-1 или C-2



C-1



C-2

R^3 представляет собой (1-6C)алкил, гидрокси(1-6C)алкил, Ar^2 , $hetCyc^1$, (3-7C) циклоалкил или $hetAr^2$;

Ar^2 представляет собой фенил, необязательно, замещенный одной или несколькими группами, независимо выбранными из галогена и (1-6C)алкила;

$hetCyc^1$ представляет собой 5-6-членное насыщенное или частично ненасыщенное гетероциклическое кольцо, имеющее в кольце 1-2 гетероатома, независимо выбранных из N и O;

$hetAr^2$ представляет собой 5-6 членное гетероарильное кольцо, имеющее в кольце 1-3 гетероатома, независимо выбранных из N, O и S, и необязательно, замещенных одной или несколькими группами, независимо выбранными из (1-6C)алкила и галогена;

R^4 представляет собой H, OH, (1-6C)алкил, монофтор(1-6C)алкил, дифтор(1-6C)алкил, трифтор(1-6C)алкил, тетрафтор(2-6C)алкил, пентафтор(2-6C)алкил, циано(1-6C)алкил, гидрокси(1-6C)алкил, дигидрокси(2-6C)алкил, (1-3C алкокси)(1-6C)алкил, amino(1-6C) алкил, аминокарбонил(1-6C)алкил, (1-3C)алкилсульфонамидо(1-6C)алкил, сульфонамидо (1-6C)алкил, гидроксикарбонил(1-6C)алкил, $hetAr^3$ (1-6C)алкил, Ar^3 (1-6C)алкил, (1-6C) алкокси, монофтор(1-6C)алкокси, дифтор(1-6C)алкокси, трифтор(1-6C)алкокси, тетрафтор(2-6C)алкокси, пентафтор(2-6C)алкокси, циано(1-6C)алкокси, гидрокси(1-6C) алкокси, дигидрокси(2-6C)алкокси, amino(2-6C)алкокси, гидроксил-карбонил(1-6C) алкокси, $hetCyc^2$ (1-6C)алкокси, $hetAr^3$ (1-6C)алкокси, Ar^3 (1-6C)алкокси, (1-4C алкокси) (1-6C)алкокси, (1-3C алкилсульфонил)(1-6C)алкокси, (3-6C)циклоалкил [необязательно, замещенный F, OH, (1-6C алкилом), (1-6C) алкокси, или (1-3C алкокси)(1-6C)алкилом], $hetAr^4$, $hetAr^4$ -O-, Ar^4 , $hetCyc^2$ (O)CH₂-, (1-4C алкоксикарбонил)(1-6C)алкокси,

гидроксикарбонил(1-6C)алкокси, аминокарбонил(1-6C)алкокси, $hetCyc^2$ C(=O)(1-6C) алкокси, гидрокси(1-3C алкокси)(1-6C)алкокси, гидрокситрифтор(1-6C)алкокси, (1-3C) алкилсульфонамидо(1-6C)алкокси, (1-3C)алкиламида(1-6C)алкокси, ди(1-3C алкил) amino-карбоксы, $hetCyc$ C(=O)O-, гидроксидифтор(1-6C)алкил, (1-4C алкилкарбоксы)(1-6C)алкил, (1-6C)алкоксикарбонил, гидроксилкарбонил, аминокарбонил, (1-3C алкокси) аминокарбонил, $hetCyc$, галоген, CN, трифторметилсульфонил, N-(1-3C алкил) оксадиазолонил или $hetAr^5$;


$hetCyc^2$ представляет собой 4-6-членное гетероциклическое кольцо, имеющее в кольце 1-2 гетероатома, независимо выбранных из N и O, и необязательно, замещенное 1-2 группами, независимо выбранными из (1-6C)алкила, (1-4C алкилкарбоксы)(1-6C)алкила, (1-6C)ацила и галогена;

$hetCyc^3$ представляет собой 4-7-членный гетероцикл, имеющий в кольце 1-2 гетероатома, независимо выбранных из N и O, и необязательно, замещенный одним или несколькими заместителями, независимо выбранными из F, CN, (1-6C)алкила, трифтор(1-6C)алкила, гидрокси(1-6C)алкила, (1-3C алкокси)(1-6C)алкила, (1-6C)ацила-, (1-6C)алкилсульфонил, трифторметилсульфонил и (1-4C алкокси)карбонила;

hetAr³ представляет собой 5-членное гетероарильное кольцо, имеющее в кольце 1-3 атома, независимо выбранных из N, O и S, и необязательно, замещенное (1-6C)алкилом; Ar представляет собой фенил, необязательно, замещенный (1-4C)алкокси;

hetAr⁴ представляет собой 5-6 членное гетероарильное кольцо, имеющее в кольце 1-3 гетероатома, независимо выбранных из N, S и O, и необязательно, замещенное одним или несколькими заместителями, независимо выбранными из (1-6C)алкила, галогена, CN, гидрокси(1-6C)алкила, трифтор(1-6C)алкила, дифтор(1-6C)алкила, фтор(1-6C)алкила, (3-6C)циклоалкила, (3-6C циклоалкил)CH₂-, (3-6C циклоалкил)C(=O)-, (1-3C алкокси)(1-6C)алкила, (1-6C)алкокси, (1-6C)алкилсульфонила, NH₂, (1-6C алкил)амино, ди(1-6C алкил)амино, (1-3C трифторалкокси), фтор(1-6C алкил)амино, дифтор(1-6C алкил)амино, трифтор(1-6C алкил)амино и (3- 4C циклоалкил)амино;

hetAr⁵ представляет собой группу, выбранную из структур:



, где R² представляет собой (3-4C)циклоалкил или (1-3C)алкил (необязательно, замещенный 1-3 атомами фтора), где каждая из указанных групп hetAr⁵, необязательно, является дополнительно замещенной одной или несколькими группами, независимо выбранными из F и (1-3C)алкила, необязательно замещенного 1-3 атомами фтора; AT⁴ представляет собой фенил, необязательно, замещенный одной или несколькими группами, независимо выбранными из (1-6C)алкила, галогена, CN, CF₃, CF₃O-, (1-6C)алкокси, (1-6Cалкил)OC(=O)-, аминокарбонила, (1-6C)алкилтио, гидрокси(1-6C)алкила, (1-6C алкил)SO₂-, HOC(=O)- и (1-3C алкокси)(1-3C алкил)OC(=O)-;

R⁵ представляет собой (1-6C)алкил, монофтор(1-6C)алкил, дифтор(1-6C)алкил, трифтор(1-6C)алкил, тетрафтор(2-6C)алкил, пентафтор(2-6C)алкил, галоген, CN, (1-4C)алкокси, гидрокси(1-4C)алкил, (1-3C алкокси)(1-4C)алкил, (1-4C алкил)OC(=O)-, (1-6C)алкилтио, (3-4C)циклоалкил, amino, аминокарбонил, трифтор(1-3C алкил)амидо или фенил (необязательно, замещенный одной или несколькими группами, независимо выбранными из галогена, (1- 6C)алкила и (1-6C)алкокси); или

R⁴ и R⁵ вместе с атомами, к которым они присоединены, формируют 5-6-членное насыщенное, частично ненасыщенное или ненасыщенное карбоциклическое кольцо, необязательно, замещенное одним или несколькими заместителями, независимо выбранными из (1-6C)алкила, или

R⁴ и R⁵ вместе с атомами, к которым они присоединены, формируют 5-6-членное насыщенное, частично ненасыщенное или ненасыщенное гетероциклическое кольцо, имеющее в кольце гетероатом, выбранный из N, O или S, где указанное гетероциклическое кольцо, необязательно, является замещенным одним или двумя заместителями, независимо выбранными из (1-6C алкил)C(=O)O-, (1-6C)ацила, (1-6C)алкила и оксо, и указанный атом серы в кольце, необязательно, является окисленным

или его стереоизомеры, таутомеры или фармацевтически приемлемые соли, сольваты или пролекарства, где:

кольцо В и группа NH-C(=X)-NH находятся в транс-конфигурации;

R^a , R^b , R^c и R^d независимо выбраны из H и (1-3C)алкила,

или R^o и R^d независимо выбраны из H и (1-3C)алкила, и R^a и R^b вместе с атомом, к которому они присоединены, формируют циклопропильное кольцо;

X представляет собой O, S, NH или N-CN;


R^1 представляет собой (1-3C алкокси)(1-6C)алкил, (трифторметокси)(1-6C)алкил, (1-3C сульфанил)(1-6C)алкил, монофтор(1-6C)алкил, дифтор(1-6C)алкил, трифтор(1-6C)алкил, тетрафтор(2-6C)алкил, пентафтор(2-6C)алкил, циано(1-6C)алкил, аминокарбонил(1-6C)алкил, гидроксид(1-6C)алкил, дигидроксид(2-6C)алкил, (1-6C)алкил, (1-3C алкиламино)(1-3C)алкил, (1-4C алкоксикарбонил)(1-6C)алкил, амино(1-6C)алкил, гидроксид(1-3C алкокси)(1-6C)алкил, ди(1-3C алкокси)(1-6C)алкил, (1-3C алкокси)трифтор(1-6C)алкил, гидрокситрифтор(1-6C)алкил, (1-4C алкоксикарбонил)(1-3C алкокси)(1-6C)алкил или гидроксикарбонил(1-3C алкокси)(1-6C)алкил;

R^2 представляет собой H, F или OH;

кольцо В представляет собой Ar^1 или hetAr^1 ;

Ar^1 представляет собой фенил, необязательно, замещенный одним или несколькими заместителями, независимо выбранными из галогена, CF_3 , $\text{CF}_3\text{O}-$, (1-4C)алкокси, гидроксид(1-4C)алкила, (1-6C)алкил и CN; hetAr^1 представляет собой 5-6-членный гетероарил, имеющий в кольце 1-3 гетероатома, независимо выбранных из N, S и O, и необязательно, замещенный одним или несколькими заместителями, независимо выбранными из (1-6C)алкила, галогена, OH, CF_3 , NH_2 и гидроксид(1-2C)алкила;

кольцо С представляет собой



R^3 представляет собой H, (1-6C)алкил, гидроксид(1-6C)алкил, Ar^2 , hetCyc^1 , (3-7C) циклоалкил, hetAr^2 или карбоциклическое кольцо с мостиком C5-C8;



Ar^2 представляет собой фенил, необязательно, замещенный одним или несколькими заместителями, независимо выбранными из галогена и (1-6C)алкила;

hetCyc^1 представляет собой 5-6-членное насыщенное или частично ненасыщенное гетероциклическое кольцо, имеющее в кольце 1-2 гетероатома, независимо выбранных из N и O;




hetAr^2 представляет собой 5-6 членное гетероарильное кольцо, имеющее в кольце 1-3 гетероатома, независимо выбранных из N, O и S, и необязательно, замещенное одним или несколькими заместителями, независимо выбранными из (1-6C)алкила и галогена;

R^4 выбран из (1-6C алкил) SO_2- , (1-6C алкил) C(=O)- и из структур:




5






10



15







20







25


30



35



40



45

;

R^m представляет собой (1-3C)алкил, замещенный 1-3 атомами фтора, или (3-4C) циклоалкил;

R^n представляет собой (1-3C)алкил;

R^q представляет собой (1-3C)алкил, необязательно, замещенный 1-3 атомами фтора;

R^x представляет собой (1-6C)алкил, галоген, CN, гидроксигруппу (1-6C)алкил, трифторметил (1-6C)алкил, (3-6C)циклоалкил, (3-6C)циклоалкил-CH₂-, (3-6C)циклоалкил-C(=O)-, (1-3C)алкокси(1-6C)алкил, (1-6C)алкокси, (1-6C)алкилсульфонил, NH₂, (1-6C)алкиламино, ди(1-6C)алкиламино, трифторметил (1-3C)алкокси или трифторметил (1-6C)алкил;

n представляет собой 0, 1, 2, 3 или 4;


m представляет собой 0, 1, 2 или 3;

R^y представляет собой F или (1-3C)алкил, необязательно, замещенный 1-3 атомами фтора;

r представляет собой 0, 1 или 2;

R^z представляет собой (3-4C)циклоалкил, или (1-3C)алкил, необязательно, замещенный 1-3 атомами фтора; и R^5 представляет собой H, (1-6C)алкил, монофторметил (1-6C)алкил, дифторметил (1-6C)алкил, трифторметил (1-6C)алкил, тетрафторметил (2-6C)алкил, пentaфторметил (2-6C)алкил, галоген, CN, (1-4C)алкокси, гидроксигруппа (1-4C)алкил, (1-3C)алкокси(1-4C)алкил, (1-4C)алкил-OC(=O)-, (1-6C)алкилсульфонил, фенил [необязательно, замещенный одним или несколькими заместителями, независимо выбранными из галогена, (1-6C)алкила и (1-6C)алкокси], (3-4C)циклоалкил, амино, аминокарбонил, или трифторметил (1-3C)алкиламидо.


Дополнительные примеры ингибиторов T₁ можно обнаружить в Международной публикации No. WO 2014078322, полное содержание которой приведено в настоящем описании в качестве ссылки. Например, ингибитор T₁ может представлять собой соединение формулы I:



или его стереоизомеры, таутомеры или фармацевтически приемлемые соли, сольваты или пролекарства, где:

X представляет собой O, S, NH или N-CN;


кольцо A представляет собой




D представляет собой O или S;

R¹ представляет собой фенил, необязательно, замещенный одним или несколькими заместителями, независимо выбранными из галогена и (1-3C)алкила;

R представляет собой (1-6C)алкил [необязательно, замещенный 1-5 атомами фтора] или (3-6C)циклоалкил [необязательно, замещенный одним или двумя атомами фтора]; кольцо C представляет собой формулу C-1 или C-2



C-1



C-2

R³ представляет собой (1-6C)алкил, гидрокси(1-6C)алкил, Ar², hetCyc¹, (3-7C)циклоалкил или hetAr²;

Ar представляет собой фенил, необязательно, замещенный одной или несколькими группами, независимо выбранными из галогена и (1-6C)алкила;

hetCyc¹ представляет собой 5-6-членное насыщенное или частично ненасыщенное гетероциклическое кольцо, имеющее в кольце 1-2 гетероатома, независимо выбранных из N и O; hetAr² представляет собой 5-6 членное гетероарильное кольцо, имеющее в кольце 1-3 гетероатома, независимо выбранных из N, O и S, и необязательно, замещенное одной или несколькими группами, независимо выбранными из (1-6C)алкила и галогена;

R⁴ представляет собой H, OH, (1-6C)алкил, монофтор(1-6C)алкил, дифтор(1-6C)алкил, трифтор(1-6C)алкил, тетрафтор(2-6C)алкил, пентафтор(2-6C)алкил, циано(1-6C)алкил, гидрокси(1-6C)алкил, дигидрокси(2-6C)алкил, (1-3C алкокси)(1-6C)алкил, amino(1-6C)алкил, аминокарбонил(1-6C)алкил, (1-3C)алкилсульфонамидо(1-6C)алкил, сульфамидо(1-6C)алкил, гидроксикарбонил(1-6C)алкил, hetAr³(1-6C)алкил, Ar³(1-6C)алкил, (1-6C)алкокси, монофтор(1-6C)алкокси, дифтор(1-6C)алкокси, трифтор(1-6C)алкокси, тетрафтор(2-6C)алкокси, пентафтор(2-6C)алкокси, циано(1-6C)алкокси, гидрокси(1-6C)алкокси, дигидрокси(2-6C)алкокси, amino(2-6C)алкокси, гидроксикарбонил(1-6C)алкокси, hetCyc²(1-6C)алкокси, hetAr³(1-6C)алкокси, Ar³(1-6C)алкокси, (1-4C алкокси)(1-6C)алкокси, (1-3C алкилсульфонил)(1-6C)алкокси, (3-6C)циклоалкил [необязательно, замещенный F, OH, (1-6C алкилом), (1-6C) алкокси или (1-3C алкокси)(1-6C)алкилом], hetAr⁴, hetAr⁴-O-, Ar⁴, hetCyc²(O)CH₂-, (1-4C алкоксикарбонил)(1-6C)алкокси,

гидроксикарбонил(1-6C)алкокси, аминокарбонил(1-6C)алкокси, $\text{hetCys}^2\text{C}(=\text{O})(1-6\text{C})$ алкокси, гидрокси(1-3C алкокси)(1-6C)алкокси, гидрокситрифтор(1-6C)алкокси, (1-3 C)алкилсульфонамидо(1-6C)алкокси, (1-3 C)алкиламидо(1-6C)алкокси, ди(1-3C алкил) аминокарбокси, $\text{hetCys}^2\text{C}(=\text{O})\text{O}-$, гидроксидифтор(1-6C)алкил, (1-4C алкилкарбокси)(1-6C)алкил, (1-6C)алкоксикарбонил, гидроксилкарбонил, аминокарбонил, (1-3C алкокси) аминокарбонил, hetCys , галоген, CN, трифторметилсульфонил, N-(1-3C алкил) оксадиазолонил, или hetAr^5 ;







hetCys^2 представляет собой 4-6-членное гетероциклическое кольцо, имеющее в кольце 1-2 гетероатома, независимо выбранных из N и O, и необязательно, замещенное 1-2 группами, независимо выбранными из (1-6C)алкила, (1-4C алкилкарбокси)(1-6C)алкила и (1-6C)ацила; hetCys представляет собой 4-7-членный гетероцикл, имеющий в кольце 1-2 гетероатома, независимо выбранных из N и O, и необязательно, замещенный одним или несколькими заместителями, независимо выбранными из F, CN, (1-6C)алкила, трифтор(1-6C)алкила, гидрокси(1-6C)алкила, (1-3C алкокси)(1-6C)алкила, (1-6C)ацила-, (1-6C)алкилсульфонила, трифторметилсульфонила и (1-4C алкокси)карбонила;

hetAr представляет собой 5-членное гетероарильное кольцо, имеющее в кольце 1-3 атома, независимо выбранных из N, O и S, и необязательно, замещенное (1-6C)алкилом;

Ar представляет собой фенил, необязательно, замещенный (1-4C)алкокси;

hetAr^4 представляет собой 5-6 членное гетероарильное кольцо, имеющее в кольце 1-3 гетероатома, независимо выбранных из N, S и O, и необязательно, замещенное одним или несколькими заместителями, независимо выбранными из (1-6C)алкила, галогена, CN, гидрокси(1-6C)алкила, трифтор(1-6C)алкила, дифтор(1-6C)алкила, фтор (1-6C)алкила, (3-6C)циклоалкила, (3-6C циклоалкил) CH_2- , (3-6C циклоалкил) $\text{C}(\text{O})-$, (1-3C алкокси)(1-6C)алкила, (1-6C)алкокси, (1-6C)алкилсульфонила, NH_2 , (1-6C алкил) амино, ди(1-6C алкил)амино, (1-3C трифторалкокси), фтор(1-6C алкил)амино, дифтор (1-6C алкил)амино, трифтор(1-6C алкил)амино и (3-4C циклоалкил)амино;

hetAr^5 представляет собой группу, выбранную из структур:



, где R^Z представляет собой (3-4C)циклоалкил или (1-3C)алкил, (необязательно, замещенный 1-3 атомами фтора), где каждая из указанных групп hetAr^5 , необязательно, является дополнительно замещенной одной или несколькими группами, независимо выбранными из F и (1-3C)алкила, необязательно, замещенного 1-3 атомами фтора;

Ar^4 представляет собой фенил, необязательно, замещенный одной или несколькими

группами, независимо выбранными из (1-6C)алкила, галогена, CN, CF₃, CF₃O-, (1-6C)алкокси, (1-6C алкил)OC(O)-, аминокарбонила, (1-6C)алкилтио, гидрокси(1-6C)алкила, (1-6C алкил)SO₂-, НОС(O)- и (1-3C алкокси)(1-3C алкил)OC(=O)-;

5 R⁵ представляет собой (1-6C)алкил, монофтор(1-6C)алкил, дифтор(1-6C)алкил, трифтор(1-6C)алкил, тетрафтор(2-6C)алкил, пентафтор(2-6C)алкил, галоген, CN, (1-4C) алкокси, гидрокси(1- 4C)алкил, (1-3C алкокси)(1-4C)алкил, (1-4C алкил)OC(=O)-, (1-6C) алкилтио, (3- 4C)циклоалкил, amino, аминокарбонил, трифтор(1-3C алкил)амидо или фенил (необязательно, замещенный одной или несколькими группами, независимо
10 выбранными из галогена, (1-6C)алкила и (1-6C)алкокси); или

R⁴ и R⁵ вместе с атомами, к которым они присоединены, формируют 5-6-членное насыщенное, частично ненасыщенное или ненасыщенное карбоциклическое кольцо, необязательно, замещенное одним или несколькими заместителями, независимо
15 выбранными из (1-6C)алкила, или

15 R⁴ и R⁵ вместе с атомами, к которым они присоединены, формируют 5-6-членное насыщенное, частично ненасыщенное или ненасыщенное гетероциклическое кольцо, имеющее в кольце гетероатом, выбранный из N, O или S, где указанное гетероциклическое кольцо, необязательно, является замещенным одним или двумя
20 заместителями, независимо выбранными из (1-6C алкил)C(=O)O-, (1-6C)ацила, (1-6C) алкила и оксо, и указанный атом серы в кольце, необязательно, является окисленным до S(=O) или SO₂; R^{3a} представляет собой водород, галоген, (1-6C)алкил, трифтор(1- 6C)алкил, (3-6C)циклоалкил, фенил, необязательно, замещенный одним или несколькими заместителями, независимо выбранными из галогена и (1-6C)алкила, или 5-6 членное
25 гетероарильное кольцо, имеющее в кольце 1-3 гетероатома, независимо выбранных из N, O и S, и необязательно, замещенное одной или несколькими группами, независимо выбранными из (1-6C)алкила и галогена;

R^{4a} представляет собой водород, (1-6C)алкил, трифтор(1-6C)алкил, фенил [необязательно замещенный одной или несколькими группами, независимо выбранными
30 из (1-6C)алкила, галогена, CN, CF₃, CF₃O-, (1- 6C)алкокси, (1-6C алкил)OC(=O)-, аминокарбонила, (1-6C)алкилтио, гидрокси(1-6C)алкила, (1-6C алкил)SO₂-, НОС(=O)- и (1-3C алкокси)(1-3C алкил)OC(=O)-] или 5-6 членное гетероарильное кольцо, имеющее в кольце 1-3 гетероатома, независимо выбранных из N, S и O, и необязательно, замещенное 1-2 заместителями, независимо выбранными из (1-6C)алкила, гидрокси(1- 6C)алкила, трифтор(1-6C)алкила, (3-6C)циклоалкила, (3-6C циклоалкил)CH₂-, (3-6C циклоалкил)C(=O)-, (1-3C алкокси)(1-6C)алкила, (1-6C)алкокси, (1-6C)алкилсульфонила, NH₂, (1-6C алкил)амино, ди(1-6C алкил)амино и (1-3C трифторалкокси)(1-3C) трифторалкил; и
35


40 R^{5a} представляет собой водород, галоген, (1-6C)алкил, трифтор(1-6C)алкил, (3-6C) циклоалкил, фенил, необязательно, замещенный одним или несколькими заместителями, независимо выбранными из галогена и (1-6C)алкила, или 5-6 членное гетероарильное кольцо, имеющее в кольце 1-3 гетероатома, независимо выбранных из N, O и S, и
45 необязательно, замещенное одной или несколькими группами, независимо выбранными из (1-6C)алкила и галогена.

Дополнительные примеры ингибиторов Trk можно обнаружить в Международной публикации No. WO 2015175788, полное содержание которой приведено в настоящем описании в качестве ссылки. Например, ингибитор Trk может представлять собой

соединение 1-((3S,4R)-4-(3-фторфенил)-1-(2-метоксиэтил)пирролидин-3-ил)-3-(4-метил-3-(2-метилпириимидин-5-ил)-1-фенил-1H-пиразол-5-ил)мочевину или его фармацевтически приемлемую соль. В некоторых вариантах осуществления, соединение представляет собой соль хлорид.

Иллюстративные ингибиторы Trk включают AR-772, AR-786, AR-256 и AR-618.

Неограничивающие примеры ингибиторов Trk можно обнаружить в Патенте США No. 8299057 и в Международной публикации No. WO 2009/013126, полное содержание обоих из которых приведено в настоящем описании в качестве ссылки. Например, ингибитор Trk может представлять собой соединение формулы (I):



, где:

X представляет собой -CH₂-, -CH(OH)-, -CH(OR')- или -C(R'R'')-, где:

R' представляет собой C₁-C₆-алкил, и R'' представляет собой водород;

Ag представляет собой фенил, пиразолил или пиридил, необязательно, замещенные одним или несколькими заместителями, независимо выбранными из галогена, нитро, COR₄, OR₇, NR₅R₆, NHSO₂R₁₀, прямого или разветвленного C₁-C₆-алкила, необязательно, замещенного гетероциклилом, в свою очередь, необязательно, замещенным прямым или разветвленным C₁-C₆-алкилом или гетероциклилалкилом, или

гетероциклил, необязательно, замещенный прямым или разветвленным C₁-C₆-алкилом, в свою очередь, необязательно, замещенным гетероциклилом или C₁-C₆-алкоксикарбонил, или C₁-C₆ диалкиламино:

R₄ представляет собой NR₅R₆, или гетероциклил, необязательно, дополнительно замещенный прямым или разветвленным C₁-C₆-алкилом, гетероциклилалкилом, гетероциклилом или C₁-C₆ диалкиламино;

R₅ и R₆ независимо представляют собой водород, R₈R₉N-C₂-C₆-алкил, R₈O-C₂-C₆-алкил, прямой или разветвленный C₁-C₆-алкил, необязательно, дополнительно замещенный C₁-C₆-алкокси, C₁-C₆ диалкиламино, галогеном, фенилом, гидроксидом или гетероциклилом, в свою очередь, необязательно, замещенным алкилом, C₃-C₆ циклоалкил, необязательно, замещенный гидроксидом или трифтор C₁-C₆-алкилом, гетероциклил, необязательно, замещенный C₁-C₆-алкилом, в свою очередь, необязательно, замещенным галогеном или гетероциклилом, C₁-C₆-алкоксикарбонил, C₁-C₆ диалкиламино, гетероциклилом или фенилом,

или R₅ и R₆, взятые вместе с атомом азота, с которым они связаны, могут формировать гетероциклическую группу, необязательно, замещенную прямым или разветвленным C₁-C₆-алкилом, в свою очередь, необязательно, замещенным

гетероциклилом или C₁-C₆-алкоксикарбонилем, C₁-C₆ диалкиламином или гетероциклилом;

R7 представляет собой прямой или разветвленный C₁-C₆-алкил, необязательно, замещенный C₁-C₆-диалкиламином или гетероциклилом, в свою очередь, замещенным C₁-C₆-алкилом;

R8 и R₉ независимо представляют собой, необязательно, дополнительно замещенный, прямой или разветвленный C₁-C₆-алкил;

R10 представляет собой, необязательно, дополнительно замещенный, прямой или разветвленный C₁-C₆-алкил;

R представляет собой фенил или пиридил, необязательно замещенный галогеном или прямым, или разветвленным C₁-C₆-алкилом;


R₁, R2 и R3 представляют собой водород;

или его оптические изомеры, таутомеры или фармацевтически приемлемую соль.

Например, ингибитор Trk может представлять собой энтректиниб (N-[5-(3,5-дифторбензил)-1H-индазол-3-ил]-4-(4-метил-пиперазин-1-ил)-2-(тетрагидропиран-4-иламино)-бензамид) или его фармацевтически приемлемую соль. Например, ингибитор Trk может представлять собой полиморф, такой как полиморфы, описанные в Патентной публикации США No. 2015/0051222 или Международная публикация No. WO 2013/174876, полное содержание обеих из которых приведено в настоящем описании в качестве ссылки. В некоторых вариантах осуществления, ингибитор Trk может представлять собой любой из описанных в Патентной публикации США No. 2015/0283132, Международной публикации No. WO 2015/124697, Патенте США No. 8946226, Международной публикации No. WO 2010/012733, Патенте США No. 8912194, и Международной публикации No. WO 2010/058006, полное содержание всех из которых приведено в настоящем описании в качестве ссылки.

Дополнительные примеры ингибиторов Trk можно обнаружить в Патентной публикации США No., Международной публикации No. WO 2015/017533, полное содержание которых приведено в настоящем описании в качестве ссылки.

Дополнительные примеры ингибиторов Trk можно обнаружить в Патентной публикации США No. 2016/0272725 и Международной публикации No. WO 2015/112806, полное содержание обеих из которых приведено в настоящем описании в качестве ссылки. Например, ингибитор Trk может представлять собой соединение формулы (I-A):



или его фармацевтически приемлемую соль,
где

каждое из кольца A' и кольца B' независимо представляют собой моноциклический или бициклической арил или гетероарил; где одно из кольца A' и кольца B' представляет собой моноциклический арил или гетероарил, и другое представляет собой

бициклический гетероарил; и по меньшей мере одно из кольца А' и кольца В' содержит по меньшей мере один азот в качестве члена кольца;

каждый из L^1 и L^2 независимо представляет собой $-C(R^{1'}) (R^{2'})-$, $-O-$, $-N(R^{k'})-$, $-S-$, $-S(O)-$ или $-S(O)_2-$; каждый из R^1 и R^2 независимо представляют собой H, дейтерий, галоген, C_{1-6} алкил, C_{2-6} алкенил, C_{2-6} алкинил, C_{3-6} циклоалкил, 3- - 7-членный гетероциклоалкил, C_{6-10} арил, или моно- или бициклический гетероарил, $-OR^{a'}$, $-OC(O)R^{a'}$, $-OC(O)NR^{a'}R^{b'}$, $-OS(O)R^{a'}$, $-OS(O)_2R^{a'}$, $-SR^{a'}$, $-S(O)R^{a'}$, $-S(O)_2R^{a'}$, $-S(O)NR^{a'}R^{b'}$, $-S(O)_2NR^{a'}R^{b'}$, $-OS(O)NR^{a'}R^{b'}$, $-OS(O)_2NR^{a'}R^{b'}$, $-NR^{a'}R^{b'}$, $-NR^{a'}C(O)R^{b'}$, $-NR^{a'}C(O)OR^{b'}$, $-NR^{a'}C(O)NR^{a'}R^{b'}$, $-NR^{a'}S(O)R^{b'}$, $-NR^{a'}S(O)_2R^{b'}$, $-NR^{a'}S(O)NR^{a'}R^{b'}$, $-NR^{a'}S(O)_2NR^{a'}R^{b'}$, $-C(O)R^{a'}$, $-C(O)OR^{a'}$, $-C(O)NR^{a'}R^{b'}$, $-PR^{a'}R^{b'}$, $-P(O)R^{a'}R^{b'}$, $-P(O)_2R^{a'}R^{b'}$, $-P(O)NR^{a'}R^{b'}$, $-P(O)_2NR^{a'}R^{b'}$, $-P(O)OR^{a'}$, $-P(O)_2OR^{a'}$, $-CN$ или $-NO_2$, или $R^{1'}$ и $R^{2'}$, взятые вместе с атомом или атомами углерода, к которым они присоединены, формируют C_{3-6} циклоалкил или 4- - 6-членный гетероциклоалкил, где каждый атом водорода в C_{1-6} алкиле, C_{2-6} алкениле, C_{2-6} алкиниле, C_{3-6} циклоалкиле, 3- - 7-членном гетероциклоалкиле, C_{6-10} -ариле, моно- или бициклическом гетероариле, 4- - 6-членном гетероциклоалкиле независимо является необязательно замещенным дейтерием, галогеном, C_{1-6} алкилом, C_{1-6} галоалкилом, $-OR^{e'}$, $-OC(O)R^{e'}$, $-OC(O)NR^{e'}R^{f'}$, $-OS(O)R^{e'}$, $-OS(O)_2R^{e'}$, $-OS(O)NR^{e'}R^{f'}$, $-OS(O)_2NR^{e'}R^{f'}$, $-SR^{e'}$, $-S(O)R^{e'}$, $-S(O)_2R^{e'}$, $-S(O)NR^{e'}R^{f'}$, $-S(O)_2NR^{e'}R^{f'}$, $-NR^{e'}R^{f'}$, $-NR^{e'}C(O)R^{f'}$, $-NR^{e'}C(O)OR^{f'}$, $-NR^{e'}C(O)NR^{e'}R^{f'}$, $-NR^{e'}S(O)R^{f'}$, $-NR^{e'}S(O)_2R^{f'}$, $-NR^{e'}S(O)NR^{e'}R^{f'}$, $-NR^{e'}S(O)_2NR^{e'}R^{f'}$, $-C(O)R^{e'}$, $-C(O)OR^{e'}$, $-C(O)NR^{e'}R^{f'}$, $-PR^{e'}R^{f'}$, $-P(O)R^{e'}R^{f'}$, $-P(O)_2R^{e'}R^{f'}$, $-P(O)NR^{e'}R^{f'}$, $-P(O)_2NR^{e'}R^{f'}$, $-P(O)OR^{e'}$, $-P(O)_2OR^{e'}$, $-CN$ или $-NO_2$;

каждый из $R^{k'}$ независимо представляет собой H, дейтерий, C_{1-6} алкил, C_{2-6} алкенил, C_{2-6} алкинил, C_{3-6} циклоалкил, 3- - 7-членный гетероциклоалкил, C_{6-10} -арил, или моно- или бициклический гетероарил, где каждый атом водорода в C_{1-6} алкиле, C_{2-6} алкениле, C_{2-6} алкиниле, C_{3-6} циклоалкиле, 3- - 7-членном гетероциклоалкиле, C_{6-10} -ариле, или моно- или бициклическом гетероариле независимо является, необязательно, замещенным дейтерием, галогеном, C_{1-6} алкилом, C_{1-6} галоалкилом, $-OR^{e'}$, $-OC(O)R^{e'}$, $-OC(O)NR^{e'}R^{f'}$, $-OS(O)R^{e'}$, $-OS(O)_2R^{e'}$, $-OS(O)NR^{e'}R^{f'}$, $-OS(O)_2NR^{e'}R^{f'}$, $-SR^{e'}$, $-S(O)R^{e'}$, $-S(O)_2R^{e'}$, $-S(O)NR^{e'}R^{f'}$, $-S(O)_2NR^{e'}R^{f'}$, $-NR^{e'}R^{f'}$, $-NR^{e'}C(O)R^{f'}$, $-NR^{e'}C(O)OR^{f'}$, $-NR^{e'}C(O)NR^{e'}R^{f'}$, $-NR^{e'}S(O)R^{f'}$, $-NR^{e'}S(O)_2R^{f'}$, $-NR^{e'}S(O)NR^{e'}R^{f'}$, $-NR^{e'}S(O)_2NR^{e'}R^{f'}$, $-C(O)R^{e'}$, $-C(O)OR^{e'}$, $-C(O)NR^{e'}R^{f'}$, $-PR^{e'}R^{f'}$, $-P(O)R^{e'}R^{f'}$, $-P(O)_2R^{e'}R^{f'}$, $-P(O)NR^{e'}R^{f'}$, $-P(O)_2NR^{e'}R^{f'}$, $-P(O)OR^{e'}$, $-P(O)_2OR^{e'}$, $-CN$ или $-NO_2$;

каждый из $R^{3'}$ и $R^{4'}$ независимо представляет собой дейтерий, галоген, $-OR^{c'}$, $-OC(O)R^{c'}$, $-OC(O)NR^{c'}R^{d'}$, $-OC(=N)NR^{c'}R^{d'}$, $-OS(O)R^{c'}$, $-OS(O)_2R^{c'}$, $-OS(O)NR^{c'}R^{d'}$, $-OS(O)_2NR^{c'}R^{d'}$, $-SR^{c'}$, $-S(O)R^{c'}$, $-S(O)_2R^{c'}$, $-S(O)NR^{c'}R^{d'}$, $-S(O)_2NR^{c'}R^{d'}$, $-NR^{c'}R^{d'}$, $-NR^{c'}C(O)R^{d'}$, $-NR^{c'}C(O)OR^{d'}$, $-NR^{c'}C(O)NR^{c'}R^{d'}$, $-NR^{c'}C(=N)NR^{c'}R^{d'}$, $-NR^{c'}S(O)R^{d'}$, $-NR^{c'}S(O)_2R^{d'}$, $-NR^{c'}S(O)NR^{c'}R^{d'}$, $-NR^{c'}S$

$(O)_2NR^{c'}R^{d'}$, $-C(O)R^{c'}$, $-C(O)OR^{c'}$, $-C(O)NR^{c'}R^{d'}$, $-C(=N)NR^{c'}R^{d'}$, $-PR^{c'}R^{d'}$, $-P(O)R^{c'}R^{d'}$, $-P(O)_2R^{c'}R^{d'}$, $-P(O)NR^{c'}R^{d'}$, $-P(O)_2NR^{c'}R^{d'}$, $-P(O)OR^{c'}$, $-P(O)_2OR^{c'}$, $-CN$, $-NO_2$, C_{1-6} алкил, C_{2-6} алкенил, C_{2-6} алкинил, C_{3-6} циклоалкил, 3- - 7-членный гетероциклоалкил, C_{6-10} -арил, или моно- или бициклический гетероарил, или любые две группы $R^{3'}$ или любые две группы $R^{4'}$, взятые вместе с кольцом, к которому они присоединены, формируют C_{5-8} циклоалкил или 5- - 8-членный гетероциклоалкил, где каждый атом водорода в C_{1-6} алкиле, C_{2-6} алкениле, C_{2-6} алкиниле, C_{3-6} циклоалкиле, 3- - 7-членном гетероциклоалкиле, C_{6-10} ариле, моно- или бициклическом гетероариле, C_{5-8} циклоалкиле или 5- - 8-членном гетероциклоалкиле независимо является, необязательно, замещенным дейтерием, галогеном, C_{1-6} алкилом, C_{1-6} галоалкилом, $-OR^{e'}$, $-OC(O)R^{e'}$, $-OC(O)NR^{e'}R^{f'}$, $-OS(O)R^{e'}$, $-OS(O)_2R^{e'}$, $-OS(O)NR^{e'}R^{f'}$, $-OS(O)_2NR^{e'}R^{f'}$, $-SRe^{e'}$, $-S(O)R^{e'}$, $-S(O)_2R^{e'}$, $-S(O)NR^{e'}R^{f'}$, $-S(O)_2NR^{e'}R^{f'}$, $-NR^{e'}R^{f'}$, $-NR^{e'}C(O)R^{f'}$, $-NR^{e'}C(O)OR^{f'}$, $-NR^{e'}C(O)NR^{e'}R^{f'}$, $-NR^{e'}S(O)R^{f'}$, $-NR^{e'}S(O)_2R^{f'}$, $-NR^{e'}S(O)NR^{e'}R^{f'}$, $-NR^{e'}S(O)_2NR^{e'}R^{f'}$, $-C(O)R^{e'}$, $-C(O)OR^{e'}$, $-C(O)NR^{e'}R^{f'}$, $-PR^{e'}R^{f'}$, $-P(O)R^{e'}R^{f'}$, $-P(O)_2R^{e'}R^{f'}$, $-P(O)NR^{e'}R^{f'}$, $-P(O)_2NR^{e'}R^{f'}$, $-P(O)OR^{E'}$, $-P(O)_2OR^{E'}$, $-CN$ или $-NO_2$;

$R^{7'}$ представляет собой H, дейтерий, C_{1-6} алкил, C_{2-6} алкенил, C_{2-6} алкинил, C_{3-6} циклоалкил, 3- - 7-членный гетероциклоалкил, C_{6-10} -арил, или моно- или бициклической гетероарил, где каждый атом водорода в C_{1-6} алкиле, C_{2-6} алкениле, C_{2-6} алкиниле, C_{3-6} циклоалкиле, 3- - 7-членном гетероциклоалкиле, C_{6-10} -ариле, или моно- или бициклическом гетероариле независимо является, необязательно, замещенным дейтерием, галогеном, $-OR^{i'}$, $-OC(O)R^{i'}$, $-OC(O)NR^{i'}R^{j'}$, $-OS(O)R^{i'}$, $-OS(O)_2R^{i'}$, $-OS(O)NR^{i'}R^{j'}$, $-OS(O)_2NR^{i'}R^{j'}$, $-SR^{i'}$, $-S(O)R^{i'}$, $-S(O)_2R^{i'}$, $-S(O)NR^{i'}R^{j'}$, $-S(O)_2NR^{i'}R^{j'}$, $-NR^{i'}R^{j'}$, $-NR^{i'}C(O)R^{j'}$, $-NR^{i'}C(O)OR^{j'}$, $-NR^{i'}C(O)NR^{i'}R^{j'}$, $-NR^{i'}S(O)R^{j'}$, $-NR^{i'}S(O)_2R^{j'}$, $-NR^{i'}S(O)NR^{i'}R^{j'}$, $-NR^{i'}S(O)_2NR^{i'}R^{j'}$, $-C(O)R^{i'}$, $-C(O)OR^{i'}$, $-C(O)NR^{i'}R^{j'}$, $-PR^{i'}R^{j'}$, $-P(O)R^{i'}R^{j'}$, $-P(O)_2R^{i'}R^{j'}$, $-P(O)NR^{i'}R^{j'}$, $-P(O)_2NR^{i'}R^{j'}$, $-P(O)OR^{i'}$, $-P(O)_2OR^{i'}$, $-CN$ или $-NO_2$;

каждый из $R^{a'}$, $R^{b'}$, $R^{c'}$, $R^{d'}$, $R^{e'}$, $R^{f'}$, $R^{i'}$ и $R^{j'}$ независимо выбран из группы, состоящей из H, дейтерия, C_{1-6} алкила, C_{2-6} алкенила, C_{2-6} алкинила, C_{3-6} циклоалкила, 3- - 7-членного гетероциклоалкила, C_{6-10} -арила и гетероарила;

m' представляет собой 2, 3, 4 или 5;

n' представляет собой 2, 3 или 4;

p' представляет собой 0, 1, 2, 3 или 4; и

q' представляет собой 0, 1, 2, 3 или 4; или его фармацевтически приемлемую соль.

Иллюстративные ингибиторы Trk включают TPX-0005.

Ингибитор Trk может представлять собой один из ингибиторов, обнаруженных в Патенте США No. 9187489 и Международной публикации No. WO 2013/183578, полное содержание обоих из которых приведено в настоящем описании в качестве ссылки. Иллюстративные ингибиторы Trk включают PLX7486 и DS-6051.

Неограничивающие примеры ингибиторов Trk можно обнаружить в Публикации США No. 2015/0306086 и Международной публикации No. WO 2013/074518, полное

содержание обеих из которых приведено в настоящем описании в качестве ссылки. Иллюстративные ингибиторы Trk включают TSR-011.

Дополнительные примеры ингибиторов Trk можно обнаружить в Патенте США No. 8637516, Международной публикации No. WO 2012/034091, Патенте США No. 9102671, 5 Международной публикации No. WO 2012/116217, Патентной публикации США No. 2010/0297115, Международной публикации No. WO 2009/053442, Патенте США No. 8642035, Международной публикации No. WO 2009092049, Патенте США No. 8691221, Международной публикации No. WO2006131952, полное содержание всех из которых приведено в настоящем описании в качестве ссылки. Иллюстративные ингибиторы Trk 10 включают GNF-4256, описанный в Cancer Chemother. Pharmacol. 75(1):131-141, 2015; и GNF-5837 (N-[3-[[2,3-дигидро-2-оксо-3-(1H-пиррол-2-илметил)-1H-индол-6-ил]амино]-4-метилфенил]-N'-[2-фтор-5-(трифторметил)фенил]-мочевину), описанный в ACS Med. Chem. Lett. 3(2):140-145, 2012, полное содержание всех из которых приведено в настоящем описании в качестве ссылок.

Дополнительные примеры ингибиторов Trk включают ингибиторы, описанные в Патентной публикации США No. 2010/0152219, Патенте США No. 8114989 и 15 Международной публикации No. WO 2006/123113, полное содержание всех из которых приведено в настоящем описании в качестве ссылки. Иллюстративные ингибиторы Trk включают AZ623, описанный в Cancer 117(6):1321-1391, 2011; AZD6918, описанный в 20 Cancer Biol. Ther. 16(3):477-483, 2015; AZ64, описанный в Cancer Chemother. Pharmacol. 70:477-486, 2012; AZ-23 ((S)-5-хлор-N2-(1-(5-фторпиридин-2-ил)этил)-N4-(5-изопропокси-1H-пиразол-3-ил)пиримидин-2,4-диамин), описанный в Mol. Cancer Ther. 8:1818-1827, 2009; и AZD7451; полное содержание всех из которых приведено в настоящем описании в качестве ссылок.

Ингибитор Trk может включать ингибиторы, описанные в Патентах США No. 7615383; 7384632; 6153189; 6027927; 6025166; 5910574; 5877016; и 5844092, полное содержание всех из которых приведено в настоящем описании в качестве ссылок.

Дополнительные примеры ингибиторов Trk включают CEP-751, описанный в Int. J. Cancer 72:672-679, 1997; CT327, описанный в Acta Derm. Venereol. 95:542-548, 2015; 30 соединения, описанные в Международной публикации No. WO 2012/034095; соединения, описанные в Патенте США No. 8673347 и Международной публикации No. WO 2007/022999; соединения, описанные в Патенте США No. 8338417; соединения, описанные в Международной публикации No. WO 2016/027754; соединения, описанные в Патенте США No. 9242977; соединения, описанные в Патентной публикации No. 2016/0000783; 35 сунитиниб (N-(2-диэтиламиноэтил)-5-[(Z)-(5-фтор-2-оксо-1H-индол-3-илиден)метил]-2,4-диметил-1H-пиррол-3-карбоксамид), как описано в PLoS One 9:e95628, 2014; соединения, описанные в Международной публикации No. WO 2011/133637; соединения, описанные в Патенте США No. 8637256; соединения, описанные в Expert. Opin. Ther. Pat. 24(7):731-744, 2014; соединения, описанные в Expert Opin. Ther. Pat. 19(3):305-319, 40 2009; замещенные (R)-2-фенилпирролидином имидазопиридины, например, (4-((5-хлор-4-(метиламино)-7H-пирроло[2,3-d]пиримидин-2-ил)амино)-3-метоксифенил)(морфолино)метанон, как описано в ACS Med. Chem. Lett. 6(5):562-567, 2015; GTx-186 и другие, как описано в PLoS One 8(12):e83380, 2013; K252a ((9S-(9 α ,10 β ,12 α))-2,3,9,10,11,12-гексагидро-10-гидрокси-10-(метоксикарбонил)-9-метил-9,12-эпокси-1H-дииндоло[1,2,3-fg:3',2',1'-kl] 45 пирроло[3,4-i][1,6]бензодиазоцин-1-он), как описано в Mol. Cell Biochem. 339(1-2):201-213, 2010; 4-аминопиразолилпиримидины, например, AZ-23 (((S)-5-хлор-N2-(1-(5-фторпиридин-2-ил)этил)-N4-(5-изопропокси-1H-пиразол-3-ил)пиримидин-2,4-диамин)), как описано в J. Med. Chem. 51(15):4672-4684, 2008; PHA-739358 (данусертиб), as described

in Mol. Cancer Ther. 6:3158, 2007; Gö 6976 (5,6,7,13-тетрагидро-13-метил-5-оксо-12Н-индоло[2,3-а]пирроло[3,4-с]карбазол-12-пропаннитрил), как описано в J. Neurochem. 72:919-924, 1999; GW441756 ((3Z)-3-[(1-метилиндол-3-ил)метилен]-1Н-пирроло[3,2-б]пиридин-2-он), как описано в IJAE 115:117, 2010; милциклиб (РНА-848125АС), как описано в J. Carcinog. 12:22, 2013; AG-879 ((2E)-3-[3,5-бис(1,1-диметилэтил)-4-гидроксифенил]-2-циано-2-пропентиоамид); алтиратиниб (N-(4-((2-(циклопропанкарбоксамидо)пиридин-4-ил)окси)-2,5-дифторфенил)-N-(4-фторфенил)циклопропан-1,1-дикарбоксамид); кабозантиниб (N-(4-((6,7-диметоксихинолин-4-ил)окси)фенил)-N'-(4-фторфенил)циклопропан-1,1-дикарбоксамид); лестауртиниб ((5S,6S,8R)-6-гидрокси-6-(гидроксиметил)-5-метил-7,8,14,15-тетрагидро-5Н-16-окса-4b,8a,14-триаза-5,8-метанодибензо[*b,h*]циклоокта[*ijkl*]циклопента[*e*]-as-индацен-13(6Н)-она); доватиниб (гидрат моно-2-гидроксипропаноата 4-амино-5-фтор-3-[6-(4-метилпиперазин-1-ил)-1Н-бензимидазол-2-ил]хинолин-2(1Н)-она); ситраватиниб (N-(3-фтор-4-((2-(5-((2-метоксиэтил)амино)метил)пиридин-2-ил)тиено[3,2-*b*]пиридин-7-ил)окси)фенил)-N-(4-фторфенил)циклопропан-1,1-дикарбоксамид); ONO-5390556; регорафениб (гидрат 4-[4-({[4-хлор-3-(трифторметил)фенил]карбамоил}амино)-3-фторфенокси]-N-метилпиридин-2-карбоксамид); VSR-902A; полное содержание всех вышеуказанных ссылок приведено в настоящем описании в качестве ссылки.

В некоторых вариантах осуществления, ингибитор Trk выбран из группы, состоящей из:

(6*R*)-9-фтор-2,11,15,19,20,23-гексаазапентацикло[15.5.2.1^{7,11}.0^{2,6}.0^{20,24}]пентакоза-1(23),7,9,17(24),18,21-гексен-16,25-диона;

(6*R*)-12-окса-2,16,20,21,24,26-гексаазапентацикло[16.5.2.1^{7,11}.0^{2,6}.0^{21,25}]гексакоза-1(24),7(26),8,10, 18(25),19,22-гептен-17-она;

(6*R*)-9-фтор-13-окса-2,11,17,21,22,25-гексаазапентацикло[17.5.2.0^{2,6}.0^{7,12}.0^{22,26}]гексакоза-1(25),7,9,11,19(26),20,23-гептен-18-она;

(6*R*)-9-фтор-15-гидрокси-13-окса-2,11,17,21,22,25-гексаазапентацикло[17.5.2.0^{2,6}.0^{7,12}.0^{22,26}]гексакоза-1(25),7,9,11,19(26),20,23-гептен-18-она;

(6*R*,13*S*)-9-фтор-13-гидрокси-2,11,15,19,20,23-гексаазапентацикло- [15.5.2.1^{7,11}.0^{2,6}.0^{20,24}]пентакоза-1(23),7,9,17(24),18,21-гексен-16,25-диона;

(6*R*,15*R*)-9-фтор-15-гидрокси-13-окса-2,11,17,21,22,25-гексаазапентацикло- [17.5.2.0^{2,6}.0^{7,12}.0^{22,26}]гексакоза-1(25),7,9,11,19(26),20,23-гептен-18-она;

(6*R*,13*R*)-9-фтор-13-гидрокси-2,11,15,19,20,23-гексаазапентацикло- [15.5.2.1^{7,11}.0^{2,6}.0^{20,24}]пентакоза-1(23),7,9,17(24),18,21-гексен-16,25-диона;

(6*R*)-9-фтор-13-окса-2,11,16,20,21,24-гексаазапентацикло [16.5.2.0^{2,6}.0^{7,12}.0^{21,25}]пентакоза-1(24),7,9,11,18(25),19,22-гептен-17-она;

(6*R*)-9-фтор-13-окса-2,11,18,22,23,26-гексаазапентацикло [18.5.2.0^{2,6}.0^{7,12}.0^{23,27}]гептакоза-1(26),7,9,11,20(27),21,24-гептен-19-она;

(6*R*)-9-фтор-2,11,16,20,21,24-гексаазапентацикло[16.5.2.1^{7,11}.0^{2,6}.0^{21,25}]гексакоза-1(24),7,9,18(25),19,22-гексен-17,26-диона;

(6*R*)-9-фтор-2,11,13,16,20,21,24-гептаазапентацикло[16.5.2.0^{2,6}.0^{7,12}.0^{21,25}]пентакоза-1(24),7,9,11,18(25),19,22-гептен-17-она;

(6*R*)-9-фтор-2,11,13,17,21,22,25-гептаазапентацикло[17.5.2.0^{2,6}.0^{7,12}.0^{22,26}]гексакоза-1(25),7,9,11,19(26),20,23-гептен-18-она;

(6*R*)-9-фтор-13,16-диокса-2,11,20,21,24-пентаазапентацикло[16.5.2.0^{2,6}.0^{7,12}.0^{21,25}]-пентакоза-1(24),7,9,11,18(25),19,22-гептен-17-она;

(6*R*)-9-фтор-14-окса-2,11,18,19,22-пентаазапентацикло[14.5.2.1^{7,11}.0^{2,6}.0^{19,23}]тетракоза-1(22),7,9,16(23),17,20-гексен-15,24-диона;

(6*R*)-9-фтор-13,16-диокса-2,11,17,21,22,25-гексаазапентацикло[17.5.2.0^{2,6}.0^{7,12}.0^{22,26}]гексакоза-1(25),7,9,11,19(26),20,23-гептен-18-она;

(6*R*,13*R*)-9,13-дифтор-2,11,15,19,20,23-гексаазапентацикло[15.5.2.1^{7,11}.0^{2,6}.0^{20,24}]пентакоза-1(23),7,9,17(24),18,21-гексен-16,25-диона;

(6*R*)-9-фтор-17-метил-13-окса-2,11,17,21,22,25-гексаазапентацикло[17.5.2.0^{2,6}.0^{7,12}.0^{22,26}]гексакоза-1(25),7,9,11,19(26),20,23-гептен-18-она;

(6*R*)-9,15,15-трифтор-13-окса-2,11,17,21,22,25-гексаазапентацикло[17.5.2.0^{2,6}.0^{7,12}.0^{22,26}]гексакоза-1(25),7,9,11,19(26),20,23-гептен-18-она;

(6*R*)-9-фтор-13-окса-2,17,21,22,25-пентаазапентацикло[17.5.2.0^{2,6}.0^{7,12}.0^{22,26}]гексакоза-1(25),7,9,11,19(26),20,23-гептен-18-она;

(6*R*)-9-фтор-13-окса-2,16,20,21,24-пентаазапентацикло[16.5.2.0^{2,6}.0^{7,12}.0^{21,25}]пентакоза-1(24),7,9,11,18(25),19,22-гептена;

1-[(6*R*)-9-фтор-13-окса-2,16,20,21,24-пентаазапентацикло[16.5.2.0^{2,6}.0^{7,12}.0^{21,25}]пентакоза-1(24),7,9,11,18(25),19,22-гептен-16-ил]этан-1-она;

1-[(6*R*)-9-фтор-13-окса-2,16,20,21,24-пентаазапентацикло[16.5.2.0^{2,6}.0^{7,12}.0^{21,25}]пентакоза-1(24),7,9,11,18(25),19,22-гептен-16-ил]-2-гидроксиэтан-1-она;

(6*R*)-9-фтор-13-окса-2,17,21,22,25-пентаазапентацикло[17.5.2.0^{2,6}.0^{7,12}.0^{22,26}]гексакоза-1(25),7,9,11,19(26),20,23-гептена;

(6*R*)-9-фтор-16-метансульфонил-13-окса-2,16,20,21,24-пентаазапентацикло[16.5.2.0^{2,6}.0^{7,12}.0^{21,25}]пентакоза-1(24),7,9,11,18(25),19,22-гептена;

2-[(6*R*)-9-фтор-13-окса-2,16,20,21,24-пентаазапентацикло[16.5.2.0^{2,6}.0^{7,12}.0^{21,25}]пентакоза-1(24),7,9,11,18(25),19,22-гептен-16-ил]уксусной кислоты;

(6*R*)-9-фтор-17-метансульфонил-13-окса-2,17,21,22,25-пентаазапентацикло[17.5.2.0^{2,6}.0^{7,12}.0^{22,26}]гексакоза-1(25),7,9,11,19(26),20,23-гептена;

(6*R*)-*N*-этил-9-фтор-13-окса-2,17,21,22,25-пентаазапентацикло[17.5.2.0^{2,6}.0^{7,12}.0^{22,26}]гексакоза-1(25),7,9,11,19(26),20,23-гептен-17-карбоксамид;

(6*R*)-*N*-этил-9-фтор-13-окса-2,16,20,21,24-пентаазапентацикло[16.5.2.0^{2,6}.0^{7,12}.0^{21,25}]пентакоза-1(24),7,9,11,18(25),19,22-гептен-16-карбоксамид;

(6*S*)-9-фтор-4,13-диокса-2,11,17,21,22,25-гексаазапентацикло[17.5.2.0^{2,6}.0^{7,12}.0^{22,26}]гексакоза-1(25),7(12),8,10,19(26),20,23-гептен-3,18-диона;

(6*S*)-9-фтор-4,13-диокса-2,11,16,20,21,24-гексаазапентацикло[16.5.2.0^{2,6}.0^{7,12}.0^{21,25}]пентакоза-1(24),7(12),8,10,18(25),19,22-гептен-3,17-диона;

(6*R*)-9-фтор-2,11,16,20,21,24-гексаазапентацикло[16.5.2.0^{2,6}.0^{7,12}.0^{21,25}]пентакоза-1(24),7,9,11,18(25),19,22-гептен-17-она;

(6*R*)-9-фтор-15-метил-2,11,16,20,21,24-гексаазапентацикло[16.5.2.0^{2,6}.0^{7,12}.0^{21,25}]пентакоза-1(24),7,9,11,18(25),19,22-гептен-17-она;

(6*R*,13*R*)-9-фтор-13-метил-2,11,15,19,20,23-гексаазапентацикло
 [15.5.2.1^{7,11}.0^{2,6}.0^{20,24}]пентакоза-1(23),7,9,17(24),18,21-гексен-16,25-диона;
 (6*R*,13*S*)-9-фтор-13-метил-2,11,15,19,20,23-гексаазапентацикло
 5 [15.5.2.1^{7,11}.0^{2,6}.0^{20,24}]пентакоза-1(23),7,9,17(24),18,21-гексен-16,25-диона;
 (6*R*)-9-фтор-15,15-диметил-13-окса-2,11,17,21,22,25-гексаазапентацикло
 [17.5.2.0^{2,6}.0^{7,12}.0^{22,26}]гексакоза-1(25),7,9,11,19(26),20,23-гептен-18-она;
 (6*R*)-9-фтор-15,15-диметил-2,11,16,20,21,24-гексаазапентацикло
 10 [16.5.2.0^{2,6}.0^{7,12}.0^{21,25}]пентакоза-1(24),7,9,11,18(25),19,22-гептен-17-она;
 (6*R*)-9-фтор-13-окса-2,11,16,17,21,25,26,29-октаазагексацикло
 [21.5.2.0^{2,6}.0^{7,12}.0^{16,20}.0^{26,30}]триаконта-1(29),7,9,11,17,19,23(30),24,27-нонаен-22-она;
 (6*R*)-9-фтор-13-окса-2,11,19,21,25,26,29-гептаазагексацикло
 15 [21.5.2.0^{2,6}.0^{7,12}.0^{15,20}.0^{26,30}]триаконта-1(29),7,9,11,15(20),16,18,23(30),24,27-декаен-22-она;
 (6*R*)-9-фтор-13,13-диметил-2,11,15,19,20,23-гексаазапентацикло
 [15.5.2.1^{7,11}.0^{2,6}.0^{20,24}]пентакоза-1(23),7,9,17(24),18,21-гексен-16,25-диона;
 (4*R*,6*R*,15*S*)-9-фтор-4,15-дигидрокси-13-окса-2,17,21,22,25-пентаазапентацикло
 20 [17.5.2.0^{2,6}.0^{7,12}.0^{22,26}]гексакоза-1(25),7(12),8,10,19(26),20,23-гептен-18-она;
 (4*R*,6*S*,15*S*)-9-фтор-4,15-дигидрокси-13-окса-2,17,21,22,25-пентаазапентацикло
 [17.5.2.0^{2,6}.0^{7,12}.0^{22,26}]гексакоза-1(25),7(12),8,10,19(26),20,23-гептен-18-она;
 (4*R*,6*R*)-9-фтор-4-гидрокси-13-окса-2,17,21,22,25-пентаазапентацикло
 25 [17.5.2.0^{2,6}.0^{7,12}.0^{22,26}]гексакоза-1(25),7(12),8,10,19(26),20,23-гептен-18-она;
 (4*R*,6*S*)-9-фтор-4-гидрокси-13-окса-2,17,21,22,25-пентаазапентацикло
 [17.5.2.0^{2,6}.0^{7,12}.0^{22,26}]гексакоза-1(25),7(12),8,10,19(26),20,23-гептен-18-она;
 (4*R*,6*R*)-9-фтор-4-гидрокси-13-окса-2,16,20,21,24-пентаазапентацикло
 30 [16.5.2.0^{2,6}.0^{7,12}.0^{21,25}]пентакоза-1(24),7,9,11,18(25),19,22-гептен-17-она;
 (4*R*,6*S*)-9-фтор-4-гидрокси-13-окса-2,16,20,21,24-пентаазапентацикло
 [16.5.2.0^{2,6}.0^{7,12}.0^{21,25}]пентакоза-1(24),7,9,11,18(25),19,22-гептен-17-она;
 (4*R*,6*R*,15*R*)-9-фтор-4,15-дигидрокси-13-окса-2,17,21,22,25-пентаазапентацикло
 35 [17.5.2.0^{2,6}.0^{7,12}.0^{22,26}]гексакоза-1(25),7(12),8,10,19(26),20,23-гептен-18-она;
 (4*R*,6*S*,15*R*)-9-фтор-4,15-дигидрокси-13-окса-2,17,21,22,25-пентаазапентацикло
 [17.5.2.0^{2,6}.0^{7,12}.0^{22,26}]гексакоза-1(25),7(12),8,10,19(26),20,23-гептен-18-она; и
 (15*S*)-4,4,9-трифтор-15-гидрокси-13-окса-2,17,21,22,25-пентаазапентацикло
 40 [17.5.2.0^{2,6}.0^{7,12}.0^{22,26}]гексакоза-1(25),7(12),8,10,19(26),20,23-гептен-18-она, или их
 фармацевтически приемлемых солей.

В некоторых вариантах осуществления, ингибитор Trk выбран из группы, состоящей из:

(*R*)-*N*-трет-бутил-5-(2-(2,5-дифторфенил)пирролидин-1-ил)пиразоло[1,5-а]пиримидин-3-карбоксамида;

(*R*)-5-(2-(2,5-дифторфенил)пирролидин-1-ил)-*N*-(пиридин-2-ил)пиразоло[1,5-а]пиримидин-3-карбоксамида;

(*R*)-5-(2-(2,5-дифторфенил)пирролидин-1-ил)-*N*-(3-метилпиридин-2-ил)пиразоло[1,5-а]пиримидин-3-карбоксамида;

(*R*)-5-(2-(2,5-дифторфенил)пирролидин-1-ил)-*N*-(2-морфолиноэтил)пиразоло[1,5-а]

пиримидин-3-карбоксамида;

(R)-5-(2-(2,5-дифторфенил)пирролидин-1-ил)-N-((5-метилфуран-2-ил)метил)пиразоло
[1,5-а]пиримидин-3-карбоксамида;

(R)-5-(2-(2,5-дифторфенил)пирролидин-1-ил)-N-(1-метил-1H-пиразол-3-ил)пиразоло
[1,5-а]пиримидин-3-карбоксамида;

5-((R)-2-(2,5-дифторфенил)пирролидин-1-ил)-N-((транс)-4-гидроксициклогексил)
пиразоло[1,5-а]пиримидин-3-карбоксамида;

(R)-5-(2-(2,5-дифторфенил)пирролидин-1-ил)-N-(1-гидрокси-2-метилпропан-2-ил)
пиразоло[1,5-а]пиримидин-3-карбоксамида;

(R)-5-(2-(2,5-дифторфенил)пирролидин-1-ил)-N-(2-метил-1-морфолинопропан-2-ил)
пиразоло[1,5-а]пиримидин-3-карбоксамида;

(R)-5-(2-(2,5-дифторфенил)пирролидин-1-ил)-N-метилпиразоло[1,5-а]пиримидин-3-
карбоксамида;

(R)-1-(5-(2-(2,5-дифторфенил)пирролидин-1-ил)пиразоло[1,5-а]пиримидин-3-карбонил)
15 пиперидин-4-карбоновой кислоты;

(R)-2-(1-(5-(2-(2,5-дифторфенил)пирролидин-1-ил)пиразоло[1,5-а]пиримидин-3-
карбонил)пиперидин-4-ил)уксусной кислоты;

(R)-N-циклопропил-5-(2-(2,5-дифторфенил)пирролидин-1-ил)пиразоло[1,5-а]
пиримидин-3-карбоксамида;

(R)-N-циклобутил-5-(2-(2,5-дифторфенил)пирролидин-1-ил)пиразоло[1,5-а]пиримидин-
3-карбоксамида;

N-((2S)-бицикло[2,2,1]гептан-2-ил)-5-((R)-2-(2,5-дифторфенил)пирролидин-1-ил)
пиразоло[1,5-а]пиримидин-3-карбоксамида;

(R)-5-(2-(2,5-дифторфенил)пирролидин-1-ил)-N-(1-(гидроксиметил)циклопропил)
25 пиразоло[1,5-а]пиримидин-3-карбоксамида;

(R)-5-(2-(2,5-дифторфенил)пирролидин-1-ил)-N-(2-гидрокси-2-метилпропил)пиразоло
[1,5-а]пиримидин-3-карбоксамида;

(5-((R)-2-(2,5-дифторфенил)пирролидин-1-ил)пиразоло[1,5-а]пиримидин-3-ил)((S)-3-
гидрокси-2-метилпропил)пирролидин-1-ил)метанона;

(5-((R)-2-(2,5-дифторфенил)пирролидин-1-ил)пиразоло[1,5-а]пиримидин-3-ил)((R)-3-
гидрокси-2-метилпропил)пирролидин-1-ил)метанона;

(R)-5-(2-(2,5-дифторфенил)пирролидин-1-ил)-N-(тетрагидро-2H-пиран-4-ил)пиразоло
[1,5-а]пиримидин-3-карбоксамида;

(R)-5-(2-(2,5-дифторфенил)пирролидин-1-ил)-N-((1-метил-1H-имидазол-4-ил)метил)
35 пиразол[1,5-а]пиримидин-3-карбоксамида;

(R)-5-(2-(2,5-дифторфенил)пирролидин-1-ил)-N-((1-метил-1H-пиразол-4-ил)метил)
пиразоло[1,5-а]пиримидин-3-карбоксамида;

(R)-5-(2-(2,5-дифторфенил)пирролидин-1-ил)-N-(2-(1-метил-1H-имидазол-5-ил)этил)
пиразоло[1,5-а]пиримидин-3-карбоксамида;

(R)-5-(2-(2,5-дифторфенил)пирролидин-1-ил)-N-(2-(2-оксоимидазолидин-1-ил)этил)
40 пиразол[1,5-а]пиримидин-3-карбоксамида;

(R)-N-(2-(1H-имидазол-4-ил)этил)-5-(2-(2,5-дифторфенил)пирролидин-1-ил)пиразол
[1,5-а]пиримидин-3-карбоксамида;

5-((R)-2-(2,5-дифторфенил)пирролидин-1-ил)-N-((R)-2,3-дигидроксипропил)пиразоло
45 [1,5-а]пиримидин-3-карбоксамида;

(R)-5-(2-(2,5-дифторфенил)пирролидин-1-ил)-N,N-диметилпиразоло[1,5-а]пиримидин-
3-карбоксамида;

(R)-N-(2-(1H-имидазол-1-ил)этил)-5-(2-(2,5-дифторфенил)пирролидин-1-ил)пиразоло

[1,5-а]пиримидин-3-карбоксамид;

5-((R)-2-(2,5-дифторфенил)пирролидин-1-ил)-N-((S)-2,3-дигидроксипропил)пиразоло
[1,5-а]пиримидин-3-карбоксамид;

(R)-5-(2-(2,5-дифторфенил)пирролидин-1-ил)пиразоло[1,5-а]пиримидин-3-
карбоксамид;

(R)-(5-(2-(2,5-дифторфенил)пирролидин-1-ил)пиразоло[1,5-а]пиримидин-3-ил)(3-
гидроксиазетидин-1-ил)метанона;

(R)-(5-(2-(2,5-дифторфенил)пирролидин-1-ил)пиразоло[1,5-а]пиримидин-3-ил)(3-
гидрокси-3-метилазетидин-1-ил)метанона;

транс-4-(5-((R)-2-(2,5-дифторфенил)пирролидин-1-ил)пиразоло[1,5-а]пиримидин-3-
карбоксамидо)циклогексанкарбоновой кислоты;

5-((R)-2-(5-фтор-2-метоксифенил)пирролидин-1-ил)-N-((транс)-4-гидроксициклогексил)
пиразоло[1,5-а]пиримидин-3-карбоксамид;

5-((R)-2-(3-фторфенил)пирролидин-1-ил)-N-((транс)-4-гидроксициклогексил)пиразоло
[1,5-а]пиримидин-3-карбоксамид;

(R)-N-трет-бутил-5-(2-(3-фторфенил)пирролидин-1-ил)пиразоло[1,5-а]пиримидин-3-
карбоксамид;

(R)-N-циклопропил-5-(2-(3-фторфенил)пирролидин-1-ил)пиразоло[1,5-а]пиримидин-
3-карбоксамид;

(R)-N-(2-цианопропан-2-ил)-5-(2-(2,5-дифторфенил)пирролидин-1-ил)пиразоло[1,5-
а]пиримидин-3-карбоксамид;

(R)-N-(цианометил)-5-(2-(2,5-дифторфенил)пирролидин-1-ил)пиразоло[1,5-а]
пиримидин-3-карбоксамид;

(R)-5-(2-(2,5-дифторфенил)пирролидин-1-ил)-N-(1-фтор-2-метилпропан-2-ил)пиразоло
[1,5-а]пиримидин-3-карбоксамид;

N-циклопропил-5-((2R,4R)-2-(3-фторфенил)-4-гидрокси-пирролидин-1-ил)пиразоло
[1,5-а]пиримидин-3-карбоксамид;

N-трет-бутил-5-((2R,4R)-2-(3-фторфенил)-4-гидрокси-пирролидин-1-ил)пиразоло[1,5-
а]пиримидин-3-карбоксамид;

5-((2R,4R)-2-(3-фторфенил)-4-гидрокси-пирролидин-1-ил)-N-метилпиразоло[1,5-а]
пиримидин-3-карбоксамид;

(R)-5-(2-(2,5-дифторфенил)пирролидин-1-ил)-N-(1-(метилсульфонил)пиперидин-4-ил)
пиразоло[1,5-а]пиримидин-3-карбоксамид;

(R)-5-(2-(2,5-дифторфенил)пирролидин-1-ил)-N-(1-сульфамоилпиперидин-4-ил)
пиразоло[1,5-а]пиримидин-3-карбоксамид;

(R)-5-(2-(2,5-дифторфенил)пирролидин-1-ил)-N-(2-(метилсульфонамидо)этил)пиразоло
[1,5-а]пиримидин-3-карбоксамид;

(R)-5-(2-(2,5-дифторфенил)пирролидин-1-ил)-N-(2-сульфамоилэтил)пиразоло[1,5-а]
пиримидин-3-карбоксамид;

(R)-N-циклопропил-5-(2-(5-фтор-2-метоксифенил)пирролидин-1-ил)пиразоло[1,5-а]
пиримидин-3-карбоксамид;

(R)-5-(2-(5-фтор-2-метоксифенил)пирролидин-1-ил)-N-(2-гидрокси-2-метилпропил)
пиразоло[1,5-а]пиримидин-3-карбоксамид;

5-((R)-2-(2,5-дифторфенил)пирролидин-1-ил)-N-(4-гидрокси-4-метилциклогексил)
пиразоло[1,5-а]пиримидин-3-карбоксамид (диастереомера 1);

5-((R)-2-(2,5-дифторфенил)пирролидин-1-ил)-N-(4-гидрокси-4-метилциклогексил)
пиразоло[1,5-а]пиримидин-3-карбоксамид (диастереомера 2);

(R)-N-циклопропил-5-(2-(5-фторпиридин-3-ил)пирролидин-1-ил)пиразоло[1,5-а]

пиримидин-3-карбоксамида;

(R)-N-*трет*-бутил-5-(2-(5-фторпиридин-3-ил)пирролидин-1-ил)пиразоло[1,5-а]

пиримидин-3-карбоксамида;

(R)-5-(2-(5-фтор-2-метоксифенил)пирролидин-1-ил)-N-(2-морфолиноэтил)пиразоло

5 [1,5-а]пиримидин-3-карбоксамида;

N-((S)-2,3-дигидроксипропил)-5-((R)-2-(5-фтор-2-метоксифенил)пирролидин-1-ил)

пиразоло[1,5-а]пиримидин-3-карбоксамида;

N-((R)-2,3-дигидроксипропил)-5-((R)-2-(5-фтор-2-метоксифенил)пирролидин-1-ил)

пиразоло[1,5-а]пиримидин-3-карбоксамида;

10 (R)-5-(2-(2,5-дифторфенил)пирролидин-1-ил)-N-(2-метил-1-(метилсульфонамидо)

пропан-2-ил)пиразоло[1,5-а]пиримидин-3-карбоксамида;

(R)-N-(2-амино-2-метилпропил)-5-(2-(2,5-дифторфенил)пирролидин-1-ил)пиразоло

[1,5-а]пиримидин-3-карбоксамида;

(R)-N-*трет*-бутил-5-(4,4-дифтор-2-(3-фторфенил)пирролидин-1-ил)пиразоло[1,5-а]

15 пиримидин-3-карбоксамида;

(R)-5-(2-(2,5-дифторфенил)пирролидин-1-ил)-N-(1,3-дигидрокси-2-метилпропан-2-

ил)пиразоло[1,5-а]пиримидин-3-карбоксамида;

5-((R)-2-(2,5-дифторфенил)пирролидин-1-ил)-N-((3S,4R)-3-фторпиперидин-4-ил)

пиразоло[1,5-а]пиримидин-3-карбоксамида;

20 N-((S)-2,3-дигидроксипропил)-5-((R)-2-(5-фтор-2-(трифторметил)фенил)пирролидин-

1-ил)пиразоло[1,5-а]пиримидин-3-карбоксамида;

N-((R)-2,3-дигидроксипропил)-5-((R)-2-(5-фтор-2-(трифторметил)фенил)пирролидин-

1-ил)пиразоло[1,5-а]пиримидин-3-карбоксамида;

(R)-5-(2-(5-фтор-2-(трифторметил)фенил)пирролидин-1-ил)пиразоло[1,5-а]пиримидин-

25 3-карбоксамида;

(R)-5-(2-(2,5-дифторфенил)пирролидин-1-ил)-N-метоксипиразоло[1,5-а]пиримидин-

3-карбоксамида;

(R)-5-(5-(2,5-дифторфенил)-2,2-диметилпирролидин-1-ил)пиразоло[1,5-а]пиримидин-

3-карбоксамида;

30 (R)-N-циклопропил-5-(5-(2,5-дифторфенил)-2,2-диметилпирролидин-1-ил)пиразоло

[1,5-а]пиримидин-3-карбоксамида;

(R)-N-(2-цианопропан-2-ил)-5-(2-(5-фторпиридин-3-ил)пирролидин-1-ил)пиразоло

[1,5-а]пиримидин-3-карбоксамида;

(R)-5-(2-(5-фторпиридин-3-ил)пирролидин-1-ил)-N-(1-(метилсульфонил)пиперидин-

35 4-ил)пиразоло[1,5-а]пиримидин-3-карбоксамида;

(R)-N-(1-фтор-2-метилпропан-2-ил)-5-(2-(5-фторпиридин-3-ил)пирролидин-1-ил)

пиразоло[1,5-а]пиримидин-3-карбоксамида;

(R)-5-(2-(5-фторпиридин-3-ил)пирролидин-1-ил)-N-(тетрагидро-2H-пиран-4-ил)

пиразоло[1,5-а]пиримидин-3-карбоксамида;

40 (R)-5-(2-(5-фторпиридин-3-ил)пирролидин-1-ил)-N-метоксипиразоло[1,5-а]пиримидин-

3-карбоксамида;

(R)-5-(2-(3-фторфенил)пирролидин-1-ил)пиразоло[1,5-а]пиримидин-3-карбоксамида;

((R)-5-(2-(3-фторфенил)пирролидин-1-ил)-N-метоксипиразоло[1,5-а]пиримидин-3-

карбоксамида;

45 (R)-5-(2-(3-фтор-5-(2-морфолиноэтокси)фенил)пирролидин-1-ил)пиразоло[1,5-а]

пиримидин-3-карбоксамида;

(R)-N-циклопропил-5-(2-(3-фтор-5-(2-метоксиэтокси)фенил)пирролидин-1-ил)пиразол

[1,5-а]пиримидин-3-карбоксамида;

(R)-5-(2-(3-фтор-5-(2-метоксиэтокси)фенил)пирролидин-1-ил)пиразоло[1,5-a]пиримидин-3-карбоксамида;

(R)-N-циклопропил-5-(2-(5-фтор-2-метоксипиридин-3-ил)пирролидин-1-ил)пиразоло[1,5-a]пиримидин-3-карбоксамида;

5 (R)-N-*трет*-бутил-5-(2-(5-фтор-2-метоксипиридин-3-ил)пирролидин-1-ил)пиразоло[1,5-a]пиримидин-3-карбоксамида;

(R)-5-(2-(5-фтор-2-метоксипиридин-3-ил)пирролидин-1-ил)-N-(1-фтор-2-метилпропан-2-ил)пиразоло[1,5-a]пиримидин-3-карбоксамида;

10 (R)-5-(2-(5-фтор-2-метоксипиридин-3-ил)пирролидин-1-ил)пиразоло[1,5-a]пиримидин-3-карбоксамида;

(R)-5-(2-(5-фтор-2-метоксипиридин-3-ил)пирролидин-1-ил)-N-метоксипиразоло[1,5-a]пиримидин-3-карбоксамида;

(R)-1-(5-(2-(2,5-дифторфенил)пирролидин-1-ил)пиразоло[1,5-a]пиримидин-3-карбоксамидо)циклопропанкарбоновой кислоты;

15 (R)-N-циклопропил-5-(2-(3-фтор-5-(2-морфолиноэтокси)фенил)пирролидин-1-ил)пиразоло[1,5-a]пиримидин-3-карбоксамида;

(R)-5-(2-(5-фтор-2-(2-морфолиноэтокси)фенил)пирролидин-1-ил)пиразоло[1,5-a]пиримидин-3-карбоксамида;

20 (R)-N-циклопропил-5-(2-(5-фтор-2-(2-морфолиноэтокси)фенил)пирролидин-1-ил)пиразоло[1,5-a]пиримидин-3-карбоксамида;

5-((R)-2-(2,5-дифторфенил)пирролидин-1-ил)-N-((S)-2,3-дигидроксипропокси)пиразоло[1,5-a]пиримидин-3-карбоксамида;

(R)-5-(2-(5-фтор-2-(2-метоксиэтокси)фенил)пирролидин-1-ил)пиразоло[1,5-a]пиримидин-3-карбоксамида;

25 (R)-N-циклопропил-5-(2-(5-фтор-2-(2-метоксиэтокси)фенил)пирролидин-1-ил)пиразоло[1,5-a]пиримидин-3-карбоксамида;

(R)-5-(2-(5-фторпиридин-3-ил)пирролидин-1-ил)-N-(1-метилциклопропил)пиразоло[1,5-a]пиримидин-3-карбоксамида;

30 (R)-5-(2-(5-фторпиридин-3-ил)пирролидин-1-ил)пиразоло[1,5-a]пиримидин-3-ил)(3-гидрокси-3-метилазетидин-1-ил)метанона;

(R)-5-(2-(5-фторпиридин-3-ил)пирролидин-1-ил)-N-изопропилпиразоло[1,5-a]пиримидин-3-карбоксамида;

(R)-5-(2-(5-фторпиридин-3-ил)пирролидин-1-ил)пиразоло[1,5-a]пиримидин-3-ил)(пирролидин-1-ил)метанона;

35 (R)-N-(5-фторпиридин-2-ил)-5-(2-(5-фторпиридин-3-ил)пирролидин-1-ил)пиразоло[1,5-a]пиримидин-3-карбоксамида;

(R)-5-(2-(5-фторпиридин-3-ил)пирролидин-1-ил)пиразоло[1,5-a]пиримидин-3-ил)(3-метоксиазетидин-1-ил)метанона;

40 N-(3-хлор-2-фторпропил)-5-((R)-2-(5-фторпиридин-3-ил)пирролидин-1-ил)пиразоло[1,5-a]пиримидин-3-карбоксамида;

(R)-5-(2-(5-фторпиридин-3-ил)пирролидин-1-ил)-N-(1-(трифторметил)циклопропил)пиразоло[1,5-a]пиримидин-3-карбоксамида;

5-((R)-2-(5-фторпиридин-3-ил)пирролидин-1-ил)-N-((транс)-4-гидроксициклогексил)пиразоло[1,5-a]пиримидин-3-карбоксамида;

45 5-((R)-2-(5-фторпиридин-3-ил)пирролидин-1-ил)-N-((цис)-4-гидроксициклогексил)пиразоло[1,5-a]пиримидин-3-карбоксамида;

(R)-N-циклобутил-5-(2-(5-фторпиридин-3-ил)пирролидин-1-ил)пиразоло[1,5-a]пиримидин-3-карбоксамида;

(R)-5-(2-(5-фторпиридин-3-ил)пирролидин-1-ил)-N-(1-метилциклобутил)пиразоло[1,5-а]пиримидин-3-карбоксамида;

5-(R)-2-(5-фторпиридин-3-ил)пирролидин-1-ил)-N-((1S,2S)-2-гидроксициклопентил)пиразоло[1,5-а]пиримидин-3-карбоксамида;

5 5-(R)-2-(5-фторпиридин-3-ил)пирролидин-1-ил)-N-((1S,2R)-2-гидроксициклопентил)пиразоло[1,5-а]пиримидин-3-карбоксамида;

5-(R)-2-(5-фторпиридин-3-ил)пирролидин-1-ил)-N-((1S,3S)-3-гидроксициклопентил)пиразоло[1,5-а]пиримидин-3-карбоксамида;

10 (R)-N-(циклопропилметил)-5-(2-(5-фторпиридин-3-ил)пирролидин-1-ил)пиразоло[1,5-а]пиримидин-3-карбоксамида;

(R)-5-(2-(5-фторпиридин-3-ил)пирролидин-1-ил)-N-(1-(гидроксиметил)циклопропил)пиразоло[1,5-а]пиримидин-3-карбоксамида;

(R)-5-(2-(5-фторпиридин-3-ил)пирролидин-1-ил)пиразоло[1,5-а]пиримидин-3-ил)(3-гидроксиазетидин-1-ил)метанона;

15 5-(R)-2-(5-фторпиридин-3-ил)пирролидин-1-ил)-N-((S)-2-гидроксипропил)пиразоло[1,5-а]пиримидин-3-карбоксамида;

5-(R)-2-(5-фторпиридин-3-ил)пирролидин-1-ил)-N-((R)-2-гидроксипропил)пиразоло[1,5-а]пиримидин-3-карбоксамида;

20 (R)-5-(2-(5-фторпиридин-3-ил)пирролидин-1-ил)-N-(2-гидрокси-2-метилпропил)пиразоло[1,5-а]пиримидин-3-карбоксамида;

(R)-5-(2-(5-фторпиридин-3-ил)пирролидин-1-ил)-N-(2-гидроксиэтил)пиразоло[1,5-а]пиримидин-3-карбоксамида;

N-(1-циклопропилэтил)-5-(R)-2-(5-фторпиридин-3-ил)пирролидин-1-ил)пиразоло[1,5-а]пиримидин-3-карбоксамида;

25 (R)-5-(2-(5-фторпиридин-3-ил)пирролидин-1-ил)-N-метилпиразоло[1,5-а]пиримидин-3-карбоксамида;

5-(R)-2-(5-фторпиридин-3-ил)пирролидин-1-ил)-N-((R)-1-гидроксипропан-2-ил)пиразоло[1,5-а]пиримидин-3-карбоксамида;

30 5-(R)-2-(5-фторпиридин-3-ил)пирролидин-1-ил)-N-((S)-1-гидроксипропан-2-ил)пиразоло[1,5-а]пиримидин-3-карбоксамида;

(R)-5-(2-(5-фторпиридин-3-ил)пирролидин-1-ил)пиразоло[1,5-а]пиримидин-3-карбоксамида;

5-(R)-2-(5-фторпиридин-3-ил)пирролидин-1-ил)-N-(1-метоксипропан-2-ил)пиразоло[1,5-а]пиримидин-3-карбоксамида;

35 5-(R)-2-(5-фторпиридин-3-ил)пирролидин-1-ил)-N-(2-гидрокси-3-метоксипропил)пиразоло[1,5-а]пиримидин-3-карбоксамида;

5-(R)-2-(5-фторпиридин-3-ил)пирролидин-1-ил)-N-((транс)-2-гидроксициклопентил)пиразоло[1,5-а]пиримидин-3-карбоксамида;

40 5-(R)-2-(5-фторпиридин-3-ил)пирролидин-1-ил)-N-((S)-1-гидрокси-3-метилбутан-2-ил)пиразоло[1,5-а]пиримидин-3-карбоксамида;

5-(R)-2-(5-фторпиридин-3-ил)пирролидин-1-ил)-N-((R)-1-гидрокси-3-метилбутан-2-ил)пиразоло[1,5-а]пиримидин-3-карбоксамида;

N-((R)-1-циклопропилэтил)-5-((R)-2-(5-фторпиридин-3-ил)пирролидин-1-ил)пиразоло[1,5-а]пиримидин-3-карбоксамида;

45 N-((S)-1-циклопропилэтил)-5-((R)-2-(5-фторпиридин-3-ил)пирролидин-1-ил)пиразоло[1,5-а]пиримидин-3-карбоксамида;

(R)-5-(2-(5-фторпиридин-3-ил)пирролидин-1-ил)-N-(3-гидрокси-2,2-диметилпропил)пиразоло[1,5-а]пиримидин-3-карбоксамида;

(R)-азетидин-1-ил(5-(2-(5-фторпиридин-3-ил)пирролидин-1-ил)пиразоло[1,5-a]пиримидин-3-ил)метанона;

(R)-(5-(2-(5-фторпиридин-3-ил)пирролидин-1-ил)пиразоло[1,5-a]пиримидин-3-ил)(3-(гидроксиметил)азетидин-1-ил)метанона;

5 (5-((R)-2-(5-фторпиридин-3-ил)пирролидин-1-ил)пиразоло[1,5-a]пиримидин-3-ил)((S)-3-гидроксипирролидин-1-ил)метанона;

5-((R)-2-(5-фторпиридин-3-ил)пирролидин-1-ил)-N-((R)-1,1,1-трифторпропан-2-ил)пиразоло[1,5-a]пиримидин-3-карбоксамида;

10 5-((R)-2-(5-фторпиридин-3-ил)пирролидин-1-ил)-N-((S)-1,1,1-трифторпропан-2-ил)пиразоло[1,5-a]пиримидин-3-карбоксамида;

(R)-5-(2-(5-фторпиридин-3-ил)пирролидин-1-ил)-N-(2,2,2-трифторэтил)пиразоло[1,5-a]пиримидин-3-карбоксамида;

(R)-5-(2-(5-фторпиридин-3-ил)пирролидин-1-ил)-N-(1-гидрокси-2-метилпропан-2-ил)пиразоло[1,5-a]пиримидин-3-карбоксамида;

15 5-((R)-2-(5-фторпиридин-3-ил)пирролидин-1-ил)-N-((1R,2R)-2-гидроксициклопентил)пиразоло[1,5-a]пиримидин-3-карбоксамида;

(R)-N-(2,2-дифторэтил)-5-(2-(5-фторпиридин-3-ил)пирролидин-1-ил)пиразоло[1,5-a]пиримидин-3-карбоксамида;

20 5-((R)-2-(5-фторпиридин-3-ил)пирролидин-1-ил)-N-((1R,2S)-2-гидроксициклопентил)пиразоло[1,5-a]пиримидин-3-карбоксамида;

5-((R)-2-(5-фторпиридин-3-ил)пирролидин-1-ил)-N-((1R,2R)-2-гидроксициклогексил)пиразоло[1,5-a]пиримидин-3-карбоксамида;

(R)-(5-(2-(5-фторпиридин-3-ил)пирролидин-1-ил)пиразоло[1,5-a]пиримидин-3-ил)(пиперидин-1-ил)метанона;

25 5-((R)-2-(5-фторпиридин-3-ил)пирролидин-1-ил)-N-((2R,3S,4S)-3-(гидроксиметил)бицикло[2,2,1]гептан-2-ил)пиразоло[1,5-a]пиримидин-3-карбоксамида;

(R)-(5-(2-(5-фтор-2-метоксипиридин-3-ил)пирролидин-1-ил)пиразоло[1,5-a]пиримидин-3-ил)(3-гидроксиазетидин-1-ил)метанона;

30 5-((R)-2-(5-фтор-2-метоксипиридин-3-ил)пирролидин-1-ил)-N-((транс)-4-гидроксициклогексил)пиразоло[1,5-a]пиримидин-3-карбоксамида;

(R)-*трет*-бутил-3-(5-(2-(5-фтор-2-метоксипиридин-3-ил)пирролидин-1-ил)пиразоло[1,5-a]пиримидин-3-карбоксамида)пропилкарбамата;

(R)-N-(3-аминопропил)-5-(2-(5-фтор-2-оксо-1,2-дигидропиридин-3-ил)пирролидин-1-ил)пиразоло[1,5-a]пиримидин-3-карбоксамида;

35 N-((S)-2,3-дигидроксипропил)-5-((R)-2-(5-фтор-2-метоксипиридин-3-ил)пирролидин-1-ил)пиразоло[1,5-a]пиримидин-3-карбоксамида;

N-((S)-3-хлор-2-гидроксипропил)-5-((R)-2-(5-фтор-2-метоксипиридин-3-ил)пирролидин-1-ил)пиразоло[1,5-a]пиримидин-3-карбоксамида;

40 N-((R)-3-хлор-2-гидроксипропил)-5-((R)-2-(5-фтор-2-метоксипиридин-3-ил)пирролидин-1-ил)пиразоло[1,5-a]пиримидин-3-карбоксамида;

(R)-N-(2-хлорэтокси)-5-(2-(5-фтор-2-метоксипиридин-3-ил)пирролидин-1-ил)пиразоло[1,5-a]пиримидин-3-карбоксамида;

(R)-(5-(2-(5-фтор-2-метоксипиридин-3-ил)пирролидин-1-ил)пиразоло[1,5-a]пиримидин-3-ил)(3-гидрокси-3-метилазетидин-1-ил)метанона;

45 (R)-5-(2-(5-фтор-2-метоксипиридин-3-ил)пирролидин-1-ил)-N-(3-гидроксипропил)пиразоло[1,5-a]пиримидин-3-карбоксамида;

N-(2,3-дигидроксипропил)-5-((R)-2-(5-фтор-2-метоксипиридин-3-ил)пирролидин-1-ил)пиразоло[1,5-a]пиримидин-3-карбоксамида;

N-((R)-2,3-дигидроксипропил)-5-((R)-2-(5-фтор-2-метоксипиридин-3-ил)пирролидин-1-ил)пиразоло[1,5-а]пиримидин-3-карбоксамида;

(R)-5-(2-(5-фтор-2-метоксипиридин-3-ил)пирролидин-1-ил)-N-(4-гидроксибутил)пиразоло[1,5-а]пиримидин-3-карбоксамида;

5 (R)-N-(2-*трет*-бутоксизтокси)-5-(2-(5-фтор-2-метоксипиридин-3-ил)пирролидин-1-ил)пиразоло[1,5-а]пиримидин-3-карбоксамида;

(R)-5-(2-(5-фтор-2-метоксипиридин-3-ил)пирролидин-1-ил)-N-метилпиразоло[1,5-а]пиримидин-3-карбоксамида;

10 5-((R)-2-(5-фтор-2-метоксипиридин-3-ил)пирролидин-1-ил)-N-((1S,3S)-3-гидроксициклопентил)пиразоло[1,5-а]пиримидин-3-карбоксамида;

(R)-5-(2-(5-фтор-2-метоксипиридин-3-ил)пирролидин-1-ил)-N-(2-гидроксиэтил)пиразоло[1,5-а]пиримидин-3-карбоксамида;

5-((R)-2-(5-фтор-2-метоксипиридин-3-ил)пирролидин-1-ил)-N-((S)-2-гидроксипропил)пиразоло[1,5-а]пиримидин-3-карбоксамида;

15 5-((R)-2-(5-фтор-2-метоксипиридин-3-ил)пирролидин-1-ил)-N-((R)-2-гидроксипропил)пиразоло[1,5-а]пиримидин-3-карбоксамида;

(R)-5-(2-(5-фтор-2-метоксипиридин-3-ил)пирролидин-1-ил)-N-(2-гидрокси-2-метилпропил)пиразоло[1,5-а]пиримидин-3-карбоксамида;

20 (R)-N-(1,3-дигидроксипропан-2-ил)-5-(2-(5-фтор-2-метоксипиридин-3-ил)пирролидин-1-ил)пиразоло[1,5-а]пиримидин-3-карбоксамида;

(R)-5-(2-(5-фтор-2-метоксипиридин-3-ил)пирролидин-1-ил)-N-(6-оксо-1,6-дигидропиридин-3-ил)пиразоло[1,5-а]пиримидин-3-карбоксамида;

R)-5-(2-(5-фтор-2-метоксипиридин-3-ил)пирролидин-1-ил)-N-(1-(метилсульфонил)пиперидин-4-ил)пиразоло[1,5-а]пиримидин-3-карбоксамида;

25 (R)-N-(2-хлорэтил)-5-(2-(5-фтор-2-метоксипиридин-3-ил)пирролидин-1-ил)пиразоло[1,5-а]пиримидин-3-карбоксамида;

(R)-N-(2-бромэтокси)-5-(2-(5-фтор-2-метоксипиридин-3-ил)пирролидин-1-ил)пиразоло[1,5-а]пиримидин-3-карбоксамида;

30 5-(2-(2,5-дифторфенил)пирролидин-1-ил)-N-(2-гидроксиэтил)пиразоло[1,5-а]пиримидин-3-карбоксамида;

5-((R)-2-(2,5-дифторфенил)пирролидин-1-ил)-N-(2-гидроксипропил)пиразоло[1,5-а]пиримидин-3-карбоксамида;

5-((R)-2-(2,5-дифторфенил)пирролидин-1-ил)-N-(2-гидроксипропил)пиразоло[1,5-а]пиримидин-3-карбоксамида;

35 5-((R)-2-(2,5-дифторфенил)пирролидин-1-ил)-N-(3-гидрокси-2,2-диметилпропил)пиразоло[1,5-а]пиримидин-3-карбоксамида;

5-((R)-2-(2,5-дифторфенил)пирролидин-1-ил)-N-((1S,3S)-3-гидроксициклопентил)пиразоло[1,5-а]пиримидин-3-карбоксамида;

40 5-((R)-2-(2,5-дифторфенил)пирролидин-1-ил)-N-(2-(4-гидроксипиперидин-1-ил)этил)пиразоло[1,5-а]пиримидин-3-карбоксамида;

5-((R)-2-(2,5-дифторфенил)пирролидин-1-ил)-N-(2-(4-метилпиперазин-1-ил)этил)пиразоло[1,5-а]пиримидин-3-карбоксамида;

5-((R)-2-(2,5-дифторфенил)пирролидин-1-ил)-N-(2-метоксиэтил)пиразоло[1,5-а]пиримидин-3-карбоксамида;

45 5-((R)-2-(2,5-дифторфенил)пирролидин-1-ил)-N-(1,3-дигидроксипропан-2-ил)пиразоло[1,5-а]пиримидин-3-карбоксамида;

5-((R)-2-(2,5-дифторфенил)пирролидин-1-ил)-N-((2S,3R)-1,3-дигидроксибутан-2-ил)пиразоло[1,5-а]пиримидин-3-карбоксамида;

5-((R)-2-(2,5-дифторфенил)пирролидин-1-ил)-N-((2S,3S)-1,3-дигидроксипутан-2-ил)пиразоло[1,5-а]пиримидин-3-карбоксамида;

5-((R)-2-(2,5-дифторфенил)пирролидин-1-ил)-N-((2R,3S)-1,3-дигидроксипутан-2-ил)пиразоло[1,5-а]пиримидин-3-карбоксамида;

5-((R)-2-(2,5-дифторфенил)пирролидин-1-ил)-N-((S)-1-гидроксипропан-2-ил)пиразоло[1,5-а]пиримидин-3-карбоксамида;

5-((R)-2-(2,5-дифторфенил)пирролидин-1-ил)-N-((S)-1-гидроксипутан-2-ил)пиразоло[1,5-а]пиримидин-3-карбоксамида;

5-((R)-2-(2,5-дифторфенил)пирролидин-1-ил)-N-((S)-1-гидрокси-3-метилбутан-2-ил)пиразоло[1,5-а]пиримидин-3-карбоксамида;

5-((R)-2-(2,5-дифторфенил)пирролидин-1-ил)-N-((S)-1-гидрокси-3,3-диметилбутан-2-ил)пиразоло[1,5-а]пиримидин-3-карбоксамида;

N-циклопропил-5-(2-(5-фтор-2-метилпиридин-3-ил)пирролидин-1-ил)пиразоло[1,5-а]пиримидин-3-карбоксамида;

N-циклопропил-5-(2-(2-этил-5-фторпиридин-3-ил)пирролидин-1-ил)пиразоло[1,5-а]пиримидин-3-карбоксамида;

(R)-N-трет-бутил-5-(2-(5-фтор-2-метилпиридин-3-ил)пирролидин-1-ил)пиразоло[1,5-а]пиримидин-3-карбоксамида;

(R)-5-(2-(5-фтор-2-метилпиридин-3-ил)пирролидин-1-ил)-N-изопропилпиразоло[1,5-а]пиримидин-3-карбоксамида;

(R)-N-циклобутил-5-(2-(5-фтор-2-метилпиридин-3-ил)пирролидин-1-ил)пиразоло[1,5-а]пиримидин-3-карбоксамида;

(R)-5-(2-(5-фтор-2-метилпиридин-3-ил)пирролидин-1-ил)-N-метилпиразоло[1,5-а]пиримидин-3-карбоксамида;

(R)-5-(2-(5-фтор-2-метилпиридин-3-ил)пирролидин-1-ил)пиразоло[1,5-а]пиримидин-3-карбоксамида;

(R)-5-(2-(5-фтор-2-метилпиридин-3-ил)пирролидин-1-ил)-N-(2-гидроксиэтил)пиразоло[1,5-а]пиримидин-3-карбоксамида;

(R)-5-(2-(5-фтор-2-метилпиридин-3-ил)пирролидин-1-ил)-N-((R)-2-гидроксипропил)пиразоло[1,5-а]пиримидин-3-карбоксамида;

(R)-5-(2-(5-фтор-2-метилпиридин-3-ил)пирролидин-1-ил)-N-(1-метилциклопропил)пиразоло[1,5-а]пиримидин-3-карбоксамида;

(R)-5-(2-(5-фтор-2-метилпиридин-3-ил)пирролидин-1-ил)-N-(2-метоксиэтил)пиразоло[1,5-а]пиримидин-3-карбоксамида;

(R)-5-(2-(5-фтор-2-метилпиридин-3-ил)пирролидин-1-ил)пиразоло[1,5-а]пиримидин-3-ил)(3-гидроксиазетидин-1-ил)метанона;

(R)-5-(2-(5-фтор-2-метилпиридин-3-ил)пирролидин-1-ил)-N-(1-(гидроксиметил)циклопропил)пиразоло[1,5-а]пиримидин-3-карбоксамида;

5-((R)-2-(5-фтор-2-метилпиридин-3-ил)пирролидин-1-ил)-N-((транс)-4-гидроксициклогексил)пиразоло[1,5-а]пиримидин-3-карбоксамида;

5-((R)-2-(5-фтор-2-метилпиридин-3-ил)пирролидин-1-ил)-N-((цис)-4-гидроксициклогексил)пиразоло[1,5-а]пиримидин-3-карбоксамида;

5-((R)-2-(5-фтор-2-метилпиридин-3-ил)пирролидин-1-ил)-N-((1S,3S)-3-гидроксициклопентил)пиразоло[1,5-а]пиримидин-3-карбоксамида;

5-((R)-2-(5-фтор-2-метилпиридин-3-ил)пирролидин-1-ил)-N-((1R,2R)-2-гидроксициклопентил)пиразоло[1,5-а]пиримидин-3-карбоксамида;

5-((R)-2-(5-фтор-2-метилпиридин-3-ил)пирролидин-1-ил)-N-((R)-хинуклидин-3-ил)пиразоло[1,5-а]пиримидин-3-карбоксамида;

5-((R)-2-(2-этил-5-фторпиридин-3-ил)пирролидин-1-ил)-N-((транс)-4-гидроксициклогексил)пиразоло[1,5-а]пиримидин-3-карбоксамида;

5-((R)-2-(2-этил-5-фторпиридин-3-ил)пирролидин-1-ил)-N-((1S,3S)-3-гидроксициклопентил)пиразоло[1,5-а]пиримидин-3-карбоксамида;

5 (R)-5-(2-(2-этил-5-фторпиридин-3-ил)пирролидин-1-ил)-N-(2-гидрокси-2-метилпропил)пиразоло[1,5-а]пиримидин-3-карбоксамида;

(R)-N-трет-бутил-5-(2-(5-фтор-2-оксо-1,2-дигидропиридин-3-ил)пирролидин-1-ил)пиразоло[1,5-а]пиримидин-3-карбоксамида;

10 (R)-N-(2-хлорэтил)-5-(2-(5-фтор-2-оксо-1,2-дигидропиридин-3-ил)пирролидин-1-ил)пиразоло[1,5-а]пиримидин-3-карбоксамида;

N-циклопропил-5-((2R)-2-(2-((2,2-диметил-1,3-диоксолан-4-ил)метокси)-5-фторфенил)пирролидин-1-ил)пиразоло[1,5-а]пиримидин-3-карбоксамида;

5-((2R)-2-(2-((2,2-диметил-1,3-диоксолан-4-ил)метокси)-5-фторфенил)пирролидин-1-ил)пиразоло[1,5-а]пиримидин-3-карбоксамида;

15 N-циклопропил-5-((2R)-2-(3-((2,2-диметил-1,3-диоксолан-4-ил)метокси)-5-фторфенил)пирролидин-1-ил)пиразоло[1,5-а]пиримидин-3-карбоксамида;

5-((2R)-2-(3-((2,2-диметил-1,3-диоксолан-4-ил)метокси)-5-фторфенил)пирролидин-1-ил)пиразоло[1,5-а]пиримидин-3-карбоксамида;

20 N-циклопропил-5-((2R)-2-(3-(2,3-дигидроксипропокси)-5-фторфенил)пирролидин-1-ил)пиразоло[1,5-а]пиримидин-3-карбоксамида;

5-((2R)-2-(3-(2,3-дигидроксипропокси)-5-фторфенил)пирролидин-1-ил)пиразоло[1,5-а]пиримидин-3-карбоксамида;

N-циклопропил-5-((2R)-2-(2-(2,3-дигидроксипропокси)-5-фторфенил)пирролидин-1-ил)пиразоло[1,5-а]пиримидин-3-карбоксамида;

25 5-((2R)-2-(2-(2,3-дигидроксипропокси)-5-фторфенил)пирролидин-1-ил)пиразоло[1,5-а]пиримидин-3-карбоксамида;

5-((2R,5S)-2-(5-фторпиридин-3-ил)-5-(гидроксиметил)пирролидин-1-ил)-N-((R)-1,1,1-трифторпропан-2-ил)пиразоло[1,5-а]пиримидин-3-карбоксамида;

30 5-((2R,5S)-2-(5-фторпиридин-3-ил)-5-(гидроксиметил)пирролидин-1-ил)-N-((S)-1,1,1-трифторпропан-2-ил)пиразоло[1,5-а]пиримидин-3-карбоксамида;

5-((2R,5S)-2-(5-фторпиридин-3-ил)-5-(гидроксиметил)пирролидин-1-ил)-N-(1-метилциклопропил)пиразоло[1,5-а]пиримидин-3-карбоксамида;

5-((2R,5S)-2-(5-фторпиридин-3-ил)-5-(гидроксиметил)пирролидин-1-ил)-N-изопропилпиразоло[1,5-а]пиримидин-3-карбоксамида;

35 5-((2R,4S)-2-(3-фторфенил)-4-гидроксипирролидин-1-ил)-N-((S)-1,1,1-трифторпропан-2-ил)пиразоло[1,5-а]пиримидин-3-карбоксамида;

5-((2R,4S)-2-(3-фторфенил)-4-гидроксипирролидин-1-ил)-N-изопропилпиразоло[1,5-а]пиримидин-3-карбоксамида;

40 5-((2R,4S)-2-(3-фторфенил)-4-гидроксипирролидин-1-ил)-N-метилпиразоло[1,5-а]пиримидин-3-карбоксамида;

5-((2S,5R)-5-(5-фторпиридин-3-ил)-2-(гидроксиметил)-2-метилпирролидин-1-ил)-N-изопропилпиразоло[1,5-а]пиримидин-3-карбоксамида;

5-((2S,5R)-5-(5-фторпиридин-3-ил)-2-(гидроксиметил)-2-метилпирролидин-1-ил)-N-((S)-1,1,1-трифторпропан-2-ил)пиразоло[1,5-а]пиримидин-3-карбоксамида;

45 (R)-5-(2-(2-амино-5-фторпиридин-3-ил)пирролидин-1-ил)пиразоло[1,5-а]пиримидин-3-ил)(азетидин-1-ил)метанона;

(R)-трет-бутил-3-(5-(2-(2-хлор-5-фторпиридин-3-ил)пирролидин-1-ил)пиразоло[1,5-а]пиримидин-3-карбоксамида)пропилкарбамата;

(R)-N-(3-аминопропил)-5-(2-(2-хлор-5-фторпиридин-3-ил)пирролидин-1-ил)пиразоло[1,5-а]пиримидин-3-карбоксамида;

(R)-N-(2-*трет*-бутоксизтокси)-5-(2-(2-хлор-5-фторпиридин-3-ил)пирролидин-1-ил)пиразоло[1,5-а]пиримидин-3-карбоксамида;

5 (R)-5-(2-(2-хлор-5-фторпиридин-3-ил)пирролидин-1-ил)-N-(2-гидроксизтокси)пиразоло[1,5-а]пиримидин-3-карбоксамида;

(R)-N-*трет*-бутил-5-(2-(5-фтор-1-метил-2-оксо-1,2-дигидропиридин-3-ил)пирролидин-1-ил)пиразоло[1,5-а]пиримидин-3-карбоксамида;

10 (R)-5-(2-(5-фтор-1-метил-2-оксо-1,2-дигидропиридин-3-ил)пирролидин-1-ил)-N-изопропилпиразоло[1,5-а]пиримидин-3-карбоксамида;

(R)-N-циклопропил-5-(2-(5-фтор-1-метил-2-оксо-1,2-дигидропиридин-3-ил)пирролидин-1-ил)пиразоло[1,5-а]пиримидин-3-карбоксамида;

(R)-5-(2-(5-фтор-1-метил-2-оксо-1,2-дигидропиридин-3-ил)пирролидин-1-ил)-N-(6-метилпиридин-3-ил)пиразоло[1,5-а]пиримидин-3-карбоксамида;

15 (R)-N-циклобутил-5-(2-(5-фтор-1-метил-2-оксо-1,2-дигидропиридин-3-ил)пирролидин-1-ил)пиразоло[1,5-а]пиримидин-3-карбоксамида;

(R)-5-(2-(5-фтор-1-метил-2-оксо-1,2-дигидропиридин-3-ил)пирролидин-1-ил)-N-(пиридин-3-ил)пиразоло[1,5-а]пиримидин-3-карбоксамида;

20 (R)-N-(циклопропилметил)-5-(2-(5-фтор-1-метил-2-оксо-1,2-дигидропиридин-3-ил)пирролидин-1-ил)пиразоло[1,5-а]пиримидин-3-карбоксамида;

5-((R)-2-(5-фтор-1-метил-2-оксо-1,2-дигидропиридин-3-ил)пирролидин-1-ил)-N-((S)-1-гидрокси-3,3-диметилбутан-2-ил)пиразоло[1,5-а]пиримидин-3-карбоксамида;

5-((R)-2-(5-фтор-1-метил-2-оксо-1,2-дигидропиридин-3-ил)пирролидин-1-ил)-N-((1R,2R)-2-гидроксициклогексил)пиразоло[1,5-а]пиримидин-3-карбоксамида;

25 N-((R)-1-циклопропилэтил)-5-((R)-2-(5-фтор-1-метил-2-оксо-1,2-дигидропиридин-3-ил)пирролидин-1-ил)пиразоло[1,5-а]пиримидин-3-карбоксамида;

N-((S)-1-циклопропилэтил)-5-((R)-2-(5-фтор-1-метил-2-оксо-1,2-дигидропиридин-3-ил)пирролидин-1-ил)пиразоло[1,5-а]пиримидин-3-карбоксамида;

30 (R)-5-(2-(5-фтор-1-метил-2-оксо-1,2-дигидропиридин-3-ил)пирролидин-1-ил)-N-(1-метилциклопропил)пиразоло[1,5-а]пиримидин-3-карбоксамида;

5-((R)-2-(5-фтор-1-метил-2-оксо-1,2-дигидропиридин-3-ил)пирролидин-1-ил)-N-((транс)-4-гидроксициклогексил)пиразоло[1,5-а]пиримидин-3-карбоксамида;

(R)-5-(2-(5-фтор-1-метил-2-оксо-1,2-дигидропиридин-3-ил)пирролидин-1-ил)-N-(5-фторпиридин-2-ил)пиразоло[1,5-а]пиримидин-3-карбоксамида;

35 (R)-5-(2-(5-фтор-2-метоксипиридин-3-ил)пирролидин-1-ил)-N-(3-метил-1H-пиразол-5-ил)пиразоло[1,5-а]пиримидин-3-карбоксамида;

(R)-5-(2-(5-фтор-2-метоксипиридин-3-ил)пирролидин-1-ил)-N-(1-метил-1H-пиразол-3-ил)пиразоло[1,5-а]пиримидин-3-карбоксамида;

40 (R)-N-(3-циклопропил-1H-пиразол-5-ил)-5-(2-(5-фтор-2-метоксипиридин-3-ил)пирролидин-1-ил)пиразоло[1,5-а]пиримидин-3-карбоксамида;

(R)-N-(3-этил-1H-пиразол-5-ил)-5-(2-(5-фтор-2-метоксипиридин-3-ил)пирролидин-1-ил)пиразоло[1,5-а]пиримидин-3-карбоксамида; и

45 (R)-5-(2-(5-фтор-2-метоксипиридин-3-ил)пирролидин-1-ил)-N-(1-изопропил-1H-пиразол-3-ил)пиразоло[1,5-а]пиримидин-3-карбоксамида или их фармацевтически приемлемых солей.

В некоторых вариантах осуществления, ингибитор Trk выбран из группы, состоящей из:

5-фтор-2-[[[(1S)-1-(5-фтор-2-пиридил)этил]амино]-6-[(5-изопропокси-1H-пиразол-3-

ил)амино]пиридин-3-карбонитрила; ((2E)-3-[3,5-бис(1,1-диметилэтил)-4-гидроксифенил]-2-циано-2-пропентиоамида);

2,2-дихлор-N-[3-[(7-хлорхинолин-4-ил)амино]пропил]-N-метилацетамида;

N-[3-[[2,3-дигидро-2-оксо-3-(1H-пиррол-2-илметил)-1H-индол-6-ил]амино]-4-метилфенил]-N'-[2-фтор-5-(трифторметил)фенил]-мочевины;

(S)-5-хлор-N²-(1-(5-фторпиримидин-2-ил)этил)-N⁴-(5-изопропокси-1H-пиразол-3-ил)пиримидин-(S)-N-(1-(5-фторпиримидин-2-ил)этил)-3-(5-изопропокси-1H-пиразол-3-ил)-3H-имидазо[4,5-b]пиридин-5-амин,4-диамина;

5,6,7,13-тетрагидро-13-метил-5-оксо-12H-индоло[2,3-a]пирроло[3,4-c]карбазол-12-пропаннитрила;

1,3-дигидро-3-[(1-метил-1H-индол-3-ил)метил]-2H-пирроло[3,2-b]пиридин-2-она; или их фармацевтически приемлемых солей.

В некоторых вариантах осуществления, ингибитор Trk выбран из группы, состоящей из:

(2R)-2-({4-[(5-циклопропил-1H-пиразол-3-ил)амино]-5-фторпиримидин-2-ил}амино)-2-(4-фторфенил)этанола;

5-бром-N⁴-(3-циклопропил-1H-пиразол-5-ил)-N²-[(1S)-1-(4-фторфенил)этил]пиримидин-2,4-диамина;

(2R)-2-({5-хлор-4-[(3-циклопропил-1H-пиразол-5-ил)амино]пиримидин-2-ил}амино)-2-(4-фторфенил)этанола;

(2R)-2-({5-хлор-4-[(3-изопропокси-1H-пиразол-5-ил)амино]пиримидин-2-ил}амино)-2-(4-фторфенил)этанола;

(3S)-3-({5-хлор-4-[(5-циклопропил-1H-пиразол-3-ил)амино]пиримидин-2-ил}амино)-3-(4-фторфенил)-N-метилпропанамида;

2-({5-хлор-2-({[(1S)-1-(4-фторфенил)этил]амино}-6-[(5-изопропокси-1H-пиразол-3-ил)амино]пиримидин-4-ил}амино)пропан-1,3-диола;

2-[(5-хлор-6-[(3-циклопропил-1H-пиразол-5-ил)амино]-2-({[(1S)-1-(4-фторфенил)этил]амино]пиримидин-4-ил}амино)пропан-1,3-диола;

5-хлор-N⁴-(5-циклопропил-1H-пиразол-3-ил)-N²-[(1S)-(4-фтор-фенил)-этил]-6-(4-метил-пиперазин-1-ил)-пиримидин-2,4-диамина;

(2R)-2-({4-[(5-циклопропил-1H-пиразол-3-ил)амино]-7-фторхиназолин-2-ил}амино)-2-(4-фторфенил)этанола; и

2-[(5-хлор-6-[(5-циклопропил-1H-пиразол-3-ил)амино]-2-({[(1R)-1-(4-фторфенил)-2-гидроксиэтил]амино}пиримидин-4-ил)амино)пропан-1,3-диола;

или их фармацевтически приемлемых солей.

В некоторых вариантах осуществления, ингибитор Trk выбран из группы, состоящей из:

1-(3-*трет*-бутил-1-фенил-1H-пиразол-5-ил)-3-(транс-1-(2-метоксиэтил)-4-фенилпирролидин-3-ил)мочевины;

гидрохлорида 1-(3-*трет*-бутил-1-п-толил-1H-пиразол-5-ил)-3-(транс-1-(2-метоксиэтил)-4-фенилпирролидин-3-ил)мочевины;

транс-1-(4-(3,4-дифторфенил)-1-(2-метоксиэтил)пирролидин-3-ил)-3-(2-фенил-2,4,5,6-тетрагидроциклопента[с]пиразол-3-ил)мочевины;

транс-1-(4-(3,4-дифторфенил)-1-(2-метоксиэтил)пирролидин-3-ил)-3-(3-изопропил-1-фенил-1H-пиразол-5-ил)мочевины;

1-(3-*трет*-бутил-1-метил-1H-пиразол-5-ил)-3-(транс-1-(2-метоксиэтил)-4-фенилпирролидин-3-ил)мочевины;

1-(1,3-диметил-1H-пиразол-5-ил)-3-(транс-1-(2-метоксиэтил)-4-фенилпирролидин-3-

ил)мочевины;

1-(3- *трет*-бутил-1-(пиридин-3-ил)-1Н-пиразол-5-ил)-3-(транс-1-(2-метоксиэтил)-4-фенилпирролидин-3-ил)мочевины;

1-(3- *трет*-бутил-1-(4-фторфенил)-1Н-пиразол-5-ил)-3-(транс-1-(2-метоксиэтил)-4-фенилпирролидин-3-ил)мочевины;

1-(3-циклопропил-1-фенил-1Н-пиразол-5-ил)-3-(транс-1-(2-метоксиэтил)-4-фенилпирролидин-3-ил)мочевины;

1-(1,3-дифенил-1Н-пиразол-5-ил)-3-(транс-1-(2-метоксиэтил)-4-фенилпирролидин-3-ил)мочевины;

1-(транс-1-(2-метоксиэтил)-4-фенилпирролидин-3-ил)-3-(3-метил-1-фенил-1Н-пиразол-5-ил)мочевины;

1-(3-изопропил-1-фенил-1Н-пиразол-5-ил)-3-(транс-1-(2-метоксиэтил)-4-фенилпирролидин-3-ил)мочевины;

1-(транс-1-(2-метоксиэтил)-4-фенилпирролидин-3-ил)-3-(1-метил-3-фенил-1Н-пиразол-5-ил)мочевины;

1-(транс-1-(2-метоксиэтил)-4-фенилпирролидин-3-ил)-3-(2-фенил-2,4,5,6-тетрагидроциклопента[с]пиразол-3-ил)мочевины;

1-(транс-1-(2-метоксиэтил)-4-фенилпирролидин-3-ил)-3-(1-фенил-1Н-пиразол-5-ил)мочевины;

1-(3- *трет*-бутил-1-(2-фторфенил)-1Н-пиразол-5-ил)-3-(транс-1-(2-метоксиэтил)-4-фенилпирролидин-3-ил)мочевины;

1-(3- *трет*-бутил-1-(3-фторфенил)-1Н-пиразол-5-ил)-3-(транс-1-(2-метоксиэтил)-4-фенилпирролидин-3-ил)мочевины;

1-(3,4-диметил-1-фенил-1Н-пиразол-5-ил)-3-(транс-1-(2-метоксиэтил)-4-фенилпирролидин-3-ил)мочевины;

1-(транс-1-(2-метоксиэтил)-4-фенилпирролидин-3-ил)-3-(2-(пиридин-3-ил)-2,4,5,6-тетрагидроциклопента[с]пиразол-3-ил)мочевины;

1-(транс-1-(2-метоксиэтил)-4-фенилпирролидин-3-ил)-3-(1-метил-1Н-пиразол-5-ил)мочевины;

1-(транс-1-(2-метоксиэтил)-4-фенилпирролидин-3-ил)-3-(2-фенил-2,4,5,6-тетрагидроциклопента[с]пиразол-3-ил)тиомочевины;

1-(2-(3-фторфенил)-2,4,5,6-тетрагидроциклопента[с]пиразол-3-ил)-3-(транс-1-(2-метоксиэтил)-4-фенилпирролидин-3-ил)мочевины;

1-(2-(4-фторфенил)-2,4,5,6-тетрагидроциклопента[с]пиразол-3-ил)-3-(транс-1-(2-метоксиэтил)-4-фенилпирролидин-3-ил)мочевины;

1-(3-циклопентил-1-фенил-1Н-пиразол-5-ил)-3-(транс-1-(2-метоксиэтил)-4-фенилпирролидин-3-ил)мочевины;

1-(1-этил-3-фенил-1Н-пиразол-5-ил)-3-(транс-1-(2-метоксиэтил)-4-фенилпирролидин-3-ил)мочевины;

1-(транс-1-(2-метоксиэтил)-4-фенилпирролидин-3-ил)-3-(2-фенил-4,5,6,7-тетрагидро-2Н-индазол-3-ил)мочевины;

1-(транс-1-(2-метоксиэтил)-4-фенилпирролидин-3-ил)-3-(2-метил-2,4,5,6-тетрагидроциклопента[с]пиразол-3-ил)мочевины;

1-(1,3-диметил-4-фенил-1Н-пиразол-5-ил)-3-(транс-1-(2-метоксиэтил)-4-фенилпирролидин-3-ил)мочевины;

1-(3- *трет*-бутил-1-о-толил-1Н-пиразол-5-ил)-3-(транс-1-(2-метоксиэтил)-4-фенилпирролидин-3-ил)мочевины;

1-(3- *трет*-бутил-1-м-толил-1Н-пиразол-5-ил)-3-(транс-1-(2-метоксиэтил)-4-

фенилпирролидин-3-ил)мочевины;

1-(транс-1-(2-метоксиэтил)-4-фенилпирролидин-3-ил)-3-(1-метил-4-фенил-1Н-пиразол-5-ил)мочевины;

1-(4-циано-3-метил-1-фенил-1Н-пиразол-5-ил)-3-(транс-1-(2-метоксиэтил)-4-фенилпирролидин-3-ил)мочевины;

1-(транс-1-(2-метоксиэтил)-4-фенилпирролидин-3-ил)-3-(2-(1-метил-1Н-пиразол-4-ил)-2,4,5,6-тетрагидроциклопента[с]пиразол-3-ил)мочевины;

1-(3-*трет*-бутил-1-(тетрагидро-2Н-пиран-4-ил)-1Н-пиразол-5-ил)-3-(транс-1-(2-метоксиэтил)-4-фенилпирролидин-3-ил)мочевины;

1-(транс-1-(2-метоксиэтил)-4-фенилпирролидин-3-ил)-3-(2-(пиридин-2-ил)-2,4,5,6-тетрагидроциклопента[с]пиразол-3-ил)мочевины;

1-(6,6-диметил-2-фенил-2,4,5,6-тетрагидроциклопента[с]пиразол-3-ил)-3-(транс-1-(2-метоксиэтил)-4-фенил-пирролидин-3-ил)мочевины;

1-(7,7-диметил-2-фенил-4,5,6,7-тетрагидро-2Н-индазол-3-ил)-3-(транс-1-(2-метоксиэтил)-4-фенилпирролидин-3-ил)мочевины;

1-(транс-1-(2-метоксиэтил)-4-(пиридин-4-ил)пирролидин-3-ил)-3-(2-фенил-2,4,5,6-тетрагидроциклопента[с]пиразол-3-ил)мочевины;

транс-1-(4-(3-фторфенил)-1-(2-метоксиэтил)пирролидин-3-ил)-3-(2-фенил-2,4,5,6-тетрагидроциклопента[с]пиразол-3-ил)мочевины;

транс-1-(4-(3-фторфенил)-1-(2-метоксиэтил)пирролидин-3-ил)-3-(3-изопропил-1-фенил-1Н-пиразол-5-ил)мочевины;

транс-1-(4-(4-фторфенил)-1-(2-метоксиэтил)пирролидин-3-ил)-3-(3-изопропил-1-фенил-1Н-пиразол-5-ил)мочевины;

транс-1-(4-(3-хлорфенил)-1-(2-метоксиэтил)пирролидин-3-ил)-3-(3-изопропил-1-фенил-1Н-пиразол-5-ил)мочевины;

транс-1-(4-(2-фторфенил)-1-(2-метоксиэтил)пирролидин-3-ил)-3-(3-изопропил-1-фенил-1Н-пиразол-5-ил)мочевины;

транс-1-(3-изопропил-1-фенил-1Н-пиразол-5-ил)-3-(1-(2-метоксиэтил)-4-(тиофен-2-ил)пирролидин-3-ил)мочевины;

1-((3,4-транс)-4-(2,4-диметилтиазол-5-ил)-1-(2-метоксиэтил)пирролидин-3-ил)-3-(2-фенил-2,4,5,6-тетрагидроциклопента[с]пиразол-3-ил)мочевины;

1-(транс-1-(2-метоксиэтил)-4-(оксазол-5-ил)пирролидин-3-ил)-3-(2-фенил-2,4,5,6-тетрагидроциклопента[с]пиразол-3-ил)мочевины;

1-(транс-4-(изоксазол-5-ил)-1-(2-метоксиэтил)пирролидин-3-ил)-3-(2-фенил-2,4,5,6-тетрагидроциклопента[с]пиразол-3-ил)мочевины;

1-((3,4-транс)-1-(2-метоксиэтил)-4-(3-метоксифенил)пирролидин-3-ил)-3-(2-фенил-2,4,5,6-тетрагидроциклопента[с]пиразол-3-ил)мочевины;

1-(1-(2-метоксиэтил)-4-(тиазол-2-ил)пирролидин-3-ил)-3-(2-фенил-2,4,5,6-тетрагидроциклопента[с]пиразол-3-ил)мочевины;

1-((3S,4R)-1-(2-метоксиэтил)-4-фенилпирролидин-3-ил)-3-(2-фенил-2,4,5,6-тетрагидроциклопента[с]пиразол-3-ил)мочевины;

1-(1,3-дифенил-1Н-пиразол-5-ил)-3-((3S,4R)-1-(2-метоксиэтил)-4-фенилпирролидин-3-ил)мочевины;

1-((3S,4R)-1-(2-метоксиэтил)-4-фенилпирролидин-3-ил)-3-(1-метил-3-фенил-1Н-пиразол-5-ил)мочевины;

1-((3S,4R)-1-(2-метоксиэтил)-4-фенилпирролидин-3-ил)-3-(1-фенил-3-(трифторметил)-1Н-пиразол-5-ил)мочевины;

1-(1,4-диметил-3-фенил-1Н-пиразол-5-ил)-3-((3S,4R)-1-(2-метоксиэтил)-4-

фенилпирролидин-3-ил)мочевины;

1-(3-циклопропил-1-метил-1Н-пиразол-5-ил)-3-((3S,4R)-4-(3,5-дифторфенил)-1-(2-метоксиэтил)пирролидин-3-ил)мочевины;

1-((3S,4R)-4-(3,5-дифторфенил)-1-(2-метоксиэтил)пирролидин-3-ил)-3-(1-метил-3-пиридин-2-ил)-1Н-пиразол-5-ил)мочевины;

1-((3S,4R)-4-(3,5-дифторфенил)-1-(2-метоксиэтил)пирролидин-3-ил)-3-(1-метил-3-пиридин-3-ил)-1Н-пиразол-5-ил)мочевины;

1-((3S,4R)-4-(3,4-дифторфенил)-1-(2-метоксиэтил)пирролидин-3-ил)-3-(1,1'-диметил-1Н,1'Н-3,4'-бипиразол-5-ил)мочевины;

1-(3-(3-цианофенил)-1-метил-1Н-пиразол-5-ил)-3-((3S,4R)-4-(3,4-дифторфенил)-1-(2-метоксиэтил)пирролидин-3-ил)мочевины;

1-(3-(4-цианофенил)-1-метил-1Н-пиразол-5-ил)-3-((3S,4R)-4-(3,4-дифторфенил)-1-(2-метоксиэтил)пирролидин-3-ил)мочевины;

1-((3S,4R)-4-(3,4-дифторфенил)-1-(2-метоксиэтил)пирролидин-3-ил)-3-(3-(имидазо[1,2-а]пиридин-5-ил)-1-метил-1Н-пиразол-5-ил)мочевины;

1-(4-хлор-1,3-дифенил-1Н-пиразол-5-ил)-3-((3S,4R)-4-(3,4-дифторфенил)-1-(2-метоксиэтил)пирролидин-3-ил)мочевины;

1-(4-бром-1,3-дифенил-1Н-пиразол-5-ил)-3-((3S,4R)-4-(3,4-дифторфенил)-1-(2-метоксиэтил)пирролидин-3-ил)мочевины;

1-(4-хлор-3-метил-1-фенил-1Н-пиразол-5-ил)-3-((3S,4R)-4-(3,4-дифторфенил)-1-(2-метоксиэтил)пирролидин-3-ил)мочевины;

1-((3S,4R)-4-(3,4-дифторфенил)-1-(2-метоксиэтил)пирролидин-3-ил)-3-(1,3-диметил-4-фенил-1Н-пиразол-5-ил)мочевины;

1-(4-циано-3-метил-1-фенил-1Н-пиразол-5-ил)-3-((3S,4R)-4-(3,4-дифторфенил)-1-(2-метоксиэтил)пирролидин-3-ил)мочевины;

1-(4-хлор-1-метил-3-фенил-1Н-пиразол-5-ил)-3-((3S,4R)-4-(3,4-дифторфенил)-1-(2-метоксиэтил)пирролидин-3-ил)мочевины;

1-(4-бром-1-метил-3-фенил-1Н-пиразол-5-ил)-3-((3S,4R)-4-(3,4-дифторфенил)-1-(2-метоксиэтил)пирролидин-3-ил)мочевины;

1-(4-циано-3-(цианометил)-1-фенил-1Н-пиразол-5-ил)-3-((3S,4R)-4-(3,4-дифторфенил)-1-(2-метоксиэтил)пирролидин-3-ил)мочевины;

1-(3-(2-цианопропан-2-ил)-1-фенил-1Н-пиразол-5-ил)-3-((3S,4R)-4-(3,4-дифторфенил)-1-(2-метоксиэтил)пирролидин-3-ил)мочевины;

1-((3S,4R)-4-(3,4-дифторфенил)-1-(2-метоксиэтил)пирролидин-3-ил)-3-(3-этил-4-метил-1-фенил-1Н-пиразол-5-ил)мочевины;

1-((3S,4R)-4-(3,4-дифторфенил)-1-(2-метоксиэтил)пирролидин-3-ил)-3-(1'-метил-1-фенил-1Н,1'Н-3,4'-бипиразол-5-ил)мочевины;

1-((3S,4R)-4-(3,4-дифторфенил)-1-(2-метоксиэтил)пирролидин-3-ил)-3-(4-метил-3-(оксетан-3-ил)метокси)-1-фенил-1Н-пиразол-5-ил)мочевины;

1-((3S,4R)-4-(3,4-дифторфенил)-1-(2-метоксиэтил)пирролидин-3-ил)-3-(4-метил-3-(3-метилоксетан-3-ил)метокси)-1-фенил-1Н-пиразол-5-ил)мочевины;

1-((3S,4R)-4-(3,4-дифторфенил)-1-(2-метоксиэтил)пирролидин-3-ил)-3-(3-(((S)-2,2-диметил-1,3-диоксолан-4-ил)метокси)-4-метил-1-фенил-1Н-пиразол-5-ил)мочевины;

1-((3S,4R)-4-(3,4-дифторфенил)-1-(2-метоксиэтил)пирролидин-3-ил)-3-(3-(((R)-2,2-диметил-1,3-диоксолан-4-ил)метокси)-4-метил-1-фенил-1Н-пиразол-5-ил)мочевины;

1-(3,4-диметил-1-фенил-1Н-пиразол-5-ил)-3-((3S,4R)-1-(2-метоксиэтил)-4-фенилпирролидин-3-ил)мочевины;

трет-бутил-3-(3-((3S,4R)-1-(2-метоксиэтил)-4-фенилпирролидин-3-ил)уреидо)-2-фенил-

4,6-дигидропирроло[3,4-с]пиразол-5(2H)-карбоксилата;

1-(3-изопропил-4-метил-1-фенил-1H-пиразол-5-ил)-3-((3S,4R)-1-(2-метоксиэтил)-4-фенилпирролидин-3-ил)мочевины;

1-((3S,4R)-1-(2-метоксиэтил)-4-фенилпирролидин-3-ил)-3-(2-фенил-4,6-дигидро-2H-фуоро[3,4-с]пиразол-3-ил)мочевины;

1-((3S,4R)-1-(2-метоксиэтил)-4-фенилпирролидин-3-ил)-3-(2-фенил-4,6-дигидро-2H-тиено[3,4-с]пиразол-3-ил)мочевины;

1-((3S,4R)-4-(3,5-дифторфенил)-1-(2-метоксиэтил)пирролидин-3-ил)-3-(3,4-диметил-1-фенил-1H-пиразол-5-ил)мочевины;

1-((3S,4R)-4-(3,5-дифторфенил)-1-(2-метоксиэтил)пирролидин-3-ил)-3-(2-фенил-2,4,5,6-тетрагидроциклопента[с]пиразол-3-ил)мочевины;

1-((3S,4R)-4-(3,5-дифторфенил)-1-(2-метоксиэтил)пирролидин-3-ил)-3-(3-изопропил-1-фенил-1H-пиразол-5-ил)мочевины;

1-((3S,4R)-4-(3,5-дифторфенил)-1-(2-метоксиэтил)пирролидин-3-ил)-3-(3-метил-1-фенил-1H-пиразол-5-ил)мочевины;

1-((3S,4R)-4-(3,4-дифторфенил)-1-(2-метоксиэтил)пирролидин-3-ил)-3-(2-фенил-2,4,5,6-тетрагидроциклопента[с]пиразол-3-ил)мочевины;

1-((3S,4R)-4-(3,5-дифторфенил)-1-(2-метоксиэтил)пирролидин-3-ил)-3-(2-фенил-4,6-дигидро-2H-фуоро[3,4-с]пиразол-3-ил)мочевины;

1-((3S,4R)-4-(3,5-дифторфенил)-1-(2-метоксиэтил)пирролидин-3-ил)-3-(2-фенил-4,6-дигидро-2H-тиено[3,4-с]пиразол-3-ил)мочевины;

1-((3S,4R)-4-(3,4-дифторфенил)-1-(2-метоксиэтил)пирролидин-3-ил)-3-(2-фенил-4,6-дигидро-2H-фуоро[3,4-с]пиразол-3-ил)мочевины;

1-((3S,4R)-4-(3,4-дифторфенил)-1-(2-метоксиэтил)пирролидин-3-ил)-3-(2-фенил-4,6-дигидро-2H-тиено[3,4-с]пиразол-3-ил)мочевины;

1-((3S,4R)-4-(3,4-дифторфенил)-1-(2-метоксиэтил)пирролидин-3-ил)-3-(3,4-диметил-1-фенил-1H-пиразол-5-ил)мочевины;

1-((3S,4R)-4-(3,4-дифторфенил)-1-(2-метоксиэтил)пирролидин-3-ил)-3-(1-метил-3-фенил-1H-пиразол-5-ил)мочевины;

1-(3-(1-гидрокси-2-метилпропан-2-ил)-1-фенил-1H-пиразол-5-ил)-3-((3S,4R)-1-(2-метоксиэтил)-4-фенилпирролидин-3-ил)мочевины;

1-((3S,4R)-1-(2-метоксиэтил)-4-фенилпирролидин-3-ил)-3-(5-оксидо-2-фенил-4,6-дигидро-2H-тиено[3,4-с]пиразол-3-ил)мочевины;

1-((3S,4R)-1-(2-метоксиэтил)-4-фенилпирролидин-3-ил)-3-(1-метил-3-(пиридин-4-ил)-1H-пиразол-5-ил)мочевины;

1-((3S,4R)-4-(3,4-дифторфенил)-1-(2-метоксиэтил)пирролидин-3-ил)-3-(1-метил-3-(пиридин-4-ил)-1H-пиразол-5-ил)мочевины;

1-((3S,4R)-4-(3,5-дифторфенил)-1-(2-метоксиэтил)пирролидин-3-ил)-3-(1-метил-3-фенил-1H-пиразол-5-ил)мочевины;

1-((3S,4R)-4-(3,5-дифторфенил)-1-(2-метоксиэтил)пирролидин-3-ил)-3-(1-метил-3-(тиофен-2-ил)-1H-пиразол-5-ил)мочевины;

1-((3S,4R)-1-(2-метоксиэтил)-4-фенилпирролидин-3-ил)-3-(3-(метоксиметил)-1-фенил-1H-пиразол-5-ил)мочевины;

1-((3S,4R)-1-(2-метоксиэтил)-4-фенилпирролидин-3-ил)-3-(3-(метоксиметил)-4-метил-1-фенил-1H-пиразол-5-ил)мочевины;

1-((3S,4R)-4-(3,4-дифторфенил)-1-(2-метоксиэтил)пирролидин-3-ил)-3-(1-метил-3-птолил-1H-пиразол-5-ил)мочевины;

1-((3S,4R)-4-(3,4-дифторфенил)-1-(2-метоксиэтил)пирролидин-3-ил)-3-(1-метил-3-м-

толил-1Н-пиразол-5-ил)мочевины;

1-((3S,4R)-4-(3,4-дифторфенил)-1-(2-метоксиэтил)пирролидин-3-ил)-3-(1-метил-3-о-толил-1Н-пиразол-5-ил)мочевины;

1-((3S,4R)-4-(3,4-дифторфенил)-1-(2-метоксиэтил)пирролидин-3-ил)-3-(3-(3-метоксифенил)-1-метил-1Н-пиразол-5-ил)мочевины;

1-((3S,4R)-4-(3,4-дифторфенил)-1-(2-метоксиэтил)пирролидин-3-ил)-3-(3-(2-метоксифенил)-1-метил-1Н-пиразол-5-ил)мочевины;

1-(3-(4-фторфенил)-1-метил-1Н-пиразол-5-ил)-3-((3S,4R)-1-(2-метоксиэтил)-4-фенилпирролидин-3-ил)мочевины;

1-((3S,4R)-1-(2-метоксиэтил)-4-фенилпирролидин-3-ил)-3-(3-(4-метоксифенил)-1-метил-1Н-пиразол-5-ил)мочевины;

1-((3S,4R)-1-(2-метоксиэтил)-4-(3-(трифторметил)фенил)пирролидин-3-ил)-3-(1-метил-3-фенил-1Н-пиразол-5-ил)мочевины;

1-((3S,4R)-4-(3-фторфенил)-1-(2-метоксиэтил)пирролидин-3-ил)-3-(1-метил-3-фенил-1Н-пиразол-5-ил)мочевины;

1-((3S,4R)-4-(2,4-дифторфенил)-1-(2-метоксиэтил)пирролидин-3-ил)-3-(1-метил-3-фенил-1Н-пиразол-5-ил)мочевины;

1-((3S,4R)-4-(3-фторфенил)-1-(2-метоксиэтил)пирролидин-3-ил)-3-(3-(4-фторфенил)-1-метил-1Н-пиразол-5-ил)мочевины;

1-((3S,4R)-4-(3,4-дифторфенил)-1-(2-метоксиэтил)пирролидин-3-ил)-3-(3-(4-фторфенил)-1-метил-1Н-пиразол-5-ил)мочевины;

1-((3S,4R)-4-(3,4-дифторфенил)-1-(2-метоксиэтил)пирролидин-3-ил)-3-(3-(3-фторфенил)-1-метил-1Н-пиразол-5-ил)мочевины;

1-((3S,4R)-4-(3,4-дифторфенил)-1-(2-метоксиэтил)пирролидин-3-ил)-3-(3-(2-фторфенил)-1-метил-1Н-пиразол-5-ил)мочевины;

1-((3S,4R)-4-(3-фторфенил)-1-(2-метоксиэтил)пирролидин-3-ил)-3-(2-фенил-2,4,5,6-тетрагидроциклопента[с]пиразол-3-ил)мочевины;

1-(3-(1-гидрокси-2-метилпропан-2-ил)-4-метил-1-фенил-1Н-пиразол-5-ил)-3-((3S,4R)-1-(2-метоксиэтил)-4-фенилпирролидин-3-ил)мочевины;

1-((3S,4R)-4-(3,4-дифторфенил)-1-(2-метоксиэтил)пирролидин-3-ил)-3-(3-(1-гидрокси-2-метилпропан-2-ил)-4-метил-1-фенил-1Н-пиразол-5-ил)мочевины;

1-(3-(4-хлорфенил)-1-метил-1Н-пиразол-5-ил)-3-((3S,4R)-4-(3,4-дифторфенил)-1-(2-метоксиэтил)пирролидин-3-ил)мочевины;

1-((3S,4R)-4-(2,5-дифторфенил)-1-(2-метоксиэтил)пирролидин-3-ил)-3-(3-(4-фторфенил)-1-метил-1Н-пиразол-5-ил)мочевины;

метил-4-(5-(3-((3S,4R)-4-(3,4-дифторфенил)-1-(2-метоксиэтил)пирролидин-3-ил)уреидо)-1-метил-1Н-пиразол-3-ил)бензоата;

1-((3S,4R)-4-(3,4-дифторфенил)-1-(2-метоксиэтил)пирролидин-3-ил)-3-(1-(2-гидроксиэтил)-3-фенил-1Н-пиразол-5-ил)мочевины;

1-((3S,4R)-4-(3,4-дифторфенил)-1-(2-метоксиэтил)пирролидин-3-ил)-3-(3-(метоксиметил)-4-метил-1-фенил-1Н-пиразол-5-ил)мочевины;

1-((3S,4R)-4-(3,5-дифторфенил)-1-(2-метоксиэтил)пирролидин-3-ил)-3-(3-(метоксиметил)-4-метил-1-фенил-1Н-пиразол-5-ил)мочевины;

1-((3S,4R)-4-(3,4-дифторфенил)-1-(2-метоксиэтил)пирролидин-3-ил)-3-(1-метил-3-(4-(метилтио)фенил)-1Н-пиразол-5-ил)мочевины;

1-((3S,4R)-4-(3,4-дифторфенил)-1-(2-метоксиэтил)пирролидин-3-ил)-3-(1,3-дифенил-1Н-пиразол-5-ил)мочевины;

1-((3S,4R)-4-(3,4-дифторфенил)-1-(2-метоксиэтил)пирролидин-3-ил)-3-(3-(3-

метоксипропил)-4-метил-1-фенил-1Н-пиразол-5-ил)мочевины;

1-((3S,4R)-4-(4-фторфенил)-1-(2-метоксиэтил)пирролидин-3-ил)-3-(2-фенил-2,4,5,6-тетрагидроциклопента[с]пиразол-3-ил)мочевины;

1-(3,4-диметил-1-фенил-1Н-пиразол-5-ил)-3-((3S,4R)-4-(4-фторфенил)-1-(2-метоксиэтил)пирролидин-3-ил)мочевины;

1-((3S,4R)-4-(3,4-дифторфенил)-1-(2-метоксиэтил)пирролидин-3-ил)-3-(3-(4-(2-метоксиэтокси)фенил)-1-метил-1Н-пиразол-5-ил)мочевины;

1-((3S,4R)-4-(3,4-дифторфенил)-1-(2-метоксиэтил)пирролидин-3-ил)-3-(4-метокси-3-метил-1-фенил-1Н-пиразол-5-ил)мочевины;

1-((3S,4R)-4-(3,4-дифторфенил)-1-(2-метоксиэтил)пирролидин-3-ил)-3-(3-(гидроксиметил)-4-метил-1-фенил-1Н-пиразол-5-ил)мочевины;

1-((3S,4R)-4-(3,4-дифторфенил)-1-(2-метоксиэтил)пирролидин-3-ил)-3-(3-(2-гидроксиэтил)-4-метил-1-фенил-1Н-пиразол-5-ил)мочевины;

1-((3S,4R)-4-(3,4-дифторфенил)-1-(2-метоксиэтил)пирролидин-3-ил)-3-(3-(2-метоксиэтил)-4-метил-1-фенил-1Н-пиразол-5-ил)мочевины;

1-((3S,4R)-4-(3,4-дифторфенил)-1-(2-метоксиэтил)пирролидин-3-ил)-3-(3-этокси-4-метил-1-фенил-1Н-пиразол-5-ил)мочевины;

1-(3-(бензилокси)-1-метил-1Н-пиразол-5-ил)-3-((3S,4R)-4-(3,4-дифторфенил)-1-(2-метоксиэтил)пирролидин-3-ил)мочевины;

1-((3S,4R)-4-(3,4-дифторфенил)-1-(2-метоксиэтил)пирролидин-3-ил)-3-(3-(2-метоксиэтокси)-4-метил-1-фенил-1Н-пиразол-5-ил)мочевины;

1-((3S,4R)-4-(3,5-дифторфенил)-1-(2-метоксиэтил)пирролидин-3-ил)-3-(3-этокси-4-метил-1-фенил-1Н-пиразол-5-ил)мочевины;

транс-1-(3-этокси-4-метил-1-фенил-1Н-пиразол-5-ил)-3-1-(2-метоксиэтил)-4-фенилпирролидин-3-ил)мочевины;

1-((3S,4R)-4-(3,4-дифторфенил)-1-(2-метоксиэтил)пирролидин-3-ил)-3-(3-метокси-4-метил-1-фенил-1Н-пиразол-5-ил)мочевины;

1-(3-(цианометокси)-4-метил-1-фенил-1Н-пиразол-5-ил)-3-((3S,4R)-4-(3,4-дифторфенил)-1-(2-метоксиэтил)пирролидин-3-ил)мочевины;

1-((3S,4R)-4-(3,4-дифтор-фенил)-1-(2-метоксиэтил)пирролидин-3-ил)-3-(3-(4-метоксибензилокси)-4-метил-1-фенил-1Н-пиразол-5-ил)мочевины;

1-((3S,4R)-4-(4-фторфенил)-1-(2-метоксиэтил)пирролидин-3-ил)-3-(3-метокси-4-метил-1-фенил-1Н-пиразол-5-ил)мочевины;

1-((3S,4R)-4-(3,4-дифторфенил)-1-(2-метоксиэтил)пирролидин-3-ил)-3-(3-(2-фторэтокси)-4-метил-1-фенил-1Н-пиразол-5-ил)мочевины;

1-((3S,4R)-4-(3,4-дифторфенил)-1-(2-метоксиэтил)пирролидин-3-ил)-3-(3-(2-гидрокси-2-метилпропокси)-4-метил-1-фенил-1Н-пиразол-5-ил)мочевины;

1-((3S,4R)-4-(3,4-дифторфенил)-1-(2-метоксиэтил)пирролидин-3-ил)-3-(3-этокси-1-фенил-1Н-пиразол-5-ил)мочевины;

1-(3-этокси-4-метил-1-фенил-1Н-пиразол-5-ил)-3-((3S,4R)-4-(4-фторфенил)-1-(2-метоксиэтил)пирролидин-3-ил)мочевины;

1-(3-этокси-4-метил-1-фенил-1Н-пиразол-5-ил)-3-((3S,4R)-4-(3-фторфенил)-1-(2-метоксиэтил)пирролидин-3-ил)мочевины;

1-((3S,4R)-4-(3,5-дифторфенил)-1-(2-метоксиэтил)пирролидин-3-ил)-3-(3-(2-гидроксиэтокси)-4-метил-1-фенил-1Н-пиразол-5-ил)мочевины;

1-(2-циклогексил-2,4,5,6-тетрагидроциклопента[с]пиразол-3-ил)-3-((3S,4R)-4-(3,4-дифторфенил)-1-(2-метоксиэтил)пирролидин-3-ил)мочевины;

1-((3S,4R)-1-(2-метоксиэтил)-4-фенилпирролидин-3-ил)-3-(2-(пиридин-4-ил)-2,4,5,6-

тетрагидроциклопента[с]пиразол-3-ил)мочевины;

1-((3S,4R)-4-(3,4-дифторфенил)-1-(2-метоксиэтил)пирролидин-3-ил)-3-(1-метил-3-(5-метилпиразин-2-ил)-1H-пиразол-5-ил)мочевины;

1-((3S,4R)-4-(3,4-дифторфенил)-1-(2-метоксиэтил)пирролидин-3-ил)-3-(1,4-диметил-3-(5-метилпиразин-2-ил)-1H-пиразол-5-ил)мочевины;

этил-5-(3-((3S,4R)-4-(3,4-дифторфенил)-1-(2-метоксиэтил)пирролидин-3-ил)уреидо)-1-фенил-1H-пиразол-4-карбоксилата;

1-((3S,4R)-4-(3,4-дифторфенил)-1-(2-метоксиэтил)пирролидин-3-ил)-3-(1-метил-3-(пиразин-2-ил)-1H-пиразол-5-ил)мочевины;

1-((3S,4R)-4-(3,4-дифторфенил)-1-(2-метоксиэтил)пирролидин-3-ил)-3-(3-метокси-1-метил-4-фенил-1H-пиразол-5-ил)мочевины;

1-((3S,4R)-4-(3,4-дифторфенил)-1-(2-метоксиэтил)пирролидин-3-ил)-3-(3-этокси-1-метил-4-фенил-1H-пиразол-5-ил)мочевины;

дигидрохлорида 1-((3S,4R)-1-(2-метоксиэтил)-4-фенилпирролидин-3-ил)-3-(2-фенил-2,4,5,6-тетрагидропирроло[3,4-с]пиразол-3-ил)мочевины;

1-(5-ацетил-2-фенил-2,4,5,6-тетрагидропирроло[3,4-с]пиразол-3-ил)-3-((3S,4R)-1-(2-метоксиэтил)-4-фенилпирролидин-3-ил)мочевины;

1-((3S,4R)-4-(3,4-дифторфенил)-1-(2-метоксиэтил)пирролидин-3-ил)-3-(4-(гидроксиметил)-3-(метоксиметил)-1-фенил-1H-пиразол-5-ил)мочевины;

4-(5-(3-((3S,4R)-4-(3,4-дифторфенил)-1-(2-метоксиэтил)пирролидин-3-ил)уреидо)-1-метил-1H-пиразол-3-ил)бензойной кислоты;

4-(5-(3-((3S,4R)-4-(3,4-дифторфенил)-1-(2-метоксиэтил)пирролидин-3-ил)уреидо)-1-метил-1H-пиразол-3-ил)бензамида;

4-(5-(3-((3S,4R)-4-(3,4-дифторфенил)-1-(2-метоксиэтил)пирролидин-3-ил)уреидо)-1-метил-1H-пиразол-3-ил)-N-метилбензамида;

4-(5-(3-((3S,4R)-4-(3,4-дифторфенил)-1-(2-метоксиэтил)пирролидин-3-ил)уреидо)-1-метил-1H-пиразол-3-ил)-N,N-диметилбензамида;

1-((3S,4R)-4-(3,4-дифторфенил)-1-(2-метоксиэтил)пирролидин-3-ил)-3-(3-(4-(гидроксиметил)фенил)-1-метил-1H-пиразол-5-ил)мочевины;

1-((3S,4R)-4-(3,4-дифторфенил)-1-(2-метоксиэтил)пирролидин-3-ил)-3-(1-метил-3-(4-(метилсульфонил)фенил)-1H-пиразол-5-ил)мочевины;

1-((3S,4R)-4-(3,4-дифторфенил)-1-(2-метоксиэтил)пирролидин-3-ил)-3-(4-фтор-3-метил-1-фенил-1H-пиразол-5-ил)мочевины;

1-((3S,4R)-4-(3,4-дифторфенил)-1-(2-метоксиэтил)пирролидин-3-ил)-3-(4-фтор-1-метил-3-фенил-1H-пиразол-5-ил)мочевины;

1-((3S,4R)-4-(3,4-дифторфенил)-1-(2-метоксиэтил)пирролидин-3-ил)-3-(4-фтор-1,3-дифенил-1H-пиразол-5-ил)мочевины;

2-метоксиэтил 4-(5-(3-((3S,4R)-4-(3,4-дифторфенил)-1-(2-метоксиэтил)пирролидин-3-ил)уреидо)-1-метил-1H-пиразол-3-ил)бензоата;

1-((3S,4R)-4-(3,4-дифторфенил)-1-(2-метоксиэтил)пирролидин-3-ил)-3-(5,5-диоксидо-2-фенил-4,6-дигидро-2H-тиено[3,4-с]пиразол-3-ил)мочевины;

1-(5,5-диоксидо-2-фенил-4,6-дигидро-2H-тиено[3,4-с]пиразол-3-ил)-3-((3S,4R)-1-(2-метоксиэтил)-4-фенилпирролидин-3-ил)мочевины;

1-((3S,4R)-4-(3,5-дифторфенил)-1-(2-метоксиэтил)пирролидин-3-ил)-3-(5,5-диоксидо-2-фенил-4,6-дигидро-2H-тиено[3,4-с]пиразол-3-ил)мочевины;

1-((3S,4R)-4-(3,4-дифторфенил)-1-(2-метоксиэтил)пирролидин-3-ил)-3-(4-метил-3-(2-(метилсульфонил)этокси)-1-фенил-1H-пиразол-5-ил)мочевины;

1-((3S,4R)-4-(3,4-дифторфенил)-1-(2-метоксиэтил)пирролидин-3-ил)-3-(4-

(гидроксиметил)-1-фенил-1Н-пиразол-5-ил)мочевины;

1-((3S,4R)-4-(3,4-дифторфенил)-1-(2-метоксиэтил)пирролидин-3-ил)-3-(3-((R)-2,3-дигидроксипропокси)-4-метил-1-фенил-1Н-пиразол-5-ил)мочевины;

1-((3S,4R)-4-(3,4-дифторфенил)-1-(2-метоксиэтил)пирролидин-3-ил)-3-(3-((S)-2,3-дигидроксипропокси)-4-метил-1-фенил-1Н-пиразол-5-ил)мочевины;

гидрохлорида 1-((3S,4R)-4-(3,4-дифторфенил)-1-(2-метоксиэтил)пирролидин-3-ил)-3-(3-(2-гидроксиэтокси)-4-метил-1-фенил-1Н-пиразол-5-ил)мочевины;

гидрохлорида 1-((3S,4R)-4-(3,4-дифторфенил)-1-(2-метоксиэтил)пирролидин-3-ил)-3-(3-((S)-2-гидроксипропокси)-4-метил-1-фенил-1Н-пиразол-5-ил)мочевины;

1-((3R,4S)-4-гидрокси-1-(2-метоксиэтил)-4-фенилпирролидин-3-ил)-3-(2-фенил-2,4,5,6-тетрагидроциклопента[с]пиразол-3-ил)мочевины;

1-((3R,4S)-4-фтор-1-(2-метоксиэтил)-4-фенилпирролидин-3-ил)-3-(2-фенил-2,4,5,6-тетрагидроциклопента[с]пиразол-3-ил)мочевины;

1-(транс-4-фенил-1-(2-(трифторметокси)этил)пирролидин-3-ил)-3-(2-фенил-2,4,5,6-тетрагидроциклопента[с]пиразол-3-ил)мочевины;

1-(транс-1-(2-(метилтио)этил)-4-фенилпирролидин-3-ил)-3-(2-фенил-2,4,5,6-тетрагидроциклопента[с]пиразол-3-ил)мочевины;

1-((3S,4R)-1-((S)-2-метоксипропил)-4-фенилпирролидин-3-ил)-3-(2-фенил-2,4,5,6-тетрагидроциклопента[с]пиразол-3-ил)мочевины;

1-((3,4-транс)-4-фенил-1-(4,4,4-трифторбутил)пирролидин-3-ил)-3-(2-фенил-2,4,5,6-тетрагидроциклопента[с]пиразол-3-ил)мочевины;

1-((3S,4R)-1-(цианометил)-4-(3,4-дифторфенил)пирролидин-3-ил)-3-(2-фенил-2,4,5,6-тетрагидроциклопента[с]пиразол-3-ил)мочевины;

1-((3S,4R)-1-(цианометил)-4-(3,4-дифторфенил)пирролидин-3-ил)-3-(3-(2-метоксиэтокси)-4-метил-1-фенил-1Н-пиразол-5-ил)мочевины;

1-((3,4-транс)-1-(цианометил)-4-фенилпирролидин-3-ил)-3-(2-фенил-2,4,5,6-тетрагидроциклопента[с]пиразол-3-ил)мочевины;

1-((3S,4R)-1-(цианометил)-4-фенилпирролидин-3-ил)-3-(2-фенил-2,4,5,6-тетрагидроциклопента[с]пиразол-3-ил)мочевины;

2-((3R,4S)-3-фенил-4-(3-(2-фенил-2,4,5,6-тетрагидроциклопента[с]пиразол-3-ил)уреидо)пирролидин-1-ил)ацетамида;

1-((3S,4R)-4-(3,4-дифторфенил)-1-(2-гидроксиэтил)пирролидин-3-ил)-3-(3,4-диметил-1-фенил-1Н-пиразол-5-ил)мочевины;

1-((транс)-1-(3,3,4,4,4-пентафторбутил)-4-фенилпирролидин-3-ил)-3-(2-фенил-2,4,5,6-тетрагидроциклопента[с]пиразол-3-ил)мочевины;

1-((транс)-1-этил-4-фенилпирролидин-3-ил)-3-(2-фенил-2,4,5,6-тетрагидроциклопента[с]пиразол-3-ил)мочевины;

1-((транс)-4-фенил-1-(2,2,2-трифторэтил)пирролидин-3-ил)-3-(2-фенил-2,4,5,6-тетрагидроциклопента[с]пиразол-3-ил)мочевины;

1-(3,4-диметил-1-фенил-1Н-пиразол-5-ил)-3-((транс)-4-фенил-1-(2,2,2-трифторэтил)пирролидин-3-ил)мочевины;

1-(3-(2-метоксиэтокси)-4-метил-1-фенил-1Н-пиразол-5-ил)-3-((транс)-4-фенил-1-(2,2,2-трифторэтил)пирролидин-3-ил)мочевины;

1-((транс)-4-фенил-1-(2,2,2-трифторэтил)пирролидин-3-ил)-3-(2-фенил-2,4,5,6-тетрагидроциклопента[с]пиразол-3-ил)мочевины;

1-(3,4-диметил-1-фенил-1Н-пиразол-5-ил)-3-((3S,4R)-4-фенил-1-(2,2,2-трифторэтил)пирролидин-3-ил)мочевины;

1-(3-(2-метоксиэтокси)-4-метил-1-фенил-1Н-пиразол-5-ил)-3-((3S,4R)-4-фенил-1-(2,2,2-

трифторэтил)пирролидин-3-ил)мочевины;

1-((3S,4R)-4-(3-фторфенил)-1-(2,2,2-трифторэтил)пирролидин-3-ил)-3-(2-фенил-2,4,5,6-тетрагидроциклопента[с]пиразол-3-ил)мочевины;

1-(3,4-диметил-1-фенил-1Н-пиразол-5-ил)-3-((3S,4R)-4-(3-фторфенил)-1-(2,2,2-трифторэтил)пирролидин-3-ил)мочевины;

1-((3S,4R)-4-(3-фторфенил)-1-(2,2,2-трифторэтил)пирролидин-3-ил)-3-(2-метоксиэтокси)-4-метил-1-фенил-1Н-пиразол-5-ил)мочевины;

1-((3S,4R)-4-(3-фторфенил)-1-(2,2,2-трифторэтил)пирролидин-3-ил)-3-(1-метил-3-фенил-1Н-пиразол-5-ил)мочевины;

1-((3R,4S)-4-(3-фторфенил)-1-(2,2,2-трифторэтил)пирролидин-3-ил)-3-(2-фенил-2,4,5,6-тетрагидроциклопента[с]пиразол-3-ил)мочевины;

1-(3-этокси-4-метил-1-фенил-1Н-пиразол-5-ил)-3-((3R,3S)-4-(3-фторфенил)-1-(2,2,2-трифторэтил)пирролидин-3-ил)мочевины;

1-((транс)-1-(1,3-дифторпропан-2-ил)-4-фенилпирролидин-3-ил)-3-(2-фенил-2,4,5,6-тетрагидроциклопента[с]пиразол-3-ил)мочевины;

(транс)-трет-бутил-3-(3-метоксифенил)-4-(3-(2-фенил-2,4,5,6-тетрагидроциклопента[с]пиразол-3-ил)уреидо)пирролидин-1-карбоксилата;

1-((транс)-4-(3-хлорфенил)-1-(2,2,2-трифторэтил)пирролидин-3-ил)-3-(2-фенил-2,4,5,6-тетрагидроциклопента[с]пиразол-3-ил)мочевины;

1-(2-фенил-2,4,5,6-тетрагидроциклопента[с]пиразол-3-ил)-3-((транс)-4-(пиридин-2-ил)-1-(2,2,2-трифторэтил)пирролидин-3-ил)мочевины;

1-((транс)-4-(4-фторфенил)-1-(2,2,2-трифторэтил)пирролидин-3-ил)-3-(2-фенил-2,4,5,6-тетрагидроциклопента[с]пиразол-3-ил)мочевины;

1-((транс)-4-(4-хлорфенил)-1-(2,2,2-трифторэтил)пирролидин-3-ил)-3-(2-фенил-2,4,5,6-тетрагидроциклопента[с]пиразол-3-ил)мочевины;

1-((транс)-4-(2-хлорфенил)-1-(2,2,2-трифторэтил)пирролидин-3-ил)-3-(2-фенил-2,4,5,6-тетрагидроциклопента[с]пиразол-3-ил)мочевины;

1-(2-фенил-2,4,5,6-тетрагидроциклопента[с]пиразол-3-ил)-3-((транс)-4-(пиридин-3-ил)-1-(2,2,2-трифторэтил)пирролидин-3-ил)мочевины;

1-((транс)-4-(2-фторфенил)-1-(2,2,2-трифторэтил)пирролидин-3-ил)-3-(2-фенил-2,4,5,6-тетрагидроциклопента[с]пиразол-3-ил)мочевины;

1-((транс)-4-(4-фторфенил)-1-(2,2-дифторэтил)пирролидин-3-ил)-3-(2-фенил-2,4,5,6-тетрагидроциклопента[с]пиразол-3-ил)мочевины;

1-((3S,4R)-4-(3,4-дифторфенил)-1-(1Н-пиразол-4-ил)пирролидин-3-ил)-3-(3-этокси-4-метил-1-фенил-1Н-пиразол-5-ил)мочевины;

1-((3S,4R)-4-(3,5-дифторфенил)-1-(1Н-пиразол-4-ил)пирролидин-3-ил)-3-(3-этокси-4-метил-1-фенил-1Н-пиразол-5-ил)мочевины;

1-((3S,4R)-4-(3,5-дифторфенил)-1-(1Н-пиразол-3-ил)пирролидин-3-ил)-3-(3-этокси-4-метил-1-фенил-1Н-пиразол-5-ил)мочевины;

1-((3S,4R)-4-(3,4-дифторфенил)-1-(3-метил-1Н-пиразол-4-ил)пирролидин-3-ил)-3-(3-этокси-4-метил-1-фенил-1Н-пиразол-5-ил)мочевины;

1-((3S,4R)-4-(3,4-дифторфенил)-1-(3-(трифторметил)-1Н-пиразол-4-ил)пирролидин-3-ил)-3-(3-этокси-4-метил-1-фенил-1Н-пиразол-5-ил)мочевины;

1-((3S,4R)-4-(3,4-дифторфенил)-1-(1Н-пиразол-4-ил)пирролидин-3-ил)-3-(3-((S)-2-гидроксипропокси)-4-метил-1-фенил-1Н-пиразол-5-ил)мочевины;

1-((3S,4R)-4-(3,4-дифторфенил)-1-(1Н-пиразол-4-ил)пирролидин-3-ил)-3-(3-((R)-2,3-дигидроксипропокси)-4-метил-1-фенил-1Н-пиразол-5-ил)мочевины;

1-((3S,4R)-4-(3,5-дифтор-фенил)-1-(1Н-пиразол-4-ил)пирролидин-3-ил)-3-(3,4-диметил-

1-фенил-1Н-пиразол-5-ил)мочевины;

1-((3S,4R)-4-(3,4-дифторфенил)-1-(1Н-пиразол-4-ил)пирролидин-3-ил)-3-(3,4-диметил-1-фенил-1Н-пиразол-5-ил)мочевины;

1-((3S,4R)-4-(3,4-дифторфенил)-1-(1Н-пиразол-4-ил)пирролидин-3-ил)-3-(3-(3-метоксипропил)-4-метил-1-фенил-1Н-пиразол-5-ил)мочевины;

1-((3S,4R)-4-(3,4-дифторфенил)-1-(1Н-пиразол-4-ил)пирролидин-3-ил)-3-(3-(2-метоксиэтокси)-4-метил-1-фенил-1Н-пиразол-5-ил)мочевины;

1-((3S,4R)-4-(3,4-дифторфенил)-1-(1Н-пиразол-4-ил)пирролидин-3-ил)-3-(3-(2-гидрокси-2-метилпропокси)-4-метил-1-фенил-1Н-пиразол-5-ил)мочевины;

1-(3-этокси-4-метил-1-фенил-1Н-пиразол-5-ил)-3-((3S,4R)-1-(1-метил-1Н-пиразол-5-ил)-4-фенилпирролидин-3-ил)мочевины;

1-(3-этокси-4-метил-1-фенил-1Н-пиразол-5-ил)-3-((3R,4S)-1-(1-метил-1Н-пиразол-5-ил)-4-фенилпирролидин-3-ил)мочевины;

1-((3S,4R)-4-(3,5-дифторфенил)-1-(1-метил-1Н-пиразол-5-ил)пирролидин-3-ил)-3-(3-этокси-4-метил-1-фенил-1Н-пиразол-5-ил)мочевины;

1-((3R,4S)-4-(3,5-дифторфенил)-1-(1-метил-1Н-пиразол-5-ил)пирролидин-3-ил)-3-(3-этокси-4-метил-1-фенил-1Н-пиразол-5-ил)мочевины;

1-((3S,4R)-4-(3,4-дифторфенил)-1-фенилпирролидин-3-ил)-3-(3-этокси-4-метил-1-фенил-1Н-пиразол-5-ил)мочевины;

1-((3S,4R)-4-(3,4-дифторфенил)-1-(2-метоксифенил)пирролидин-3-ил)-3-(3-этокси-4-метил-1-фенил-1Н-пиразол-5-ил)мочевины;

1-(3-этокси-4-метил-1-фенил-1Н-пиразол-5-ил)-3-((3S,4R)-1-(2-фторфенил)-4-фенилпирролидин-3-ил)мочевины;

1-(3-этокси-4-метил-1-фенил-1Н-пиразол-5-ил)-3-((3S,4R)-1-(4-фторфенил)-4-фенилпирролидин-3-ил)мочевины;

1-(3-этокси-4-метил-1-фенил-1Н-пиразол-5-ил)-3-((3S,4R)-1-(2-метилфенил)-4-фенилпирролидин-3-ил)мочевины;

1-(3-этокси-4-метил-1-фенил-1Н-пиразол-5-ил)-3-((3S,4R)-1-(2-метоксифенил)-4-фенилпирролидин-3-ил)мочевины;

1-(3-этокси-4-метил-1-фенил-1Н-пиразол-5-ил)-3-((3S,4R)-1-(2-хлорфенил)-4-фенилпирролидин-3-ил)мочевины;

1-(3-этокси-4-метил-1-фенил-1Н-пиразол-5-ил)-3-((3S,4R)-4-фенил-1-(2-(трифторметокси)фенил)пирролидин-3-ил)мочевины;

1-((3S,4R)-1-(2,6-дифторфенил)-4-фенилпирролидин-3-ил)-3-(3-этокси-4-метил-1-фенил-1Н-пиразол-5-ил)мочевины;

1-(3-этокси-4-метил-1-фенил-1Н-пиразол-5-ил)-3-((3S,4R)-1-(2-метоксипиридин-4-ил)-4-фенилпирролидин-3-ил)мочевины;

1-(3-этокси-4-метил-1-фенил-1Н-пиразол-5-ил)-3-((3S,4R)-1-(2-метоксипиридин-3-ил)-4-фенилпирролидин-3-ил)мочевины;

1-(3-этокси-4-метил-1-фенил-1Н-пиразол-5-ил)-3-((3S,4R)-1-(2-этоксипиридин-3-ил)-4-фенилпирролидин-3-ил)мочевины;

1-(1',4'-диметил-1-фенил-1Н,1'Н-[3,4'-бипиразол]-5-ил)-3-((3S,4R)-1-(2-метоксипиридин-3-ил)-4-фенилпирролидин-3-ил)мочевины;

1-((3S,4R)-1-(2-метоксипиридин-3-ил)-4-фенилпирролидин-3-ил)-3-(4-метил-1,3-дифенил-1Н-пиразол-5-ил)мочевины;

1-(4-бром-1'-метил-1-фенил-1Н,1'Н-[3,4'-бипиразол]-5-ил)-3-((3S,4R)-1-(2-метоксипиридин-3-ил)-4-фенилпирролидин-3-ил)мочевины;

1-(4-бром-1,3-дифенил-1Н-пиразол-5-ил)-3-((3S,4R)-1-(2-метоксипиридин-3-ил)-4-

фенилпирролидин-3-ил)мочевины;

1-((3S,4R)-1-((1,2,3-тиадиазол-4-ил)метил)-4-(3,4-дифторфенил)пирролидин-3-ил)-3-(2-фенил-2,4,5,6-тетрагидро циклопента[с]пиразол-3-ил)мочевины;

1-((3S,4R)-1-((1,2,3-тиадиазол-4-ил)метил)-4-(3,4-дифторфенил)пирролидин-3-ил)-3-
5 (3-этокси-4-метил-1-фенил-1Н-пиразол-5-ил)мочевины;

1-((3S,4R)-1-((1,2,3-тиадиазол-4-ил)метил)-4-(3,4-дифторфенил)пирролидин-3-ил)-3-(3-(цианометокси)-4-метил-1-фенил-1Н-пиразол-5-ил)мочевины;

1-((3S,4R)-1-((1,2,3-тиадиазол-4-ил)метил)-4-(3,4-дифторфенил)пирролидин-3-ил)-3-(1',4-диметил-1-фенил-1Н,1'Н-3,4'-бипиразол-5-ил)мочевины;

10 1-((3S,4R)-1-((1,2,3-тиадиазол-4-ил)метил)-4-(3,4-дифторфенил)пирролидин-3-ил)-3-(4-метил-3-(1-метил-1Н-имидазол-4-ил)-1-фенил-1Н-пиразол-5-ил)мочевины;

1-((3S,4R)-4-(3,4-дифторфенил)-1-((1-метил-1Н-1,2,3-триазол-4-ил)метил)пирролидин-3-ил)-3-(2-фенил-2,4,5,6-тетрагидроциклопента[с]пиразол-3-ил)мочевины;

1-((3S,4R)-4-(3,4-дифторфенил)-1-(1,3-диметоксипропан-2-ил)пирролидин-3-ил)-3-(3-
15 этокси-4-метил-1-фенил-1Н-пиразол-5-ил)мочевины;

1-((3S,4R)-4-(3,4-дифторфенил)-1-(1-метоксипропан-2-ил)пирролидин-3-ил)-3-(3-этокси-4-метил-1-фенил-1Н-пиразол-5-ил)мочевины;

1-((транс)-4-(4-фторфенил)-1-(2-(метиламино)этил)пирролидин-3-ил)-3-(2-фенил-2,4,5,6-тетрагидроциклопента[с]пиразол-3-ил)мочевины;

20 1-((транс)-1-((1Н-имидазол-2-ил)метил)-4-фенилпирролидин-3-ил)-3-(2-фенил-2,4,5,6-тетрагидроциклопента[с]пиразол-3-ил)мочевины;

метил-3-метокси-2-((транс)-3-фенил-4-(3-(2-фенил-2,4,5,6-тетрагидроциклопента[с]пиразол-3-ил)уреидо)пирролидин-1-ил)пропаноата;

1-((3S,4R)-4-(3,4-дифторфенил)-1-(1-метоксипропан-2-ил)пирролидин-3-ил)-3-(3-
25 этокси-4-метил-1-фенил-1Н-пиразол-5-ил)мочевины;

1-((3S,4R)-4-(3,4-дифторфенил)-1-(1-гидрокси-3-метоксипропан-2-ил)пирролидин-3-ил)-3-(2-фенил-2,4,5,6-тетрагидроциклопента[с]пиразол-3-ил)мочевины;

1-((3S,4R)-4-(3,4-дифторфенил)-1-(3-гидрокси-1-метокси-3-метилбутан-2-ил)пирролидин-3-ил)-3-(2-фенил-2,4,5,6-тетрагидроциклопента[с]пиразол-3-ил)мочевины;

30 гидрокорида 2-((3R,4S)-3-(3,4-дифторфенил)-4-(3-(2-фенил-2,4,5,6-тетрагидроциклопента[с]пиразол-3-ил)уреидо)пирролидин-1-ил)-3-метоксипропионовой кислоты;

1-((3S,4R)-4-(3,4-дифторфенил)-1-(1-гидрокси-3-метоксипропан-2-ил)пирролидин-3-ил)-3-(3-этокси-4-метил-1-фенил-1Н-пиразол-5-ил)мочевины;

35 1-(4-хлор-1'-метил-1-фенил-1Н,1'Н-3,4'-бипиразол-5-ил)-3-((3S,4R)-4-(3,4-дифторфенил)-1-(1-гидрокси-3-метоксипропан-2-ил)пирролидин-3-ил)мочевины;

1-((3S,4R)-4-(3,4-дифторфенил)-1-(2-метоксиэтил)пирролидин-3-ил)-3-(3-метокси-1-фенил-4-(трифторметил)-1Н-пиразол-5-ил)мочевины;

1-(3-(2-фторэтокси)-4-метил-1-фенил-1Н-пиразол-5-ил)-3-((3R,4S)-4-фенил-1-(2,2,2-
40 трифторэтил)пирролидин-3-ил)мочевины;

1-(3-этокси-4-метил-1-фенил-1Н-пиразол-5-ил)-3-((3R,4S)-4-фенил-1-(2,2,2-трифторэтил)пирролидин-3-ил)мочевины;

1-(3-(цианометокси)-4-метил-1-фенил-1Н-пиразол-5-ил)-3-((3R,4S)-4-фенил-1-(2,2,2-трифторэтил)пирролидин-3-ил)мочевины;

45 1-(1',4-диметил-1-фенил-1Н,1'Н-3,4'-бипиразол-5-ил)-3-((3R,4S)-4-фенил-1-(2,2,2-трифторэтил)пирролидин-3-ил)мочевины;

1-(4-хлор-1'-метил-1-фенил-1Н,1'Н-3,4'-бипиразол-5-ил)-3-((3R,4S)-4-фенил-1-(2,2,2-трифторэтил)пирролидин-3-ил)мочевины;

1-(3-(((S)-2,2-диметил-1,3-диоксолан-4-ил)метокси)-4-метил-1-фенил-1Н-пиразол-5-ил)-3-((3R,4S)-4-фенил-1-(2,2,2-трифторэтил)пирролидин-3-ил)мочевины;

1-(3-((R)-2,3-дигидроксипропоксид)-4-метил-1-фенил-1Н-пиразол-5-ил)-3-((3R,4S)-4-фенил-1-(2,2,2-трифторэтил)пирролидин-3-ил)мочевины;

5 (R,S)-1-((3(3,4 α ,5 α)-2-метил-4-фенил-1-(2,2,2-трифторэтил)пирролидин-3-ил)-3-(2-фенил-2,4,5,6-тетрагидроциклопента[с]пиразол-3-ил)мочевины;

(R,S)-1-((3(3,4 α ,5 α)-5-метил-4-фенил-1-(2,2,2-трифторэтил)пирролидин-3-ил)-3-(2-фенил-2,4,5,6-тетрагидроциклопента[с]пиразол-3-ил)мочевины;

10 1-((3S,4R)-4-(3,4-дифторфенил)-1-((S)-1,1,1-трифтор-3-гидроксипропан-2-ил)пирролидин-3-ил)-3-(3-этокси-4-метил-1-фенил-1Н-пиразол-5-ил)мочевины;

1-((3S,4R)-4-(3,4-дифторфенил)-1-((S)-1,1,1-трифтор-3-метоксипропан-2-ил)пирролидин-3-ил)-3-(3-этокси-4-метил-1-фенил-1Н-пиразол-5-ил)мочевины;

1-((3S,4R)-4-(3,4-дифторфенил)-1-((S)-1,1,1-трифтор-3-метоксипропан-2-ил)пирролидин-3-ил)-3-(3-((S)-2-гидроксипропоксид)-4-метил-1-фенил-1Н-пиразол-5-ил)

15 мочевины;

1-(4-хлор-1'-метил-1-фенил-1Н, 1'Н-3,4'-бипиразол-5-ил)-3-((3S,4R)-4-(3,4-дифторфенил)-1-((R)-1,1,1-трифтор-3-метоксипропан-2-ил)пирролидин-3-ил)мочевины;

1-((3S,4R)-4-(3,4-дифторфенил)-1-((R)-1,1,1-трифтор-3-метоксипропан-2-ил)пирролидин-3-ил)-3-(3-((S)-2-гидроксипропоксид)-4-метил-1-фенил-1Н-пиразол-5-ил)

20 мочевины;

1-((3S,4R)-4-(3,4-дифторфенил)-1-(2-метоксиэтил)пирролидин-3-ил)-3-(3-метил-4-(метилтио)-1-фенил-1Н-пиразол-5-ил)мочевины;

1-((3S,4R)-4-(3,5-дифторфенил)-1-(2-метоксиэтил)пирролидин-3-ил)-3-(3-(3-метоксипропил)-4-метил-1-фенил-1Н-пиразол-5-ил)мочевины;

25 1-(3-(1,1-дифтор-2-гидроксиэтил)-4-метил-1-фенил-1Н-пиразол-5-ил)-3-((3S,4R)-4-(3,4-дифторфенил)-1-(2-метоксиэтил)пирролидин-3-ил)мочевины;

1-(3-(1,1-дифтор-2-гидроксиэтил)-4-метил-1-фенил-1Н-пиразол-5-ил)-3-((3S,4R)-4-(3,5-дифторфенил)-1-(2-метоксиэтил)пирролидин-3-ил)мочевины;

30 1-(3-(1,1-дифтор-2-гидроксиэтил)-4-метил-1-фенил-1Н-пиразол-5-ил)-3-((3S,4R)-4-(4-фторфенил)-1-(2-метоксиэтил)пирролидин-3-ил)мочевины;

1-(3-(1,1-дифтор-2-гидроксиэтил)-1-фенил-1Н-пиразол-5-ил)-3-((3S,4R)-4-(3,4-дифторфенил)-1-(2-метоксиэтил)пирролидин-3-ил)мочевины;

1-((3S,4R)-4-(3,5-дифторфенил)-1-(2-метоксиэтил)пирролидин-3-ил)-3-(3-(2-гидроксиэтил)-4-метил-1-фенил-1Н-пиразол-5-ил)мочевины;

35 1-((3S,4R)-4-(4-фторфенил)-1-(2-метоксиэтил)пирролидин-3-ил)-3-(3-(2-гидроксиэтил)-4-метил-1-фенил-1Н-пиразол-5-ил)мочевины;

1-((3S,4R)-4-(3,4-дифторфенил)-1-(2-метоксиэтил)пирролидин-3-ил)-3-(3-(2-гидрокси-2-метилпропил)-4-метил-1-фенил-1Н-пиразол-5-ил)мочевины;

40 1-((3S,4R)-4-(3,4-дифторфенил)-1-(2-метоксиэтил)пирролидин-3-ил)-3-(3-((S)-2-гидроксипропил)-4-метил-1-фенил-1Н-пиразол-5-ил)мочевины;

1-((3S,4R)-4-(3,4-дифторфенил)-1-(2-метоксиэтил)пирролидин-3-ил)-3-(3-((R)-2-гидроксипропил)-4-метил-1-фенил-1Н-пиразол-5-ил)мочевины;

этил-5-(3-((3S,4R)-4-(3,4-дифторфенил)-1-(2-метоксиэтил)пирролидин-3-ил)уреидо)-4-метил-1-фенил-1Н-пиразол-3-карбоксилата;

45 5-(3-((3S,4R)-4-(4-фторфенил)-1-(2-метоксиэтил)пирролидин-3-ил)уреидо)-N,4-диметил-1-фенил-1Н-пиразол-3-карбоксамид;

1-(транс-4-(3-хлор-4-фторфенил)-1-(2-метоксиэтил)пирролидин-3-ил)-3-(1',4-диметил-1-фенил-1Н,1'Н-[3,4'-бипиразол]-5-ил)мочевины;

1-(транс-4-(4-хлор-3-фторфенил)-1-(2-метоксиэтил)пирролидин-3-ил)-3-(1',4-диметил-1-фенил-1Н,1'Н-[3,4'-бипиразол]-5-ил)мочевины;

1-(транс-4-(3-хлор-5-фторфенил)-1-(2-метоксиэтил)пирролидин-3-ил)-3-(1',4-диметил-1-фенил-1Н,1'Н-[3,4'-бипиразол]-5-ил)мочевины;

5 1-(транс-4-(3-хлорфенил)-1-(2-метоксиэтил)пирролидин-3-ил)-3-(1',4-диметил-1-фенил-1Н,1'Н-[3,4'-бипиразол]-5-ил)мочевины;

1-((3S,4R)-4-(3,4-дифторфенил)-1-(2-метоксиэтил)пирролидин-3-ил)-3-(4-метил-3-(5-метил-1,3,4-оксадиазол-2-ил)-1-фенил-1Н-пиразол-5-ил)мочевины;

10 1-((3S,4R)-4-(3,4-дифторфенил)-1-(2-метоксиэтил)пирролидин-3-ил)-3-(4-метил-3-(3-метил-1,2,4-оксадиазол-5-ил)-1-фенил-1Н-пиразол-5-ил)мочевины;

1-((3S,4R)-4-(3,4-дифторфенил)-1-(2-метоксиэтил)пирролидин-3-ил)-3-(4-метил-1-фенил-3-(3-(трифторметил)-1,2,4-оксадиазол-5-ил)-1Н-пиразол-5-ил)мочевины;

1-((3S,4R)-4-(4-фторфенил)-1-(2-метоксиэтил)пирролидин-3-ил)-3-(4-метил-1-фенил-3-(3-(трифторметил)-1,2,4-оксадиазол-5-ил)-1Н-пиразол-5-ил)мочевины;

15 5-(3-(транс-4-(3-хлор-4-фторфенил)-1-(2-метоксиэтил)пирролидин-3-ил)уреидо)-N,4-диметил-1-фенил-1Н-пиразол-3-карбоксамида;

5-(3-(транс-4-(4-хлор-3-фторфенил)-1-(2-метоксиэтил)пирролидин-3-ил)уреидо)-N,4-диметил-1-фенил-1Н-пиразол-3-карбоксамида;

20 1-(транс-4-(4-хлор-3-фторфенил)-1-(2-метоксиэтил)пирролидин-3-ил)-3-(4-метил-3-(1-метил-2-оксо-1,2-дигидропиридин-4-ил)-1-фенил-1Н-пиразол-5-ил)мочевины;

1-(транс-4-(3-хлор-4-фторфенил)-1-(2-метоксиэтил)пирролидин-3-ил)-3-(4-метил-3-(1-метил-2-оксо-1,2-дигидропиридин-4-ил)-1-фенил-1Н-пиразол-5-ил)мочевины;

1-((3S,4R)-4-(3,4-дифторфенил)-1-(2-метоксиэтил)пирролидин-3-ил)-3-(1',4,5'-триметил-1-фенил-1Н,1'Н-[3,3'-бипиразол]-5-ил)мочевины;

25 1-((3S,4R)-4-(3,5-дифторфенил)-1-(2-метоксиэтил)пирролидин-3-ил)-3-(1',4,5'-триметил-1-фенил-1Н,1'Н-[3,3'-бипиразол]-5-ил)мочевины;

1-((3S,4R)-4-(4-фторфенил)-1-(2-метоксиэтил)пирролидин-3-ил)-3-(1',4,5'-триметил-1-фенил-1Н,1'Н-[3,3'-бипиразол]-5-ил)мочевины;

30 1-((3S,4R)-4-(3,4-дифторфенил)-1-(2-метоксиэтил)пирролидин-3-ил)-3-(2',4,5'-триметил-1-фенил-1Н,2'Н-[3,3'-бипиразол]-5-ил)мочевины;

1-(4-циклопропил-1'-метил-1-фенил-1Н,1'Н-[3,4'-бипиразол]-5-ил)-3-((3S,4R)-4-(3,4-дифторфенил)-1-(2-метоксиэтил)пирролидин-3-ил)мочевины;

1-((3S,4R)-4-(3,4-дифторфенил)-1-(2-метоксиэтил)пирролидин-3-ил)-3-(4-изопропил-1'-метил-1-фенил-1Н,1'Н-[3,4'-бипиразол]-5-ил)мочевины;

35 1-((3S,4R)-4-(3,4-дифторфенил)-1-(2-метоксиэтил)пирролидин-3-ил)-3-(4-этил-1'-метил-1-фенил-1Н,1'Н-[3,4'-бипиразол]-5-ил)мочевины;

1-((3S,4R)-4-(3,4-дифторфенил)-1-(2-метоксиэтил)пирролидин-3-ил)-3-(1-(4-фторфенил)-1',4-диметил-1Н,1'Н-[3,4'-бипиразол]-5-ил)мочевины;

40 1-((3S,4R)-4-(3,4-дифторфенил)-1-(2-метоксиэтил)пирролидин-3-ил)-3-(1-(3-фторфенил)-1',4-диметил-1Н,1'Н-[3,4'-бипиразол]-5-ил)мочевины;

1-((3S,4R)-4-(3,4-дифторфенил)-1-(2-метоксиэтил)пирролидин-3-ил)-3-(1-(2-фторфенил)-1',4-диметил-1Н,1'Н-[3,4'-бипиразол]-5-ил)мочевины;

1-((3S,4R)-4-(3,4-дифторфенил)-1-(2-метоксиэтил)пирролидин-3-ил)-3-(1-(3-хлорфенил)-1',4-диметил-1Н,1'Н-[3,4'-бипиразол]-5-ил)мочевины;

45 1-(1-(3-хлор-4-фторфенил)-1',4-диметил-1Н,1'Н-[3,4'-бипиразол]-5-ил)-3-((3S,4R)-4-(3,4-дифторфенил)-1-(2-метоксиэтил)пирролидин-3-ил)мочевины;

1-(1-(3-хлор-2-фторфенил)-1',4-диметил-1Н,1'Н-[3,4'-бипиразол]-5-ил)-3-((3S,4R)-4-(3,4-дифторфенил)-1-(2-метоксиэтил)пирролидин-3-ил)мочевины;

1-((3S,4R)-4-(4-фторфенил)-1-(2-метоксиэтил)пирролидин-3-ил)-3-(1-(4-фторфенил)-1',4-диметил-1Н,1'Н-[3,4'-бипиразол]-5-ил)мочевины;

1-((3S,4R)-4-(4-фторфенил)-1-(2-метоксиэтил)пирролидин-3-ил)-3-(1-(3-фторфенил)-1',4-диметил-1Н,1'Н-[3,4'-бипиразол]-5-ил)мочевины;

5 1-((3S,4R)-4-(4-фторфенил)-1-(2-метоксиэтил)пирролидин-3-ил)-3-(1-(2-фторфенил)-1',4-диметил-1Н,1'Н-[3,4'-бипиразол]-5-ил)мочевины;

1-((3S,4R)-4-(3,4-фторфенил)-1-(2-метоксиэтил)пирролидин-3-ил)-3-(1-(3-хлорфенил)-1',4-диметил-1Н,1'Н-[3,4'-бипиразол]-5-ил)мочевины;

10 1-(1-(3-хлор-4-фторфенил)-1',4-диметил-1Н,1'Н-[3,4'-бипиразол]-5-ил)-3-((3S,4R)-4-(4-дифторфенил)-1-(2-метоксиэтил)пирролидин-3-ил)мочевины;

1-(1-(3-хлор-2-фторфенил)-1',4-диметил-1Н,1'Н-[3,4'-бипиразол]-5-ил)-3-((3S,4R)-4-(4-дифторфенил)-1-(2-метоксиэтил)пирролидин-3-ил)мочевины;

1-((3S,4R)-4-(2,4-дифторфенил)-1-(2-метоксиэтил)пирролидин-3-ил)-3-(1',4-диметил-1-фенил-1Н,1'Н-[3,4'-бипиразол]-5-ил)мочевины;

15 1-((3S,4R)-4-(3-цианофенил)-1-(2-метоксиэтил)пирролидин-3-ил)-3-(1',4-диметил-1-фенил-1Н,1'Н-[3,4'-бипиразол]-5-ил)мочевины;

1-((3S,4R)-4-(4-цианофенил)-1-(2-метоксиэтил)пирролидин-3-ил)-3-(1',4-диметил-1-фенил-1Н,1'Н-[3,4'-бипиразол]-5-ил)мочевины;

1-(1',4-диметил-1-фенил-1Н,1'Н-[3,4'-бипиразол]-5-ил)-3-((3S,4R)-1-(2-метоксиэтил)-20 4-(п-толил)пирролидин-3-ил)мочевины;

1-((3S,4R)-4-(3,4-дифторфенил)-1-(2-метоксиэтил)пирролидин-3-ил)-3-(4-метил-1,3-дифенил-1Н-пиразол-5-ил)мочевины;

1-((3S,4R)-4-(3,5-дифторфенил)-1-(2-метоксиэтил)пирролидин-3-ил)-3-(4-метил-1,3-дифенил-1Н-пиразол-5-ил)мочевины;

25 1-((3S,4R)-4-(3,4,5-трифторфенил)-1-(2-метоксиэтил)пирролидин-3-ил)-3-(4-метил-1,3-дифенил-1Н-пиразол-5-ил)мочевины;

1-((3S,4R)-4-(4-фторфенил)-1-(2-метоксиэтил)пирролидин-3-ил)-3-(4-метил-1,3-дифенил-1Н-пиразол-5-ил)мочевины;

1-(4-бром-3-метил-1-фенил-1Н-пиразол-5-ил)-3-транс-1-(2-метоксиэтил)-4-(1-метил-30 1Н-пиразол-4-ил)пирролидин-3-ил)мочевины;

1-(1',4-диметил-1-фенил-1Н,1'Н-[3,4'-бипиразол]-5-ил)-3-(транс-1-(2-метоксиэтил)-4-(1-метил-1Н-пиразол-4-ил)пирролидин-3-ил)мочевины;

1-(1',4-диметил-1-фенил-1Н,1'Н-[3,4'-бипиразол]-5-ил)-3-((транс-1-(2-метоксиэтил)-4-(1,2,3-тиадиазол-4-ил)пирролидин-3-ил)мочевины;

35 1-(3-этокси-4-метил-1-фенил-1Н-пиразол-5-ил)-3-(транс-1-(2-метоксиэтил)-4-(3-(трифторметил)фенил)пирролидин-3-ил)мочевины;

1-(3,4-диметил-1-фенил-1Н-пиразол-5-ил)-3-((3S,4R)-1-(2-метоксиэтил)-4-(3-(трифторметил)фенил)пирролидин-3-ил)мочевины;

1-((3S,4R)-4-(5-фторпиридин-3-ил)-1-(2-метоксиэтил)пирролидин-3-ил)-3-(2-фенил-40 2,4,5,6-тетрагидроциклопента[с]пиразол-3-ил)мочевины;

1-((3R,4S)-4-(5-фторпиридин-3-ил)-1-(2-метоксиэтил)пирролидин-3-ил)-3-(2-фенил-2,4,5,6-тетрагидроциклопента[с]пиразол-3-ил)мочевины;

1-(3-(2-фторэтокси)-4-метил-1-фенил-1Н-пиразол-5-ил)-3-((3S,4R)-4-(5-фторпиридин-3-ил)-1-(2-метоксиэтил)пирролидин-3-ил)мочевины;

45 1-(3-(2-фторэтокси)-4-метил-1-фенил-1Н-пиразол-5-ил)-3-((3R,4S)-4-(5-фторпиридин-3-ил)-1-(2-метоксиэтил)пирролидин-3-ил)мочевины;

1-(транс-4-(5-фторпиридин-3-ил)-1-(2-метоксиэтил)пирролидин-3-ил)-3-(2-фенил-2,4,5,6-тетрагидроциклопента[с]пиразол-3-ил)мочевины;

1-(транс-4-(5-хлорпиридин-3-ил)-1-(2-метоксиэтил)пирролидин-3-ил)-3-(3-этокси-4-метил-1-фенил-1Н-пиразол-5-ил)мочевины;

1-(транс-4-(5-хлорпиридин-3-ил)-1-(2-метоксиэтил)пирролидин-3-ил)-3-(3,4-диметил-1-фенил-1Н-пиразол-5-ил)мочевины;

5 1-(транс-4-(5-фторпиридин-3-ил)-1-(2-метоксиэтил)пирролидин-3-ил)-3-(4-метил-1,3-дифенил-1Н-пиразол-5-ил)мочевины;

1-(1',4-диметил-1-фенил-1Н,1'Н-[3,4'-бипиразол]-5-ил)-3-(транс-4-(5-фторпиридин-2-ил)-1-(2-метоксиэтил)пирролидин-3-ил)мочевины;

10 1-(1',4-диметил-1-фенил-1Н,1'Н-[3,4'-бипиразол]-5-ил)-3-((3S,4R)-4-(3-фторпиридин-4-ил)-1-(2-метоксиэтил)пирролидин-3-ил)мочевины;

1-((3S,4R)-4-(3,4-дифторфенил)-1-(2-метоксиэтил)пирролидин-3-ил)-3-(4-метил-3-(1-метил-1Н-1,2,4-триазол-3-ил)-1-фенил-1Н-пиразол-5-ил)мочевины;

1-((3S,4R)-4-(3,4-дифторфенил)-1-(2-метоксиэтил)пирролидин-3-ил)-3-(1'-(2-метоксиэтил)-4-метил-1-фенил-1Н,1'Н-[3,4'-бипиразол]-5-ил)мочевины;

15 1-(3-циано-4-метил-1-фенил-1Н-пиразол-5-ил)-3-((3S,4R)-4-(3,4-дифторфенил)-1-(2-метоксиэтил)пирролидин-3-ил)мочевины;

1-((3S,4R)-4-(3,4-дифторфенил)-1-(2-метоксиэтил)пирролидин-3-ил)-3-(1'-(2-гидроксиэтил)-4-метил-1-фенил-1Н,1'Н-[3,4'-бипиразол]-5-ил)мочевины;

1-((3S,4R)-4-(3,4-дифторфенил)-1-(2-метоксиэтил)пирролидин-3-ил)-3-(4-метил-3-(2-метил-2Н-1,2,3-триазол-4-ил)-1-фенил-1Н-пиразол-5-ил)мочевины;

20 1-(3-бром-4-метил-1-фенил-1Н-пиразол-5-ил)-3-((3S,4R)-4-(3,4-дифторфенил)-1-(2-метоксиэтил)пирролидин-3-ил)мочевины;

1-((3S,4R)-4-(3,4-дифторфенил)-1-(2-метоксиэтил)пирролидин-3-ил)-3-(5-метил-6-оксо-2-фенил-2,4,5,6-тетрагидропирроло[3,4-с]пиразол-3-ил)мочевины;

25 1-((3S,4R)-4-(3,5-дифторфенил)-1-(2-метоксиэтил)пирролидин-3-ил)-3-(5-метил-6-оксо-2-фенил-2,4,5,6-тетрагидропирроло[3,4-с]пиразол-3-ил)мочевины;

1-((3S,4R)-4-(3,4-дифторфенил)-1-(2-метоксиэтил)пирролидин-3-ил)-3-(4-метил-3-((5-метил-1,3,4-оксадиазол-2-ил)метокси)-1-фенил-1Н-пиразол-5-ил)мочевины;

1-(4-хлор-3-этокси-1-фенил-1Н-пиразол-5-ил)-3-((3S,4R)-4-(3,4-дифторфенил)-1-(2-метоксиэтил)пирролидин-3-ил)мочевины;

30 1-((3S,4R)-4-(3,4-дифторфенил)-1-(2-метоксиэтил)пирролидин-3-ил)-3-(3-этокси-4-фтор-1-фенил-1Н-пиразол-5-ил)мочевины;

1-(4-бром-3-(2-гидрокси-2-метилпропокси)-1-фенил-1Н-пиразол-5-ил)-3-((3S,4R)-4-(3,4-дифторфенил)-1-(2-метоксиэтил)пирролидин-3-ил)мочевины;

35 1-(4-хлор-3-(2-гидрокси-2-метилпропокси)-1-фенил-1Н-пиразол-5-ил)-3-((3S,4R)-4-(3,4-дифторфенил)-1-(2-метоксиэтил)пирролидин-3-ил)мочевины;

1-((3S,4R)-4-(3,4-дифторфенил)-1-(2-метоксиэтил)пирролидин-3-ил)-3-(3-((S)-2-гидроксибутокси)-4-метил-1-фенил-1Н-пиразол-5-ил)мочевины;

этил-2-((5-(3-((3S,4R)-4-(3,4-дифторфенил)-1-(2-метоксиэтил)пирролидин-3-ил)уреидо)-4-метил-1-фенил-1Н-пиразол-3-ил)окси)ацетата;

40 1-((3S,4R)-4-(4-фторфенил)-1-(2-метоксиэтил)пирролидин-3-ил)-3-(3-(2-гидрокси-2-метилпропокси)-4-метил-1-фенил-1Н-пиразол-5-ил)мочевины;

1-((3S,4R)-4-(3,4-дифторфенил)-1-(2-метоксиэтил)пирролидин-3-ил)-3-(3-(2-гидрокси-2-метилпропокси)-4-метил-1-фенил-1Н-пиразол-5-ил)мочевины;

45 1-((3S,4R)-4-(4-фторфенил)-1-(2-метоксиэтил)пирролидин-3-ил)-3-(3-((R)-2-гидроксипропокси)-4-метил-1-фенил-1Н-пиразол-5-ил)мочевины;

1-((3S,4R)-4-(3,4-дифторфенил)-1-(2-метоксиэтил)пирролидин-3-ил)-3-(3-((R)-2-гидроксипропокси)-4-метил-1-фенил-1Н-пиразол-5-ил)мочевины;

1-((3S,4R)-4-(3,5-дифторфенил)-1-(2-метоксиэтил)пирролидин-3-ил)-3-(3-((R)-2-гидроксипропокс)-4-метил-1-фенил-1H-пиразол-5-ил)мочевины;

1-((3S,4R)-4-(3,5-дифторфенил)-1-(2-метоксиэтил)пирролидин-3-ил)-3-(4-метил-1-фенил-3-((R)-3,3,3-трифтор-2-гидроксипропокс)-1H-пиразол-5-ил)мочевины;

5 1-((3S,4R)-4-(4-фторфенил)-1-(2-метоксиэтил)пирролидин-3-ил)-3-(3-((S)-2-гидроксипропокс)-4-метил-1-фенил-1H-пиразол-5-ил)мочевины;

1-((3S,4R)-4-(3,5-дифторфенил)-1-(2-метоксиэтил)пирролидин-3-ил)-3-(4-метил-1-фенил-3-((S)-3,3,3-трифтор-2-гидроксипропокс)-1H-пиразол-5-ил)мочевины;

10 1-(4-хлор-3-(2-гидрокси-2-метилпропокс)-1-фенил-1H-пиразол-5-ил)-3-((3S,4R)-4-(3,5-дифторфенил)-1-(2-метоксиэтил)пирролидин-3-ил)мочевины;

1-(4-хлор-3-(2-гидрокси-2-метилпропокс)-1-фенил-1H-пиразол-5-ил)-3-((3S,4R)-4-(4-фторфенил)-1-(2-метоксиэтил)пирролидин-3-ил)мочевины;

1-(4-хлор-3-((R)-2-гидроксипропокс)-1-фенил-1H-пиразол-5-ил)-3-((3S,4R)-4-(3,4-дифторфенил)-1-(2-метоксиэтил)пирролидин-3-ил)мочевины;

15 1-(4-хлор-3-((R)-2-гидроксипропокс)-1-фенил-1H-пиразол-5-ил)-3-((3S,4R)-4-(3,5-дифторфенил)-1-(2-метоксиэтил)пирролидин-3-ил)мочевины;

1-(4-хлор-3-((R)-2-гидроксипропокс)-1-фенил-1H-пиразол-5-ил)-3-((3S,4R)-4-(4-фторфенил)-1-(2-метоксиэтил)пирролидин-3-ил)мочевины;

20 1-(4-бром-3-((R)-2-гидроксипропокс)-1-фенил-1H-пиразол-5-ил)-3-((3S,4R)-4-(3,4-дифторфенил)-1-(2-метоксиэтил)пирролидин-3-ил)мочевины;

1-(4-бром-3-((R)-2-гидроксипропокс)-1-фенил-1H-пиразол-5-ил)-3-((3S,4R)-4-(3,5-дифторфенил)-1-(2-метоксиэтил)пирролидин-3-ил)мочевины;

1-(4-бром-3-((R)-2-гидроксипропокс)-1-фенил-1H-пиразол-5-ил)-3-((3S,4R)-4-(4-фторфенил)-1-(2-метоксиэтил)пирролидин-3-ил)мочевины;

25 1-((3S,4R)-4-(3,5-дифторфенил)-1-(2-метоксиэтил)пирролидин-3-ил)-3-(3-((R)-2-гидроксибутокс)-4-метил-1-фенил-1H-пиразол-5-ил)мочевины;

1-((3S,4R)-4-(4-фторфенил)-1-(2-метоксиэтил)пирролидин-3-ил)-3-(3-((R)-2-гидроксибутокс)-4-метил-1-фенил-1H-пиразол-5-ил)мочевины;

30 1-((3S,4R)-4-(3,4-дифторфенил)-1-(2-метоксиэтил)пирролидин-3-ил)-3-(3-((R)-2-гидроксибутокс)-4-метил-1-фенил-1H-пиразол-5-ил)мочевины;

этил-4-бром-5-(3-((3S,4R)-4-(3,4-дифторфенил)-1-(2-метоксиэтил)пирролидин-3-ил)уреидо)-1-фенил-1H-пиразол-3-карбоксилата;

1-((3S,4R)-4-(4-фторфенил)-1-(2-метоксиэтил)пирролидин-3-ил)-3-(1'-(2-метоксиэтил)-4-метил-1-фенил-1H,1'H-[3,4'-бипиразол]-5-ил)мочевины;

35 1-((3S,4R)-4-(3-фторфенил)-1-(2-метоксиэтил)пирролидин-3-ил)-3-(1'-(2-метоксиэтил)-4-метил-1-фенил-1H,1'H-[3,4'-бипиразол]-5-ил)мочевины;

1-((3S,4R)-4-(3-фторфенил)-1-(2-метоксиэтил)пирролидин-3-ил)-3-(4-метил-3-(2-метил-2H-1,2,3-триазол-4-ил)-1-фенил-1H-пиразол-5-ил)мочевины;

40 1-((3S,4R)-4-(4-фторфенил)-1-(2-метоксиэтил)пирролидин-3-ил)-3-(4-метил-3-(2-метил-2H-1,2,3-триазол-4-ил)-1-фенил-1H-пиразол-5-ил)мочевины;

1-((3S,4R)-4-(3,4-дифторфенил)-1-(2-метоксиэтил)пирролидин-3-ил)-3-(4-метил-3-(2-морфолиноэтокс)-1-фенил-1H-пиразол-5-ил)мочевины;

1-((3S,4R)-4-(3,4-дифторфенил)-1-(2-метоксиэтил)пирролидин-3-ил)-3-(3-(2-(1,3-диоксоизоиндолин-2-ил)этокс)-4-метил-1-фенил-1H-пиразол-5-ил)мочевины;

45 *трет*-бутил-4-(2-((5-(3-((3S,4R)-4-(3,4-дифторфенил)-1-(2-метоксиэтил)пирролидин-3-ил)уреидо)-4-метил-1-фенил-1H-пиразол-3-ил)окси)этил)пиперазин-1-карбоксилата;

транс-1-(2-метоксиэтил)-4-фенилпирролидин-3-ил)-3-(2-фенил-2H-индазол-3-ил)мочевины;

1-((3S,4R)-4-(3,4-дифторфенил)-1-(2-метоксиэтил)пирролидин-3-ил)-3-(2-фенил-2Н-индазол-3-ил)мочевины;

1-((3S,4R)-4-(3,4-дифторфенил)-1-(2-метоксиэтил)пирролидин-3-ил)-3-(4-метил-3-((1-метил-1Н-1,2,4-триазол-3-ил)метокси)-1-фенил-1Н-пиразол-5-ил)мочевины;

5 1-((3S,4R)-4-(3,5-дифторфенил)-1-(2-метоксиэтил)пирролидин-3-ил)-3-(3-((R)-2,2-диметил-1,3-диоксолан-4-ил)метокси)-4-метил-1-фенил-1Н-пиразол-5-ил)мочевины;

1-((3S,4R)-4-(3,5-дифторфенил)-1-(2-метоксиэтил)пирролидин-3-ил)-3-(3-((S)-2,2-диметил-1,3-диоксолан-4-ил)метокси)-4-метил-1-фенил-1Н-пиразол-5-ил)мочевины;

10 1-((3S,4R)-4-(3,4-дифторфенил)-1-(2-метоксиэтил)пирролидин-3-ил)-3-(3-этокси-4-метил-1-(пиразин-2-ил)-1Н-пиразол-5-ил)мочевины;

1-((3S,4R)-4-(3,4-дифторфенил)-1-(2-метоксиэтил)пирролидин-3-ил)-3-(2-(пиридазин-4-ил)-2,4,5,6-тетрагидроциклопента[с]пиразол-3-ил)мочевины;

5-(3-((3S,4R)-4-(3,4-дифторфенил)-1-(2-метоксиэтил)пирролидин-3-ил)уреидо)-4-метил-1-фенил-1Н-пиразол-3-ил диметилкарбамата;

15 5-(3-((3S,4R)-4-(3,4-дифторфенил)-1-(2-метоксиэтил)пирролидин-3-ил)уреидо)-4-метил-1-фенил-1Н-пиразол-3-ил морфолин-4-карбоксилата;

1-(3-((S)-2,2-диметил-1,3-диоксолан-4-ил)метокси)-4-метил-1-фенил-1Н-пиразол-5-ил)-3-((3S,4R)-1-(2-метоксиэтил)-4-(3,4,5-трифторфенил)пирролидин-3-ил)мочевины;

1-(3-((R)-2,2-диметил-1,3-диоксолан-4-ил)метокси)-4-метил-1-фенил-1Н-пиразол-5-ил)-3-((3S,4R)-1-(2-метоксиэтил)-4-(3,4,5-трифторфенил)пирролидин-3-ил)мочевины;

1-(3-((S)-2-(*трет*-бутилдиметилсилилокси)пропокси)-4-метил-1-фенил-1-пиразол-5-ил)-3-((3S,4R)-1-(2-метоксиэтил)-4-(3,4,5-трифторфенил)пирролидин-3-ил)мочевины;

1-(3-(2-гидрокси-2-метилпропокси)-4-метил-1-фенил-1Н-пиразол-5-ил)-3-((3S,4R)-1-(2-метоксиэтил)-4-(3,4,5-трифторфенил)пирролидин-3-ил)мочевины;

25 1-(3-((S)-2-(*трет*-бутилдиметилсилилокси)-3-метоксипропокси)-4-метил-1-фенил-1Н-пиразол-5-ил)-3-((3S,4R)-4-(3,4-дифторфенил)-1-(2-метоксиэтил)пирролидин-3-ил)мочевины;

1-(4-хлор-3-(метоксиметил)-1-фенил-1Н-пиразол-5-ил)-3-((3S,4R)-4-(3,4-дифторфенил)-1-(2-метоксиэтил)пирролидин-3-ил)мочевины;

30 1-(4-бром-3-(метоксиметил)-1-фенил-1Н-пиразол-5-ил)-3-((3S,4R)-4-(3,4-дифторфенил)-1-(2-метоксиэтил)пирролидин-3-ил)мочевины;

1-(4-хлор-3-(метоксиметил)-1-фенил-1Н-пиразол-5-ил)-3-((3S,4R)-4-(3,5-дифторфенил)-1-(2-метоксиэтил)пирролидин-3-ил)мочевины;

35 1-(4-бром-3-(метоксиметил)-1-фенил-1Н-пиразол-5-ил)-3-((3S,4R)-4-(3,5-дифторфенил)-1-(2-метоксиэтил)пирролидин-3-ил)мочевины;

1-(4-хлор-3-(метоксиметил)-1-фенил-1Н-пиразол-5-ил)-3-((3S,4R)-4-(4-фторфенил)-1-(2-метоксиэтил)пирролидин-3-ил)мочевины;

1-(4-бром-3-(метоксиметил)-1-фенил-1Н-пиразол-5-ил)-3-((3S,4R)-4-(4-фторфенил)-1-(2-метоксиэтил)пирролидин-3-ил)мочевины;

40 1-(4-хлор-3-(1,1-дифтор-2-гидроксиэтил)-1-фенил-1Н-пиразол-5-ил)-3-((3S,4R)-4-(3,4-дифторфенил)-1-(2-метоксиэтил)пирролидин-3-ил)мочевины;

1-(4-хлор-3-(1,1-дифтор-2-гидроксиэтил)-1-фенил-1Н-пиразол-5-ил)-3-((3S,4R)-4-(3,5-дифторфенил)-1-(2-метоксиэтил)пирролидин-3-ил)мочевины;

45 1-(4-хлор-3-(1,1-дифтор-2-гидроксиэтил)-1-фенил-1Н-пиразол-5-ил)-3-((3S,4R)-4-(4-фторфенил)-1-(2-метоксиэтил)пирролидин-3-ил)мочевины;

1-(4-хлор-3-((S)-2-гидроксипропил)-1-фенил-1Н-пиразол-5-ил)-3-((3S,4R)-4-(3,4-дифторфенил)-1-(2-метоксиэтил)пирролидин-3-ил)мочевины;

1-(4-хлор-3-((R)-2-гидроксипропил)-1-фенил-1Н-пиразол-5-ил)-3-((3S,4R)-4-(3,4-

метоксиэтил)пирролидин-3-ил)мочевины;

1-((3S,4R)-4-(3,4-дифторфенил)-1-(2-метоксиэтил)пирролидин-3-ил)-3-(4-фтор-1'-метил-1-фенил-1H,1'H-[3,4'-бипиразол]-5-ил)мочевины;

1-((3S,4R)-4-(3,5-дифторфенил)-1-(2-метоксиэтил)пирролидин-3-ил)-3-(4-фтор-1'-метил-1-фенил-1H,1'H-[3,4'-бипиразол]-5-ил)мочевины;

1-(4-бром-1'-метил-1-фенил-1H,1'H-[3,4'-бипиразол]-5-ил)-3-((3S,4R)-4-(5-фторпиридин-3-ил)-1-(2-метоксиэтил)пирролидин-3-ил)мочевины;

1-(1',4-диметил-1-фенил-1H,1'H-[3,4'-бипиразол]-5-ил)-3-((3S,4R)-4-(4-фторфенил)-1-(2-метоксиэтил)пирролидин-3-ил)мочевины;

1-(1',4-диметил-1-фенил-1H,1'H-[3,4'-бипиразол]-5-ил)-3-((3S,4R)-4-(3,5-дифторфенил)-1-(2-метоксиэтил)пирролидин-3-ил)мочевины;

1-(1',4-диметил-1-фенил-1H,1'H-[3,4'-бипиразол]-5-ил)-3-((3S,4R)-4-(3,4,5-трифторфенил)-1-(2-метоксиэтил)пирролидин-3-ил)мочевины;

1-(1',4-диметил-1-фенил-1H,1'H-[3,4'-бипиразол]-5-ил)-3-((3S,4R)-4-(3,4-дифторфенил)-1-(2-метоксиэтил)пирролидин-3-ил)мочевины;

1-(1',4-диметил-1-фенил-1H,1'H-[3,4'-бипиразол]-5-ил)-3-((3S,4R)-4-(фторфенил)-1-(2-метоксиэтил)пирролидин-3-ил)мочевины;

1-((3S,4R)-4-(3,4-дифторфенил)-1-(2-метоксиэтил)пирролидин-3-ил)-3-(1'-(4-метоксибензил)-4-метил-1-фенил-1H,1'H-[3,4'-бипиразол]-5-ил)мочевины;

трифторацетата 1-((3S,4R)-4-(3,4-дифторфенил)-1-(2-метоксиэтил)пирролидин-3-ил)-3-(1'-(4-метоксибензил)-4-метил-1-фенил-1H,1'H-[3,4'-бипиразол]-5-ил)мочевины;

2-(4-хлор-5-(3-((3S,4R)-4-(3,4-дифторфенил)-1-(2-метоксиэтил)пирролидин-3-ил)уреидо)-1-фенил-1H-пиразол-3-ил)этилацетата;

1-(4-хлор-3-(2-гидроксиэтил)-1-фенил-1H-пиразол-5-ил)-3-((3S,4R)-4-(3,4-дифторфенил)-1-(2-метоксиэтил)пирролидин-3-ил)мочевины;

1-((3S,4R)-4-(3,4-дифторфенил)-1-(2-метоксиэтил)пирролидин-3-ил)-3-(3-(цис-3-гидроксициклобутил)-4-метил-1-фенил-1H-пиразол-5-ил)мочевины;

1-((3S,4R)-4-(3,4-дифторфенил)-1-(2-метоксиэтил)пирролидин-3-ил)-3-(3-(транс-3-гидроксициклобутил)-4-метил-1-фенил-1H-пиразол-5-ил)мочевины;

1-(4-хлор-3-(цис-3-гидроксициклобутил)-1-фенил-1H-пиразол-5-ил)-3-((3S,4R)-4-(3,4-дифторфенил)-1-(2-метоксиэтил)пирролидин-3-ил)мочевины;

1-(4-хлор-3-((1R,3S)-3-гидроксициклобутил)-1-фенил-1H-пиразол-5-ил)-3-(транс-4-(3,4-дифторфенил)-1-(2-метоксиэтил)пирролидин-3-ил)мочевины;

1-((3S,4R)-4-(4-фторфенил)-1-(2-метоксиэтил)пирролидин-3-ил)-3-(3-(цис-3-гидроксициклобутил)-4-метил-1-фенил-1H-пиразол-5-ил)мочевины;

1-((3S,4R)-4-(4-фторфенил)-1-(2-метоксиэтил)пирролидин-3-ил)-3-(3-(транс-3-гидроксициклобутил)-4-метил-1-фенил-1H-пиразол-5-ил)мочевины;

1-((3S,4R)-4-(3,5-дифторфенил)-1-(2-метоксиэтил)пирролидин-3-ил)-3-(3-(цис-3-гидроксициклобутил)-4-метил-1-фенил-1H-пиразол-5-ил)мочевины;

1-((3S,4R)-4-(3,5-дифторфенил)-1-(2-метоксиэтил)пирролидин-3-ил)-3-(3-(транс-3-гидроксициклобутил)-4-метил-1-фенил-1H-пиразол-5-ил)мочевины;

5-(3-((3S,4R)-4-(3,4-дифторфенил)-1-(2-метоксиэтил)пирролидин-3-ил)уреидо)-4-метил-1-фенил-1H-пиразол-3-карбоновая кислота;

5-(3-((3S,4R)-4-(3,4-дифторфенил)-1-(2-метоксиэтил)пирролидин-3-ил)уреидо)-N,4-диметил-1-фенил-1H-пиразол-3-карбоксамида;

5-(3-((3S,4R)-4-(3,4-дифторфенил)-1-(2-метоксиэтил)пирролидин-3-ил)уреидо)-N,N,4-триметил-1-фенил-1H-пиразол-3-карбоксамида;

5-(3-((3S,4R)-4-(3,4-дифторфенил)-1-(2-метоксиэтил)пирролидин-3-ил)уреидо)-N-этил-

4-метил-1-фенил-1Н-пиразол-3-карбоксамида;

5-(3-((3S,4R)-4-(3,4-дифторфенил)-1-(2-метоксиэтил)пирролидин-3-ил)уреидо)-N-изопропил-4-метил-1-фенил-1Н-пиразол-3-карбоксамида;

5-(3-((3S,4R)-4-(3,4-дифторфенил)-1-(2-метоксиэтил)пирролидин-3-ил)уреидо)-4-метил-1-фенил-1Н-пиразол-3-карбоксамида;

1-((3S,4R)-4-(3,5-дифторфенил)-1-(2-метоксиэтил)пирролидин-3-ил)-3-(3-этокси-4-(гидроксиметил)-1-фенил-1Н-пиразол-5-ил)мочевины;

1-((3S,4R)-4-(3-хлор-4-фторфенил)-1-(2-метоксиэтил)пирролидин-3-ил)-3-(1',4-диметил-1-фенил-1Н,1'Н-3,4'-бипиразол-5-ил)мочевины;

1-((3S,4R)-4-(4-хлор-3-фторфенил)-1-(2-метоксиэтил)пирролидин-3-ил)-3-(1',4-диметил-1-фенил-1Н,1'Н-3,4'-бипиразол-5-ил)мочевины;

1-((3S,4R)-4-(3-хлор-5-фторфенил)-1-(2-метоксиэтил)пирролидин-3-ил)-3-(1',4-диметил-1-фенил-1Н,1'Н-3,4'-бипиразол-5-ил)мочевины;

2-((3R,4S)-3-(3,4-дифторфенил)-4-(3-(3-этокси-4-метил-1-фенил-1Н-пиразол-5-ил)уреидо)пирролидин-1-ил)ацетата;

1-((3S,4R)-4-(3,4-дифторфенил)-1-(3,3,3-трифтор-2-гидроксипропил)пирролидин-3-ил)-3-(3-этокси-4-метил-1-фенил-1Н-пиразол-5-ил)мочевины;

1-((3S,4R)-4-(3,4-дифторфенил)-1-(2-гидроксипропил)пирролидин-3-ил)-3-(3-этокси-4-метил-1-фенил-1Н-пиразол-5-ил)мочевины;

1-((3S,4R)-1-(2-цианоэтил)-4-(3,4-дифторфенил)пирролидин-3-ил)-3-(3-этокси-4-метил-1-фенил-1Н-пиразол-5-ил)мочевины;

2-((3R,4S)-3-(3,4-дифторфенил)-4-(3-(3-этокси-4-метил-1-фенил-1Н-пиразол-5-ил)уреидо)пирролидин-1-ил)-N-метилацетамида;

1-(1-циклогексил-3,4-диметил-1Н-пиразол-5-ил)-3-((3S,4R)-4-(3,4-дифторфенил)-1-(2-метоксиэтил)пирролидин-3-ил)мочевины;

1-((3S,4R)-4-(3,4-дифторфенил)-1-(2-метоксиэтил)пирролидин-3-ил)-3-(3-(3-гидрокси-2-(гидроксиметил)пропокси)-4-метил-1-фенил-1Н-пиразол-5-ил)мочевины;

1-((3S,4R)-4-(3,4-дифторфенил)-1-(2-метоксиэтил)пирролидин-3-ил)-3-(4-метил-1-фенил-3-(2,2,2-трифторэтокси)-1Н-пиразол-5-ил)мочевины;

1-((3S,4R)-4-(4-фторфенил)-1-(2-метоксиэтил)пирролидин-3-ил)-3-(4-метил-1-фенил-3-(2,2,2-трифторэтокси)-1Н-пиразол-5-ил)мочевины;

1-((3S,4R)-4-(3,5-дифторфенил)-1-(2-метоксиэтил)пирролидин-3-ил)-3-(4-метил-1-фенил-3-(2,2,2-трифторэтокси)-1Н-пиразол-5-ил)мочевины;

1-(3-(2,2-дифторэтокси)-4-метил-1-фенил-1Н-пиразол-5-ил)-3-((3S,4R)-4-(3,4-дифторфенил)-1-(2-метоксиэтил)пирролидин-3-ил)мочевины;

1-(4-хлор-1-фенил-3-(2,2,2-трифторэтокси)-1Н-пиразол-5-ил)-3-((3S,4R)-4-(3,4-дифторфенил)-1-(2-метоксиэтил)пирролидин-3-ил)мочевины;

1-(4-хлор-1-фенил-3-(пиридин-2-ил)-1Н-пиразол-5-ил)-3-((3S,4R)-4-(3,4-дифторфенил)-1-(2-метоксиэтил)пирролидин-3-ил)мочевины;

1-(4-хлор-1-фенил-3-(пиридин-4-ил)-1Н-пиразол-5-ил)-3-((3S,4R)-4-(3,4-дифторфенил)-1-(2-метоксиэтил)пирролидин-3-ил)мочевины;

1-(4-хлор-1-фенил-3-(пиридин-3-ил)-1Н-пиразол-5-ил)-3-((3S,4R)-4-(3,4-дифторфенил)-1-(2-метоксиэтил)пирролидин-3-ил)мочевины;

1-(4-бром-1-фенил-3-(пиридин-3-ил)-1Н-пиразол-5-ил)-3-((3S,4R)-4-(3,4-дифторфенил)-1-(2-метоксиэтил)пирролидин-3-ил)мочевины;

1-(4-бром-1-фенил-3-(пиридин-2-ил)-1Н-пиразол-5-ил)-3-((3S,4R)-4-(3,4-дифторфенил)-1-(2-метоксиэтил)пирролидин-3-ил)мочевины;

1-(4-хлор-3-фенил-1-(пиридин-3-ил)-1Н-пиразол-5-ил)-3-((3S,4R)-4-(3,4-дифторфенил)-1-(2-метоксиэтил)пирролидин-3-ил)мочевины;

-1-(2-метоксиэтил)пирролидин-3-ил)мочевины;

1-((3S,4R)-4-(3,4-дифторфенил)-1-(2-метоксиэтил)пирролидин-3-ил)-3-(4-метил-1-фенил-3-(пиридин-3-ил)-1Н-пиразол-5-ил)мочевины;

1-((3S,4R)-4-(3,4-дифторфенил)-1-(2-метоксиэтил)пирролидин-3-ил)-3-(4-метил-1-фенил-3-(пиридин-4-ил)-1Н-пиразол-5-ил)мочевины;

1-((3S,4R)-4-(3,4-дифторфенил)-1-(2-метоксиэтил)пирролидин-3-ил)-3-(4-метил-1-фенил-3-(пиридин-2-ил)-1Н-пиразол-5-ил)мочевины;

1-((3S,4R)-4-(3,4-дифторфенил)-1-(2-метоксиэтил)пирролидин-3-ил)-3-(3-(5-фторпиридин-3-ил)-4-метил-1-фенил-1Н-пиразол-5-ил)мочевины;

1-((3S,4R)-4-(3,4-дифторфенил)-1-(2-метоксиэтил)пирролидин-3-ил)-3-(3-(5-фторпиридин-3-ил)-4-метил-1-(пиридин-3-ил)-1Н-пиразол-5-ил)мочевины;

1-((3S,4R)-4-(3,4-дифторфенил)-1-(2-метоксиэтил)пирролидин-3-ил)-3-(1',4-диметил-1-фенил-1Н,1'Н-[3,3'-бипиразол]-5-ил)мочевины;

1-(1',4-диметил-1-фенил-1Н,1'Н-[3,3'-бипиразол]-5-ил)-3-((3S,4R)-4-(4-фторфенил)-1-(2-метоксиэтил)пирролидин-3-ил)мочевины;

1-((3S,4R)-4-(3,5-дифторфенил)-1-(2-метоксиэтил)пирролидин-3-ил)-3-(1',4-диметил-1-фенил-1Н,1'Н-[3,3'-бипиразол]-5-ил)мочевины;

1-((3S,4R)-4-(3,4-дифторфенил)-1-(2-метоксиэтил)пирролидин-3-ил)-3-(2',4-диметил-1-фенил-1Н,2'Н-[3,3'-бипиразол]-5-ил)мочевины;

1-((3S,4R)-4-(3,4-дифторфенил)-1-(2-метоксиэтил)пирролидин-3-ил)-3-(1-(5-фторпиридин-3-ил)-1',4-диметил-1Н,1'Н-[3,4'-бипиразол]-5-ил)мочевины;

1-((3S,4R)-4-(3,4-дифторфенил)-1-(2-метоксиэтил)пирролидин-3-ил)-3-(1',4-диметил-1-(5-метилпиридин-3-ил)-1Н,1'Н-[3,4'-бипиразол]-5-ил)мочевины;

1-(1-(5-хлорпиридин-3-ил)-1',4-диметил-1Н,1'Н-[3,4'-бипиразол]-5-ил)-3-((3S,4R)-4-(3,4-дифторфенил)-1-(2-метоксиэтил)пирролидин-3-ил)мочевины;

1-((3S,4R)-4-(3,4-дифторфенил)-1-(2-метоксиэтил)пирролидин-3-ил)-3-(4-метил-1-фенил-1'-(2,2,2-трифтор-1-(2,2,2-трифторэтокси)этил)-1Н,1'Н-[3,4'-бипиразол]-5-ил)мочевины;

1-((3S,4R)-4-(3,4-дифторфенил)-1-(2-метоксиэтил)пирролидин-3-ил)-3-(4-метил-1-фенил-1'-(2,2,2-трифторэтил)-1Н,1'Н-[3,4'-бипиразол]-5-ил)мочевины;

1-(1'-(циклопропилметил)-4-метил-1-фенил-1Н,1'Н-[3,4'-бипиразол]-5-ил)-3-((3S,4R)-4-(3,4-дифторфенил)-1-(2-метоксиэтил)пирролидин-3-ил)мочевины;

1-(1'-(циклопропанкарбонил)-4-метил-1-фенил-1Н,1'Н-[3,4'-бипиразол]-5-ил)-3-((3S,4R)-4-(3,4-дифторфенил)-1-(2-метоксиэтил)пирролидин-3-ил)мочевины;

1-((3S,4R)-4-(3,4-дифторфенил)-1-(2-метоксиэтил)пирролидин-3-ил)-3-(4-метил-1'-(метилсульфонил)-1-фенил-1Н,1'Н-[3,4'-бипиразол]-5-ил)мочевины;

1-((3S,4R)-4-(3,4-дифторфенил)-1-(2-метоксиэтил)пирролидин-3-ил)-3-(1'-изопропил-4-метил-1-фенил-1Н,1'Н-[3,4'-бипиразол]-5-ил)мочевины;

1-((3S,4R)-4-(3,4-дифторфенил)-1-(2-метоксиэтил)пирролидин-3-ил)-3-(4-метил-1-фенил-3-(пиримидин-5-ил)-1Н-пиразол-5-ил)мочевины;

1-((3S,4R)-4-(3,4-дифторфенил)-1-(2-метоксиэтил)пирролидин-3-ил)-3-(4-метил-3-(1-метил-2-оксо-1,2-дигидропиридин-4-ил)-1-фенил-1Н-пиразол-5-ил)мочевины;

1-((3S,4R)-4-(3,4-дифторфенил)-1-(2-метоксиэтил)пирролидин-3-ил)-3-(4-метил-3-(1-метил-6-оксо-1,6-дигидропиридин-3-ил)-1-фенил-1Н-пиразол-5-ил)мочевины;

1-((3S,4R)-4-(3,4-дифторфенил)-1-(2-метоксиэтил)пирролидин-3-ил)-3-(1',4,5'-триметил-1-фенил-1Н,1'Н-[3,4'-бипиразол]-5-ил)мочевины;

1-((3S,4R)-4-(3,4-дифторфенил)-1-(2-метоксиэтил)пирролидин-3-ил)-3-(1',3',4-триметил-1-фенил-1Н,1'Н-[3,4'-бипиразол]-5-ил)мочевины;

1-(1'-циклопропил-4-метил-1-фенил-1Н,1'Н-[3,4'-бипиразол]-5-ил)-3-((3S,4R)-4-(3,4-дифторфенил)-1-(2-метоксиэтил)пирролидин-3-ил)мочевины;

1-((3S,4R)-4-(3,4-дифторфенил)-1-(2-метоксиэтил)пирролидин-3-ил)-3-(4-метил-3-(2-метилтиазол-5-ил)-1-фенил-1Н-пиразол-5-ил)мочевины;

5 1-((3S,4R)-4-(3,4-дифторфенил)-1-(2-метоксиэтил)пирролидин-3-ил)-3-(4-метил-3-(2-метилпиримидин-5-ил)-1-фенил-1Н-пиразол-5-ил)мочевины;

1-(3-(2-аминопиримидин-5-ил)-4-метил-1-фенил-1Н-пиразол-5-ил)-3-((3S,4R)-4-(3,4-дифторфенил)-1-(2-метоксиэтил)пирролидин-3-ил)мочевины;

10 1-((3S,4R)-4-(3,4-дифторфенил)-1-(2-метоксиэтил)пирролидин-3-ил)-3-(3-(2,4-диметилтиазол-5-ил)-4-метил-1-фенил-1Н-пиразол-5-ил)мочевины;

1-((3S,4R)-4-(3,4-дифторфенил)-1-(2-метоксиэтил)пирролидин-3-ил)-3-(3-(2,6-диметилпиридин-4-ил)-4-метил-1-фенил-1Н-пиразол-5-ил)мочевины;

1-(3-(6-аминопиридин-3-ил)-4-метил-1-фенил-1Н-пиразол-5-ил)-3-((3S,4R)-4-(3,4-дифторфенил)-1-(2-метоксиэтил)пирролидин-3-ил)мочевины;

15 1-(3-бром-4-метил-1-фенил-1Н-пиразол-5-ил)-3-((3S,4R)-4-(4-фторфенил)-1-(2-метоксиэтил)пирролидин-3-ил)мочевины;

1-((3S,4R)-4-(3,4-дифторфенил)-1-(2-метоксиэтил)пирролидин-3-ил)-3-(4-метил-3-(6-оксо-1-(2,2,2-трифторэтил)-1,6-дигидропиридин-3-ил)-1-фенил-1Н-пиразол-5-ил)мочевины;

20 1-((3S,4R)-4-(4-фторфенил)-1-(2-метоксиэтил)пирролидин-3-ил)-3-(1'-изопропил-4-метил-1-фенил-1Н,1'Н-[3,4'-бипиразол]-5-ил)мочевины;

1-((3S,4R)-4-(4-фторфенил)-1-(2-метоксиэтил)пирролидин-3-ил)-3-(4-метил-3-(1-метил-6-оксо-1,6-дигидропиридин-3-ил)-1-фенил-1Н-пиразол-5-ил)мочевины;

1-(3-бром-4-метил-1-фенил-1Н-пиразол-5-ил)-3-((3R,4S)-4-фенил-1-(2,2,2-трифторэтил)пирролидин-3-ил)мочевины;

1-(4-метил-3-(1-метил-6-оксо-1,6-дигидропиридин-3-ил)-1-фенил-1Н-пиразол-5-ил)-3-((3R,4S)-4-фенил-1-(2,2,2-трифторэтил)пирролидин-3-ил)мочевины;

бис-2,2,2-трифторацетата 1-(3-(2-аминопиримидин-5-ил)-4-метил-1-фенил-1Н-пиразол-5-ил)-3-((3R,4S)-4-фенил-1-(2,2,2-трифторэтил)пирролидин-3-ил)мочевины;

30 1-((3S,4R)-4-(3,4-дифторфенил)-1-(2-метоксиэтил)пирролидин-3-ил)-3-(1'-этил-4-метил-1-фенил-1Н,1'Н-[3,4'-бипиразол]-5-ил)мочевины;

1-(1'-этил-4-метил-1-фенил-1Н,1'Н-[3,4'-бипиразол]-5-ил)-3-((3S,4R)-4-(4-фторфенил)-1-(2-метоксиэтил)пирролидин-3-ил)мочевины;

5-(3-((3S,4R)-4-(3,4-дифторфенил)-1-(2-метоксиэтил)пирролидин-3-ил)уреидо)-4-метил-1-фенил-1Н-пиразол-3-ил трифторметансульфоната;

1-((3S,4R)-4-(3,4-дифторфенил)-1-(2-метоксиэтил)пирролидин-3-ил)-3-(3-(2-метоксипиримидин-5-ил)-4-метил-1-фенил-1Н-пиразол-5-ил)мочевины;

1-((3S,4R)-4-(3,4-дифторфенил)-1-(2-метоксиэтил)пирролидин-3-ил)-3-(3-(2-(диметиламино)пиримидин-5-ил)-4-метил-1-фенил-1Н-пиразол-5-ил)мочевины;

40 1-((3S,4R)-4-(4-фторфенил)-1-(2-метоксиэтил)пирролидин-3-ил)-3-(3-(2-метоксипиримидин-5-ил)-4-метил-1-фенил-1Н-пиразол-5-ил)мочевины;

1-(3-(2-(диметиламино)пиримидин-5-ил)-4-метил-1-фенил-1Н-пиразол-5-ил)-3-((3S,4R)-4-(4-фторфенил)-1-(2-метоксиэтил)пирролидин-3-ил)мочевины;

1-(1'-этил-4-метил-1-фенил-1Н,1'Н-[3,4'-бипиразол]-5-ил)-3-((3S,4R)-4-(3-фторфенил)-1-(2-метоксиэтил)пирролидин-3-ил)мочевины;

1-((3S,4R)-4-(3-фторфенил)-1-(2-метоксиэтил)пирролидин-3-ил)-3-(4-метил-3-(1-метил-2-оксо-1,2-дигидропиридин-4-ил)-1-фенил-1Н-пиразол-5-ил)мочевины;

1-((3S,4R)-4-(4-фторфенил)-1-(2-метоксиэтил)пирролидин-3-ил)-3-(4-метил-3-(1-метил-

2-оксо-1,2-дигидропиридин-4-ил)-1-фенил-1Н-пиразол-5-ил)мочевины;

1-(3-циклопропил-4-метил-1-фенил-1Н-пиразол-5-ил)-3-((3S,4R)-4-(3,4-дифторфенил)-1-(2-метоксиэтил)пирролидин-3-ил)мочевины;

1-(3-циклопропил-4-метил-1-фенил-1Н-пиразол-5-ил)-3-((3S,4R)-4-(4-фторфенил)-1-(2-метоксиэтил)пирролидин-3-ил)мочевины;

1-((3S,4R)-4-(3,4-дифторфенил)-1-(2-метоксиэтил)пирролидин-3-ил)-3-(3-(1-изопропил-6-оксо-1,6-дигидропиридин-3-ил)-4-метил-1-фенил-1Н-пиразол-5-ил)мочевины;

1-((3S,4R)-4-(4-фторфенил)-1-(2-метоксиэтил)пирролидин-3-ил)-3-(3-(1-изопропил-6-оксо-1,6-дигидропиридин-3-ил)-4-метил-1-фенил-1Н-пиразол-5-ил)мочевины;

дигидрохлорида 1-((3S,4R)-4-(3,5-дифторфенил)-1-(2-метоксиэтил)пирролидин-3-ил)-3-((3S)-2-гидроксипропокси)-4-метил-1-фенил-1Н-пиразол-5-ил)мочевины;

тригидрохлорида 1-((3S,4R)-4-(3,5-дифторфенил)-1-(2-метоксиэтил)пирролидин-3-ил)-3-(4-метил-1-фенил-3-(2-(пиперазин-1-ил)этокси)-1Н-пиразол-5-ил)мочевины;

1-(3-(бензилокси)-4-хлор-1-метил-1Н-пиразол-5-ил)-3-((3S,4R)-4-(3,4-дифторфенил)-1-(2-метоксиэтил)пирролидин-3-ил)мочевины;

2-((5-(3-((3S,4R)-4-(3,4-дифторфенил)-1-(2-метоксиэтил)пирролидин-3-ил)уреидо)-4-метил-1-фенил-1Н-пиразол-3-ил)окси)уксусной кислоты;

2-((5-(3-((3S,4R)-4-(3,4-дифторфенил)-1-(2-метоксиэтил)пирролидин-3-ил)уреидо)-4-метил-1-фенил-1Н-пиразол-3-ил)окси)-N-этилацетамида;

1-((3S,4R)-4-(3,4-дифторфенил)-1-(2-метоксиэтил)пирролидин-3-ил)-3-(4-этил-3-(2-гидрокси-2-метилпропокси)-1-фенил-1Н-пиразол-5-ил)мочевины;

1-(3-(2-аминоэтокси)-4-метил-1-фенил-1Н-пиразол-5-ил)-3-((3S,4R)-4-(3,4-дифторфенил)-1-(2-метоксиэтил)пирролидин-3-ил)мочевины;

N-(2-((5-(3-((3S,4R)-4-(3,4-дифторфенил)-1-(2-метоксиэтил)пирролидин-3-ил)уреидо)-4-метил-1-фенил-1Н-пиразол-3-ил)окси)этил)метансульфонамида;

N-(2-((5-(3-((3S,4R)-4-(3,4-дифторфенил)-1-(2-метоксиэтил)пирролидин-3-ил)уреидо)-4-метил-1-фенил-1Н-пиразол-3-ил)окси)этил)ацетамида;

1-(3-(2-(4-ацетилпиперазин-1-ил)этокси)-4-метил-1-фенил-1Н-пиразол-5-ил)-3-((3S,4R)-4-(3,4-дифторфенил)-1-(2-метоксиэтил)пирролидин-3-ил)мочевины;

2-((5-(3-((3S,4R)-4-(3,4-дифторфенил)-1-(2-метоксиэтил)пирролидин-3-ил)уреидо)-4-метил-1-фенил-1Н-пиразол-3-ил)окси)ацетамида;

N-(5-(3-((3S,4R)-4-(3,4-дифторфенил)-1-(2-метоксиэтил)пирролидин-3-ил)уреидо)-3-этокси-1-фенил-1Н-пиразол-4-ил)-2,2,2-трифторацетамида;

1-(4-амино-3-этокси-1-фенил-1Н-пиразол-5-ил)-3-((3S,4R)-4-(3,4-дифторфенил)-1-(2-метоксиэтил)пирролидин-3-ил)мочевины;

1-((3S,4R)-4-(3,4-дифторфенил)-1-(2-метоксиэтил)пирролидин-3-ил)-3-(3-этокси-4-(2-гидроксиэтил)-1-фенил-1Н-пиразол-5-ил)мочевины;

тригидрохлорида 1-((3S,4R)-4-(3,4-дифторфенил)-1-(2-метоксиэтил)пирролидин-3-ил)-3-(4-метил-3-(2-(4-метилпиперазин-1-ил)этокси)-1-фенил-1Н-пиразол-5-ил)мочевины;

1-((3S,4R)-4-(3,4-дифторфенил)-1-(2-метоксиэтил)пирролидин-3-ил)-3-(4-метил-3-(2-морфолино-2-оксоэтокси)-1-фенил-1Н-пиразол-5-ил)мочевины;

4-бром-5-(3-((3S,4R)-4-(3,4-дифторфенил)-1-(2-метоксиэтил)пирролидин-3-ил)уреидо)-1-фенил-1Н-пиразол-3-карбоновой кислоты;

4-бром-5-(3-((3S,4R)-4-(3,4-дифторфенил)-1-(2-метоксиэтил)пирролидин-3-ил)уреидо)-N-метил-1-фенил-1Н-пиразол-3-карбоксамида;

4-бром-5-(3-((3S,4R)-4-(3,4-дифторфенил)-1-(2-метоксиэтил)пирролидин-3-ил)уреидо)-N-метокси-1-фенил-1Н-пиразол-3-карбоксамида;

1-(4-хлор-1'-(2-метоксиэтил)-1-фенил-1Н,1'Н-[3,4'-бипиразол]-5-ил)-3-((3S,4R)-4-(3,4-

дифторфенил)-1-(2-метоксиэтил)пирролидин-3-ил)мочевины;

1-((3S,4R)-4-(3,5-дифторфенил)-1-(2-метоксиэтил)пирролидин-3-ил)-3-(3-((S)-2,3-дигидроксипропокс)-4-метил-1-фенил-1H-пиразол-5-ил)мочевины;

1-((3S,4R)-4-(3,5-дифторфенил)-1-(2-метоксиэтил)пирролидин-3-ил)-3-(3-((R)-2,3-
5 дигидроксипропокси)-4-метил-1-фенил-1H-пиразол-5-ил)мочевины;

1-(3-((R)-2,3-дигидроксипропокси)-4-метил-1-фенил-1H-пиразол-5-ил)-3-((3S,4R)-1-(2-метоксиэтил)-4-(3,4,5-трифторфенил)пирролидин-3-ил)мочевины;

1-(3-((S)-2,3-дигидроксипропокси)-4-метил-1-фенил-1H-пиразол-5-ил)-3-((3S,4R)-1-(2-метоксиэтил)-4-(3,4,5-трифторфенил)пирролидин-3-ил)мочевины;

10 1-(3-((S)-2-гидроксипропокси)-4-метил-1-фенил-1Н-пиразол-5-ил)-3-((3S,4R)-1-(2-метоксиэтил)-4-(3,4,5-трифторфенил)пирролидин-3-ил)мочевины;

1-((3S,4R)-4-(3,4-дифторфенил)-1-(2-метоксиэтил)пирролидин-3-ил)-3-(3-((S)-2-гидрокси-3-метоксипропокси)-4-метил-1-фенил-1H-пиразол-5-ил)мочевины;

1-((3S,4R)-4-(3,4-дифторфенил)-1-(2-метоксиэтил)пирролидин-3-ил)-3-(3-((R)-2-
15 гидроксипроп-1-ин-1-ил)-4-метил-1-фенил-1H-пиразол-5-ил)мочевины;

1-(3-((S)-2-гидрокси-3-метоксипропокси)-4-метил-1-фенил-1Н-пиразол-5-ил)-3-((3S,4R)-1-(2-метоксиэтил)-4-(3,4,5-трифторфенил)пирролидин-3-ил)мочевины;

1-(3-((R)-2-гидрокси-3-метоксипропокси)-4-метил-1-фенил-1H-пиразол-5-ил)-3-((3S,4R)-1-(2-метоксиэтил)-4-(3,4,5-трифторфенил)пирролидин-3-ил)мочевины;

20 1-(4-бром-1,1'-диметил-1Н,1'Н-[3,4'-бипиразол]-5-ил)-3-((3S,4R)-4-(3,4-дифторфенил)-1-(2-метоксиэтил)пирролидин-3-ил)мочевины;

1-(4-хлор-1,1'-диметил-1Н,1'Н-[3,4'-бипиразол]-5-ил)-3-((3S,4R)-4-(3,4-дифторфенил)-1-(2-метоксиэтил)пирролидин-3-ил)мочевины;

1-(4-хлор-1-фенил-3-(тетрагидро-2Н-пиран-4-ил)-1Н-пиразол-5-ил)-3-((3S,4R)-4-(3,4-
25 дифторфенил)-1-(2-метоксиэтил)пирролидин-3-ил)мочевины;

трет-бутил 4-(4-хлор-5-(3-((3S,4R)-4-(3,4-дифторфенил)-1-(2-метоксиэтил)пирролидин-3-ил)уреидо)-1-фенил-1H-пиразол-3-ил)пиперидин-1-карбоксилата;

1-(4-хлор-1-фенил-3-(тетрагидро-2Н-пиран-4-ил)-1Н-пиразол-5-ил)-3-((3S,4R)-4-(4-фторфенил)-1-(2-метоксиэтил)пирролидин-3-ил)мочевины;

30 1-(4-хлор-3-(3,5-диметилизоксазол-4-ил)-1-фенил-1Н-пиразол-5-ил)-3-((3S,4R)-4-(3,4-дифторфенил)-1-(2-метоксиэтил)пирролидин-3-ил)мочевины;

(R)-трет-бутил-2-(4-хлор-5-(3-((3S,4R)-4-(3,4-дифторфенил)-1-(2-метоксиэтил)пирролидин-3-ил)уреидо)-1-фенил-1H-пиразол-3-ил)пирролидин-1-карбоксилата;

(S)-трет-бутил-2-(4-хлор-5-(3-((3S,4R)-4-(3,4-дифторфенил)-1-(2-метоксиэтил)пирролидин-3-ил)уреидо)-1-фенил-1H-пиразол-3-ил)пирролидин-1-карбоксилат

1-(4-бром-1-фенил-3-(тетрагидро-2H-пиран-4-ил)-1H-пиразол-5-ил)-3-((3S,4R)-4-(3,4-дифторфенил)-1-(2-метоксиэтил)пирролидин-3-ил)мочевины;

трет-бутил 4-(4-бром-5-(3-((3S,4R)-4-(3,4-дифторфенил)-1-(2-метоксиэтил)пирролидин-3-ил)уреидо)-1-фенил-1H-пиразол-3-ил)пиперидин-1-карбоксилата;

40 1-(4-бром-1-фенил-3-(тетрагидро-2Н-пиран-4-ил)-1Н-пиразол-5-ил)-3-((3S,4R)-4-(4-фторфенил)-1-(2-метоксиэтил)пирролидин-3-ил)мочевины;

1-(4-бром-3-(3,5-диметилизоксазол-4-ил)-1-фенил-1Н-пиразол-5-ил)-3-дифторфенил)-1-(2-метоксиэтил)пирролидин-3-ил)мочевины;

(R)-трет-бутил-2-(4-бром-5-(3-((3S,4R)-4-(3,4-дифторфенил)-1-(2-метоксиэтил) 45 пирролидин-3-ил)уреидо)-1-фенил-1H-пиразол-3-ил)пирролидин-1-карбоксилата;

трет-бутил-4-((4-бром-5-(3-((3S,4R)-4-(3,4-дифторфенил)-1-(2-метоксиэтил)пирролидин-3-ил)уреидо)-1-фенил-1H-пиразол-3-ил)метокси)пиперидин-1-карбоксилата;

дигидрохлорида 1-((3S,4R)-4-(3,4-дифторфенил)-1-(2-метоксиэтил)пирролидин-3-ил)

[illegible]

- 1-((3S,4R)-1-(2-метоксиэтил)-4-(3,4,5-трифторфенил)пирролидин-3-ил)-3-(4-метил-3-(1-метил-6-оксо-1,6-дигидропиридин-3-ил)-1-фенил-1Н-пиразол-5-ил)мочевины;
- 1-((3S,4R)-4-(3,4-дифторфенил)-1-(2-метоксиэтил)пирролидин-3-ил)-3-(3-метокси-1-фенил-4-(трифторметил)-1Н-пиразол-5-ил)мочевины;
- 5 1-((3S,4R)-4-(3,5-дифторфенил)-1-(2-метоксиэтил)пирролидин-3-ил)-3-(3-метокси-1-фенил-4-(трифторметил)-1Н-пиразол-5-ил)мочевины;
- 1-((3S,4R)-4-(4-фторфенил)-1-(2-метоксиэтил)пирролидин-3-ил)-3-(3-метокси-1-фенил-4-(трифторметил)-1Н-пиразол-5-ил)мочевины;
- 1-((3S,4R)-4-(3,4-дифторфенил)-1-(2-метоксиэтил)пирролидин-3-ил)-3-(3-метокси-1-фенил-4-(трифторметил)-1Н-пиразол-5-ил)мочевины;
- 10 1-((транс)-4-(4-хлор-3-фторфенил)-1-(2-метоксиэтил)пирролидин-3-ил)-3-(4-метил-5-оксо-2-фенил-2,5-дигидро-1Н-пиразол-3-ил)мочевины;
- 1-((транс)-4-(3-хлор-4-фторфенил)-1-(2-метоксиэтил)пирролидин-3-ил)-3-(4-метил-5-оксо-2-фенил-2,5-дигидро-1Н-пиразол-3-ил)мочевины;
- 15 1-((3S,4R)-4-(3,5-дифторфенил)-1-(2-метоксиэтил)пирролидин-3-ил)-3-(4-метил-5-оксо-2-фенил-2,5-дигидро-1Н-пиразол-3-ил)мочевины;
- 1-((3S,4R)-1-(2-метоксиэтил)-4-(3,4,5-трифторфенил)пирролидин-3-ил)-3-(4-метил-5-оксо-2-фенил-2,5-дигидро-1Н-пиразол-3-ил)мочевины;
- 1-((3S,4R)-4-(3-фторфенил)-1-(2-метоксиэтил)пирролидин-3-ил)-3-(4-метил-5-оксо-2-фенил-2,5-дигидро-1Н-пиразол-3-ил)мочевины;
- 20 1-((транс)-4-(3-хлор-5-фторфенил)-1-(2-метоксиэтил)пирролидин-3-ил)-3-(4-метил-5-оксо-2-фенил-2,5-дигидро-1Н-пиразол-3-ил)мочевины;
- 1-(4-циано-3-метокси-1-фенил-1Н-пиразол-5-ил)-3-((3S,4R)-4-(3,4-дифторфенил)-1-(2-метоксиэтил)пирролидин-3-ил)мочевины;
- 25 1-((3S,4R)-4-(3-хлор-5-фторфенил)-1-(2-метоксиэтил)пирролидин-3-ил)-3-(4-метил-5-оксо-2-фенил-2,5-дигидро-1Н-пиразол-3-ил)мочевины;
- 1-(4-циано-1-фенил-3-(трифторметил)-1Н-пиразол-5-ил)-3-((3S,4R)-4-(3,4-дифторфенил)-1-(2-метоксиэтил)пирролидин-3-ил)мочевины;
- 1-(4-циано-5-оксо-2-фенил-2,5-дигидро-1Н-пиразол-3-ил)-3-((3S,4R)-4-(3,4-дифторфенил)-1-(2-метоксиэтил)пирролидин-3-ил)мочевины;
- 30 5-(3-((3S,4R)-4-(3,4-дифторфенил)-1-(2-метоксиэтил)пирролидин-3-ил)уреидо)-3-метокси-1-фенил-1Н-пиразол-4-карбоксамида;
- 5-(3-((3S,4R)-4-(3,4-дифторфенил)-1-(2-метоксиэтил)пирролидин-3-ил)уреидо)-3-метил-1-фенил-1Н-пиразол-4-карбоксамида;
- 35 5-(3-((3S,4R)-4-(3,4-дифторфенил)-1-(2-метоксиэтил)пирролидин-3-ил)уреидо)-3-этил-1-фенил-1Н-пиразол-4-карбоксамида;
- 5-(3-((3S,4R)-4-(3,4-дифторфенил)-1-(2-метоксиэтил)пирролидин-3-ил)уреидо)-1-фенил-3-(трифторметил)-1Н-пиразол-4-карбоксамида;
- 5-(3-((транс)-4-(3-хлор-4-фторфенил)-1-(2-метоксиэтил)пирролидин-3-ил)уреидо)-3-метил-1-фенил-1Н-пиразол-4-карбоксамида;
- 40 5-(3-((транс)-4-(4-хлор-3-фторфенил)-1-(2-метоксиэтил)пирролидин-3-ил)уреидо)-3-метил-1-фенил-1Н-пиразол-4-карбоксамида;
- 5-(3-((транс)-4-(3-хлор-5-фторфенил)-1-(2-метоксиэтил)пирролидин-3-ил)уреидо)-3-метил-1-фенил-1Н-пиразол-4-карбоксамида;
- 45 5-(3-((3S,4R)-4-(3,5-дифторфенил)-1-(2-метоксиэтил)пирролидин-3-ил)уреидо)-3-метил-1-фенил-1Н-пиразол-4-карбоксамида;
- 5-(3-((3S,4R)-4-(3,4-дифторфенил)-1-(2-метоксиэтил)пирролидин-3-ил)уреидо)-1-фенил-1Н-пиразол-4-карбоксамида;

5-((3S,4R)-4-(3,4-дифторфенил)-1-(2-метоксиэтил)пирролидин-3-ил)уреидо)-1-фенил-1Н-пиразол-4-карбоксамида;

дигидрохлорида 1-(4-бром-3-метил-1-фенил-1Н-пиразол-5-ил)-3-((3S,4R)-4-(3,4-дифторфенил)-1-(2-метоксиэтил)пирролидин-3-ил)гуанидина;

1-(4-бром-3-метил-1-фенил-1Н-пиразол-5-ил)-3-((3S,4R)-4-(3,4-дифторфенил)-1-(2-метоксиэтил)пирролидин-3-ил)тиомочевины;

1-((3S,4R)-4-(3,4-дифторфенил)-1-(2-метоксиэтил)пирролидин-3-ил)-3-(4-метил-3-(1-метил-6-оксо-1,6-дигидропиридин-3-ил)-1-фенил-1Н-пиразол-5-ил)тиомочевины;

1-((3S,4R)-4-(3,4-дифторфенил)-1-(2-метоксиэтил)пирролидин-3-ил)-3-(1',4-диметил-1-фенил-1Н,1'Н-3,4'-бипиразол-5-ил)тиомочевины;

1-((3S,4R)-4-(4-фторфенил)-1-(2-метоксиэтил)пирролидин-3-ил)-3-(1',4-диметил-1-фенил-1Н,1'Н-3,4'-бипиразол-5-ил)тиомочевины;

транс-1-(2-метоксиэтил)-4-фенилпирролидин-3-ил)-3-(2-фенилпиразоло[1,5-а]пиридин-3-ил)мочевины;

1-((3S,4R)-4-(3,4-дифторфенил)-1-(2-метоксиэтил)пирролидин-3-ил)-3-(2-фенилпиразоло[1,5-а]пиридин-3-ил)мочевины;

транс-1-(2-метоксиэтил)-4-фенилпирролидин-3-ил)-3-(пиразоло[1,5-а]пиридин-3-ил)мочевины;

1-((3S,4R)-4-(3,4-дифторфенил)-1-(2-метоксиэтил)пирролидин-3-ил)-3-(пиразоло[1,5-а]пиридин-3-ил)мочевины;

1-((3S,4R)-4-(3,4-дифторфенил)-1-(2-метоксиэтил)пирролидин-3-ил)-3-(5-метил-3-фенил-1-(пиразин-2-ил)-1Н-пиразол-4-ил)мочевины;

1-((3S,4R)-4-(3,4-дифторфенил)-1-(2-метоксиэтил)пирролидин-3-ил)-3-(1,5-диметил-3-фенил-1Н-пиразол-4-ил)мочевины;

1-((3S,4R)-4-(3,5-дифторфенил)-1-(2-метоксиэтил)пирролидин-3-ил)-3-(1,5-диметил-3-фенил-1Н-пиразол-4-ил)мочевины;

1-((3S,4R)-4-(3,4-дифторфенил)-1-(2-метоксиэтил)пирролидин-3-ил)-3-(1-изопропил-5-метил-3-фенил-1Н-пиразол-4-ил)мочевины;

1-((3S,4R)-4-(3,5-дифторфенил)-1-(2-метоксиэтил)пирролидин-3-ил)-3-(1-изопропил-5-метил-3-фенил-1Н-пиразол-4-ил)мочевины;

1-((3S,4R)-4-(3,4-дифторфенил)-1-(2-метоксиэтил)пирролидин-3-ил)-3-(5-метил-3-фенил-1-(2,2,2-трифторэтил)-1Н-пиразол-4-ил)мочевины;

1-((3S,4R)-4-(3,4-дифторфенил)-1-(2-метоксиэтил)пирролидин-3-ил)-3-(1-этил-5-метил-3-фенил-1Н-пиразол-4-ил)мочевины;

1-((3S,4R)-4-(3,4-дифторфенил)-1-(2-метоксиэтил)пирролидин-3-ил)-3-(1-этил-3-метил-5-фенил-1Н-пиразол-4-ил)мочевины;

1-((3S,4R)-4-(3,4-дифторфенил)-1-(2-метоксиэтил)пирролидин-3-ил)-3-(1-метил-5-фенил-3-(трифторметил)-1Н-пиразол-4-ил)мочевины;

1-((3S,4R)-4-(3,4-дифторфенил)-1-(2-метоксиэтил)пирролидин-3-ил)-3-(1-метил-3-фенил-5-(трифторметил)-1Н-пиразол-4-ил)мочевины;

1-((3S,4R)-4-(3,4-дифторфенил)-1-(2-метоксиэтил)пирролидин-3-ил)-3-(3-метил-1-фенил-1Н-пиразол-4-ил)мочевины;

1-((3S,4R)-4-(3,4-дифторфенил)-1-(2-метоксиэтил)пирролидин-3-ил)-3-(1-фенил-3-(трифторметил)-1Н-пиразол-4-ил)мочевины;

или их фармацевтически приемлемых солей.

В некоторых вариантах осуществления, ингибитор Trk выбран из группы, состоящей из:

5-хлор-N⁴-(5-циклопропил-1Н-пиразол-3-ил)-N²-(1-фенилэтил)пиримидин-2,4-диамина;

5-бром-N⁴-(3-этил-1H-пиразол-5-ил)-N²-(1-фенилэтил) пиримидин-2,4-диамина;

N⁴-(3-трет-бутил-1H-пиразол-5-ил)-5-хлор-N²-(1-фенилэтил)пиримидин-2,4-диамина;

N⁴-(3-Циклопропил-1H-пиразол-5-ил)-N²-(1-фенилэтил)-5-(трифторметил)пиримидин-
2,4-диамина;

5-бром-N⁴-(3-циклопропил-1H-пиразол-5-ил)-N²-[(1S)-1-(4-фторфенил)этил]
пиримидин-2,4-диамина;

5-бром-N⁴-(3-циклопропил-1H-пиразол-5-ил)-N²-[(1S)-1-фенилпропил]пиримидин-
2,4-диамина;

5-бром-N⁴-(3-циклопропил-1H-пиразол-5-ил)-N²-[(1S)-1-(4-нитрофенил)этил]
пиримидин-2,4-диамина;

(2R)-2-({5-бром-4-[(3-циклопропил-1H-пиразол-5-ил)амино]пиримидин-2-ил}амино)
-2-фенилэтанола;

5-бром-N⁴-(5-циклопропил-1H-пиразол-3-ил)-N²-(1-фенилэтил)пиримидин-2,4-диамина;







5-хлор-N⁴-(5-циклопропил-1H-пиразол-3-ил)-N²-(1-фенилпропил)пиримидин-2,4-
диамина;







или их фармацевтически приемлемых солей.







В некоторых вариантах осуществления, ингибитор Trk представляет собой одно или
несколько соединений из таблицы 5, или их фармацевтически приемлемые соли.








Таблица 5. Иллюстративные ингибиторы Trk

No. соединения	Структура соединения	Наименование соединения
1		(R)-N-(6-(2-(2,5-дифторфенил)пирролидин-1-ил)имидазо[1,2-b]пиридазин-3-ил)-3-гидроксиазетидин-1-карбоксамид
2		(R)-3-(6-(2-(2,5-дифторфенил)пирролидин-1-ил)имидазо[1,2-b]пиридазин-3-ил)-1,1-диметилмочевина
3		(R)-1-(6-(2-(2,5-дифторфенил)пирролидин-1-ил)имидазо[1,2-b]пиридазин-3-ил)мочевина

5	4		(R)-1-(6-(2-(2,5-дифторфенил)пирролидин-1-ил)имидазо[1,2-b]пиридазин-3-ил)-3-метилмочевина
10	5		(R)-N-(5-(2-(2,5-дифторфенил)пирролидин-1-ил)пиразоло[1,5-a]пиримидин-3-ил)-3-гидроксиазетидин-1-карбоксамид
15	6		(R)-3-(6-(2-(2,5-дифторфенил)пирролидин-1-ил)имидазо[1,2-b]пиридазин-3-ил)-1-(2-гидроксиэтил)-1-метилмочевина
20	7		(R)-N-(6-(2-(2,5-дифторфенил)пирролидин-1-ил)имидазо[1,2-b]пиридазин-3-ил)-3-гидрокси-3-метилазетидин-1-карбоксамид
25	8		(R)-3-(5-(2-(2,5-дифторфенил)пирролидин-1-ил)пиразоло[1,5-a]пиримидин-3-ил)-1,1-диметилмочевина
30	9		(R)-N-(5-(2-(2-хлор-5-фторфенил)пирролидин-1-ил)пиразоло[1,5-a]пиримидин-3-ил)-3-гидроксиазетидин-1-карбоксамид

5	10		(R)-N-(5-(2-(2-хлор-5-фторфенил)пирролидин-1-ил)пиразоло[1,5-а]пиримидин-3-ил)-3-гидрокси-3-метилазетидин-1-карбоксамид
10	11		(R)-N-(5-(2-(3-фторфенил)пирролидин-1-ил)пиразоло[1,5-а]пиримидин-3-ил)-3-гидроксиазетидин-1-карбоксамид
15			
20	12		(R)-5-(2-(2,5-дифторфенил)пирролидин-1-ил)пиразоло[1,5-а]пиримидин-3-карбоксамид
25	13		(R)-N-циклопропил-5-(2-(5-фторпиридин-3-ил)пирролидин-1-ил)пиразоло[1,5-а]пиримидин-3-карбоксамид
30			
35	14		(R)-5-(2-(5-фтор-2-метоксипиридин-3-ил)пирролидин-1-ил)-N-метокси-пиразоло[1,5-а]пиримидин-3-карбоксамид
40	15		(R)-5-(2-(5-фторпиридин-3-ил)пирролидин-1-ил)-N-(1-метилциклопропил)пиразоло[1,5-а]пиримидин-3-карбоксамид
45			

5	16		(6R)-9-фтор-13-окса-2, 11, 17,21,22,25-гексазапентацикло [17.5.2.0 ^{2,6} .0 ^{7,12} .0 ^{22,26}]-гексакоза-1(25),7,9,11,19(26),20,23-гептен-18-он
10	17		(6R,15R)-9-фтор-15-гидрокси-13-окса-2,11, 17,21,22,25-гексазапентацикло- ло-[17.5.2.0 ^{2,6} .0 ^{7,12} .0 ^{22,26}]-гексакоза-1(25),7,9,11, 19(26),20,23-гептен-18-он
15	18		(6R)-9-фтор-13-окса-2,11,18,22,23,26-гексазапентацикло [18.5.2.0 ^{2,6} .0 ^{7,12} .0 ^{23,27}]-гептакоза-1(26),7,9,11,20(27),21,24-гептен-19-он
20	19		(6R)-9-фтор-13-окса-2,17,21,22,25-пентазапентацикло [17.5.2.0 ^{2,6} .0 ^{7,12} .0 ^{22,26}]-гексакоза-1(25),7,9,11,19(26),20,23-гептен-18-он
30	20		(6R)-12-окса-2,16,20,21,24,26-гексазапентацикло[16.5.2.17,11.0 ^{2,6} .0 ^{21,25}]- гексакоза-1(24),7(26),8,10,18(25),19,22-гептен-17-он
35	21		1-[(6R)-9-фтор-13-окса-2,16,20,21,24-пентазапентацикло [16.5.2.0 ^{2,6} .0 ^{7,12} .0 ^{21,25}]-пентакоза-1(24),7,9,11,18(25),19,22-гептен-16-ил] этан-1-он

5	22		(6R)-9-фтор-13,16-диокса-2,11,20,21,24-пентаазапентацикло [16.5.2.0 ^{2,6} .0 ^{7,12} .0 ^{21,25}]-пентакоза-1(24),7,9,11,18(25),19,22-гептен-17-он
10	23		(6R)-9,15,15-трифтор-13-окса-2,11,17,21,22,25-гексаазапентацикло [17.5.2.0 ^{2,6} .0 ^{7,12} .0 ^{22,26}]-гексакоза-1(25),7,9,11,19(26),20,23-гептен-18-он
15	24		(6R,13S)-9-фтор-13-метил-2,11,15,19,20,23-гексаазапентацикло [15.5.2.1 ^{7,11} .0 ^{2,6} .0 ^{20,24}]-пентакоза-1(23),7,9,17(24),18,21-гексен-16,25-дион
20	25		(6R)-9-фтор-15,15-диметил-13-окса-2,11,17,21,22,25-гексаазапентацикло [17.5.2.0 ^{2,6} .0 ^{7,12} .0 ^{22,26}]-гексакоза-1(25),7,9,11,19(26),20,23-гептен-18-он
25	26		(15S)-4,4,9-трифтор-15-гидрокси-13-окса-2,17,21,22,25-пентаазапентацикло [17.5.2.0 ^{2,6} .0 ^{7,12} .0 ^{22,26}]-гексакоза-1(25),7(12),8,10,19(26),20,23-гептен-18-он
30	27		(6R,15S)-9-фтор-15-метил-2,11,16,20,21,24-гексаазапентацикло [16.5.2.0 ^{2,6} .0 ^{7,12} .0 ^{21,25}]-пентакоза-1(24),7,9,11,18(25),19,22-гептен-17-он
35	28		(6R,15R)-9-фтор-15-метил-2,11,16,20,21,24-гексаазапентацикло [16.5.2.0 ^{2,6} .0 ^{7,12} .0 ^{21,25}]-пентакоза-1(24),7,9,11,18(25),19,22-гептен-17-он

Дополнительные примеры ингибиторов Trk описаны в Патентной заявке США

серийный No. 62/080,374, в Публикациях Международных заявок No. WO 11/006074, WO 11/146336, WO 10/033941, и WO 10/048314, и в Патентах США No. 8933084, 8791123, 8637516, 8513263, 8450322, 7615383, 7384632, 6153189, 6027927, 6025166, 5910574, 5877016 и 5844092, полное содержание всех из которых приведено в настоящем описании в качестве ссылки. Дополнительные ингибиторы Trk известны в данной области.

В некоторых вариантах осуществления, первый ингибитор Trk выбран из группы, состоящей из: энтректиниба (N-[5-(3,5-дифторбензил)-1H-индазол-3-ил]-4-(4-метилпиперазин-1-ил)-2-(тетрагидропиран-4-иламино)-бензамида); сульфата (S)-N-(5-((R)-2-(2,5-дифторфенил)пирролидин-1-ил)пиразоло[1,5-а]пиримидин-3-ил)-3-гидроксипирролидин-1-карбоксоамида; кабозантиниба ((N-(4-((6,7-диметоксихинолин-4-ил)окси)фенил)-N'-(4-фторфенил)циклопропан-1,1-дикарбоксоамида)); доватиниба (гидрата моно-2-гидроксипропаноата 4-амино-5-фтор-3-[6-(4-метилпиперазин-1-ил)-1H-бензимидазол-2-ил]хинолин-2(1H)-она); белизатиниба (4-фтор-N-(6-((4-(2-гидроксипропан-2-ил)пиперидин-1-ил)метил)-1-((1s,4s)-4-(изопропилкарбамоил)циклогексил)-1H-бензо[d]имидазол-2-ил)бензамида); ситраватиниба (N-(3-фтор-4-((2-(5-((2-метоксиэтил)амино)метил)пиридин-2-ил)тиено[3,2-b]пиридин-7-ил)окси)фенил)-N-(4-фторфенил)циклопропан-1,1-дикарбоксоамида); PLX7486; алтиратиниба (N-(4-((2-(циклопропанкарбоксоамидо)пиридин-4-ил)окси)-2,5-дифторфенил)-N-(4-фторфенил)циклопропан-1,1-дикарбоксоамида); и AZD7451 ((S)-N-(1-(5-фторпиримидин-2-ил)этил)-3-(5-изопропокси-1H-пиразол-3-ил)-3H-имидазо[4,5-b]пиридин-5-амин)). Например, первый ингибитор Trk может представлять собой энтректиниб или сульфат ((S)-N-(5-((R)-2-(2,5-дифторфенил)пирролидин-1-ил)пиразоло[1,5-а]пиримидин-3-ил)-3-гидроксипирролидин-1-карбоксоамида (или его полиморфа).

В некоторых вариантах осуществления, второй ингибитор Trk представляет собой соединение из таблицы 5 или его фармацевтически приемлемую соль.

В некоторых вариантах осуществления, второй ингибитор Trk не включает соединение, выбранное из группы, состоящей из: энтректиниба (N-[5-(3,5-дифторбензил)-1H-индазол-3-ил]-4-(4-метилпиперазин-1-ил)-2-(тетрагидропиран-4-иламино)-бензамида); сульфата (S)-N-(5-((R)-2-(2,5-дифторфенил)пирролидин-1-ил)пиразоло[1,5-а]пиримидин-3-ил)-3-гидроксипирролидин-1-карбоксоамида; кабозантиниба ((N-(4-((6,7-диметоксихинолин-4-ил)окси)фенил)-N'-(4-фторфенил)циклопропан-1,1-дикарбоксоамида)); доватиниба (гидрата моно-2-гидроксипропаноата 4-амино-5-фтор-3-[6-(4-метилпиперазин-1-ил)-1H-бензимидазол-2-ил]хинолин-2(1H)-она); белизатиниба (4-фтор-N-(6-((4-(2-гидроксипропан-2-ил)пиперидин-1-ил)метил)-1-((1s,4s)-4-(изопропилкарбамоил)циклогексил)-1H-бензо[d]имидазол-2-ил)бензамида); ситраватиниба (N-(3-фтор-4-((2-(5-((2-метоксиэтил)амино)метил)пиридин-2-ил)тиено[3,2-b]пиридин-7-ил)окси)фенил)-N-(4-фторфенил)циклопропан-1,1-дикарбоксоамида); PLX7486; алтиратиниба (N-(4-((2-(циклопропанкарбоксоамидо)пиридин-4-ил)окси)-2,5-дифторфенил)-N-(4-фторфенил)циклопропан-1,1-дикарбоксоамида); и AZD7451 ((S)-N-(1-(5-фторпиримидин-2-ил)этил)-3-(5-изопропокси-1H-пиразол-3-ил)-3H-имидазо[4,5-b]пиридин-5-амин)).


Настоящее изобретение относится также к фармацевтическим композициям, содержащим один или несколько ингибиторов Trk, как представлено в настоящем описании, с фармацевтически приемлемым носителем. Фармацевтические композиции, содержащие один или несколько ингибиторов Trk в качестве активного ингредиента, можно получать посредством смешивания ингибитора Trk с фармацевтическим носителем в соответствии с общепринятыми фармацевтическими способами. Носитель может принимать широкое множество форм в зависимости от желательного способа

введения (например, перорального, парентерального). Таким образом, для жидких пероральных препаратов, таких как суспензии, эликсиры и растворы, пригодные носители и добавки включают воду, гликоли, масла, спирты, придающие вкус средства, консерванты, стабилизаторы, окрашивающие средства и т.п.; для твердых пероральных препаратов, таких как порошки, капсулы и таблетки, пригодные носители и добавки включают крахмалы, сахара, разбавители, гранулирующие средства, смазывающие средства, связующие вещества, дезинтегрирующие средства и т.п. Твердые пероральные препараты можно также покрывать такими веществами, как сахара, или можно покрывать кишечнорастворимым покрытием, чтобы регулировать главный участок абсорбции. Для парентерального введения, носитель обычно состоит из стерильной воды, и другие ингредиенты можно добавлять для увеличения растворимости или срока хранения. Можно также получать пригодные для инъекции суспензии или растворы.

В некоторых вариантах осуществления, ингибитор Trk, как представлено в настоящем описании, можно вводить в форме таблетки или капсулы.

В некоторых вариантах осуществления, ингибитор Trk, представленный в настоящем описании, можно вводить в форме жидкого состава. Например, настоящее изобретение относится к жидкому составу, содержащему:

(a) (S)-N-(5-((R)-2-(2,5-дифторфенил)пирролидин-1-ил)-пиразоло[1,5-a]пиримидин-3-ил)-3-гидрокси-пирролидин-1-карбоксамид, имеющий формулу I:



(I),

его фармацевтически приемлемую соль или их комбинацию;

(b) солюбилизирующее средство (например, циклодекстрин, такой как гидроксипропил-β-циклодекстрин), присутствующий в количестве от приблизительно 5 масс. % до приблизительно 35 масс. %; и

(c) буфер (например, цитратный буфер, такой как цитрат натрия), присутствующий в количестве от приблизительно 0,1 масс. % до приблизительно 5 масс. %;


(d) подсластитель (например, подсластитель, содержащий сахарозу или интенсивный подсластитель), присутствующий в количестве от приблизительно 30 масс. % до приблизительно 70 масс. %;

(e) маскирующее горечь средство, присутствующее в количестве от приблизительно 0,2 масс. % до приблизительно 0,5 масс. %; и

(f) придающее вкус средство, присутствующее в количестве приблизительно от 0,01 масс. % до приблизительно 2 масс. %. В некоторых вариантах осуществления, состав имеет pH от приблизительно 3 до приблизительно 4. В некоторых вариантах осуществления, соединение формулы I имеет концентрацию от приблизительно 20 мг/мл до приблизительно 30 мг/мл в жидком составе. Дополнительные примеры жидкого состава можно обнаружить в Предварительных патентных заявках США No. 62/380773 и 62/329561, полное содержание обеих из которых приведено в настоящем описании в качестве ссылки.

В некоторых вариантах осуществления, жидкий состав получают из фармацевтически

приемлемой соли соединения формулы I. Например, фармацевтически приемлемая соль представляет собой соль гидросульфат. В некоторых вариантах осуществления, жидкий состав получают из кристаллической формы соединения формулы I. Например, кристаллическая форма соединения формулы I может иметь формулу I-HS:



I-HS

В способах, представленных в настоящем описании, ингибитор Trk можно вводить перорально, подкожно, внутривенно, внутримышечно. В некоторых примерах, ингибитор Trk можно вводить в одной или нескольких дозах, включающих дозы между приблизительно 1 мг и приблизительно 250 мг, между приблизительно 1 мг и приблизительно 200 мг, между приблизительно 1 мг и приблизительно 180 мг, между приблизительно 1 мг и приблизительно 160 мг, между приблизительно 1 мг и приблизительно 140 мг, между приблизительно 1 мг и приблизительно 120 мг, между приблизительно 1 мг и приблизительно 100 мг, между приблизительно 1 мг и приблизительно 80 мг, между приблизительно 1 мг и приблизительно 60 мг, между приблизительно 1 мг и приблизительно 40 мг, между приблизительно 1 мг и приблизительно 40 мг, между приблизительно 10 мг и приблизительно 200 мг, между приблизительно 10 мг и приблизительно 180 мг, между приблизительно 10 мг и приблизительно 160 мг, между приблизительно 10 мг и приблизительно 140 мг, между приблизительно 10 мг и приблизительно 120 мг, между приблизительно 10 мг и приблизительно 100 мг, между приблизительно 10 мг и приблизительно 80 мг, между приблизительно 10 мг и приблизительно 60 мг, между приблизительно 10 мг и приблизительно 40 мг, между приблизительно 10 мг и приблизительно 20 мг, между приблизительно 20 мг и приблизительно 200 мг, между приблизительно 20 мг и приблизительно 180 мг, между приблизительно 20 мг и приблизительно 160 мг, между приблизительно 20 мг и приблизительно 140 мг, между приблизительно 20 мг и приблизительно 120 мг, между приблизительно 20 мг и приблизительно 100 мг, между приблизительно 20 мг и приблизительно 80 мг, между приблизительно 20 мг и приблизительно 60 мг, между приблизительно 20 мг и приблизительно 40 мг, между приблизительно 40 мг и приблизительно 200 мг, между приблизительно 40 мг и приблизительно 180 мг, между приблизительно 40 мг и приблизительно 160 мг, между приблизительно 40 мг и приблизительно 140 мг, между приблизительно 40 мг и приблизительно 120 мг, между приблизительно 40 мг и приблизительно 100 мг, между приблизительно 40 мг и приблизительно 80 мг, между приблизительно 40 мг и приблизительно 60 мг, между приблизительно 60 мг и приблизительно 200 мг, между приблизительно 60 мг и приблизительно 180 мг, между приблизительно 60 мг и приблизительно 140 мг, между приблизительно 60 мг и приблизительно 120 мг, между приблизительно 60 мг и приблизительно 100 мг, между приблизительно 60 мг и приблизительно 80 мг, между приблизительно 80 мг и приблизительно 200 мг, между приблизительно 80 мг и приблизительно 180 мг, между приблизительно 80 мг и приблизительно 160 мг, между приблизительно 80 мг и приблизительно 140 мг, между приблизительно 80 мг и приблизительно 120 мг, между

приблизительно 80 мг и приблизительно 100 мг, между приблизительно 90 мг и приблизительно 110 мг, между приблизительно 95 мг и приблизительно 105 мг, между приблизительно 100 мг и приблизительно 200 мг, между приблизительно 100 мг и приблизительно 180 мг, между приблизительно 100 мг и приблизительно 160 мг, между
 5 приблизительно 100 мг и приблизительно 140 мг, между приблизительно 100 мг и приблизительно 120 мг, между приблизительно 120 мг и приблизительно 200 мг, между приблизительно 120 мг и приблизительно 180 мг, между приблизительно 120 мг и приблизительно 160 мг, между приблизительно 120 мг и приблизительно 140 мг, между приблизительно 140 мг и приблизительно 200 мг, между приблизительно 140 мг и
 10 приблизительно 180 мг, между приблизительно 140 мг и приблизительно 160 мг, между приблизительно 160 мг и приблизительно 200 мг, между приблизительно 160 мг и приблизительно 200 мг, между приблизительно 160 мг и приблизительно 180 мг, или между приблизительно 180 мг и приблизительно 200 мг ингибитора Trk. Подходящую дозу ингибитора Trk для введения субъекту может определить медицинский работник,
 15 например, на основании одного или нескольких из массы субъекта, состояния субъекта, пола субъекта и других заболеваний, которые может иметь субъект.

Множественные дозы ингибитора Trk (например, любые из доз, описанных в настоящем описании) можно вводить один раз в каждые шесть месяцев, один раз в каждые пять месяцев, один раз в каждые четыре месяца, один раз в каждые три месяца,
 20 один раз в каждые два месяца, один раз в каждые шесть недель, один раз в месяц, один раз в каждые три недели, один раз в каждые две недели, один раз в неделю, дважды в неделю, три раза в неделю, четыре раза в неделю, три раза в неделю, каждые вторые сутки, один раз в сутки, два раза в сутки или три раза в сутки в качестве части лечения. Ингибитор Trk можно вводить самостоятельно (например, его может вводить субъект,
 25 имеющий злокачественную опухоль), или его может вводить медицинский работник (например, терапевт, сиделка, медсестра или фармацевт) в качестве части лечения, как описано в настоящем описании.

Способы лечения, не включающие ингибитор Trk в качестве монотерапии, и дополнительные противораковые средства и способы терапии

30 В любом из способов, описанных в настоящем описании, лечение, не включающее ингибитор Trk (например, первый ингибитор Trk, как описано в настоящем описании) (например, энтректиниб или сульфат (S)-N-(5-((R)-2-(2,5-дифторфенил)пирролидин-1-ил)пиразоло[1,5-a]пиримидин-3-ил)-3-гидроксипирролидин-1-карбоксамид) в качестве монотерапии, может представлять собой, например, лечение, включающее другое
 35 противораковое средство или противораковую терапию. В некоторых вариантах осуществления, лечение, не включающее ингибитор Trk в качестве монотерапии, может представлять собой, например, лечение, включающее одно или несколько из: хирургии, радиотерапии, химиотерапии, иммунотерапии, гормонотерапии, низкомолекулярных лекарственных средств, нацеленных на другие киназы в пути передачи сигналов Trk,
 40 рекомбинантных антител и трансплантации стволовых клеток. В некоторых вариантах осуществления, дополнительное противораковое средство выбрано из группы, состоящей из: химиотерапии, иммунотерапии, гормонотерапии, низкомолекулярных лекарственных средств, нацеленных на другие киназы в пути передачи сигналов Trk, и рекомбинантных антител. В некоторых вариантах осуществления, противораковая
 45 терапия выбрана из группы, состоящей из: хирургии, радиотерапии и трансплантации стволовых клеток.

В некоторых вариантах осуществления, лечение, не включающее ингибитор Trk (например, первый ингибитор Trk) в качестве монотерапии, может представлять собой,

например, комбинированное лечение, включающее (i) одно или несколько из хирургии, радиотерапии, химиотерапии, иммунотерапии, гормонотерапии, низкомолекулярных лекарственных средств, нацеленных на другие киназы в пути передачи сигналов Trk, рекомбинантных антител и трансплантации стволовых клеток, и (ii) один или несколько ингибиторов Trk (например, любой из ингибиторов Trk, описанных в настоящем описании). В некоторых вариантах осуществления, лечение, не включающее ингибитор Trk в качестве монотерапии, может представлять собой, например, лечение, включающее два или более ингибиторов Trk (например, любые из ингибиторов Trk, описанных в настоящем описании).

В некоторых вариантах осуществления, лечение, не включающее первый ингибитор Trk в качестве монотерапии, может представлять собой, например, лечение, включающее второй ингибитор Trk в качестве монотерапии. В некоторых вариантах осуществления, лечение, не включающее первый ингибитор Trk в качестве монотерапии, может представлять собой, например, лечение, включающее одно или несколько соединений из таблицы 5, или их фармацевтически приемлемые соли.

Неограничивающие примеры хирургии включают, например, открытое хирургическое вмешательство или минимально инвазивное хирургическое вмешательство.

Хирургическое вмешательство может включать, например, удаление всей опухоли, уменьшение объема опухоли, или удаление опухоли, вызывающей боль или сдавливание у субъекта. Способы проведения открытого хирургического вмешательства и минимально инвазивного хирургического вмешательства у субъекта, имеющего злокачественную опухоль, известны в данной области.

Неограничивающие примеры радиотерапии включают наружную дистанционную лучевую терапию (например, наружную дистанционную лучевую терапию с использованием киловольтных рентгеновских лучей или мегавольтных рентгеновских лучей) или внутреннюю радиотерапию. Внутренняя радиотерапия (называемая также брахитерапией) может включать использование, например, внутренней радиотерапии с использованием низкой дозы или внутренней радиотерапии с использованием высокой дозы. Внутренняя радиотерапия с использованием низкой дозы включает, например, вставку небольших радиоактивных гранул (называемых также зёрнами) в ткань злокачественной опухоли или поблизости от ткани злокачественной опухоли у субъекта. Внутренняя радиотерапия с использованием высокой дозы включает, например, вставку тонкой трубки (например, катетера) или имплантата в ткань злокачественной опухоли или поблизости от ткани злокачественной опухоли у субъекта, и доставку высокой дозы радиоактивного излучения в тонкую трубку или имплантат с использованием устройства для радиоактивного излучения. Способы проведения радиотерапии у субъекта, имеющего злокачественную опухоль, известны в данной области.

В некоторых вариантах осуществления, представленных в настоящем описании, вводят дополнительное противораковое средство. Неограничивающие примеры таких дополнительных противораковых средств являются следующими.

Неограничивающие примеры химиотерапии включают, например, алкилирующее средство, антиметаболит, средство, нарушающее функционирование микротрубочек, ингибитор топоизомеразы и цитотоксический антибиотик. Примеры алкилирующих средств включают, например, азотистые иприты (например, циклофосфамид, мехлорэтамин или мустин, урамустин или урациловый иприт, мелфалан, хлорамбуцил, ифосфамид и бендамустин), нитрозомочевину (например, кармустин, ломустин и стрептозоцин) и алкилсульфонаты (например, бусульфан). Дополнительные примеры алкилирующих средств включают, например, цисплатин, карбоплатин, недаплатин,

оксалиплатин, сатраплатин, тетранитрат триплатина, прокарбазин, алтретамин, декарбазин, митозоломид и темозололмид. Неограничивающие примеры антиметаболитов включают фторурацил, кладрибин, капецитабин, меркаптопурин, пеметрексед, флударабин, гемцитабин, гидроксимочевину, метотрексат, неларабин, клофарабин, цитарабин, децитабин, пралатрексат, флоксуридин и тиогуанин. Неограничивающие примеры средств, нарушающих функционирование микротрубочек, включают колхицин, доластатин 15, нокодазол, паклитаксел, подофиллотоксин, ризоксин, винбластин, винкристин, виндезин и винорелбин. Неограничивающие примеры ингибиторов топоизомеразы включают камптосар, гикамтин, иринотекан, топотекан, ворелоксин, камптотецин, SN-38, гиматекан, белотекан, луртотекан, экзатекан, дифлометекан, S 39625, NSC 314622, NSC 706744, NSC 725776, NSC 724998, топовал (ARC-111), эндотекарин (ED-709), BMS-250749 и инденоизохинолин. Неограничивающие примеры цитотоксических антибиотиков включают блеомицин, дактиномицин, даунорубицин, пликамицин, митомицин, митоксантрон, даунорубицин, доксорубицин, эпирубицин, идарубицин и митоксантрон. Дополнительные примеры химиотерапии известны в данной области.

Неограничивающие примеры иммунотерапии включают адоптивный перенос клеток, цитокины, вакцинацию против злокачественных опухолей, привлекающий Т-клетки биспецифические активаторы (например, Huehls et al., *Immunol. Cell Biol.* 93:290-296, 2015), и бациллу Кальмета-Герена. Неограничивающие примеры адоптивного переноса клеток включают инфильтрующие опухоль лимфоциты (Demaria et al., *Clin. Cancer Res.* 7:3025-3030, 2001), сенсibilизированные В-клетки (Li et al., *J. Immunol.* 183:3195-3203, 2009), сенсibilизированные Т-клетки (Wang et al., *Breast Cancer Res. Treatment* 134:61-70, 2012), нагруженные антигеном дендритные клетки (Ponsaerts et al., *Clin. Exp. Immunol.* 134:378-384, 2003), Т-клетки с химерным рецептором антигена (CAR-Т-клетки) (Hinrichs et al., *Immunol. Rev.* 257:56-71, 2014), искусственные антигенпредставляющие клетки (аАРС) (например, Turtle et al., *Cancer J.* 16:374-381, 2010), подвергнутые иммуномодуляции клетки NK (например, Flannery et al., *Eur. J. Cancer Clin. Oncol.* 20:791-798, 1984), и Т-клетки с генетически сконструированными Т-клеточными рецепторами (например, Essand et al., *J. Intern Med.* 273:166-181, 2013). Дополнительные примеры иммунотерапии известны в данной области.

Неограничивающие примеры гормонотерапии включают лекарственные средства, блокирующие эстроген, лекарственные средства, уменьшающие уровень эстрогена, подобные прогестерону лекарственные средства и антиандрогенные лекарственные средства. Примеры лекарственных средств, блокирующих эстроген, включают, например, ворозол, тестолактон, форместан, тамоксифен, кломифен, арзоксифен, кломифен, анастрозол, лентрозол, экземестан, ралоксифен, торемифен и фулвестрант. Примеры антипрогестеронных средств включают мифепристон и аглепристон. Примеры лекарственных средств, представляющих собой антиандрогенные лекарственные средства, включают, например, бикалутамид, флутамид, нилутамид и энзалутамид. Дополнительные примеры гормонотерапии известны в данной области.

Неограничивающие примеры низкомолекулярных лекарственных средств, нацеленных на другие киназы в пути передачи сигналов Trk, включают ингибиторы PI3K, Akt, Ras, Raf, MEK и ERK. Примеры ингибиторов PI3K включают A-769662, акалисиб (GS-9820 или CAL-120), афуресертиб (GSK-2110183), AMG-319, ARQ-092, AS-252424, AS-604850, AS-605240, AZD6482, BAY 80-6940, BEZ235 (NVP-BEZ235), BGT-226, бупарлисиб (BKM120), BYL719, CAL-101, CAY10505, CC-115, CC-223, CH5132799, копанлисиб (BAY 80-6946), CUDC-907, CZC24832, D-106669, D-116883, D-87503, дегуелин, DS-3078a,

дувелисиб (PI-145), эверолимус (RAD001), GDC-0032, GDC-0349 (RG7603), GDC-0980 (RG7422), GSK1059615, GSK2126458, GSK-2141795, HS-173, IC-87114, иделаалисиб (CAL-101 или GS-1101), INCB040093, INK1117, LY2780301, LY294002 (SF1101), МК-2206, MLN0128, NU7441, OSI-027, панулисиб, PF-04691502, PF376304, гидрохлорид фенформина, PI-103, пиктилисиб (GDC-0941 или RG7321), PIK-124, PIK-294, PIK-39, PIK-90, PIK-93, PIK-402, PKI-587, PP121, PWT33597, PX-866, кверцетин (софоретин), ридафоролimus, ригосертиб (ON 01910.Na), RP-6539, SAR245408 (XL147), SAR260301, SF1126, SF1326, сиролimus, стауроспорин, TASP0415914, темсиролimus, TG100-115, TGR-1202, TGX221, теofilлин, трицирибин, VS-5584, вортманнин, XL-765 (SAR245409) и ZSTK474.

Неограничивающие примеры ингибиторов Akt включают A-443654, A-674563, афуресертиб (GSK-2110183), API-1, ARQ-094, AT7867, AZ7328, AZD-5363, CCT128930, DC120, дегуелин, GDC-0068, GSK-2141795, GSK-690693, ISC-4, KP372-1, LY2780301, LY294002, Y294005, МК-2206, олеандрин (PBI-05204), паломид 529, перифозин, PF-AKT400, PHT-427, PX-316, SC66, семаксаниб, SH-5, SR13668, темсиролimus, траметиниб и трицирибин.

Неограничивающие примеры ингибиторов Ras включают Kobe2602, манумицин A, L-744,832 дигидрохлорид, фарнезил-тиосалициловую кислоту, соль трифторацетат FTI-276, SCH 51344, типифарниб и ингибитор 12 K-ras(G12C), и ингибитор 6 K-ras(G12C).

Неограничивающие примеры ингибиторов Raf включают сорафениб (нексавар или BAY 43-9006), GDC0879, RAF265, дабрафениб (GSK2118436), вемурафениб (PLX-4032), SB590885, PLX-4720, энкорафениб (LGX818), LY3009120, AZ 628, CEP-32496, TAK-632, ZM 336372, NVP-BHG712 и GW5074.

Неограничивающие примеры ингибиторов MEK включают CI-1040, траметиниб (GSK1120212), селуметиниб (AZD6244), биниметиниб (MEK162, ARRY-162 или ARRY-438162), PD-325901, кобиметиниб (XL518), CI-1040, PD035901, U0126, PD184352 (CI-1040), PD98059, BIX 02189, пимасертиб (AS-703026), BIX 02188, TAK-733, AZD8330, PD318088, хонокиол, SL-327, рефаметиниб (RDEA119 или Bay 86-9766), GDC-0623 и BI-847325.

Неограничивающие примеры ингибиторов ERK включают SCH772984, XMD8-92, FR 180204, GDC-0994, ERK5-IN-1, уликсертиниб (BVD-523 или VRT752271), FR180204, BIX 02189, плюрипотин, TCS ERK 11e, TMCB, XMD 8-92, U0126, траметиниб и селуметиниб.

Неограничивающие примеры рекомбинантных антител включают моноклональные антитела, биспецифические антитела (например, антитела BiTE®), Fab, Fab₂, Fab₃, scFv, Bis-scFv, миниантитело, триотело, диатело, тетратело, домен VhH, домен V-NAR, IgNAR, и верблюжье Ig. Дополнительные примеры рекомбинантного антитела (например, рекомбинантного человеческого антитела) представляют собой IgG (например, IgG1, IgG2, IgG3 или IgG4), IgM, IgE, IgD и IgA. Неограничивающие примеры рекомбинантных антител включают человеческие антитела, гуманизированные антитела или химерные антитела. Неограничивающие примеры рекомбинантных антител включают антитела, специфически связывающиеся с NGF.

Неограничивающие примеры рекомбинантных антител, специфически связывающихся с NGF, включают танезумаб, футуксимаб, MNAC13, фазинумаб (REGN475), mAb NGF30 (например, Saragovi et al., J. Biol. Chem. 273:34933-34940, 1998), ME20.4, и ME82.11.

Дополнительные антитела, специфически связывающиеся с NGF, описаны, например, в Патенте США No. 8106167; 8148107; и 8911734; в Публикациях патентных заявок США No. 2009/0041717, 2011/0268725 и 2014/0227287; в Публикациях международных патентных заявок No. WO 06/131051 и WO 12/024650; и в Европейском патенте No. 18646451.

Дополнительные примеры рекомбинантных антител включают, например, 3F8, 8H9, абаговомаб, абитузумаб, адекватумумаб, афутузумаб, алацизумаб пеголь, алемтузумаб, альтумомаб пентетат, аматуксимаб, анатумомаб мафенатокс, анетумаб равтансин, аполизумаб, арцитумомаб, аскринвакумаб, атезолизумаб, бавитуксимаб, бектумомаб, 5 белимумаб, бесилесомаб, бевацизумаб, биватузумаб мертанзин, блинатумомаб, брентуксимаб, брониктузумаб, кантузумаб мертанзин, кантузумаб равтанзин, капромаб пендетид, карлумаб, катумаксомаб, иммуноконъюгат сBR96-доксорубицин, CC49, цетуксимаб, Ch.14.18, цитатузумаб богатокс, сиксутумаб, кливатузумаб тетраксэтан, кодритузумаб, колтуксимаб равтанзин, конатумумаб, дацетузумаб, далотузумаб, 10 даратумумаб, демцизумаб, денинтузумаб мафодотин, деносумаб, дерлотуксимаб биотин, детумомаб, динутуксимаб, дрозитумаб, дурвалумаб, дусигитумаб, экромексимаб, эдреколомаб, элгемтумаб, элотузумаб, эмактузумаб, эмибетузумаб, энаватузумаб, энфортунмаб ведотин, эноблитузумаб, энситуксимаб, эпратузумаб, эртумаксомаб, этарацизумаб, фарлетузумаб, FBTA05, фиклатузумаб, фигитумумаб, фланвотумаб, 15 галиксимаб, ганитумаб, гемтузумаб озогамидин, гирентуксимаб, глембатумумаб ведотин, ибритумомаб, икрукумаб, иговомаб, IMAV362, ималумаб, имгатузумаб, индатузумаб равтанзин, индусатумаб ведотин, интетумумаб, инотузумаб озогамидин, ипилимумаб, иратумумаб, изатузумаб, лабетузумаб, ламбролизумаб, лексатумумаб, лифастузумаб ведотин, лилотомаб сатетраксетан, линтузумаб, лорвотузумаб мертанзин, лукатумумаб, 20 лумиликсимаб, лумретузумаб, мапатумумаб, маргетуксимаб, матузумаб, милатузумаб, мирветуксимаб соравтанзин, митумомаб, могамулизумаб, моксетумомаб пазудотокс, наколомаб тафенатокс, наптумомаб эстафенатокс, нарнатумаб, нецитумумаб, несвакумаб, нимотузумаб, ниволумаб, нофетумомаб мерпентан, обинутузумаб, окаратузумаб, офатумумаб, оларатумаб, онартузумаб, онтуксизумаб, опортузумаб 25 монатокс, ореговомаб, отлелтузумаб, панитумумаб, панкомаб, парсатузумаб, пазотуксизумаб, патритумаб, пембролизумаб, пемтумомаб, пертузумаб, пидилизумаб, пинатузумаб ведотин, пинтумомаб, полатузумаб ведотин, притумумаб, ракотумомаб, радретумаб, рамуцирумаб, рилотумумаб, ритуксимаб, робатумумаб, сацитузумаб говитекан, самализумаб, сатумомаб пендетид, серибантумаб, сибротузумаб, SGN- 30 CD19A, SGN-CD33A, силтуксимаб, софитузумаб ведотин, табалумаб, такатузумаб тетраксэтан, таплитумомаб паптокс, тарекстумаб, тенатумомаб, тепротумумаб, TGN1412, тицилимумаб (тремелимумаб), тигатузумаб, TNX-650, тозитумомаб, товетумаб, трастузумаб, TRBS07, тремелимумаб, тукотузумаб целмолейкин, ублитуксимаб, улокуплумаб, урелумаб, вандортузумаб ведотин, ванктикумаб, вануцизумаб, велтузумаб, 35 волоциксимаб, ворсетузумаб мафодотин, вотумумаб, залутумумаб, занолимумаб и затуксимаб.

Неограничивающие примеры трансплантации стволовых клеток включают аутологичную трансплантацию стволовых клеток, аллогенную трансплантацию 40 стволовых клеток и сингенную трансплантацию стволовых клеток. Способы проведения аутологичной трансплантации стволовых клеток описаны, например, в Perales et al., Biol. Blood Marrow Transplant., e-published ahead of print, 2015; и Isdori et al., World J. Stem Cells 7:1039-1046, 2015. Способы проведения аллогенной трансплантации стволовых клеток описаны, например, в Imamura et al., Exp. Hematol. Oncol. 4:20, 2015; Hobbs et al., J. Clin. Med. 19:488-503, 2015; и Bensinger et al., Stem Cells 14:90-105, 1996. Способы 45 проведения сингенной трансплантации стволовых клеток описаны, например, в Engman et al., Clin. Adv. Hematol. Oncol. 7:321-323, 2009; и Richard et al., Br. J. Haematol. 117:245-246, 2002. Дополнительные способы выделения стволовых клеток и введения стволовых клеток субъекту известны в данной области.

В некоторых примерах, субъект является госпитализированным, или его подвергают лечению, не включающему ингибитор Trk в качестве монотерапии, в стационаре. В других примерах, субъекта подвергают лечению или введению лекарственного средства, не включающим ингибитор Trk в качестве монотерапии, на амбулаторной основе.

В некоторых примерах, субъект является госпитализированным, или его подвергают лечению, включающему одно или несколько соединений из таблицы 5, или их фармацевтически приемлемые соли, и дополнительное противораковое средство или противораковую терапию, включающему одно или несколько соединений из таблицы 5, или их фармацевтически приемлемые соли, в стационаре. В других примерах, субъекта подвергают лечению или введению лекарственного средства, включающим одно или несколько соединений из таблицы 5, или их фармацевтически приемлемые соли, и дополнительное противораковое средство или лечение, включающие одно или несколько соединений из таблицы 5, или их фармацевтически приемлемые соли, на амбулаторной основе.

Способы лечения субъекта, имеющего злокачественную опухоль

Настоящее изобретение относится к способам лечения субъекта, имеющего злокачественную опухоль (например, любую из злокачественных опухолей, описанных в настоящем описании), включающим идентификацию субъекта, имеющего клетку злокачественной опухоли, имеющую по меньшей мере одну точечную мутацию в гене NTRK, приводящую к экспрессии белка Trk, содержащего мутацию в одном или нескольких из положений аминокислот, показанных в таблицах 1, 2 или 3, и подвергание идентифицированного субъекта лечению, не включающему ингибитор Trk (например, первый ингибитор Trk, такой как энтректиниб или сульфат (S)-N-(5-((R)-2-(2,5-дифторфенил)пирролидин-1-ил)пиразоло[1,5-а]пиримидин-3-ил)-3-гидроксипирролидин-1-карбоксамид) в качестве монотерапии (например, любому из видов лечения, не включающих ингибитор Trk в качестве монотерапии, описанных в настоящем описании).

Настоящее изобретение относится также к способам лечения субъекта, имеющего злокачественную опухоль (например, любую из злокачественных опухолей, описанных в настоящем описании) и идентифицированного как имеющего клетку злокачественной опухоли, имеющую по меньшей мере одну точечную мутацию в гене NTRK, приводящую к экспрессии белка Trk, содержащего мутацию в одном или нескольких положений аминокислот (например, мутацию в одном или нескольких из положений аминокислот, показанных в таблицах 1, 2 или 3), включающим подвергание идентифицированного субъекта лечению, не включающему ингибитор Trk (например, первый ингибитор Trk, такой как энтректиниб или сульфат (S)-N-(5-((R)-2-(2,5-дифторфенил)пирролидин-1-ил)пиразоло[1,5-а]пиримидин-3-ил)-3-гидроксипирролидин-1-карбоксамид) в качестве монотерапии (например, любому из видов лечения, не включающих ингибитор Trk в качестве монотерапии, описанных в настоящем описании).

Настоящее изобретение относится также к способам лечения субъекта, включающим введение терапевтически эффективного количества лекарственного средства, не включающего ингибитор Trk (например, первый ингибитор Trk) в качестве монотерапии, субъекту, имеющему анамнез, показывающий, что субъект имеет клетку злокачественной опухоли, имеющую по меньшей мере одну точечную мутацию в гене NTRK, приводящую к экспрессии белка Trk, содержащего мутацию в одном или нескольких положений аминокислот (например, мутацию в одном или нескольких из положений аминокислот, показанных в таблицах 1, 2 или 3).

Настоящее изобретение относится также к способам лечения субъекта, имеющего злокачественную опухоль (например, любую из злокачественных опухолей, описанных

в настоящем описании или известных в данной области), включающим: идентификацию субъекта, имеющего клетку злокачественной опухоли, имеющую по меньшей мере одну точечную мутацию в гене NTRK, приводящую к экспрессии белка Trk, содержащего мутацию в одном или нескольких положений аминокислот (например, мутацию в одном или нескольких из положений аминокислот, показанных в таблицах 1, 2 или 3); и подвергание идентифицированного субъекта лечению, включающему одно или несколько соединений из таблицы 5, или их фармацевтически приемлемые соли.

Настоящее изобретение относится также к способам лечения субъекта, имеющего злокачественную опухоль (например, любую из злокачественных опухолей, описанных в настоящем описании или известных в данной области), включающим: идентификацию субъекта, имеющего клетку злокачественной опухоли, имеющую по меньшей мере одну точечную мутацию в гене NTRK, приводящую к экспрессии белка Trk, содержащего мутацию в одном или нескольких положений аминокислот (например, мутацию в одном или нескольких из положений аминокислот, показанных в таблицах 1, 2 или 3); и подвергание идентифицированного субъекта лечению, включающему одно или несколько соединений из таблицы 5, или их фармацевтически приемлемые соли, и другое противораковое средство (например, любое одно или несколько из противораковых средств, описанных в настоящем описании) или противораковую терапию (например, любой один или несколько из видов противораковой терапии, представленной в настоящем описании).

Настоящее изобретение относится также к способам лечения субъекта, идентифицированного как имеющего клетку злокачественной опухоли, имеющую по меньшей мере одну точечную мутацию в гене NTRK, приводящую к экспрессии белка Trk, содержащего мутацию в одном или нескольких положений аминокислот (например, мутацию в одном или нескольких из положений аминокислот, показанных в таблицах 1, 2 или 3), включающим подвергание субъекта лечению, включающему одно или несколько соединений из таблицы 5, или их фармацевтически приемлемые соли.

Настоящее изобретение относится также к способам лечения субъекта, идентифицированного как имеющего клетку злокачественной опухоли, имеющую по меньшей мере одну точечную мутацию в гене NTRK, приводящую к экспрессии белка Trk, содержащего мутацию в одном или нескольких положений аминокислот (например, мутацию в одном или нескольких из положений аминокислот, показанных в таблицах 1, 2 или 3), включающим подвергание субъекта лечению, включающему одно или несколько соединений из таблицы 5, или их фармацевтически приемлемые соли, и другое противораковое средство (например, любое одно или несколько из противораковых средств, описанных в настоящем описании) или противораковую терапию (например, любой один или несколько из видов противораковой терапии, описанных в настоящем описании).

Настоящее изобретение относится также к способам лечения субъекта, включающим введение терапевтически эффективного количества лекарственного средства, включающего одно или несколько соединений из таблицы 5, или их фармацевтически приемлемые соли, субъекту, имеющему анамнез, показывающий, что субъект имеет клетку злокачественной опухоли, имеющую по меньшей мере одну точечную мутацию в гене NTRK, приводящую к экспрессии белка Trk, содержащего мутацию в одном или нескольких положений аминокислот (например, мутацию в одном или нескольких из положений аминокислот, показанных в таблицах 1, 2, или 3).

Настоящее изобретение относится также к способам лечения субъекта, включающим введение терапевтически эффективного количества лекарственного средства,

включающего одно или несколько соединений из таблицы 5, или их фармацевтически приемлемые соли, и другое противораковое средство (например, любое одно или несколько из противораковых средств, описанных в настоящем описании) или противораковую терапию (например, любой один или несколько из видов

5 противораковой терапии, описанных в настоящем описании), для субъекта, имеющего анамнез, показывающий, что субъект имеет клетку злокачественной опухоли, имеющую по меньшей мере одну точечную мутацию в гене NTRK, приводящую к экспрессии белка Trk, содержащего мутацию в одном или нескольких положений аминокислот (например, мутацию в одном или нескольких из положений аминокислот, показанных в таблицах

10 1, 2 или 3).

Настоящее изобретение относится также к способам лечения субъекта, имеющего злокачественную опухоль, включающим (a) введение одной или нескольких доз ингибитора Trk (например, первого ингибитора Trk, такого как энтректиниб или сульфат (S)-N-(5-((R)-2-(2,5-дифторфенил)пирролидин-1-ил)пиразоло[1,5-a]пиримидин-3-ил)-3-гидрокси-пирролидин-1-карбоксамида) субъекту в течение некоторого периода времени;

15 (b) после (a), определения того, имеет ли клетка злокачественной опухоли в образце, полученном от субъекта, по меньшей мере одну точечную мутацию в гене NTRK, приводящую к экспрессии белка Trk, содержащего мутацию в одном или нескольких положений аминокислот (например, мутацию в одном или нескольких из положений

20 аминокислот, показанных в таблицах 1, 2 или 3), и (c) введение другого ингибитора Trk или проведение лечения, не включающего ингибитор Trk со стадии (a) в качестве монотерапии, для субъекта, имеющего клетку злокачественной опухоли, имеющую по меньшей мере одну точечную мутацию в гене NTRK, приводящую к экспрессии белка Trk, содержащего мутацию в одном или нескольких положений аминокислот (например,

25 мутацию в одном или нескольких из положений аминокислот, показанных в таблицах 1, 2 или 3); или (d) введение дополнительных доз ингибитора Trk со стадии (a) субъекту, имеющему клетку злокачественной опухоли, не имеющую по меньшей мере одну точечную мутацию в гене NTRK, приводящую к экспрессии белка Trk, содержащего мутацию в одном или нескольких положений аминокислот (например, мутацию в одном

30 или нескольких из положений аминокислот, показанных в таблицах 1, 2 или 3).

Настоящее изобретение относится также к способам лечения субъекта, имеющего злокачественную опухоль, включающим: (a) определение того, имеет ли клетка злокачественной опухоли в образце, полученном от субъекта, который имеет злокачественную опухоль, и которому ранее вводили одну или несколько доз ингибитора

35 Trk (например, первого ингибитора Trk, такого как энтректиниб или сульфат (S)-N-(5-((R)-2-(2,5-дифторфенил)пирролидин-1-ил)пиразоло[1,5-a]пиримидин-3-ил)-3-гидрокси-пирролидин-1-карбоксамида), по меньшей мере одну точечную мутацию в гене NTRK, приводящую к экспрессии белка Trk, содержащего мутацию в одном или нескольких положений аминокислот (например, мутацию в одном или нескольких из

40 положений аминокислот, показанных в таблицах 1, 2, или 3); (b) введение ингибитора Trk, отличного от вводимого на стадии (a), или проведение лечения, не включающего ингибитор Trk со стадии (a) в качестве монотерапии, для субъекта, имеющего клетку злокачественной опухоли, имеющую по меньшей мере одну точечную мутацию в гене NTRK, приводящую к экспрессии белка Trk, содержащего мутацию в одном или

45 нескольких положений аминокислот (например, мутацию в одном или нескольких из положений аминокислот, показанных в таблицах 1, 2 или 3); или (c) введение дополнительных доз ингибитора Trk со стадии (a) субъекту, имеющему клетку злокачественной опухоли, не имеющую по меньшей мере одну точечную мутацию в

гене NTRK, приводящую к экспрессии белка Trk, содержащего мутацию в одном или нескольких положений аминокислот (например, мутацию в одном или нескольких из положений аминокислот, показанных в таблицах 1, 2 или 3). В некоторых вариантах осуществления, отличный ингибитор Trk представляет собой второй ингибитор Trk (например, соединение из таблицы 5 или его фармацевтически приемлемую соль).

Настоящее изобретение относится также к способам лечения субъекта, имеющего злокачественную опухоль, включающим: (а) введение одной или нескольких доз первого ингибитора Trk субъекту в течение некоторого периода времени; (b) после (а), определения того, имеет ли клетка злокачественной опухоли в образце, полученном от субъекта, по меньшей мере одну точечную мутацию в гене NTRK, приводящую к экспрессии белка Trk, содержащего мутацию в одном или нескольких положений аминокислот (например, мутацию в одном или нескольких из положений аминокислот, показанных в таблицах 1, 2 или 3); и (с) введение лекарственного средства, включающего одну или несколько доз второго ингибитора Trk, субъекту, имеющему клетку злокачественной опухоли, имеющую по меньшей мере одну точечную мутацию в гене NTRK, приводящую к экспрессии белка Trk, содержащего мутацию в одном или нескольких положений аминокислот (например, мутацию в одном или нескольких из положений аминокислот, показанных в таблицах 1, 2 или 3); или (d) введение дополнительных доз первого ингибитора Trk субъекту, имеющему клетку злокачественной опухоли, не имеющую по меньшей мере одну точечную мутацию в гене NTRK, приводящую к экспрессии белка Trk, содержащего мутацию в одном или нескольких положений аминокислот (например, мутацию в одном или нескольких из положений аминокислот, показанных в таблицах 1, 2 или 3).

Настоящее изобретение относится также к способам лечения субъекта, имеющего злокачественную опухоль, включающим: (а) введение одной или нескольких доз первого ингибитора Trk субъекту в течение некоторого периода времени; (b) после (а), определения того, имеет ли клетка злокачественной опухоли в образце, полученном от субъекта, по меньшей мере одну точечную мутацию в гене NTRK, приводящую к экспрессии белка Trk, содержащего мутацию в одном или нескольких положений аминокислот (например, мутацию в одном или нескольких из положений аминокислот, показанных в таблицах 1, 2, или 3); и (с) введение лекарственного средства, включающего одно или несколько соединений из таблицы 5 или их фармацевтически приемлемые соли, субъекту, имеющему клетку злокачественной опухоли, имеющую по меньшей мере одну точечную мутацию в гене NTRK, приводящую к экспрессии белка Trk, содержащего мутацию в одном или нескольких положений аминокислот (например, мутацию в одном или нескольких из положений аминокислот, показанных в таблицах 1, 2 или 3); или (d) введение дополнительных доз первого ингибитора Trk субъекту, имеющему клетку злокачественной опухоли, не имеющую по меньшей мере одну точечную мутацию в гене NTRK, приводящую к экспрессии белка Trk, содержащего мутацию в одном или нескольких положений аминокислот (например, мутацию в одном или нескольких из положений аминокислот, показанных в таблицах 1, 2 или 3).

Настоящее изобретение относится также к способам лечения субъекта, имеющего злокачественную опухоль, включающим: (а) введение одной или нескольких доз первого ингибитора Trk субъекту в течение некоторого периода времени; (b) после (а), определения того, имеет ли клетка злокачественной опухоли в образце, полученном от субъекта, по меньшей мере одну точечную мутацию в гене NTRK, приводящую к экспрессии белка Trk, содержащего мутацию в одном или нескольких положений аминокислот (например, мутацию в одном или нескольких из положений аминокислот,

показанных в таблицах 1, 2 или 3); и (с) введение лекарственного средства, включающего одно или несколько соединений из таблицы 5 или их фармацевтически приемлемые соли, и другого противоракового средства или проведение противораковой терапии для субъекта, имеющего клетку злокачественной опухоли, имеющую по меньшей мере одну точечную мутацию в гене NTRK, приводящую к экспрессии белка Trk, содержащего мутацию в одном или нескольких положениях аминокислот (например, мутацию в одном или нескольких из положений аминокислот, показанных в таблицах 1, 2, или 3); или (d) введение дополнительных доз первого ингибитора Trk субъекту, имеющему клетку злокачественной опухоли, не имеющую по меньшей мере одну точечную мутацию в гене NTRK, приводящую к экспрессии белка Trk, содержащего мутацию в одном или нескольких положениях аминокислот (например, мутацию в одном или нескольких из положений аминокислот, показанных в таблицах 1, 2 или 3).

Настоящее изобретение относится также к способам лечения субъекта, имеющего злокачественную опухоль, включающим: (а) определение того, имеет ли клетка злокачественной опухоли в образце, полученном от субъекта, который имеет злокачественную опухоль, и которому ранее вводили одну или несколько доз первого ингибитора Trk, по меньшей мере одну точечную мутацию в гене NTRK, приводящую к экспрессии белка Trk, содержащего мутацию в одном или нескольких положениях аминокислот (например, мутацию в одном или нескольких из положений аминокислот, показанных в таблицах 1, 2, или 3); (b) введение лекарственного средства, включающего одну или несколько доз второго ингибитора Trk субъекту, имеющему клетку злокачественной опухоли, имеющую по меньшей мере одну точечную мутацию в гене NTRK, приводящую к экспрессии белка Trk, содержащего мутацию в одном или нескольких положениях аминокислот (например, мутацию в одном или нескольких из положений аминокислот, показанных в таблицах 1, 2 или 3); или (с) введение дополнительных доз первого ингибитора Trk субъекту, имеющему клетку злокачественной опухоли, не имеющую по меньшей мере одну точечную мутацию в гене NTRK, приводящую к экспрессии белка Trk, содержащего мутацию в одном или нескольких положениях аминокислот (например, мутацию в одном или нескольких из положений аминокислот, показанных в таблицах 1, 2 или 3).

Настоящее изобретение относится также к способам лечения субъекта, имеющего злокачественную опухоль, включающим: (а) определение того, имеет ли клетка злокачественной опухоли в образце, полученном от субъекта, который имеет злокачественную опухоль, и которому ранее вводили одну или несколько доз первого ингибитора Trk, по меньшей мере одну точечную мутацию в гене NTRK, приводящую к экспрессии белка Trk, содержащего мутацию в одном или нескольких положениях аминокислот (например, мутацию в одном или нескольких из положений аминокислот, показанных в таблицах 1, 2, или 3); (b) введение лекарственного средства, включающего одно или несколько соединений из таблицы 5, или их фармацевтически приемлемые соли, субъекту, имеющему клетку злокачественной опухоли, имеющую по меньшей мере одну точечную мутацию в гене NTRK, приводящую к экспрессии белка Trk, содержащего мутацию в одном или нескольких положениях аминокислот (например, мутацию в одном или нескольких из положений аминокислот, показанных в таблицах 1, 2, или 3); или (с) введение дополнительных доз первого ингибитора Trk субъекту, имеющему клетку злокачественной опухоли, не имеющую по меньшей мере одну точечную мутацию в гене NTRK, приводящую к экспрессии белка Trk, содержащего мутацию в одном или нескольких положениях аминокислот (например, мутацию в одном или нескольких из положений аминокислот, показанных в таблицах 1, 2 или 3).

Настоящее изобретение относится также к способам лечения субъекта, имеющего злокачественную опухоль, включающим: (а) определение того, имеет ли клетка злокачественной опухоли в образце, полученном от субъекта, который имеет злокачественную опухоль, и которому ранее вводили одну или несколько доз первого ингибитора Trk, по меньшей мере одну точечную мутацию в гене NTRK, приводящую к экспрессии белка Trk, содержащего мутацию в одном или нескольких положениях аминокислот (например, мутацию в одном или нескольких из положений аминокислот, показанных в таблицах 1, 2 или 3); (b) проведение лечения, включающего одно или несколько соединений из таблицы 5, или их фармацевтически приемлемые соли, и другое противораковое средство или противораковую терапию, для субъекта, имеющего клетку злокачественной опухоли, имеющую по меньшей мере одну точечную мутацию в гене NTRK, приводящую к экспрессии белка Trk, содержащего мутацию в одном или нескольких положениях аминокислот (например, мутацию в одном или нескольких из положений аминокислот, показанных в таблицах 1, 2, или 3); или (c) введение дополнительных доз первого ингибитора Trk субъекту, имеющему клетку злокачественной опухоли, не имеющую по меньшей мере одну точечную мутацию в гене NTRK, приводящую к экспрессии белка Trk, содержащего мутацию в одном или нескольких положениях аминокислот (например, мутацию в одном или нескольких из положений аминокислот, показанных в таблицах 1, 2 или 3).

В некоторых вариантах осуществления, первый ингибитор Trk со стадии (а) выбран из группы, состоящей из: энтректиниба (N-[5-(3,5-дифторбензил)-1H-индазол-3-ил]-4-(4-метилпиперазин-1-ил)-2-(тетрагидропиран-4-иламино)-бензамида); сульфата (S)-N-(5-((R)-2-(2,5-дифторфенил)пирролидин-1-ил)пиразоло[1,5-а]пиримидин-3-ил)-3-гидрокси-пирролидин-1-карбоксамид; кабозантиниба ((N-(4-((6,7-Диметоксихинолин-4-ил)окси)фенил)-N'-(4-фторфенил)циклопропан-1,1-дикарбоксамид)); доватиниба (гидрата моно-2-гидроксипропаноата 4-амино-5-фтор-3-[6-(4-метилпиперазин-1-ил)-1H-бензимидазол-2-ил]хинолин-2(1H)-она); белизатиниба (4-фтор-N-(6-((4-(2-гидроксипропан-2-ил)пиперидин-1-ил)метил)-1-((1s,4s)-4-(изопропилкарбамоил)циклогексил)-1H-бензо[d]имидазол-2-ил)бензамида); ситраватиниба (N-(3-фтор-4-((2-(5-(((2-метоксиэтил)амино)метил)пиридин-2-ил)тиено[3,2-b]пиридин-7-ил)окси)фенил)-N-(4-фторфенил)циклопропан-1,1-дикарбоксамид); PLX7486; алтиратиниба (N-(4-((2-(циклопропанкарбоксамидо)пиридин-4-ил)окси)-2,5-дифторфенил)-N-(4-фторфенил)циклопропан-1,1-дикарбоксамид); AZD7451 ((S)-N-(1-(5-фторпиримидин-2-ил)этил)-3-(5-изопропокси-1H-пиразол-3-ил)-3H-имидазо[4,5-b]пиридин-5-амин). Например, первый ингибитор Trk может представлять собой энтректиниб или сульфат (S)-N-(5-((R)-2-(2,5-дифторфенил)пирролидин-1-ил)пиразоло[1,5-а]пиримидин-3-ил)-3-гидрокси-пирролидин-1-карбоксамид (или его полиморфа).

В некоторых вариантах осуществления, второй ингибитор Trk представляет собой соединение из таблицы 5 или его фармацевтически приемлемую соль. Например, второй ингибитор Trk может быть выбран из группы, состоящей из:

(R)-N-(6-(2-(2,5-дифторфенил)пирролидин-1-ил)имидазо[1,2-b]пиридазин-3-ил)-3-гидроксиазетидин-1-карбоксамид;

(R)-3-(6-(2-(2,5-дифторфенил)пирролидин-1-ил)имидазо[1,2-b]пиридазин-3-ил)-1,1-диметилмочевины;

(R)-1-(6-(2-(2,5-дифторфенил)пирролидин-1-ил)имидазо[1,2-b]пиридазин-3-ил)мочевины;

(R)-1-(6-(2-(2,5-дифторфенил)пирролидин-1-ил)имидазо[1,2-b]пиридазин-3-ил)-3-метилмочевины;

(R)-3-(6-(2-(2,5-дифторфенил)пирролидин-1-ил)имидазо[1,2-b]пиридазин-3-ил)-1-(2-гидроксиэтил)-1-метилмочевины;

(R)-N-(6-(2-(2,5-дифторфенил)пирролидин-1-ил)имидазо[1,2-b]пиридазин-3-ил)-3-гидрокси-3-метилазетидин-1-карбоксамида;

5 или их фармацевтически приемлемых солей. В некоторых вариантах осуществления, второй ингибитор Trk выбран из группы, состоящей из:

(R)-N-(5-(2-(2,5-дифторфенил)пирролидин-1-ил)пиразоло[1,5-a]пиримидин-3-ил)-3-гидроксиазетидин-1-карбоксамида;

10 (R)-3-(5-(2-(2,5-дифторфенил)пирролидин-1-ил)пиразоло[1,5-a]пиримидин-3-ил)-1,1-диметилмочевины;

(R)-N-(5-(2-(2-хлор-5-фторфенил)пирролидин-1-ил)пиразоло[1,5-a]пиримидин-3-ил)-3-гидроксиазетидин-1-карбоксамида;

(R)-N-(5-(2-(2-хлор-5-фторфенил)пирролидин-1-ил)пиразоло[1,5-a]пиримидин-3-ил)-3-гидрокси-3-метилазетидин-1-карбоксамида;

15 (R)-N-(5-(2-(3-фторфенил)пирролидин-1-ил)пиразоло[1,5-a]пиримидин-3-ил)-3-гидроксиазетидин-1-карбоксамида;

или их фармацевтически приемлемых солей. В некоторых вариантах осуществления, второй ингибитор Trk выбран из группы, состоящей из:

20 (R)-5-(2-(2,5-дифторфенил)пирролидин-1-ил)пиразоло[1,5-a]пиримидин-3-карбоксамида;

(R)-N-циклопропил-5-(2-(5-фторпиридин-3-ил)пирролидин-1-ил)пиразоло[1,5-a]пиримидин-3-карбоксамида;

(R)-5-(2-(5-фтор-2-метоксипиридин-3-ил)пирролидин-1-ил)-N-метоксипиразоло[1,5-a]пиримидин-3-карбоксамида;

25 (R)-5-(2-(5-фторпиридин-3-ил)пирролидин-1-ил)-N-(1-метилциклопропил)пиразоло[1,5-a]пиримидин-3-карбоксамида;

или их фармацевтически приемлемых солей. В некоторых вариантах осуществления, второй ингибитор Trk выбран из группы, состоящей из:

30 (6R)-9-фтор-13-окса-2,11,17,21,22,25-гексаазапентацикло[17.5.2.0^{2,6}.0^{7,12}.0^{22,26}]-гексакоза-1(25),7,9,11,19(26),20,23-гептен-18-она;

(6R,15R)-9-фтор-15-гидрокси-13-окса-2,11,17,21,22,25-гексаазапентацикло[17.5.2.0^{2,6}.0^{7,12}.0^{22,26}]-гексакоза-1(25),7,9,11,19(26),20,23-гептен-18-она;

35 (6R)-9-фтор-13-окса-2,11,18,22,23,26-гексаазапентацикло[18.5.2.0^{2,6}.0^{7,12}.0^{23,27}]-гептакоза-1(26),7,9,11,20(27),21,24-гептен-19-она;

(6R)-9-фтор-13-окса-2,17,21,22,25-пентаазапентацикло[17.5.2.0^{2,6}.0^{7,12}.0^{22,26}]-гексакоза-1(25),7,9,11,19(26),20,23-гептен-18-она;

40 (6R)-12-окса-2,16,20,21,24,26-гексаазапентацикло[16.5.2.^{17,11}.0^{2,6}.0^{21,25}]-гексакоза-1(24),7(26),8,10,18(25),19,22-гептен-17-она;

1-[(6R)-9-фтор-13-окса-2,16,20,21,24-пентаазапентацикло[16.5.2.0^{2,6}.0^{7,12}.0^{21,25}]-пентакоза-1(24),7,9,11,18(25),19,22-гептен-16-ил]этан-1-она;

(6R)-9-фтор-13,16-диокса-2,11,20,21,24-пентаазапентацикло[16.5.2.0^{2,6}.0^{7,12}.0^{21,25}]-пентакоза-1(24),7,9,11,18(25),19,22-гептен-17-она;

45 (6R)-9,15,15-трифтор-13-окса-2,11,17,21,22,25-гексаазапентацикло[17.5.2.0^{2,6}.0^{7,12}.0^{22,26}]-гексакоза-1(25),7,9,11,19(26),20,23-гептен-18-она;

(6R,13S)-9-фтор-13-метил-2,11,15,19,20,23-гексаазапентацикло

[15.5.2.^{17,11}.0^{2,6}.0^{20,24}]пентакоза-1(23),7,9,17(24),18,21-гексен-16,25-диона;
 (6R)-9-фтор-15,15-диметил-13-окса-2,11,17,21,22,25-гексаазапентацикло
 [17.5.2.0^{2,6}.0^{7,12}.0^{22,26}]гексакоза-1(25),7,9,11,19(26),20,23-гептен-18-она;
 (15S)-4,4,9-трифтор-15-гидрокси-13-окса-2,17,21,22,25-пентаазапентацикло
 [17.5.2.0^{2,6}.0^{7,12}.0^{22,26}]гексакоза-1(25),7(12),8,10,19(26),20,23-гептен-18-она;
 (6R,15S)-9-фтор-15-метил-2,11,16,20,21,24-гексаазапентацикло
 [16.5.2.0^{2,6}.0^{7,12}.0^{21,25}]пентакоза-1(24),7,9,11,18(25),19,22-гептен-17-она;
 (6R,15R)-9-фтор-15-метил-2,11,16,20,21,24-гексаазапентацикло
 [16.5.2.0^{2,6}.0^{7,12}.0^{21,25}]пентакоза-1(24),7,9,11,18(25),19,22-гептен-17-она;
 или их фармацевтически приемлемых солей.

В некоторых вариантах осуществления способов, представленных в настоящем описании, первый ингибитор Trk представляет собой энтректиниб (N-[5-(3,5-дифторбензил)-1H-индазол-3-ил]-4-(4-метилпиперазин-1-ил)-2-(тетрагидропиран-4-иламино)-бензамид); и второй ингибитор Trk выбран из группы, состоящей из:

(R)-N-(6-(2-(2,5-дифторфенил)пирролидин-1-ил)имидазо[1,2-b]пиридазин-3-ил)-3-гидроксиазетидин-1-карбоксамида;

(R)-3-(6-(2-(2,5-дифторфенил)пирролидин-1-ил)имидазо[1,2-b]пиридазин-3-ил)-1,1-диметилмочевины;

(R)-1-(6-(2-(2,5-дифторфенил)пирролидин-1-ил)имидазо[1,2-b]пиридазин-3-ил)мочевины;

(R)-1-(6-(2-(2,5-дифторфенил)пирролидин-1-ил)имидазо[1,2-b]пиридазин-3-ил)-3-метилмочевины;

(R)-3-(6-(2-(2,5-дифторфенил)пирролидин-1-ил)имидазо[1,2-b]пиридазин-3-ил)-1-(2-гидроксиэтил)-1-метилмочевины;

(R)-N-(6-(2-(2,5-дифторфенил)пирролидин-1-ил)имидазо[1,2-b]пиридазин-3-ил)-3-гидрокси-3-метилазетидин-1-карбоксамида;

или их фармацевтически приемлемых солей. В некоторых вариантах осуществления представленных в настоящем описании способов, первый ингибитор Trk представляет собой энтректиниб (N-[5-(3,5-дифторбензил)-1H-индазол-3-ил]-4-(4-метилпиперазин-1-ил)-2-(тетрагидропиран-4-иламино)-бензамид); и второй ингибитор Trk выбран из группы, состоящей из:

(R)-N-(5-(2-(2,5-дифторфенил)пирролидин-1-ил)пиразоло[1,5-a]пиримидин-3-ил)-3-гидроксиазетидин-1-карбоксамида;

(R)-3-(5-(2-(2,5-дифторфенил)пирролидин-1-ил)пиразоло[1,5-a]пиримидин-3-ил)-1,1-диметилмочевины;

(R)-N-(5-(2-(2-хлор-5-фторфенил)пирролидин-1-ил)пиразоло[1,5-a]пиримидин-3-ил)-3-гидроксиазетидин-1-карбоксамида;

(R)-N-(5-(2-(2-хлор-5-фторфенил)пирролидин-1-ил)пиразоло[1,5-a]пиримидин-3-ил)-3-гидрокси-3-метилазетидин-1-карбоксамида;

(R)-N-(5-(2-(3-фторфенил)пирролидин-1-ил)пиразоло[1,5-a]пиримидин-3-ил)-3-гидроксиазетидин-1-карбоксамида;

или их фармацевтически приемлемых солей. В некоторых вариантах осуществления представленных в настоящем описании способов, первый ингибитор Trk представляет собой энтректиниб (N-[5-(3,5-дифторбензил)-1H-индазол-3-ил]-4-(4-метилпиперазин-1-ил)-2-(тетрагидропиран-4-иламино)-бензамид); и второй ингибитор Trk выбран из группы, состоящей из:

(R)-5-(2-(2,5-дифторфенил)пирролидин-1-ил)пиразоло[1,5-a]пиримидин-3-

карбоксамида;

(R)-N-циклопропил-5-(2-(5-фторпиридин-3-ил)пирролидин-1-ил)пиразоло[1,5-a]пиримидин-3-карбоксамида;

(R)-5-(2-(5-фтор-2-метоксипиридин-3-ил)пирролидин-1-ил)-N-метоксипиразоло[1,5-a]пиримидин-3-карбоксамида;

(R)-5-(2-(5-фторпиридин-3-ил)пирролидин-1-ил)-N-(1-метилциклопропил)пиразоло[1,5-a]пиримидин-3-карбоксамида;

или их фармацевтически приемлемых солей. В некоторых вариантах осуществления представленных в настоящем описании способов, первый ингибитор Trk представляет собой энтректиниб (N-[5-(3,5-дифторбензил)-1H-индазол-3-ил]-4-(4-метилпиперазин-1-ил)-2-(тетрагидропиран-4-иламино)-бензамид); и второй ингибитор Trk выбран из группы, состоящей из:

(6R)-9-фтор-13-окса-2,11,17,21,22,25-гексаазапентацикло[17.5.2.0^{2,6}.0^{7,12}.0^{22,26}]-гексакоза-1(25),7,9,11,19(26),20,23-гептен-18-она;

(6R,15R)-9-фтор-15-гидрокси-13-окса-2,11,17,21,22,25-гексаазапентацикло[17.5.2.0^{2,6}.0^{7,12}.0^{22,26}]-гексакоза-1(25),7,9,11,19(26),20,23-гептен-18-она;

(6R)-9-фтор-13-окса-2,11,18,22,23,26-гексаазапентацикло[18.5.2.0^{2,6}.0^{7,12}.0^{23,27}]-гептакоза-1(26),7,9,11,20(27),21,24-гептен-19-она;

(6R)-9-фтор-13-окса-2,17,21,22,25-пентаазапентацикло[17.5.2.0^{2,6}.0^{7,12}.0^{22,26}]-гексакоза-1(25),7,9,11,19(26),20,23-гептен-18-она;

(6R)-12-окса-2,16,20,21,24,26-гексаазапентацикло[16.5.2.0^{2,6}.0^{7,11}.0^{21,25}]-гексакоза-1(24),7(26),8,10,18(25),19,22-гептен-17-она;

1-[(6R)-9-фтор-13-окса-2,16,20,21,24-пентаазапентацикло[16.5.2.0^{2,6}.0^{7,12}.0^{21,25}]-пентакоза-1(24),7,9,11,18(25),19,22-гептен-16-ил]этан-1-она;

(6R)-9-фтор-13,16-диокса-2,11,20,21,24-пентаазапентацикло[16.5.2.0^{2,6}.0^{7,12}.0^{21,25}]-пентакоза-1(24),7,9,11,18(25),19,22-гептен-17-она;

(6R)-9,15,15-трифтор-13-окса-2,11,17,21,22,25-гексаазапентацикло[17.5.2.0^{2,6}.0^{7,12}.0^{22,26}]-гексакоза-1(25),7,9,11,19(26),20,23-гептен-18-она;

(6R,13S)-9-фтор-13-метил-2,11,15,19,20,23-гексаазапентацикло[15.5.2.17,11.0^{2,6}.0^{20,24}]-пентакоза-1(23),7,9,17(24),18,21-гексен-16,25-диола;

(6R)-9-фтор-15,15-диметил-13-окса-2,11,17,21,22,25-гексаазапентацикло[17.5.2.0^{2,6}.0^{7,12}.0^{22,26}]-гексакоза-1(25),7,9,11,19(26),20,23-гептен-18-она;

(15S)-4,4,9-трифтор-15-гидрокси-13-окса-2,17,21,22,25-пентаазапентацикло[17.5.2.0^{2,6}.0^{7,12}.0^{22,26}]-гексакоза-1(25),7(12),8,10,19(26),20,23-гептен-18-она;

(6R,15S)-9-фтор-15-метил-2,11,16,20,21,24-гексаазапентацикло[16.5.2.0^{2,6}.0^{7,12}.0^{21,25}]-пентакоза-1(24),7,9,11,18(25),19,22-гептен-17-она;

(6R,15R)-9-фтор-15-метил-2,11,16,20,21,24-гексаазапентацикло[16.5.2.0^{2,6}.0^{7,12}.0^{21,25}]-пентакоза-1(24),7,9,11,18(25),19,22-гептен-17-она;

или их фармацевтически приемлемых солей.

В некоторых вариантах осуществления представленных в настоящем описании способов, первый ингибитор Trk представляет собой сульфат (S)-N-(5-((R)-2-(2,5-дифторфенил)пирролидин-1-ил)пиразоло[1,5-a]пиримидин-3-ил)-3-гидрокси-1-карбоксамида; и второй ингибитор Trk выбран из группы, состоящей из:

(R)-N-(6-(2-(2,5-дифторфенил)пирролидин-1-ил)имидазо[1,2-b]пиридазин-3-ил)-3-

гидроксиазетидин-1-карбоксамида;

(R)-3-(6-(2-(2,5-дифторфенил)пирролидин-1-ил)имидазо[1,2-b]пиридазин-3-ил)-1,1-диметилмочевины;

(R)-1-(6-(2-(2,5-дифторфенил)пирролидин-1-ил)имидазо[1,2-b]пиридазин-3-ил) мочевины;

(R)-1-(6-(2-(2,5-дифторфенил)пирролидин-1-ил)имидазо[1,2-b]пиридазин-3-ил)-3-метилмочевины;

(R)-3-(6-(2-(2,5-дифторфенил)пирролидин-1-ил)имидазо[1,2-b]пиридазин-3-ил)-1-(2-гидроксиэтил)-1-метилмочевины;

(R)-N-(6-(2-(2,5-дифторфенил)пирролидин-1-ил)имидазо[1,2-b]пиридазин-3-ил)-3-гидрокси-3-метилазетидин-1-карбоксамида;

или их фармацевтически приемлемых солей. В некоторых вариантах осуществления представленных в настоящем описании способов, первый ингибитор Trk представляет собой сульфат (S)-N-(5-((R)-2-(2,5-дифторфенил)пирролидин-1-ил)пиразоло[1,5-a]пиримидин-3-ил)-3-гидрокси-3-метилазетидин-1-карбоксамида; и второй ингибитор Trk выбран из группы, состоящей из:

(R)-N-(5-(2-(2,5-дифторфенил)пирролидин-1-ил)пиразоло[1,5-a]пиримидин-3-ил)-3-гидроксиазетидин-1-карбоксамида;

(R)-3-(5-(2-(2,5-дифторфенил)пирролидин-1-ил)пиразоло[1,5-a]пиримидин-3-ил)-1,1-диметилмочевины;

(R)-N-(5-(2-(2-хлор-5-фторфенил)пирролидин-1-ил)пиразоло[1,5-a]пиримидин-3-ил)-3-гидроксиазетидин-1-карбоксамида;

(R)-N-(5-(2-(2-хлор-5-фторфенил)пирролидин-1-ил)пиразоло[1,5-a]пиримидин-3-ил)-3-гидрокси-3-метилазетидин-1-карбоксамида;

(R)-N-(5-(2-(3-фторфенил)пирролидин-1-ил)пиразоло[1,5-a]пиримидин-3-ил)-3-гидроксиазетидин-1-карбоксамида;

или их фармацевтически приемлемых солей. В некоторых вариантах осуществления представленных в настоящем описании способов, первый ингибитор Trk представляет собой сульфат (S)-N-(5-((R)-2-(2,5-дифторфенил)пирролидин-1-ил)пиразоло[1,5-a]пиримидин-3-ил)-3-гидрокси-3-метилазетидин-1-карбоксамида; и второй ингибитор Trk выбран из группы, состоящей из:

(R)-5-(2-(2,5-дифторфенил)пирролидин-1-ил)пиразоло[1,5-a]пиримидин-3-карбоксамида;

(R)-N-циклопропил-5-(2-(5-фторпиридин-3-ил)пирролидин-1-ил)пиразоло[1,5-a]пиримидин-3-карбоксамида;

(R)-5-(2-(5-фтор-2-метоксипиридин-3-ил)пирролидин-1-ил)-N-метоксипиразоло[1,5-a]пиримидин-3-карбоксамида;

(R)-5-(2-(5-фторпиридин-3-ил)пирролидин-1-ил)-N-(1-метилциклопропил)пиразоло[1,5-a]пиримидин-3-карбоксамида;

или их фармацевтически приемлемых солей. В некоторых вариантах осуществления представленных в настоящем описании способов, первый ингибитор Trk представляет собой сульфат (S)-N-(5-((R)-2-(2,5-дифторфенил)пирролидин-1-ил)пиразоло[1,5-a]пиримидин-3-ил)-3-гидрокси-3-метилазетидин-1-карбоксамида; и второй ингибитор Trk выбран из группы, состоящей из:

(6R)-9-фтор-13-окса-2,11,17,21,22,25-гексаазапентацикло[17.5.2.0^{2,6}.0^{7,12}.0^{22,26}]-гексакоза-1(25),7,9,11,19(26),20,23-гептен-18-она;

(6R,15R)-9-фтор-15-гидрокси-13-окса-2,11,17,21,22,25-гексаазапентацикло[17.5.2.0^{2,6}.0^{7,12}.0^{22,26}]-гексакоза-1(25),7,9,11,19(26),20,23-гептен-18-она;

(6R)-9-фтор-13-окса-2,11,18,22,23,26-гексаазапентацикло[18.5.2.0^{2,6}.0^{7,12}.0^{23,27}]-гептакоза-1(26),7,9,11,20(27),21,24-гептен-19-она;

(6R)-9-фтор-13-окса-2,17,21,22,25-пентаазапентацикло[17.5.2.0^{2,6}.0^{7,12}.0^{22,26}]-гексакоза-1(25),7,9,11,19(26),20,23-гептен-18-она;

(6R)-12-окса-2,16,20,21,24,26-гексаазапентацикло[16.5.2.^{17,11}.0^{2,6}.0^{21,25}]-гексакоза-1(24),7(26),8,10,18(25),19,22-гептен-17-она;

1-[(6R)-9-фтор-13-окса-2,16,20,21,24-пентаазапентацикло[16.5.2.0^{2,6}.0^{7,12}.0^{21,25}]-пентакоза-1(24),7,9,11,18(25),19,22-гептен-16-ил]этан-1-она;

(6R)-9-фтор-13,16-диокса-2,11,20,21,24-пентаазапентацикло[16.5.2.0^{2,6}.0^{7,12}.0^{21,25}]-пентакоза-1(24),7,9,11,18(25),19,22-гептен-17-она;

(6R)-9,15,15-трифтор-13-окса-2,11,17,21,22,25-гексаазапентацикло[17.5.2.0^{2,6}.0^{7,12}.0^{22,26}]-гексакоза-1(25),7,9,11,19(26),20,23-гептен-18-она;

(6R,13S)-9-фтор-13-метил-2,11,15,19,20,23-гексаазапентацикло[15.5.2.^{17,11}.0^{2,6}.0^{20,24}]-пентакоза-1(23),7,9,17(24),18,21-гексен-16,25-диона;

(6R)-9-фтор-15,15-диметил-13-окса-2,11,17,21,22,25-гексаазапентацикло[17.5.2.0^{2,6}.0^{7,12}.0^{22,26}]-гексакоза-1(25),7,9,11,19(26),20,23-гептен-18-она;

(15S)-4,4,9-трифтор-15-гидрокси-13-окса-2,17,21,22,25-пентаазапентацикло[17.5.2.0^{2,6}.0^{7,12}.0^{22,26}]-гексакоза-1(25),7(12),8,10,19(26),20,23-гептен-18-она;

(6R,15S)-9-фтор-15-метил-2,11,16,20,21,24-гексаазапентацикло[16.5.2.0^{2,6}.0^{7,12}.0^{21,25}]-пентакоза-1(24),7,9,11,18(25),19,22-гептен-17-она;

(6R,15R)-9-фтор-15-метил-2,11,16,20,21,24-гексаазапентацикло[16.5.2.0^{2,6}.0^{7,12}.0^{21,25}]-пентакоза-1(24),7,9,11,18(25),19,22-гептен-17-она;

или их фармацевтически приемлемых солей.

Некоторые примеры этих способов дополнительно включают регистрацию в медицинской карте субъекта (например, на машиночитаемом носителе) того, что субъекта следует подвергать лечению, не включающему ингибитор Trk со стадии (а) в качестве монотерапии, или введению отличного ингибитора Trk в будущем.

Настоящее изобретение относится к способам лечения субъекта, имеющего злокачественную опухоль (например, любую из злокачественных опухолей, описанных в настоящем описании), включающим идентификацию субъекта, имеющего клетку злокачественной опухоли, имеющую по меньшей мере одну точечную мутацию в гене NTRK, приводящую к экспрессии белка Trk, содержащего мутацию в одном или нескольких положений аминокислот (например, мутацию в одном или нескольких из положений аминокислот, показанных в таблицах 1, 2 или 3), и подвергание идентифицированного субъекта лечению, включающему увеличение дозы ингибитора Trk (например, первого ингибитора Trk, такого как энтректиниб или сульфат (S)-N-(5-((R)-2-(2,5-дифторфенил)пирролидин-1-ил)пиразоло[1,5-a]пиримидин-3-ил)-3-гидроксипирролидин-1-карбоксамида) (например, по сравнению с контрольной дозой ингибитора Trk). Как используют в другом месте настоящего описания, контрольная доза ингибитора Trk представляет собой дозу ингибитора Trk, достаточную для лечения субъекта, имеющего злокачественную опухоль, не являющуюся устойчивой к ингибитору Trk злокачественной опухолью (например, злокачественную опухоль, не содержащую по меньшей мере одну точечную мутацию в гене NTRK, приводящую к экспрессии белка Trk, содержащего мутацию в одном или нескольких положений аминокислот (например, мутацию в одном или нескольких из положений аминокислот, показанных в таблицах

1, 2 или 3)).

Настоящее изобретение относится также к способам лечения субъекта, имеющего злокачественную опухоль (например, любую из злокачественных опухолей, описанных в настоящем описании) и идентифицированного как имеющего клетку злокачественной опухоли, имеющую по меньшей мере одну точечную мутацию в гене NTRK, приводящую к экспрессии белка Trk, содержащего мутацию в одном или нескольких положениях аминокислот (например, мутацию в одном или нескольких из положений аминокислот, показанных в таблицах 1, 2, или 3), включающим подвергание идентифицированного субъекта лечению, включающему увеличение дозы ингибитора Trk (например, первого ингибитора Trk, такого как энтректиниб или сульфат (S)-N-(5-((R)-2-(2,5-дифторфенил)пирролидин-1-ил)пиразоло[1,5-a]пиримидин-3-ил)-3-гидроксипирролидин-1-карбоксамид) (например, по сравнению с контрольной дозой ингибитора Trk).

В некоторых примерах, стадия идентификации субъекта, имеющего клетку злокачественной опухоли, имеющую по меньшей мере одну точечную мутацию (например, любую из точечных мутаций, описанных в настоящем описании) в гене NTRK1, приводящих к экспрессии TrkA, содержащего мутацию в одном или нескольких положении(положениях) аминокислот, и/или по меньшей мере одну точечную мутацию (например, любую из точечных мутаций, описанных в настоящем описании) в гене NTRK2, приводящих к экспрессии TrkB, содержащего мутацию в одном или нескольких положении(положениях) аминокислот, и/или по меньшей мере одну точечную мутацию (например, любую из точечных мутаций, описанных в настоящем описании) в гене NTRK3, приводящих к экспрессии TrkC, содержащего мутацию в одном или нескольких положении(положениях) аминокислот, включает проведение анализа для определения присутствия по меньшей мере одной точечной мутации в гене NTRK1 и/или по меньшей мере одной точечной мутации в гене NTRK2, и/или по меньшей мере одной точечной мутации в гене NTRK3 в клетке злокачественной опухоли в образце (например, образце биоптата) от субъекта. Любой из анализов, описанных в настоящем описании, можно использовать для определения присутствия по меньшей мере одной точечной мутации в гене NTRK1 и/или по меньшей мере одной точечной мутации в гене NTRK2, и/или по меньшей мере одной точечной мутации в гене NTRK3. Кроме того, любой из наборов, представленных в настоящем описании, можно использовать в анализе для определения присутствия по меньшей мере одной точечной мутации в гене NTRK1 и/или по меньшей мере одной точечной мутации в гене NTRK2, и/или по меньшей мере одной точечной мутации в гене NTRK3. В некоторых примерах, анализ включает секвенирование фрагмента NTRK1, содержащего по меньшей мере одну точечную мутацию, и/или фрагмента гена NTRK2, содержащего по меньшей мере одну точечную мутацию, и/или фрагмента гена NTRK3, содержащего по меньшей мере одну точечную мутацию.

Настоящее изобретение относится также к способам лечения субъекта, имеющего злокачественную опухоль, включающим (а) введение контрольной дозы ингибитора Trk (например, первого ингибитора Trk, такого как энтректиниб или сульфат (S)-N-(5-((R)-2-(2,5-дифторфенил)пирролидин-1-ил)пиразоло[1,5-a]пиримидин-3-ил)-3-гидроксипирролидин-1-карбоксамид) субъекту в течение некоторого периода времени; (b) после (а), определения того, имеет ли клетка злокачественной опухоли в образце, полученном от субъекта, по меньшей мере одну точечную мутацию в гене NTRK, приводящую к экспрессии белка Trk, содержащего мутацию в одном или нескольких положениях аминокислот (например, мутацию в одном или нескольких из положений аминокислот, показанных в таблицах 1, 2, или 3); и (с) введение увеличенной дозы ингибитора Trk субъекту, имеющему клетку злокачественной опухоли, имеющую по

меньшей мере одну точечную мутацию в гене NTRK, приводящую к экспрессии белка Trk, содержащего мутацию в одном или нескольких положениях аминокислот (например, мутацию в одном или нескольких из положений аминокислот, показанных в таблицах 1, 2, или 3); или (d) введение контрольной дозы ингибитора Trk (например, первого ингибитора Trk, такого как энтректиниб или сульфат (S)-N-(5-((R)-2-(2,5-дифторфенил)пирролидин-1-ил)пиразоло[1,5-a]пиримидин-3-ил)-3-гидроксипирролидин-1-карбоксамид) субъекту, имеющему клетку злокачественной опухоли, не имеющую по меньшей мере одну точечную мутацию в гене NTRK, приводящую к экспрессии белка Trk, содержащего мутацию в одном или нескольких положениях аминокислот (например, мутацию в одном или нескольких из положений аминокислот, показанных в таблицах 1, 2 или 3). Как используют в другом месте настоящего описания, контрольная доза ингибитора Trk представляет собой дозу ингибитора Trk, достаточную для лечения субъекта, имеющего злокачественную опухоль, не являющуюся устойчивой к ингибитору Trk злокачественной опухолью (например, злокачественную опухоль, не содержащую по меньшей мере одну точечную мутацию в гене NTRK, приводящую к экспрессии белка Trk, содержащего мутацию в одном или нескольких положениях аминокислот (например, мутацию в одном или нескольких из положений аминокислот, показанных в таблицах 1, 2 или 3)).

Настоящее изобретение относится также к способам лечения субъекта, имеющего злокачественную опухоль, включающим: (а) определение того, имеет ли клетка злокачественной опухоли в образце, полученном от субъекта, который имеет злокачественную опухоль, и которому ранее вводили контрольную дозу ингибитора Trk (например, первого ингибитора Trk, такого как энтректиниб или сульфат (S)-N-(5-((R)-2-(2,5-дифторфенил)пирролидин-1-ил)пиразоло[1,5-a]пиримидин-3-ил)-3-гидроксипирролидин-1-карбоксамид), по меньшей мере одну точечную мутацию в гене NTRK, приводящую к экспрессии белка Trk, содержащего мутацию в одном или нескольких положениях аминокислот (например, мутацию в одном или нескольких из положений аминокислот, показанных в таблицах 1, 2, или 3); и (b) введение увеличенной дозы ингибитора Trk субъекту, имеющему клетку злокачественной опухоли, имеющую по меньшей мере одну точечную мутацию в гене NTRK, приводящую к экспрессии белка Trk, содержащего мутацию в одном или нескольких положениях аминокислот (например, мутацию в одном или нескольких из положений аминокислот, показанных в таблицах 1, 2, или 3); или (с) введение контрольной дозы ингибитора Trk субъекту, имеющему клетку злокачественной опухоли, не имеющую по меньшей мере одну точечную мутацию в гене NTRK, приводящую к экспрессии белка Trk, содержащего мутацию в одном или нескольких положениях аминокислот (например, мутацию в одном или нескольких из положений аминокислот, показанных в таблицах 1, 2 или 3).

Злокачественная опухоль может представлять собой любую из иллюстративных злокачественных опухолей, описанных в настоящем описании. В некоторых вариантах осуществления, субъекта ранее идентифицировали или диагностировали как имеющего злокачественную опухоль. В некоторых примерах, субъекта ранее подвергали лечению злокачественной опухоли, и лечение злокачественной опухоли не было успешным (например, присутствовала высокая токсичность для субъекта или отсутствовал положительный ответ на проводимое ранее лечение злокачественной опухоли).

Некоторые примеры этих способов дополнительно включают регистрацию в медицинской карте субъекта (например, на машиночитаемом носителе) того, что субъекта следует подвергать лечению, включающему увеличенную дозу ингибитора Trk, в будущем.

Некоторые варианты осуществления этих способов включают введение увеличенной дозы ингибитора Trk на стадии (b). Некоторые варианты осуществления этих способов включают введение контрольной дозы ингибитора Trk на стадии (c).

5 Некоторые примеры этих способов дополнительно включают регистрацию в медицинской карте субъекта (например, на машиночитаемом носителе) того, что субъекту следует вводить увеличенную дозу ингибитора Trk в будущем. Некоторые
10 примеры этих способов дополнительно включают регистрацию в медицинской карте субъекта (например, на машиночитаемом носителе) того, что субъекта следует подвергать лечению, не включающему ингибитор Trk в качестве монотерапии, в будущем.

В некоторых вариантах осуществления, представленных в настоящем описании, по меньшей мере одна точечная мутация в гене NTRK, приводящая к экспрессии белка Trk, содержащего мутацию в одном или нескольких положениях аминокислот, включает
15 (i) по меньшей мере одну (например, одну, две, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать или пятнадцать) точечную мутацию в гене NTRK1, приводящую к экспрессии белка TrkA, содержащего мутацию в одном или нескольких (например, двух, трех, четырех, пяти, шести, семи, восьми, девяти, десяти, одиннадцати, двенадцати, тринадцати, четырнадцати или пятнадцати) положениях(положениях) аминокислот, выбранных из группы, состоящей
20 из: 517, 542, 568, 573, 589, 595, 599, 600, 602, 646, 656, 657, 667 и 676 (например, одну или несколько из замен G517R, A542V, V573M, F589L, F589C, G595S, G595R, D596V, F600L, F646V, C656Y, C656F, L657V, G667S, G667C и Y676S), и/или (ii) по меньшей мере одну (например, две, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать или пятнадцать) точечную мутацию в гене
25 NTRK2, приводящую к экспрессии белка TrkB, содержащего мутацию в одном или нескольких (например, двух, трех, четырех, пяти, шести, семи, восьми, девяти, десяти, одиннадцати, двенадцати, тринадцати, четырнадцати или пятнадцати) положениях аминокислот, выбранных из группы, состоящей из: 545, 570, 596, 601, 617, 623, 624, 628, 630, 672, 682, 683, 693 и 702 (например, одну или несколько из замен G545R, A570V,
30 Q596E, Q596P, V601G, F617L, F617C, F617I, G623S, G623R, D624V, R630K, C682Y, C682F, L683V, G693S и G713S), и/или (iii) по меньшей мере одну (например, две, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать или пятнадцать) точечную мутацию в гене NTRK3, приводящую к экспрессии белка TrkC, содержащего мутацию в одном или нескольких (например, двух,
35 трех, четырех, пяти, шести, семи, восьми, девяти, десяти, одиннадцати, двенадцати, тринадцати, четырнадцати или пятнадцати) положениях(положениях) аминокислот, выбранных из группы, состоящей из: 545, 570, 596, 601, 617, 623, 624, 628, 630, 675, 685, 686, 696 и 705 (например, одну или несколько из замен G545R, A570V, F617L, G623R, D624V, C685Y, C685F, L686V и G696A). В некоторых вариантах осуществления, по
40 меньшей мере одна точечная мутация в гене NTRK, приводящая к экспрессии белка Trk, содержащего мутацию в одном или нескольких положениях аминокислот, выбрана из мутации в одном или нескольких из положений аминокислот, показанных в таблицах 1, 2 или 3.

Способы выбора лечения для субъекта, имеющего злокачественную опухоль

45 Настоящее изобретение относится также к способам выбора лечения, не включающего ингибитор Trk (например, первый ингибитор Trk, такой как энтректиниб или сульфат (S)-N-(5-((R)-2-(2,5-дифторфенил)пирролидин-1-ил)пиразоло[1,5-a]пиримидин-3-ил)-3-гидроксипирролидин-1-карбоксиамида) в качестве монотерапии, для субъекта, имеющего

злокачественную опухоль, (например, любую из злокачественных опухолей, описанных в настоящем описании), включающим идентификацию субъекта, имеющего клетку злокачественной опухоли, имеющую по меньшей мере одну точечную мутацию в гене NTRK, приводящую к экспрессии белка Trk, содержащего мутацию в одном или

5 нескольких положений аминокислот (например, мутацию в одном или нескольких из положений аминокислот, показанных в таблицах 1, 2 или 3), и выбор лечения, не включающего ингибитор Trk в качестве монотерапии (например, любого из способов лечения, не включающего ингибитор Trk в качестве монотерапии, описанных в настоящем описании), для идентифицированного субъекта.

10 Настоящее изобретение относится также к способам выбора лечения, не включающего ингибитор Trk (например, первый ингибитор Trk, такой как энтректиниб или сульфат (S)-N-(5-((R)-2-(2,5-дифторфенил)пирролидин-1-ил)пиразоло[1,5-a]пиримидин-3-ил)-3-гидроксипирролидин-1-карбоксамида) в качестве монотерапии, для субъекта, имеющего злокачественную опухоль, (например, любого из способов лечения, не включающего

15 ингибитор Trk в качестве монотерапии, описанных в настоящем описании), включающим выбор лечения, не включающего ингибитор Trk в качестве монотерапии (например, например, любого из способов лечения, не включающего ингибитор Trk в качестве монотерапии, описанных в настоящем описании) для субъекта, идентифицированного как имеющего клетку злокачественной опухоли, имеющую по меньшей мере одну

20 точечную мутацию в гене NTRK, приводящую к экспрессии белка Trk, содержащего мутацию в одном или нескольких положений аминокислот (например, мутацию в одном или нескольких положений аминокислот, показанных в таблицах 1, 2 или 3).

Некоторые из этих способов включают выбор отличного ингибитора Trk (например, второго ингибитора Trk) или лечения, не включающего ингибитор Trk со стадии (а) в

25 качестве монотерапии, для субъекта, имеющего клетку злокачественной опухоли, имеющую по меньшей мере одну точечную мутацию в гене NTRK, приводящую к экспрессии белка Trk, содержащего мутацию в одном или нескольких положений аминокислот (например, мутацию в одном или нескольких из положений аминокислот, показанных в таблицах 1, 2 или 3). В некоторых вариантах осуществления, отличный

30 ингибитор Trk представляет собой соединение из таблицы 5 или его фармацевтически приемлемую соль.

Настоящее изобретение относится также к способам выбора лечения для субъекта, имеющего злокачественную опухоль (например, любую из злокачественных опухолей, описанных в настоящем описании или известных в данной области), включающим:

35 идентификацию субъекта, имеющего клетку злокачественной опухоли, имеющую по меньшей мере одну точечную мутацию в гене NTRK, приводящую к экспрессии белка Trk, содержащего мутацию в одном или нескольких положений аминокислот (например, мутацию в одном или нескольких из положений аминокислот, показанных в таблицах 1, 2 или 3); и выбор лечения, включающего одно или несколько соединений из таблицы

40 5 или их фармацевтически приемлемые соли, для идентифицированного субъекта.

Настоящее изобретение относится также к способам выбора лечения для субъекта, имеющего злокачественную опухоль (например, любую из злокачественных опухолей, описанных в настоящем описании или известных в данной области), включающим:

45 идентификацию субъекта, имеющего клетку злокачественной опухоли, имеющую по меньшей мере одну точечную мутацию в гене NTRK, приводящую к экспрессии белка Trk, содержащего мутацию в одном или нескольких положений аминокислот (например, мутацию в одном или нескольких из положений аминокислот, показанных в таблицах 1, 2 или 3); и выбор лечения, включающего одно или несколько соединений из таблицы

5 или их фармацевтически приемлемые соли, и другое противораковое средство (например, любое одно или несколько из противораковых средств, описанных в настоящем описании или известных в данной области) или противораковую терапию (например, любой один или несколько способов противораковой терапии, описанных в настоящем описании или известных в данной области), для идентифицированного субъекта.

Настоящее изобретение относится также к способам выбора лечения для субъекта, имеющего злокачественную опухоль, включающим: выбор лечения, включающего одно или несколько соединений из таблицы 5 или их фармацевтически приемлемые соли, для субъекта, идентифицированного как имеющего клетку злокачественной опухоли, имеющую по меньшей мере одну точечную мутацию в гене NTRK, приводящую к экспрессии белка Trk, содержащего мутацию в одном или нескольких положений аминокислот (например, мутацию в одном или нескольких из положений аминокислот, показанных в таблицах 1, 2 или 3).

Настоящее изобретение относится также к способам выбора лечения для субъекта, имеющего злокачественную опухоль, включающим: выбор лечения, включающего одно или несколько соединений из таблицы 5 или их фармацевтически приемлемые соли, и другое противораковое средство (например, любое одно или несколько из противораковых средств, описанных в настоящем описании или известных в данной области) или противораковую терапию (например, любой один или несколько способов противораковой терапии, описанных в настоящем описании или известных в данной области), для субъекта, идентифицированного как имеющего клетку злокачественной опухоли, имеющую по меньшей мере одну точечную мутацию в гене NTRK, приводящую к экспрессии белка Trk, содержащего мутацию в одном или нескольких положений аминокислот (например, мутацию в одном или нескольких из положений аминокислот, показанных в таблицах 1, 2 или 3).

Настоящее изобретение относится также к способам выбора лечения для субъекта, имеющего злокачественную опухоль, включающим: (a) введение одной или нескольких доз ингибитора Trk (например, первого ингибитора Trk, такого как энтректиниб или сульфат (S)-N-(5-((R)-2-(2,5-дифторфенил)пирролидин-1-ил)пиразоло[1,5-a]пиримидин-3-ил)-3-гидроксипирролидин-1-карбоксамида) субъекту в течение некоторого периода времени; (b) после (a), определения того, имеет ли клетка злокачественной опухоли в образце, полученном от субъекта, по меньшей мере одну точечную мутацию в гене NTRK, приводящую к экспрессии белка Trk, содержащего мутацию в одном или нескольких положений аминокислот (например, мутацию в одном или нескольких из положений аминокислот, показанных в таблицах 1, 2, или 3); и (c) выбор отличного ингибитора Trk или лечения, не включающего ингибитор Trk со стадии (a) (например, сульфата (S)-N-(5-((R)-2-(2,5-дифторфенил)пирролидин-1-ил)пиразоло[1,5-a]пиримидин-3-ил)-3-гидроксипирролидин-1-карбоксамида) в качестве монотерапии, для субъекта, имеющего клетку злокачественной опухоли, имеющую по меньшей мере одну точечную мутацию в гене NTRK, приводящую к экспрессии белка Trk, содержащего мутацию в одном или нескольких положений аминокислот (например, мутацию в одном или нескольких из положений аминокислот, показанных в таблицах 1, 2 или 3); или (d) выбор дополнительных доз ингибитора Trk со стадии (a) (например, сульфата (S)-N-(5-((R)-2-(2,5-дифторфенил)пирролидин-1-ил)пиразоло[1,5-a]пиримидин-3-ил)-3-гидроксипирролидин-1-карбоксамида) для субъекта, имеющего клетку злокачественной опухоли, не имеющую по меньшей мере одну точечную мутацию в гене NTRK, приводящую к экспрессии белка Trk, содержащего мутацию в одном или нескольких

положений аминокислот (например, мутацию в одном или нескольких из положений аминокислот, показанных в таблицах 1, 2 или 3).

Настоящее изобретение относится также к способам выбора лечения для субъекта, имеющего злокачественную опухоль, включающим: (а) определение того, имеет ли
 5 клетка злокачественной опухоли в образце, полученном от субъекта, который имеет злокачественную опухоль, и которому ранее вводили одну или несколько доз ингибитора Trk (например, первого ингибитора Trk, такого как энтректиниб или сульфат (S)-N-(5-((R)-2-(2,5-дифторфенил)пирролидин-1-ил)пиразоло[1,5-a]пиримидин-3-ил)-3-гидроксипирролидин-1-карбоксамид), по меньшей мере одну точечную мутацию в
 10 гене NTRK, приводящую к экспрессии белка Trk, содержащего мутацию в одном или нескольких положениях аминокислот (например, мутацию в одном или нескольких из положений аминокислот, показанных в таблицах 1, 2 или 3); (b) выбор отличного ингибитора Trk или лечения, не включающего ингибитор Trk со стадии (а) в качестве монотерапии, для субъекта, имеющего клетку злокачественной опухоли, имеющую по
 15 меньшей мере одну точечную мутацию в гене NTRK, приводящую к экспрессии белка Trk, содержащего мутацию в одном или нескольких положениях аминокислот (например, мутацию в одном или нескольких из положений аминокислот, показанных в таблицах 1, 2 или 3); или (с) выбор дополнительных доз ингибитора Trk со стадии (а) для субъекта, имеющего клетку злокачественной опухоли, не имеющую по меньшей мере одну
 20 точечную мутацию в гене NTRK, приводящую к экспрессии белка Trk, содержащего мутацию в одном или нескольких положениях аминокислот (например, мутацию в одном или нескольких из положений аминокислот, показанных в таблицах 1, 2 или 3).

Настоящее изобретение относится также к способам выбора лечения для субъекта, имеющего злокачественную опухоль, включающим: (а) введение одной или нескольких
 25 доз первого ингибитора Trk субъекту в течение некоторого периода времени; (b) после (а), определения того, имеет ли клетка злокачественной опухоли в образце, полученном от субъекта, по меньшей мере одну точечную мутацию в гене NTRK, приводящую к экспрессии белка Trk, содержащего мутацию в одном или нескольких положениях аминокислот (например, мутацию в одном или нескольких из положений аминокислот, показанных в таблицах 1, 2 или 3); и (с) выбор лечения, включающего одну или
 30 несколько доз второго ингибитора Trk, для субъекта, имеющего клетку злокачественной опухоли, имеющую по меньшей мере одну точечную мутацию в гене NTRK, приводящую к экспрессии белка Trk, содержащего мутацию в одном или нескольких положениях аминокислот (например, мутацию в одном или нескольких из положений аминокислот, показанных в таблицах 1, 2 или 3); или (d) выбор дополнительных доз первого
 35 ингибитора Trk для субъекта, имеющего клетку злокачественной опухоли, не имеющую по меньшей мере одну точечную мутацию в гене NTRK, приводящую к экспрессии белка Trk, содержащего мутацию в одном или нескольких положениях аминокислот (например, мутацию в одном или нескольких из положений аминокислот, показанных в таблицах 1, 2 или 3); и (с) выбор лечения, включающего одно или
 40 1, 2 или 3).

Настоящее изобретение относится также к способам выбора лечения для субъекта, имеющего злокачественную опухоль, включающим: (а) введение одной или нескольких
 доз первого ингибитора Trk субъекту в течение некоторого периода времени; (b) после (а), определения того, имеет ли клетка злокачественной опухоли в образце, полученном
 45 от субъекта, по меньшей мере одну точечную мутацию в гене NTRK, приводящую к экспрессии белка Trk, содержащего мутацию в одном или нескольких положениях аминокислот (например, мутацию в одном или нескольких из положений аминокислот, показанных в таблицах 1, 2 или 3); и (с) выбор лечения, включающего одно или

несколько соединений из таблицы 5, или их фармацевтически приемлемые соли, для субъекта, имеющего клетку злокачественной опухоли, имеющую по меньшей мере одну точечную мутацию в гене NTRK, приводящую к экспрессии белка Trk, содержащего мутацию в одном или нескольких положений аминокислот (например, мутацию в одном или нескольких из положений аминокислот, показанных в таблицах 1, 2, или 3); или (d) выбор дополнительных доз первого ингибитора Trk для субъекта, имеющего клетку злокачественной опухоли, не имеющую по меньшей мере одну точечную мутацию в гене NTRK, приводящую к экспрессии белка Trk, содержащего мутацию в одном или нескольких положений аминокислот (например, мутацию в одном или нескольких из положений аминокислот, показанных в таблицах 1, 2 или 3).

Настоящее изобретение относится также к способам выбора лечения для субъекта, имеющего злокачественную опухоль, включающим: (a) введение одной или нескольких доз первого ингибитора Trk субъекту в течение некоторого периода времени; (b) после (a), определения того, имеет ли клетка злокачественной опухоли в образце, полученном от субъекта, по меньшей мере одну точечную мутацию в гене NTRK, приводящую к экспрессии белка Trk, содержащего мутацию в одном или нескольких положений аминокислот (например, мутацию в одном или нескольких из положений аминокислот, показанных в таблицах 1, 2 или 3); и (c) выбор лечения, включающего одно или несколько соединений из таблицы 5, или их фармацевтически приемлемые соли, и другое противораковое средство или противораковую терапию, для субъекта, имеющего клетку злокачественной опухоли, имеющую по меньшей мере одну точечную мутацию в гене NTRK, приводящую к экспрессии белка Trk, содержащего мутацию в одном или нескольких положений аминокислот (например, мутацию в одном или нескольких из положений аминокислот, показанных в таблицах 1, 2 или 3); или (d) выбор дополнительных доз первого ингибитора Trk для субъекта, имеющего клетку злокачественной опухоли, не имеющую по меньшей мере одну точечную мутацию в гене NTRK, приводящую к экспрессии белка Trk, содержащего мутацию в одном или нескольких положений аминокислот (например, мутацию в одном или нескольких из положений аминокислот, показанных в таблицах 1, 2 или 3). Настоящее изобретение относится также к способам выбора лечения для субъекта, имеющего злокачественную опухоль, включающим: (a) определение того, имеет ли клетка злокачественной опухоли в образце, полученном от субъекта, который имеет злокачественную опухоль, и которому ранее вводили одну или несколько доз первого ингибитора Trk, по меньшей мере одну точечную мутацию в гене NTRK, приводящую к экспрессии белка Trk, содержащего мутацию в одном или нескольких положений аминокислот (например, мутацию в одном или нескольких из положений аминокислот, показанных в таблицах 1, 2 или 3); (b) выбор лечения, включающего одну или несколько доз второго ингибитора Trk, для субъекта, имеющего клетку злокачественной опухоли, имеющую по меньшей мере одну точечную мутацию в гене NTRK, приводящую к экспрессии белка Trk, содержащего мутацию в одном или нескольких положений аминокислот (например, мутацию в одном или нескольких из положений аминокислот, показанных в таблицах 1, 2 или 3); или (c) выбор дополнительных доз первого ингибитора Trk для субъекта, имеющего клетку злокачественной опухоли, не имеющую по меньшей мере одну точечную мутацию в гене NTRK, приводящую к экспрессии белка Trk, содержащего мутацию в одном или нескольких положений аминокислот (например, мутацию в одном или нескольких из положений аминокислот, показанных в таблицах 1, 2 или 3).

Настоящее изобретение относится также к способам выбора лечения для субъекта, имеющего злокачественную опухоль, включающим: (a) определение того, имеет ли

клетка злокачественной опухоли в образце, полученном от субъекта, который имеет злокачественную опухоль, и которому ранее вводили одну или несколько доз первого ингибитора Trk, по меньшей мере одну точечную мутацию в гене NTRK, приводящую к экспрессии белка Trk, содержащего мутацию в одном или нескольких положениях

5 аминокислот (например, мутацию в одном или нескольких из положений аминокислот, показанных в таблицах 1, 2 или 3); (b) выбор лечения, включающего одно или несколько соединений из таблицы 5 или их фармацевтически приемлемые соли, для субъекта, имеющего клетку злокачественной опухоли, имеющую по меньшей мере одну точечную мутацию в гене NTRK, приводящую к экспрессии белка Trk, содержащего мутацию в

10 одном или нескольких положениях аминокислот (например, мутацию в одном или нескольких из положений аминокислот, показанных в таблицах 1, 2 или 3); или (c) выбор дополнительных доз первого ингибитора Trk для субъекта, имеющего клетку злокачественной опухоли, не имеющую по меньшей мере одну точечную мутацию в гене NTRK, приводящую к экспрессии белка Trk, содержащего мутацию в одном или

15 нескольких положениях аминокислот (например, мутацию в одном или нескольких из положений аминокислот, показанных в таблицах 1, 2 или 3).

Настоящее изобретение относится также к способам выбора лечения для субъекта, имеющего злокачественную опухоль, включающим: (a) определение того, имеет ли клетка злокачественной опухоли в образце, полученном от субъекта, который имеет

20 злокачественную опухоль, и которому ранее вводили одну или несколько доз первого ингибитора Trk, по меньшей мере одну точечную мутацию в гене NTRK, приводящую к экспрессии белка Trk, содержащего мутацию в одном или нескольких положениях аминокислот (например, мутацию в одном или нескольких из положений аминокислот, показанных в таблицах 1, 2 или 3); (b) выбор лечения, включающего одно или несколько

25 соединений из таблицы 5 или их фармацевтически приемлемые соли, и другое противораковое средство или противораковую терапию, для субъекта, имеющему клетку злокачественной опухоли, имеющую по меньшей мере одну точечную мутацию в гене NTRK, приводящую к экспрессии белка Trk, содержащего мутацию в одном или нескольких положениях аминокислот (например, мутацию в одном или нескольких из

30 положений аминокислот, показанных в таблицах 1, 2 или 3); или (c) выбор дополнительных доз первого ингибитора Trk для субъекта, имеющего клетку злокачественной опухоли, не имеющую по меньшей мере одну точечную мутацию в гене NTRK, приводящую к экспрессии белка Trk, содержащего мутацию в одном или нескольких положениях аминокислот (например, мутацию в одном или нескольких из

35 положений аминокислот, показанных в таблицах 1, 2 или 3).

Настоящее изобретение относится также к способам выбора лечения, включающего увеличенную дозу ингибитора Trk (например, первого ингибитора Trk, такого как энтректиниб или сульфат (S)-N-(5-((R)-2-(2,5-дифторфенил)пирролидин-1-ил)пиразоло

40 [1,5-а]пиримидин-3-ил)-3-гидроксипирролидин-1-карбоксамида) (например, по сравнению с контрольной дозой ингибитора Trk), для субъекта, имеющего злокачественную опухоль, (например, любую из злокачественных опухолей, описанных в настоящем описании), включающим идентификацию субъекта, имеющего клетку злокачественной опухоли, имеющую по меньшей мере одну точечную мутацию в гене NTRK, приводящую к экспрессии белка Trk, содержащего мутацию в одном или

45 нескольких положениях аминокислот (например, мутацию в одном или нескольких из положений аминокислот, показанных в таблицах 1, 2 или 3), и выбор увеличенной дозы ингибитора Trk (например, по сравнению с контрольной дозой ингибитора Trk) для идентифицированного субъекта. Как используют в другом месте настоящего описания,

контрольная доза ингибитора Trk представляет собой дозу ингибитора Trk, достаточную для лечения субъекта, имеющего злокачественную опухоль, не являющуюся устойчивой к ингибитору Trk злокачественной опухолью (например, злокачественную опухоль, не содержащую по меньшей мере одну точечную мутацию в гене NTRK, приводящую к экспрессии белка Trk, содержащего мутацию в одном или нескольких положениях аминокислот (например, мутацию в одном или нескольких из положений аминокислот, показанных в таблицах 1, 2 или 3)).

Настоящее изобретение относится также к способам выбора лечения, включающего увеличенную дозу ингибитора Trk (например, первого ингибитора Trk, такого как энтректиниб или сульфат (S)-N-(5-((R)-2-(2,5-дифторфенил)пирролидин-1-ил)пиразоло[1,5-a]пиримидин-3-ил)-3-гидроксипирролидин-1-карбоксамида) (например, по сравнению с контрольной дозой ингибитора Trk), для субъекта, имеющего злокачественную опухоль, (например, любую из злокачественных опухолей, описанных в настоящем описании), включающим выбор лечения, включающего увеличенную дозу ингибитора Trk (например, по сравнению с контрольной дозой ингибитора Trk) для субъекта, идентифицированного как имеющего клетку злокачественной опухоли, имеющую по меньшей мере одну точечную мутацию в гене NTRK, приводящую к экспрессии белка Trk, содержащего мутацию в одном или нескольких положениях аминокислот (например, мутацию в одном или нескольких из положений аминокислот, показанных в таблицах 1, 2 или 3)).

Настоящее изобретение относится также к способам выбора лечения для субъекта, имеющего злокачественную опухоль, включающим: (а) введение контрольной дозы ингибитора Trk (например, первого ингибитора Trk, такого как энтректиниб или сульфат (S)-N-(5-((R)-2-(2,5-дифторфенил)пирролидин-1-ил)пиразоло[1,5-a]пиримидин-3-ил)-3-гидроксипирролидин-1-карбоксамида) субъекту в течение некоторого периода времени; (b) после (а), определения того, имеет ли клетка злокачественной опухоли в образце, полученном от субъекта, по меньшей мере одну точечную мутацию в гене NTRK, приводящую к экспрессии белка Trk, содержащего мутацию в одном или нескольких положениях аминокислот (например, мутацию в одном или нескольких из положений аминокислот, показанных в таблицах 1, 2 или 3); и (с) выбор увеличенной дозы ингибитора Trk для субъекта, имеющего клетку злокачественной опухоли, имеющую по меньшей мере одну точечную мутацию в гене NTRK, приводящую к экспрессии белка Trk, содержащего мутацию в одном или нескольких положениях аминокислот (например, мутацию в одном или нескольких из положений аминокислот, показанных в таблицах 1, 2 или 3); или (d) выбор контрольной дозы ингибитора Trk для субъекта, имеющего клетку злокачественной опухоли, не имеющую по меньшей мере одну точечную мутацию в гене NTRK, приводящую к экспрессии белка Trk, содержащего мутацию в одном или нескольких положениях аминокислот (например, мутацию в одном или нескольких из положений аминокислот, показанных в таблицах 1, 2 или 3). Как используют в другом месте настоящего описания, контрольная доза ингибитора Trk представляет собой дозу ингибитора Trk, достаточную для лечения субъекта, имеющего злокачественную опухоль, не являющуюся устойчивой к ингибитору Trk злокачественной опухолью (например, злокачественную опухоль, не содержащую по меньшей мере одну точечную мутацию в гене NTRK, приводящую к экспрессии белка Trk, содержащего мутацию в одном или нескольких положениях аминокислот (например, мутацию в одном или нескольких из положений аминокислот, показанных в таблицах 1, 2 или 3)).

Настоящее изобретение относится также к способам выбора лечения для субъекта, имеющего злокачественную опухоль, включающим: (а) определение того, имеет ли

клетка злокачественной опухоли в образце, полученном от субъекта, который имеет злокачественную опухоль, и которому ранее вводили контрольную дозу ингибитора Trk (например, первого ингибитора Trk, такого как энтректиниб или сульфат (S)-N-(5-((R)-2-(2,5-дифторфенил)пирролидин-1-ил)пиразоло[1,5-а]пиримидин-3-ил)-3-гидроксипирролидин-1-карбоксамида), по меньшей мере одну точечную мутацию в гене NTRK, приводящую к экспрессии белка Trk, содержащего мутацию в одном или нескольких положений аминокислот (например, мутацию в одном или нескольких из положений аминокислот, показанных в таблицах 1, 2 или 3); (b) выбор увеличенной дозы ингибитора Trk для субъекта, имеющего клетку злокачественной опухоли, имеющую по меньшей мере одну точечную мутацию в гене NTRK, приводящую к экспрессии белка Trk, содержащего мутацию в одном или нескольких положений аминокислот (например, мутацию в одном или нескольких из положений аминокислот, показанных в таблицах 1, 2 или 3); или (c) выбор контрольной дозы ингибитора Trk для субъекта, имеющего клетку злокачественной опухоли, не имеющую по меньшей мере одну точечную мутацию в гене NTRK, приводящую к экспрессии белка Trk, содержащего мутацию в одном или нескольких положений аминокислот (например, мутацию в одном или нескольких из положений аминокислот, показанных в таблицах 1, 2 или 3).

Некоторые примеры этих способов дополнительно включают подвергание идентифицированного субъекта выбранному лечению. В некоторых примерах, выбранное лекарственное средство вводят самостоятельно. В других примерах, выбранное лекарственное средство вводит медицинский работник (например, любой из медицинских работников, описанных в настоящем описании). Некоторые примеры этих способов дополнительно включают регистрацию выбранного лечения в медицинской карте идентифицированного субъекта (например, на машиночитаемом носителе).

В некоторых из вариантов осуществления, представленных в настоящем описании, по меньшей мере одна точечная мутация в гене NTRK, приводящая к экспрессии белка Trk, содержащего мутацию в одном или нескольких положений аминокислот, включает (i) по меньшей мере одну (например, одну, две, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать или пятнадцать) точечную мутацию в гене NTRK1, приводящую к экспрессии белка TrkA, содержащего мутацию в одном или нескольких (например, двух, трех, четырех, пяти, шести, семи, восьми, девяти, десяти, одиннадцати, двенадцати, тринадцати, четырнадцати или пятнадцати) положении(ях) аминокислот, выбранных из группы, состоящей из: 517, 542, 568, 573, 589, 595, 599, 600, 602, 646, 656, 657, 667 и 676 (например, одну или несколько замен из G517R, A542V, V573M, F589L, F589C, G595S, G595R, D596V, F600L, F646V, C656Y, C656F, L657V, G667S, G667C и Y676S), и/или (ii) по меньшей мере одну (например, две, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать или пятнадцать) точечную мутацию в гене NTRK2, приводящую к экспрессии белка TrkB, содержащего мутацию в одном или нескольких (например, двух, трех, четырех, пяти, шести, семи, восьми, девяти, десяти, одиннадцати, двенадцати, тринадцати, четырнадцати или пятнадцати) положений аминокислот, выбранных из группы, состоящей из: 545, 570, 596, 601, 617, 623, 624, 628, 630, 672, 682, 683, 693 и 702 (например, одну или несколько замен из G545R, A570V, Q596E, Q596P, V601G, F617L, F617C, F617I, G623S, G623R, D624V, R630K, C682Y, C682F, L683V, G693S и G713S), и/или (iii) по меньшей мере одну (например, две, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать,

четырнадцать или пятнадцать) точечную мутацию в гене NTRK3, приводящую к экспрессии белка TrkC, содержащего мутацию в одном или нескольких (например, двух, трех, четырех, пяти, шести, семи, восьми, девяти, десяти, одиннадцати, двенадцати, тринадцати, четырнадцати или пятнадцати) положении(положениях) аминокислот, выбранных из группы, состоящей из: 545, 570, 596, 601, 617, 623, 624, 628, 630, 675, 685, 686, 696 и 705 (например, одну или несколько замен из G545R, A570V, F617L, G623R, D624V, C685Y, C685F, L686V и G696A). В некоторых вариантах осуществления, по меньшей мере одна точечная мутация в гене NTRK, приводящая к экспрессии белка Trk, содержащего мутацию в одном или нескольких положений аминокислот, выбрана из мутации в одном или нескольких из положений аминокислот, показанных в таблицах 1, 2 или 3.

Способы выбора субъекта, имеющего злокачественную опухоль, для лечения

Настоящее изобретение относится также к способам выбора субъекта, имеющего злокачественную опухоль, для лечения, не включающего ингибитор Trk (например, первый ингибитор Trk, такой как энтректиниб или сульфат (S)-N-(5-((R)-2-(2,5-дифторфенил)пирролидин-1-ил)пиразоло[1,5-a]пиримидин-3-ил)-3-гидроксипирролидин-1-карбоксамид) в качестве монотерапии, включающим идентификацию субъекта как имеющего клетку злокачественной опухоли, имеющую по меньшей мере одну точечную мутацию в гене NTRK, приводящую к экспрессии белка Trk, содержащего мутацию в одном или нескольких положений аминокислот (например, мутацию в одном или нескольких из положений аминокислот, показанных в таблицах 1, 2 или 3), и выбор идентифицированного субъекта для лечения, не включающего ингибитор Trk в качестве монотерапии (например, любого из способов лечения, не включающего ингибитор Trk в качестве монотерапии, описанных в настоящем описании).

Настоящее изобретение относится также к способам выбора субъекта, имеющего злокачественную опухоль, для лечения, не включающего ингибитор Trk (например, первый ингибитор Trk, такой как энтректиниб или сульфат (S)-N-(5-((R)-2-(2,5-дифторфенил)пирролидин-1-ил)пиразоло[1,5-a]пиримидин-3-ил)-3-гидроксипирролидин-1-карбоксамид) в качестве монотерапии, включающим выбор субъекта, имеющего злокачественную опухоль, (например, любую из злокачественных опухолей, описанных в настоящем описании) и идентифицированного как имеющего клетку злокачественной опухоли, имеющую по меньшей мере одну точечную мутацию в гене NTRK, приводящую к экспрессии белка Trk, содержащего мутацию в одном или нескольких положений аминокислот (например, мутацию в одном или нескольких из положений аминокислот, показанных в таблицах 1, 2 или 3), для лечения, не включающего ингибитор Trk в качестве монотерапии (например, любого из способов лечения, не включающего ингибитор Trk в качестве монотерапии, описанных в настоящем описании).

В некоторых примерах, лечение, не включающее ингибитор Trk в качестве монотерапии, включает одно или несколько из: хирургии (например, открытого хирургического вмешательства или минимально инвазивного хирургического вмешательства), радиотерапии (например, наружной дистанционной лучевой терапии или внутренней радиотерапии), химиотерапии (например, алкилирующего средства, антиметаболитов, средств, нарушающих функционирование микротрубочек, ингибиторов топоизомеразы и цитотоксических антибиотиков), иммунотерапии (например, адоптивного переноса клеток, цитокинов, вакцинации против злокачественных опухолей и бациллы Кальмета-Герена), гормонотерапии (например, лекарственного средства, блокирующего эстроген, лекарственного средства, уменьшающего уровень эстрогена, подобного прогестерону лекарственного средства

или антиандрогенного лекарственного средства), низкомолекулярных лекарственных средств, нацеленных на другие киназы в пути передачи сигналов Trk, рекомбинантных антител (например, любого из иллюстративных рекомбинантных антител, описанных в настоящем описании, например, антител против NGF) и трансплантации стволовых клеток. В некоторых примерах, лечение, не включающее ингибитор Trk в качестве монотерапии, может представлять собой, например, лечение, включающее (i) одно или несколько из хирургии, радиотерапии, химиотерапии, иммунотерапии, гормонотерапии, низкомолекулярных лекарственных средств, нацеленных на другие киназы в пути передачи сигналов Trk, рекомбинантных антител и трансплантации стволовых клеток, и (ii) один или несколько ингибиторов Trk (например, любой из ингибиторов Trk, описанных в настоящем описании). В некоторых вариантах осуществления, лечение, не включающее ингибитор Trk в качестве монотерапии, может представлять собой, например, лечение, включающее два или более ингибитора Trk (например, любые из ингибиторов Trk, описанных в настоящем описании). Дополнительные примеры способов лечения, не включающего ингибитор Trk в качестве монотерапии, и доз и способов для его проведения, описаны в настоящем описании или известны в данной области.

Некоторые примеры этих способов дополнительно включают подвергание выбранного субъекта лечению, не включающему ингибитор Trk в качестве монотерапии (например, с использованием любого из способов лечения, не включающего ингибитор Trk в качестве монотерапии, любого из способов введения, любой из доз и/или любой из частоты введения, описанных в настоящем описании). В некоторых примерах, лечение, не включающее ингибитор Trk в качестве монотерапии, проводят самостоятельно. В других примерах, медицинский работник подвергает выбранного субъекта лечению, не включающему ингибитор Trk в качестве монотерапии. В некоторых примерах, выбранный субъект является госпитализированным. В других примерах, субъекта подвергают лечению, не включающему ингибитор Trk в качестве монотерапии, на амбулаторной основе. Некоторые способы дополнительно включают регистрацию в медицинской карте субъекта (например, на машиночитаемом носителе) того, что субъект выбран для лечения, не включающего ингибитор Trk в качестве монотерапии.

Настоящее изобретение относится также к способам выбора субъекта, имеющего злокачественную опухоль, для лечения, включающего одно или несколько соединений из таблицы 5, или их фармацевтически приемлемые соли, включающим: идентификацию субъекта, имеющего клетку злокачественной опухоли, имеющую по меньшей мере одну точечную мутацию в гене NTRK, приводящую к экспрессии белка Trk, содержащего мутацию в одном или нескольких положений аминокислот (например, мутацию в одном или нескольких из положений аминокислот, показанных в таблицах 1, 2, или 3); и выбор идентифицированного субъекта для лечения, включающего одно или несколько соединений из таблицы 5, или их фармацевтически приемлемые соли.

Настоящее изобретение относится также к способам выбора субъекта, имеющего злокачественную опухоль, для лечения, включающего одно или несколько соединений из таблицы 5, или их фармацевтически приемлемые соли, и другое противораковое средство (например, любое одно или несколько из противораковых средств, описанных в настоящем описании или известны в данной области) или другую противораковую терапию, включающих: идентификацию субъекта, имеющего клетку злокачественной опухоли, имеющую по меньшей мере одну точечную мутацию в гене NTRK, приводящую к экспрессии белка Trk, содержащего мутацию в одном или нескольких положений аминокислот (например, мутацию в одном или нескольких из положений аминокислот,

показанных в таблицах 1, 2 или 3); и выбор идентифицированного субъекта для лечения, включающего одно или несколько соединений из таблицы 5, или их фармацевтически приемлемые соли и другое противораковое средство или противораковую терапию.

Настоящее изобретение относится также к способам выбора субъекта, имеющего злокачественную опухоль, для лечения, включающего одно или несколько соединений из таблицы 5, или их фармацевтически приемлемые соли, включающим: идентификацию субъекта, имеющего клетку злокачественной опухоли, имеющую по меньшей мере одну точечную мутацию в гене NTRK, приводящую к экспрессии белка Trk, содержащего мутацию в одном или нескольких положениях аминокислот (например, мутацию в одном или нескольких из положений аминокислот, показанных в таблицах 1, 2 или 3); и выбор идентифицированного субъекта для лечения, включающего одно или несколько соединений из таблицы 5, или их фармацевтически приемлемые соли.

Настоящее изобретение относится также к способам выбора субъекта, имеющего злокачественную опухоль, для лечения, включающего одно или несколько соединений из таблицы 5, или их фармацевтически приемлемые соли и другое противораковое средство или противораковую терапию, включающим: идентификацию субъекта, имеющего клетку злокачественной опухоли, имеющую по меньшей мере одну точечную мутацию в гене NTRK, приводящую к экспрессии белка Trk, содержащего мутацию в одном или нескольких положениях аминокислот (например, мутацию в одном или нескольких из положений аминокислот, показанных в таблицах 1, 2 или 3); и выбор идентифицированного субъекта для лечения, включающего одно или несколько соединений из таблицы 5, или их фармацевтически приемлемые соли и другое противораковое средство или противораковую терапию.

Некоторые примеры этих способов дополнительно включают подвергание выбранного субъекта лечению, включающему одно или несколько соединений из таблицы 5, или их фармацевтически приемлемые соли, или лечению, включающему одно или несколько соединений из таблицы 5, или их фармацевтически приемлемые соли и другое противораковое средство или противораковую терапию.

В некоторых из вариантов осуществления, представленных в настоящем описании, по меньшей мере одна точечная мутация в гене NTRK, приводящая к экспрессии белка Trk, содержащего мутацию в одном или нескольких положениях аминокислот, включает (i) по меньшей мере одну (например, одну, две, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать или пятнадцать) точечную мутацию в гене NTRK1, приводящую к экспрессии белка TrkA, содержащего мутацию в одном или нескольких (например, двух, трех, четырех, пяти, шести, семи, восьми, девяти, десяти, одиннадцати, двенадцати, тринадцати, четырнадцати или пятнадцати) положениях(положениях) аминокислот, выбранных из группы, состоящей из: 517, 542, 568, 573, 589, 595, 599, 600, 602, 646, 656, 657, 667 и 676 (например, одну или несколько замен из G517R, A542V, V573M, F589L, F589C, G595S, G595R, D596V, F600L, F646V, C656Y, C656F, L657V, G667S, G667C и Y676S), и/или (ii) по меньшей мере одну (например, две, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать или пятнадцать) точечную мутацию в гене NTRK2, приводящую к экспрессии белка TrkB, содержащего мутацию в одном или нескольких (например, двух, трех, четырех, пяти, шести, семи, восьми, девяти, десяти, одиннадцати, двенадцати, тринадцати, четырнадцати или пятнадцати) положениях аминокислот, выбранных из группы, состоящей из: 545, 570, 596, 601, 617, 623, 624, 628, 630, 672, 682, 683, 693 и 702 (например, одну или несколько замен из G545R, A570V, Q596E, Q596P, V601G, F617L, F617C, F617I, G623S, G623R, D624V, R630K, C682Y, C682F,

L683V, G693S, и G713S), и/или (iii) по меньшей мере одну (например, две, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать или пятнадцать) точечную мутацию в гене NTRK3, приводящую к экспрессии белка TrkC, включая мутацию в одном или нескольких (например, двух, трех, четырех, пяти, шести, семи, восьми, девяти, десяти, одиннадцати, двенадцати, тринадцати, четырнадцати или пятнадцати) положении(ях) аминокислот, выбранных из группы, состоящей из: 545, 570, 596, 601, 617, 623, 624, 628, 630, 675, 685, 686, 696 и 705 (например, одну или несколько замен из G545R, A570V, F617L, G623R, D624V, C685Y, C685F, L686V и G696A). В некоторых вариантах осуществления, по меньшей мере одна точечная мутация в гене NTRK, приводящая к экспрессии белка Trk, содержащего мутацию в одном или нескольких положениях аминокислот, выбрана из мутации в одном или нескольких из положений аминокислот, показанных в таблицах 1, 2 или 3.

Способы определения вероятности того, что субъект, имеющий злокачественную опухоль, будет иметь положительный ответ на лечение ингибитором Trk в качестве монотерапии

Настоящее изобретение относится также к способам определения вероятности того, что субъект, имеющий злокачественную опухоль, (например, любую из злокачественных опухолей, описанных в настоящем описании) будет иметь положительный ответ на лечение ингибитором Trk (например, первым ингибитором Trk, таким как энтректиниб или сульфат (S)-N-(5-((R)-2-(2,5-дифторфенил)пирролидин-1-ил)пиразоло[1,5-a]пиримидин-3-ил)-3-гидроксипирролидин-1-карбоксамида) в качестве монотерапии, включающим определение того, имеет ли клетка злокачественной опухоли в образце, полученном от субъекта, по меньшей мере одну точечную мутацию в гене NTRK, приводящую к экспрессии белка Trk, содержащего мутацию в одном или нескольких положениях аминокислот (например, мутацию в одном или нескольких из положений аминокислот, показанных в таблицах 1, 2 или 3), присутствует ли уменьшенная вероятность наличия положительного ответа на лечение ингибитором Trk в качестве монотерапии (например, по сравнению с субъектом, имеющим клетку злокачественной опухоли, не имеющую по меньшей мере одну точечную мутацию в гене NTRK, приводящую к экспрессии белка Trk, содержащего мутацию в одном или нескольких положениях аминокислот (например, мутацию в одном или нескольких из положений аминокислот, показанных в таблицах 1, 2 или 3)).

Настоящее изобретение относится также к способам определения того, что субъект, имеющий злокачественную опухоль, (например, любую из злокачественных опухолей, описанных в настоящем описании) будет иметь положительный ответ на лечение ингибитором Trk (например, первым ингибитором Trk, таким как энтректиниб или сульфат (S)-N-(5-((R)-2-(2,5-дифторфенил)пирролидин-1-ил)пиразоло[1,5-a]пиримидин-3-ил)-3-гидроксипирролидин-1-карбоксамида) в качестве монотерапии, включающим определение того, что субъект, имеющий клетку злокачественной опухоли, имеющую по меньшей мере одну точечную мутацию в гене NTRK, приводящую к экспрессии белка Trk, содержащего мутацию в одном или нескольких положениях аминокислот (например, мутацию в одном или нескольких из положений аминокислот, показанных в таблицах 1, 2 или 3), имеет уменьшенную вероятность наличия положительного ответа на лечение ингибитором Trk в качестве монотерапии (например, по сравнению с субъектом, имеющему клетку злокачественной опухоли, не имеющую по меньшей мере одну точечную мутацию в гене NTRK, приводящую к экспрессии белка Trk, содержащего мутацию в одном или нескольких положениях аминокислот (например, мутацию в одном

или нескольких из положений аминокислот, показанных в таблицах 1, 2 или 3)).

Некоторые примеры этих способов включают подвергание лечению, не включающему ингибитор Trk в качестве монотерапии (например, любому из способов лечения, не включающего ингибитор Trk в качестве монотерапии, описанных в настоящем описании), субъекта, определенного как обладающего уменьшенной вероятностью

наличия положительного ответа на лечение ингибитором Trk в качестве монотерапии.

В некоторых примерах, лечение, не включающее ингибитор Trk в качестве монотерапии, включает одно или несколько из: хирургии (например, открытого хирургического вмешательства или минимально инвазивного хирургического вмешательства), радиотерапии (например, наружной дистанционной лучевой терапии или внутренней радиотерапии), химиотерапии (например, алкилирующего средства, антиметаболитов, средств, нарушающих функционирование микротрубочек, ингибиторов топоизомеразы и цитотоксических антибиотиков), иммунотерапии (например, адоптивного переноса клеток, цитокинов, вакцинации против злокачественных опухолей и бациллы Кальмета-Герена), гормонотерапии (например, лекарственного средства, блокирующего эстроген, лекарственного средства, уменьшающего уровень эстрогена, подобного прогестерону лекарственного средства или антиандрогенного лекарственного средства), низкомолекулярных лекарственных средств, нацеленных на другие киназы в пути передачи сигналов Trk, рекомбинантных антител (например, любого из иллюстративных рекомбинантных антител, описанных в настоящем описании, например, антител против NGF) и трансплантации стволовых клеток. В некоторых примерах, лечение, не включающее ингибитор Trk в качестве монотерапии, может представлять собой, например, лечение, включающее (i) одно или несколько из хирургии, радиотерапии, химиотерапии, иммунотерапии, гормонотерапии, низкомолекулярных лекарственных средств, нацеленных на другие киназы в пути передачи сигналов Trk, рекомбинантных антител и трансплантации стволовых клеток, и (ii) один или несколько ингибиторов Trk (например, любой из ингибиторов Trk, описанных в настоящем описании). В некоторых вариантах осуществления, лечение, не включающее ингибитор Trk в качестве монотерапии, может представлять собой, например, лечение, включающее два или более ингибиторы Trk (например, любого из ингибиторов Trk, описанных в настоящем описании). Дополнительные примеры способов лечения, не включающего ингибитор Trk в качестве монотерапии, и доз и способов для его проведения, описаны в настоящем описании или известны в данной области.

В некоторых примерах, лечение, не включающее ингибитор Trk в качестве монотерапии, проводят самостоятельно. В других примерах, медицинский работник подвергает субъекта лечению, не включающему ингибитор Trk в качестве монотерапии. В некоторых примерах, субъект является госпитализированным. В других примерах, субъекта подвергают лечению, не включающему ингибитор Trk в качестве монотерапии, на амбулаторной основе. Некоторые способы дополнительно включают регистрацию в медицинской карте субъекта (например, на машиночитаемом носителе) того, что субъект имеет уменьшенную вероятность наличия положительного ответа на лечение ингибитором Trk в качестве монотерапии.

Настоящее изобретение относится также к способам определения того, что субъект, имеющий злокачественную опухоль, будет иметь положительный ответ на лечение, включающее одно или несколько соединений из таблицы 5, или их фармацевтически приемлемые соли, включающим: определение того, имеет ли клетка злокачественной опухоли в образце, полученном от субъекта, по меньшей мере одну точечную мутацию

в гене NTRK, приводящую к экспрессии белка Trk, содержащего мутацию в одном или нескольких положений аминокислот (например, мутацию в одном или нескольких из положений аминокислот, показанных в таблицах 1, 2 или 3), присутствует ли увеличенная вероятность наличия положительного ответа на лечение, включающее одно или несколько соединений из таблицы 5, или их фармацевтически приемлемые соли.

Настоящее изобретение относится также к способам определения вероятности того, что субъект, имеющий злокачественную опухоль, будет иметь положительный ответ на лечение, включающее одно или несколько соединений из таблицы 5, или их фармацевтически приемлемые соли, включающим: определение того, что субъект, имеющий клетку злокачественной опухоли, имеющую по меньшей мере одну точечную мутацию в гене NTRK, приводящую к экспрессии белка Trk, содержащего мутацию в одном или нескольких положений аминокислот (например, мутацию в одном или нескольких из положений аминокислот, показанных в таблицах 1, 2 или 3), имеет увеличенную вероятность наличия положительного ответа на лечение, включающее одно или несколько соединений из таблицы 5, или их фармацевтически приемлемые соли.

В некоторых из вариантов осуществления, представленных в настоящем описании, по меньшей мере одна точечная мутация в гене NTRK, приводящая к экспрессии белка Trk, содержащего мутацию в одном или нескольких положений аминокислот, включает (i) по меньшей мере одну (например, одну, две, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать или пятнадцать) точечную мутацию в гене NTRK1, приводящую к экспрессии белка TrkA, содержащего мутацию в одном или нескольких (например, двух, трех, четырех, пяти, шести, семи, восьми, девяти, десяти, одиннадцати, двенадцати, тринадцати, четырнадцати или пятнадцати) положений(положениях) аминокислот, выбранных из группы, состоящей из: 517, 542, 568, 573, 589, 595, 599, 600, 602, 646, 656, 657, 667 и 676 (например, одну или несколько замен из G517R, A542V, V573M, F589L, F589C, G595S, G595R, D596V, F600L, F646V, C656Y, C656F, L657V, G667S, G667C и Y676S), и/или (ii) по меньшей мере одну (например, две, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать или пятнадцать) точечную мутацию в гене NTRK2, приводящую к экспрессии белка TrkB, содержащего мутацию в одном или нескольких (например, двух, трех, четырех, пяти, шести, семи, восьми, девяти, десяти, одиннадцати, двенадцати, тринадцати, четырнадцати или пятнадцати) положениях аминокислот, выбранных из группы, состоящей из: 545, 570, 596, 601, 617, 623, 624, 628, 630, 672, 682, 683, 693 и 702 (например, одну или несколько замен из G545R, A570V, Q596E, Q596P, V601G, F617L, F617C, F617I, G623S, G623R, D624V, R630K, C682Y, C682F, L683V, G693S и G713S), и/или (iii) по меньшей мере одну (например, две, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать или пятнадцать) точечную мутацию в гене NTRK3, приводящую к экспрессии белка TrkC, содержащего мутацию в одном или нескольких (например, двух, трех, четырех, пяти, шести, семи, восьми, девяти, десяти, одиннадцати, двенадцати, тринадцати, четырнадцати или пятнадцати) положениях(положениях) аминокислот, выбранных из группы, состоящей из: 545, 570, 596, 601, 617, 623, 624, 628, 630, 675, 685, 686, 696 и 705 (например, одну или несколько замен из G545R, A570V, F617L, G623R, D624V, C685Y, C685F, L686V и G696A). В некоторых вариантах осуществления, по меньшей мере одна точечная мутация в гене NTRK, приводящая к экспрессии белка Trk, содержащего мутацию в одном или нескольких положений аминокислот, выбрана из мутации в одном или нескольких из положений аминокислот, показанных в таблицах

1, 2 или 3.

Способы прогнозирования эффективности лечения ингибитором Trk в качестве монотерапии у субъекта, имеющего злокачественную опухоль,

Настоящее изобретение относится также к способам прогнозирования эффективности лечения ингибитором Trk (например, первым ингибитором Trk, таким как энтректиниб или сульфат (S)-N-(5-((R)-2-(2,5-дифторфенил)пирролидин-1-ил)пиразоло[1,5-a]пиримидин-3-ил)-3-гидроксипирролидин-1-карбоксамида) в качестве монотерапии у субъекта, имеющего злокачественную опухоль, (например, любую из злокачественных опухолей, описанных в настоящем описании), включающим определение того, имеет ли клетка злокачественной опухоли в образце, полученном от субъекта, по меньшей мере одну точечную мутацию в гене NTRK, приводящую к экспрессии белка Trk, содержащего мутацию в одном или нескольких положениях аминокислот (например, мутацию в одном или нескольких из положений аминокислот, показанных в таблицах 1, 2 или 3), и определение того, что лечение ингибитором Trk в качестве монотерапии с меньшей вероятностью будет являться эффективным у субъекта, имеющего клетку злокачественной опухоли в образце, полученном от субъекта, имеющую по меньшей мере одну точечную мутацию в гене NTRK, приводящую к экспрессии белка Trk, содержащего мутацию в одном или нескольких положениях аминокислот (например, мутацию в одном или нескольких из положений аминокислот, показанных в таблицах 1, 2, или 3) (например, по сравнению с субъектом, имеющим клетку злокачественной опухоли в образце, полученном от субъекта, не имеющую по меньшей мере одну точечную мутацию в гене NTRK, приводящую к экспрессии белка Trk, содержащего мутацию в одном или нескольких положениях аминокислот (например, мутацию в одном или нескольких из положений аминокислот, показанных в таблицах 1, 2 или 3)).

Настоящее изобретение относится также к способам прогнозирования эффективности лечения ингибитором Trk (например, первым ингибитором Trk, таким как энтректиниб или сульфат (S)-N-(5-((R)-2-(2,5-дифторфенил)пирролидин-1-ил)пиразоло[1,5-a]пиримидин-3-ил)-3-гидроксипирролидин-1-карбоксамида) в качестве монотерапии у субъекта, имеющего злокачественную опухоль (например, любую из злокачественных опухолей, описанных в настоящем описании), включающим определение того, что лечение ингибитором Trk в качестве монотерапии с меньшей вероятностью будет являться эффективным у субъекта, имеющего клетку злокачественной опухоли в образце, полученном от субъекта, имеющую по меньшей мере одну точечную мутацию в гене NTRK, приводящую к экспрессии белка Trk, содержащего мутацию в одном или нескольких положениях аминокислот (например, мутацию в одном или нескольких из положений аминокислот, показанных в таблицах 1, 2 или 3) (например, по сравнению с субъектом, имеющим клетку злокачественной опухоли в образце, полученном от субъекта, не имеющую по меньшей мере одну точечную мутацию в гене NTRK, приводящую к экспрессии белка Trk, содержащего мутацию в одном или нескольких положениях аминокислот (например, мутацию в одном или нескольких из положений аминокислот, показанных в таблицах 1, 2 или 3)).

Некоторые способы дополнительно включают регистрацию в медицинской карте субъекта (например, на машиночитаемом носителе) прогнозируемой эффективности лечения ингибитором Trk в качестве монотерапии, у субъекта, имеющего злокачественную опухоль. Некоторые примеры этих способов дополнительно включают выбор лечения, не включающего ингибитор Trk в качестве монотерапии, для субъекта. Некоторые примеры дополнительно включают подвергание субъекта выбранному лечению (например, с использованием любого из способов лечения, не включающего

ингибитор Trk в качестве монотерапии, любого из способов введения, любой из доз и/или любой из частоты введения, описанных в настоящем описании).

В некоторых примерах, лечение, не включающее ингибитор Trk в качестве монотерапии, включает одно или несколько из: хирургии (например, открытого хирургического вмешательства или минимально инвазивного хирургического вмешательства), радиотерапии (например, наружной дистанционной лучевой терапии или внутренней радиотерапии), химиотерапии (например, алкилирующего средства, антиметаболитов, средств, нарушающих функционирование микротрубочек, ингибиторов топоизомеразы и цитотоксических антибиотиков), иммунотерапии (например, адоптивного переноса клеток, цитокинов, вакцинации против злокачественных опухолей и бациллы Кальмета-Герена), гормонотерапии (например, лекарственного средства, блокирующего эстроген, лекарственного средства, уменьшающего уровень эстрогена, подобного прогестерону лекарственного средства или антиандрогенного лекарственного средства), низкомолекулярных лекарственных средств, нацеленных на другие киназы в пути передачи сигналов Trk, рекомбинантных антител (например, любого из иллюстративных рекомбинантных антител, описанных в настоящем описании, например, антител против NGF) и трансплантации стволовых клеток. В некоторых примерах, лечение, не включающее ингибитор Trk в качестве монотерапии, может представлять собой, например, лечение, включающее (i) одно или несколько из хирургии, радиотерапии, химиотерапии, иммунотерапии, гормонотерапии, низкомолекулярных лекарственных средств, нацеленных на другие киназы в пути передачи сигналов Trk, рекомбинантных антител и трансплантации стволовых клеток, и (ii) один или несколько ингибиторов Trk (например, любой из ингибиторов Trk, описанных в настоящем описании). В некоторых вариантах осуществления, лечение, не включающее ингибитор Trk в качестве монотерапии, может представлять собой, например, лечение, включающее два или более ингибитора Trk (например, любые из ингибиторов Trk, описанных в настоящем описании). Дополнительные примеры способов лечения, не включающего ингибитор Trk в качестве монотерапии, и доз и способов для его проведения, описаны в настоящем описании или известны в данной области.

В некоторых примерах, лечение, не включающее ингибитор Trk в качестве монотерапии, проводят самостоятельно. В других примерах, медицинский работник подвергает субъекта лечению, не включающему ингибитор Trk в качестве монотерапии. В некоторых примерах, субъект является госпитализированным. В других примерах, субъекта подвергают лечению, не включающему ингибитор Trk в качестве монотерапии, на амбулаторной основе.

Настоящее изобретение относится также к способам прогнозирования эффективности лечения, включающего одно или несколько соединений из таблицы 5, или их фармацевтически приемлемые соли, у субъекта, имеющего злокачественную опухоль, включающих: определение того, имеет ли клетка злокачественной опухоли в образце, полученном от субъекта, по меньшей мере одну точечную мутацию в гене NTRK, приводящую к экспрессии белка Trk, содержащего мутацию в одном или нескольких положений аминокислот (например, мутацию в одном или нескольких из положений аминокислот, показанных в таблицах 1, 2 или 3); и определение того, что лечение, включающее одно или несколько соединений из таблицы 5, или их фармацевтически приемлемые соли, с большей вероятностью будет являться эффективным у субъекта, имеющего клетку злокачественной опухоли в образце, полученном от субъекта, имеющую по меньшей мере одну точечную мутацию в гене NTRK, приводящую к

экспрессии белка Trk, содержащего мутацию в одном или нескольких положениях аминокислот (например, мутацию в одном или нескольких из положений аминокислот, показанных в таблицах 1, 2 или 3).

Настоящее изобретение относится также к способам прогнозирования эффективности лечения, включающего одно или несколько соединений из таблицы 5, или их фармацевтически приемлемые соли, у субъекта, имеющего злокачественную опухоль, включающим: определение того, что лечение, включающее одно или несколько соединений из таблицы 5, или их фармацевтически приемлемые соли, с большей вероятностью будет являться эффективным у субъекта, имеющего клетку злокачественной опухоли в образце, полученном от субъекта, имеющую по меньшей мере одну точечную мутацию в гене NTRK, приводящую к экспрессии белка Trk, содержащего мутацию в одном или нескольких положениях аминокислот (например, мутацию в одном или нескольких из положений аминокислот, показанных в таблицах 1, 2 или 3).

В некоторых из вариантов осуществления, представленных в настоящем описании, по меньшей мере одна точечная мутация в гене NTRK, приводящая к экспрессии белка Trk, содержащего мутацию в одном или нескольких положениях аминокислот, включает (i) по меньшей мере одну (например, одну, две, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать или пятнадцать) точечную мутацию в гене NTRK1, приводящей к экспрессии белка TrkA, содержащего мутацию в одном или нескольких (например, двух, трех, четырех, пяти, шести, семи, восьми, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать или пятнадцать) положениях(положениях) аминокислот, выбранных из группы, состоящей из: 517, 542, 568, 573, 589, 595, 599, 600, 602, 646, 656, 657, 667 и 676 (например, одну или несколько замен из G517R, A542V, V573M, F589L, F589C, G595S, G595R, D596V, F600L, F646V, C656Y, C656F, L657V, G667S, G667C и Y676S), и/или (ii) по меньшей мере одну (например, две, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать или пятнадцать) точечную мутацию в гене NTRK2, приводящую к экспрессии белка TrkB, содержащего мутацию в одном или нескольких (например, двух, трех, четырех, пяти, шести, семи, восьми, девяти, десяти, одиннадцати, двенадцати, тринадцати, четырнадцати или пятнадцати) положениях аминокислот, выбранных из группы, состоящей из: 545, 570, 596, 601, 617, 623, 624, 628, 630, 672, 682, 683, 693 и 702 (например, одну или несколько замены из G545R, A570V, Q596E, Q596R, V601G, F617L, F617C, F617I, G623S, G623R, D624V, R630K, C682Y, C682F, L683V, G693S и G713S), и/или (iii) по меньшей мере одну (например, две, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать или пятнадцать) точечную мутацию в гене NTRK3, приводящую к экспрессии белка TrkC, содержащего мутацию в одном или нескольких (например, двух, трех, четырех, пяти, шести, семи, восьми, девяти, десяти, одиннадцати, двенадцати, тринадцати, четырнадцати или пятнадцати) положениях(положениях) аминокислот, выбранных из группы, состоящей из: 545, 570, 596, 601, 617, 623, 624, 628, 630, 675, 685, 686, 696 и 705 (например, один или несколько замен из G545R, A570V, F617L, G623R, D624V, C685Y, C685F, L686V и G696A). В некоторых вариантах осуществления, по меньшей мере одна точечная мутация в гене NTRK, приводящая к экспрессии белка Trk, содержащего мутацию в одном или нескольких положениях аминокислот, выбрана из мутаций в одном или нескольких из положений аминокислот, показанных в таблицах 1, 2 или 3.

Способы прогнозирования для субъекта риска развития устойчивой к ингибитору Trk

злокачественной опухоли

Настоящее изобретение относится также к способам определения для субъекта риска развития устойчивой к ингибитору Trk злокачественной опухоли (например, любой из злокачественных опухолей, описанных в настоящем описании), включающим

- 5 определение того, имеет ли клетка в образце, полученном от субъекта, (i) по меньшей мере одну (например, две, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать или пятнадцать) точечную мутацию в гене NTRK1, приводящую к экспрессии белка TrkA, содержащего мутацию в одном или нескольких (например, двух, трех, четырех, пяти, шести, семи, восьми, девяти,
- 10 десяти, одиннадцати, двенадцати, тринадцати, четырнадцати или пятнадцати) положениях (положениях) аминокислот, выбранных из группы, состоящей из: 517, 542, 568, 573, 589, 595, 599, 600, 602, 646, 656, 657, 667 и 676 (например, одну или несколько замен из G517R, A542V, V573M, F589L, F589C, G595S, G595R, D596V, F600L, F646V, C656Y, C656F, L657V, G667S, G667C и Y676S) и/или (ii) по меньшей мере одну (например, две, три, четыре,
- 15 пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать или пятнадцать) точечную мутацию в гене NTRK2, приводящую к экспрессии белка TrkB, содержащего мутацию в одном или нескольких (например, двух, трех, четырех, пяти, шести, семи, восьми, девяти, десяти, одиннадцати, двенадцати, тринадцати, четырнадцати или пятнадцати) положениях аминокислот, выбранных из
- 20 группы, состоящей из: 545, 570, 596, 601, 617, 623, 624, 628, 630, 672, 682, 683, 693 и 702 (например, одну или несколько замен из G545R, A570V, Q596E, Q596P, V601G, F617L, F617C, F617I, G623S, G623R, D624V, R630K, C682Y, C682F, L683V, G693S и G713S), и/или (iii) по меньшей мере одну (например, две, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать или пятнадцать)
- 25 точечную мутацию в гене NTRK3, приводящую к экспрессии белка TrkC, содержащего мутацию в одном или нескольких (например, двух, трех, четырех, пяти, шести, семи, восьми, девяти, десяти, одиннадцати, двенадцати, тринадцати, четырнадцать или пятнадцати) положениях (положениях) аминокислот, выбранных из группы, состоящей из: 545, 570, 596, 601, 617, 623, 624, 628, 630, 675, 685, 686, 696 и 705 (например, одну или
- 30 несколько замен из G545R, A570V, F617L, G623R, D624V, C685Y, C685F, L686V и G696A), и идентификацию субъекта, имеющего клетку, имеющую (i) по меньшей мере одну (например, две, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать или пятнадцать) точечную мутацию в гене NTRK1, приводящую к экспрессии белка TrkA, содержащего мутацию в одном или
- 35 нескольких (например, двух, трех, четырех, пяти, шести, семи, восьми, девяти, десяти, одиннадцати, двенадцати, тринадцати, четырнадцать или пятнадцати) положениях (положениях) аминокислот, выбранных из группы, состоящей из: 517, 542, 568, 573, 589, 595, 599, 600, 602, 646, 656, 657, 667 и 676 (например, одну или несколько замен из G517R, A542V, V573M, F589L, F589C, G595S, G595R, D596V, F600L, F646V, C656Y, C656F, L657V,
- 40 G667S, G667C и Y676S), и/или (ii) по меньшей мере одну (например, две, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать или пятнадцать) точечную мутацию в гене NTRK2, приводящую к экспрессии белка TrkB, содержащего мутацию в одном или нескольких (например, двух, трех, четырех, пяти, шести, семи, восьми, девяти, десяти, одиннадцати, двенадцати,
- 45 тринадцати, четырнадцать или пятнадцати) положениях аминокислот, выбранных из группы, состоящей из: 545, 570, 596, 601, 617, 623, 624, 628, 630, 672, 682, 683, 693 и 702 (например, одну или несколько замен из G545R, A570V, Q596E, Q596P, V601G, F617L, F617C, F617I, G623S, G623R, D624V, R630K, C682Y, C682F, L683V, G693S и G713S), и/

или (iii) по меньшей мере одну (например, две, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать или пятнадцать) точечную мутацию в гене NTRK3, приводящей к экспрессии белка TrkC, содержащего мутацию в одном или нескольких (например, двух, трех, четырех, пяти, шести, семи, 5 восьми, девяти, десяти, одиннадцати, двенадцати, тринадцати, четырнадцати или пятнадцати) положении(положениях) аминокислот, выбранных из группы, состоящей из: 545, 570, 596, 601, 617, 623, 624, 628, 630, 675, 685, 686, 696 и 705 (например, одну или несколько замен из G545R, A570V, F617L, G623R, D624V, C685Y, C685F, L686V, и G696A), как имеющего увеличенную вероятность развития устойчивой к ингибитору Trk 10 злокачественной опухоли (например, по сравнению с субъектом, не имеющим (i) точечную мутацию в гене NTRK1, приводящую к экспрессии белка TrkA, содержащего мутацию в одном или нескольких положении(положениях) аминокислот, выбранных из группы, состоящей из: 517, 542, 568, 573, 589, 595, 599, 600, 602, 646, 656, 657, 667 и 676 (например, одну или несколько замен из G517R, A542V, V573M, F589L, F589C, G595S, 15 G595R, D596V, F600L, F646V, C656Y, C656F, L657V, G667S, G667C, и Y676S), или (ii) точечную мутацию в гене NTRK2, приводящую к экспрессии белка TrkB, содержащего мутацию в одном или нескольких (например, двух, трех, четырех, пяти, шести, семи, восьми, девяти, десяти, одиннадцати, двенадцати, тринадцати, четырнадцать или пятнадцати) положениях аминокислот, выбранных из группы, состоящей из: 545, 570, 20 596, 601, 617, 623, 624, 628, 630, 672, 682, 683, 693 и 702 (например, одну или несколько замен из G545R, A570V, Q596E, Q596P, V601G, F617L, F617C, F617I, G623S, G623R, D624V, R630K, C682Y, C682F, L683V, G693S, и G713S), или (iii) точечную мутацию в гене NTRK3, приводящую к экспрессии белка TrkC, содержащего мутацию в одном или нескольких положении(положениях) аминокислот, выбранных из группы, состоящей из: 545, 570, 25 596, 601, 617, 623, 624, 628, 630, 675, 685, 686, 696 и 705 (например, одну или несколько замен из G545R, A570V, F617L, G623R, D624V, C685Y, C685F, L686V и G696A)).

Настоящее изобретение относится также к способам определения для субъекта риска развития устойчивой к ингибитору Trk злокачественной опухоли (например, любой из злокачественных опухолей, описанных в настоящем описании), включающим 30 идентификацию субъекта, имеющего клетку, имеющую (i) по меньшей мере одну (например, две, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать или пятнадцать) точечную мутацию(мутаций) в гене NTRK1, приводящую к экспрессии белка TrkA, содержащего мутацию в одном или нескольких (например, двух, трех, четырех, пяти, шести, семи, восьми, девяти, 35 десяти, одиннадцати, двенадцати, тринадцати, четырнадцати или пятнадцати) положении(положениях) аминокислот, выбранных из группы, состоящей из: 517, 542, 568, 573, 589, 595, 599, 600, 602, 646, 656, 657, 667 и 676 (например, одну или несколько замен из G517R, A542V, V573M, F589L, F589C, G595S, G595R, D596V, F600L, F646V, C656Y, C656F, L657V, G667S, G667C и Y676S), и/или (ii) по меньшей мере одну (например, две, три, четыре, 40 пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать или пятнадцать) точечную мутацию в гене NTRK2, приводящую к экспрессии белка TrkB, содержащего мутацию в одном или нескольких (например, двух, трех, четырех, пяти, шести, семи, восьми, девяти, десяти, одиннадцати, двенадцати, тринадцати, четырнадцать или пятнадцати) положениях аминокислот, выбранных из 45 группы, состоящей из: 545, 570, 596, 601, 617, 623, 624, 628, 630, 672, 682, 683, 693 и 702 (например, одну или несколько замен из G545R, A570V, Q596E, Q596P, V601G, F617L, F617C, F617I, G623S, G623R, D624V, R630K, C682Y, C682F, L683V, G693S, и G713S), и/или (iii) по меньшей мере одну (например, две, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь,

девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать или пятнадцать) точечную мутацию в гене NTRK3, приводящую к экспрессии белка TrkC, содержащего мутацию в одном или нескольких (например, двух, трех, четырех, пяти, шести, семи, восьми, девяти, десяти, одиннадцати, двенадцати, тринадцати, четырнадцати или пятнадцати) положении(положениях) аминокислот, выбранных из группы, состоящей из: 545, 570, 596, 601, 617, 623, 624, 628, 630, 675, 685, 686, 696 и 705 (например, одну или несколько замен из G545R, A570V, F617L, G623R, D624V, C685Y, C685F, L686V, и G696A), как имеющего увеличенную вероятность развития устойчивой к ингибитору Trk злокачественной опухоли (например, по сравнению с субъектом, имеющим клетку, не имеющую (i) точечную мутацию в гене NTRK1, приводящую к экспрессии белка TrkA, содержащего мутацию в одном или нескольких положении(положениях) аминокислот, выбранных из группы, состоящей из: 517, 542, 568, 573, 589, 595, 599, 600, 602, 646, 656, 657, 667 и 676 (например, одну или несколько замен из G517R, A542V, V573M, F589L, F589C, G595S, G595R, D596V, F600L, F646V, C656Y, C656F, L657V, G667S, G667C и Y676S), или (ii) точечную мутацию в гене NTRK2, приводящую к экспрессии белка TrkB, содержащего мутацию в одном или нескольких (например, двух, трех, четырех, пяти, шести, семи, восьми, девяти, десяти, одиннадцати, двенадцати, тринадцати, четырнадцати или пятнадцати) положениях аминокислот, выбранных из группы, состоящей из: 545, 570, 596, 601, 617, 623, 624, 628, 630, 672, 682, 683, 693 и 702 (например, одну или несколько замен из G545R, A570V, Q596E, Q596P, V601G, F617L, F617C, F617I, G623S, G623R, D624V, R630K, C682Y, C682F, L683V, G693S и G713S), или (iii) точечную мутацию в гене NTRK3, приводящую к экспрессии белка TrkC, содержащего мутацию в одном или нескольких положении(положениях) аминокислот, выбранных из группы, состоящей из: 545, 570, 596, 601, 617, 623, 624, 628, 630, 675, 685, 686, 696 и 705 (например, одну или несколько замен из G545R, A570V, F617L, G623R, D624V, C685Y, C685F, L686V и G696A)).

Некоторые способы дополнительно включают регистрацию в медицинской карте субъекта (например, на машиночитаемом носителе) риска развития у субъекта устойчивой к ингибитору Trk злокачественной опухоли. Устойчивая к ингибитору Trk злокачественная опухоль может представлять собой любую из иллюстративных злокачественных опухолей, описанных в настоящем описании. Некоторые способы дополнительно включают периодическое тестирование присутствия устойчивой к ингибитору Trk злокачественной опухоли у субъекта.

В некоторых примерах, субъекта идентифицируют как подвергавшегося воздействию значительного уровня канцерогена(канцерогенов) (например, табачного дыма, излучения UVB и гамма-излучения). В некоторых примерах, у субъекта, как подозревают, имеющего злокачественную опухоль, присутствуют один или несколько симптомов злокачественной опухоли (например, любой из симптомов злокачественных опухолей, описанных в настоящем описании), и/или субъект имеет злокачественную опухоль в семейном анамнезе.

В некоторых примерах, стадия определения того, имеет ли клетка злокачественной опухоли в образце, полученном от субъекта, (i) по меньшей мере одну (например, две, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать или пятнадцать) точечную мутацию в гене NTRK1, приводящую к экспрессии белка TrkA, содержащего одну или несколько (например, две, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать или пятнадцать) мутаций (например, любую из мутаций в TrkA, описанных в настоящем описании), и/или (ii) по меньшей мере одну (например, две, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать,

тринадцать, четырнадцать или пятнадцать) точечную мутацию в гене NTRK2, приводящую к экспрессии белка TrkB, содержащего одну или несколько (например, две, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать или пятнадцать) мутаций (например, любую из мутаций в TrkB, описанных в настоящем описании), и/или (iii) по меньшей мере одну (например, две, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать или пятнадцать) точечную мутацию в гене NTRK3, приводящую к экспрессии белка TrkC, содержащего одну или несколько (например, две, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать или пятнадцать) мутаций (например, любую из мутаций в TrkC, описанных в настоящем описании), включает проведение анализа для определения присутствия по меньшей мере одной точечной мутации в гене NTRK1 и/или по меньшей мере одной точечной мутации в гене NTRK2, и/или по меньшей мере одной точечной мутации в гене NTRK3 в клетке злокачественной опухоли в образце (например, в образце биоптата) от субъекта. Любой из анализов, описанных в настоящем описании, можно использовать для определения присутствия по меньшей мере одной точечной мутации в гене NTRK1 и/или по меньшей мере одной точечной мутации в гене NTRK2, и/или по меньшей мере одной точечной мутации в гене NTRK3. Кроме того, любой из наборов, представленных в настоящем описании, можно использовать в анализе для определения присутствия по меньшей мере одной точечной мутации в гене NTRK1 и/или по меньшей мере одной точечной мутации в гене NTRK2, и/или по меньшей мере одной точечной мутации в гене NTRK3. В некоторых примерах, анализ включает секвенирование фрагмента гена NTRK1, содержащего по меньшей мере одну точечную мутацию, и/или фрагмента гена NTRK2, содержащего по меньшей мере одну точечную мутацию, и/или фрагмента гена NTRK3, содержащего по меньшей мере одну точечную мутацию.

Способы определения присутствия устойчивой к ингибитору Trk злокачественной опухоли у субъекта

Настоящее изобретение относится также к способам определения присутствия устойчивой к ингибитору Trk злокачественной опухоли (например, любой из злокачественных опухолей, описанных в настоящем описании) у субъекта, включающим определение того, имеет ли клетка в образце, полученном от субъекта, (i) по меньшей мере одну (например, две, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать или пятнадцать) точечную мутацию в гене NTRK1, приводящую к экспрессии белка TrkA, содержащего мутацию в одном или нескольких (например, двух, трех, четырех, пяти, шести, семи, восьми, девяти, десяти, одиннадцати, двенадцати, тринадцати, четырнадцати или пятнадцати) положении (положениях) аминокислот, выбранных из группы, состоящей из: 517, 542, 568, 573, 589, 595, 599, 600, 602, 646, 656, 657, 667 и 676 (например, одну или несколько замен из G517R, A542V, V573M, F589L, F589C, G595S, G595R, D596V, F600L, F646V, C656Y, C656F, L657V, G667S, G667C и Y676S), и/или (ii) по меньшей мере одну (например, две, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать или пятнадцать) точечную мутацию в гене NTRK2, приводящей к экспрессии белка TrkB, содержащего мутацию в одном или нескольких (например, двух, трех, четырех, пяти, шести, семи, восьми, девяти, десяти, одиннадцати, двенадцати, тринадцати, четырнадцати или пятнадцати) положениях аминокислот, выбранных из группы, состоящей из: 545, 570, 596, 601, 617, 623, 624, 628, 630, 672, 682, 683, 693 и 702 (например, одну или несколько замен из G545R, A570V, Q596E, Q596P, V601G, F617L, F617C, F617I, G623S, G623R, D624V, R630K, C682Y, C682F, L683V, G693S, и G713S), и/

или (iii) по меньшей мере одну (например, две, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать или пятнадцать) точечную мутацию в гене NTRK3, приводящую к экспрессии белка TrkC, содержащего мутацию в одном или нескольких (например, двух, трех, четырех, пяти, шести, семи, восьми, девяти, десяти, одиннадцати, двенадцати, тринадцати, четырнадцати или пятнадцати) положении(ях) аминокислот, выбранных из группы, состоящей из: 545, 570, 596, 601, 617, 623, 624, 628, 630, 675, 685, 686, 696 и 705 (например, одну или несколько замен из G545R, A570V, F617L, G623R, D624V, C685Y, C685F, L686V, и G696A), и определение того, что субъект, имеющий клетку, имеющую (i) по меньшей мере одну (например, две, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать или пятнадцать) точечную мутацию в гене NTRK1, приводящую к экспрессии белка TrkA, содержащего мутацию в одном или нескольких (например, двух, трех, четырех, пяти, шести, семи, восьми, девяти, десяти, одиннадцати, двенадцати, тринадцати, четырнадцати или пятнадцати) положении(ях) аминокислот, выбранных из группы, состоящей из: 517, 542, 568, 573, 589, 595, 599, 600, 602, 646, 656, 657, 667 и 676 (например, одну или несколько замен из G517R, A542V, V573M, F589L, F589C, G595S, G595R, D596V, F600L, F646V, C656Y, C656F, L657V, G667S, G667C и Y676S), и/или (ii) по меньшей мере одну (например, две, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать или пятнадцать) точечную мутацию в гене NTRK2, приводящую к экспрессии белка TrkB, содержащего мутацию в одном или нескольких (например, двух, трех, четырех, пяти, шести, семи, восьми, девяти, десяти, одиннадцати, двенадцати, тринадцати, четырнадцати или пятнадцати) положении(ях) аминокислот, выбранных из группы, состоящей из: 545, 570, 596, 601, 617, 623, 624, 628, 630, 672, 682, 683, 693 и 702 (например, одну или несколько замен из G545R, A570V, Q596E, Q596R, V601G, F617L, F617C, F617I, G623S, G623R, D624V, R630K, C682Y, C682F, L683V, G693S, и G713S), и/или (iii) по меньшей мере одну (например, две, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать или пятнадцать) точечную мутацию в гене NTRK3, приводящую к экспрессии белка TrkC, содержащего мутацию в одном или нескольких (например, двух, трех, четырех, пяти, шести, семи, восьми, девяти, десяти, одиннадцати, двенадцати, тринадцати, четырнадцати или пятнадцати) положении(ях) аминокислот, выбранных из группы, состоящей из: 545, 570, 596, 601, 617, 623, 624, 628, 630, 675, 685, 686, 696 и 705 (например, одну или несколько замен из G545R, A570V, F617L, G623R, D624V, C685Y, C685F, L686V, и G696A), имеет устойчивую к ингибитору Trk злокачественную опухоль.

Настоящее изобретение относится также к способам определения присутствия устойчивой к ингибитору Trk злокачественной опухоли (например, любой из злокачественных опухолей, описанных в настоящем описании) у субъекта, включающим определение того, что субъект, имеющий клетку, имеющую (i) по меньшей мере одну (например, две, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать или пятнадцать) точечную мутацию в гене NTRK1, приводящую к экспрессии белка TrkA, содержащего мутацию в одном или нескольких (например, двух, трех, четырех, пяти, шести, семи, восьми, девяти, десяти, одиннадцати, двенадцати, тринадцати, четырнадцати или пятнадцати) положении(ях) аминокислот, выбранных из группы, состоящей из: 517, 542, 568, 573, 589, 595, 599, 600, 602, 646, 656, 657, 667 и 676 (например, одну или несколько замен из G517R, A542V, V573M, F589L, F589C, G595S, G595R, D596V, F600L, F646V, C656Y, C656F, L657V, G667S, G667C и Y676S), и/или (ii) по меньшей мере одну (например, две, три, четыре,

пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать или пятнадцать) точечную мутацию в гене NTRK2, приводящую к экспрессии белка TrkB, содержащего мутацию в одном или нескольких (например, двух, трех, четырех, пяти, шести, семи, восьми, девяти, десяти, одиннадцати, двенадцати, тринадцати, четырнадцати или пятнадцати) положениях аминокислот, выбранных из группы, состоящей из: 545, 570, 596, 601, 617, 623, 624, 628, 630, 672, 682, 683, 693 и 702 (например, одну или несколько замен из G545R, A570V, Q596E, Q596P, V601G, F617L, F617C, F617I, G623S, G623R, D624V, R630K, C682Y, C682F, L683V, G693S и G713S), и/или (iii) по меньшей мере одну (например, две, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать или пятнадцать) точечную мутацию в гене NTRK3, приводящую к экспрессии белка TrkC, содержащего мутацию в одном или нескольких (например, двух, трех, четырех, пяти, шести, семи, восьми, девяти, десяти, одиннадцати, двенадцати, тринадцати, четырнадцати или пятнадцати) положении(положениях) аминокислот, выбранных из группы, состоящей из: 545, 570, 596, 601, 617, 623, 624, 628, 630, 675, 685, 686, 696 и 705 (например, одну или несколько замен из G545R, A570V, F617L, G623R, D624V, C685Y, C685F, L686V и G696A), имеет устойчивую к ингибитору Trk злокачественную опухоль (например, по сравнению с субъектом, имеющим клетку, не имеющую (i) точечную мутацию в гене NTRK1, приводящую к экспрессии белка TrkA, содержащего мутацию в одном или нескольких положении(положениях) аминокислот, выбранных из группы, состоящей из: 517, 542, 568, 573, 589, 595, 599, 600, 602, 646, 656, 657, 667 и 676 (например, одну или несколько замен из G517R, A542V, V573M, F589L, F589C, G595S, G595R, D596V, F600L, F646V, C656Y, C656F, L657V, G667S, G667C и Y676S), или (ii) точечную мутацию в гене NTRK2, приводящую к экспрессии белка TrkB, содержащего мутацию в одном или нескольких (например, двух, трех, четырех, пяти, шести, семи, восьми, девяти, десяти, одиннадцати, двенадцати, тринадцати, четырнадцати или пятнадцати) положениях аминокислот, выбранных из группы, состоящей из: 545, 570, 596, 601, 617, 623, 624, 628, 630, 672, 682, 683, 693 и 702 (например, одну или несколько замен из G545R, A570V, Q596E, Q596P, V601G, F617L, F617C, F617I, G623S, G623R, D624V, R630K, C682Y, C682F, L683V, G693S, и G713S), или (iii) точечную мутацию в гене NTRK3, приводящую к экспрессии белка TrkC, содержащего мутацию в одном или нескольких (например, двух, трех, четырех, пяти, шести, семи, восьми, девяти, десяти, одиннадцати, двенадцати, тринадцати, четырнадцати или пятнадцати) положении(положениях) аминокислот, выбранных из группы, состоящей из: 545, 570, 596, 601, 617, 623, 624, 628, 630, 675, 685, 686, 696 и 705 (например, одну или несколько замен из G545R, A570V, F617L, G623R, D624V, C685Y, C685F, L686V и G696A)).

Некоторые варианты осуществления дополнительно включают подтверждение диагноза устойчивой к ингибитору Trk злокачественной опухоли у субъекта. Подтверждение диагноза устойчивой к ингибитору Trk злокачественной опухоли у субъекта может включать, например, проведение дополнительных лабораторных исследований (например, анализов мочи или крови, например, полного анализа крови), анализов визуализации (например, компьютерной томографии (СТ), остеосцинтиграфии, магнитно-резонансной томографии (MRI), сканирования с использованием позитронной эмиссионной томографии (PET), ультразвукового и рентгеновского исследования), и/или физического обследования, например, до и после проведения лечения с использованием ингибитора Trk в качестве монотерапии.

Некоторые способы дополнительно включают регистрацию в медицинской карте субъекта (например, на машиночитаемом носителе) того, что субъект имеет устойчивую

к ингибитору Trk злокачественную опухоль. Злокачественная опухоль может представлять собой любую из иллюстративных злокачественных опухолей, описанных в настоящем описании.

Некоторые примеры дополнительно включают проведение лечения, не включающего ингибитор Trk в качестве монотерапии (например, любого из способов лечения, не включающего ингибитор Trk в качестве монотерапии, описанный в настоящем описании). В некоторых примерах, лечение, не включающее ингибитор Trk в качестве монотерапии, включает одно или несколько из: хирургии (например, открытого хирургического вмешательства или минимально инвазивного хирургического вмешательства), радиотерапии (например, наружной дистанционной лучевой терапии или внутренней радиотерапии), химиотерапии (например, алкилирующего средства, антиметаболитов, средств, нарушающих функционирование микротрубочек, ингибиторов топоизомеразы и цитотоксических антибиотиков), иммунотерапии (например, адоптивного переноса клеток, цитокинов, вакцинации против злокачественных опухолей и бациллы Кальметта-Герена), гормонотерапии (например, лекарственного средства, блокирующего эстроген, лекарственного средства, уменьшающего уровень эстрогена, подобного прогестерону лекарственного средства или антиандрогенного лекарственного средства), низкомолекулярных лекарственных средств, нацеленных на другие киназы в пути передачи сигналов Trk, рекомбинантных антител (например, любого из иллюстративных рекомбинантных антител, описанных в настоящем описании, например, антител против NGF) и трансплантации стволовых клеток. В некоторых примерах, лечение, не включающее ингибитор Trk в качестве монотерапии, может представлять собой, например, лечение, включающее (i) одно или несколько из хирургии, радиотерапии, химиотерапии, иммунотерапии, гормонотерапии, низкомолекулярных лекарственных средств, нацеленных на другие киназы в пути передачи сигналов Trk, рекомбинантных антител и трансплантации стволовых клеток, и (ii) один или несколько ингибиторов Trk (например, любой из ингибиторов Trk, описанных в настоящем описании). В некоторых вариантах осуществления, лечение, не включающее ингибитор Trk в качестве монотерапии, может представлять собой, например, лечение, включающее два или более ингибитора Trk (например, любые из ингибиторов Trk, описанных в настоящем описании). Дополнительные примеры способов лечения, не включающего ингибитор Trk в качестве монотерапии, и доз и способов для его проведения, описаны в настоящем описании или известны в данной области.

В некоторых примерах, лечение, не включающее ингибитор Trk в качестве монотерапии, проводят самостоятельно. В других примерах, медицинский работник подвергает субъекта лечению, не включающему ингибитор Trk в качестве монотерапии. В некоторых примерах, субъект является госпитализированным. В других примерах, субъекта подвергают лечению, не включающему ингибитор Trk в качестве монотерапии, на амбулаторной основе.

В некоторых примерах, субъекта идентифицируют как подвергавшегося воздействию значительного уровня канцерогена(канцерогенов) (например, табачного дыма, излучения UVB и гамма-излучения). В некоторых примерах, у субъекта, как подозревают, имеющего злокачественную опухоль, присутствуют один или несколько симптомов злокачественной опухоли (например, любой из симптомов злокачественных опухолей, описанных в настоящем описании), и/или субъект имеет злокачественную опухоль в семейном анамнезе.

В некоторых примерах, стадия определения того, имеет ли клетка злокачественной опухоли в образце, полученном от субъекта, (i) по меньшей мере одну (например, две,

три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать или пятнадцать) точечную мутацию в гене NTRK1, приводящую к экспрессии белка TrkA, содержащего одну или несколько (например, две, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать или пятнадцать) мутаций (например, любую из мутаций в TrkA, описанных в настоящем описании) и/или (ii) по меньшей мере одну (например, две, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать или пятнадцать) точечную мутацию в гене NTRK2, приводящую к экспрессии белка TrkB, содержащего одну или несколько (например, две, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать или пятнадцать) мутаций (например, любую из мутаций в TrkB, описанных в настоящем описании), и/или (iii) по меньшей мере одну (например, две, три, четыре, пять, шесть или семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать или пятнадцать) точечную мутацию в гене NTRK3, приводящую к экспрессии белка TrkC, содержащего одну или несколько (например, две, три, четыре, пять, шесть или семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать или пятнадцать) мутаций (например, любую из мутаций в TrkC, описанных в настоящем описании), включает проведение анализа для определения присутствия по меньшей мере одной точечной мутации в гене NTRK1 и/или по меньшей мере одной точечной мутации в гене NTRK2 и/или по меньшей мере одной точечной мутации в гене NTRK3 в клетке злокачественной опухоли в образце (например, в образце биоптата) от субъекта. Любой из анализов, описанных в настоящем описании, можно использовать для определения присутствия по меньшей мере одной точечной мутации в гене NTRK1 и/или по меньшей мере одной точечной мутации в гене NTRK2, и/или по меньшей мере одной точечной мутации в гене NTRK3. Кроме того, любой из наборов, представленных в настоящем описании, можно использовать в анализе для определения присутствия по меньшей мере одной точечной мутации в гене NTRK1 и/или по меньшей мере одной точечной мутации в гене NTRK2, и/или по меньшей мере одной точечной мутации в гене NTRK3. В некоторых примерах, анализ включает секвенирование фрагмента гена NTRK1, содержащего по меньшей мере одну точечную мутацию, и/или фрагмента гена NTRK2, содержащего по меньшей мере одну точечную мутацию, и/или фрагмента гена NTRK3, содержащего по меньшей мере одну точечную мутацию.

Способы выбора субъекта, имеющего злокачественную опухоль, для участия в клиническом исследовании

Настоящее изобретение относится также к способам выбора субъекта, имеющего злокачественную опухоль, для участия в клиническом исследовании, включающем проведение лечения злокачественной опухоли, включающим (а) определение того, имеет ли клетка злокачественной опухоли в образце, полученном от субъекта, (i) по меньшей мере одну (например, две, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать или пятнадцать) точечную мутацию в гене NTRK1, приводящую к экспрессии белка TrkA, содержащего мутацию в одном или нескольких (например, двух, трех, четырех, пяти, шести, семи, восьми, девяти, десяти, одиннадцати, двенадцати, тринадцати, четырнадцати или пятнадцати) положении(положениях) аминокислот, выбранных из группы, состоящей из: 517, 542, 568, 573, 589, 595, 599, 600, 602, 646, 656, 657, 667 и 676 (например, одну или несколько замен из G517R, A542V, V573M, F589L, F589C, G595S, G595R, D596V, F600L, F646V, C656Y, C656F, L657V, G667S, G667C и Y676S) и/или (ii) по меньшей мере одну (например, две, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать,

тринадцать, четырнадцать или пятнадцать) точечную мутацию в гене NTRK2, приводящую к экспрессии белка TrkB, содержащего мутацию в одном или нескольких (например, двух, трех, четырех, пяти, шести, семи, восьми, девяти, десяти, одиннадцати, двенадцати, тринадцати, четырнадцати или пятнадцати) положениях аминокислот, выбранных из группы, состоящей из: 545, 570, 596, 601, 617, 623, 624, 628, 630, 672, 682, 683, 693 и 702 (например, одну или несколько замен из G545R, A570V, Q596E, Q596P, V601G, F617L, F617C, F617I, G623S, G623R, D624V, R630K, C682Y, C682F, L683V, G693S, и G713S), и/или (iii) по меньшей мере одну (например, две, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать или пятнадцать) точечную мутацию в гене NTRK3, приводящую к экспрессии белка TrkC, содержащего мутацию в одном или нескольких (например, двух, трех, четырех, пяти, шести, семи, восьми, девяти, десяти, одиннадцати, двенадцати, тринадцати, четырнадцати или пятнадцати) положении(положениях) аминокислот, выбранных из группы, состоящей из: 545, 570, 596, 601, 617, 623, 624, 628, 630, 675, 685, 686, 696 и 705 (например, одну или несколько замен из G545R, A570V, F617L, G623R, D624V, C685Y, C685F, L686V, и G696A); и (b) выбор субъекта, имеющего клетку злокачественной опухоли, имеющую (i) по меньшей мере одну (например, две, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать или пятнадцать) точечную мутацию в гене NTRK1, приводящую к экспрессии белка TrkA, содержащего мутацию в одном или нескольких (например, двух, трех, четырех, пяти, шести, семи, восьми, девяти, десяти, одиннадцати, двенадцати, тринадцати, четырнадцати или пятнадцати) положении(положениях) аминокислот, выбранных из группы, состоящей из: 517, 542, 568, 573, 589, 595, 599, 600, 602, 646, 656, 657, 667 и 676 (например, одну или несколько замен из G517R, A542V, V573M, F589L, F589C, G595S, G595R, D596V, F600L, F646V, C656Y, C656F, L657V, G667S, G667C, и Y676S), и/или (ii) по меньшей мере одну (например, две, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать или пятнадцать) точечную мутацию в гене NTRK2, приводящую к экспрессии белка TrkB, содержащего мутацию в одном или нескольких (например, двух, трех, четырех, пяти, шести, семи, восьми, девяти, десяти, одиннадцати, двенадцати, тринадцати, четырнадцати или пятнадцати) положениях аминокислот, выбранных из группы, состоящей из: 545, 570, 596, 601, 617, 623, 624, 628, 630, 672, 682, 683, 693 и 702 (например, одну или несколько замен из G545R, A570V, Q596E, Q596P, V601G, F617L, F617C, F617I, G623S, G623R, D624V, R630K, C682Y, C682F, L683V, G693S, и G713S), и/или (iii) по меньшей мере одну (например, две, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать или пятнадцать) точечную мутацию в гене NTRK3, приводящую к экспрессии белка TrkC, содержащего мутацию в одном или нескольких (например, двух, трех, четырех, пяти, шести, семи, восьми, девяти, десяти, одиннадцати, двенадцати, тринадцати, четырнадцати или пятнадцати) положении(положениях) аминокислот, выбранных из группы, состоящей из: 545, 570, 596, 601, 617, 623, 624, 628, 630, 675, 685, 686, 696 и 705 (например, одну или несколько замен из G545R, A570V, F617L, G623R, D624V, C685Y, C685F, L686V и G696A), для участия в клиническом исследовании, включающем проведение лечения злокачественной опухоли.

Настоящее изобретение относится также к способам выбора субъекта, имеющего злокачественную опухоль, для участия в клиническом исследовании, включающем введение ингибитора Trk, включающим (a) определение того, имеет ли клетка злокачественной опухоли в образце, полученном от субъекта, (i) по меньшей мере одну (например, две, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать,

двенадцать, тринадцать, четырнадцать или пятнадцать) точечную мутацию в гене NTRK1, приводящую к экспрессии белка TrkA, содержащего мутацию в одном или нескольких (например, двух, трех, четырех, пяти, шести, семи, восьми, девяти, десяти, одиннадцати, двенадцати, тринадцати, четырнадцати или пятнадцати) положениях (положениях) аминокислот, выбранных из группы, состоящей из: 517, 542, 568, 573, 589, 595, 599, 600, 602, 646, 656, 657, 667 и 676 (например, одну или несколько замен из G517R, A542V, V573M, F589L, F589C, G595S, G595R, D596V, F600L, F646V, C656Y, C656F, L657V, G667S, G667C и Y676S), и/или (ii) по меньшей мере одну (например, две, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать или пятнадцать) точечную мутацию в гене NTRK2, приводящей к экспрессии белка TrkB, содержащего мутацию в одном или нескольких (например, двух, трех, четырех, пяти, шести, семи, восьми, девяти, десяти, одиннадцати, двенадцати, тринадцати, четырнадцати или пятнадцати) положениях аминокислот, выбранных из группы, состоящей из: 545, 570, 596, 601, 617, 623, 624, 628, 630, 672, 682, 683, 693 и 702 (например, одну или несколько замен из G545R, A570V, Q596E, Q596P, V601G, F617L, F617C, F617I, G623S, G623R, D624V, R630K, C682Y, C682F, L683V, G693S и G713S), и/или (iii) по меньшей мере одну (например, две, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать или пятнадцать) точечную мутацию в гене NTRK3, приводящую к экспрессии белка TrkC, содержащего мутацию в одном или нескольких (например, двух, трех, четырех, пяти, шести, семи, восьми, девяти, десяти, одиннадцати, двенадцати, тринадцати, четырнадцати или пятнадцати) положениях(положениях) аминокислот, выбранных из группы, состоящей из: 545, 570, 596, 601, 617, 623, 624, 628, 630, 675, 685, 686, 696 и 705 (например, одну или несколько замен из G545R, A570V, F617L, G623R, D624V, C685Y, C685F, L686V и G696A); и (b) выбор субъекта, имеющего клетку злокачественной опухоли, не имеющую (i) точечную мутацию в гене NTRK1, приводящую к экспрессии белка TrkA, содержащего мутацию в одном или нескольких (например, двух, трех, четырех, пяти, шести, семи, восьми, девяти, десяти, одиннадцати, двенадцати, тринадцати, четырнадцати или пятнадцати) положениях(положениях) аминокислот, выбранных из группы, состоящей из: 517, 542, 568, 573, 589, 595, 599, 600, 602, 646, 656, 657, 667 и 676 (например, одну или несколько замен из G517R, A542V, V573M, F589L, F589C, G595S, G595R, D596V, F600L, F646V, C656Y, C656F, L657V, G667S, G667C и Y676S), и/или (ii) точечную мутацию в гене NTRK2, приводящую к экспрессии белка TrkB, содержащего мутацию в одном или нескольких (например, двух, трех, четырех, пяти, шести, семи, восьми, девяти, десяти, одиннадцати, двенадцати, тринадцати, четырнадцати или пятнадцати) положениях аминокислот, выбранных из группы, состоящей из: 545, 570, 596, 601, 617, 623, 624, 628, 630, 672, 682, 683, 693 и 702 (например, одну или несколько замен из G545R, A570V, Q596E, Q596P, V601G, F617L, F617C, F617I, G623S, G623R, D624V, R630K, C682Y, C682F, L683V, G693S и G713S), и/или (iii) точечную мутацию в гене NTRK3, приводящую к экспрессии белка TrkC, содержащего мутацию в одном или нескольких (например, двух, трех, четырех, пяти, шести, семи, восьми, девяти, десяти, одиннадцати, двенадцати, тринадцати, четырнадцати или пятнадцати) положениях(положениях) аминокислот, выбранных из группы, состоящей из: 545, 570, 596, 601, 617, 623, 624, 628, 630, 675, 685, 686, 696 и 705 (например, одну или несколько замен из G545R, A570V, F617L, G623R, D624V, C685Y, C685F, L686V и G696A), для участия в клиническом исследовании, включающем введение ингибитора Trk.

Злокачественная опухоль может представлять собой любую из иллюстративных злокачественных опухолей, описанных в настоящем описании. В некоторых вариантах

осуществления, субъекта ранее идентифицировали или диагностировали как имеющего злокачественную опухоль. В некоторых примерах, субъекта ранее подвергали лечению злокачественной опухоли, и лечение злокачественной опухоли не было успешным (например, присутствовала высокая токсичность для субъекта или отсутствовал

положительный ответ на проводимое ранее лечение злокачественной опухоли).

В некоторых примерах, стадия определения того, имеет ли клетка злокачественной опухоли в образце, полученном от субъекта, по меньшей мере одну точечную мутацию (например, любую из точечных мутаций, описанных в настоящем описании) в гене NTRK1, приводящую к экспрессии TrkA, содержащего мутацию в одном или нескольких

положении(положениях) аминокислот и/или по меньшей мере одну точечную мутацию (например, любую из точечных мутаций, описанных в настоящем описании) в гене NTRK2, приводящую к экспрессии TrkB, содержащего мутацию в одном или нескольких

положении(положениях) аминокислот, и/или по меньшей мере одну точечную мутацию (например, любую из точечных мутаций, описанных в настоящем описании) в гене NTRK3, приводящую к экспрессии TrkC, содержащего мутацию в одном или нескольких

положении(положениях) аминокислот, включает проведение анализа для определения присутствия по меньшей мере одной точечной мутации в гене NTRK1 и/или по меньшей мере одной точечной мутации в гене NTRK2, и/или по меньшей мере одной точечной мутации в гене NTRK3 в клетке злокачественной опухоли в образце (например, образце биоптата) от субъекта. Любой из анализов, описанных в настоящем описании, можно использовать для определения присутствия по меньшей мере одной точечной мутации в гене NTRK1 и/или по меньшей мере одной точечной мутации в гене NTRK2, и/или по меньшей мере одной точечной мутации в гене NTRK3. Кроме того, любой из наборов, представленных в настоящем описании, можно использовать в анализе для определения

присутствия по меньшей мере одной точечной мутации в гене NTRK1 и/или по меньшей мере одной точечной мутации в гене NTRK2, и/или по меньшей мере одной точечной мутации в гене NTRK3. В некоторых примерах, анализ включает секвенирование фрагмента NTRK1, содержащего по меньшей мере одну точечную мутацию, и/или фрагмента NTRK2, содержащего по меньшей мере одну точечную мутацию, и/или фрагмента NTRK3, содержащего по меньшей мере одну точечную мутацию.

Наборы

Настоящее изобретение относится также к наборам, содержащим один или несколько (например, два, три, четыре, пять, шесть или семь) зондов, специфически гибридизующихся с фрагментом гена NTRK1, содержащим одну из точечных мутаций, описанных в настоящем описании (например, любую точечную мутацию, приводящую к аминокислотной замене в положении аминокислоты 517, 542, 568, 573, 589, 595, 599, 600, 602, 646, 656, 657, 667 и 676 в TrkA); и/или один или несколько (например, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать или пятнадцать) зондов, специфически гибридизующихся с фрагментом

гена NTRK2, содержащим одну из точечных мутаций, описанных в настоящем описании (например, любую точечную мутацию, приводящую к аминокислотной замене в положении аминокислоты 545, 570, 596, 601, 617, 623, 624, 628, 630, 672, 682, 683, 693, 702, или 713; и/или один или несколько (например, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать или пятнадцать) зондов, специфически гибридизующихся с фрагментом гена NTRK3, содержащим одну из точечных мутаций, описанных в настоящем описании (например, любую точечную мутацию, приводящую к аминокислотной замене в положении аминокислоты 545, 570, 596, 601, 617, 623, 624, 628, 630, 675, 685, 686, 696, 705 или 730 в

TrkC). Например, наборы, представленные в настоящем описании, могут включать один или несколько зондов, специфически гибридизующихся с фрагментом гена NTRK1, кодирующим мутацию, выбранную из группы, состоящей из: G517R, A542V, V573M, F589L, F589C, G595S, G595R, D596V, F600L, F646V, C656Y, C656F, L657V, G667S, G667C и Y676S в белке TrkA); и/или один или несколько зондов, специфически гибридизующихся с фрагментом гена NTRK2, кодирующим мутацию, выбранную из группы, состоящей из: G545R, A570V, Q596E, Q596P, V601G, F617L, F617C, F617I, G623S, G623R, D624V, R630K, C682Y, C682F, L683V, G693S и G713S; и/или один или несколько зондов, специфически гибридизующихся с фрагментом гена NTRK3, кодирующим мутацию, выбранную из группы, состоящей из: G545R, A570V, F617L, G623R, D624V, C685Y, C685F, L686V и G696A.

Каждый из одного или нескольких зондов может иметь длину 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 или 35 нуклеотидов. В некоторых вариантах осуществления, один или несколько зондов содержат поддающуюся детекции метку (например, флуорофор, гаситель, радиоактивный изотоп или металл). В некоторых вариантах осуществления, один или нескольких зондов могут являться ковалентно присоединенными к субстрату (например, пленке, планшету или бусине).

Изобретение далее описано в следующих примерах, которые не ограничивают объем изобретения, описанный в формуле изобретения.

ПРИМЕРЫ

Пример 1. Идентификация придающих устойчивость к ингибитору Trk точечных мутаций

Проводили генетический скрининг для определения того, возникают ли придающие устойчивость мутации у субъектов с злокачественными опухолями, имеющих NTRK⁺ опухоли, подвергнутых лечению с использованием ингибиторов Trk. При генетическом скрининге кДНК, несущие онкоген MPRIP-NTRK1, вводили в клетки Ba/F3. Клетки Ba/F3 обрабатывали мутагеном, 100 мкг/мл N-этил-N-нитрозомочевина (ENU; Sigma Aldrich, St. Louis, MO), в течение ночи. Обработанные ENU клетки Ba/F3 рассеивали в 96-луночные планшеты в среде, дополненной различными концентрациями сульфата (S)-N-(5-((R)-2-(2,5-дифторфенил)пирролидин-1-ил)пиразоло[1,5-a]пиримидин-3-ил)-3-гидроксипирролидин-1-карбоксамида (25 нМ, 50 нМ, 100 нМ, 250 нМ, 500 нМ или 1 мкМ). В лунках наблюдали изменение окраски среды и рост клеток. Содержимое лунок с разрастанием размножали в 12-луночных планшетах в среде, дополненной сульфатом (S)-N-(5-((R)-2-(2,5-дифторфенил)пирролидин-1-ил)пиразоло[1,5-a]пиримидин-3-ил)-3-гидроксипирролидин-1-карбоксамида в такой же концентрации, как в исходном 96-луночном планшете. При конфлюэнтности, клетки собирали и выделяли геномную ДНК. Область киназы NTRK1 амплифицировали, и продукты ПЦР очищали и секвенировали. Плазмиды, кодирующие мутации MPRIP-NTRK1, получали с использованием сайт-направленного мутагенеза QuickChange в соответствии с инструкциями производителя, с использованием последовательности, кодирующей слитый белок MPRIP-NTRK1, в качестве матрицы. Каждую мутацию подтверждали посредством секвенирования ДНК. Клетки Ba/F3 и клетки NIH353, экспрессирующие мутанты MPRIP-NTRK1, получали посредством инфекции исходных клеток Ba/F3 и NIH353 лентивирусом, кодирующим мутантные слитые белки MPRIP-NTRK1, с последующим отбором с использованием пурамицина. Блок-схема, показывающая стадии экспериментальных способов, показана на фигуре 1.

Идентифицированные придающие устойчивость к сульфату (S)-N-(5-((R)-2-(2,5-

дифторфенил)пирролидин-1-ил)пиразоло[1,5-а]пиримидин-3-ил)-3-гидроксипирролидин-1-карбоксамида точечные мутации приводили к следующим аминокислотным заменам в TrkA: V573M, F589L, F600L, G667S и Y676S. Локализация трех замен в TrkA, возникающих в результате придающих устойчивость к сульфату (S)-N-(5-((R)-2-(2,5-дифторфенил)пирролидин-1-ил)пиразоло[1,5-а]пиримидин-3-ил)-3-гидроксипирролидин-1-карбоксамида точечных мутаций, картирована на кристаллической структуре TrkA: V573, F589 и G667 (Фигура 2) и схеме доменной структуры TrkA (Фигура 3). Клетки злокачественных опухолей, имеющие точечную мутацию MPRIP-NTRK1, имеют увеличенную устойчивость к сульфату (S)-N-(5-((R)-2-(2,5-дифторфенил)пирролидин-1-ил)пиразоло[1,5-а]пиримидин-3-ил)-3-гидроксипирролидин-1-карбоксамида (Фигура 4).

Эти эксперименты показывают, что присутствие одной или нескольких из замен V573M, F589L, F600L, G667S и Y676S в TrkA (или одной или нескольких из соответствующих точечных мутаций в гене NTRK1) в клетке злокачественной опухоли можно использовать для прогнозирования устойчивости клетки злокачественной опухоли к сульфату (S)-N-(5-((R)-2-(2,5-дифторфенил)пирролидин-1-ил)пиразоло[1,5-а]пиримидин-3-ил)-3-гидроксипирролидин-1-карбоксамида и другим ингибиторам Trk, и показывают, что клетка злокачественной опухоли не является чувствительной к лечению с использованием сульфата (S)-N-(5-((R)-2-(2,5-дифторфенил)пирролидин-1-ил)пиразоло[1,5-а]пиримидин-3-ил)-3-гидроксипирролидин-1-карбоксамида и других ингибиторов Trk.

Пример 2. Идентификация придающих устойчивость к ингибитору Trk точечных мутаций

Подвергнутые воздействию N-этил-N-нитрозомочевина (ENU)-клетки Ba/F3-MPRIP-NTRK1 и Ba/F3-TRIM24-NTRK2 использовали для получения мутаций, позволяющих рост клеток Ba/F3 в отсутствие IL-3 несмотря на присутствие 100, 250, или 500 нМ сульфата (S)-N-(5-((R)-2-(2,5-дифторфенил)пирролидин-1-ил)пиразоло[1,5-а]пиримидин-3-ил)-3-гидроксипирролидин-1-карбоксамида. Мутации, идентифицированные посредством секвенирования геномной ДНК в первоначальном скрининге, подтверждали посредством клонирования несущих мутации кДНК обратно в клетки Ba/F3 для оценки их чувствительности к сульфату (S)-N-(5-((R)-2-(2,5-дифторфенил)пирролидин-1-ил)пиразоло[1,5-а]пиримидин-3-ил)-3-гидроксипирролидин-1-карбоксамиду с использованием как анализов пролиферации, так и анализов фосфорилирования TRK посредством иммуноблоттинга. Моделирование мутаций проводили посредством картирования аминокислотных замен на кристаллической структуре связанного с лекарственным средством киназного домена TRK.

Идентифицированы мутации в 6 положениях аминокислот в белке TRKA и в 3 положениях аминокислот в белке TRKB, индуцирующие устойчивость к сульфату (S)-N-(5-((R)-2-(2,5-дифторфенил)пирролидин-1-ил)пиразоло[1,5-а]пиримидин-3-ил)-3-гидроксипирролидин-1-карбоксамида. В киназном домене TRKA идентифицированы придающие устойчивость к сульфату (S)-N-(5-((R)-2-(2,5-дифторфенил)пирролидин-1-ил)пиразоло[1,5-а]пиримидин-3-ил)-3-гидроксипирролидин-1-карбоксамида мутации V573M и F589L/C, G595S, F600L, F646V и G667S. В киназном домене TRKB идентифицированы придающие устойчивость к сульфату (S)-N-(5-((R)-2-(2,5-дифторфенил)пирролидин-1-ил)пиразоло[1,5-а]пиримидин-3-ил)-3-гидроксипирролидин-1-карбоксамида мутации Q596E/P, F617L/C/I и G623S. Эти TRK мутации уменьшают ингибирование мишени сульфатом (S)-N-(5-((R)-2-(2,5-дифторфенил)пирролидин-1-ил)пиразоло[1,5-а]пиримидин-3-ил)-3-гидроксипирролидин-1-карбоксамида, как измерено

посредством фосфорилирования тирозина TRK и полученной в результате передачи сигналов посредством MAPK или других критических путей.

Пример 3. Идентификация мутаций в киназном домене TRKA и TRKB, индуцирующих устойчивость к ингибитору пан-TRK

Осуществляли способы мутагенеза и генетического скрининга для идентификации мутаций-кандидатов в TRKA и TRKB, опосредующих устойчивость к сульфату (S)-N-(5-((R)-2-(2,5-дифторфенил)пирролидин-1-ил)пиразоло[1,5-А]пиримидин-3-ил)-3-гидроксипирролидин-1-карбоксамид. Блок-схема, показывающая стадии экспериментальных способов, показана на фигуре 5.

Клетки Ba/F3, стабильно экспрессирующие *MPRIP-NTRK1* или *TRIM24-NTRK2*, обрабатывали в течение ночи 100 мкг/мл N-этил-N-нитрозомочевины (ENU), осаждали, ресуспендировали в свежей среде и распределяли в 96-луночные планшеты в 200 мкл среды, дополненной сульфатом (S)-N-(5-((R)-2-(2,5-дифторфенил)пирролидин-1-ил)пиразоло[1,5-А]пиримидин-3-ил)-3-гидроксипирролидин-1-карбоксамид (100, 250 и 500 нМ). В лунках наблюдали изменение окраски среды и рост клеток. Содержимое лунок с разрастанием размножали в 12-луночных планшетах в среде, дополненной сульфатом (S)-N-(5-((R)-2-(2,5-дифторфенил)пирролидин-1-ил)пиразоло[1,5-А]пиримидин-3-ил)-3-гидроксипирролидин-1-карбоксамид в такой же концентрации, как в исходном 96-луночном планшете. При конфлюэнтности, клетки собирали и выделяли геномную ДНК. Область киназы *NTRK1* и *NTRK2* амплифицировали посредством ПЦР и секвенировали. Плазмиды, кодирующие мутации *MPRIP-NTRK1* и *TRIM24-NTRK2*, получали с использованием сайт-направленного мутагенеза QuickChange и подтверждали посредством секвенирования ДНК. Клетки Ba/F3 и клетки NIH3T3, экспрессирующие мутанты *MPRIP-NTRK1*, получали посредством инфекции исходных клеток Ba/F3 и NIH3T3 лентивирусом, кодирующим мутантный *MPRIP-NTRK1*, с последующим отбором с использованием пурамицина.

Идентифицированные придающие устойчивость к сульфату (S)-N-(5-((R)-2-(2,5-дифторфенил)пирролидин-1-ил)пиразоло[1,5-а]пиримидин-3-ил)-3-гидроксипирролидин-1-карбоксамид точечные мутации приводили к следующим аминокислотным заменам в RIP-TrkA: V573M, F589L, F589C, G595R, F600L, F646V, G667S и Y676S (Фигура 6A). Локализация выбранных замен в TrkA, возникающих в результате придающих устойчивость к сульфату (S)-N-(5-((R)-2-(2,5-дифторфенил)пирролидин-1-ил)пиразоло[1,5-а]пиримидин-3-ил)-3-гидроксипирролидин-1-карбоксамид точечных мутаций, картирована на схеме доменной структуры TrkA (Фигура 6B) и кристаллической структуры TrkA (Фигура 6C). Клетки злокачественных опухолей, имеющие точечную мутацию *MPRIP-NTRK1*, приводящую к аминокислотным заменам V573M, F589L и G667S, имеют увеличенную устойчивость к сульфату (S)-N-(5-((R)-2-(2,5-дифторфенил)пирролидин-1-ил)пиразоло[1,5-а]пиримидин-3-ил)-3-гидроксипирролидин-1-карбоксамид (Фигура 7). TRKA и нижестоящая передача сигналов не ингибированы в клетках NIH3T3, экспрессирующих эти мутации в киназном домене TRKA: активация TRKA и ERK1/2 является чувствительной к ингибированию сульфатом (S)-N-(5-((R)-2-(2,5-дифторфенил)пирролидин-1-ил)пиразоло[1,5-А]пиримидин-3-ил)-3-гидроксипирролидин-1-карбоксамид в клетках NIH3T3, экспрессирующих слитый белок *MPRIP-NTRK1*^[WT], в то время как клетки NIH3T3, экспрессирующие слитые белки *MPRIP-NTRK1*^[V573M], *MPRIP-NTRK1*^[F589L] или *MPRIP-NTRK1*^[G667S], являются устойчивыми (Фигура 8).

Идентифицированные придающие устойчивость к сульфату (S)-N-(5-((R)-2-(2,5-дифторфенил)пирролидин-1-ил)пиразоло[1,5-а]пиримидин-3-ил)-3-гидроксипирролидин-

1-карбоксамиды точечные мутации приводили к следующим аминокислотным заменам в TRIM24-TrkB: Q596E, Q596P, V601G, F617C, F617I, F617L, G623S, R630K и G713S (Фигура 9А). Локализация выбранных замен в TrkB, возникающих в результате придающих устойчивость к сульфату (S)-N-(5-((R)-2-(2,5-дифторфенил)пирролидин-1-ил)пиразоло[1,5-а]пиримидин-3-ил)-3-гидроксипирролидин-1-карбоксамиды точечных мутаций, картирована на схеме доменной структуры TrkB (Фигура 9В) и кристаллической структуры TrkB (Фигура 9С). Клетки злокачественных опухолей, имеющие точечную мутацию TRIM24-NTRK2, приводящую к аминокислотным заменам V601G, G623S и R630K, имеют увеличенную устойчивость к сульфату (S)-N-(5-((R)-2-(2,5-дифторфенил)пирролидин-1-ил)пиразоло[1,5-а]пиримидин-3-ил)-3-гидроксипирролидин-1-карбоксамид (Фигура 10). TRKB и нижестоящая передача сигналов не ингибированы в клетках NIH3T3, экспрессирующих эти мутации в киназном домене TRKB: активация TRKB и ERK1/2 является чувствительной к ингибированию сульфатом (S)-N-(5-((R)-2-(2,5-дифторфенил)пирролидин-1-ил)пиразоло[1,5-А]пиримидин-3-ил)-3-гидроксипирролидин-1-карбоксамид в клетках NIH3T3, экспрессирующих слитый белок *TRIM24-NTRK2*^[WT], в то время как клетки NIH3T3, экспрессирующие слитые белки *TRIM24-NTRK2*^[V601G], *TRIM24-NTRK2*^[G623S] или *TRIM24-NTRK2*^[R630K], являются устойчивыми. (Фигура 11).

На фигуре 12 показана IC₅₀ для конкретных идентифицированных клонов Ba/F3, устойчивых к сульфату (S)-N-(5-((R)-2-(2,5-дифторфенил)пирролидин-1-ил)пиразоло[1,5-А]пиримидин-3-ил)-3-гидроксипирролидин-1-карбоксамид. Значения IC₅₀ для показанных мутаций определяли по среднему из 3 экспериментов. Клоны расположены в порядке консервативных аминокислотных остатков между TRKA и TRKB.

Выравнивание киназных доменов из избранных онкогенов с известными придающими устойчивость мутациями показано на фигуре 13.








Новые мутации в киназном домене TRKA онкогена MPRIP-NTRK1 и в киназном домене TRKB TRIM24-NTRK2 идентифицированы с использованием комбинированного мутагенеза/генетического скрининга. Все идентифицированные мутации придают устойчивость к ингибитору пан-TRK сульфату (S)-N-(5-((R)-2-(2,5-дифторфенил)пирролидин-1-ил)пиразоло[1,5-А]пиримидин-3-ил)-3-гидроксипирролидин-1-карбоксамиду, как оценено посредством анализов пролиферации клеток и измерения передачи сигналов в клетках. Большинство мутаций кластеризуются позади связывающего АТФ/лекарственное средство кармана, возможно, функционируя посредством изменения топологии этого кармана, таким образом, ингибирования связывания сульфата (S)-N-(5-((R)-2-(2,5-дифторфенил)пирролидин-1-ил)пиразоло[1,5-А]пиримидин-3-ил)-3-гидроксипирролидин-1-карбоксамид. Оценка в ДНК опухолей или в циркулирующей свободной ДНК при прогрессировании заболевания этих и других придающих устойчивость мутаций позволяет использование структурно отличных ингибиторов TRK для преодоления устойчивости к лекарственному средству.








Пример 4. Анализ фермента Trk








Активность Trk для различных соединений, проиллюстрированных в таблице 6, определяли посредством мониторинга включения [³³P]PO₄ из [³³P]АТФ в поли-EAY (Sigma-Aldrich, P3899).








Таблица 6. Соединения, тестированные в анализе фермента Trk

№.соединения	Структура соединения	Наименование соединения
--------------	----------------------	-------------------------

5	1		(R)-N-(6-(2-(2,5-дифторфенил)пирролидин-1-ил)имидазо[1,2-b]пиридазин-3-ил)-3-гидроксиазетидин-1-карбоксамид
10	2		(R)-3-(6-(2-(2,5-дифторфенил)пирролидин-1-ил)имидазо[1,2-b]пиридазин-3-ил)-1,1-диметилмочевина
15	3		(R)-1-(6-(2-(2,5-дифторфенил)пирролидин-1-ил)имидазо[1,2-b]пиридазин-3-ил)мочевина
20	4		(R)-1-(6-(2-(2,5-дифторфенил)пирролидин-1-ил)имидазо[1,2-b]пиридазин-3-ил)-3-метилмочевина
25	5		(R)-N-(5-(2-(2,5-дифторфенил)пирролидин-1-ил)пиразоло[1,5-a]пиримидин-3-ил)-3-гидроксиазетидин-1-карбоксамид
30	6		(R)-3-(6-(2-(2,5-дифторфенил)пирролидин-1-ил)имидазо[1,2-b]пиридазин-3-ил)-1-(2-гидроксиэтил)-1-метилмочевина
35	7		(R)-N-(6-(2-(2,5-дифторфенил)пирролидин-1-ил)имидазо[1,2-b]пиридазин-3-ил)-3-гидрокси-3-метилазетидин-1-карбоксамид

5	8		(R)-3-(5-(2-(2,5-дифторфенил)пирролидин-1-ил)пиазоло[1,5-а]пиримидин-3-ил)-1,1-диметилмочевина
10	9		(R)-N-(5-(2-(2-хлор-5-фторфенил)пирролидин-1-ил)пиазоло[1,5-а]пиримидин-3-ил)-3-гидроксиазетидин-1-карбоксамид
15	10		(R)-N-(5-(2-(2-хлор-5-фторфенил)пирролидин-1-ил)пиазоло[1,5-а]пиримидин-3-ил)-3-гидрокси-3-метилазетидин-1-карбоксамид
20	11		(R)-N-(5-(2-(3-фторфенил)пирролидин-1-ил)пиазоло[1,5-а]пиримидин-3-ил)-3-гидроксиазетидин-1-карбоксамид
25	12		(R)-5-(2-(2,5-дифторфенил)пирролидин-1-ил)пиазоло[1,5-а]пиримидин-3-карбоксамид
30	13		(R)-N-циклопропил-5-(2-(5-фторпиридин-3-ил)пирролидин-1-ил)пиазоло[1,5-а]пиримидин-3-карбоксамид
35	14		(R)-5-(2-(5-фтор-2-метоксипиридин-3-ил)пирролидин-1-ил)-N-метоксипиазоло[1,5-а]пиримидин-3-карбоксамид
40			
45			

5	15		(R)-5-(2-(5-фторпиридин-3-ил)пирролидин-1-ил)-N-(1-метилциклопропил)пиразоло[1,5-а]пиримидин-3-карбоксамид
10	16		(6R)-9-фтор-13-окса-2,11,17,21,22,25-гексаазапентацикло [17.5.2.0 ^{2,6} .0 ^{7,12} .0 ^{22,26}]-гексакоза-1(25),7,9,11,19(26),20,23-гептен-18-он
15	17		(6R,15R)-9-фтор-15-гидрокси-13-окса-2,11,17,21,22,25-гексаазапентацикло-[17.5.2.0 ^{2,6} .0 ^{7,12} .0 ^{22,26}]-гексакоза-1(25),7,9,11,19(26),20,23-гептен-18-он
20	18		(6R)-9-фтор-13-окса-2,11,18,22,23,26-гексаазапентацикло [18.5.2.0 ^{2,6} .0 ^{7,12} .0 ^{23,27}]-гептакоза-1(26),7,9,11,20(27),21,24-гептен-19-он
25	19		(6R)-9-фтор-13-окса-2,17,21,22,25-пентаазапентацикло [17.5.2.0 ^{2,6} .0 ^{7,12} .0 ^{22,26}]-гексакоза-1(25),7,9,11,19(26),20,23-гептен-18-он
30	20		(6R)-12-окса-2,16,20,21,24,26-гексаазапентацикло[16.5.2. ^{17,11} .0 ^{2,6} .0 ^{21,25}]-гексакоза-1(24),7(26),8,10,18(25),19,22-гептен-17-он
35	21		1-[(6R)-9-фтор-13-окса-2,16,20,21,24-пентаазапентацикло [16.5.2.0 ^{2,6} .0 ^{7,12} .0 ^{21,25}]-пентакоза-1(24),7,9,11,18(25),19,22-гептен-16-ил]этан-1-он
40			
45			

5	22		(6R)-9-фтор-13,16-диокса-2,11,20,21,24-пентаазапентацикло [16.5.2.0 ^{2,6} .0 ^{7,12} .0 ^{21,25}]-пентакоза-1(24),7,9,11,18(25),19,22-гептен-17- он
10	23		(6R)-9,15,15-трифтор-13-окса-2,11,17,21,22,25-гексаазапентацикло [17.5.2.0 ^{2,6} .0 ^{7,12} .0 ^{22,26}]-гексакоза-1(25),7,9,11,19(26),20,23-гептен-18-он
15	24		(6R,13S)-9-фтор-13-метил-2,11,15,19,20,23-гексаазапентацикло [15.5.2.17,11.0 ^{2,6} .0 ^{20,24}]-пентакоза-1(23),7,9,17(24),18,21-гексен-16,25-дион
20	25		(6R)-9-фтор-15,15-диметил-13-окса-2,11,17,21,22,25-гексаазапентацикло [17.5.2.0 ^{2,6} .0 ^{7,12} .0 ^{22,26}]-гексакоза-1(25),7,9,11,19(26),20,23-гептен-18-он
25	26		(15S)-4,4,9-трифтор-15-гидрокси-13-окса-2,17,21,22,25-пентаазапента- цикло[17.5.2.0 ^{2,6} .0 ^{7,12} .0 ^{22,26}]-гексакоза-1(25),7(12),8,10,19(26),20,23- гептен-18-он
30	27		(6R,15S)-9-фтор-15-метил-2,11,16,20,21,24-гексаазапентацикло [16.5.2.02,6.07,12.021,25]-пентакоза-1(24),7,9,11,18(25),19,22-гептен-17- он
35	28		(6R,15R)-9-фтор-15-метил-2,11,16,20,21,24-гексаазапентацикло [16.5.2.0 ^{2,6} .0 ^{7,12} .0 ^{21,25}]-пентакоза-1(24),7,9,11,18(25),19,22-гептен-17-он
40			

Анализы проводили в 96-луночных полипропиленовых планшетах для
микротитрования с v-образным дном (Corning, Costar® 3363) в общем объеме 50 мкл.
Реакционные смеси, как правило, содержали 25 мМ Na⁺MOPS, pH 7,4, 5 мМ MgCl₂,
0,005% Тритон X-100, 2% DMSO, 1 мМ DTT, 5 мкМ [³³P]АТФ (50 мкКи/мл (1,85 МБк/
мл)), 100 мкг/мл поли-EAY, фермент Trk (Trk A, B или C, дикого типа или мутантный,

в соответствующем диапазоне концентраций 0,1-10 нМ, в зависимости от соединения) и соединение, с изменением на протяжении 10-точечных серий разведения в три раза в диапазоне от 2000 до 0,1 нМ. Инкубации проводили при 22°C в течение 60 минут и останавливали посредством добавления 100 мкл аликвот 25% трихлоруксусной кислоты. Затем меченный радиоактивной меткой продукт связывали на планшетах с фильтрами из стекловолокна (PerkinElmer, Unifilter®-96, GF/B®) и промывали с использованием 5% фосфорной кислоты для удаления не связавшейся радиоактивной метки с использованием Tomtec MACH III Harvester 96®. После добавления 35 мкл/лунку жидкого сцинтилляционного коктейля Bio-Safe II™ (Research Products International), проводили подсчет планшетов в TopCount NXT (PerkinElmer) с использованием времени счета 30 с/лунку. Активность при каждой концентрации соединения выражали как процент от контроля (РОС) и наносили на график в зависимости от концентрации соединения. IC₅₀ определяли с использованием 4-параметрической логистической модели соответствия графикам зависимости ответа от дозы, где IC₅₀ определяли как концентрацию соединения, где кривая с наилучшим соответствием пересекает 50 РОС. Значения IC₅₀ для соединений, протестированных в этом анализе, представлены в таблице 7.

Таблица 7. Значения IC₅₀ соединений, протестированных в анализе из примера 4.

Номер соединения	IC ₅₀ (нМ)										
	TrkA WT	TrkA V573M	TrkA F589L	TrkA G595R	TrkA G667C	TrkA G667S	TrkB WT	TrkB G623R	TrkC WT	TrkC G623R	TrkC F617L
1	1,0	94,9	124,0	24,8	91,3	30,1	5,7	59,7	<2,5	29,3	58,0
2	0,8	76,4	61,5	19,4	46,3	21,3	4,5	34,1	<2,5	23,1	37,6
3	2,8	627,6	577,5	61,0	295,7	91,1	11,9	90,0	4,5	55,7	273,0
3	2,5	547,4	384,8	57,0	298,1	108,5	10,6	132,3	3,1	70,8	177,0
5	1,1	151,6	231,6	84,6	141,2	38,5	5,9	131,9	<2,5	95,0	153,7
6	0,8	74,9	78,5	25,3	55,1	23,3	5,0	27,5	<2,5	24,1	49,7
7	<0,5	67,1	83,1	30,5	52,5	26,4	7,0	47,9	<2,5	22,7	42,5
8	0,9	129,3	153,5	49,6	84,2	19,7	5,0	64,6	<2,5	54,9	67,1
9	0,8	106,4	90,7	91,9	76,5	21,6	4,6	104,3	<2,5	92,6	66,5
10	0,9	104,8	102,6	107,3	89,2	27,0	6,5	149,8	<2,5	100,5	80,1
11	6,9	1198,9	1084,1	560,6	830,4	274,6	19,0	671,4	4,4	445,7	476,2
12	<0,5	14,9	21,0	1,0	15,6	3,6	3,3	1,3	<2,5	1,6	9,9
13	<0,5	20,9	37,2	3,3	32,4	4,1	3,5	2,7	<2,5	3,1	8,7
14	<0,5	12,1	14,8	1,5	9,0	2,8	4,4	1,5	<2,5	2,7	12,4
15	<0,5	6,3	7,3	1,6	8,1	1,4	<2,5	1,6	<2,5	1,7	<5,0
16	<0,5	<5,0	<1,0	0,9	1,1	0,4	2,9	0,9	<2,5	1,3	<5,0
17	<0,5	<5,0	2,1	1,5	2,6	0,7	3,6	1,1	<2,5	1,8	<5,0
18	<0,5	<5,0	3,9	1,3	2,6	0,6	4,1	1,0	<2,5	1,4	5,5
19	0,5	<5,0	1,1	1,2	0,9	0,3	4,4	1,0	<2,5	1,8	5,1
20	<0,5	36,5	48,3	2,7	13,3	3,2	3,1	3,1	<2,5	3,1	18,3
21	0,6	29,1	66,3	7,3	22,2	8,4	5,6	12,4	<2,5	7,8	48,5
22	0,5	<5,0	8,4	1,5	5,7	0,9	2,9	1,3	<2,5	1,5	5,4
23	0,7	<5,0	<1,0	1,6	0,8	0,3	6,1	1,1	2,7	2,1	5,8
24	0,5	38,3	86,8	3,3	22,3	4,7	4,7	4,2	<2,5	4,5	61,9
25	1,0	<5,0	1,1	3,0	1,0	0,5	8,7	2,3	4,0	4,7	8,1
26	0,6	<5,0	3,9	2,1	1,0	0,5	3,3	1,8	<2,5	2,6	9,6
27	<0,5	9,3	21,0	1,5	5,6	2,1	3,4	1,7	<2,5	2,2	9,5
28	0,5	<5,0	3,3	2,0	9,8	2,3	3,2	1,9	<2,5	2,8	<5,0

ДРУГИЕ ВАРИАНТЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ

Следует понимать, что в то время как изобретение описано в сочетании с его подробным описанием, предшествующее описание предназначено для иллюстрации,

а не ограничения объема изобретения, который определяется посредством объема прилагаемой формулы изобретения. Другие аспекты, преимущества и модификации входят в объем следующей формулы изобретения.

СПИСОК ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЕЙ

5 <110> Loxo Oncology, Inc. & The Regents of the University of
Colorado, A Body Corporate
<120> ТОЧЕЧНЫЕ МУТАЦИИ В УСТОЙЧИВЫХ К ИНГИБИТОРУ TRK ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ
ОПУХОЛЯХ И СВЯЗАННЫЕ С НИМИ СПОСОБЫ
<130> 40449-0069WO1
10 <150> 62/246,580
<151> 2015-10-26
<150> 62/287,778
<151> 2016-01-27
<150> 62/323,586
15 <151> 2016-04-15
<160> 9
<170> PatentIn версии 3.5
<210> 1
<211> 796
20 <212> PRT
<213> Homo sapiens
<400> 1
Met Leu Arg Gly Gly Arg Arg Gly Gln Leu Gly Trp His Ser Trp Ala
1 5 10 15
25 Ala Gly Pro Gly Ser Leu Leu Ala Trp Leu Ile Leu Ala Ser Ala Gly
20 25 30
Ala Ala Pro Cys Pro Asp Ala Cys Cys Pro His Gly Ser Ser Gly Leu
35 40 45
Arg Cys Thr Arg Asp Gly Ala Leu Asp Ser Leu His His Leu Pro Gly
30 50 55 60
Ala Glu Asn Leu Thr Glu Leu Tyr Ile Glu Asn Gln Gln His Leu Gln
65 70 75 80
His Leu Glu Leu Arg Asp Leu Arg Gly Leu Gly Glu Leu Arg Asn Leu
85 90 95
35 Thr Ile Val Lys Ser Gly Leu Arg Phe Val Ala Pro Asp Ala Phe His
100 105 110
Phe Thr Pro Arg Leu Ser Arg Leu Asn Leu Ser Phe Asn Ala Leu Glu
115 120 125
Ser Leu Ser Trp Lys Thr Val Gln Gly Leu Ser Leu Gln Glu Leu Val
40 130 135 140
Leu Ser Gly Asn Pro Leu His Cys Ser Cys Ala Leu Arg Trp Leu Gln
145 150 155 160
Arg Trp Glu Glu Glu Gly Leu Gly Gly Val Pro Glu Gln Lys Leu Gln
165 170 175
45 Cys His Gly Gln Gly Pro Leu Ala His Met Pro Asn Ala Ser Cys Gly
180 185 190
Val Pro Thr Leu Lys Val Gln Val Pro Asn Ala Ser Val Asp Val Gly
195 200 205

RU 2744852 C2

	Asp	Asp	Val	Leu	Leu	Arg	Cys	Gln	Val	Glu	Gly	Arg	Gly	Leu	Glu	Gln	
	210						215					220					
	Ala	Gly	Trp	Ile	Leu	Thr	Glu	Leu	Glu	Gln	Ser	Ala	Thr	Val	Met	Lys	
	225					230					235					240	
5	Ser	Gly	Gly	Leu	Pro	Ser	Leu	Gly	Leu	Thr	Leu	Ala	Asn	Val	Thr	Ser	
					245					250					255		
	Asp	Leu	Asn	Arg	Lys	Asn	Val	Thr	Cys	Trp	Ala	Glu	Asn	Asp	Val	Gly	
				260					265					270			
	Arg	Ala	Glu	Val	Ser	Val	Gln	Val	Asn	Val	Ser	Phe	Pro	Ala	Ser	Val	
10				275				280					285				
	Gln	Leu	His	Thr	Ala	Val	Glu	Met	His	His	Trp	Cys	Ile	Pro	Phe	Ser	
	290						295					300					
	Val	Asp	Gly	Gln	Pro	Ala	Pro	Ser	Leu	Arg	Trp	Leu	Phe	Asn	Gly	Ser	
	305					310					315					320	
15	Val	Leu	Asn	Glu	Thr	Ser	Phe	Ile	Phe	Thr	Glu	Phe	Leu	Glu	Pro	Ala	
					325					330					335		
	Ala	Asn	Glu	Thr	Val	Arg	His	Gly	Cys	Leu	Arg	Leu	Asn	Gln	Pro	Thr	
				340					345					350			
	His	Val	Asn	Asn	Gly	Asn	Tyr	Thr	Leu	Leu	Ala	Ala	Asn	Pro	Phe	Gly	
20				355				360					365				
	Gln	Ala	Ser	Ala	Ser	Ile	Met	Ala	Ala	Phe	Met	Asp	Asn	Pro	Phe	Glu	
	370						375					380					
	Phe	Asn	Pro	Glu	Asp	Pro	Ile	Pro	Val	Ser	Phe	Ser	Pro	Val	Asp	Thr	
	385					390				395					400		
25	Asn	Ser	Thr	Ser	Gly	Asp	Pro	Val	Glu	Lys	Lys	Asp	Glu	Thr	Pro	Phe	
					405					410					415		
	Gly	Val	Ser	Val	Ala	Val	Gly	Leu	Ala	Val	Phe	Ala	Cys	Leu	Phe	Leu	
				420				425					430				
	Ser	Thr	Leu	Leu	Leu	Val	Leu	Asn	Lys	Cys	Gly	Arg	Arg	Asn	Lys	Phe	
30				435				440					445				
	Gly	Ile	Asn	Arg	Pro	Ala	Val	Leu	Ala	Pro	Glu	Asp	Gly	Leu	Ala	Met	
	450					455					460						
	Ser	Leu	His	Phe	Met	Thr	Leu	Gly	Gly	Ser	Ser	Leu	Ser	Pro	Thr	Glu	
	465					470				475					480		
35	Gly	Lys	Gly	Ser	Gly	Leu	Gln	Gly	His	Ile	Ile	Glu	Asn	Pro	Gln	Tyr	
					485					490					495		
	Phe	Ser	Asp	Ala	Cys	Val	His	His	Ile	Lys	Arg	Arg	Asp	Ile	Val	Leu	
				500					505					510			
	Lys	Trp	Glu	Leu	Gly	Glu	Gly	Ala	Phe	Gly	Lys	Val	Phe	Leu	Ala	Glu	
40				515				520					525				
	Cys	His	Asn	Leu	Leu	Pro	Glu	Gln	Asp	Lys	Met	Leu	Val	Ala	Val	Lys	
	530					535					540						
	Ala	Leu	Lys	Glu	Ala	Ser	Glu	Ser	Ala	Arg	Gln	Asp	Phe	Gln	Arg	Glu	
	545					550					555					560	
45	Ala	Glu	Leu	Leu	Thr	Met	Leu	Gln	His	Gln	His	Ile	Val	Arg	Phe	Phe	
					565					570					575		
	Gly	Val	Cys	Thr	Glu	Gly	Arg	Pro	Leu	Leu	Met	Val	Phe	Glu	Tyr	Met	
				580					585					590			

	Arg His Gly Asp Leu Asn Arg Phe Leu Arg Ser His Gly Pro Asp Ala	
	595	600 605
	Lys Leu Leu Ala Gly Gly Glu Asp Val Ala Pro Gly Pro Leu Gly Leu	
	610	615 620
5	Gly Gln Leu Leu Ala Val Ala Ser Gln Val Ala Ala Gly Met Val Tyr	
	625	630 635 640
	Leu Ala Gly Leu His Phe Val His Arg Asp Leu Ala Thr Arg Asn Cys	
	645	650 655
	Leu Val Gly Gln Gly Leu Val Val Lys Ile Gly Asp Phe Gly Met Ser	
10	660	665 670
	Arg Asp Ile Tyr Ser Thr Asp Tyr Tyr Arg Val Gly Gly Arg Thr Met	
	675	680 685
	Leu Pro Ile Arg Trp Met Pro Pro Glu Ser Ile Leu Tyr Arg Lys Phe	
	690	695 700
15	Thr Thr Glu Ser Asp Val Trp Ser Phe Gly Val Val Leu Trp Glu Ile	
	705	710 715 720
	Phe Thr Tyr Gly Lys Gln Pro Trp Tyr Gln Leu Ser Asn Thr Glu Ala	
	725	730 735
	Ile Asp Cys Ile Thr Gln Gly Arg Glu Leu Glu Arg Pro Arg Ala Cys	
20	740	745 750
	Pro Pro Glu Val Tyr Ala Ile Met Arg Gly Cys Trp Gln Arg Glu Pro	
	755	760 765
	Gln Gln Arg His Ser Ile Lys Asp Val His Ala Arg Leu Gln Ala Leu	
	770	775 780
25	Ala Gln Ala Pro Pro Val Tyr Leu Asp Val Leu Gly	
	785	790 795
	<210> 2	
	<211> 2663	
	<212> ДНК	
30	<213> Homo sapiens	
	<400> 2	
	tgcagctggg agcgcacaga cggtgcccc gcctgagcga ggcgggcgcc gccgcgatgc	60
	tgcgaggcgg acggcgcggg cagcttggtt ggcacagctg ggctgcgggg ccgggcagcc	120
	tgtctggttg gctgatactg gcatctgcgg gcgcccgcacc ctgccccgat gcctgctgcc	180
35	cccacggctc ctcgggactg cgatgcaccc gggatggggc cctggatagc ctccaccacc	240
	tgccccgcgc agagaacctg actgagctct acatcgagaa ccagcagcat ctgcagcatc	300
	tggagctccg tgatctgagg ggcctggggg agctgagaaa cctcaccatc gtgaagagtg	360
	gtctccgttt cgtggcgcca gatgccttcc atttactcc tcggctcagt cgctgaatc	420
	tctccttcaa cgctctggag tctctctcct ggaaaactgt gcagggcctc tccttacagg	480
40	aactggctct gtcggggaac cctctgcact gttcttgtgc cctgcgctgg ctacagcgct	540
	gggaggagga gggactgggc ggagtgcctg aacagaagct gcagtgtcat gggcaagggc	600
	ccctggccca catgcccatt gccagctgtg gtgtgcccac gctgaaggct caggtgccca	660
	atgcctcggg ggatgtgggg gacgacgtgc tgctgcgggt ccaggtggag gggcggggcc	720
	tggagcaggc cggtctggatc ctacacagagc tggagcagtc agccacggtg atgaaatctg	780
45	ggggtctgcc atccctgggg ctgaccctgg ccaatgtcac cagtgcctc aacaggaaga	840
	acgtgacgtg ctgggcagag aacgatgtgg gccgggcaga ggtctctgtt caggtcaacg	900
	tctccttccc ggccagtgtg cagctgcaca cggcggtgga gatgcaccac tgggtcatcc	960
	ccttctctgt ggatgggcag ccggcaccgt ctctgcgctg gctcttcaat ggctccgtgc	1020

tcaatgagac cagcttcatc ttactgagt tcctggagcc ggcagccaat gagaccgtgc 1080
ggcacgggtg tctgcgcctc aaccagccca cccacgtcaa caacggcaac tacacgtgc 1140
tggctgccaa ccccttcggc caggcctccg cctccatcat ggctgccttc atggacaacc 1200
ctttcgagtt caaccccgag gaccccatcc ctgtctcctt ctgcccgtg gacactaaca 1260
5 gcacatctgg agacccggtg gagaagaagg acgaaacacc ttttggggtc tcggtggctg 1320
tgggcctggc cgtctttgcc tgccctcttc tttctacgt gtccttctg ctcaacaaat 1380
gtggacggag aaacaagttt gggatcaacc gcccggtgt gctggctcca gaggatgggc 1440
tggccatgtc cctgcatttc atgacattgg gtggcagctc cctgtcccc accgagggca 1500
aaggctctgg gctccaaggc cacatcatcg agaaccaca atacttcagt gatgcctgtg 1560
10 ttcaccacat caagcgccgg gacatcgtgc tcaagtggga gctgggggag ggcgctttg 1620
ggaaggtctt ccttgctgag tgccacaacc tcctgcctga gcaggacaag atgctggtg 1680
ctgtcaaggc actgaaggag gcgtccgaga gtgctcgga ggacttcag cgtgaggctg 1740
agctgctcac catgctgcag caccagcaca tcgtgcgctt ctcggcgctc tgcaccgagg 1800
gccgccccct gctcatggtc tttgagtata tgccggcacgg ggacctcaac cgcttctcc 1860
15 gatcccatgg acctgatgcc aagctgctgg ctggtgggga ggatgtggct ccaggccccc 1920
tgggtctggg gcagctgctg gccgtggcta gccaggtcgc tgcggggatg gtgtacctg 1980
cgggtctgca ttttgtgcac cgggacctgg ccacacgcaa ctgtctagt ggccagggac 2040
tggtggtcaa gattggtgat tttggcatga gcagggatat ctacagcacc gactattacc 2100
gtgtgggagg ccgcaccatg ctgcccattc gctggatgcc gcccgagagc atcctgtacc 2160
20 gtaagttcac caccgagagc gacgtgtgga gcttcggcgt ggtgctctg gagatcttca 2220
cctacggcaa gcagccctg taccagctct ccaacacgga ggcaatcgac tgcacacgc 2280
agggacgtga gttggagcgg ccacgtgcct gccaccaga ggtctacgcc atcatgcggg 2340
gctgctggca gcgggagccc cagcaacgcc acagcatcaa ggatgtgcac gcccggtgc 2400
aagccctggc ccaggcacct cctgtctacc tggatgtcct gggctagggg gccggccag 2460
25 gggctgggag tggttagccg gaatactggg gcctgccctc agcatcccc atagctccca 2520
gcagccccag ggtgatctca aagtatctaa ttcacctca gcatgtggga agggacaggt 2580
gggggctggg agtagaggat gttcctgctt ctctaggcaa ggtcccgta tagcaattat 2640
atttattatc ccttgaaaaa aaa 2663

<210> 3

30 <211> 760

<212> PRT

<213> Homo sapiens

<400> 3

Met Lys Glu Ala Ala Leu Ile Cys Leu Ala Pro Ser Val Pro Pro Ile
35 1 5 10 15
Leu Thr Val Lys Ser Trp Asp Thr Met Gln Leu Arg Ala Ala Arg Ser
20 25 30
Arg Cys Thr Asn Leu Leu Ala Ala Ser Tyr Ile Glu Asn Gln Gln His
35 40 45
40 Leu Gln His Leu Glu Leu Arg Asp Leu Arg Gly Leu Gly Glu Leu Arg
50 55 60
Asn Leu Thr Ile Val Lys Ser Gly Leu Arg Phe Val Ala Pro Asp Ala
65 70 75 80
Phe His Phe Thr Pro Arg Leu Ser Arg Leu Asn Leu Ser Phe Asn Ala
45 85 90 95
Leu Glu Ser Leu Ser Trp Lys Thr Val Gln Gly Leu Ser Leu Gln Glu
100 105 110
Leu Val Leu Ser Gly Asn Pro Leu His Cys Ser Cys Ala Leu Arg Trp

RU 2744852 C2

			115					120					125					
		Leu	Gln	Arg	Trp	Glu	Glu	Glu	Gly	Leu	Gly	Gly	Val	Pro	Glu	Gln	Lys	
		130					135					140						
5		Leu	Gln	Cys	His	Gly	Gln	Gly	Pro	Leu	Ala	His	Met	Pro	Asn	Ala	Ser	
		145					150					155					160	
		Cys	Gly	Val	Pro	Thr	Leu	Lys	Val	Gln	Val	Pro	Asn	Ala	Ser	Val	Asp	
						165					170					175		
		Val	Gly	Asp	Asp	Val	Leu	Leu	Arg	Cys	Gln	Val	Glu	Gly	Arg	Gly	Leu	
10					180					185					190			
		Glu	Gln	Ala	Gly	Trp	Ile	Leu	Thr	Glu	Leu	Glu	Gln	Ser	Ala	Thr	Val	
		195					200					205						
		Met	Lys	Ser	Gly	Gly	Leu	Pro	Ser	Leu	Gly	Leu	Thr	Leu	Ala	Asn	Val	
		210					215					220						
15		Thr	Ser	Asp	Leu	Asn	Arg	Lys	Asn	Val	Thr	Cys	Trp	Ala	Glu	Asn	Asp	
		225					230					235					240	
		Val	Gly	Arg	Ala	Glu	Val	Ser	Val	Gln	Val	Asn	Val	Ser	Phe	Pro	Ala	
						245					250					255		
		Ser	Val	Gln	Leu	His	Thr	Ala	Val	Glu	Met	His	His	Trp	Cys	Ile	Pro	
20					260					265					270			
		Phe	Ser	Val	Asp	Gly	Gln	Pro	Ala	Pro	Ser	Leu	Arg	Trp	Leu	Phe	Asn	
		275					280					285						
		Gly	Ser	Val	Leu	Asn	Glu	Thr	Ser	Phe	Ile	Phe	Thr	Glu	Phe	Leu	Glu	
		290					295					300						
25		Pro	Ala	Ala	Asn	Glu	Thr	Val	Arg	His	Gly	Cys	Leu	Arg	Leu	Asn	Gln	
		305					310					315					320	
		Pro	Thr	His	Val	Asn	Asn	Gly	Asn	Tyr	Thr	Leu	Leu	Ala	Ala	Asn	Pro	
						325					330					335		
		Phe	Gly	Gln	Ala	Ser	Ala	Ser	Ile	Met	Ala	Ala	Phe	Met	Asp	Asn	Pro	
30					340					345					350			
		Phe	Glu	Phe	Asn	Pro	Glu	Asp	Pro	Ile	Pro	Asp	Thr	Asn	Ser	Thr	Ser	
		355					360					365						
		Gly	Asp	Pro	Val	Glu	Lys	Lys	Asp	Glu	Thr	Pro	Phe	Gly	Val	Ser	Val	
		370					375					380						
35		Ala	Val	Gly	Leu	Ala	Val	Phe	Ala	Cys	Leu	Phe	Leu	Ser	Thr	Leu	Leu	
		385					390					395					400	
		Leu	Val	Leu	Asn	Lys	Cys	Gly	Arg	Arg	Asn	Lys	Phe	Gly	Ile	Asn	Arg	
						405					410					415		
		Pro	Ala	Val	Leu	Ala	Pro	Glu	Asp	Gly	Leu	Ala	Met	Ser	Leu	His	Phe	
40					420					425					430			
		Met	Thr	Leu	Gly	Gly	Ser	Ser	Leu	Ser	Pro	Thr	Glu	Gly	Lys	Gly	Ser	
		435					440					445						
		Gly	Leu	Gln	Gly	His	Ile	Ile	Glu	Asn	Pro	Gln	Tyr	Phe	Ser	Asp	Ala	
		450					455					460						
45		Cys	Val	His	His	Ile	Lys	Arg	Arg	Asp	Ile	Val	Leu	Lys	Trp	Glu	Leu	
		465					470					475					480	
		Gly	Glu	Gly	Ala	Phe	Gly	Lys	Val	Phe	Leu	Ala	Glu	Cys	His	Asn	Leu	
						485					490					495		
		Leu	Pro	Glu	Gln	Asp	Lys	Met	Leu	Val	Ala	Val	Lys	Ala	Leu	Lys	Glu	

RU 2 744 852 C2

				500					505					510			
	Ala	Ser	Glu	Ser	Ala	Arg	Gln	Asp	Phe	Gln	Arg	Glu	Ala	Glu	Leu	Leu	
				515				520					525				
	Thr	Met	Leu	Gln	His	Gln	His	Ile	Val	Arg	Phe	Phe	Gly	Val	Cys	Thr	
5				530				535					540				
	Glu	Gly	Arg	Pro	Leu	Leu	Met	Val	Phe	Glu	Tyr	Met	Arg	His	Gly	Asp	
	545						550					555				560	
	Leu	Asn	Arg	Phe	Leu	Arg	Ser	His	Gly	Pro	Asp	Ala	Lys	Leu	Leu	Ala	
					565					570					575		
10	Gly	Gly	Glu	Asp	Val	Ala	Pro	Gly	Pro	Leu	Gly	Leu	Gly	Gln	Leu	Leu	
				580					585					590			
	Ala	Val	Ala	Ser	Gln	Val	Ala	Ala	Gly	Met	Val	Tyr	Leu	Ala	Gly	Leu	
				595				600					605				
	His	Phe	Val	His	Arg	Asp	Leu	Ala	Thr	Arg	Asn	Cys	Leu	Val	Gly	Gln	
15				610				615				620					
	Gly	Leu	Val	Val	Lys	Ile	Gly	Asp	Phe	Gly	Met	Ser	Arg	Asp	Ile	Tyr	
	625					630				635					640		
	Ser	Thr	Asp	Tyr	Tyr	Arg	Val	Gly	Gly	Arg	Thr	Met	Leu	Pro	Ile	Arg	
					645					650					655		
20	Trp	Met	Pro	Pro	Glu	Ser	Ile	Leu	Tyr	Arg	Lys	Phe	Thr	Thr	Glu	Ser	
				660					665					670			
	Asp	Val	Trp	Ser	Phe	Gly	Val	Val	Leu	Trp	Glu	Ile	Phe	Thr	Tyr	Gly	
				675				680					685				
	Lys	Gln	Pro	Trp	Tyr	Gln	Leu	Ser	Asn	Thr	Glu	Ala	Ile	Asp	Cys	Ile	
25				690				695				700					
	Thr	Gln	Gly	Arg	Glu	Leu	Glu	Arg	Pro	Arg	Ala	Cys	Pro	Pro	Glu	Val	
	705					710				715					720		
	Tyr	Ala	Ile	Met	Arg	Gly	Cys	Trp	Gln	Arg	Glu	Pro	Gln	Gln	Arg	His	
					725					730					735		
30	Ser	Ile	Lys	Asp	Val	His	Ala	Arg	Leu	Gln	Ala	Leu	Ala	Gln	Ala	Pro	
				740					745					750			
	Pro	Val	Tyr	Leu	Asp	Val	Leu	Gly									
				755				760									
	<210>	4															
35	<211>	2581															
	<212>	ДНК															
	<213>	Homo sapiens															
	<400>	4															
	gcaccctggt	catctgcgga	ctcagcctga	gcttccagag	ggcctaggag	cagtaaggga											60
40	gtgagtgggc	aactcggcgc	atgaaggagg	ccgccctcat	ctgcctggca	ccctctgtac											120
	ccccgatctt	gacggtgaag	tctctgggaca	ccatgcagtt	gcgggctgct	agatctcggt					</						

cggtggatgt gggggacgac gtgctgctgc ggtgccaggt ggaggggagg ggctggagc 660
 aggccggctg gatcctcaca gagctggagc agtcagccac ggtgatgaaa tctgggggtc 720
 tgccatccct ggggctgacc ctggccaatg tcaccagtga cctcaacagg aagaacgtga 780
 cgtgctgggc agagaacgat gtgggcccgg cagaggctctc tgttcaggctc aacgtctcct 840
 5 tcccggccag tgtgcagctg cacacggcgg tggagatgca cactgggtgc atccccctct 900
 ctgtggatgg gcagccggca ccgtctctgc gctggctctt caatggctcc gtgctcaatg 960
 agaccagctt catcttcact gagttcctgg agccggcagc caatgagacc gtgcggcagc 1020
 ggtgtctgcg cctcaaccag cccacccacg tcaacaacgg caactacacg ctgctggctg 1080
 ccaacccctt cggccaggcc tccgcctcca tcatggctgc cttcatggac aaccctttcg 1140
 10 agttcaaccc cgaggacccc atccctgaca ctaacagcac atctggagac ccggtggaga 1200
 agaaggacga aacacctttt ggggtctcgg tggctgtggg cctggccgctc tttgcctgcc 1260
 tcttcctttc tacgctgctc cttgtgctca acaaagtggg acggagaaaac aagtttggga 1320
 tcaaccgccc ggctgtgctg gctccagagg atgggctggc catgtccctg catttcatga 1380
 cattgggtgg cagctccctg tccccaccg agggcaaagg ctctgggctc caaggccaca 1440
 15 tcatcgagaa cccacaatac ttcagtgatg cctgtgttca ccacatcaag cgccgggaca 1500
 tcgtgctcaa gtgggagctg ggggaggggc cttttgggaa ggtcttcctt gctgagtgcc 1560
 acaacctcct gcctgagcag gacaagatgc tgggtggctgt caaggcactg aaggaggcgt 1620
 ccgagagtgc tcggcaggac ttccagcgtg aggtgagct gctcaccatg ctgcagcacc 1680
 agcacatcgt gcgcttcttc ggcgtctgca ccgagggccg cccctgctc atggtctttg 1740
 20 agtatatgcg gcacggggac ctcaaccgct tcctccgatc ccattggacct gatgccaagc 1800
 tgctggctgg tggggaggat gtggctccag gccccctggg tctggggcag ctgctggccg 1860
 tggctagcca ggtcgtctgc gggatggtgt acctggcggg tctgcatttt gtgcaccggg 1920
 acctggccac acgcaactgt ctagtgggcc agggactggt ggtcaagatt ggtgattttg 1980
 gcatgagcag ggatatctac agcaccgact attaccgtgt gggaggccgc accatgctgc 2040
 25 ccattcgctg gatgccgcc gagagcatcc tgtaccgtaa gttcaccacc gagagcgacg 2100
 tgtggagctt cggcgtggtg ctctgggaga tcttcaccta cggcaagcag ccctggtacc 2160
 agctctccaa cacggaggca atcgactgca tcacgcaggg acgtgagttg gagcgccac 2220
 gtgcctgccc accagaggctc tacgccatca tgcggggctg ctggcagcgg gagccccagc 2280
 aacgccacag catcaaggat gtgcacgccc ggctgcaagc cctggcccag gcacctcctg 2340
 30 tctacctgga tgtcctgggc tagggggccg gcccaggggc tgggagtggg tagccggaat 2400
 actggggcct gccctcagca tccccatag ctcccagcag cccaggggtg atctcaaagt 2460
 atctaattca ccctcagcat gtgggaaggg acaggtgggg gctgggagta gaggatgttc 2520
 ctgcttctct aggcaaggct ccgtcatagc aattatattt attatccctt gaaaaaaaaa 2580
 a 2581

35 <210> 5
 <211> 822
 <212> PRT
 <213> Homo sapiens
 <400> 5

40 Met Ser Ser Trp Ile Arg Trp His Gly Pro Ala Met Ala Arg Leu Trp
 1 5 10 15
 Gly Phe Cys Trp Leu Val Val Gly Phe Trp Arg Ala Ala Phe Ala Cys
 20 25 30
 Pro Thr Ser Cys Lys Cys Ser Ala Ser Arg Ile Trp Cys Ser Asp Pro
 45 35 40 45
 Ser Pro Gly Ile Val Ala Phe Pro Arg Leu Glu Pro Asn Ser Val Asp
 50 55 60
 Pro Glu Asn Ile Thr Glu Ile Phe Ile Ala Asn Gln Lys Arg Leu Glu

RU 2744852 C2

	65				70				75				80			
	Ile	Ile	Asn	Glu	Asp	Asp	Val	Glu	Ala	Tyr	Val	Gly	Leu	Arg	Asn	Leu
					85				90					95		
	Thr	Ile	Val	Asp	Ser	Gly	Leu	Lys	Phe	Val	Ala	His	Lys	Ala	Phe	Leu
5				100					105					110		
	Lys	Asn	Ser	Asn	Leu	Gln	His	Ile	Asn	Phe	Thr	Arg	Asn	Lys	Leu	Thr
				115					120					125		
	Ser	Leu	Ser	Arg	Lys	His	Phe	Arg	His	Leu	Asp	Leu	Ser	Glu	Leu	Ile
				130					135					140		
10	Leu	Val	Gly	Asn	Pro	Phe	Thr	Cys	Ser	Cys	Asp	Ile	Met	Trp	Ile	Lys
	145					150					155				160	
	Thr	Leu	Gln	Glu	Ala	Lys	Ser	Ser	Pro	Asp	Thr	Gln	Asp	Leu	Tyr	Cys
					165					170					175	
	Leu	Asn	Glu	Ser	Ser	Lys	Asn	Ile	Pro	Leu	Ala	Asn	Leu	Gln	Ile	Pro
15				180					185					190		
	Asn	Cys	Gly	Leu	Pro	Ser	Ala	Asn	Leu	Ala	Ala	Pro	Asn	Leu	Thr	Val
				195					200					205		
	Glu	Glu	Gly	Lys	Ser	Ile	Thr	Leu	Ser	Cys	Ser	Val	Ala	Gly	Asp	Pro
				210					215					220		
20	Val	Pro	Asn	Met	Tyr	Trp	Asp	Val	Gly	Asn	Leu	Val	Ser	Lys	His	Met
	225					230					235				240	
	Asn	Glu	Thr	Ser	His	Thr	Gln	Gly	Ser	Leu	Arg	Ile	Thr	Asn	Ile	Ser
					245					250					255	
	Ser	Asp	Asp	Ser	Gly	Lys	Gln	Ile	Ser	Cys	Val	Ala	Glu	Asn	Leu	Val
25				260					265					270		
	Gly	Glu	Asp	Gln	Asp	Ser	Val	Asn	Leu	Thr	Val	His	Phe	Ala	Pro	Thr
				275					280					285		
	Ile	Thr	Phe	Leu	Glu	Ser	Pro	Thr	Ser	Asp	His	His	Trp	Cys	Ile	Pro
				290					295					300		
30	Phe	Thr	Val	Lys	Gly	Asn	Pro	Lys	Pro	Ala	Leu	Gln	Trp	Phe	Tyr	Asn
	305					310					315				320	
	Gly	Ala	Ile	Leu	Asn	Glu	Ser	Lys	Tyr	Ile	Cys	Thr	Lys	Ile	His	Val
					325					330				335		
	Thr	Asn	His	Thr	Glu	Tyr	His	Gly	Cys	Leu	Gln	Leu	Asp	Asn	Pro	Thr
35				340					345					350		
	His	Met	Asn	Asn	Gly	Asp	Tyr	Thr	Leu	Ile	Ala	Lys	Asn	Glu	Tyr	Gly
				355					360					365		
	Lys	Asp	Glu	Lys	Gln	Ile	Ser	Ala	His	Phe	Met	Gly	Trp	Pro	Gly	Ile
				370					375				380			
40	Asp	Asp	Gly	Ala	Asn	Pro	Asn	Tyr	Pro	Asp	Val	Ile	Tyr	Glu	Asp	Tyr
	385					390					395				400	
	Gly	Thr	Ala	Ala	Asn	Asp	Ile	Gly	Asp	Thr	Thr	Asn	Arg	Ser	Asn	Glu
					405					410					415	
	Ile	Pro	Ser	Thr	Asp	Val	Thr	Asp	Lys	Thr	Gly	Arg	Glu	His	Leu	Ser
45				420					425					430		
	Val	Tyr	Ala	Val	Val	Val	Ile	Ala	Ser	Val	Val	Gly	Phe	Cys	Leu	Leu
				435					440					445		
	Val	Met	Leu	Phe	Leu	Leu	Lys	Leu	Ala	Arg	His	Ser	Lys	Phe	Gly	Met

RU 2744852 C2

	450		455		460												
	Lys	Gly	Pro	Ala	Ser	Val	Ile	Ser	Asn	Asp	Asp	Asp	Ser	Ala	Ser	Pro	
	465						470				475					480	
	Leu	His	His	Ile	Ser	Asn	Gly	Ser	Asn	Thr	Pro	Ser	Ser	Ser	Glu	Gly	
5					485					490					495		
	Gly	Pro	Asp	Ala	Val	Ile	Ile	Gly	Met	Thr	Lys	Ile	Pro	Val	Ile	Glu	
				500					505					510			
	Asn	Pro	Gln	Tyr	Phe	Gly	Ile	Thr	Asn	Ser	Gln	Leu	Lys	Pro	Asp	Thr	
				515					520					525			
10	Phe	Val	Gln	His	Ile	Lys	Arg	His	Asn	Ile	Val	Leu	Lys	Arg	Glu	Leu	
	530						535					540					
	Gly	Glu	Gly	Ala	Phe	Gly	Lys	Val	Phe	Leu	Ala	Glu	Cys	Tyr	Asn	Leu	
	545					550				555					560		
	Cys	Pro	Glu	Gln	Asp	Lys	Ile	Leu	Val	Ala	Val	Lys	Thr	Leu	Lys	Asp	
15				565					570					575			
	Ala	Ser	Asp	Asn	Ala	Arg	Lys	Asp	Phe	His	Arg	Glu	Ala	Glu	Leu	Leu	
				580					585					590			
	Thr	Asn	Leu	Gln	His	Glu	His	Ile	Val	Lys	Phe	Tyr	Gly	Val	Cys	Val	
				595				600					605				
20	Glu	Gly	Asp	Pro	Leu	Ile	Met	Val	Phe	Glu	Tyr	Met	Lys	His	Gly	Asp	
	610						615					620					
	Leu	Asn	Lys	Phe	Leu	Arg	Ala	His	Gly	Pro	Asp	Ala	Val	Leu	Met	Ala	
	625					630					635					640	
	Glu	Gly	Asn	Pro	Pro	Thr	Glu	Leu	Thr	Gln	Ser	Gln	Met	Leu	His	Ile	
25				645					650					655			
	Ala	Gln	Gln	Ile	Ala	Ala	Gly	Met	Val	Tyr	Leu	Ala	Ser	Gln	His	Phe	
				660					665					670			
	Val	His	Arg	Asp	Leu	Ala	Thr	Arg	Asn	Cys	Leu	Val	Gly	Glu	Asn	Leu	
				675				680					685				
30	Leu	Val	Lys	Ile	Gly	Asp	Phe	Gly	Met	Ser	Arg	Asp	Val	Tyr	Ser	Thr	
	690						695					700					
	Asp	Tyr	Tyr	Arg	Val	Gly	Gly	His	Thr	Met	Leu	Pro	Ile	Arg	Trp	Met	
	705				710					715					720		
	Pro	Pro	Glu	Ser	Ile	Met	Tyr	Arg	Lys	Phe	Thr	Thr	Glu	Ser	Asp	Val	
35				725					730					735			
	Trp	Ser	Leu	Gly	Val	Val	Leu	Trp	Glu	Ile	Phe	Thr	Tyr	Gly	Lys	Gln	
				740					745					750			
	Pro	Trp	Tyr	Gln	Leu	Ser	Asn	Asn	Glu	Val	Ile	Glu	Cys	Ile	Thr	Gln	
				755				760					765				
40	Gly	Arg	Val	Leu	Gln	Arg	Pro	Arg	Thr	Cys	Pro	Gln	Glu	Val	Tyr	Glu	
	770						775					780					
	Leu	Met	Leu	Gly	Cys	Trp	Gln	Arg	Glu	Pro	His	Met	Arg	Lys	Asn	Ile	
	785					790					795					800	
	Lys	Gly	Ile	His	Thr	Leu	Leu	Gln	Asn	Leu	Ala	Lys	Ala	Ser	Pro	Val	
45				805					810					815			
	Tyr	Leu	Asp	Ile	Leu	Gly											
				820													

<210> 6

<211> 3194

<212> ДНК

<213> Homo sapiens

<400> 6

5	ggaaggttta	aagaagaagc	cgcaaagcgc	agggaaggcc	tcccggcacg	ggtgggggaa	60
	agcggccggt	gcagcgcggg	gacaggcact	cgggctggca	ctggctgcta	gggatgtcgt	120
	cctggataag	gtggcatgga	cccgccatgg	cgcggtctctg	gggcttctgc	tggctggttg	180
	tgggcttctg	gagggccgct	ttcgctctgc	ccacgtcctg	caaatgcagt	gcctctcgga	240
	tctggtgcag	cgacccttct	cctggcatcg	tggcatttcc	gagattggag	cctaacagtg	300
10	tagatcctga	gaacatcacc	gaaattttca	tgcgaaacca	gaaaaggtta	gaaatcatca	360
	acgaagatga	tgttgaagct	tatgtgggac	tgagaaatct	gacaattgtg	gattctggat	420
	taaaatttgt	ggctcataaa	gcatttctga	aaaacagcaa	cctgcagcac	atcaatttta	480
	cccgaaacaa	actgacgagt	ttgtctagga	aacatttccg	tcacctgac	ttgtctgaac	540
	tgatcctggt	gggcaatcca	tttacctgct	cctgtgacat	tatgtggatc	aagactctcc	600
15	aagaggctaa	atccagtgca	gacactcagg	atttgtactg	cctgaatgaa	agcagcaaga	660
	atattcccct	ggcaaacctg	cagataacca	atttgtggtt	gccatctgca	aatctggccg	720
	cacctaacct	cactgtggag	gaaggaaaagt	ctatcacatt	atcctgtagt	gtggcaggtg	780
	atccggttcc	taatatgtat	tgggatgttg	gtaacctggt	ttccaaacat	atgaatgaaa	840
	caagccacac	acagggctcc	ttaaggataa	ctaacatttc	atccgatgac	agtgggaagc	900
20	agatctcttg	tgtggcgga	aatctttag	gagaagatca	agattctgtc	aacctcactg	960
	tgcattttgc	accaactatc	acatttctcg	aatctccaac	ctcagaccac	cactggtgca	1020
	ttccattcac	tgtgaaaggc	aacccaaaac	cagcgcttca	gtggttctat	aacggggcaa	1080
	tattgaatga	gtccaaatac	atctgtacta	aaatacatgt	taccaatcac	acggagtacc	1140
	acggctgcct	ccagctggat	aatcccactc	acatgaacaa	tggggactac	actctaatag	1200
25	ccaagaatga	gtatgggaag	gatgagaaac	agatttctgc	tcacttcatg	ggctggcctg	1260
	gaattgacga	tgggtgcaa	ccaaattatc	ctgatgtaat	ttatgaagat	tatggaactg	1320
	cagcgaatga	catcggggac	accacgaaca	gaagtaatga	aatcccttcc	acagacgtca	1380
	ctgataaaac	cggctcgggaa	catctctcgg	tctatgctgt	ggtggtgatt	gcgtctgtgg	1440
	tgggattttg	ccttttggtg	atgctgtttc	tgcttaagtt	ggcaagacac	tccaagtttg	1500
30	gcatgaaagg	cccagcctcc	gttatcagca	atgatgatga	ctctgccagc	ccactccatc	1560
	acatctccaa	tgggagtaac	actccatctt	cttcggaagg	tggcccagat	gctgtcatta	1620
	ttggaatgac	caagatccct	gtcattgaaa	atccccagta	ctttggcatc	accaacagtc	1680
	agctcaagcc	agacacattt	gttcagcaca	tcaagcgaca	taacattgtt	ctgaaaaggg	1740
	agctaggcga	aggagccttt	ggaaaagtgt	tcctagctga	atgctataac	ctctgtcctg	1800
35	agcaggacaa	gatcttggtg	gcagtgaaga	ccctgaagga	tgccagtgac	aatgcacgca	1860
	aggacttcca	ccgtgaggcc	gagctcctga	ccaacctcca	gcatgagcac	atcgtcaagt	1920
	tctatggcgt	ctgcgtggag	ggcgaccccc	tcatcatggt	ctttgagtac	atgaagcatg	1980
	gggacctcaa	caagttcctc	agggcacacg	gccctgatgc	cgtgctgatg	gctgagggca	2040
	acccgcccac	ggaactgacg	cagtcgcaga	tgctgcata	agcccagcag	atcgccgcgg	2100
40	gcatggtcta	cctggcgctc	cagcacttctg	tgcaccgcga	tttggccacc	aggaactgcc	2160
	tggtcgggga	gaacttgctg	gtgaaaaatcg	gggactttgg	gatgtcccgg	gacgtgtaca	2220
	gcaactgacta	ctacaggggc	ggtggccaca	caatgctgcc	cattcgctgg	atgcctccag	2280
	agagcatcat	gtacaggaaa	ttcacgacgg	aaagcgacgt	ctggagcctg	ggggctcgtg	2340
	tgtgggagat	tttcacctat	ggcaaacagc	cctggtacca	gctgtcaa	aatgagggtga	2400
45	tagagtgtat	cactcagggc	cgagtcctgc	agcgaccccc	cacgtgcccc	caggaggtgt	2460
	atgagctgat	gctgggggtg	tggcagcgag	agccccacat	gaggaagaac	atcaagggca	2520
	tccataccct	ccttcagaac	ttggccaagg	catctccggt	ctacctggac	attctaggct	2580
	agggcccttt	tccccagacc	gatccttccc	aacgtactcc	tcagacgggc	tgagaggatg	2640

aacatctttt aactgccgct ggaggccacc aagctgctct ccttcactct gacagtatta 2700
 acatcaaaga ctccgagaag ctctcgaggg aagcagtgtg tacttcttca tccatagaca 2760
 cagtattgac ttcttttttg cattatctct ttctctcttt ccactctccct tgggtgttcc 2820
 tttttctttt tttaaatttt ctttttcttc ttttttttcg tcttccctgc ttcacgattc 2880
 5 ttaccctttc ttttgaatca atctggcttc tgcattacta ttaactctgc atagacaaag 2940
 gccttaacaa acgtaatttg ttatatcagc agacactcca gtttgccac cacaactaac 3000
 aatgccttgt tgtattcctg cttttgatgt ggatgaaaaa aagggaac aaatatttca 3060
 cttaaacttt gtcacttctg ctgtacagat atcgagagtt tctatggatt cacttctatt 3120
 tattttattat tattactggt cttattgttt ttggatggct taagcctgtg tataaaaaaa 3180
 10 aaaaaaatc taga 3194
 <210> 7
 <211> 839
 <212> PRT
 <213> Homo sapiens
 15 <400> 7
 Met Asp Val Ser Leu Cys Pro Ala Lys Cys Ser Phe Trp Arg Ile Phe
 1 5 10 15
 Leu Leu Gly Ser Val Trp Leu Asp Tyr Val Gly Ser Val Leu Ala Cys
 20 25 30
 Pro Ala Asn Cys Val Cys Ser Lys Thr Glu Ile Asn Cys Arg Arg Pro
 35 40 45
 Asp Asp Gly Asn Leu Phe Pro Leu Leu Glu Gly Gln Asp Ser Gly Asn
 50 55 60
 Ser Asn Gly Asn Ala Asn Ile Asn Ile Thr Asp Ile Ser Arg Asn Ile
 25 65 70 75 80
 Thr Ser Ile His Ile Glu Asn Trp Arg Ser Leu His Thr Leu Asn Ala
 85 90 95
 Val Asp Met Glu Leu Tyr Thr Gly Leu Gln Lys Leu Thr Ile Lys Asn
 100 105 110
 30 Ser Gly Leu Arg Ser Ile Gln Pro Arg Ala Phe Ala Lys Asn Pro His
 115 120 125
 Leu Arg Tyr Ile Asn Leu Ser Ser Asn Arg Leu Thr Thr Leu Ser Trp
 130 135 140
 Gln Leu Phe Gln Thr Leu Ser Leu Arg Glu Leu Gln Leu Glu Gln Asn
 35 145 150 155 160
 Phe Phe Asn Cys Ser Cys Asp Ile Arg Trp Met Gln Leu Trp Gln Glu
 165 170 175
 Gln Gly Glu Ala Lys Leu Asn Ser Gln Asn Leu Tyr Cys Ile Asn Ala
 180 185 190
 40 Asp Gly Ser Gln Leu Pro Leu Phe Arg Met Asn Ile Ser Gln Cys Asp
 195 200 205
 Leu Pro Glu Ile Ser Val Ser His Val Asn Leu Thr Val Arg Glu Gly
 210 215 220
 Asp Asn Ala Val Ile Thr Cys Asn Gly Ser Gly Ser Pro Leu Pro Asp
 45 225 230 235 240
 Val Asp Trp Ile Val Thr Gly Leu Gln Ser Ile Asn Thr His Gln Thr
 245 250 255
 Asn Leu Asn Trp Thr Asn Val His Ala Ile Asn Leu Thr Leu Val Asn

RU 2744852 C2

		260		265		270											
		Val	Thr	Ser	Glu	Asp	Asn	Gly	Phe	Thr	Leu	Thr	Cys	Ile	Ala	Glu	Asn
		275							280					285			
		Val	Val	Gly	Met	Ser	Asn	Ala	Ser	Val	Ala	Leu	Thr	Val	Tyr	Tyr	Pro
5		290						295					300				
		Pro	Arg	Val	Val	Ser	Leu	Glu	Glu	Pro	Glu	Leu	Arg	Leu	Glu	His	Cys
		305					310				315					320	
		Ile	Glu	Phe	Val	Val	Arg	Gly	Asn	Pro	Pro	Pro	Thr	Leu	His	Trp	Leu
					325					330					335		
10		His	Asn	Gly	Gln	Pro	Leu	Arg	Glu	Ser	Lys	Ile	Ile	His	Val	Glu	Tyr
				340					345					350			
		Tyr	Gln	Glu	Gly	Glu	Ile	Ser	Glu	Gly	Cys	Leu	Leu	Phe	Asn	Lys	Pro
			355					360					365				
		Thr	His	Tyr	Asn	Asn	Gly	Asn	Tyr	Thr	Leu	Ile	Ala	Lys	Asn	Pro	Leu
15		370					375				380						
		Gly	Thr	Ala	Asn	Gln	Thr	Ile	Asn	Gly	His	Phe	Leu	Lys	Glu	Pro	Phe
		385				390				395						400	
		Pro	Glu	Ser	Thr	Asp	Asn	Phe	Ile	Leu	Phe	Asp	Glu	Val	Ser	Pro	Thr
				405					410					415			
20		Pro	Pro	Ile	Thr	Val	Thr	His	Lys	Pro	Glu	Glu	Asp	Thr	Phe	Gly	Val
				420					425					430			
		Ser	Ile	Ala	Val	Gly	Leu	Ala	Ala	Phe	Ala	Cys	Val	Leu	Leu	Val	Val
			435					440					445				
		Leu	Phe	Val	Met	Ile	Asn	Lys	Tyr	Gly	Arg	Arg	Ser	Lys	Phe	Gly	Met
25		450					455				460						
		Lys	Gly	Pro	Val	Ala	Val	Ile	Ser	Gly	Glu	Glu	Asp	Ser	Ala	Ser	Pro
		465				470				475						480	
		Leu	His	His	Ile	Asn	His	Gly	Ile	Thr	Thr	Pro	Ser	Ser	Leu	Asp	Ala
				485				490					495				
30		Gly	Pro	Asp	Thr	Val	Val	Ile	Gly	Met	Thr	Arg	Ile	Pro	Val	Ile	Glu
			500					505					510				
		Asn	Pro	Gln	Tyr	Phe	Arg	Gln	Gly	His	Asn	Cys	His	Lys	Pro	Asp	Thr
			515					520					525				
		Tyr	Val	Gln	His	Ile	Lys	Arg	Arg	Asp	Ile	Val	Leu	Lys	Arg	Glu	Leu
35		530					535				540						
		Gly	Glu	Gly	Ala	Phe	Gly	Lys	Val	Phe	Leu	Ala	Glu	Cys	Tyr	Asn	Leu
		545				550				555						560	
		Ser	Pro	Thr	Lys	Asp	Lys	Met	Leu	Val	Ala	Val	Lys	Ala	Leu	Lys	Asp
				565				570					575				
40		Pro	Thr	Leu	Ala	Ala	Arg	Lys	Asp	Phe	Gln	Arg	Glu	Ala	Glu	Leu	Leu
			580					585					590				
		Thr	Asn	Leu	Gln	His	Glu	His	Ile	Val	Lys	Phe	Tyr	Gly	Val	Cys	Gly
			595				600						605				
		Asp	Gly	Asp	Pro	Leu	Ile	Met	Val	Phe	Glu	Tyr	Met	Lys	His	Gly	Asp
45		610					615				620						
		Leu	Asn	Lys	Phe	Leu	Arg	Ala	His	Gly	Pro	Asp	Ala	Met	Ile	Leu	Val
		625				630				635						640	
		Asp	Gly	Gln	Pro	Arg	Gln	Ala	Lys	Gly	Glu	Leu	Gly	Leu	Ser	Gln	Met

RU 2744852 C2

					645					650					655	
	Leu	His	Ile	Ala	Ser	Gln	Ile	Ala	Ser	Gly	Met	Val	Tyr	Leu	Ala	Ser
					660					665					670	
	Gln	His	Phe	Val	His	Arg	Asp	Leu	Ala	Thr	Arg	Asn	Cys	Leu	Val	Gly
5					675					680					685	
	Ala	Asn	Leu	Leu	Val	Lys	Ile	Gly	Asp	Phe	Gly	Met	Ser	Arg	Asp	Val
					690					695					700	
	Tyr	Ser	Thr	Asp	Tyr	Tyr	Arg	Leu	Phe	Asn	Pro	Ser	Gly	Asn	Asp	Phe
	705						710					715				720
10	Cys	Ile	Trp	Cys	Glu	Val	Gly	Gly	His	Thr	Met	Leu	Pro	Ile	Arg	Trp
					725						730				735	
	Met	Pro	Pro	Glu	Ser	Ile	Met	Tyr	Arg	Lys	Phe	Thr	Thr	Glu	Ser	Asp
					740					745					750	
	Val	Trp	Ser	Phe	Gly	Val	Ile	Leu	Trp	Glu	Ile	Phe	Thr	Tyr	Gly	Lys
15					755					760					765	
	Gln	Pro	Trp	Phe	Gln	Leu	Ser	Asn	Thr	Glu	Val	Ile	Glu	Cys	Ile	Thr
					770										780	
	Gln	Gly	Arg	Val	Leu	Glu	Arg	Pro	Arg	Val	Cys	Pro	Lys	Glu	Val	Tyr
	785						790					795				800
20	Asp	Val	Met	Leu	Gly	Cys	Trp	Gln	Arg	Glu	Pro	Gln	Gln	Arg	Leu	Asn
					805						810				815	
	Ile	Lys	Glu	Ile	Tyr	Lys	Ile	Leu	His	Ala	Leu	Gly	Lys	Ala	Thr	Pro
					820						825				830	
	Ile	Tyr	Leu	Asp	Ile	Leu	Gly									
25					835											
	<210>	8														
	<211>	2715														
	<212>	ДНК														
	<213>	Homo sapiens														
30	<400>	8														
	ggatccgcgt	cggagatgga	tgtctctctt	tgcccagcca	agtgtagttt	ctggcggatt										60
	ttcttgctgg	gaagcgtctg	gctggactat	gtgggctccg	tgctggcttg	ccctgcaa										120
	tgtgtctgca	gcaagactga	gatcaattgc	cggcggccgg	acgatgggaa	cctcttcccc										180
	ctcctggaag	ggcaggattc	agggaacagc	aatgggaacg	ccaatatcaa	catcacggac										240
35	atctcaagga	atatcacttc	catacacata	gagaactggc	gcagtcttca	cacgctcaac										300
	gccgtggaca	tggagctcta	caccggactt	caaaagctga	ccatcaagaa	ctcaggactt										360
	cggagcattc	agcccagagc	ctttgccaag	aacccccatt	tgcgttatat	aaacctgtca										420
	agtaaccggc	tcaccacact	ctcgtggcag	ctcttccaga	cgctgagtct	tcgggaattg										480
	cagttggagc	agaacttttt	caactgcagc	tgtgacatcc	gctggatgca	gctctggcag										540
40	gagcaggggg	aggccaagct	caacagccag	aacctctact	gcatcaatgc	tgatggctcc										600
	cagcttcctc	tcttccgcat	gaacatcagt	cagtgtgacc	ttcctgagat	cagcgtgagc										660
	cacgtcaacc	tgaccgtacg	agagggtgac	aatgctgtta	tcacttgcaa	tggtcttgga										720
	tcaccccttc	ctgatgtgga	ctggatagtc	actgggctgc	agtccatcaa	cactcaccag										780
	accaatctga	actggaccaa	tgttcatgcc	atcaacttga	cgctggtgaa	tgtgacgagt										840
45	gaggacaatg	gcttcaccct	gacgtgcatt	gcagagaacg	tggtgggcat	gagcaatgcc										900
	agtgttgccc	tactgtctta	ctatccccca	cggtgtggtga	gcctggagga	gcctgagctg										960
	cgcttgagc	actgcacga	gtttgtggtg	cgtggcaacc	ccccaccaac	gctgcactgg										1020
	ctgcacaatg	ggcagcctct	gcgggagtcc	aagatcatcc	atgtggaata	ctaccaagag										1080

ggagagattt ccgagggctg cctgctcttc aacaagccca cccactacaa caatggcaac 1140
 tataccctca ttgccaaaaa cccactgggc acagccaacc agaccatcaa tggccacttc 1200
 ctcaaggagc cctttccaga gagcacggat aactttatct tgtttgacga agtgagtccc 1260
 acacctccta tcaactgtgac ccacaaacca gaagaagaca cttttggggt atccatagca 1320
 5 gttggacttg ctgcttttgc ctgtgtcctg ttggtggttc tcttcgtcat gatcaacaaa 1380
 tatggctcgac ggtccaaatt tggaatgaag ggtcccgtgg ctgtcatcag tggtgaggag 1440
 gactcagcca gccactgca ccacatcaac cacggcatca ccacgccctc gtcactggat 1500
 gccgggcccc acactgtggt cattggcatg actcgcaccc ctgtcattga gaacccccag 1560
 tacttccgtc agggacacaa ctgccacaag ccggacacgt atgtgcagca cattaagagg 1620
 10 agagacatcg tgctgaagcg agaactgggt gagggagcct ttggaaagggt cttcctggcc 1680
 gagtgtctaca acctcagccc gaccaaggac aagatgcttg tggctgtgaa ggccctgaag 1740
 gatccacccc tggtgccccg gaaggatttc cagagggagg ccgagctgct caccaacctg 1800
 cagcatgagc acattgtcaa gttctatgga gtgtgcggcg atggggaccc cctcatcatg 1860
 gtctttgaat acatgaagca tggagacctg aataagttcc tcagggccca tgggccagat 1920
 15 gcaatgatcc ttgtggatgg acagccacgc caggccaagg gtgagctggg gctctcccaa 1980
 atgtccaca ttgccagtca gatcgccctg ggtatggtgt acctggcctc ccagcacttt 2040
 gtgcaccgag acctggccac caggaaactgc ctggttgagg cgaatctgct agtgaagatt 2100
 ggggacttcg gcatgtccag agatgtctac agcacggatt attacaggct ctttaatcca 2160
 tctggaaatg atttttgtat atggtgtgag gtgggaggac acaccatgct ccccatcgc 2220
 20 tggatgcctc ctgaaagcat catgtaccgg aagttcacta cagagagtga tgtatggagc 2280
 ttcggggtga tcctctggga gatcttcacc tatggaaagc agccatgggt ccaactctca 2340
 aacacggagg tcattgagtg cattacccaa ggtcgtgttt tggagcggcc ccgagtctgc 2400
 cccaaagagg tgtacgatgt catgctgggg tgctggcaga gggaaccaca gcagcggttg 2460
 aacatcaagg agatctacaa aatcctccat gctttgggga aggccacccc aatctacctg 2520
 25 gacattcttg gctagtgggt gctggtggtc atgaattcat actctgttgc ctctctctc 2580
 cctgcctcac atctcccttc cacctcaciaa ctcttccat ccttgactga agcgaacatc 2640
 ttcatataaa ctcaagtgcc tgctacacat acaacactga aaaaaggaaa aaaaaagaaa 2700
 aaaaaaaaaa accgc 2715

<210> 9
 30 <211> 720
 <212> PRT
 <213> Искусственная последовательность
 <220>

<223> Последовательность, полученная в результате выравнивания изоформы А
 35 белка TrkA дикого типа и изоформы В белка TrkA дикого типа

<400> 9
 Leu Tyr Ile Glu Asn Gln Gln His Leu Gln His Leu Glu Leu Arg Asp
 1 5 10 15
 Leu Arg Gly Leu Gly Glu Leu Arg Asn Leu Thr Ile Val Lys Ser Gly
 40 20 25 30
 Leu Arg Phe Val Ala Pro Asp Ala Phe His Phe Thr Pro Arg Leu Ser
 35 40 45
 Arg Leu Asn Leu Ser Phe Asn Ala Leu Glu Ser Leu Ser Trp Lys Thr
 50 55 60
 45 Val Gln Gly Leu Ser Leu Gln Glu Leu Val Leu Ser Gly Asn Pro Leu
 65 70 75 80
 His Cys Ser Cys Ala Leu Arg Trp Leu Gln Arg Trp Glu Glu Glu Gly
 85 90 95

RU 2744852 C2

	Leu	Gly	Gly	Val	Pro	Glu	Gln	Lys	Leu	Gln	Cys	His	Gly	Gln	Gly	Pro
				100					105					110		
	Leu	Ala	His	Met	Pro	Asn	Ala	Ser	Cys	Gly	Val	Pro	Thr	Leu	Lys	Val
				115				120					125			
5	Gln	Val	Pro	Asn	Ala	Ser	Val	Asp	Val	Gly	Asp	Asp	Val	Leu	Leu	Arg
				130				135				140				
	Cys	Gln	Val	Glu	Gly	Arg	Gly	Leu	Glu	Gln	Ala	Gly	Trp	Ile	Leu	Thr
	145					150					155					160
	Glu	Leu	Glu	Gln	Ser	Ala	Thr	Val	Met	Lys	Ser	Gly	Gly	Leu	Pro	Ser
10					165					170					175	
	Leu	Gly	Leu	Thr	Leu	Ala	Asn	Val	Thr	Ser	Asp	Leu	Asn	Arg	Lys	Asn
				180					185					190		
	Val	Thr	Cys	Trp	Ala	Glu	Asn	Asp	Val	Gly	Arg	Ala	Glu	Val	Ser	Val
				195				200					205			
15	Gln	Val	Asn	Val	Ser	Phe	Pro	Ala	Ser	Val	Gln	Leu	His	Thr	Ala	Val
				210				215				220				
	Glu	Met	His	His	Trp	Cys	Ile	Pro	Phe	Ser	Val	Asp	Gly	Gln	Pro	Ala
	225					230					235					240
	Pro	Ser	Leu	Arg	Trp	Leu	Phe	Asn	Gly	Ser	Val	Leu	Asn	Glu	Thr	Ser
20					245					250				255		
	Phe	Ile	Phe	Thr	Glu	Phe	Leu	Glu	Pro	Ala	Ala	Asn	Glu	Thr	Val	Arg
				260					265				270			
	His	Gly	Cys	Leu	Arg	Leu	Asn	Gln	Pro	Thr	His	Val	Asn	Asn	Gly	Asn
				275				280				285				
25	Tyr	Thr	Leu	Leu	Ala	Ala	Asn	Pro	Phe	Gly	Gln	Ala	Ser	Ala	Ser	Ile
				290			295				300					
	Met	Ala	Ala	Phe	Met	Asp	Asn	Pro	Phe	Glu	Phe	Asn	Pro	Glu	Asp	Pro
	305					310					315					320
	Ile	Pro	Asp	Thr	Asn	Ser	Thr	Ser	Gly	Asp	Pro	Val	Glu	Lys	Lys	Asp
30					325					330				335		
	Glu	Thr	Pro	Phe	Gly	Val	Ser	Val	Ala	Val	Gly	Leu	Ala	Val	Phe	Ala
				340					345				350			
	Cys	Leu	Phe	Leu	Ser	Thr	Leu	Leu	Leu	Val	Leu	Asn	Lys	Cys	Gly	Arg
				355				360				365				
35	Arg	Asn	Lys	Phe	Gly	Ile	Asn	Arg	Pro	Ala	Val	Leu	Ala	Pro	Glu	Asp
				370			375				380					
	Gly	Leu	Ala	Met	Ser	Leu	His	Phe	Met	Thr	Leu	Gly	Gly	Ser	Ser	Leu
	385					390				395						400
	Ser	Pro	Thr	Glu	Gly	Lys	Gly	Ser	Gly	Leu	Gln	Gly	His	Ile	Ile	Glu
40					405					410				415		
	Asn	Pro	Gln	Tyr	Phe	Ser	Asp	Ala	Cys	Val	His	His	Ile	Lys	Arg	Arg
				420				425				430				
	Asp	Ile	Val	Leu	Lys	Trp	Glu	Leu	Gly	Glu	Gly	Ala	Phe	Gly	Lys	Val
				435				440				445				
45	Phe	Leu	Ala	Glu	Cys	His	Asn	Leu	Leu	Pro	Glu	Gln	Asp	Lys	Met	Leu
				450			455				460					
	Val	Ala	Val	Lys	Ala	Leu	Lys	Glu	Ala	Ser	Glu	Ser	Ala	Arg	Gln	Asp
	465					470				475				480		

	Phe	Gln	Arg	Glu	Ala	Glu	Leu	Leu	Thr	Met	Leu	Gln	His	Gln	His	Ile
						485					490				495	
	Val	Arg	Phe	Phe	Gly	Val	Cys	Thr	Glu	Gly	Arg	Pro	Leu	Leu	Met	Val
					500				505				510			
5	Phe	Glu	Tyr	Met	Arg	His	Gly	Asp	Leu	Asn	Arg	Phe	Leu	Arg	Ser	His
					515			520					525			
	Gly	Pro	Asp	Ala	Lys	Leu	Leu	Ala	Gly	Gly	Glu	Asp	Val	Ala	Pro	Gly
					530			535				540				
	Pro	Leu	Gly	Leu	Gly	Gln	Leu	Leu	Ala	Val	Ala	Ser	Gln	Val	Ala	Ala
10	545					550					555					560
	Gly	Met	Val	Tyr	Leu	Ala	Gly	Leu	His	Phe	Val	His	Arg	Asp	Leu	Ala
					565					570					575	
	Thr	Arg	Asn	Cys	Leu	Val	Gly	Gln	Gly	Leu	Val	Val	Lys	Ile	Gly	Asp
					580				585					590		
15	Phe	Gly	Met	Ser	Arg	Asp	Ile	Tyr	Ser	Thr	Asp	Tyr	Tyr	Arg	Val	Gly
					595			600					605			
	Gly	Arg	Thr	Met	Leu	Pro	Ile	Arg	Trp	Met	Pro	Pro	Glu	Ser	Ile	Leu
					610			615				620				
	Tyr	Arg	Lys	Phe	Thr	Thr	Glu	Ser	Asp	Val	Trp	Ser	Phe	Gly	Val	Val
20	625					630				635						640
	Leu	Trp	Glu	Ile	Phe	Thr	Tyr	Gly	Lys	Gln	Pro	Trp	Tyr	Gln	Leu	Ser
					645					650					655	
	Asn	Thr	Glu	Ala	Ile	Asp	Cys	Ile	Thr	Gln	Gly	Arg	Glu	Leu	Glu	Arg
					660				665					670		
25	Pro	Arg	Ala	Cys	Pro	Pro	Glu	Val	Tyr	Ala	Ile	Met	Arg	Gly	Cys	Trp
					675			680					685			
	Gln	Arg	Glu	Pro	Gln	Gln	Arg	His	Ser	Ile	Lys	Asp	Val	His	Ala	Arg
					690			695				700				
	Leu	Gln	Ala	Leu	Ala	Gln	Ala	Pro	Pro	Val	Tyr	Leu	Asp	Val	Leu	Gly
30	705					710				715						720

(57) Формула изобретения

1. Способ лечения субъекта, имеющего ассоциированную с Trk злокачественную опухоль, включающий:

35 (a) введение одной или нескольких доз первого ингибитора Trk субъекту в течение некоторого периода времени, где первый ингибитор Trk представляет собой сульфат (S)- N-(5-((R)-2-(2,5-дифторфенил)пирролидин-1-ил)пиразоло[1,5-a]пиримидин-3-ил)-3-гидроксипирролидин-1-карбоксамид; и

(b) после (a) подвергание лечению, включающему второй ингибитор Trk, субъекта, где второй ингибитор Trk представляет собой (6R,15R)-9-фтор-15-метил-2,11,16,20,21,24-гексаазапентацикло[16.5.2.02,6.07,12.021,25]пентакоза-1(24),7,9,11,18(25),19,22-гептен-17-он;

где ассоциированная с Trk злокачественная опухоль является устойчивой к первому ингибитору Trk.

45 2. Способ по п. 1, где субъект после введения одной или нескольких доз первого ингибитора Trk на стадии (a) идентифицирован как имеющий (i) по меньшей мере одну точечную мутацию в гене NTRK1, приводящую к экспрессии полипептида киназы TrkA, содержащего мутацию в одном или нескольких положениях(положениях) аминокислот,

выбранных из группы, состоящей из: 517, 542, 568, 573, 589, 595, 599, 600, 602, 646, 656, 657, 667 и 676, и/или (ii) по меньшей мере одну точечную мутацию в гене NTRK2, приводящую к экспрессии полипептида киназы TrkB, содержащего мутацию в одном или нескольких положении(положениях) аминокислот, выбранных из группы, состоящей из: 545, 570, 596, 601, 617, 623, 624, 628, 630, 672, 682, 683, 693 и 702, и/или (iii) по меньшей мере одну точечную мутацию в гене NTRK3, приводящую к экспрессии полипептида киназы TrkC, содержащего мутацию в одном или нескольких положении(положениях) аминокислот, выбранных из группы, состоящей из: 545, 570, 596, 601, 617, 623, 624, 628, 630, 675, 685, 686, 696 и 705.

3. Способ по п. 2, где по меньшей мере одна точечная мутация представляет собой (i) по меньшей мере одну точечную мутацию в гене NTRK1, приводящую к экспрессии полипептида киназы TrkA, содержащего мутацию, выбранную из группы, состоящей из: G517R, A542V, Q568x, V573M, F589L, F589C, G595S, G595R, F600L, R602x, F646V, C656Y, C656F, L657V, G667C, G667S и Y676S, и/или (ii) по меньшей мере одну точечную мутацию в гене NTRK2, приводящую к экспрессии полипептида киназы TrkB, содержащего мутацию, выбранную из группы, состоящей из: G545R, A570V, Q596E, Q596P, V601G, F617L, F617C, F617I, G623S, G623R, D624V, F628x, R630K, F672x, C682Y, C682F, L683V, G693S и Y702x, и/или (iii) по меньшей мере одну точечную мутацию в гене NTRK3, приводящую к экспрессии полипептида киназы TrkC, содержащего мутацию в одном или нескольких положении(положениях) аминокислот, выбранных из группы, состоящей из: G545R, A570V, Q596x, F617L, G623R, D624V, F628x, R630x, F675x, C685Y, C685F, L686V, G696A и Y705x.

4. Способ по п. 1, где субъект после введения одной или нескольких доз первого ингибитора Trk на стадии (a) идентифицирован как имеющий (i) по меньшей мере одну точечную мутацию в гене NTRK1, приводящую к экспрессии полипептида киназы TrkA, содержащего мутацию в положении аминокислоты 595, и/или (ii) по меньшей мере одну точечную мутацию в гене NTRK3, приводящую к экспрессии полипептида киназы TrkC, содержащего мутацию в положении аминокислоты 623, где по меньшей мере одна мутация участка solvent front экспрессируется при ассоциированной с Trk злокачественной опухоли.

5. Способ по п. 4, где по меньшей мере одна точечная мутация представляет собой G595R TrkA, G623R TrkC или обе.

6. Способ по п. 1, где ассоциированная с Trk злокачественная опухоль выбрана из группы, состоящей из: аденокарциномы, адренокортикальной карциномы, нейробластомы надпочечника, плоскоклеточной карциномы ануса, аденокарциномы аппендикса, уротелиальной карциномы мочевого пузыря, аденокарциномы желчных протоков, карциномы мочевого пузыря, уротелиальной карциномы мочевого пузыря, хордомы кости, хронического лимфоцитарного лейкоза костного мозга, острого нелимфоцитарного миелоцитарного лейкоза костного мозга, лимфопролиферативного заболевания костного мозга, множественной миеломы костного мозга, саркомы кости, астроцитомы головного мозга, глиобластомы головного мозга, медуллобластомы головного мозга, менингиомы головного мозга, олигодендроглиомы головного мозга, аденокистозной карциномы молочной железы, карциномы молочной железы, карциномы протоков молочной железы in situ, инвазивной карциномы протоков молочной железы, инвазивной лобулярной карциномы молочной железы, метастатической карциномы молочной железы, нейроэндокринной карциномы шейки матки, плоскоклеточной карциномы шейки матки, аденокарциномы ободочной кишки, карциноидной опухоли ободочной кишки, аденокарциномы двенадцатиперстной кишки, эндометриоидной

опухоли, аденокарциномы пищевода, внутриглазной меланомы, внутриглазной плоскоклеточной карциномы, карциномы слезных протоков глаза, серозной карциномы фаллопиевой трубы, аденокарциномы желчного пузыря, гломусной опухоли желчного пузыря, аденокарциномы желудочно-пищеводного соединения, аденокистозной карциномы головы и шеи, карциномы головы и шеи, нейробластомы головы и шеи, плоскоклеточной карциномы головы и шеи, хромофорной карциномы почки, медуллярной карциномы почки, почечноклеточного рака, папиллярной карциномы почки, саркоматоидной карциномы почки, уротелиальной карциномы почки, лимфоцитарного лейкоза, холангиокарциномы печени, печеночноклеточной карциномы, аденокарциномы легких, аденосквамозной карциномы легких, атипичного карциноида легких, карциносаркомы легких, крупноклеточной нейроэндокринной карциномы легких, немелкоклеточной карциномы легких, саркомы легких, саркоматоидной карциномы легких, мелкоклеточной карциномы легких, недифференцированной мелкоклеточной карциномы легких, плоскоклеточной карциномы легких, диффузной крупноклеточной В-клеточной лимфомы лимфатических узлов, фолликулярной лимфомы лимфатических узлов, медиастинальной В-клеточной лимфомы лимфатических узлов, плазмобластной лимфомы лимфатических узлов, аденокарциномы легких, фолликулярной лимфомы, неходжскинской лимфомы, недифференцированной карциномы носоглотки и околоносовых пазух, карциномы яичников, карциносаркомы яичников, светлоклеточной карциномы яичников, эпителиальной карциномы яичников, гранулезоклеточной опухоли яичников, серозной карциномы яичников, карциномы поджелудочной железы, аденокарциномы протоков поджелудочной железы, нейроэндокринной карциномы поджелудочной железы, перитонеальной мезотелиомы, перитонеальной серозной карциномы, хориокарциномы плаценты, мезотелиомы плевры, ацинарной аденокарциномы предстательной железы, карциномы предстательной железы, аденокарциномы прямой кишки, плоскоклеточной карциномы прямой кишки, аднексальной карциномы кожи, базальноклеточной карциномы кожи, меланомы кожи, карциномы кожи из клеток Меркеля, плоскоклеточной карциномы кожи, аденокарциномы тонкого кишечника, стромальных опухолей желудочно-кишечного тракта (GIST) с локализацией в тонком кишечнике, ангиосаркомы мягких тканей, саркомы Юинга мягких тканей, гемангиоэндотелиомы мягких тканей, воспалительной миофибробластической опухоли мягких тканей, лейомиосаркомы мягких тканей, липосаркомы мягких тканей, нейробластомы мягких тканей, параганглиомы мягких тканей, опухоли из периваскулярных эпителиоидных клеток мягких тканей, саркомы мягких тканей, синовиальной саркомы мягких тканей, аденокарциномы желудка, аденокарциномы желудка диффузного типа, аденокарциномы желудка кишечного типа, аденокарциномы желудка кишечного типа, лейомиосаркомы желудка, карциномы тимуса, лимфоцитарной тимомы, папиллярной карциномы щитовидной железы, неизвестной первичной аденокарциномы, неизвестной первичной карциномы, неизвестного первичного злокачественного новообразования, неизвестной первичной меланомы, неизвестной первичной саркоматоидной карциномы, неизвестной первичной плоскоклеточной карциномы, неизвестной недифференцированной нейроэндокринной карциномы, неизвестной первичной недифференцированной мелкоклеточной карциномы, карциносаркомы матки, эндометриальной аденокарциномы матки, эндометриальной эндометриоидной аденокарциномы матки, папиллярной серозной эндометриальной аденокарциномы матки и лейомиосаркомы матки.

7. Способ лечения субъекта, имеющего ассоциированную с Trk злокачественную опухоль, включающий введение субъекту одной или нескольких доз первого ингибитора

Trk и (6R,15R)-9-фтор-15-метил-2,11,16,20,21,24-гексаазапентацикло [16.5.2.02,6.07,12.021,25]пентакоза-1(24),7,9,11,18(25),19,22-гептен-17-она, где первый ингибитор Trk представляет собой сульфат (S)-N-(5-((R)-2-(2,5-дифторфенил)пирролидин-1-ил)пиразоло[1,5-a]пиримидин-3-ил)-3-гидроксипирролидин-1-карбоксамид;

где ассоциированная с Trk злокачественная опухоль является устойчивой к первому ингибитору Trk.

8. Способ по п. 7, где субъекту ранее вводили одну или несколько доз первого ингибитора Trk до того, как он был идентифицирован как имеющий по меньшей мере одну точечную мутацию, где по меньшей мере одна точечная мутация представляет собой (i) по меньшей мере одну точечную мутацию в гене NTRK1, приводящую к экспрессии полипептида киназы TrkA, содержащего мутацию в одном или нескольких положениях(положениях) аминокислот, выбранных из группы, состоящей из: 517, 542, 568, 573, 589, 595, 599, 600, 602, 646, 656, 657, 667 и 676, и/или (ii) по меньшей мере одну точечную мутацию в гене NTRK2, приводящую к экспрессии полипептида киназы TrkB, содержащего мутацию в одном или нескольких положениях(положениях) аминокислот, выбранных из группы, состоящей из: 545, 570, 596, 601, 617, 623, 624, 628, 630, 672, 682, 683, 693 и 702, и/или (iii) по меньшей мере одну точечную мутацию в гене NTRK3, приводящую к экспрессии полипептида киназы TrkC, содержащего мутацию в одном или нескольких положениях(положениях) аминокислот, выбранных из группы, состоящей из: 545, 570, 596, 601, 617, 623, 624, 628, 630, 675, 685, 686, 696 и 705.

9. Способ по п. 8, где по меньшей мере одна точечная мутация представляет собой (i) по меньшей мере одну точечную мутацию в гене NTRK1, приводящую к экспрессии полипептида киназы TrkA, содержащего мутацию, выбранную из группы, состоящей из: G517R, A542V, Q568H, V573M, F589L, F589C, G595S, G595R, F600L, R602H, F646V, C656Y, C656F, L657V, G667C, G667S и Y676S, и/или (ii) по меньшей мере одну точечную мутацию в гене NTRK2, приводящую к экспрессии полипептида киназы TrkB, содержащего мутацию, выбранную из группы, состоящей из: G545R, A570V, Q596E, Q596P, V601G, F617L, F617C, F617I, G623S, G623R, D624V, F628H, R630K, F672H, C682Y, C682F, L683V, G693S и Y702H, и/или (iii) по меньшей мере одну точечную мутацию в гене NTRK3, приводящую к экспрессии полипептида киназы TrkC, содержащего мутацию в одном или нескольких положениях(положениях) аминокислот, выбранных из группы, состоящей из: G545R, A570V, Q596H, F617L, G623R, D624V, F628H, R630H, F675H, C685Y, C685F, L686V, G696A и Y705H.

10. Способ по п. 7, где субъекту ранее вводили одну или несколько доз первого ингибитора Trk до того, как он был идентифицирован как имеющий по меньшей мере одну мутацию, где по меньшей мере одна мутация представляет собой (i) по меньшей мере одну точечную мутацию в гене NTRK1, приводящую к экспрессии полипептида киназы TrkA, содержащего мутацию в положении аминокислоты 595, и/или (ii) по меньшей мере одну точечную мутацию в гене NTRK3, приводящую к экспрессии полипептида киназы TrkC, содержащего мутацию в положении аминокислоты 623, где по меньшей мере одна мутация экспрессируется при ассоциированной с Trk злокачественной опухоли.

11. Способ по п. 10, где по меньшей мере одна мутация представляет собой G595R TrkA, G623R TrkC или обе.

12. Способ по п. 7, где ассоциированная с Trk злокачественная опухоль выбрана из группы, состоящей из: аденокарциномы, адренокортикальной карциномы, нейробластомы надпочечника, плоскоклеточной карциномы ануса, аденокарциномы

аппендикса, уротелиальной карциномы мочевого пузыря, аденокарциномы желчных протоков, карциномы мочевого пузыря, уротелиальной карциномы мочевого пузыря, хордомы кости, хронического лимфоцитарного лейкоза костного мозга, острого нелимфоцитарного миелоцитарного лейкоза костного мозга, лимфопролиферативного

 5 заболевания костного мозга, множественной миеломы костного мозга, саркомы кости, астроцитомы головного мозга, глиобластомы головного мозга, медуллобластомы головного мозга, менингиомы головного мозга, олигодендроглиомы головного мозга, аденокистозной карциномы молочной железы, карциномы молочной железы, карциномы протоков молочной железы in situ, инвазивной карциномы протоков молочной железы,

 10 инвазивной лобулярной карциномы молочной железы, метапластической карциномы молочной железы, нейроэндокринной карциномы шейки матки, плоскоклеточной карциномы шейки матки, аденокарциномы ободочной кишки, карциноидной опухоли ободочной кишки, аденокарциномы двенадцатиперстной кишки, эндометриоидной опухоли, аденокарциномы пищевода, внутриглазной меланомы, внутриглазной

 15 плоскоклеточной карциномы, карциномы слезных протоков глаза, серозной карциномы фаллопиевой трубы, аденокарциномы желчного пузыря, гломусной опухоли желчного пузыря, аденокарциномы желудочно-пищеводного соединения, аденокистозной карциномы головы и шеи, карциномы головы и шеи, нейробластомы головы и шеи, плоскоклеточной карциномы головы и шеи, хромофорной карциномы почки,

 20 медуллярной карциномы почки, почечноклеточного рака, папиллярной карциномы почки, саркоматоидной карциномы почки, уротелиальной карциномы почки, лимфоцитарного лейкоза, холангиокарциномы печени, печеночноклеточной карциномы, аденокарциномы легких, аденосквамозной карциномы легких, атипичного карциноида легких, карциносаркомы легких, крупноклеточной нейроэндокринной карциномы

 25 легких, мелкоклеточной карциномы легких, саркомы легких, саркоматоидной карциномы легких, мелкоклеточной карциномы легких, недифференцированной мелкоклеточной карциномы легких, плоскоклеточной карциномы легких, диффузной крупноклеточной В-клеточной лимфомы лимфатических узлов, фолликулярной лимфомы лимфатических узлов, медиастинальной В-клеточной лимфомы лимфатических

 30 узлов, плазмобластной лимфомы лимфатических узлов, аденокарциномы легких, фолликулярной лимфомы, неходжскинской лимфомы, недифференцированной карциномы носоглотки и околоносовых пазух, карциномы яичников, карциносаркомы яичников, светлоклеточной карциномы яичников, эпителиальной карциномы яичников, гранулезоклеточной опухоли яичников, серозной карциномы яичников, карциномы

 35 поджелудочной железы, аденокарциномы протоков поджелудочной железы, нейроэндокринной карциномы поджелудочной железы, перитонеальной мезотелиомы, перитонеальной серозной карциномы, хориокарциномы плаценты, мезотелиомы плевры, ацинарной аденокарциномы предстательной железы, карциномы предстательной железы, аденокарциномы прямой кишки, плоскоклеточной карциномы прямой кишки,

 40 аднексальной карциномы кожи, базальноклеточной карциномы кожи, меланомы кожи, карциномы кожи из клеток Меркеля, плоскоклеточной карциномы кожи, аденокарциномы тонкого кишечника, стромальных опухолей желудочно-кишечного тракта (GIST) с локализацией в тонком кишечнике, ангиосаркомы мягких тканей, саркомы Юинга мягких тканей, гемангиоэндотелиомы мягких тканей, воспалительной

 45 миофибробластической опухоли мягких тканей, лейомиосаркомы мягких тканей, липосаркомы мягких тканей, нейробластомы мягких тканей, параганглиомы мягких тканей, опухоли из периваскулярных эпителиоидных клеток мягких тканей, саркомы мягких тканей, синовиальной саркомы мягких тканей, аденокарциномы желудка,

аденокарциномы желудка диффузного типа, аденокарциномы желудка кишечного типа, аденокарциномы желудка кишечного типа, лейомиосаркомы желудка, карциномы тимуса, лимфоцитарной тимомы, папиллярной карциномы щитовидной железы, неизвестной первичной аденокарциномы, неизвестной первичной карциномы, неизвестного первичного злокачественного новообразования, неизвестной первичной меланомы, неизвестной первичной саркоматоидной карциномы, неизвестной первичной плоскоклеточной карциномы, неизвестной недифференцированной нейроэндокринной карциномы, неизвестной первичной недифференцированной мелкоклеточной карциномы, карциносаркомы матки, эндометриальной аденокарциномы матки, эндометриальной эндометриоидной аденокарциномы матки, папиллярной серозной эндометриальной аденокарциномы матки и лейомиосаркомы матки.

13. Способ лечения субъекта, имеющего ассоциированную с Trk злокачественную опухоль, включающий:

(а) введение одной или нескольких доз первого ингибитора Trk субъекту в течение некоторого периода времени, где первый ингибитор Trk представляет собой (N-[5-(3,5-дифторбензил)-1H-индазол-3-ил]-4-(4-метилпиперазин-1-ил)-2-(тетрагидропиран-4-иламино)-бензамид); и

(b) после (а) подвергание лечению, включающему второй ингибитор Trk, субъекта, где второй ингибитор Trk представляет собой (6R,15R)-9-фтор-15-метил-2,11,16,20,21,24-гексаазапентацикло[16.5.2.02,6.07,12.021,25]пентакоза-1(24),7,9,11,18(25),19,22-гептен-17-он;

где ассоциированная с Trk злокачественная опухоль является устойчивой к первому ингибитору Trk.

14. Способ по п. 13, где субъект после введения одной или нескольких доз первого ингибитора Trk на стадии (а) идентифицирован как имеющий (i) по меньшей мере одну точечную мутацию в гене NTRK1, приводящую к экспрессии полипептида киназы TrkA, содержащего мутацию в одном или нескольких положении(положениях) аминокислот, выбранных из группы, состоящей из: 517, 542, 568, 573, 589, 595, 599, 600, 602, 646, 656, 657, 667 и 676, и/или (ii) по меньшей мере одну точечную мутацию в гене NTRK2, приводящую к экспрессии полипептида киназы TrkB, содержащего мутацию в одном или нескольких положении(положениях) аминокислот, выбранных из группы, состоящей из: 545, 570, 596, 601, 617, 623, 624, 628, 630, 672, 682, 683, 693 и 702, и/или (iii) по меньшей мере одну точечную мутацию в гене NTRK3, приводящую к экспрессии полипептида киназы TrkC, содержащего мутацию в одном или нескольких положении(положениях) аминокислот, выбранных из группы, состоящей из: 545, 570, 596, 601, 617, 623, 624, 628, 630, 675, 685, 686, 696 и 705.

15. Способ по п. 14, где по меньшей мере одна точечная мутация представляет собой (i) по меньшей мере одну точечную мутацию в гене NTRK1, приводящую к экспрессии полипептида киназы TrkA, содержащего мутацию, выбранную из группы, состоящей из: G517R, A542V, Q568x, V573M, F589L, F589C, G595S, G595R, F600L, R602x, F646V, C656Y, C656F, L657V, G667C, G667S и Y676S, и/или (ii) по меньшей мере одну точечную мутацию в гене NTRK2, приводящую к экспрессии полипептида киназы TrkB, содержащего мутацию, выбранную из группы, состоящей из: G545R, A570V, Q596E, Q596P, V601G, F617L, F617C, F617I, G623S, G623R, D624V, F628x, R630K, F672x, C682Y, C682F, L683V, G693S и Y702x, и/или (iii) по меньшей мере одну точечную мутацию в гене NTRK3, приводящую к экспрессии полипептида киназы TrkC, содержащего мутацию в одном или нескольких положении(положениях) аминокислот, выбранных из группы, состоящей из: G545R, A570V, Q596x, F617L, G623R, D624V, F628x, R630x, F675x, C685Y,

C685F, L686V, G696A и Y705х.

16. Способ по п. 13, где субъект после введения одной или нескольких доз первого ингибитора Trk на стадии (а) идентифицирован как имеющий (i) по меньшей мере одну точечную мутацию в гене NTRK1, приводящую к экспрессии полипептида киназы TrkA, содержащего мутацию в положении аминокислоты 595, и/или (ii) по меньшей мере одну точечную мутацию в гене NTRK3, приводящую к экспрессии полипептида киназы TrkC, содержащего мутацию в положении аминокислоты 623, где по меньшей мере одна мутация экспрессируется при ассоциированной с Trk злокачественной опухоли.

17. Способ по п. 16, где по меньшей мере одна точечная мутация представляет собой G595R TrkA, G623R TrkC или обе.

18. Способ по п. 13, где ассоциированная с Trk злокачественная опухоль выбрана из группы, состоящей из: аденокарциномы, адренокортикальной карциномы, нейробластомы надпочечника, плоскоклеточной карциномы ануса, аденокарциномы аппендикса, уротелиальной карциномы мочевого пузыря, аденокарциномы желчных протоков, карциномы мочевого пузыря, уротелиальной карциномы мочевого пузыря, хордомы кости, хронического лимфоцитарного лейкоза костного мозга, острого нелимфоцитарного миелоцитарного лейкоза костного мозга, лимфопролиферативного заболевания костного мозга, множественной миеломы костного мозга, саркомы кости, астроцитомы головного мозга, глиобластомы головного мозга, медуллобластомы головного мозга, менингиомы головного мозга, олигодендроглиомы головного мозга, аденокистозной карциномы молочной железы, карциномы молочной железы, карциномы протоков молочной железы in situ, инвазивной карциномы протоков молочной железы, инвазивной лобулярной карциномы молочной железы, метапластической карциномы молочной железы, нейроэндокринной карциномы шейки матки, плоскоклеточной карциномы шейки матки, аденокарциномы ободочной кишки, карциноидной опухоли ободочной кишки, аденокарциномы двенадцатиперстной кишки, эндометриоидной опухоли, аденокарциномы пищевода, внутриглазной меланомы, внутриглазной плоскоклеточной карциномы, карциномы слезных протоков глаза, серозной карциномы фаллопиевой трубы, аденокарциномы желчного пузыря, гломусной опухоли желчного пузыря, аденокарциномы желудочно-пищеводного соединения, аденокистозной карциномы головы и шеи, карциномы головы и шеи, нейробластомы головы и шеи, плоскоклеточной карциномы головы и шеи, хромофорной карциномы почки, медуллярной карциномы почки, почечноклеточного рака, папиллярной карциномы почки, саркоматоидной карциномы почки, уротелиальной карциномы почки, лимфоцитарного лейкоза, холангиокарциномы печени, печеночноклеточной карциномы, аденокарциномы легких, аденосквамозной карциномы легких, атипичного карциноида легких, карциносаркомы легких, крупноклеточной нейроэндокринной карциномы легких, немелкоклеточной карциномы легких, саркомы легких, саркоматоидной карциномы легких, мелкоклеточной карциномы легких, недифференцированной мелкоклеточной карциномы легких, плоскоклеточной карциномы легких, диффузной крупноклеточной В-клеточной лимфомы лимфатических узлов, фолликулярной лимфомы лимфатических узлов, медиастинальной В-клеточной лимфомы лимфатических узлов, плазмобластной лимфомы лимфатических узлов, аденокарциномы легких, фолликулярной лимфомы, неходжгинской лимфомы, недифференцированной карциномы носоглотки и околоносовых пазух, карциномы яичников, карциносаркомы яичников, светлоклеточной карциномы яичников, эпителиальной карциномы яичников, гранулезоклеточной опухоли яичников, серозной карциномы яичников, карциномы поджелудочной железы, аденокарциномы протоков поджелудочной железы,

нейроэндокринной карциномы поджелудочной железы, перитонеальной мезотелиомы, перитонеальной серозной карциномы, хориокарциномы плаценты, мезотелиомы плевры, ацинарной аденокарциномы предстательной железы, карциномы предстательной железы, аденокарциномы прямой кишки, плоскоклеточной карциномы прямой кишки, аднексальной карциномы кожи, базальноклеточной карциномы кожи, меланомы кожи, карциномы кожи из клеток Меркеля, плоскоклеточной карциномы кожи, аденокарциномы тонкого кишечника, стромальных опухолей желудочно-кишечного тракта (GIST) с локализацией в тонком кишечнике, ангиосаркомы мягких тканей, саркомы Юинга мягких тканей, гемангиоэндотелиомы мягких тканей, воспалительной миофибробластической опухоли мягких тканей, лейомиосаркомы мягких тканей, липосаркомы мягких тканей, нейробластомы мягких тканей, параганглиомы мягких тканей, опухоли из периваскулярных эпителиоидных клеток мягких тканей, саркомы мягких тканей, синовиальной саркомы мягких тканей, аденокарциномы желудка, аденокарциномы желудка диффузного типа, аденокарциномы желудка кишечного типа, аденокарциномы желудка кишечного типа, лейомиосаркомы желудка, карциномы тимуса, лимфоцитарной тимомы, папиллярной карциномы щитовидной железы, неизвестной первичной аденокарциномы, неизвестной первичной карциномы, неизвестного первичного злокачественного новообразования, неизвестной первичной меланомы, неизвестной первичной саркоматоидной карциномы, неизвестной первичной плоскоклеточной карциномы, неизвестной недифференцированной нейроэндокринной карциномы, неизвестной первичной недифференцированной мелкоклеточной карциномы, карциносаркомы матки, эндометриальной аденокарциномы матки, эндометриальной эндометриоидной аденокарциномы матки, папиллярной серозной эндометриальной аденокарциномы матки и лейомиосаркомы матки.

19. Способ лечения субъекта, имеющего ассоциированную с Trk злокачественную опухоль, включающий введение субъекту одной или нескольких доз первого ингибитора Trk и (6R,15R)-9-фтор-15-метил-2,11,16,20,21,24-гексаазапентацикло [16.5.2.02,6.07,12.021,25]пентакоза-1(24),7,9,11,18(25),19,22-гептен-17-она, где первый ингибитор Trk представляет собой (N-[5-(3,5-дифторбензил)-1H-индазол-3-ил]-4-(4-метилпиперазин-1-ил)-2-(тетрагидропиран-4-иламино)-бензамид);

где ассоциированная с Trk злокачественная опухоль является устойчивой к первому ингибитору Trk.

20. Способ по п. 19, где субъекту ранее вводили одну или несколько доз первого ингибитора Trk до того, как он был идентифицирован как имеющий по меньшей мере одну точечную мутацию, где по меньшей мере одна точечная мутация представляет собой (i) по меньшей мере одну точечную мутацию в гене NTRK1, приводящую к экспрессии полипептида киназы TrkA, содержащего мутацию в одном или нескольких положении(положениях) аминокислот, выбранных из группы, состоящей из: 517, 542, 568, 573, 589, 595, 599, 600, 602, 646, 656, 657, 667 и 676, и/или (ii) по меньшей мере одну точечную мутацию в гене NTRK2, приводящую к экспрессии полипептида киназы TrkB, содержащего мутацию в одном или нескольких положении(положениях) аминокислот, выбранных из группы, состоящей из: 545, 570, 596, 601, 617, 623, 624, 628, 630, 672, 682, 683, 693 и 702, и/или (iii) по меньшей мере одну точечную мутацию в гене NTRK3, приводящую к экспрессии полипептида киназы TrkC, содержащего мутацию в одном или нескольких положении(положениях) аминокислот, выбранных из группы, состоящей из: 545, 570, 596, 601, 617, 623, 624, 628, 630, 675, 685, 686, 696 и 705.

21. Способ по п. 20, где по меньшей мере одна точечная мутация представляет собой (i) по меньшей мере одну точечную мутацию в гене NTRK1, приводящую к экспрессии

полипептида киназы TrkA, содержащего мутацию, выбранную из группы, состоящей из: G517R, A542V, Q568x, V573M, F589L, F589C, G595S, G595R, F600L, R602x, F646V, C656Y, C656F, L657V, G667C, G667S и Y676S, и/или (ii) по меньшей мере одну точечную мутацию в гене NTRK2, приводящую к экспрессии полипептида киназы TrkB,

5 содержащего мутацию, выбранную из группы, состоящей из: G545R, A570V, Q596E, Q596P, V601G, F617L, F617C, F617I, G623S, G623R, D624V, F628x, R630K, F672x, C682Y, C682F, L683V, G693S и Y702x, и/или (iii) по меньшей мере одну точечную мутацию в гене NTRK3, приводящую к экспрессии полипептида киназы TrkC, содержащего мутацию в одном или нескольких положении(положениях) аминокислот, выбранных из группы, состоящей из: G545R, A570V, Q596x, F617L, G623R, D624V, F628x, R630x, F675x, C685Y, C685F, L686V, G696A и Y705x.

22. Способ по п. 19, где субъекту ранее вводили одну или несколько доз первого ингибитора Trk до того, как он был идентифицирован как имеющий по меньшей мере одну мутацию, где по меньшей мере одна мутация представляет собой (i) по меньшей мере одну точечную мутацию в гене NTRK1, приводящую к экспрессии полипептида киназы TrkA, содержащего мутацию в положении аминокислоты 595, и/или (ii) по меньшей мере одну точечную мутацию в гене NTRK3, приводящую к экспрессии полипептида киназы TrkC, содержащего мутацию в положении аминокислоты 623, где по меньшей мере одна мутация экспрессируется при ассоциированной с Trk злокачественной опухоли.

23. Способ по п. 22, где по меньшей мере одна мутация представляет собой G595R TrkA, G623R TrkC или обе.

24. Способ по п. 19, где ассоциированная с Trk злокачественная опухоль выбрана из группы, состоящей из: аденокарциномы, адренокортикальной карциномы, 25 нейробластомы надпочечника, плоскоклеточной карциномы ануса, аденокарциномы аппендикса, уротелиальной карциномы мочевого пузыря, аденокарциномы желчных протоков, карциномы мочевого пузыря, уротелиальной карциномы мочевого пузыря, хордомы кости, хронического лимфоцитарного лейкоза костного мозга, острого нелимфоцитарного миелоцитарного лейкоза костного мозга, лимфопролиферативного 30 заболевания костного мозга, множественной миеломы костного мозга, саркомы кости, астроцитомы головного мозга, глиобластомы головного мозга, медуллобластомы головного мозга, менингиомы головного мозга, олигодендроглиомы головного мозга, аденокистозной карциномы молочной железы, карциномы молочной железы, карциномы протоков молочной железы in situ, инвазивной карциномы протоков молочной железы, инвазивной лобулярной карциномы молочной железы, метастатической карциномы 35 молочной железы, нейроэндокринной карциномы шейки матки, плоскоклеточной карциномы шейки матки, аденокарциномы ободочной кишки, карциноидной опухоли ободочной кишки, аденокарциномы двенадцатиперстной кишки, эндометриоидной опухоли, аденокарциномы пищевода, внутриглазной меланомы, внутриглазной 40 плоскоклеточной карциномы, карциномы слезных протоков глаза, серозной карциномы фаллопиевой трубы, аденокарциномы желчного пузыря, гломусной опухоли желчного пузыря, аденокарциномы желудочно-пищеводного соединения, аденокистозной карциномы головы и шеи, карциномы головы и шеи, нейробластомы головы и шеи, плоскоклеточной карциномы головы и шеи, хромофорной карциномы почки, 45 медуллярной карциномы почки, почечноклеточного рака, папиллярной карциномы почки, саркоматоидной карциномы почки, уротелиальной карциномы почки, лимфоцитарного лейкоза, холангиокарциномы печени, печеночноклеточной карциномы, аденокарциномы легких, аденосквамозной карциномы легких, атипичного карциноида

легких, карциносаркомы легких, крупноклеточной нейроэндокринной карциномы легких, немелкоклеточной карциномы легких, саркомы легких, саркоматоидной карциномы легких, мелкоклеточной карциномы легких, недифференцированной мелкоклеточной карциномы легких, плоскоклеточной карциномы легких, диффузной крупноклеточной В-клеточной лимфомы лимфатических узлов, фолликулярной лимфомы лимфатических узлов, медиастинальной В-клеточной лимфомы лимфатических узлов, плазмобластной лимфомы лимфатических узлов, аденокарциномы легких, фолликулярной лимфомы, неходжскинской лимфомы, недифференцированной карциномы носоглотки и околоносовых пазух, карциномы яичников, карциносаркомы яичников, светлоклеточной карциномы яичников, эпителиальной карциномы яичников, гранулезоклеточной опухоли яичников, серозной карциномы яичников, карциномы поджелудочной железы, аденокарциномы протоков поджелудочной железы, нейроэндокринной карциномы поджелудочной железы, перитонеальной мезотелиомы, перитонеальной серозной карциномы, хориокарциномы плаценты, мезотелиомы плевры, ацинарной аденокарциномы предстательной железы, карциномы предстательной железы, аденокарциномы прямой кишки, плоскоклеточной карциномы прямой кишки, аднексальной карциномы кожи, базальноклеточной карциномы кожи, меланомы кожи, карциномы кожи из клеток Меркеля, плоскоклеточной карциномы кожи, аденокарциномы тонкого кишечника, стромальных опухолей желудочно-кишечного тракта (GIST) с локализацией в тонком кишечнике, ангиосаркомы мягких тканей, саркомы Юинга мягких тканей, гемангиоэндотелиомы мягких тканей, воспалительной миофибробластической опухоли мягких тканей, лейомиосаркомы мягких тканей, липосаркомы мягких тканей, нейробластомы мягких тканей, параганглиомы мягких тканей, опухоли из периваскулярных эпителиоидных клеток мягких тканей, саркомы мягких тканей, синовиальной саркомы мягких тканей, аденокарциномы желудка, аденокарциномы желудка диффузного типа, аденокарциномы желудка кишечного типа, аденокарциномы желудка кишечного типа, лейомиосаркомы желудка, карциномы тимуса, лимфоцитарной тимомы, папиллярной карциномы щитовидной железы, неизвестной первичной аденокарциномы, неизвестной первичной карциномы, неизвестного первичного злокачественного новообразования, неизвестной первичной меланомы, неизвестной первичной саркоматоидной карциномы, неизвестной первичной плоскоклеточной карциномы, неизвестной недифференцированной нейроэндокринной карциномы, неизвестной первичной недифференцированной мелкоклеточной карциномы, карциносаркомы матки, эндометриальной аденокарциномы матки, эндометриальной эндометриоидной аденокарциномы матки, папиллярной серозной эндометриальной аденокарциномы матки и лейомиосаркомы матки.

25. Способ лечения субъекта, имеющего ассоциированную с Trk злокачественную опухоль, включающий введение субъекту одной или нескольких доз (6R,15R)-9-фтор-15-метил-2,11,16,20,21,24-гексаазапентацикло[16.5.2.02,6.07,12.021,25]пентакоза-1 (24),7,9,11,18(25),19,22-гептен-17-она, где ассоциированная с Trk злокачественная опухоль является устойчивой или развила устойчивость к первому ингибитору Trk, который представляет собой сульфат (S)-N-(5-((R)-2-(2,5-дифторфенил)пирролидин-1-ил)пиразоло [1,5-a]пиримидин-3-ил)-3-гидроксипирролидин-1-карбоксамида.

26. Способ по п. 25, где субъекту ранее вводили одну или несколько доз первого ингибитора Trk до того, как он был идентифицирован как имеющий по меньшей мере одну точечную мутацию, где по меньшей мере одна точечная мутация представляет собой (i) по меньшей мере одну точечную мутацию в гене NTRK1, приводящую к экспрессии полипептида киназы TrkA, содержащего мутацию в одном или нескольких

положении(положениях) аминокислот, выбранных из группы, состоящей из: 517, 542, 568, 573, 589, 595, 599, 600, 602, 646, 656, 657, 667 и 676, и/или (ii) по меньшей мере одну точечную мутацию в гене NTRK2, приводящую к экспрессии полипептида киназы TrkB, содержащего мутацию в одном или нескольких положении(положениях) аминокислот, выбранных из группы, состоящей из: 545, 570, 596, 601, 617, 623, 624, 628, 630, 672, 682, 683, 693 и 702, и/или (iii) по меньшей мере одну точечную мутацию в гене NTRK3, приводящую к экспрессии полипептида киназы TrkC, содержащего мутацию в одном или нескольких положении(положениях) аминокислот, выбранных из группы, состоящей из: 545, 570, 596, 601, 617, 623, 624, 628, 630, 675, 685, 686, 696 и 705.

27. Способ по п. 26, где по меньшей мере одна точечная мутация представляет собой (i) по меньшей мере одну точечную мутацию в гене NTRK1, приводящую к экспрессии полипептида киназы TrkA, содержащего мутацию, выбранную из группы, состоящей из: G517R, A542V, Q568x, V573M, F589L, F589C, G595S, G595R, F600L, R602x, F646V, C656Y, C656F, L657V, G667C, G667S и Y676S, и/или (ii) по меньшей мере одну точечную мутацию в гене NTRK2, приводящую к экспрессии полипептида киназы TrkB, содержащего мутацию, выбранную из группы, состоящей из: G545R, A570V, Q596E, Q596P, V601G, F617L, F617C, F617I, G623S, G623R, D624V, F628x, R630K, F672x, C682Y, C682F, L683V, G693S и Y702x, и/или (iii) по меньшей мере одну точечную мутацию в гене NTRK3, приводящую к экспрессии полипептида киназы TrkC, содержащего мутацию в одном или нескольких положении(положениях) аминокислот, выбранных из группы, состоящей из: G545R, A570V, Q596x, F617L, G623R, D624V, F628x, R630x, F675x, C685Y, C685F, L686V, G696A и Y705x.

28. Способ по п. 25, где субъекту ранее вводили одну или несколько доз первого ингибитора Trk до того, как он был идентифицирован как имеющий по меньшей мере одну мутацию, где по меньшей мере одна мутация представляет собой (i) по меньшей мере одну точечную мутацию в гене NTRK1, приводящую к экспрессии полипептида киназы TrkA, содержащего мутацию в положении аминокислоты 595, и/или (ii) по меньшей мере одну точечную мутацию в гене NTRK3, приводящую к экспрессии полипептида киназы TrkC, содержащего мутацию в положении аминокислоты 623, где по меньшей мере одна мутация экспрессируется при ассоциированной с Trk злокачественной опухоли.

29. Способ по п. 28, где по меньшей мере одна мутация представляет собой G595R TrkA, G623R TrkC или обе.

30. Способ по п. 25, где ассоциированная с Trk злокачественная опухоль выбрана из группы, состоящей из: аденокарциномы, адренокортикальной карциномы, нейробластомы надпочечника, плоскоклеточной карциномы ануса, аденокарциномы аппендикса, уротелиальной карциномы мочевого пузыря, аденокарциномы желчных протоков, карциномы мочевого пузыря, уротелиальной карциномы мочевого пузыря, хордомы кости, хронического лимфоцитарного лейкоза костного мозга, острого нелимфоцитарного миелоцитарного лейкоза костного мозга, лимфопролиферативного заболевания костного мозга, множественной миеломы костного мозга, саркомы кости, астроцитомы головного мозга, глиобластомы головного мозга, медуллобластомы головного мозга, менингиомы головного мозга, олигодендроглиомы головного мозга, аденокистозной карциномы молочной железы, карциномы молочной железы, карциномы протоков молочной железы in situ, инвазивной карциномы протоков молочной железы, инвазивной лобулярной карциномы молочной железы, метапластической карциномы молочной железы, нейроэндокринной карциномы шейки матки, плоскоклеточной карциномы шейки матки, аденокарциномы ободочной кишки, карциноидной опухоли

ободочной кишки, аденокарциномы двенадцатиперстной кишки, эндометриоидной опухоли, аденокарциномы пищевода, внутриглазной меланомы, внутриглазной плоскоклеточной карциномы, карциномы слезных протоков глаза, серозной карциномы фаллопиевой трубы, аденокарциномы желчного пузыря, гломусной опухоли желчного пузыря, аденокарциномы желудочно-пищеводного соединения, аденокистозной карциномы головы и шеи, карциномы головы и шеи, нейробластомы головы и шеи, плоскоклеточной карциномы головы и шеи, хромоформной карциномы почки, медуллярной карциномы почки, почечноклеточного рака, папиллярной карциномы почки, саркоматоидной карциномы почки, уротелиальной карциномы почки, лимфоцитарного лейкоза, холангиокарциномы печени, печеночноклеточной карциномы, аденокарциномы легких, аденосквамозной карциномы легких, атипичного карциноида легких, карциносаркомы легких, крупноклеточной нейроэндокринной карциномы легких, немелкоклеточной карциномы легких, саркомы легких, саркоматоидной карциномы легких, мелкоклеточной карциномы легких, недифференцированной мелкоклеточной карциномы легких, плоскоклеточной карциномы легких, диффузной крупноклеточной В-клеточной лимфомы лимфатических узлов, фолликулярной лимфомы лимфатических узлов, медиастинальной В-клеточной лимфомы лимфатических узлов, плазмобластной лимфомы лимфатических узлов, аденокарциномы легких, фолликулярной лимфомы, неходжкинской лимфомы, недифференцированной карциномы носоглотки и околоносовых пазух, карциномы яичников, карциносаркомы яичников, светлоклеточной карциномы яичников, эпителиальной карциномы яичников, гранулезоклеточной опухоли яичников, серозной карциномы яичников, карциномы поджелудочной железы, аденокарциномы протоков поджелудочной железы, нейроэндокринной карциномы поджелудочной железы, перитонеальной мезотелиомы, перитонеальной серозной карциномы, хориокарциномы плаценты, мезотелиомы плевры, ацинарной аденокарциномы предстательной железы, карциномы предстательной железы, аденокарциномы прямой кишки, плоскоклеточной карциномы прямой кишки, аднексальной карциномы кожи, базальноклеточной карциномы кожи, меланомы кожи, карциномы кожи из клеток Меркеля, плоскоклеточной карциномы кожи, аденокарциномы тонкого кишечника, стромальных опухолей желудочно-кишечного тракта (GIST) с локализацией в тонком кишечнике, ангиосаркомы мягких тканей, саркомы Юинга мягких тканей, гемангиоэндотелиомы мягких тканей, воспалительной миофибробластической опухоли мягких тканей, лейомиосаркомы мягких тканей, липосаркомы мягких тканей, нейробластомы мягких тканей, параганглиомы мягких тканей, опухоли из периваскулярных эпителиоидных клеток мягких тканей, саркомы мягких тканей, синовиальной саркомы мягких тканей, аденокарциномы желудка, аденокарциномы желудка диффузного типа, аденокарциномы желудка кишечного типа, аденокарциномы желудка кишечного типа, лейомиосаркомы желудка, карциномы тимуса, лимфоцитарной тимомы, папиллярной карциномы щитовидной железы, неизвестной первичной аденокарциномы, неизвестной первичной карциномы, неизвестного первичного злокачественного новообразования, неизвестной первичной меланомы, неизвестной первичной саркоматоидной карциномы, неизвестной первичной плоскоклеточной карциномы, неизвестной недифференцированной нейроэндокринной карциномы, неизвестной первичной недифференцированной мелкоклеточной карциномы, карциносаркомы матки, эндометриальной аденокарциномы матки, эндометриальной эндометриоидной аденокарциномы матки, папиллярной серозной эндометриальной аденокарциномы матки и лейомиосаркомы матки.

31. Способ лечения субъекта, имеющего ассоциированную с Trk злокачественную

опухоль, включающий введение субъекту одной или нескольких доз (6R,15R)-9-фтор-15-метил-2,11,16,20,21,24-гексазапентацикло[16.5.2.02,6.07,12.021,25]пентакоза-1(24),7,9,11,18(25),19,22-гептен-17-она,

где ассоциированная с Trk злокачественная опухоль является устойчивой или развила устойчивость к первому ингибитору Trk, который представляет собой (N-[5-(3,5-дифторбензил)-1H-индазол-3-ил]-4-(4-метилпиперазин-1-ил)-2-(тетрагидропиранил-4-иламино)-бензамид).

32. Способ по п. 31, где субъекту ранее вводили одну или несколько доз первого ингибитора Trk до того, как он был идентифицирован как имеющий по меньшей мере одну точечную мутацию, где по меньшей мере одна точечная мутация представляет собой (i) по меньшей мере одну точечную мутацию в гене NTRK1, приводящую к экспрессии полипептида киназы TrkA, содержащего мутацию в одном или нескольких положениях(положениях) аминокислот, выбранных из группы, состоящей из: 517, 542, 568, 573, 589, 595, 599, 600, 602, 646, 656, 657, 667 и 676, и/или (ii) по меньшей мере одну точечную мутацию в гене NTRK2, приводящую к экспрессии полипептида киназы TrkB, содержащего мутацию в одном или нескольких положениях(положениях) аминокислот, выбранных из группы, состоящей из: 545, 570, 596, 601, 617, 623, 624, 628, 630, 672, 682, 683, 693 и 702, и/или (iii) по меньшей мере одну точечную мутацию в гене NTRK3, приводящую к экспрессии полипептида киназы TrkC, содержащего мутацию в одном или нескольких положениях(положениях) аминокислот, выбранных из группы, состоящей из: 545, 570, 596, 601, 617, 623, 624, 628, 630, 675, 685, 686, 696 и 705.

33. Способ по п. 32, где по меньшей мере одна точечная мутация представляет собой (i) по меньшей мере одну точечную мутацию в гене NTRK1, приводящую к экспрессии полипептида киназы TrkA, содержащего мутацию, выбранную из группы, состоящей из: G517R, A542V, Q568x, V573M, F589L, F589C, G595S, G595R, F600L, R602x, F646V, C656Y, C656F, L657V, G667C, G667S и Y676S, и/или (ii) по меньшей мере одну точечную мутацию в гене NTRK2, приводящую к экспрессии полипептида киназы TrkB, содержащего мутацию, выбранную из группы, состоящей из: G545R, A570V, Q596E, Q596P, V601G, F617L, F617C, F617I, G623S, G623R, D624V, F628x, R630K, F672x, C682Y, C682F, L683V, G693S и Y702x, и/или (iii) по меньшей мере одну точечную мутацию в гене NTRK3, приводящую к экспрессии полипептида киназы TrkC, содержащего мутацию в одном или нескольких положениях(положениях) аминокислот, выбранных из группы, состоящей из: G545R, A570V, Q596x, F617L, G623R, D624V, F628x, R630x, F675x, C685Y, C685F, L686V, G696A и Y705x.

34. Способ по п. 31, где субъекту ранее вводили одну или несколько доз первого ингибитора Trk до того, как он был идентифицирован как имеющий по меньшей мере одну мутацию, где по меньшей мере одна мутация представляет собой (i) по меньшей мере одну точечную мутацию в гене NTRK1, приводящую к экспрессии полипептида киназы TrkA, содержащего мутацию в положении аминокислоты 595, и/или (ii) по меньшей мере одну точечную мутацию в гене NTRK3, приводящую к экспрессии полипептида киназы TrkC, содержащего мутацию в положении аминокислоты 623, где по меньшей мере одна мутация экспрессируется при ассоциированной с Trk злокачественной опухоли.

35. Способ по п. 34, где по меньшей мере одна мутация представляет собой G595R TrkA, G623R TrkC или обе.

36. Способ по п. 31, где ассоциированная с Trk злокачественная опухоль выбрана из группы, состоящей из: аденокарциномы, адренокортикальной карциномы, нейробластомы надпочечника, плоскоклеточной карциномы ануса, аденокарциномы

аппендикса, уротелиальной карциномы мочевого пузыря, аденокарциномы желчных протоков, карциномы мочевого пузыря, уротелиальной карциномы мочевого пузыря, хордомы кости, хронического лимфоцитарного лейкоза костного мозга, острого нелимфоцитарного миелоцитарного лейкоза костного мозга, лимфопролиферативного

5 заболевания костного мозга, множественной миеломы костного мозга, саркомы кости, астроцитомы головного мозга, глиобластомы головного мозга, медуллобластомы головного мозга, менингиомы головного мозга, олигодендроглиомы головного мозга, аденокистозной карциномы молочной железы, карциномы молочной железы, карциномы протоков молочной железы in situ, инвазивной карциномы протоков молочной железы,

10 инвазивной лобулярной карциномы молочной железы, метапластической карциномы молочной железы, нейроэндокринной карциномы шейки матки, плоскоклеточной карциномы шейки матки, аденокарциномы ободочной кишки, карциноидной опухоли ободочной кишки, аденокарциномы двенадцатиперстной кишки, эндометриоидной опухоли, аденокарциномы пищевода, внутриглазной меланомы, внутриглазной

15 плоскоклеточной карциномы, карциномы слезных протоков глаза, серозной карциномы фаллопиевой трубы, аденокарциномы желчного пузыря, гломусной опухоли желчного пузыря, аденокарциномы желудочно-пищеводного соединения, аденокистозной карциномы головы и шеи, карциномы головы и шеи, нейробластомы головы и шеи, плоскоклеточной карциномы головы и шеи, хромофорной карциномы почки,

20 медуллярной карциномы почки, почечноклеточного рака, папиллярной карциномы почки, саркоматоидной карциномы почки, уротелиальной карциномы почки, лимфоцитарного лейкоза, холангиокарциномы печени, печеночноклеточной карциномы, аденокарциномы легких, аденосквамозной карциномы легких, атипичного карциноида легких, карциносаркомы легких, крупноклеточной нейроэндокринной карциномы

25 легких, мелкоклеточной карциномы легких, саркомы легких, саркоматоидной карциномы легких, мелкоклеточной карциномы легких, недифференцированной мелкоклеточной карциномы легких, плоскоклеточной карциномы легких, диффузной крупноклеточной В-клеточной лимфомы лимфатических узлов, фолликулярной лимфомы лимфатических узлов, медиастинальной В-клеточной лимфомы лимфатических

30 узлов, плазмобластной лимфомы лимфатических узлов, аденокарциномы легких, фолликулярной лимфомы, неходжскинской лимфомы, недифференцированной карциномы носоглотки и околоносовых пазух, карциномы яичников, карциносаркомы яичников, светлоклеточной карциномы яичников, эпителиальной карциномы яичников, гранулезоклеточной опухоли яичников, серозной карциномы яичников, карциномы

35 поджелудочной железы, аденокарциномы протоков поджелудочной железы, нейроэндокринной карциномы поджелудочной железы, перитонеальной мезотелиомы, перитонеальной серозной карциномы, хориокарциномы плаценты, мезотелиомы плевры, ацинарной аденокарциномы предстательной железы, карциномы предстательной железы, аденокарциномы прямой кишки, плоскоклеточной карциномы прямой кишки,

40 аднексальной карциномы кожи, базальноклеточной карциномы кожи, меланомы кожи, карциномы кожи из клеток Меркеля, плоскоклеточной карциномы кожи, аденокарциномы тонкого кишечника, стромальных опухолей желудочно-кишечного тракта (GIST) с локализацией в тонком кишечнике, ангиосаркомы мягких тканей, саркомы Юинга мягких тканей, гемангиоэндотелиомы мягких тканей, воспалительной

45 миофибробластической опухоли мягких тканей, лейомиосаркомы мягких тканей, липосаркомы мягких тканей, нейробластомы мягких тканей, параганглиомы мягких тканей, опухоли из периваскулярных эпителиоидных клеток мягких тканей, саркомы мягких тканей, синовиальной саркомы мягких тканей, аденокарциномы желудка,

аденокарциномы желудка диффузного типа, аденокарциномы желудка кишечного типа, аденокарциномы желудка кишечного типа, лейомиосаркомы желудка, карциномы тимуса, лимфоцитарной тимомы, папиллярной карциномы щитовидной железы, неизвестной первичной аденокарциномы, неизвестной первичной карциномы, неизвестного первичного злокачественного новообразования, неизвестной первичной меланомы, неизвестной первичной саркоматоидной карциномы, неизвестной первичной плоскоклеточной карциномы, неизвестной недифференцированной нейроэндокринной карциномы, неизвестной первичной недифференцированной мелкоклеточной карциномы, карциносаркомы матки, эндометриальной аденокарциномы матки, эндометриальной эндометриоидной аденокарциномы матки, папиллярной серозной эндометриальной аденокарциномы матки и лейомиосаркомы матки.

37. Способ лечения субъекта, имеющего ассоциированную с Trk злокачественную опухоль, включающий:

(а) определение того, что ассоциированная с Trk злокачественная опухоль устойчива к первому ингибитору Trk, где первый ингибитор Trk выбран из группы, состоящей из: энтректиниба (N-[5-(3,5-дифторбензил)-1H-индазол-3-ил]-4-(4-метилпиперазин-1-ил)-2-(тетрагидропиран-4-иламино)-бензамида);

сульфата (S)-N-(5-((R)-2-(2,5-дифторфенил)пирролидин-1-ил)пиразоло[1,5-a]пиримидин-3-ил)-3-гидроксипирролидин-1-карбоксамида;

кабозантиниба ((N-(4-((6,7-диметоксихинолин-4-ил)окси)фенил)-N'-(4-фторфенил)циклопропан-1,1-дикарбоксамида));

доватиниба (гидрата моно-2-гидроксипропаноата 4-амино-5-фтор-3-[6-(4-метилпиперазин-1-ил)-1H-бензимидазол-2-ил]хинолин-2(1H)-она);

белизатиниба (4-фтор-N-(6-((4-(2-гидроксипропан-2-ил)пиперидин-1-ил)метил)-1-(1s,4s)-4-(изопропилкарбамоил)циклогексил)-1H-бензо[d]имидазол-2-ил)бензамида);

ситраватиниба (N-(3-фтор-4-((2-(5-((2-метоксиэтил)амино)метил)пиридин-2-ил)тиено[3,2-b]пиридин-7-ил)окси)фенил)-N-(4-фторфенил)циклопропан-1,1-дикарбоксамида); PLX7486;

алтиратиниба (N-(4-((2-(циклопропанкарбоксамидо)пиридин-4-ил)окси)-2,5-дифторфенил)-N-(4-фторфенил)циклопропан-1,1-дикарбоксамида); и

AZD7451 ((S)-N-(1-(5-фторпиримидин-2-ил)этил)-3-(5-изопропокси-1H-пиразол-3-ил)-3H-имидазо[4,5-b]пиридин-5-амин)); и

(b) введение второго ингибитора Trk субъекту, где второй ингибитор Trk выбран из группы, состоящей из:

(R)-N-(6-(2-(2,5-дифторфенил)пирролидин-1-ил)имидазо[1,2-b]пиридазин-3-ил)-3-гидроксиазетидин-1-карбоксамида;

(R)-3-(6-(2-(2,5-дифторфенил)пирролидин-1-ил)имидазо[1,2-b]пиридазин-3-ил)-1,1-диметилмочевины;

(R)-1-(6-(2-(2,5-дифторфенил)пирролидин-1-ил)имидазо[1,2-b]пиридазин-3-ил)мочевины;

(R)-1-(6-(2-(2,5-дифторфенил)пирролидин-1-ил)имидазо[1,2-b]пиридазин-3-ил)-3-метилмочевины;

(R)-N-(5-(2-(2,5-дифторфенил)пирролидин-1-ил)пиразоло[1,5-a]пиримидин-3-ил)-3-гидроксиазетидин-1-карбоксамида;

(R)-3-(6-(2-(2,5-дифторфенил)пирролидин-1-ил)имидазо[1,2-b]пиридазин-3-ил)-1-(2-гидроксиэтил)-1-метилмочевины;

(R)-N-(6-(2-(2,5-дифторфенил)пирролидин-1-ил)имидазо[1,2-b]пиридазин-3-ил)-3-гидрокси-3-метилазетидин-1-карбоксамида;

(R)-3-(5-(2-(2,5-дифторфенил)пирролидин-1-ил)пиразоло[1,5-а]пиримидин-3-ил)-1,1-диметилмочевины;

(R)-N-(5-(2-(2-хлор-5-фторфенил)пирролидин-1-ил)пиразоло[1,5-а]пиримидин-3-ил)-3-гидроксиазетидин-1-карбоксамида;

5 (R)-N-(5-(2-(2-хлор-5-фторфенил)пирролидин-1-ил)пиразоло[1,5-а]пиримидин-3-ил)-3-гидрокси-3-метилазетидин-1-карбоксамида;

(R)-N-(5-(2-(3-фторфенил)пирролидин-1-ил)пиразоло[1,5-а]пиримидин-3-ил)-3-гидроксиазетидин-1-карбоксамида;

10 (R)-5-(2-(2,5-дифторфенил)пирролидин-1-ил)пиразоло[1,5-а]пиримидин-3-карбоксамида;

(R)-N-циклопропил-5-(2-(5-фторпиридин-3-ил)пирролидин-1-ил)пиразоло[1,5-а]пиримидин-3-карбоксамида;

(R)-5-(2-(5-фтор-2-метоксипиридин-3-ил)пирролидин-1-ил)-N-метоксипиразоло[1,5-а]пиримидин-3-карбоксамида;

15 (R)-5-(2-(5-фторпиридин-3-ил)пирролидин-1-ил)-N-(1-метилциклопропил)пиразоло[1,5-а]пиримидин-3-карбоксамида;

(6R)-9-фтор-13-окса-2,11,17,21,22,25-гексаазапентацикло[17.5.2.02,6.07,12.022,26]-гексакоза-1(25),7,9,11,19(26),20,23-гептен-18-она;

20 (6R,15R)-9-фтор-15-гидрокси-13-окса-2,11,17,21,22,25-гексаазапентацикло-[17.5.2.02,6.07,12.022,26]-гексакоза-1(25),7,9,11,19(26),20,23-гептен-18-она;

(6R)-9-фтор-13-окса-2,11,18,22,23,26-гексаазапентацикло[18.5.2.02,6.07,12.023,27]-гептакоза-1(26),7,9,11,20(27),21,24-гептен-19-она;

(6R)-9-фтор-13-окса-2,17,21,22,25-пентаазапентацикло[17.5.2.02,6.07,12.022,26]гексакоза-1(25),7,9,11,19(26),20,23-гептен-18-она;

25 (6R)-12-окса-2,16,20,21,24,26-гексаазапентацикло[16.5.2.17,11.02,6.021,25]-гексакоза-1(24),7(26),8,10,18(25),19,22-гептен-17-она;

1-[(6R)-9-фтор-13-окса-2,16,20,21,24-пентаазапентацикло[16.5.2.02,6.07,12.021,25]пентакоза-1(24),7,9,11,18(25),19,22-гептен-16-ил]этан-1-она;

30 (6R)-9-фтор-13,16-диокса-2,11,20,21,24-пентаазапентацикло[16.5.2.02,6.07,12.021,25]-пентакоза-1(24),7,9,11,18(25),19,22-гептен-17-она;

(6R)-9,15,15-трифтор-13-окса-2,11,17,21,22,25-гексаазапентацикло[17.5.2.02,6.07,12.022,26]гексакоза-1(25),7,9,11,19(26),20,23-гептен-18-она;

(6R,13S)-9-фтор-13-метил-2,11,15,19,20,23-гексаазапентацикло[15.5.2.17,11.02,6.020,24]пентакоза-1(23),7,9,17(24),18,21-гексен-16,25-диола;

35 (6R)-9-фтор-15,15-диметил-13-окса-2,11,17,21,22,25-гексаазапентацикло[17.5.2.02,6.07,12.022,26]гексакоза-1(25),7,9,11,19(26),20,23-гептен-18-она;

(15S)-4,4,9-трифтор-15-гидрокси-13-окса-2,17,21,22,25-пентаазапентацикло[17.5.2.02,6.07,12.022,26]гексакоза-1(25),7(12),8,10,19(26),20,23-гептен-18-она;

40 (6R,15S)-9-фтор-15-метил-2,11,16,20,21,24-гексаазапентацикло[16.5.2.02,6.07,12.021,25]пентакоза-1(24),7,9,11,18(25),19,22-гептен-17-она; и

(6R,15R)-9-фтор-15-метил-2,11,16,20,21,24-гексаазапентацикло[16.5.2.02,6.07,12.021,25]пентакоза-1(24),7,9,11,18(25),19,22-гептен-17-она;

или их фармацевтически приемлемых солей;

45 где злокачественная опухоль выбрана из группы, состоящей из: аденокарциномы, адренокортикальной карциномы, нейробластомы надпочечника, плоскоклеточной карциномы ануса, аденокарциномы аппендикса, уротелиальной карциномы мочевого пузыря, аденокарциномы желчных протоков, карциномы мочевого пузыря, уротелиальной карциномы мочевого пузыря, хордомы кости, хронического

лимфоцитарного лейкоза костного мозга, острого нелимфоцитарного миелоцитарного лейкоза костного мозга, лимфопролиферативного заболевания костного мозга, множественной миеломы костного мозга, саркомы кости, астроцитомы головного мозга, глиобластомы головного мозга, медуллобластомы головного мозга, менингиомы

5 головного мозга, олигодендроглиомы головного мозга, аденокистозной карциномы молочной железы, карциномы молочной железы, карциномы протоков молочной железы *in situ*, инвазивной карциномы протоков молочной железы, инвазивной лобулярной карциномы молочной железы, метастатической карциномы молочной железы, нейроэндокринной карциномы шейки матки, плоскоклеточной карциномы

10 шейки матки, аденокарциномы ободочной кишки, карциноидной опухоли ободочной кишки, аденокарциномы двенадцатиперстной кишки, эндометриоидной опухоли, аденокарциномы пищевода, внутриглазной меланомы, внутриглазной плоскоклеточной карциномы, карциномы слезных протоков глаза, серозной карциномы фаллопиевой трубы, аденокарциномы желчного пузыря, гломусной опухоли желчного пузыря,

15 аденокарциномы желудочно-пищеводного соединения, аденокистозной карциномы головы и шеи, карциномы головы и шеи, нейробластомы головы и шеи, плоскоклеточной карциномы головы и шеи, хромоформной карциномы почки, медуллярной карциномы почки, почечноклеточного рака, папиллярной карциномы почки, саркоматоидной карциномы почки, уротелиальной карциномы почки, лимфоцитарного лейкоза,

20 холангиокарциномы печени, печеночноклеточной карциномы, аденокарциномы легких, аденосквамозной карциномы легких, атипичного карциноида легких, карциносаркомы легких, крупноклеточной нейроэндокринной карциномы легких, немелкоклеточной карциномы легких, саркомы легких, саркоматоидной карциномы легких, мелкоклеточной карциномы легких, недифференцированной мелкоклеточной карциномы легких,

25 плоскоклеточной карциномы легких, диффузной крупноклеточной В-клеточной лимфомы лимфатических узлов, фолликулярной лимфомы лимфатических узлов, медиастинальной В-клеточной лимфомы лимфатических узлов, плазмобластной лимфомы лимфатических узлов, аденокарциномы легких, фолликулярной лимфомы, неходжжкинской лимфомы, недифференцированной карциномы носоглотки и

30 околоносовых пазух, карциномы яичников, карциносаркомы яичников, светлоклеточной карциномы яичников, эпителиальной карциномы яичников, гранулезоклеточной опухоли яичников, серозной карциномы яичников, карциномы поджелудочной железы, аденокарциномы протоков поджелудочной железы, нейроэндокринной карциномы поджелудочной железы, перитонеальной мезотелиомы, перитонеальной серозной

35 карциномы, хориокарциномы плаценты, мезотелиомы плевры, ацинарной аденокарциномы предстательной железы, карциномы предстательной железы, аденокарциномы прямой кишки, плоскоклеточной карциномы прямой кишки, аднексальной карциномы кожи, базальноклеточной карциномы кожи, меланомы кожи, карциномы кожи из клеток Меркеля, плоскоклеточной карциномы кожи,

40 аденокарциномы тонкого кишечника, стромальных опухолей желудочно-кишечного тракта (GIST) с локализацией в тонком кишечнике, ангиосаркомы мягких тканей, саркомы Юинга мягких тканей, гемангиоэндотелиомы мягких тканей, воспалительной миофибробластической опухоли мягких тканей, лейомиосаркомы мягких тканей, липосаркомы мягких тканей, нейробластомы мягких тканей, параганглиомы мягких

45 тканей, опухоли из периваскулярных эпителиоидных клеток мягких тканей, саркомы мягких тканей, синовиальной саркомы мягких тканей, аденокарциномы желудка, аденокарциномы желудка диффузного типа, аденокарциномы желудка кишечного типа, аденокарциномы желудка кишечного типа, лейомиосаркомы желудка, карциномы

тимуса, лимфоцитарной тимомы, папиллярной карциномы щитовидной железы, неизвестной первичной аденокарциномы, неизвестной первичной карциномы, неизвестного первичного злокачественного новообразования, неизвестной первичной меланомы, неизвестной первичной саркоматоидной карциномы, неизвестной первичной плоскоклеточной карциномы, неизвестной недифференцированной нейроэндокринной карциномы, неизвестной первичной недифференцированной мелкоклеточной карциномы, карциносаркомы матки, эндометриальной аденокарциномы матки, эндометриальной эндометриоидной аденокарциномы матки, папиллярной серозной эндометриальной аденокарциномы матки и лейомиосаркомы матки.

38. Способ по п. 37, где первый ингибитор Trk выбран из группы, состоящей из: энтректиниба (N-[5-(3,5-дифторбензил)-1H-индазол-3-ил]-4-(4-метилпиперазин-1-ил)-2-(тетрагидропиран-4-иламино)-бензамида) и сульфата (S)-N-(5-((R)-2-(2,5-дифторфенил)пирролидин-1-ил)пиразоло[1,5-a]пиримидин-3-ил)-3-гидроксипирролидин-1-карбоксамида.

39. Способ по п. 37, где второй ингибитор Trk выбран из группы, состоящей из: (R)-N-(6-(2-(2,5-дифторфенил)пирролидин-1-ил)имидазо[1,2-b]пиридазин-3-ил)-3-гидроксиазетидин-1-карбоксамида;

(R)-3-(6-(2-(2,5-дифторфенил)пирролидин-1-ил)имидазо[1,2-b]пиридазин-3-ил)-1,1-диметилмочевины;

(R)-1-(6-(2-(2,5-дифторфенил)пирролидин-1-ил)имидазо[1,2-b]пиридазин-3-ил)мочевины;

(R)-1-(6-(2-(2,5-дифторфенил)пирролидин-1-ил)имидазо[1,2-b]пиридазин-3-ил)-3-метилмочевины;

(R)-3-(6-(2-(2,5-дифторфенил)пирролидин-1-ил)имидазо[1,2-b]пиридазин-3-ил)-1-(2-гидроксиэтил)-1-метилмочевины;

(R)-N-(6-(2-(2,5-дифторфенил)пирролидин-1-ил)имидазо[1,2-b]пиридазин-3-ил)-3-гидрокси-3-метилазетидин-1-карбоксамида;

или их фармацевтически приемлемых солей.

40. Способ по п. 37, где второй ингибитор Trk выбран из группы, состоящей из:

(R)-N-(5-(2-(2,5-дифторфенил)пирролидин-1-ил)пиразоло[1,5-a]пиримидин-3-ил)-3-гидроксиазетидин-1-карбоксамида;

(R)-3-(5-(2-(2,5-дифторфенил)пирролидин-1-ил)пиразоло[1,5-a]пиримидин-3-ил)-1,1-диметилмочевины;

(R)-N-(5-(2-(2-хлор-5-фторфенил)пирролидин-1-ил)пиразоло[1,5-a]пиримидин-3-ил)-3-гидроксиазетидин-1-карбоксамида;

(R)-N-(5-(2-(2-хлор-5-фторфенил)пирролидин-1-ил)пиразоло[1,5-a]пиримидин-3-ил)-3-гидрокси-3-метилазетидин-1-карбоксамида;

(R)-N-(5-(2-(3-фторфенил)пирролидин-1-ил)пиразоло[1,5-a]пиримидин-3-ил)-3-гидроксиазетидин-1-карбоксамида;

или их фармацевтически приемлемых солей.

41. Способ по п. 37, где второй ингибитор Trk выбран из группы, состоящей из:

(R)-5-(2-(2,5-дифторфенил)пирролидин-1-ил)пиразоло[1,5-a]пиримидин-3-карбоксамида;

(R)-N-циклопропил-5-(2-(5-фторпиридин-3-ил)пирролидин-1-ил)пиразоло[1,5-a]пиримидин-3-карбоксамида;

(R)-5-(2-(5-фтор-2-метоксипиридин-3-ил)пирролидин-1-ил)-N-метоксипиразоло[1,5-a]пиримидин-3-карбоксамида;

(R)-5-(2-(5-фторпиридин-3-ил)пирролидин-1-ил)-N-(1-метилциклопропил)пиразоло

[1,5-а]пиримидин-3-карбоксамида;

или их фармацевтически приемлемых солей.

42. Способ по п. 37, где второй ингибитор Trk выбран из группы, состоящей из:

(6R)-9-фтор-13-окса-2,11,17,21,22,25-гексаазапентацикло[17.5.2.02,6.07,12.022,26]-гексакоза-1(25),7,9,11,19(26),20,23-гептен-18-она;

(6R,15R)-9-фтор-15-гидрокси-13-окса-2,11,17,21,22,25-гексаазапентацикло[17.5.2.02,6.07,12.022,26]-гексакоза-1(25),7,9,11,19(26),20,23-гептен-18-она;

(6R)-9-фтор-13-окса-2,11,18,22,23,26-гексаазапентацикло[18.5.2.02,6.07,12.023,27]-гептакоза-1(26),7,9,11,20(27),21,24-гептен-19-она;

(6R)-9-фтор-13-окса-2,17,21,22,25-пентаазапентацикло[17.5.2.02,6.07,12.022,26]гексакоза-1(25),7,9,11,19(26),20,23-гептен-18-она;

(6R)-12-окса-2,16,20,21,24,26-гексаазапентацикло[16.5.2.17,11.02,6.021,25]-гексакоза-1(24),7(26),8,10,18(25),19,22-гептен-17-она;

1-[(6R)-9-фтор-13-окса-2,16,20,21,24-пентаазапентацикло[16.5.2.02,6.07,12.021,25]

пентакоза-1(24),7,9,11,18(25),19,22-гептен-16-ил]этан-1-она;

(6R)-9-фтор-13,16-диокса-2,11,20,21,24-пентаазапентацикло[16.5.2.02,6.07,12.021,25]-пентакоза-1(24),7,9,11,18(25),19,22-гептен-17-она;

(6R)-9,15,15-трифтор-13-окса-2,11,17,21,22,25-гексаазапентацикло[17.5.2.02,6.07,12.022,26]гексакоза-1(25),7,9,11,19(26),20,23-гептен-18-она;

(6R,13S)-9-фтор-13-метил-2,11,15,19,20,23-гексаазапентацикло[15.5.2.17,11.02,6.020,24]пентакоза-1(23),7,9,17(24),18,21-гексен-16,25-диола;

(6R)-9-фтор-15,15-диметил-13-окса-2,11,17,21,22,25-гексаазапентацикло[17.5.2.02,6.07,12.022,26]гексакоза-1(25),7,9,11,19(26),20,23-гептен-18-она;

(15S)-4,4,9-трифтор-15-гидрокси-13-окса-2,17,21,22,25-пентаазапентацикло[17.5.2.02,6.07,12.022,26]гексакоза-1(25),7(12),8,10,19(26),20,23-гептен-18-она;

(6R,15S)-9-фтор-15-метил-2,11,16,20,21,24-гексаазапентацикло[16.5.2.02,6.07,12.021,25]пентакоза-1(24),7,9,11,18(25),19,22-гептен-17-она;

(6R,15R)-9-фтор-15-метил-2,11,16,20,21,24-гексаазапентацикло[16.5.2.02,6.07,12.021,25]пентакоза-1(24),7,9,11,18(25),19,22-гептен-17-она;

или их фармацевтически приемлемых солей.

43. Способ по п. 37, где первый ингибитор Trk представляет собой энтректиниб (N-[5-(3,5-дифторбензил)-1H-индазол-3-ил]-4-(4-метилпиперазин-1-ил)-2-(тетрагидропиран-4-иламино)-бензамид) и второй ингибитор Trk выбран из группы, состоящей из:

(R)-N-(6-(2-(2,5-дифторфенил)пирролидин-1-ил)имидазо[1,2-b]пиридазин-3-ил)-3-гидроксиазетидин-1-карбоксамида;

(R)-3-(6-(2-(2,5-дифторфенил)пирролидин-1-ил)имидазо[1,2-b]пиридазин-3-ил)-1,1-диметилмочевины;

(R)-1-(6-(2-(2,5-дифторфенил)пирролидин-1-ил)имидазо[1,2-b]пиридазин-3-ил)мочевины;

(R)-1-(6-(2-(2,5-дифторфенил)пирролидин-1-ил)имидазо[1,2-b]пиридазин-3-ил)-3-метилмочевины;

(R)-3-(6-(2-(2,5-дифторфенил)пирролидин-1-ил)имидазо[1,2-b]пиридазин-3-ил)-1-(2-гидроксиэтил)-1-метилмочевины;

(R)-N-(6-(2-(2,5-дифторфенил)пирролидин-1-ил)имидазо[1,2-b]пиридазин-3-ил)-3-гидрокси-3-метилазетидин-1-карбоксамида;

или их фармацевтически приемлемых солей.

44. Способ по п. 37, где первый ингибитор Trk представляет собой энтректиниб (N-[5-(3,5-дифторбензил)-1H-индазол-3-ил]-4-(4-метилпиперазин-1-ил)-2-(тетрагидропиран-

4-иламино)-бензамид) и второй ингибитор Trk выбран из группы, состоящей из:

(R)-N-(5-(2-(2,5-дифторфенил)пирролидин-1-ил)пиразоло[1,5-а]пиримидин-3-ил)-3-гидроксиазетидин-1-карбоксамида;

(R)-3-(5-(2-(2,5-дифторфенил)пирролидин-1-ил)пиразоло[1,5-а]пиримидин-3-ил)-1,1-диметилмочевины;

(R)-N-(5-(2-(2-хлор-5-фторфенил)пирролидин-1-ил)пиразоло[1,5-а]пиримидин-3-ил)-3-гидроксиазетидин-1-карбоксамида;

(R)-N-(5-(2-(2-хлор-5-фторфенил)пирролидин-1-ил)пиразоло[1,5-а]пиримидин-3-ил)-3-гидрокси-3-метилазетидин-1-карбоксамида;

(R)-N-(5-(2-(3-фторфенил)пирролидин-1-ил)пиразоло[1,5-а]пиримидин-3-ил)-3-гидроксиазетидин-1-карбоксамида;

или их фармацевтически приемлемых солей.

45. Способ по п. 37, где первый ингибитор Trk представляет собой энтректиниб (N-[5-(3,5-дифторбензил)-1Н-индазол-3-ил]-4-(4-метилпиперазин-1-ил)-2-(тетрагидропиран-4-иламино)-бензамид) и второй ингибитор Trk выбран из группы, состоящей из:

(R)-5-(2-(2,5-дифторфенил)пирролидин-1-ил)пиразоло[1,5-а]пиримидин-3-карбоксамида;

(R)-N-циклопропил-5-(2-(5-фторпиридин-3-ил)пирролидин-1-ил)пиразоло[1,5-а]пиримидин-3-карбоксамида;

(R)-5-(2-(5-фтор-2-метоксипиридин-3-ил)пирролидин-1-ил)-N-метоксипиразоло[1,5-а]пиримидин-3-карбоксамида;

(R)-5-(2-(5-фторпиридин-3-ил)пирролидин-1-ил)-N-(1-метилциклопропил)пиразоло[1,5-а]пиримидин-3-карбоксамида;

или их фармацевтически приемлемых солей.

46. Способ по п. 37, где первый ингибитор Trk представляет собой энтректиниб (N-[5-(3,5-дифторбензил)-1Н-индазол-3-ил]-4-(4-метилпиперазин-1-ил)-2-(тетрагидропиран-4-иламино)-бензамид) и второй ингибитор Trk выбран из группы, состоящей из:

(6R)-9-фтор-13-окса-2,11,17,21,22,25-гексаазапентацикло[17.5.2.02,6.07,12.022,26]-гексакоза-1(25),7,9,11,19(26),20,23-гептен-18-она;

(6R,15R)-9-фтор-15-гидрокси-13-окса-2,11,17,21,22,25-гексаазапентацикло[17.5.2.02,6.07,12.022,26]-гексакоза-1(25),7,9,11,19(26),20,23-гептен-18-она;

(6R)-9-фтор-13-окса-2,11,18,22,23,26-гексаазапентацикло[18.5.2.02,6.07,12.023,27]-гептакоза-1(26),7,9,11,20(27),21,24-гептен-19-она;

(6R)-9-фтор-13-окса-2,17,21,22,25-пентаазапентацикло[17.5.2.02,6.07,12.022,26]-гексакоза-1(25),7,9,11,19(26),20,23-гептен-18-она;

(6R)-12-окса-2,16,20,21,24,26-гексаазапентацикло[16.5.2.17,11.02,6.021,25]-гексакоза-1(24),7(26),8,10,18(25),19,22-гептен-17-она;

1-[(6R)-9-фтор-13-окса-2,16,20,21,24-пентаазапентацикло[16.5.2.02,6.07,12.021,25]-пентакоза-1(24),7,9,11,18(25),19,22-гептен-16-ил]этан-1-она;

(6R)-9-фтор-13,16-диокса-2,11,20,21,24-пентаазапентацикло[16.5.2.02,6.07,12.021,25]-пентакоза-1(24),7,9,11,18(25),19,22-гептен-17-она;

(6R)-9,15,15-трифтор-13-окса-2,11,17,21,22,25-гексаазапентацикло[17.5.2.02,6.07,12.022,26]-гексакоза-1(25),7,9,11,19(26),20,23-гептен-18-она;

(6R,13S)-9-фтор-13-метил-2,11,15,19,20,23-гексаазапентацикло[15.5.2.17,11.02,6.020,24]-пентакоза-1(23),7,9,17(24),18,21-гексен-16,25-диола;

(6R)-9-фтор-15,15-диметил-13-окса-2,11,17,21,22,25-гексаазапентацикло[17.5.2.02,6.07,12.022,26]-гексакоза-1(25),7,9,11,19(26),20,23-гептен-18-она;

(15S)-4,4,9-трифтор-15-гидрокси-13-окса-2,17,21,22,25-пентаазапентацикло

[17.5.2.02,6.07,12.022,26]гексакоза-1(25),7(12),8,10,19(26),20,23-гептен-18-она;
(6R,15S)-9-фтор-15-метил-2,11,16,20,21,24-гексаазапентацикло[16.5.2.02,6.07,12.021,25]
пентакоза-1(24),7,9,11,18(25),19,22-гептен-17-она;

(6R,15R)-9-фтор-15-метил-2,11,16,20,21,24-гексаазапентацикло[16.5.2.02,6.07,12.021,25]
пентакоза-1(24),7,9,11,18(25),19,22-гептен-17-она;

или их фармацевтически приемлемых солей.

47. Способ по п. 37, где первый ингибитор Trk представляет собой сульфат (S)- N-(5-((R)-2-(2,5-дифторфенил)пирролидин-1-ил)пиразоло[1,5-a]пиримидин-3-ил)-3-гидроксипирролидин-1-карбоксамида и второй ингибитор Trk выбран из группы, состоящей из:

(R)-N-(6-(2-(2,5-дифторфенил)пирролидин-1-ил)имидазо[1,2-b]пиридазин-3-ил)-3-гидроксиазетидин-1-карбоксамида;

(R)-3-(6-(2-(2,5-дифторфенил)пирролидин-1-ил)имидазо[1,2-b]пиридазин-3-ил)-1,1-диметилмочевины;

(R)-1-(6-(2-(2,5-дифторфенил)пирролидин-1-ил)имидазо[1,2-b]пиридазин-3-ил)мочевины;

(R)-1-(6-(2-(2,5-дифторфенил)пирролидин-1-ил)имидазо[1,2-b]пиридазин-3-ил)-3-метилмочевины;

(R)-3-(6-(2-(2,5-дифторфенил)пирролидин-1-ил)имидазо[1,2-b]пиридазин-3-ил)-1-(2-гидроксиэтил)-1-метилмочевины;

(R)-N-(6-(2-(2,5-дифторфенил)пирролидин-1-ил)имидазо[1,2-b]пиридазин-3-ил)-3-гидрокси-3-метилазетидин-1-карбоксамида;

или их фармацевтически приемлемых солей.

48. Способ по п. 37, где первый ингибитор Trk представляет собой сульфат (S)- N-(5-((R)-2-(2,5-дифторфенил)пирролидин-1-ил)пиразоло[1,5-a]пиримидин-3-ил)-3-гидроксипирролидин-1-карбоксамида и второй ингибитор Trk выбран из группы, состоящей из:

(R)-N-(5-(2-(2,5-дифторфенил)пирролидин-1-ил)пиразоло[1,5-a]пиримидин-3-ил)-3-гидроксиазетидин-1-карбоксамида;

(R)-3-(5-(2-(2,5-дифторфенил)пирролидин-1-ил)пиразоло[1,5-a]пиримидин-3-ил)-1,1-диметилмочевины;

(R)-N-(5-(2-(2-хлор-5-фторфенил)пирролидин-1-ил)пиразоло[1,5-a]пиримидин-3-ил)-3-гидроксиазетидин-1-карбоксамида;

(R)-N-(5-(2-(2-хлор-5-фторфенил)пирролидин-1-ил)пиразоло[1,5-a]пиримидин-3-ил)-3-гидрокси-3-метилазетидин-1-карбоксамида;

(R)-N-(5-(2-(3-фторфенил)пирролидин-1-ил)пиразоло[1,5-a]пиримидин-3-ил)-3-гидроксиазетидин-1-карбоксамида;

или их фармацевтически приемлемых солей.

49. Способ по п. 37, где первый ингибитор Trk представляет собой сульфат (S)- N-(5-((R)-2-(2,5-дифторфенил)пирролидин-1-ил)пиразоло[1,5-a]пиримидин-3-ил)-3-гидроксипирролидин-1-карбоксамида и второй ингибитор Trk выбран из группы, состоящей из:

(R)-5-(2-(2,5-дифторфенил)пирролидин-1-ил)пиразоло[1,5-a]пиримидин-3-карбоксамида;

(R)-N-циклопропил-5-(2-(5-фторпиридин-3-ил)пирролидин-1-ил)пиразоло[1,5-a]пиримидин-3-карбоксамида;

(R)-5-(2-(5-фтор-2-метоксипиридин-3-ил)пирролидин-1-ил)-N-метоксипиразоло[1,5-a]пиримидин-3-карбоксамида;

(R)-5-(2-(5-фторпиридин-3-ил)пирролидин-1-ил)-N-(1-метилциклопропил)пиразоло [1,5-а]пиримидин-3-карбоксамида;

или их фармацевтически приемлемых солей.

50. Способ по п. 37, где первый ингибитор Trk представляет собой сульфат (S)- N-(5-
5 ((R)-2-(2,5-дифторфенил)пирролидин-1-ил)пиразоло[1,5-а]пиримидин-3-ил)-3-
гидрокси-пирролидин-1-карбоксамида и второй ингибитор Trk выбран из группы,
состоящей из:

(6R)-9-фтор-13-окса-2,11,17,21,22,25-гексаазапентацикло[17.5.2.02,6.07,12.022,26]-
гексакоза-1(25),7,9,11,19(26),20,23-гептен-18-она;

10 (6R,15R)-9-фтор-15-гидрокси-13-окса-2,11,17,21,22,25-гексаазапентацикло-
[17.5.2.02,6.07,12.022,26]-гексакоза-1(25),7,9,11,19(26),20,23-гептен-18-она;

(6R)-9-фтор-13-окса-2,11,18,22,23,26-гексаазапентацикло[18.5.2.02,6.07,12.023,27]-
гептакоза-1(26),7,9,11,20(27),21,24-гептен-19-она;

(6R)-9-фтор-13-окса-2,17,21,22,25-пентаазапентацикло[17.5.2.02,6.07,12.022,26]
15 гексакоза-1(25),7,9,11,19(26),20,23-гептен-18-она;

(6R)-12-окса-2,16,20,21,24,26-гексаазапентацикло[16.5.2.17,11.02,6.021,25]-гексакоза-
1(24),7(26),8,10,18(25),19,22-гептен-17-она;

1-[(6R)-9-фтор-13-окса-2,16,20,21,24-пентаазапентацикло[16.5.2.02,6.07,12.021,25]
пентакоза-1(24),7,9,11,18(25),19,22-гептен-16- ил]этан-1-она;

20 (6R)-9-фтор-13,16-диокса-2,11,20,21,24-пентаазапентацикло[16.5.2.02,6.07,12.021,25]
-пентакоза-1(24),7,9,11,18(25),19,22-гептен-17-она;

(6R)-9,15,15-трифтор-13-окса-2,11,17,21,22,25-гексаазапентацикло
[17.5.2.02,6.07,12.022,26]гексакоза-1(25),7,9,11,19(26),20,23-гептен-18-она;

(6R,13S)-9-фтор-13-метил-2,11,15,19,20,23-гексаазапентацикло[15.5.2.17,11.02,6.020,24]
25 пентакоза-1(23),7,9,17(24),18,21-гексен-16,25-диола;

(6R)-9-фтор-15,15-диметил-13-окса-2,11,17,21,22,25-гексаазапентацикло
[17.5.2.02,6.07,12.022,26]гексакоза-1(25),7,9,11,19(26),20,23-гептен-18-она;

(15S)-4,4,9-трифтор-15-гидрокси-13-окса-2,17,21,22,25-пентаазапентацикло
[17.5.2.02,6.07,12.022,26]гексакоза-1(25),7(12),8,10,19(26),20,23-гептен-18-она;

30 (6R,15S)-9-фтор-15-метил-2,11,16,20,21,24-гексаазапентацикло[16.5.2.02,6.07,12.021,25]
пентакоза-1(24),7,9,11,18(25),19,22-гептен-17-она;

(6R,15R)-9-фтор-15-метил-2,11,16,20,21,24-гексаазапентацикло[16.5.2.02,6.07,12.021,25]
пентакоза-1(24),7,9,11,18(25),19,22-гептен-17-она;

или их фармацевтически приемлемых солей.

35 51. Способ по п. 37, где субъект идентифицирован как имеющий (i) по меньшей мере
одну точечную мутацию в гене NTRK1, приводящую к экспрессии полипептида киназы
TrkA, содержащего мутацию в одном или нескольких положении(положениях)
аминокислот, выбранных из группы, состоящей из: 517, 542, 568, 573, 589, 595, 599, 600,
602, 646, 656, 657, 667 и 676, и/или (ii) по меньшей мере одну точечную мутацию в гене
40 NTRK2, приводящую к экспрессии полипептида киназы TrkB, содержащего мутацию
в одном или нескольких положении(положениях) аминокислот, выбранных из группы,
состоящей из: 545, 570, 596, 601, 617, 623, 624, 628, 630, 672, 682, 683, 693 и 702, и/или (iii)
по меньшей мере одну точечную мутацию в гене NTRK3, приводящую к экспрессии
полипептида киназы TrkC, содержащего мутацию в одном или нескольких положении
45 (положениях) аминокислот, выбранных из группы, состоящей из: 545, 570, 596, 601, 617,
623, 624, 628, 630, 675, 685, 686, 696 и 705.

52. Способ по п. 51, где субъект идентифицирован как имеющий по меньшей мере
одну точечную мутацию, представляющую собой G595R TrkA или G623R TrkC.

53. Способ лечения субъекта, имеющего ассоциированную с Trk злокачественную опухоль, включающий:

(а) введение одной или нескольких доз первого ингибитора Trk субъекту в течение некоторого периода времени, где первый ингибитор Trk представляет собой энтректиниб (N-[5-(3,5-дифторбензил)-1H-индазол-3-ил]-4-(4-метилпиперазин-1-ил)-2-(тетрагидропиран-4-иламино)-бензамид);

(b) после (а) определение того, что ассоциированная с Trk злокачественная опухоль является устойчивой к первому ингибитору Trk; и

(с) подвергание лечению, включающему одну или несколько доз второго ингибитора Trk или его фармацевтически приемлемой соли, субъекта, где второй ингибитор Trk представляет собой (6R,15R)-9-фтор-15-метил-2,11,16,20,21,24-гексаазапентацикло [16.5.2.02,6.07,12.021,25]пентакоза-1(24),7,9,11,18(25),19,22-гептен-17-он;

где злокачественная опухоль выбрана из группы, состоящей из: аденокарциномы, адренокортикальной карциномы, нейробластомы надпочечника, плоскоклеточной карциномы ануса, аденокарциномы аппендикса, уротелиальной карциномы мочевого пузыря, аденокарциномы желчных протоков, карциномы мочевого пузыря, уротелиальной карциномы мочевого пузыря, хордомы кости, хронического лимфоцитарного лейкоза костного мозга, острого нелимфоцитарного миелоцитарного лейкоза костного мозга, лимфопролиферативного заболевания костного мозга, множественной миеломы костного мозга, саркомы кости, астроцитомы головного мозга, глиобластомы головного мозга, медуллобластомы головного мозга, менингиомы головного мозга, олигодендроглиомы головного мозга, аденокистозной карциномы молочной железы, карциномы молочной железы, карциномы протоков молочной железы in situ, инвазивной карциномы протоков молочной железы, инвазивной лобулярной карциномы молочной железы, метастатической карциномы молочной железы, нейроэндокринной карциномы шейки матки, плоскоклеточной карциномы шейки матки, аденокарциномы ободочной кишки, карциноидной опухоли ободочной кишки, аденокарциномы двенадцатиперстной кишки, эндометриоидной опухоли, аденокарциномы пищевода, внутриглазной меланомы, внутриглазной плоскоклеточной карциномы, карциномы слезных протоков глаза, серозной карциномы фаллопиевой трубы, аденокарциномы желчного пузыря, гломусной опухоли желчного пузыря, аденокарциномы желудочно-пищеводного соединения, аденокистозной карциномы головы и шеи, карциномы головы и шеи, нейробластомы головы и шеи, плоскоклеточной карциномы головы и шеи, хромоформной карциномы почки, медуллярной карциномы почки, почечноклеточного рака, папиллярной карциномы почки, саркоматоидной карциномы почки, уротелиальной карциномы почки, лимфоцитарного лейкоза, холангиокарциномы печени, печеночноклеточной карциномы, аденокарциномы легких, аденосквамозной карциномы легких, атипичного карциноида легких, карциносаркомы легких, крупноклеточной нейроэндокринной карциномы легких, немелкоклеточной карциномы легких, саркомы легких, саркоматоидной карциномы легких, мелкоклеточной карциномы легких, недифференцированной мелкоклеточной карциномы легких, плоскоклеточной карциномы легких, диффузной крупноклеточной В-клеточной лимфомы лимфатических узлов, фолликулярной лимфомы лимфатических узлов, медиастинальной В-клеточной лимфомы лимфатических узлов, плазмобластной лимфомы лимфатических узлов, аденокарциномы легких, фолликулярной лимфомы, неходжжкинской лимфомы, недифференцированной карциномы носоглотки и околоносовых пазух, карциномы яичников, карциносаркомы яичников, светлоклеточной карциномы яичников, эпителиальной карциномы яичников, гранулезоклеточной опухоли

яичников, серозной карциномы яичников, карциномы поджелудочной железы, аденокарциномы протоков поджелудочной железы, нейроэндокринной карциномы поджелудочной железы, перитонеальной мезотелиомы, перитонеальной серозной карциномы, хориокарциномы плаценты, мезотелиомы плевры, ацинарной

5 аденокарциномы предстательной железы, карциномы предстательной железы, аденокарциномы прямой кишки, плоскоклеточной карциномы прямой кишки, аднексальной карциномы кожи, базальноклеточной карциномы кожи, меланомы кожи, карциномы кожи из клеток Меркеля, плоскоклеточной карциномы кожи, аденокарциномы тонкого кишечника, стромальных опухолей желудочно-кишечного

10 тракта (GIST) с локализацией в тонком кишечнике, ангиосаркомы мягких тканей, саркомы Юинга мягких тканей, гемангиоэндотелиомы мягких тканей, воспалительной миофибробластической опухоли мягких тканей, лейомиосаркомы мягких тканей, липосаркомы мягких тканей, нейробластомы мягких тканей, параганглиомы мягких тканей, опухоли из периваскулярных эпителиоидных клеток мягких тканей, саркомы

15 мягких тканей, синовиальной саркомы мягких тканей, аденокарциномы желудка, аденокарциномы желудка диффузного типа, аденокарциномы желудка кишечного типа, аденокарциномы желудка кишечного типа, лейомиосаркомы желудка, карциномы тимуса, лимфоцитарной тимомы, папиллярной карциномы щитовидной железы, неизвестной первичной аденокарциномы, неизвестной первичной карциномы,

20 неизвестного первичного злокачественного новообразования, неизвестной первичной меланомы, неизвестной первичной саркоматоидной карциномы, неизвестной первичной плоскоклеточной карциномы, неизвестной недифференцированной нейроэндокринной карциномы, неизвестной первичной недифференцированной мелкоклеточной карциномы, карциносаркомы матки, эндометриальной аденокарциномы матки, эндометриальной

25 эндометриоидной аденокарциномы матки, папиллярной серозной эндометриальной аденокарциномы матки и лейомиосаркомы матки.

54. Способ по п. 53, где субъект идентифицирован как имеющий (i) по меньшей мере одну точечную мутацию в гене NTRK1, приводящую к экспрессии полипептида киназы TrkA, содержащего мутацию в одном или нескольких положении(положениях)

30 аминокислот, выбранных из группы, состоящей из: 517, 542, 568, 573, 589, 595, 599, 600, 602, 646, 656, 657, 667 и 676, и/или (ii) по меньшей мере одну точечную мутацию в гене NTRK2, приводящую к экспрессии полипептида киназы TrkB, содержащего мутацию в одном или нескольких положении(положениях) аминокислот, выбранных из группы, состоящей из: 545, 570, 596, 601, 617, 623, 624, 628, 630, 672, 682, 683, 693 и 702, и/или (iii)

35 по меньшей мере одну точечную мутацию в гене NTRK3, приводящую к экспрессии полипептида киназы TrkC, содержащего мутацию в одном или нескольких положении(положениях) аминокислот, выбранных из группы, состоящей из: 545, 570, 596, 601, 617, 623, 624, 628, 630, 675, 685, 686, 696 и 705.

55. Способ по п. 54, где субъект идентифицирован как имеющий по меньшей мере

40 одну точечную мутацию, представляющую собой G595R TrkA или G623R TrkC.

56. Способ лечения субъекта, имеющего ассоциированную с Trk злокачественную опухоль, включающий:

(a) введение одной или нескольких доз первого ингибитора Trk субъекту в течение некоторого периода времени, где первый ингибитор Trk представляет собой сульфат

45 (S)-N-(5-((R)-2-(2,5-дифторфенил)пирролидин-1-ил)пиразоло[1,5-a]пиримидин-3-ил)-3-гидрокси-пирролидин-1-карбоксамид;

(b) после (a) определение того, что ассоциированная с Trk злокачественная опухоль является устойчивой к первому ингибитору Trk; и

(с) подвергание лечению, включающему одну или несколько доз второго ингибитора Trk или его фармацевтически приемлемой соли, субъекта, где второй ингибитор Trk представляет собой (6R,15R)-9-фтор-15-метил-2,11,16,20,21,24-гексаазапентацикло [16.5.2.02,6.07,12.021,25]пентакоза-1(24),7,9,11,18(25),19,22-гептен-17-он;

- 5 где злокачественная опухоль выбрана из группы, состоящей из: аденокарциномы, адренокортикальной карциномы, нейробластомы надпочечника, плоскоклеточной карциномы ануса, аденокарциномы аппендикса, уротелиальной карциномы мочевого пузыря, аденокарциномы желчных протоков, карциномы мочевого пузыря, уротелиальной карциномы мочевого пузыря, хордомы кости, хронического
- 10 лимфоцитарного лейкоза костного мозга, острого нелимфоцитарного миелоцитарного лейкоза костного мозга, лимфопролиферативного заболевания костного мозга, множественной миеломы костного мозга, саркомы кости, астроцитомы головного мозга, глиобластомы головного мозга, медуллобластомы головного мозга, менингиомы головного мозга, олигодендроглиомы головного мозга, аденокистозной карциномы
- 15 молочной железы, карциномы молочной железы, карциномы протоков молочной железы in situ, инвазивной карциномы протоков молочной железы, инвазивной лобулярной карциномы молочной железы, метастатической карциномы молочной железы, нейроэндокринной карциномы шейки матки, плоскоклеточной карциномы шейки матки, аденокарциномы ободочной кишки, карциноидной опухоли ободочной
- 20 кишки, аденокарциномы двенадцатиперстной кишки, эндометриоидной опухоли, аденокарциномы пищевода, внутриглазной меланомы, внутриглазной плоскоклеточной карциномы, карциномы слезных протоков глаза, серозной карциномы фаллопиевой трубы, аденокарциномы желчного пузыря, гломусной опухоли желчного пузыря, аденокарциномы желудочно-пищеводного соединения, аденокистозной карциномы
- 25 головы и шеи, карциномы головы и шеи, нейробластомы головы и шеи, плоскоклеточной карциномы головы и шеи, хромофорной карциномы почки, медуллярной карциномы почки, почечноклеточного рака, папиллярной карциномы почки, саркоматоидной карциномы почки, уротелиальной карциномы почки, лимфоцитарного лейкоза, холангиокарциномы печени, печеночноклеточной карциномы, аденокарциномы легких,
- 30 аденосквамозной карциномы легких, атипичного карциноида легких, карциносаркомы легких, крупноклеточной нейроэндокринной карциномы легких, немелкоклеточной карциномы легких, саркомы легких, саркоматоидной карциномы легких, мелкоклеточной карциномы легких, недифференцированной мелкоклеточной карциномы легких, плоскоклеточной карциномы легких, диффузной крупноклеточной В-клеточной
- 35 лимфомы лимфатических узлов, фолликулярной лимфомы лимфатических узлов, медиастинальной В-клеточной лимфомы лимфатических узлов, плазмобластной лимфомы лимфатических узлов, аденокарциномы легких, фолликулярной лимфомы, неходжскинской лимфомы, недифференцированной карциномы носоглотки и околоносовых пазух, карциномы яичников, карциносаркомы яичников, светлоклеточной
- 40 карциномы яичников, эпителиальной карциномы яичников, гранулезоклеточной опухоли яичников, серозной карциномы яичников, карциномы поджелудочной железы, аденокарциномы протоков поджелудочной железы, нейроэндокринной карциномы поджелудочной железы, перитонеальной мезотелиомы, перитонеальной серозной карциномы, хориокарциномы плаценты, мезотелиомы плевры, ацинарной
- 45 аденокарциномы предстательной железы, карциномы предстательной железы, аденокарциномы прямой кишки, плоскоклеточной карциномы прямой кишки, аднексальной карциномы кожи, базальноклеточной карциномы кожи, меланомы кожи, карциномы кожи из клеток Меркеля, плоскоклеточной карциномы кожи,

аденокарциномы тонкого кишечника, стромальных опухолей желудочно-кишечного тракта (GIST) с локализацией в тонком кишечнике, ангиосаркомы мягких тканей, саркомы Юинга мягких тканей, гемангиоэндотелиомы мягких тканей, воспалительной миофибробластической опухоли мягких тканей, лейомиосаркомы мягких тканей, липосаркомы мягких тканей, нейробластомы мягких тканей, параганглиомы мягких тканей, опухоли из периваскулярных эпителиоидных клеток мягких тканей, саркомы мягких тканей, синовиальной саркомы мягких тканей, аденокарциномы желудка, аденокарциномы желудка диффузного типа, аденокарциномы желудка кишечного типа, аденокарциномы желудка кишечного типа, лейомиосаркомы желудка, карциномы тимуса, лимфоцитарной тимомы, папиллярной карциномы щитовидной железы, неизвестной первичной аденокарциномы, неизвестной первичной карциномы, неизвестного первичного злокачественного новообразования, неизвестной первичной меланомы, неизвестной первичной саркоматоидной карциномы, неизвестной первичной плоскоклеточной карциномы, неизвестной недифференцированной нейроэндокринной карциномы, неизвестной первичной недифференцированной мелкоклеточной карциномы, карциносаркомы матки, эндометриальной аденокарциномы матки, эндометриальной эндометриоидной аденокарциномы матки, папиллярной серозной эндометриальной аденокарциномы матки и лейомиосаркомы матки.

57. Способ по п. 56, где субъект идентифицирован как имеющий (i) по меньшей мере одну точечную мутацию в гене NTRK1, приводящую к экспрессии полипептида киназы TrkA, содержащего мутацию в одном или нескольких положении(положениях) аминокислот, выбранных из группы, состоящей из: 517, 542, 568, 573, 589, 595, 599, 600, 602, 646, 656, 657, 667 и 676, и/или (ii) по меньшей мере одну точечную мутацию в гене NTRK2, приводящую к экспрессии полипептида киназы TrkB, содержащего мутацию в одном или нескольких положении(положениях) аминокислот, выбранных из группы, состоящей из: 545, 570, 596, 601, 617, 623, 624, 628, 630, 672, 682, 683, 693 и 702, и/или (iii) по меньшей мере одну точечную мутацию в гене NTRK3, приводящую к экспрессии полипептида киназы TrkC, содержащего мутацию в одном или нескольких положении(положениях) аминокислот, выбранных из группы, состоящей из: 545, 570, 596, 601, 617, 623, 624, 628, 630, 675, 685, 686, 696 и 705.

58. Способ по п. 57, где субъект идентифицирован как имеющий по меньшей мере одну точечную мутацию, представляющую собой G595R TrkA или G623R TrkC.

59. Способ лечения субъекта, имеющего ассоциированную с Trk злокачественную опухоль, включающий:

(a) определение того, что ассоциированная с Trk злокачественная опухоль является устойчивой к первому ингибитору Trk, где первый ингибитор Trk представляет собой энтректиниб (N-[5-(3,5-дифторбензил)-1H-индазол-3-ил]-4-(4-метилпиперазин-1-ил)-2-(тетрагидропиран-4-иламино)-бензамид); и

(b) введение второго ингибитора Trk субъекту, где второй ингибитор Trk представляет собой (6R,15R)-9-фтор-15-метил-2,11,16,20,21,24-гексаазапентацикло [16.5.2.02,6.07,12.021,25]пентакоза-1(24),7,9,11,18(25),19,22-гептен-17-он;

где злокачественная опухоль выбрана из группы, состоящей из: аденокарциномы, адренокортикальной карциномы, нейробластомы надпочечника, плоскоклеточной карциномы ануса, аденокарциномы аппендикса, уротелиальной карциномы мочевого пузыря, аденокарциномы желчных протоков, карциномы мочевого пузыря, уротелиальной карциномы мочевого пузыря, хордомы кости, хронического лимфоцитарного лейкоза костного мозга, острого нелимфоцитарного миелоцитарного лейкоза костного мозга, лимфопролиферативного заболевания костного мозга,

множественной миеломы костного мозга, саркомы кости, астроцитомы головного мозга, глиобластомы головного мозга, медуллобластомы головного мозга, менингиомы головного мозга, олигодендроглиомы головного мозга, аденокистозной карциномы молочной железы, карциномы молочной железы, карциномы протоков молочной железы in situ, инвазивной карциномы протоков молочной железы, инвазивной лобулярной карциномы молочной железы, метapластической карциномы молочной железы, нейроэндокринной карциномы шейки матки, плоскоклеточной карциномы шейки матки, аденокарциномы ободочной кишки, карциноидной опухоли ободочной кишки, аденокарциномы двенадцатиперстной кишки, эндометриоидной опухоли, аденокарциномы пищевода, внутриглазной меланомы, внутриглазной плоскоклеточной карциномы, карциномы слезных протоков глаза, серозной карциномы фаллопиевой трубы, аденокарциномы желчного пузыря, гломусной опухоли желчного пузыря, аденокарциномы желудочно-пищеводного соединения, аденокистозной карциномы головы и шеи, карциномы головы и шеи, нейробластомы головы и шеи, плоскоклеточной карциномы головы и шеи, хромофорной карциномы почки, медуллярной карциномы почки, почечноклеточного рака, папиллярной карциномы почки, саркоматоидной карциномы почки, уротелиальной карциномы почки, лимфоцитарного лейкоза, холангиокарциномы печени, печеночноклеточной карциномы, аденокарциномы легких, аденосквамозной карциномы легких, атипичного карциноида легких, карциносаркомы легких, крупноклеточной нейроэндокринной карциномы легких, немелкоклеточной карциномы легких, саркомы легких, саркоматоидной карциномы легких, мелкоклеточной карциномы легких, недифференцированной мелкоклеточной карциномы легких, плоскоклеточной карциномы легких, диффузной крупноклеточной В-клеточной лимфомы лимфатических узлов, фолликулярной лимфомы лимфатических узлов, медиастинальной В-клеточной лимфомы лимфатических узлов, плазмобластной лимфомы лимфатических узлов, аденокарциномы легких, фолликулярной лимфомы, неходжжкинской лимфомы, недифференцированной карциномы носоглотки и околоносовых пазух, карциномы яичников, карциносаркомы яичников, светлоклеточной карциномы яичников, эпителиальной карциномы яичников, гранулезоклеточной опухоли яичников, серозной карциномы яичников, карциномы поджелудочной железы, аденокарциномы протоков поджелудочной железы, нейроэндокринной карциномы поджелудочной железы, перитонеальной мезотелиомы, перитонеальной серозной карциномы, хориокарциномы плаценты, мезотелиомы плевры, ацинарной аденокарциномы предстательной железы, карциномы предстательной железы, аденокарциномы прямой кишки, плоскоклеточной карциномы прямой кишки, аднексальной карциномы кожи, базальноклеточной карциномы кожи, меланомы кожи, карциномы кожи из клеток Меркеля, плоскоклеточной карциномы кожи, аденокарциномы тонкого кишечника, стромальных опухолей желудочно-кишечного тракта (GIST) с локализацией в тонком кишечнике, ангиосаркомы мягких тканей, саркомы Юинга мягких тканей, гемангиоэндотелиомы мягких тканей, воспалительной миофибробластической опухоли мягких тканей, лейомиосаркомы мягких тканей, липосаркомы мягких тканей, нейробластомы мягких тканей, параганглиомы мягких тканей, опухоли из периваскулярных эпителиоидных клеток мягких тканей, саркомы мягких тканей, синовиальной саркомы мягких тканей, аденокарциномы желудка, аденокарциномы желудка диффузного типа, аденокарциномы желудка кишечного типа, аденокарциномы желудка кишечного типа, лейомиосаркомы желудка, карциномы тимуса, лимфоцитарной тимомы, папиллярной карциномы щитовидной железы, неизвестной первичной аденокарциномы, неизвестной первичной карциномы,

неизвестного первичного злокачественного новообразования, неизвестной первичной меланомы, неизвестной первичной саркоматоидной карциномы, неизвестной первичной плоскоклеточной карциномы, неизвестной недифференцированной нейроэндокринной карциномы, неизвестной первичной недифференцированной мелкоклеточной карциномы, карциносаркомы матки, эндометриальной аденокарциномы матки, эндометриальной эндометриоидной аденокарциномы матки, папиллярной серозной эндометриальной аденокарциномы матки и лейомиосаркомы матки.

60. Способ по п. 59, где субъект идентифицирован как имеющий (i) по меньшей мере одну точечную мутацию в гене NTRK1, приводящую к экспрессии полипептида киназы TrkA, содержащего мутацию в одном или нескольких положении(положениях) аминокислот, выбранных из группы, состоящей из: 517, 542, 568, 573, 589, 595, 599, 600, 602, 646, 656, 657, 667 и 676, и/или (ii) по меньшей мере одну точечную мутацию в гене NTRK2, приводящую к экспрессии полипептида киназы TrkB, содержащего мутацию в одном или нескольких положении(положениях) аминокислот, выбранных из группы, состоящей из: 545, 570, 596, 601, 617, 623, 624, 628, 630, 672, 682, 683, 693 и 702, и/или (iii) по меньшей мере одну точечную мутацию в гене NTRK3, приводящую к экспрессии полипептида киназы TrkC, содержащего мутацию в одном или нескольких положении(положениях) аминокислот, выбранных из группы, состоящей из: 545, 570, 596, 601, 617, 623, 624, 628, 630, 675, 685, 686, 696 и 705.

61. Способ по п. 60, где субъект идентифицирован как имеющий по меньшей мере одну точечную мутацию, представляющую собой G595R TrkA или G623R TrkC.

62. Способ лечения субъекта, имеющего ассоциированную с Trk злокачественную опухоль, включающий:

(а) определение того, что ассоциированная с Trk злокачественная опухоль является устойчивой к первому ингибитору Trk, где первый ингибитор Trk представляет собой сульфат (S)-N-(5-((R)-2-(2,5-дифторфенил)пирролидин-1-ил)пиразоло[1,5-a]пиримидин-3-ил)-3-гидрокси-1-карбоксамид; и

(b) введение второго ингибитора Trk субъекту, где второй ингибитор Trk представляет собой (6R,15R)-9-фтор-15-метил-2,11,16,20,21,24-гексаазапентацикло[16.5.2.0^{2,6}.0^{7,12}.0^{21,25}]пентакоза-1(24),7,9,11,18(25),19,22-гептен-17-он;

где злокачественная опухоль выбрана из группы, состоящей из: аденокарциномы, адренокортикальной карциномы, нейробластомы надпочечника, плоскоклеточной карциномы ануса, аденокарциномы аппендикса, уротелиальной карциномы мочевого пузыря, аденокарциномы желчных протоков, карциномы мочевого пузыря, уротелиальной карциномы мочевого пузыря, хордомы кости, хронического лимфоцитарного лейкоза костного мозга, острого нелимфоцитарного миелоцитарного лейкоза костного мозга, лимфопролиферативного заболевания костного мозга, множественной миеломы костного мозга, саркомы кости, астроцитомы головного мозга, глиобластомы головного мозга, медуллобластомы головного мозга, менингиомы головного мозга, олигодендроглиомы головного мозга, аденокистозной карциномы молочной железы, карциномы молочной железы, карциномы протоков молочной железы in situ, инвазивной карциномы протоков молочной железы, инвазивной лобулярной карциномы молочной железы, метастатической карциномы молочной железы, нейроэндокринной карциномы шейки матки, плоскоклеточной карциномы шейки матки, аденокарциномы ободочной кишки, карциноидной опухоли ободочной кишки, аденокарциномы двенадцатиперстной кишки, эндометриоидной опухоли, аденокарциномы пищевода, внутриглазной меланомы, внутриглазной плоскоклеточной карциномы, карциномы слезных протоков глаза, серозной карциномы фаллопиевой

трубы, аденокарциномы желчного пузыря, гломусной опухоли желчного пузыря, аденокарциномы желудочно-пищеводного соединения, аденокистозной карциномы головы и шеи, карциномы головы и шеи, нейробластомы головы и шеи, плоскоклеточной карциномы головы и шеи, хромофорной карциномы почки, медуллярной карциномы почки, почечноклеточного рака, папиллярной карциномы почки, саркоматоидной карциномы почки, уротелиальной карциномы почки, лимфоцитарного лейкоза, холангиокарциномы печени, печеночноклеточной карциномы, аденокарциномы легких, аденосквамозной карциномы легких, атипичного карциноида легких, карциносаркомы легких, крупноклеточной нейроэндокринной карциномы легких, мелкоклеточной карциномы легких, саркомы легких, саркоматоидной карциномы легких, мелкоклеточной карциномы легких, недифференцированной мелкоклеточной карциномы легких, плоскоклеточной карциномы легких, диффузной крупноклеточной В-клеточной лимфомы лимфатических узлов, фолликулярной лимфомы лимфатических узлов, медиастинальной В-клеточной лимфомы лимфатических узлов, плазмобластной лимфомы лимфатических узлов, аденокарциномы легких, фолликулярной лимфомы, неходжскинской лимфомы, недифференцированной карциномы носоглотки и околоносовых пазух, карциномы яичников, карциносаркомы яичников, светлоклеточной карциномы яичников, эпителиальной карциномы яичников, гранулезоклеточной опухоли яичников, серозной карциномы яичников, карциномы поджелудочной железы, аденокарциномы протоков поджелудочной железы, нейроэндокринной карциномы поджелудочной железы, перитонеальной мезотелиомы, перитонеальной серозной карциномы, хориокарциномы плаценты, мезотелиомы плевры, ацинарной аденокарциномы предстательной железы, карциномы предстательной железы, аденокарциномы прямой кишки, плоскоклеточной карциномы прямой кишки, аднексальной карциномы кожи, базальноклеточной карциномы кожи, меланомы кожи, карциномы кожи из клеток Меркеля, плоскоклеточной карциномы кожи, аденокарциномы тонкого кишечника, стромальных опухолей желудочно-кишечного тракта (GIST) с локализацией в тонком кишечнике, ангиосаркомы мягких тканей, саркомы Юинга мягких тканей, гемангиоэндотелиомы мягких тканей, воспалительной миофибробластической опухоли мягких тканей, лейомиосаркомы мягких тканей, липосаркомы мягких тканей, нейробластомы мягких тканей, параганглиомы мягких тканей, опухоли из периваскулярных эпителиоидных клеток мягких тканей, саркомы мягких тканей, синовиальной саркомы мягких тканей, аденокарциномы желудка, аденокарциномы желудка диффузного типа, аденокарциномы желудка кишечного типа, аденокарциномы желудка кишечного типа, лейомиосаркомы желудка, карциномы тимуса, лимфоцитарной тимомы, папиллярной карциномы щитовидной железы, неизвестной первичной аденокарциномы, неизвестной первичной карциномы, неизвестного первичного злокачественного новообразования, неизвестной первичной меланомы, неизвестной первичной саркоматоидной карциномы, неизвестной первичной плоскоклеточной карциномы, неизвестной недифференцированной нейроэндокринной карциномы, неизвестной первичной недифференцированной мелкоклеточной карциномы, карциносаркомы матки, эндометриальной аденокарциномы матки, эндометриальной эндометриоидной аденокарциномы матки, папиллярной серозной эндометриальной аденокарциномы матки и лейомиосаркомы матки.

63. Способ по п. 62, где субъект идентифицирован как имеющий (i) по меньшей мере одну точечную мутацию в гене NTRK1, приводящую к экспрессии полипептида киназы TrkA, содержащего мутацию в одном или нескольких положении(положениях) аминокислот, выбранных из группы, состоящей из: 517, 542, 568, 573, 589, 595, 599, 600,

602, 646, 656, 657, 667 и 676, и/или (ii) по меньшей мере одну точечную мутацию в гене NTRK2, приводящую к экспрессии полипептида киназы TrkB, содержащего мутацию в одном или нескольких положении(положениях) аминокислот, выбранных из группы, состоящей из: 545, 570, 596, 601, 617, 623, 624, 628, 630, 672, 682, 683, 693 и 702, и/или (iii)

5 по меньшей мере одну точечную мутацию в гене NTRK3, приводящую к экспрессии полипептида киназы TrkC, содержащего мутацию в одном или нескольких положении (положениях) аминокислот, выбранных из группы, состоящей из: 545, 570, 596, 601, 617, 623, 624, 628, 630, 675, 685, 686, 696 и 705.

64. Способ по п. 63, где субъект идентифицирован как имеющий по меньшей мере
10 одну точечную мутацию, представляющую собой G595R TrkA или G623R TrkC.

15

20

25


30

35

40

45


Скрининг по устойчивости к лекарственному средству посредством мутагенеза *in vitro*



1/15


ФИГ.1

2/15




ФИГ.2

3/15




ФИГ.3

4/15




ФИГ.4




ФИГ.5

6/15




ФИГ.6А




ФИГ.6В

7/15




ФИГ.6С

8/15




ФИГ.7




ФИГ.8

10/15




ФИГ.9А




ФИГ.9В

11/15




ФИГ.9С

12/15



ФИГ.10



ФИГ.11

14/15

IC ₅₀ (нМ)			
MPRIP-NTRK1	15	TRIM24-NTRK2	88.3
V573M	534.5	V601G	>2000
F589L	1999.8	F617	--
G595R		G623S	>2000
G667S	217.2	G693S	
		R630K	45.7
		Q596E	

ФИГ.12

15/15

```

NTRK1 486 -----LQGHIIENPQYFS-----DACVHHIKRRDIVLKWELGEGAFGKVFL 526
NTRK2 490 -----VIIGMTKIPVIENPQYFGITNSQLKPDTFVQHIKRNIVLKRELGEAFGKVFL 554
ALK 1083 -----LRTSTIMTDYNPNYCFAGK--TSSISDLKEVPKRNITLIRGLGHGAFGEVYE 1132
ROS1 1908 -----ELRGLAAGVGLANACYAIHTLPTQEEIENLPAPPREKLT LRLLLGSGAFGEVYE 1961
ABL1 199 VHHHSTVADGLITTLHPAPKRNKPTVYGVSPNYDKWEMERTDITMKHKLGGGQYGEVYE 258
EGFR 680 -----RRLQERELVEPLTPSGEAPN---QALLRILKETEFKKIKVLGSGAFGTVVK 728

NTRK1 527 AECHNLLP-EQDKMLVAVKALKEA--SESARQDFQREAE LLMQHCHIRFFGVCTEGRP 584
NTRK2 555 AECYNLCP-EQDKILVAVKTLKDA--SDARKDFHREAELLTNHHEHIVKFGVVCVEGDP 612
ALK 1133 GQVSGMPN-DPSPLQVAVKTLPEVCEQDELDFLMEALIIISKRNHQNIVRCIGVSLQSLP 1191
ROS1 1962 GTAVDILGVSGEIKVAVKTLKKGSTDQEKIEFLKEAHLMSKRNHPNIIKQLGVCLLNEP 2021
ABL1 259 GVNKK-----YSLTVAVKTLKEQTM--EVEEFLKEAAVMKEIKHPNIVQLLGCTREPP 310
EGFR 729 GLWI--PEGEVKIPVAIKELREATSPKANKEILDEAYVMASVDNPHVCRLLGICLTSTV 786

NTRK1 585 LLMVF EYMRHCDLNRF LRSHPDAKLLAGGEDVAPGPLGLGQLLAVASQVAAGMVYLAGL 644
NTRK2 613 LIMVF EYMKHCDLNKFLRAHGPDVFLMAEGN--PPTELTQSQNLHIAQQIAAGMVYLASQ 670
ALK 1192 RFILLEIMAGGDLKSFIRETRPRPS-----QPSSLAMLDLHHVARDIACGCQYLLEN 1243
ROS1 2022 QYIILEMEGGDLLTYLRKARMATF-----YGPLLTLDLDVLCVDISKGCVYLERM 2073
ABL1 311 FYIITEFMTYGNLLDYLRECNRQEV-----NAVLLLYMATQISSAMEYLEKK 357
EGFR 787 QL-ITQLMPHGLLDYVREHKDNI-----GSQYLLNWCVQIAKGMNYLEDR 831

NTRK1 645 NFVHRDLATRNCLV-----GQGLVVKITDFGMSRDIYSTDYRVGGRTMLPIRWMPPESEI 699
NTRK2 671 NFVHRDLATRNCLV-----GENLLVKITDFGMSRDVYSTDYRVGGHTMLPIRWMPPESEI 725
ALK 1244 NFIIHRDLAARNCLLTCP--GPGRVAKITDFGMARDIIRASYRKGGCAMLVPVKWMPPEAF 1301
ROS1 2074 NFIIHRDLAARNCLVSVKDYTSRIVKIDDFGLARDIYKNDYRKRGEGLLPVRWMAPESEI 2133
ABL1 358 NFIIHRDLAARNCLV-----GENHLVKVADFGLSRLMTGDTYTAH-AGAKFPIKWTAPESEI 411
EGFR 832 RLIVHRDLAARNVLV-----KTPQHVKITDFGLAKLLGAEKEYHAEGGKVPKIMMALESEI 886

NTRK1 700 LYRKFTTESDVWSFGVVLWEIFTYGKQPYQLSNTAIDCITQGRELERPRACPPEVYAI 759
NTRK2 726 MYRKFTTESDVWSLGVVLWEIFTYGKQPYQLSNNEVIECITQGRVLQRPRTCPQEVYEL 785
ALK 1302 MEGIFTSKTDTSFGVVLWEIFSLGYMPYPSKSNQEVLEFVTSGGRMDPPKNCPPGVYRI 1361
ROS1 2134 MDGIFTTQSDVWSFGILWEILTGHQPYPAHSNLDVLNVVQTGGRLEPPRNCPODLWNL 2193
ABL1 412 AYNKFSIKSDVWAFGVVLWEIATYGMSPYPGIDLSQVYELLEKDYRMERPEGCPEKVYEL 471
EGFR 887 LHRIYTHQSDVWSYGVTVWELMTFGSKPYDGIPASEISSILEKGERLPQPPICTIDVYMI 946

```

ФИГ.13