

[19] 中华人民共和国国家知识产权局



[12] 发明专利申请公布说明书

[21] 申请号 200710101441.0

[51] Int. Cl.

A23L 1/29 (2006.01)

A23F 3/14 (2006.01)

A23C 9/16 (2006.01)

A23L 1/212 (2006.01)

A23L 1/216 (2006.01)

A23L 1/28 (2006.01)

[43] 公开日 2007年9月12日

[11] 公开号 CN 101032334A

[51] Int. Cl. (续)

A23L 1/168 (2006.01)

A23L 1/48 (2006.01)

A61K 36/71 (2006.01)

A61K 36/899 (2006.01)

A61K 36/74 (2006.01)

A61K 9/06 (2006.01)

A61K 9/48 (2006.01)

A61P 9/12 (2006.01)

A23P 1/04 (2006.01)

[22] 申请日 2007.4.17

[21] 申请号 200710101441.0

[71] 申请人 李永胜

地址 048000 山西省晋城市瑞丰路宏翔小区7
号楼

[72] 发明人 李永胜 李小波 李 军

权利要求书1页 说明书2页

[54] 发明名称

一种降血压组合保健品

[57] 摘要

降压组合保健食品由罗布麻、杜仲、白芍、川牛膝、决明子、菊花等提取制成颗粒装入胶囊。降压组合奶茶由保健食品提取物、奶粉、蛋白糖、麦芽糊精、茶粉、食用香精、植脂末等汇合后装入消毒袋。降压组合粥由车前子、薏苡仁、枸杞、红枣、葡萄干、山药、山楂、银耳、梗米等煮熟装罐。降压泡脚液由夏枯草、桑枝、牛膝、钩藤、南瓜藤等研末装袋。降压组合膏由吴茱萸研末和醋调成膏。本发明特点：全面联合运用，共奏降压效果。

1、一种降血压组合保健品的保健食品其特征在于由以下重量份的原料配比组成：罗布麻 0.5-50 份、杜仲 0.5-50 份、白芍 0.3-30 份、川牛膝 0.3-30 份、决明子 0.3-30 份、菊花 0.5-50 份。

2、根据权利要求 1 所述的降血压组合保健品的保健食品其特征在于各原料的重量优选配比是：罗布麻 5 份、杜仲 5 份、白芍 3 份、川牛膝 3 份、决明子 3 份、菊花 5 份。

3、根据权利要求 1 和权利要求 2 所述的降血压组合保健品的保健食品的制备方法其特征在于将原料罗布麻、杜仲分别加 10 倍、8 倍 70% 的乙醇提取 2 次，每次 1.5 小时，提取液浓缩、干燥，以上两味残渣合白芍、川牛膝、决明子、菊花分别加 8 倍 6 倍水煮 2 小时提取两次，提取液浓缩、干燥后合醇提干膏，并粉碎成细粉，加入辅料制成颗粒装入胶囊。

4、一种降血压组合保健品的奶茶其特征在于各原料的优选配比是：保健食品提取物 5 份、奶粉 16 份、蛋白糖 0.3 份、麦芽糊精 0.01 份、茶粉 3 份、食用香精 0.02 份，植脂末 3 份。

5、根据权利要求 4 所述的降血压奶茶的制备方法其特征在于将保健食品提取物、奶粉、蛋白糖、麦芽糊精、茶粉、食用香精、植脂末装入消毒纸袋，置入包装杯中，服用时打开杯盖把奶茶粉倒入杯中加沸水 120 毫升，加盖焖 5 分钟，加清华紫光水 80 毫升搅拌至完全溶解，插入吸管即可饮用。

6、一种降血压组合粥其特征在于由以下重量配比的原料组成：车前子 20 份、薏苡仁 30 份、枸杞 30 份、红枣 30 份、葡萄干 40 份、山药 40 份、山楂 30 份、银耳 40 份、梗米 40 份。

7、根据权利要求 6 降血压组合粥的制备方法其特征在于将车前子用布包煎汤去渣、薏苡仁清水洗净与枸杞、红枣、葡萄干、山药去皮洗净切片、山楂去核切片、银耳用清水泡涨与梗米一起下锅煮熟、装罐即成。

8、降血压泡脚液其特征在于由以下重量份的原料组成：夏枯草 30 份、桑枝 20 份、牛膝 20 份、钩藤 20 份、南瓜藤 20 份。

9、根据权利要求 8 所述的降血压泡脚液的制备方法其特征在于：将夏枯草、桑枝、牛膝、钩藤、南瓜藤共研细末装纱布袋内，放在洗脚盆内加 1000 份开水浸泡 5 分钟后，再加入凉水 1000 份，将水温调至摄氏 40-50 度，泡脚 30 分钟。

10、降血压组合膏其特征在于由以下重量份的原料组成及制备方法：吴茱萸 50 份、醋 50 份，将吴茱萸研细末，用醋调成膏即成。

一种降血压组合保健品

技术领域

本发明涉及一种降血压组合保健品即保健食品、奶茶、粥、泡脚液、膏。本发明涉及的降血压的组合保健品是高血压患者治疗过程中配合使用的中药保健品。

技术背景

随着人们生活水平的提高和生活节奏的加快，高血压的发病率逐年上升，据统计我国高血压患者有 1.4 亿，占成人的 18.8%，严重危害人类的生命健康，为此我们研究了中药降压组合保健品，克服了现有药物出现的失眠、咳嗽等毒副作用，而提供一种综合的预防保健品。

发明内容

本发明的目的在于克服了上述现有技术存在的不足之处，而提供一种降血压的组合保健品即保健食品、奶茶、粥、泡脚液、膏。经过多年临床实践证明对高血压有很好的调节效果，对缓解症状、调节血压有一定的辅助治疗作用。

本发明的目的可以通过以下措施来达到：一种降血压组合保健品即保健食品、奶茶、粥、泡脚液、膏。

本发明降压组合保健品的保健食品原料组成如下：罗布麻 0.5-50 份、杜仲 0.5-50 份、白芍 0.3-30 份、川牛膝 0.3-30 份、决明子 0.3-30 份、菊花 0.5-50 份组成。

降压组合保健品的保健食品的原料优选用量为：罗布麻 5 份、杜仲 5 份、白芍 3 份、川牛膝 3 份、决明子 3 份、菊花 5 份。

降压组合保健品的保健食品的制备方法：将原料罗布麻、杜仲分别加 10 倍、8 倍 70% 的乙醇提取 2 次，每次 1.5 小时，提取液浓缩、干燥，以上两味残渣合白芍、川牛膝、决明子、菊花分别加 8 倍 6 倍水煮 2 小时提取两次，提取液浓缩、干燥后合醇提干膏，并粉碎成细粉，加入辅料制成颗粒装入胶囊。

在服用降压组合保健品的保健食品时需使用降压奶茶送服。配合食用降压组合粥、并使用降压泡脚液泡脚，然后敷上降压组合膏来控制血压。

降压奶茶原料的优选用量配比是保健食品提取物 5 份、奶粉 16 份、蛋白糖 0.3 份、麦芽糊精 0.01 份、茶粉 3 份、食用香精 0.02 份、植脂末 3 份。

降压奶茶的制备方法是将保健食品提取物、奶粉、蛋白糖、麦芽糊精、茶粉、食用香精、植脂末装入消毒纸袋，置入包装杯中。服用时打开杯盖把奶茶粉倒入杯中加沸水 120 毫升，加盖焖 5 分钟，加清华紫光水 80 毫升搅拌至完全溶解，插入吸管即可饮用。

降压组合粥是由以下重量配比的原料组成：车前子 20 份、薏苡仁 30 份、枸杞 30 份、红枣 30 份、葡萄干 40 份、山药 40 份、山楂 30 份、银耳 40 份、梗米 40 份。

降血压组合粥的制备方法是由车前子用布包煎汤去渣、薏苡仁清水洗净与枸杞、红枣、葡萄干、山药去皮洗净切片、山楂去核切片、银耳用清水泡涨与梗米一起下锅煮熟、装罐即成。

降压泡脚液是由以下重量配比的原料组成：夏枯草 30 份、桑枝 20 份、牛膝 20 份、钩藤 20 份、南瓜藤 20 份。

降压泡脚液的制备方法：将夏枯草、桑枝、牛膝、钩藤、南瓜藤共研细末装纱布袋内，放在洗脚盆内加 1000 份开水浸泡 5 分钟后，再加入凉水 1000 份，将水温调至摄氏 40-50 度，泡脚 30 分钟。

降压组合膏是由以下重量配比的原料组成：吴茱萸 50 份、醋 50 份。

降压组合膏的制备方法：将吴茱萸研细末，用醋调成膏即成。

本发明比现有技术具有以下优点，我国有 1.4 亿高血压患者，多数为终生不能停药，给患者造成心理负担，本发明是推出一套预防保健的方法来达到降低血压的目的，我们还发现很多服用降压药物的患者会不同程度的出现失眠、咳嗽等毒副作用，本组合保健品无任何毒副作用，深受患者欢迎。

具体实施方式

下面列举实施例，对本发明加以进一步说明

实施例 1

(1) 降压保健食品：罗布麻 5 克、杜仲 5 克、白芍 3 克、川牛膝 3 克、决明子 3 克、菊花 5 克按前制备方法制成降压保健食品胶囊，在服用时需降压奶茶送服，并配合食用以下降压食品。

(2) 降压奶茶：保健食品提取物 5 克、奶粉 16 克、蛋白糖 0.3 克、麦芽糊精 0.01 克、食用香精 0.02 克、茶粉 3 克、植脂末 0.3 克按前制备方法制成奶茶，可配合早餐食用。

(3) 降血压组合粥：车前子 20 克、薏苡仁 30 克、枸杞 30 克、红枣 30 克、葡萄干 40 克、山药 40 克、山楂 30 克、银耳 40 克、梗米 40 克按前制备方法一起下锅煮熟，作为主食食用。

(4) 降压泡脚液：夏枯草 30 克、桑枝 20 克、牛膝 20 克、钩藤 20 克、南瓜藤 20 克按前制备方法研细末装纱布袋内，放在洗脚盆内加热水 1000 毫升，浸泡 5 分钟，再加入 1000 毫升凉水将水温调至摄氏 40-50 度，泡脚 30 分钟。

(5) 降压组合膏：吴茱萸 50 克、醋 50 克按前制备方法制成，晚上泡脚后敷上降压组合膏。

以上形成一个统一的降血压方案，本方案联合运用，共奏降压之效果。

降压组合保健品主要功能：降压通络、活血化淤、清热平肝。

用法：保健食品胶囊，一日两次、一次两粒，用降压奶茶送服；降压奶茶可配合早餐食用；降血压组合粥可配合午餐食用；晚上用降压泡脚液泡脚 30 分钟，然后敷上降压组合膏。

降压保健品的临床应用分析：实践证明运用以上综合降压保健品效果明显，经 30 余人的临床运用，显效 25 人，显效率 83%；有效 30 人，有效率 100%。如降压泡脚液一般泡脚 30 分钟后降压，一小时后降压效果最强，维持 4-6 小时，用降压膏一般敷 24 小时血压开始下降，自觉症状减轻。

病例介绍：王*、68 岁、河北任丘石油总医院退休中医师，94 年患高血压，180-100mmHg，经服用复方降压片，效果不佳，2004 年服用降压保健食品，半个月后，血压降至 130-80mmHg,05 年 5 月来函表示感谢。