

ČESKOSLOVENSKÁ
SOCIALISTICKÁ
REPUBLIKA
(19)



FEDERÁLNÍ ÚŘAD
PRO VYNÁLEZY

POPIS VYNÁLEZU K AUTORSKÉMU OSVĚDČENÍ

(11) **263999**

(13) B1

(21) PV 2055-88.Z
(22) Přihlášeno 28 03 88

(40) Zveřejněno 16 09 88
(45) Vydáno 15 07 89

(51) Int. Cl. 4
C 07 D 495/04


(75)
Autor vynálezu

PROTIVA MIROSLAV dr. ing. DrSc., POLÍVKA ZDENĚK ing. CSc.,
METYŠ JAN MUDr., CSc., METYŠOVÁ JIŘINA RNDr. PhMr. CSc.,
VALCHÁŘ MARTIN RNDr. CSc., PRAHA

(54) Aminy 4,9-dihydrothieno(2,3-c)-2-benzothiepinové řady a jejich soli

(57) Řešení spadá do oboru syntetických léčiv. Jeho předmětem jsou aminy 4,9-dihydrothieno/2,3-c/-2-benzothiepinové řady a jejich soli, z nichž zvláště hydrochlorid N,N-dimethyl-3-[4,9-dihydrothieno/2,3-c/-2-benzothiepin-4-yl]propylaminu vykazuje v řadě farmakologických a biochemických testů farmakodynamický profil antidepresiva a thymoleptika. Přichází tedy v úvahu jako léčivo proti duševním depresivním stavům. Látky podle řešení jsou přístupné redukcí příslušných terciárních alkoholů nebo olefinických aminů kyselinou jodovodíkovou ve vroucí kyselině octové za přítomnosti červeného fosforu. Získané olejovité báze se neutralizací reakcemi převedou na krystalické soli, které jsou rovněž předmětem řešení.

Vynález se týká aminů 4,9-dihydrothieno-
/2,3-c/-2-benzothiepinové řady obecného
vzorce I




ve kterém R značí 3-dimethylaminopropyl
nebo 1-methyl-4-piperidyl, a jejich soli s
farmaceuticky nezávadnými anorganickými
nebo organickými kyselinami.

Látky obecného vzorce I jsou nové a ve
farmakologických a biochemických testech
vykazují typické thymoleptické účinky, kte-
ré obvykle korelují s antidepresivními účin-
ky u pacientů. Látky obecného vzorce I a
jejich soli lze tedy považovat za antidepre-
sivní léčiva a jako takové jsou technicky
důležité.


Typickou látkou podle vynálezu je 4-{3-
dimethylaminopropyl}-4,9-dihydrothieno-
/2,3-c/-2-benzothiepin, který byl farmakolo-
gicky hodnocen jako hydrochlorid. Dále u-
vedené dávky jsou vesměs přepočty na bá-
zi. Jeho akutní toxicita u myších samic při
nitrožilním podání je dána střední smrtnou
dávku LD₅₀ = 28,2 mg/kg. Toxické přízna-
ky, pozorované při stanovování LD₅₀, jsou
dechové obtíže a dále křečové projevy. Lá-
tka má jen velmi mírné diskoordinační pů-
sobení v testu rotující tyčky u myši; střed-
ní účinná dávka ED₅₀ je 60 mg/kg při orál-
ním podání (s maximem za 15 min po po-
dání a s ústupem projevů v průběhu 2 h).
Centrálně tlumivé působení prakticky chy-
bí, což je velmi výhodné. Při hodnocení vli-
vu na spontánní lokomotorickou aktivitu u
myši paprskovou metodou podle Dewse vy-
kazuje aktivitu; rozhodně tedy nepůsobí tlu-
mivě. V testu reserpinových vředů u kry-
s vykazuje látka statisticky významný anti-
reserpinový účinek již od orální dávky
10 mg/kg. Od této orální dávky látka vý-
znamně antagonizuje reserpinovou ptosu u
myši. V dávkách 5, 10 a 25 mg/kg orálně
antagonizuje významně reserpinovou hypo-
termii u myši; střední účinná dávka D₅₀ je
17,5 mg/kg p. o. V testu perfenazinové ka-
talepsie u krys má zkoušená látka inten-
sivní antikataleptický účinek v orální dáv-
ce 40 mg/kg; ještě v dávce 20 mg/kg je an-
tikataleptické působení patrné. Látka účin-
ně potencuje jedovatost yohimbinu u myši;
ED₅₀ = 10,8 mg/kg p. o. Účinek v tomto tes-
tu a v řadě dalších je dobře srovnatelný s
účinkem klasického tricyklického antide-
presiva imipraminu. Látka konečně proje-
vuje zřetelnou afinitu k vazebným místům
/³H/imipraminu a /³H/desipraminu v hypo-
thalamu krys. Střední inhibiční koncentra-
ce látky pro inhibici vazby 4 nM /³H/imí-

praminu IC₅₀ je 169,4 nM a pro inhibici vaz-
by nM /³H/desipraminu 512 nM. Látka má
tedy celkově profil farmakodynamiky kla-
sického tricyklického antidepresiva.

Látky obecného vzorce I podle vynálezu
jsou přístupné redukcí terciárních amino-
alkoholů obecného vzorce II



ve kterém R značí totéž jako ve vzorci I,
nebo olefinických aminů vzorce III



ve kterém R¹ značí 3-dimethylaminopropy-
liden nebo 1-methyl-4-piperidyliden. K re-
dukci se nejlépe hodí jodovodíková kyseli-
na ve vroucí směsi s kyselinou octovou. Pro
regeneraci jodovodíku se k reakční směsi
přidává červený fosfor.

Redukčními reakcemi získané báze obec-
ného vzorce I jsou olejovité, avšak posky-
tují krystalické hydrochloridy, popřípadě
další soli, např. maleináty. Ve formě soli
se vyčistí krystalizací do analytické čisto-
ty a pro identifikaci se měří buď spektra
těchto soli, nebo z nich uvolněných homo-
genních bází. Analytická i spektrální data
potvrzují identitu popisovaných látek. Vý-
chozí látky obecných vzorců II a III jsou
vesměs známé a literální odkazy na ně jsou
uvedeny v příkladech. Tyto mají za úkol
pouze ilustrovat možnosti přípravy látek
podle vynálezu.

Příklad 1

N,N-dimethyl-3-{4,9-dihydrothieno/2,3-c/-
2-benzothiepin-4-yl}propylamin

Směs 120 ml kyseliny octové, 75 ml 55%
kyseliny jodovodíkové, 13,9 g červeného fos-
foru a 33,8 g hydrochloridu N,N-dimethyl-
-3-{4,9-dihydrothieno/2,3-c/-2-benzothiepin-
-4-yliden}propylaminu [Protiva M. et al.:
Collect. Czech. Chem. Commun. **29**, 2161,
1964; Rajšner M. et al.: Collect. Czech.
Chem. Commun. **39**, 1366, 1974] se míchá a
vaří 3 h pod zpětným chladičem v dusíko-
vé atmosféře. Ochlazená směs se zfiltruje,

filtrát se zředí 400 ml vody, za vnějšího chlazení se zalkalizuje 25 % roztokem hydroxidu sodného a extrahuje se dichlormethanem. Zpracováním extraktu se získá nehomogenní odparek, který se chromatografuje na koloně 120 g silikagelu (Merck 60). Elucí chloroformem se získá 14,9 g (49 %) žádané homogenní olejovité báze. Její neutralizací chlorovodíkem ve směsi ethanolu a etheru se připraví hydrochlorid, který krystalizuje ze směsi ethanolu a etheru a v čistém stavu taje při 172 až 173 °C. Zcela homogenní olejovitá báze se získá rozkladem hydrochloridu zředěným vodným amoniakem, extrakcí etherem a obvyklým zpracováním extraktu. Její ^1H NMR spektrum potvrzuje její identitu.

Příklad 2


4-(1-methyl-4-piperidyl)-4,9-dihydrothieno[2,3-c]-2-benzothiepin

Směs 45 ml kyseliny octové, 45 ml 57 %

kyseliny jodovodíkové, 5,6 g červeného fosforu a 13,3 g 4-(1-methyl-4-piperidyl)-4,9-dihydrothieno[2,3-c]-2-benzothiepin-4-olu (Rajšner M. et al.: Collect. Czech. Chem. Commun. **32**, 2854, 1967; Polívka Z. et al.: Collect. Czech. Chem. Commun. **48**, 623, 1983) se míchá a vaří 3,5 h pod zpětným chladičem. Podobné zpracování jako v předešlém příkladu poskytne 13,5 g nehomogenní báze, která se chromatografuje na 80 g silikagelu (Merck 40). Eluce chloroformem nejdříve odstraní 0,9 g směsi méně polárních komponent, po které se vymyje ze sloupce 8,0 g (63 %) žádané homogenní olejovité báze. Neutralizací chlorovodíkem ve směsi ethanolu a etheru se získá hydrochlorid, který krystalizuje z ethanolu a v čistém stavu taje při 279 až 290 °C. Jeho analýza i spektra potvrzují identitu. Z uvolněné báze se potom neutralizací kyselinou maleinovou připraví hydrogenmaleinát, který krystalizuje ze směsi ethanolu a etheru a taje při 151 až 153 °C.

PŘEDMĚT VYNÁLEZU

Aminy 4,9-dihydrothieno[2,3-c]-2-benzothiepinové řady obecného vzorce I



(I)

ve kterém R značí 3-dimethylaminopropyl nebo 1-methyl-4-piperidyl, a jejich soli s farmaceuticky nezávadnými anorganickými nebo organickými kyselinami.