(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)发明专利申请

(10)申请公布号 CN 104873596 A
(43)申请公布日 2015.09.02

(21)申请号 201510317800.0

(22)申请日 2015.06.11

(71)申请人 商孝霞
地址 250000 山东省济南市槐荫区营市西街5号

(72)发明人 商孝霞

(51)Int.Cl.
A61K 36/74(2006.01)
A61P 17/00(2006.01)

权利要求书1页 说明书7页

(54)发明名称

治疗湿疹的中药外洗剂

(57)摘要

本发明公开了治疗湿疹的中药外洗剂，主要由下列原料药制备而成，均为质量份：大飞扬9-16；半边旗11-15；石莽草7-12；木棉花10-16；防风8-14；伽蓝菜10-17；刺蒺藜9-13；蕨根11-16；节节花9-17；莲蓬草10-16；水团花8-16；牙疳药7-13；车前草10-15；山薄荷9-14；古山龙7-17；木芙蓉10-14。本发明经多年临床实践总结而成，具有消肿止痛、清热解毒的功效，疗效显著。

CN 104873596 A

1. 治疗湿疹的中药外洗剂，其特征在于，主要由下列原料药制备而成，均为质量份：大飞扬 9-16；半边旗 11-15；石莽草 7-12；木棉花 10-16；防风 8-14；伽蓝菜 10-17；刺蒺藜 9-13；蕨根 11-16；节节花 9-17；莲蓬草 10-16；水团花 8-16；牙疳药 7-13；车前草 10-15；山薄荷 9-14；古山龙 7-17；木芙蓉 10-14。

2. 如权利要求 1 所述的治疗湿疹的中药外洗剂，其特征在于，大飞扬 11-14；半边旗 12-14；石莽草 9-10；木棉花 12-14；防风 10-12；伽蓝菜 12-15；刺蒺藜 10-12；蕨根 12-15；节节花 11-15；莲蓬草 11-15；水团花 10-14；牙疳药 8-12；车前草 11-14；山薄荷 10-13；古山龙 9-15；木芙蓉 11-13。

3. 如权利要求 1 所述的治疗湿疹的中药外洗剂，其特征在于，大飞扬 12.5；半边旗 13；石莽草 9.5；木棉花 13；防风 11；伽蓝菜 13.5；刺蒺藜 11；蕨根 13.5；节节花 13；莲蓬草 13；水团花 12；牙疳药 10；车前草 12.5；山薄荷 11.5；古山龙 12；木芙蓉 12。

4. 如权利要求 1-3 任一所述的治疗湿疹的中药外洗剂的制备方法，其特征在于，步骤如下：

（1）取刺蒺藜除去杂质，利用沸腾的醋水，蒸气熏蒸 10-20 分钟，取出，将河砂放入热锅内，加热至灵活状态，与刺蒺藜混匀，翻炒至原料药表面颜色加深，取出、筛去砂，放凉；

（2）取石莽草、伽蓝菜、节节花、莲蓬草、牙疳药、车前草和山薄荷清水洗净，切碎，加入炼蜜拌匀，文火翻炒 3 分钟，再加水煎煮，大火加热至沸腾，转小火煎煮 15-25 分钟（优选的：小火煎煮 18-22 分钟；更加优选的：小火煎煮 20 分钟），关火后，过滤并收集滤液；

（3）取木棉花洗净除杂，置于炒制容器内，文火加热至干燥，再加入黄酒闷润，改为中火加热，炒至焦褐色，淋入清水，灭尽火星，取出，干燥放凉；

（4）将大飞扬、半边旗、防风、蕨根、水团花、古山龙和木芙蓉除去杂质，洗净切片或段，放入非铁质容器内，加入所煮原料药质量 7 倍的水，浸泡 8 分钟，武火加热至沸腾，持续 6 分钟，转小火煎煮，关火后，过滤收集滤液；

（5）将步骤（1）（3）所制原料药粉碎过筛，与步骤（2）（4）所得滤液混合，加热浓缩至原体积的一半，过滤后，即得中药外洗剂。

5. 如权利要求 4 所述的治疗湿疹的中药外洗剂的制备方法，其特征在于，步骤（1）蒸气熏蒸 12-18 分钟（优选的：蒸气熏蒸 15 分钟）。

6. 如权利要求 4 所述的治疗湿疹的中药外洗剂的制备方法，其特征在于，步骤（2）加水量为所煮原料药质量的 6-8 倍（优选的：加水量为所煮原料药质量的 6.5-7.5 倍；更加优选的：加水量为所煮原料药质量的 7 倍）。

7. 如权利要求 4 所述的治疗湿疹的中药外洗剂的制备方法，其特征在于，步骤（3）加入黄酒量为原料药质量的 1-3 倍（优选的：加入黄酒量为原料药质量的 2 倍）。

8. 如权利要求 4 所述的治疗湿疹的中药外洗剂的制备方法，其特征在于，步骤（4）转小火煎煮 30-44 分钟（优选的：转小火煎煮 34-40 分钟；更加优选的：转小火煎煮 37 分钟）。

9. 如权利要求 4 所述的治疗湿疹的中药外洗剂的制备方法，其特征在于，步骤（5）粉碎过 130-210 目筛（优选的：粉碎过 150-190 目筛；更加优选的：粉碎过 170 目筛）。

10. 如权利要求 1-3 任一所述的治疗湿疹的中药外洗剂在制备治疗湿疹的药物时的应用。

治疗湿疹的中药外洗剂

技术领域

[0001] 本发明涉及中医中药领域，特别是涉及治疗湿疹的中药外洗剂。

背景技术

[0002] 湿疹，属于比较常见的由多种内外因素引起的表皮及真皮浅层的炎症性皮肤病。按照皮损表现可分为急性、亚急性、慢性三期，急性湿疹初为多数密集的粟粒大小的丘疹、丘疱疹或小水疱，基底潮红，逐渐融合成片，由于搔抓，丘疹、丘疱疹或水疱顶端抓破后呈明显的点状渗出及小糜烂面，边缘不清。如继发感染，炎症更明显，可形成脓疱、脓痂、毛囊炎、疖等。自觉剧烈瘙痒。好发于头面、耳后、四肢远端、阴囊、肛周等，多对称发布；亚急性湿疹常因急性期损害处理不当迁延而来，皮损以红色丘疹、斑丘疹、鳞屑或结痂为主，兼有少数丘疱疹或水疱及糜烂渗液。慢性湿疹多有急性、亚急性湿疹反复不愈转化而来，皮损为暗红或棕红色斑或斑丘疹，常融合增厚呈苔藓样变，表面有鳞屑、抓痕和血痂，周围散在少数丘疹、斑丘疹等。

[0003] 公布号 CN104644828A（申请号 201310575795.4）的中国专利文献公开了一种能够彻底根治湿疹的外用中药。本发明是由以下中药成分组成的：蒲公英 10~15、苦参 20~30 克、刺五加 8~12 克、沙棘 10~18 克、川牛膝 15~25 克、金银花 5~10 克、吴茱萸 25~35 克、乌贼骨 15~25 克、硫磺 4~8 克。公布号 CN 104623104 A（申请号 201410856242.0）的中国专利文献公开了三九湿疹清外用药，它由 9 味中草药药汁组成。其各种药物的比份为：三角枫 200g；九里光 200g；土大黄 100g；蛇泡簕 60g；马缨丹 60g；虾钳草 60g；杠板归 100g；排痱草 50g；黄花蒿 100g。公布号 CN 104189185 A（申请号 201410405955.5）的中国专利文献公开了一种治疗湿疹的外用搽剂，采用的原料药材分别是：牡丹皮、地榆、车前子、苦参、龙骨、青蒿、蛇床子、栀子、公丁香、甘草、黄柏、黄连、白酒。制备方法为以下步骤：称取原料药材牡丹皮、地榆、车前子、苦参、龙骨、青蒿、蛇床子、栀子、公丁香、甘草、黄柏、黄连，去除杂质，加入白酒，密封，浸泡 1 个月即可取用。

[0004] 目前针对湿疹的治疗，尚无特效药，临床上多采用抗生素及激素类药物，长期使用，效果较差且损伤身体，因此需研制出一种疗效更加显著的中药。

发明内容

[0005] 针对现有技术的问题，本发明的目的是提供一种效果显著、使用安全适用性广的治疗湿疹的中药外洗剂。

[0006] 本发明的技术方案是：

治疗湿疹的中药外洗剂，主要由下列原料药制备而成，均为质量份：大飞扬 9-16；半边旗 11-15；石莽草 7-12；木棉花 10-16；防风 8-14；伽蓝菜 10-17；刺蒺藜 9-13；蕨根 11-16；节节花 9-17；莲蓬草 10-16；水团花 8-16；牙疳药 7-13；车前草 10-15；山薄荷 9-14；古山龙 7-17；木芙蓉 10-14。

[0007] 优选方案为，大飞扬 11-14；半边旗 12-14；石莽草 9-10；木棉花 12-14；防风

10-12；伽蓝菜 12-15；刺蒺藜 10-12；蕨根 12-15；节节花 11-15；莲蓬草 11-15；水团花 10-14；牙疳药 8-12；车前草 11-14；山薄荷 10-13；古山龙 9-15；木芙蓉 11-13。

[0008] 更加优选的是，大飞扬 12.5；半边旗 13；石莽草 9.5；木棉花 13；防风 11；伽蓝菜 13.5；刺蒺藜 11；蕨根 13.5；节节花 13；莲蓬草 13；水团花 12；牙疳药 10；车前草 12.5；山薄荷 11.5；古山龙 12；木芙蓉 12。

[0009] 所述的治疗湿疹的中药外洗剂的制备方法，步骤如下：

（1）取刺蒺藜除去杂质，利用沸腾的醋水，蒸气熏蒸 10-20 分钟，取出，将河砂放入热锅内，加热至灵活状态，与刺蒺藜混匀，翻炒至原料药表面颜色加深，取出、筛去砂，放凉；

（2）取石莽草、伽蓝菜、节节花、莲蓬草、牙疳药、车前草和山薄荷清水洗净，切碎，加入炼蜜拌匀，文火翻炒 3 分钟，再加水煎煮，大火加热至沸腾，转小火煎煮 15-25 分钟（优选的：小火煎煮 18-22 分钟；更加优选的：小火煎煮 20 分钟），关火后，过滤并收集滤液；

（3）取木棉花洗净除杂，置于炒制容器内，文火加热至干燥，再加入黄酒闷润，改为中火加热，炒至焦褐色，淋入清水，灭尽火星，取出，干燥放凉；

（4）将大飞扬、半边旗、防风、蕨根、水团花、古山龙和木芙蓉除去杂质，洗净切片或段，放入非铁质容器内，加入所煮原料药质量 7 倍的水，浸泡 8 分钟，武火加热至沸腾，持续 6 分钟，转小火煎煮，关火后，过滤收集滤液；

（5）将步骤（1）（3）所制原料药粉碎过筛，与步骤（2）（4）所得滤液混合，加热浓缩至原体积的一半，过滤后，即得中药外洗剂。

[0010] 所述的治疗湿疹的中药外洗剂的制备方法，步骤（1）蒸气熏蒸 12-18 分钟（优选的：蒸气熏蒸 15 分钟）。

[0011] 所述的治疗湿疹的中药外洗剂的制备方法，步骤（2）加水量为所煮原料药质量的 6-8 倍（优选的：加水量为所煮原料药质量的 6.5-7.5 倍；更加优选的：加水量为所煮原料药质量的 7 倍）。

[0012] 所述的治疗湿疹的中药外洗剂的制备方法，步骤（3）加入黄酒量为原料药质量的 1-3 倍（优选的：加入黄酒量为原料药质量的 2 倍）。

[0013] 所述的治疗湿疹的中药外洗剂的制备方法，步骤（4）转小火煎煮 30-44 分钟（优选的：转小火煎煮 34-40 分钟；更加优选的：转小火煎煮 37 分钟）。

[0014] 所述的治疗湿疹的中药外洗剂的制备方法，步骤（5）粉碎过 130-210 目筛（优选的：粉碎过 150-190 目筛；更加优选的：粉碎过 170 目筛）。

[0015] 本发明还提供所述的治疗湿疹的中药外洗剂在制备治疗湿疹的药物时的应用。

[0016] 本发明提供的治疗湿疹的中药外洗剂配方科学，制备方法简单。除此之外，它的优良之处还表现在：

1、本发明所得产品，疗效显著，疗程短，可有效消除皮损，防止复发；

2、本配方经多年临床实践总结而成，具有清热解毒、活血止痛的功效；

3、本发明所选中药材，安全无副作用，可长期使用，药效直达病灶。

具体实施方式

[0017] 下面结合实施例和实验例详细说明本发明的技术方案，但保护范围不限于此。

[0018] 实施例 1治疗湿疹的中药外洗剂，主要由下列原料药制备而成（每份 10g）：大飞扬

9 份，半边旗 11 份，石莽草 7 份，木棉花 10 份，防风 8 份，伽蓝菜 10 份，刺蒺藜 9 份，蕨根 11 份，节节花 9 份，莲蓬草 10 份，水团花 8 份，牙疳药 7 份，车前草 10 份，山薄荷 9 份，古山龙 7 份，木芙蓉 10 份。上述治疗湿疹的中药外洗剂的制备方法是：

（1）取刺蒺藜除去杂质，利用沸腾的醋水，蒸气熏蒸 10 分钟，取出，将河砂放入热锅内，加热至灵活状态，与刺蒺藜混匀，翻炒至原料药表面颜色加深，取出、筛去砂，放凉；

（2）取石莽草、伽蓝菜、节节花、莲蓬草、牙疳药、车前草和山薄荷清水洗净，切碎，加入炼蜜拌匀，文火翻炒 3 分钟，再加入所煮原料药质量 6 倍的水煎煮，大火加热至沸腾，转小火煎煮 15 分钟，关火后，过滤并收集滤液；

（3）取木棉花洗净除杂，置于炒制容器内，文火加热至干燥，再加入黄酒闷润（黄酒量为原料药质量的 1 倍），改为中火加热，炒至焦褐色，淋入清水，灭尽火星，取出，干燥放凉；

（4）将大飞扬、半边旗、防风、蕨根、水团花、古山龙和木芙蓉除去杂质，洗净切片或段，放入非铁质容器内，加入所煮原料药质量 7 倍的水，浸泡 8 分钟，武火加热至沸腾，持续 6 分钟，转小火煎煮 30 分钟，关火后，过滤收集滤液；

（5）将步骤（1）（3）所制原料药粉碎过 130 目筛，与步骤（2）（4）所得滤液混合，加热浓缩至原体积的一半，过滤后，即得中药外洗剂。

[0019] 实施例 2治疗湿疹的中药外洗剂，主要由下列原料药制备而成（每份 10g）：大飞扬 16 份，半边旗 15 份，石莽草 12 份，木棉花 16 份，防风 14 份，伽蓝菜 17 份，刺蒺藜 13 份，蕨根 16 份，节节花 17 份，莲蓬草 16 份，水团花 16 份，牙疳药 13 份，车前草 15 份，山薄荷 14 份，古山龙 17 份，木芙蓉 14 份。上述治疗湿疹的中药外洗剂的制备方法是：

（1）取刺蒺藜除去杂质，利用沸腾的醋水，蒸气熏蒸 20 分钟，取出，将河砂放入热锅内，加热至灵活状态，与刺蒺藜混匀，翻炒至原料药表面颜色加深，取出、筛去砂，放凉；

（2）取石莽草、伽蓝菜、节节花、莲蓬草、牙疳药、车前草和山薄荷清水洗净，切碎，加入炼蜜拌匀，文火翻炒 3 分钟，再加入所煮原料药质量 8 倍的水煎煮，大火加热至沸腾，转小火煎煮 25 分钟，关火后，过滤并收集滤液；

（3）取木棉花洗净除杂，置于炒制容器内，文火加热至干燥，再加入黄酒闷润（黄酒量为原料药质量的 3 倍，改为中火加热，炒至焦褐色，淋入清水，灭尽火星，取出，干燥放凉；

（4）将大飞扬、半边旗、防风、蕨根、水团花、古山龙和木芙蓉除去杂质，洗净切片或段，放入非铁质容器内，加入所煮原料药质量 7 倍的水，浸泡 8 分钟，武火加热至沸腾，持续 6 分钟，转小火煎煮 44 分钟，关火后，过滤收集滤液；

（5）将步骤（1）（3）所制原料药粉碎过 210 目筛，与步骤（2）（4）所得滤液混合，加热浓缩至原体积的一半，过滤后，即得中药外洗剂。

[0020] 典型病例：xxx，男性，41 岁。主诉：患者半年前大腿内外侧出现皮疹，可脱屑，瘙痒难忍，有蔓延趋势，抓挠后出现破损，曾使用皮炎平涂抹，效果不甚显著，经医院诊断，确诊为湿疹。

[0021] 使用本实例所得中药外洗剂，用时摇晃均匀，清洗患处，每日 2-3 次，十五天为一个疗程，患者使用一周后，瘙痒症状有所减轻，破损处逐渐好转，坚持使用两个疗程，皮疹基本消失，无其他不适症，又巩固十天后，患者痊愈，随访一年内，未出现复发。

[0022] 实施例 3治疗湿疹的中药外洗剂，主要由下列原料药制备而成（每份 10g）：大飞扬 11 份，半边旗 12 份，石莽草 9 份，木棉花 12 份，防风 10 份，伽蓝菜 12 份，刺蒺藜 10 份，蕨根

12 份，节节花 11 份，莲蓬草 11 份，水团花 10 份，牙疳药 8 份，车前草 11 份，山薄荷 10 份，古山龙 9 份，木芙蓉 11 份。上述治疗湿疹的中药外洗剂的制备方法是：

（1）取刺蒺藜除去杂质，利用沸腾的醋水，蒸气熏蒸 12 分钟，取出，将河砂放入热锅内，加热至灵活状态，与刺蒺藜混匀，翻炒至原料药表面颜色加深，取出、筛去砂，放凉；

（2）取石莽草、伽蓝菜、节节花、莲蓬草、牙疳药、车前草和山薄荷清水洗净，切碎，加入炼蜜拌匀，文火翻炒 3 分钟，再加入所煮原料药质量 6.5 倍的水煎煮，大火加热至沸腾，转小火煎煮 18 分钟，关火后，过滤并收集滤液；

（3）取木棉花洗净除杂，置于炒制容器内，文火加热至干燥，再加入黄酒闷润（黄酒量为原料药质量的 1 倍），改为中火加热，炒至焦褐色，淋入清水，灭尽火星，取出，干燥放凉；

（4）将大飞扬、半边旗、防风、蕨根、水团花、古山龙和木芙蓉除去杂质，洗净切片或段，放入非铁质容器内，加入所煮原料药质量 7 倍的水，浸泡 8 分钟，武火加热至沸腾，持续 6 分钟，转小火煎煮 34 分钟，关火后，过滤收集滤液；

（5）将步骤（1）（3）所制原料药粉碎过 150 目筛，与步骤（2）（4）所得滤液混合，加热浓缩至原体积的一半，过滤后，即得中药外洗剂。

[0023] 典型病例：xxx，女性，24 岁。主诉：皮肤潮红，瘙痒一周；病史：患者于一周前，无明显诱因出现皮肤瘙痒，伴有红色斑丘疹，分散于双手、双脚及大腿内侧，当时未在意，使用芦荟胶涂抹，未见效，且瘙痒加剧，严重影响睡眠质量，前往医院检查，诊断为急性湿疹。

[0024] 经人推荐使用本实例所得中药外洗剂，用时摇晃均匀，清洗患处，每日 2-3 次，十五天为一个疗程，患者使用一个疗程后，斑丘疹逐渐消退，不适症缓解，坚持使用三个疗程后，瘙痒消失，皮肤表面恢复正常，停药三个月内，病情未反复，患者痊愈。

[0025] 实施例 4治疗湿疹的中药外洗剂，主要由下列原料药制备而成（每份 10g）：大飞扬 14 份，半边旗 14 份，石莽草 10 份，木棉花 14 份，防风 12 份，伽蓝菜 15 份，刺蒺藜 12 份，蕨根 15 份，节节花 15 份，莲蓬草 15 份，水团花 14 份，牙疳药 12 份，车前草 14 份，山薄荷 13 份，古山龙 15 份，木芙蓉 13 份。上述治疗湿疹的中药外洗剂的制备方法是：

（1）取刺蒺藜除去杂质，利用沸腾的醋水，蒸气熏蒸 18 分钟，取出，将河砂放入热锅内，加热至灵活状态，与刺蒺藜混匀，翻炒至原料药表面颜色加深，取出、筛去砂，放凉；

（2）取石莽草、伽蓝菜、节节花、莲蓬草、牙疳药、车前草和山薄荷清水洗净，切碎，加入炼蜜拌匀，文火翻炒 3 分钟，再加入所煮原料药质量 7.5 倍的水煎煮，大火加热至沸腾，转小火煎煮 22 分钟，关火后，过滤并收集滤液；

（3）取木棉花洗净除杂，置于炒制容器内，文火加热至干燥，再加入黄酒闷润（黄酒量为原料药质量的 3 倍，改为中火加热，炒至焦褐色，淋入清水，灭尽火星，取出，干燥放凉；

（4）将大飞扬、半边旗、防风、蕨根、水团花、古山龙和木芙蓉除去杂质，洗净切片或段，放入非铁质容器内，加入所煮原料药质量 7 倍的水，浸泡 8 分钟，武火加热至沸腾，持续 6 分钟，转小火煎煮 40 分钟，关火后，过滤收集滤液；

（5）将步骤（1）（3）所制原料药粉碎过 190 目筛，与步骤（2）（4）所得滤液混合，加热浓缩至原体积的一半，过滤后，即得中药外洗剂。

[0026] 实施例 5治疗湿疹的中药外洗剂，主要由下列原料药制备而成（每份 10g）：大飞扬 12.5 份，半边旗 13 份，石莽草 9.5 份，木棉花 13 份，防风 11 份，伽蓝菜 13.5 份，刺蒺藜 11 份，蕨根 13.5 份，节节花 13 份，莲蓬草 13 份，水团花 12 份，牙疳药 10 份，车前草 12.5 份，

山薄荷 11.5 份，古山龙 12 份，木芙蓉 12 份。上述治疗湿疹的中药外洗剂的制备方法是：

（1）取刺蒺藜除去杂质，利用沸腾的醋水，蒸气熏蒸 15 分钟，取出，将河砂放入热锅内，加热至灵活状态，与刺蒺藜混匀，翻炒至原料药表面颜色加深，取出、筛去砂，放凉；

（2）取石莽草、伽蓝菜、节节花、莲蓬草、牙疳药、车前草和山薄荷清水洗净，切碎，加入炼蜜拌匀，文火翻炒 3 分钟，再加入所煮原料药质量 7 倍的水煎煮，大火加热至沸腾，转小火煎煮 20 分钟，关火后，过滤并收集滤液；

（3）取木棉花洗净除杂，置于炒制容器内，文火加热至干燥，再加入黄酒闷润（黄酒量为原料药质量的 2 倍），改为中火加热，炒至焦褐色，淋入清水，灭尽火星，取出，干燥放凉；

（4）将大飞扬、半边旗、防风、蕨根、水团花、古山龙和木芙蓉除去杂质，洗净切片或段，放入非铁质容器内，加入所煮原料药质量 7 倍的水，浸泡 8 分钟，武火加热至沸腾，持续 6 分钟，转小火煎煮 37 分钟，关火后，过滤收集滤液；

（5）将步骤（1）（3）所制原料药粉碎过 170 目筛，与步骤（2）（4）所得滤液混合，加热浓缩至原体积的一半，过滤后，即得中药外洗剂。

[0027] 本发明所用主要中药原料的药理如下：

大飞扬：基原：为豆科植物马鞍叶羊蹄甲的枝叶或根。性味：苦涩，平。功能主治：清热润肺，敛阴安神，除湿，杀虫。治百日咳，心悸失眠，盗汗遗精，瘰窃，湿疹，疥癣。

[0028] 半边旗：基原：为凤尾蕨科植物半边旗的全草或根茎。性味：苦；辛；凉。归经：肝；大肠经。功能主治：清热利湿；凉血止血；解毒消肿。主泄泻；痢疾；黄疸；目赤肿痛；牙痛；吐血；痔疮出血；外伤出血；跌打损伤；皮肤瘙痒；毒蛇咬伤。

[0029] 石莽草：基原：为蓼科植物头花蓼的全草。化学成份：头花蓼全草含苯甲醛，乙酸，24-羟基二十四烷-3-酮，29-羟基二十九烷-3-酮，β-谷甾醇，没食子酸。性味：苦；辛；性凉。功能主治：清热利湿；活血止痛。主痢疾；肾盂肾炎；膀胱炎；尿路结石；风湿痛；跌打损伤；疟腮；疮疡；湿疹。

[0030] 木棉花：基原：为木棉科植物木棉的花。性味：甘；淡；性凉。归经：脾；肝；大肠经。功能主治：清热；利湿；解毒；止血。主泄泻；痢疾；咳血；吐血；血崩；金疮出血；疮毒；湿疹。

[0031] 防风：性味：辛、甘，微温。归经：归膀胱、肺、脾、肝经。功效：祛风解表，胜湿止痛。主治：用于外感风寒，头痛身痛，风湿痹痛。

[0032] 伽蓝菜：基原：为景天科植物伽蓝菜的全草。性味：甘；苦；寒。归经：心；肝；肺经。功能主治：散瘀止血；清热解毒。主跌打损伤；扭伤；外伤出血；咽喉炎；烫伤；湿疹；痈疮肿毒；毒蛇咬伤。

[0033] 刺蒺藜：基原：为蒺藜科植物蒺藜和大花疾藜的果实。性味：味苦；辛；性平。归经：肝；肺；肾；心经。功能主治：平肝；解郁；祛风明目。主头痛；眩晕；胸胁胀痛；乳房胀痛；乳闭不通；经闭；目赤翳障；风疹瘙痒；白癜风；疮疽；瘰疬。

[0034] 蕨根：基原：为蕨科植物蕨的根茎。性味：甘；寒；无毒。归经：肺；肝；脾；大肠经。功能主治：清热；利湿；平肝安神；解毒消肿。主发热；咽喉肿痛；腹泻；痢疾；黄疸；白带；高血压；头昏失眠；风湿痹痛；痔疮；脱肛；湿疹；烫伤；蛇虫咬伤。

[0035] 节节花：基原：为苋科植物莲子草的全草或带根全草。性味：苦，凉。归经：《泉州本草》：″入心、小肠二经。″功能主治：清热，利尿，解毒。治咳嗽吐血，痢疾，肠风下血，淋

病，痈疽肿毒，湿疹。

[0036] 莲蓬草：基原：为菊科植物吕吴风草的全草。性味：味辛；甘；微苦；性凉。功能主治：清热解毒；凉血止血；消肿散结。主感冒；咽喉肿痛；咳嗽咯血；便血；尿血；朋经不调；乳腺炎；瘰疬；痈疖肿毒；痈疮湿疹；跌打损伤；蛇咬伤。

[0037] 水团花：基原：为双子叶植物药茜草科植物水团花的枝叶或花果。性味：味苦、涩、性凉。归经：肝；脾；大肠经。功能主治：清热祛湿；散瘀止痛；止血敛疮。。主痢疾；肠炎；浮肿；痈肿疮毒；湿疹；溃疡不敛；创伤出血。

[0038] 牙疳药：基原：为双子叶植物药茜草科植物粗糙钩毛耳草的全草。性味：味辛；甘；微苦；性平。归经：胃经。功能主治：祛风除湿；健脾消积。主牙疳；小儿疳积；风湿关节炎；泄泻；痢疾；皮肤瘙痒。

[0039] 车前草：性味与归经，甘，寒。归肝、肾、肺、小肠经。有清热利尿通淋，祛痰，凉血，解毒的功效。用于热淋涩痛。水肿尿少，暑湿泄泻，痰热咳嗽，吐血衄血，痈肿疮毒。

[0040] 山薄荷：基原：为唇形科植物香青兰的全草。性味：味辛；苦；性凉。功能主治：疏风清热；利咽止咳；凉肝止血。主感冒发热；头痛；咽喉肿痛；咳嗽氯喘；痢疸；吐血；衄血；风疹；皮肤瘙痒。

[0041] 古山龙：基原：为防己科植物古山龙的根或茎藤。性味：苦；寒；小毒。归经：心；肺；大肠经。功能主治：清热利湿；泻火解毒。主肠炎；菌痢；黄疸；疟疾；疖肿；湿疹；阴道炎；支气管炎；百日咳；扁桃体炎；眼结膜炎。

[0042] 木芙蓉：基原：为锦葵科木槿属植物木芙蓉，以花（芙蓉花）、叶（芙蓉叶）和根入药。性味：微辛，凉。功能主治：清热解毒，消肿排脓，凉血止血。用于肺热咳嗽，月经过多，白带；外用治痈肿疮疖，乳腺炎，淋巴结炎，腮腺炎，烧烫伤，毒蛇咬伤，跌打损伤。

[0043] 试验例 1 本发明所得治疗湿疹的中药外洗剂（实施例 5）的临床应用：

选取人群：2014 年 4 月 -2015 年 4 月，依据就诊病历，在五家医院筛选患有湿疹的患者 382 例，年龄 1-70 岁，平均年龄 39.4±3.6 岁，病程 3 个月 -10 年，平均病程 4.5±2.8 年，其中男性患者 186 例，女性患者 196 例。诊断标准：①皮损为局限性，肥厚浸润较剧，常伴有色素沉着，境界清楚。②严重瘙痒。③反复出现的急性发作史。④好发部位：手，足，小腿，肘窝，股部，乳房，外阴及肛门等处。排除标准：合并细菌或真菌感染的皮肤病；有药物接触过敏史者；有糖尿病、柯兴氏综合征等内分泌疾病者；妊娠期、哺乳期妇女以及儿童；治疗期间服用其他药物者。

[0044] 试验前，将患者随机分为两组，实验组 264 例和对照组 118 例，两组在性别、年龄、病程、病情等方面无显著差异。实验组使用本发明所得产品，用时摇晃均匀，清洗患处，每日 2-3 次，十五天为一个疗程；对照组使用其他常规药物（派瑞松、复方酮康唑软膏、艾洛松等）。用药期间对两组患者进行连续观察，记录症状及变化。

[0045] 疗效判定标准：参照文献疗效标准，(1) 治愈：临床症状全部消失，皮损完全消退，无其他不适；(2) 显效：临床症状明显缓解，皮损消退 70% 以上；(3) 有效：临床症状有所改善，皮损消退 30% 以上；(4)无效：症状无改善，皮损消退 30% 以下。总有效率 = 治愈率 + 显效率 + 有效率

临床结果：经三个疗程的用药后，两组的治疗结果如表 1 所示：

组别	病例总数	治愈		显效		有效	
		例数	痊愈率	例数	显效率	例数	有效率
实验组	N=264	181	68.6%	48	18.2%	30	11.4%
对照组	N=118	61	51.7%	28	23.7%	12	10.2%

由表 1 可知，实验组的治愈患者为 181 例，治愈率为 68.6%，显效患者为 48 例，有效患者为 30 例，总有效率为 98.2%，而对照组被治愈的患者为 61 例，治愈率为 51.7%，显效的患者为 28 例，有效的患者为 12 例，总有效率 85.6%，明显低于实验组的治疗效果，说明本发明所得产品疗效显著，治愈率高。

[0046] 本发明中所使用的中药，大飞扬可清热润肺，半边旗可解毒消肿，石莽草、蕨根、古山龙可清热利湿，木棉花、节节花、木芙蓉可清热解毒，防风胜湿止痛，伽蓝菜可散瘀止血，刺蒺藜可平肝解郁，莲蓬草可消肿散结，水团花可散瘀止痛，牙疳药可祛风除湿，车前草可凉血解毒，山薄荷可疏风清热，多种药材协同作用，共奏清热解毒、消肿止痛等功效，有效消除皮损，防止病情复发。

[0047] 应当指出的是，具体实施方式只是本发明比较有代表性的例子，显然本发明的技术方案不限于上述实施例，还可以有很多变形。本领域的普通技术人员，以本发明所明确公开的或根据文件的书面描述毫无异议的得到的，均应认为是本专利所要保护的范围。