



(12) 发明专利申请

(10) 申请公布号 CN 104873884 A

(43) 申请公布日 2015. 09. 02

(21) 申请号 201510196638. 1

(22) 申请日 2015. 04. 24

(71) 申请人 安徽智远生物科技有限公司

地址 241200 安徽省芜湖市繁昌县孙村镇金岭村盛村组

(72) 发明人 钱小智

(74) 专利代理机构 安徽合肥华信知识产权代理有限公司 34112

代理人 方峥

(51) Int. Cl.

A61K 36/9066(2006. 01)

A61P 29/00(2006. 01)

权利要求书1页 说明书2页

(54) 发明名称

一种治疗跌打损伤的外用中药

(57) 摘要

本发明公开了一种治疗跌打损伤的外用中药,其组成原料的重量份为:续断 5-6、当归 2-4、骨碎补 6-8、莪术 4-5、炙甘草 8-10、川芎 2-4、川牛膝 5-6、万年青 2-4、姜黄 7-8、羌活 4-5、白芷 2-4、威灵仙 1-3、五加皮 4-5、海桐皮 2-4、制乳香 5-6、熟大黄 4-5、三七 2-4、紫楠根 1-3、雉子筴根 2-4;本发明的外用中药对皮肤无任何副作用,相互之间协同作用,具有祛风止痛、活血化瘀、止血生肌、清热燥湿之功效,其组方合理,治疗跌打损伤疗效确切,无副作用,值得临床推广和应用。

1. 一种治疗跌打损伤的外用中药,其特征不在于其组成原料的重量份为:续断 5-6、当归 2-4、骨碎补 6-8、莪术 4-5、炙甘草 8-10、川芎 2-4、川牛膝 5-6、万年青 2-4、姜黄 7-8、羌活 4-5、白芷 2-4、威灵仙 1-3、五加皮 4-5、海桐皮 2-4、制乳香 5-6、熟大黄 4-5、三七 2-4、紫楠根 1-3、雉子筴根 2-4。

2. 根据权利要求 1 所述的治疗跌打损伤的外用中药,其特征不在于其组成原料的重量份为:续断 5.5、当归 3、骨碎补 7、莪术 4.5、炙甘草 9、川芎 3、川牛膝 5.5、万年青 3、姜黄 7.5、羌活 4.5、白芷 3、威灵仙 2、五加皮 4.5、海桐皮 3、制乳香 5.5、熟大黄 4.5、三七 3、紫楠根 2、雉子筴根 3。

一种治疗跌打损伤的外用中药

技术领域

[0001]

[0002] 本发明涉及一种治疗跌打损伤的外用中药,属于中药领域。

背景技术

[0003]

[0004] 跌打损伤包括刀枪、跌仆、殴打、闪挫、刺伤、擦伤、运动损伤、扭伤等,伤处多有疼痛、肿胀、出血或骨折、脱臼等,主要以软组织损伤为主;虽然目前已有不少治疗跌打损伤的药物,对医治骨质损伤和内外组织损伤等疾病有一定的疗效;但是,现有治疗跌打损伤的药物,在快速止痛止血和加快骨质生长愈合这两方面的效果不是很明显。

发明内容

[0005]

[0006] 本发明的目的在于提供一种治疗跌打损伤的外用中药。

[0007] 本发明采用如下技术方案:

治疗跌打损伤的外用中药,其组成原料的重量份为:续断 5-6、当归 2-4、骨碎补 6-8、莪术 4-5、炙甘草 8-10、川芎 2-4、川牛膝 5-6、万年青 2-4、姜黄 7-8、羌活 4-5、白芷 2-4、威灵仙 1-3、五加皮 4-5、海桐皮 2-4、制乳香 5-6、熟大黄 4-5、三七 2-4、紫楠根 1-3、雉子筴根 2-4。

[0008] 治疗跌打损伤的外用中药,其组成原料的重量份为:续断 5.5、当归 3、骨碎补 7、莪术 4.5、炙甘草 9、川芎 3、川牛膝 5.5、万年青 3、姜黄 7.5、羌活 4.5、白芷 3、威灵仙 2、五加皮 4.5、海桐皮 3、制乳香 5.5、熟大黄 4.5、三七 3、紫楠根 2、雉子筴根 3。

[0009] 用量及用法:按组成原料的重量份称取各原料,粉碎成粉末,然后加入适量白酒搅拌均匀,成糊状敷于患处,每天敷患处 1-2 次,患者敷用 10-15 天即可治愈。

[0010] 本发明的有益效果:

本发明的外用中药对皮肤无任何副作用,相互之间协同作用,具有祛风止痛、活血化瘀、止血生肌、清热燥湿之功效,其组方合理,治疗跌打损伤疗效确切,无副作用,值得临床推广和应用。

具体实施方式

[0011]

[0012] 实施例 1:治疗跌打损伤的外用中药,其组成原料的重量份(g)为:续断 5.5、当归 3、骨碎补 7、莪术 4.5、炙甘草 9、川芎 3、川牛膝 5.5、万年青 3、姜黄 7.5、羌活 4.5、白芷 3、威灵仙 2、五加皮 4.5、海桐皮 3、制乳香 5.5、熟大黄 4.5、三七 3、紫楠根 2、雉子筴根 3。

[0013] 用量及用法:按组成原料的重量份称取各原料,粉碎成粉末,然后加入适量白酒搅拌均匀,成糊状敷于患处,每天敷患处 1-2 次,患者敷用 10-15 天即可治愈。

[0014] 典型病例:

病例 1 :张某某,男,32 岁,腰部在工作时不慎损伤,有明显的疼痛感,不可剧烈运动 ;涂敷本发明的外用中药一个疗程后,症状明显减轻,继续服用两个疗程后,痊愈。

[0015] 病例 2 :刘某,男,42 岁,肩部被重物压伤,疼痛难忍,多处软组织挫伤,涂敷本发明的外用中药两个疗程后,症状明显减轻,疼痛明显好转,继续服用两个疗程后,痊愈,至今未复发。

[0016] 病例 3 :张某某,女,34 岁,脚踝扭伤,患处疼痛难忍,伴有肿胀、淤血 ;不能行走,多方治疗无效,效果不明显,后涂敷本发明的外用中药十余天,肿胀、疼痛等症状明显减轻,淤血消失,后继续服用两个疗程后,痊愈,可自行行走。