



⑩ A **Terinzagelegging** ⑪ **8320218**

**Nederland**

⑲ **NL**

---

⑤4 **Nieuwe vitamine D analogen.**

⑤1 Int.Cl<sup>3</sup>.: C07C 172/00, A61K 31/59.

⑦1 Aanvrager: Wisconsin Alumni Research Foundation te Madison, Wisconsin,  
Ver.St.v.Am.

⑦4 Gem.: Ir. L.W. Kooy c.s.  
Octrooibureau Vriesendorp & Gaade  
Dr. Kuiperstraat 6  
2514 BB 's-Gravenhage.

---

②1 Aanvraag Nr. 8320218.

⑧6 Aanvraagnummer oorspronkelijke internationale aanvraag: PCT/US83/00965.

②2 Ingediend 22 juni 1983.

③2 Voorrang vanaf 26 juli 1982.

③3 Land van voorrang: Ver. St. v. Am. (US).

③1 Nummer van de voorrangsaanvraag: 401997 .

⑥2 - -

---

④3 Ter inzage gelegd 1 juni 1984.

⑧7 Publicatiedatum oorspronkelijke internationale aanvraag: 16 februari 1984.

⑧7 Publicatienummer oorspronkelijke internationale aanvraag: WO84/00550.

Deze octrooiaanvraag werd ingediend als internationale octrooiaanvraag onder de bepalingen van het Verdrag tot samenwerking inzake octrooien (PCT). De aan dit blad gehechte stukken zijn een afdruk van een Nederlandse vertaling van de oorspronkelijk in een andere taal ingediende beschrijving met conclusie(s) en tekening(en). De Nederlandse octrooiaanvraag wordt geacht te zijn ingediend op de indieningsdatum van de internationale octrooiaanvraag.

---

- 1 -

BeschrijvingNieuwe vitamine D analogen5     Technisch terrein

De uitvinding heeft betrekking op verbin-  
dingen, die worden gekenmerkt door vitamine D achtige werking.

De uitvinding heeft meer in het bijzonder  
10     betrekking op gefluoreerde vitamine D<sub>3</sub> analogen.

Technische achtergrond

Het staat nu duidelijk vast, dat de werking  
15     van vitamine D bij de regulering van de calcium- en fosfaat-  
hemeostase bij dieren en mensen afhankelijk is van het meta-  
bolisme van het vitamine in vivo tot gehydroxyleerde vormen.  
In het geval van vitamine D<sub>3</sub> behelst deze metabolische aktive-  
ring een aanvankelijke hydroxylering aan koolstof 25 onder  
20     verkrijging van 25-hydroxyvitamine D<sub>3</sub>, gevolgd door een andere  
hydroxylering aan koolstof 1 onder vorming van 1 $\alpha$ ,25-dihy-  
droxyvitamine D<sub>3</sub>. Deze laatste verbinding wordt in het alge-  
meen als de actieve vorm van vitamine D<sub>3</sub> beschouwd en als  
zodanig is het middel rechtstreeks verantwoordelijk voor de  
25     stimulering van intestinaal calciumtransport en beendermine-  
raalmobilisatie in vivo.

1 $\alpha$ ,25-dihydroxyvitamine D<sub>3</sub> is echter zelf  
onderhevig aan verder metabolisme in vivo, waarbij het bij-  
voorbeeld door enzymatische hydroxylering aan C-24 in 1 $\alpha$ ,24,  
30     25-trihydroxyvitamine D<sub>3</sub> wordt omgezet. Deze 24-gehydroxyleer-  
de vorm is echter minder actief dan 1 $\alpha$ ,25-dihydroxyvitamine  
D<sub>3</sub> zelf en 24-hydroxylering kan zelfs een stap naar inaktive-  
ring en afbraak van de actieve vorm van het vitamine betekenen.  
Naar mate er zodoende 24-hydroxylering optreedt, put deze de  
35     lichaamsvoorraden aan de fysiologische actiefste metaboliet,

1 ~~W~~,25-dihydroxyvitamine D<sub>3</sub>, uit. Om deze reden zijn 24,24-  
difluorverbindingen onlangs voorgesteld als farmakologisch  
gewenste analogen en vervangingsmiddelen, omdat de aanwezig-  
heid van de 24-difluorsubstituenten de aktiviteit-dempende  
5 24-hydroxyleringsreacties blokkeert. Er werd zelfs aangetoond,  
dat dergelijke verbindingen werkingen hebben, die tenminste  
equivalent en in het algemeen superieur zijn ten opzichte  
van de overeenkomstige niet gefluoreerde metaboliët (zie de  
Amerikaanse octrooischriften 4.196.133 en 4.201.881, Tanaka  
10 et al., J. Biol. Chem. 254, 7163 (1979); Tanaka et al., Arch.  
Biochem. Biophys. 199, 473 (1980)).

#### Beschrijving van de uitvinding

15 De onderhavige uitvinding heeft betrekking  
op nieuwe verbindingen met de gewenste eigenschappen van ster-  
ke potentie en een geblokkeerde C-24-positie. Een voorbeeld  
van een dergelijke verbinding is 24-fluor-1,25-dihydroxy-  
vitamine D<sub>3</sub>, die kan worden voorgesteld met de formule 1 en  
20 op overeenkomstige acylderivaten van deze verbindingen, als-  
mede hun 5,6-transisomeren.

Bovengenoemde structuur wordt gekenmerkt  
door de aanwezigheid van de werking versterkende hydroxyl-  
groepen aan koolstoffen 1 en 25, zoals deze optreden in de  
25 natuurlijke metaboliët en fluor als blokkerende substituent  
aan koolstof 24. De blokkerende substituent stoort de invoer-  
ring door metabolisme in vivo van de 24-hydroxylgroep. Vanwe-  
ge de aanwezigheid van een enkele fluorsubstituent hebben  
dergelijke verbindingen boven eerder voorgestelde 24-geblok-  
30 keerde analogen (bovengenoemde Amerikaanse octrooischriften  
4.201.881 en 4.196.133) / dat zij <sup>het voordeel,</sup> biologisch en chemisch gelijk-  
ker en <sup>nauwer</sup> verwant aan de natuurlijke 1,25-dihydroxymetaboliët  
zijn en zodoende een gewenster vervangingsmiddel voor de na-  
tuurverbinding zijn. Ook vanwege deze mindere fluorsubstitutie  
35 kan het nieuwe analoog voordelig en beter worden gebruikt bij

8320218

de behandeling van beenderziekten en verwante calciumstorin-  
gen, aangezien het bij de praktische farmaceutische toepas-  
singen van geneesmiddelen vaak gewenst is, de invoering van  
5 onnatuurlijke vreemde elementen zo veel mogelijk te vermij-  
den.

24-fluor-1 $\alpha$ ,25-dihydroxyvitamine D<sub>3</sub> kan  
worden bereid door de enzymatische hydroxylering in vitro  
van 24-fluor-25-hydroxyvitamine D<sub>3</sub> (Amerikaans octrooischrift  
4.305.880) aan koolstof 1, onder gebruikmaking van een homo-  
10 genaat van nierweefsel, dat is verkregen uit vitamine D-  
deficiente kuikens. Het vereiste homogenaat wordt als volgt  
verkregen: een dag oude leghornkuikens worden gedurende een  
maand gevoederd met een vitamine D-deficient dieet, dat 1%  
calcium bevat (Omdahl et al., Biochemistry, 10, 2935-2940  
15 (1971)). De kuikens worden daarna gedood, hun nieren worden  
verwijderd en er wordt een 20% (w/v) homogenaat bereid in  
ijskoude 0,19 M saccharoseoplossing, die 15 mM Tris-acetaat  
(trihydroxymethylaminoethaanacetaat) pH 7,4)) en 1,9 mM  
magnesiumacetaat bevat. (Omdahl, J., et al., Biochemistry,  
20 10, 2935-2940 (1971) en Tanaka, Y., et al., Arch. Biochem.  
Biophys. 171, 521-526 (1975)).

Ter bereiding van het gewenste analoog,  
24-fluor-1 $\alpha$ ,25-dihydroxyvitamine D<sub>3</sub>, wordt de uitgangsstof,  
24-fluor-25-hydroxyvitamine D<sub>3</sub> daarna met dit homogenaat ge-  
25 incubeerd. De volgende procedure toont een incubatie op kleine  
schaal, maar desgewenst kunnen de hoeveelheden natuurlijk op  
passende schaal worden vergroot.

Een monster (ca. 3  $\mu$ g) 24-fluor-25-hy-  
droxyvitamine D<sub>3</sub> (in 25  $\mu$ l 95% ethanol) wordt toegevoegd aan  
30 een hoeveelheid nierhomogenaat (dat als boven beschreven is  
bereid en ongeveer 600 mg nierweefsel vertegenwoordigt), dat  
gesuspendeerd is in 4,5 ml bufferoplossing (pH 7,4), die 0,19  
M saccharose, 1,5 mM Tris-acetaat, 1,9 mM magnesiumacetaat en  
25 mM succinaat bevat. Na 2 uur schudden van het mengsel bij  
35 37°C wordt de reactie gestopt door toevoeging van een 2:1

8320218



D<sub>3</sub>) verkregen en gekenmerkt en gekwantificeerd aan zijn ultravioletabsorptiemaximum bij 264 nm en zijn kenmerkende massaspektrumpatroon (molekuulgewicht = 434).

5                                    Uit het 24-fluor-1  $\alpha$ ,25-dihydroxyvitamine  
D<sub>3</sub> wordt het overeenkomstige 5,6-trans-isomeer gemakkelijk  
bereid door met jodium gekatalyseerde isomerisatie volgens  
de algemene werkwijze van Verloop et al., Rec. Trav. Chim.  
Rays-Bas 78, 1004 (1969). Aldus levert behandeling van 24-  
10 fluor-1  $\alpha$ ,25-dihydroxyvitamine D<sub>3</sub> in etheroplossing, die een  
druppel pyridine bevat, met een jodiumoplossing in hexaan  
(0,5 mg/ml) gedurende 15 minuten, gevolgd door toevoeging  
van een natriumthiosulfaatoplossing in water, afscheiding  
van de organische fase en verdamping van het oplosmiddel een  
residu op, waaruit het gewenste 24-fluor-1  $\alpha$ ,25-dihydroxy-  
15 5,6-transvitamine D<sub>3</sub> wordt gewonnen door een combinatie van  
omgekeerde fase en rechte fase hogedrukvlloeistofchromatogra-  
fie (HPLC) onder gebruikmaking van boven beschreven systemen  
of door dunnelaagchromatografie (TLC) aan silicagel onder  
gebruikmaking van ethylacetaat/hexaanoplosmiddelmengsels.

20                                    Geacyleerde derivaten van beide boven-  
genoemde verbindingen, die voor bepaalde toepassingen gewenst  
kunnen zijn, worden op gebruikelijke wijzen bereid, teweten  
door behandeling van een oplossing van de hydroxylverbinding  
met een acyleermiddel, zoals een acylanhydride of acylchlor-  
25 ride. Verschillende uitvoeringsvormen voor dergelijke acyle-  
ringen zijn in de techniek goed bekend, alsmede de vereiste  
acyleerreagentia. Zo levert bijvoorbeeld behandeling van 24-  
fluor-1,25-dihydroxyvitamine D<sub>3</sub> met azijnzuuranhydride in  
pyridine, of mengsels van pyridine en een inert medeoplosmid-  
30 del, bij temperaturen beneden 50°C, het overeenkomstige 1,3-  
diacetaat op, terwijl onder krachtigere omstandigheden, bij-  
voorbeeld 80-90°C, het 1,3,25-triacetaat wordt verkregen.  
Andere acylaten, zoals propionaten, butyraten, benzoaten,  
nitrobenzoaten, hemisuccinaten, hemiglutamaten, hemiadipaten,  
35 hemidiglykolaten, enzovoort, worden op analoge wijze bereid

8320218

door reactie van de vitaminealkohol met de overeenkomstige anhydriden of zuurchloriden. Desgewenst worden acylgroepen in dergelijke geacyleerde derivaten op gebruikelijke wijze verwijderd, zoals hydrolyse met zachte base (KOH/MeOH) of  
5 soortgelijke omstandigheden). Door selectieve acylering en/of deacylering, uitgevoerd aan 24-fluor-1~~4~~,25-dihydroxyvitamine D<sub>3</sub> of zijn 5,6-trans-isomeer kan men verbindingen verkrijgen met de structuurformules 2 of 3, waarin R<sub>1</sub>, R<sub>2</sub> en R<sub>3</sub>, die hetzelfde of verschillend kunnen zijn, elk waterstof of acyl  
10 voorstellen.

In deze beschrijving en in de conclusies heeft de uitdrukking acyl betrekking op een alifatische acylgroep met 1 tot 6 koolstofatomen in alle mogelijke isomere vormen, zoals acetyl, propionyl, butyryl, enzovoort, of op  
15 gebruikelijke aromatische arylgroepen, zoals benzoyl, nitrobenzoyl, halogeenbenzoyl, methylbenzoyl, enzovoort, of op een dicarbonsure acylgroep met 2-6 atomen ketenlengte, zoals worden vertegenwoordigd door oxalyl, malonyl, succinyl, glutaryl, adipyl, diglykoly, enzovoort.

20 De sterke vitamine D achtige werking van de nieuwe verbindingen van de uitvinding, gelijk aan die van het natuurlijke hormoon, 1,25-dihydroxyvitamine D<sub>3</sub>, bemoedigt krachtig hun toepassing als therapeutische middelen voor aandoeningen, waarbij calcium- en fosfaatmetabolisme betrokken  
25 zijn, met misschien betere instandhouding van de verbindingsvoorraad in vivo, vanwege de verstoring van de 24-hydroxylering.

30

8320218

C O N C L U S I E S.

1. Verbindingen met de formule 2 of 3,  
waarin  $R_1$ ,  $R_2$  en  $R_3$ , die hetzelfde of verschillend kunnen  
zijn, elk uit waterstof of acyl geselecteerd zijn.

5 2. Verbindingen volgens conclusie 1, waarin  
 $R_1$ ,  $R_2$  en  $R_3$  elk geselecteerd zijn uit de groep, bestaande uit  
waterstof, acetyl en benzoyl.

3. 24-fluor-1 $\alpha$ ,25-dihydroxyvitamine  $D_3$ .

4. 24-fluor-1 $\alpha$ ,25-dihydroxy-5,6-trans-  
vitamine  $D_3$ .

10

8320218

