



[12] 发明专利申请公开说明书

[21]申请号 95109747.4

[51]Int.Cl⁶

A61K 35/78

[43]公开日 1996年5月15日

[22]申请日 95.8.16

[71]申请人 岳泰出

地址 137100吉林省镇来县镇来镇四街岳泰出
诊所

共同申请人 岳素贤 岳晓出

[72]发明人 岳泰出 岳素贤 岳晓出

[74]专利代理机构 北京元中专利事务所

代理人 王凤华

权利要求书 2 页 说明书 5 页 附图页数 0 页

[54]发明名称 消栓通脉散

[57]摘要

治疗脱疽新药消栓通脉散为一种中药合剂, 适用初期脱疽患者的配方由当归、附子、干姜、桃仁、细辛、肉桂、红花、三七、赤木、元芪、桂枝、鸡血藤、川芎、水蛭、土虫、艾叶、牛膝、熟地、甲珠等中药成分组成; 适用于中、晚期脱疽患者的配方由桃仁、当归、双花、甲珠、牛膝、赤芍、水蛭、三七、公英、丹参、红花、元芪、熟地、生地、附子、桂枝、一米、赤木、川楝子、元胡、地丁、乳香、没药、甘草等中药成分组成。该散剂不含任何激素, 无毒副作用, 疗程短, 疗效显著, 治愈率达 90—95%, 有效率达 100%, 并可根治此病, 永不复发。

权 利 要 求 书

1. 一种治疗脱疽新药消栓通脉散,其特征在于为一种中药合剂,由多种中药成份组成,其中药成份包括当归、附子、干姜、桃仁、细辛、肉桂、红花、三七、赤木、元芪、桂枝、鸡血藤、川芎、水蛭、土虫、艾叶、牛膝、熟地、甲珠等。

2. 按权利要求1所述的消栓通脉散,其特征在于所述的中药成份重量配比如下:

当归 10-25g	桃仁 10-20g
红花 5-20g	三七 5-15g
赤木 5-20g	附子 5-20g
干姜 5-20g	细辛 5-10g
肉桂 5-20g	元芪 20-70g
桂枝 10-20g	熟地 5-25g
鸡血藤 10-50g	川芎 10-20g
水蛭 5-15g	土虫 5-15g
艾叶 5-25g	牛膝 10-20g
甲珠 5-15g	

3. 按权利要求1所述的消栓通脉散,其特征在于所述的中药成份还可以为:桃仁、双花、当归、甲珠、牛膝、赤芍、水蛭、三七、公英、丹参、红花、元芪、熟地、生地、附子、桂枝、一米、赤木、川楝子、元胡、地丁、乳香、没药、甘草。

4. 按权利要求3所述的消栓通脉散,其特征在于所述的中药成份的重量配比如下:

桃仁	10-20g	当归	20-50g
双花	20-50g	甲珠	5-15g
牛膝	10-20g	赤芍	10-20g
水蛭	5-15g	三七	5-15g
公英	15-50g	丹参	10-50g
红花	10-15g	元芪	20-70g
熟地	10-25g	生地	10-50g
附子	2-5g	桂枝	2-5g
一米	10-50g	赤木	10-25g
川楝子	5-15g	元胡	10-20g
地丁	15-50g	乳香	5-15g
没药	5-15g	甘草	5-20g

说 明 书

消栓通脉散

本发明提供的消栓通脉散涉及一种治疗脱疽（血栓闭塞型脉管炎）的药物，是一种中药合剂。

脱疽亦称血栓闭塞型脉管炎，是一种疑难病症。此病多发于人体肢体，轻者可令患肢发麻发凉，造成肌肉萎缩，肢体抽搐、跛行，中期患肢发紫暗色，疼痛难忍，发展到后期，患肢则焦黑坏死，溃烂流浓水，肉烂筋腐，指（趾）脱落，并出现全身症状，甚至造成截肢致残，患者痛苦不堪，而目前医药市场上尚无较理想的治疗此病的药物，通常用于治疗脱疽的药物有：

1. 低分子右旋糖酐：有少数患者服用后，会出现皮肤瘙痒、荨麻疹、红色丘疹等皮肤过敏反应，有的患者会出现哮喘病发作，个别患者还可发生休克，用量过大可致出血，如鼻出血牙龈出血，皮肤粘膜出血等，所以充血性心力衰竭及有出血性疾病的患者禁用，肝肾病患者慎用。

2. 盐酸罂粟硷：服用可致恶心、嗜睡、头痛、便秘等症，过量可致房室传导阻滞，心室颤动等不良反应，久服成瘾。

3. 强的松：属激素类药物，长期服用可引起肥胖，多毛，血糖增高，高血压，眼内压升高，钠水潴留，水肿，胃及十二指肠溃疡，甚者穿孔，骨质疏松，伤口愈合不良等。

4. 杜冷丁、吗啡：用于此病止痛效果好，但不治病，且易成瘾。

由上可知，目前用于治疗脱疽的药物大都是以治表为主，疗效缓慢，更难控制病情的发展及恶化，且有毒副作用，甚至成

癱，当病情发展到晚期，几乎无药可治，只能高位截肢致成重残，给患者精神上和身体上造成巨大的痛苦，经济上带来巨大的负担。

本发明的目的在于克服现行医药市场上治疗脱疽药物的诸多缺陷，提供一种疗效快，疗程短，无毒副作用，能够迅速有效地控制病情的发展及恶化，并且可以根治此病，不留后遗症，永不复发等优点的中药合剂。

本发明提供的治疗脱疽（血栓闭塞型脉管炎）的消栓通脉散属于一种中药合剂，由多种中药成份组成。由于脱疽症可分三期，即初期、中期和晚期。根据脱疽症患者所处的病情、病理，对症用药，该消栓通脉散分为两种剂型，分别适用于初期脱疽患者和中、晚期脱疽患者。下面详细叙述之：

适用于初期脱疽患者的消栓通脉散所含中药成份包括：当归、附子、干姜、桃仁、细辛、肉桂、红花、三七、赤木、元芪、桂枝、鸡血藤、川芎、水蛭、土虫、艾叶、牛膝、熟地、甲珠等。

其中药成份重量配比如下：

当归 10-25g	桃仁 10-20g
红花 5-20g	三七 5-15g
赤木 5-20g	附子 5-20g
干姜 5-20g	细辛 5-10g
肉桂 5-20g	元芪 20-70g
桂枝 10-20g	熟地 5-25g
鸡血藤 10-50g	川芎 10-20g
水蛭 5-15g	土虫 5-15g

艾叶 5-25g

牛膝 10-20g

甲珠 5-15g

适用于中、晚期脱疽患者的消栓通脉散所含中药成份包括：
桃仁、当归、双花、甲珠、牛膝、赤芍、水蛭、三七、公英、
丹参、红花、元芪、熟地、生地、附子、桂枝、一米、赤木、
川楝子、元胡、地丁、乳香、没药、甘草等。

其中药成份重量配比是：

桃仁 10-20g

当归 20-50g

双花 20-50g

甲珠 5-15g

牛膝 10-20g

赤芍 10-20g

水蛭 5-15g

三七 5-15g

公英 15-50g

丹参 10-50g

红花 10-15g

元芪 20-70g

熟地 10-25g

生地 10-50g

附子 2-5g

桂枝 2-5g

一米 10-50g

赤木 10-25g

川楝子 5-15g

元胡 10-20g

地丁 15-50g

乳香 5-15g

甘草 5-20g

没药 5-15g

实施例1. 消栓通脉散剂型I: 治疗初期脱疽患者。

病情及症状: 患肢发凉、发麻, 皮色苍白无泽, 有间歇跛行,
时有抽搐, 肌肉逐渐萎缩, 汗毛稀疏脱落, 指(趾)甲增厚、
粗糙而脆, 跌阳脉、太溪脉减弱或消失。

治疗方法: 活血化瘀, 温经通络。

治疗配方及重量配比:

元芪 20-70g	当归 10-25g
桂枝 10-20g	附子 5-20g
干姜 5-20g	鸡血藤 10-50g
桃仁 10-20g	细辛 5-10g
川芎 10-20g	肉桂 5-20g
红花 5-20g	水蛭 5-15g
三七 5-15g	土虫 5-15g
艾叶 5-25g	牛膝 10-20g
熟地 5-25g	甲珠 5-15g
赤木 5-20g	

该配方经1988-1995年临床试用，治疗脱疽初期患者578例，其中549例患者获痊愈，29例患者获明显好转，治愈率达95%以上，有效率100%。

实施例2. 消栓通脉散剂型Ⅱ：治疗中、晚期脱疽患者。

病情及症状：

中期：患肢疼痛难忍，活动范围受限，行走疼痛异常，静止时也有疼痛，寒邪郁久化热而导致局部皮肤发紫暗色，并由一指（趾）向它处发展，自觉发凉，症状稍减，但疼痛加剧，彻夜难眠，食纳减，患肢肌肉更加消瘦或轻度浮肿。

晚期：患肢剧痛或灼痛，昼轻夜重，外形枯槁，甚则焦黑坏死，溃烂，流浓水，肉烂筋腐，指（趾）脱落，可出现全身症状，面色晦暗或苍白，心烦极，食纳呆，大、小便失调。

治疗方法：活血通脉，滋阴降火，和营解毒。

治疗配方及重量配比：

丹参 10-50g	桃仁 10-20g
-----------	-----------

红花 10-15g	元芪 20-70g
当归 20-50g	熟地 10-25g
双花 20-50g	甲珠 5-15g
生地 10-50g	附子 2-5g
桂枝 2-5g	牛膝 10-20g
一米 10-50g	赤木 10-25g
赤芍 10-20g	水蛭 5-15g
三七 5-15g	川楝子 5-15g
元胡 10-20g	公英 15-50g
地丁 15-50g	乳香 5-15g
没药 5-15g	甘草 5-20g

该配方经1988-1995年临床试用，治疗中期脱疽患者425例，其中414例患者获痊愈，11例患者明显好转，治愈率达95%以上，有效率100%，治疗晚期脱疽患者316例，其中284例患者获痊愈，22例患者趋于好转，治愈率达90%以上，有效率100%，疗程短的47天，疗程长的124天。