



(12) 发明专利申请

(10) 申请公布号 CN 103251748 A

(43) 申请公布日 2013.08.21

(21) 申请号 201310197849.8

(22) 申请日 2013.05.25

(71) 申请人 王德章

地址 250200 山东省济南市章丘市人民医院

(72) 发明人 王德章

(74) 专利代理机构 济南鲁科专利代理有限公司

37214

代理人 曹玉琳

(51) Int. Cl.

A61K 36/88 (2006.01)

A61P 1/04 (2006.01)

A61K 35/56 (2006.01)

权利要求书1页 说明书6页

(54) 发明名称

一种治疗过食熏肉型贲门炎的中药制备方法

(57) 摘要

一种治疗过食熏肉型贲门炎的中药制备方法,属于中药制备方法技术领域。目前治疗过食熏肉型贲门炎,一般采用西药治疗,其缺点是毒副作用大。该发明的技术方案为:取马桑叶、马鞭草、天芥麦根、无花果、木槿皮、五色梅、牛西西、毛冬青、凤眼草、石蒜、田螺、白薇、白头翁、白花蛇舌草、半枝莲、地丁、朱砂根、连翘、岗梅根、金盏银盘、贯叶连翘、珍珠草、茶叶、穿心莲、桦木皮、鸭跖草、射干、拳参、黄连、黄花母、救必应、象皮木、橄榄和甘草,将以上中药放入水中浸泡,然后文火煎制,过滤去渣煎出的药液即为治疗过食熏肉型贲门炎的中药。它的优点是:制作简单,制成的中药液毒副作用小,疗程短,治愈率高。

1. 一种治疗过食熏肉型贲门炎的中药制备方法,其特征是:取三白草 6 克、大青叶 5 克、大金钱草 6 克、山白菊 3 克、山海螺 6 克、千里光 6 克、千金藤 6 克、小飞扬草 5 克、马尾连 6 克、马桑叶 4 克、马鞭草 6 克、天荞麦根 6 克、无花果 9 克、木槿皮 6 克、五色梅 5 克、牛西西 6 克、毛冬青 8 克、凤眼草 6 克、石蒜 5 克、田螺 6 克、白薇 3 克、白头翁 4 克、白花蛇舌草 6 克、半枝莲 5 克、地丁 2 克、朱砂根 6 克、连翘 6 克、岗梅根 4 克、金盏银盘 6 克、贯叶连翘 6 克、珍珠草 5 克、茶叶 6 克、穿心莲 6 克、桦木皮 8 克、鸭跖草 6 克、射干 2 克、拳参 1 克、黄连 6 克、黄花母 6 克、救必应 6 克、象皮木 5 克、橄榄 6 克和甘草 9 克,将以上 43 味中药放入 1800 毫升水中,浸泡 30 分钟,然后文火煎制 30 分钟,过滤去渣共煎药液 390 毫升,煎出的药液即为治疗过食熏肉型贲门炎的中药。

一种治疗过食熏肉型贲门炎的中药制备方法

技术领域

[0001] 本发明涉及中药制备方法技术领域,更具体的讲是一种治疗过食熏肉型贲门炎的中药制备方法。

背景技术

[0002] 目前治疗过食熏肉型贲门炎,一般采用:

1、法莫替丁:①禁忌证:对本药过敏者、严重肾功能不全者、孕妇、哺乳期妇女禁用。②慎用:有药物过敏史、肝、肾功能不全者、婴幼儿应慎用。③可引起便秘、恶心、呕吐、腹泻、腹部不适、口干、食欲不振、腮腺炎及味觉障碍;服药期间,肝脏功能的检测指标可升高;常见头痛,少见的有头晕、意识模糊、焦虑、感觉异常、抑郁、失眠、全身倦怠无力和嗜睡等,少见中性粒细胞减少和血小板减少,嗜酸粒细胞增多,少见性欲降低;少见皮疹、荨麻疹、脱发、痤疮、瘙痒、皮肤干燥和潮红;罕见心悸、心动过缓、房室传导阻滞、血压上升、月经不调,用药期间应监测心电图变化;罕见中毒性表皮坏死溶解;罕见幻觉、癫痫大发作,用药应注意患者临床表现;可致耳鸣;肌肉骨骼疼痛,包括肌肉痛性痉挛和关节痛;可致眶部水肿、面部水肿、结膜充血、血管神经性水肿、药物热、荨麻疹和皮疹等。

[0003] 2、奥美拉唑:①禁忌证:对本药过敏者、严重肾功能不全者、孕妇、婴幼儿患者禁用。②慎用:肝、肾功能不全者、哺乳期妇女、老年患者应慎用。③常见不良反应是腹泻、头痛、恶心、腹痛、胃肠胀气及便秘,偶见血清氨基转移酶增高、皮疹、眩晕、嗜睡、失眠等;可见胸痛、心悸、心动过速或过缓、血压升高、外周水肿。可见镜下脓尿、蛋白尿、血尿、尿频、泌尿系统感染、间质性肾炎、尿糖、睾丸痛。可见溶血性贫血。可见皮肤潮红、干燥。罕见光敏性、多形性红斑、史-约综合征、毒性上皮坏死溶解、脱发。罕见视物模糊。罕见出汗增多、低钠血症、男子乳腺发育。罕见关节痛、肌痛、肌力减弱。罕见白细胞减少、血小板减少、粒细胞缺乏症和各类血细胞减少。

[0004] 3、枸橼酸铋钾:①禁忌证:对本药过敏者、严重肾功能不全、孕妇患者禁用。②慎用:肝功能不良者、儿童、哺乳期妇女慎用。③少数患者可有轻微头痛、头晕、失眠等;个别患者可出现皮疹;口中可能带有氨味,且舌、粪便可被染成黑色,易与黑粪症相混淆;个别患者服用时可出现恶心、腹泻、便秘、食欲减退、腹泻等消化道症状。④长期大剂量服用可能引起肾脏毒性,导致可逆性肾衰,并与10日内发作,应定期检查肾功能。⑤骨骼的不良反应较常见的是铋性脑病相关的骨关节病,常以单侧或双肩疼痛为先兆症状。

[0005] 4、氢氧化铝:①禁忌证:有胆汁、胰液等强碱性消化液分泌不足或排泄障碍者、骨折患者、低磷血症患者及对氢氧化铝过敏者禁用。②慎用:肾功能不全者、长期便秘者、老年人、阑尾炎等急腹症患者慎用。③可引起恶心、呕吐、便秘等症状。长期大量服用,可致严重便秘,甚至粪结块引起肠梗阻。④肾衰竭患者长期服用可引起脑病、痴呆及小细胞性贫血等。

[0006] 5、西咪替丁:①禁忌证:孕妇、哺乳期妇女禁用。②慎用:严重心脏及呼吸系统疾病、慢性炎症如系统性红斑狼疮(SLE)、器质性脑病、肾功能损害、肝功能不全、幼儿慎用。③

较常见的不良反应有腹泻、头晕、乏力、头痛和皮疹等；有用药剂量较大时可引起男性乳房发育、女性溢乳、性欲减退、阳痿、精子计数减少等，可通过血-脑脊液屏障，具有一定的神经毒性。偶见精神紊乱，本品罕见的不良反应有：过敏反应、发热、关节痛、肌痛、粒细胞减少、血小板减少、间质性肾炎、肝脏毒性、心动过缓、心动过速等。

[0007] 6、雷尼替丁：①禁忌证：对本药及其他 H₂ 受体拮抗药过敏者、孕妇、哺乳期妇女、8 岁以下儿童禁用。②慎用：肝、肾功能不全者、急性血卟啉症者、老年人慎用。③可出现头痛、头晕、乏力、神志不清、精神行为异常、失眠等；肝、肾功能不全者及老年患者，偶见服药后出现定向力障碍、嗜睡、焦虑等精神症状；有少量发生视力模糊；出现便秘、腹泻、恶心、呕吐、腹痛；可出现皮疹，有极少数发生多形性红斑；罕见关节痛、肌痛；罕见过敏性反应，表现为风疹、血管神经性水肿、发热、支气管痉挛、低血压、过敏性休克、胸痛等；长期使用可致维生素 B₁₂ 缺乏、男性乳房女性化少见；引起肾功能损伤等、静注后部分患者可出现面热感、头晕、恶心、出汗及胃刺激。④本药对肝脏有一定的毒性，故给药过程中，应监测患者肝功能变化。⑤静脉给予本药时，可出现心动过缓。故静注时应缓慢，且用药过程中应定期检查心电图。⑥本药对骨髓有一定的抑制作用，少数患者可发生可逆性中等程度的白细胞或粒细胞减少，也有出现血小板减少以及自身免疫性溶血性贫血。

[0008] 7、阿莫西林：偶见皮疹，口服大量后可有恶心、上腹部不适、腹泻等；伪膜性结肠炎。

[0009] 8、羧苄西林：可以出现各种类型的变态反应。大剂量给药后可能引起神经毒反应、肺水肿，用药期间可能出现短暂性转氨酶升高与粒细胞减少。

[0010] 9、氨苄西林：大量口服常出现胃肠道不适。肌注局部有疼痛。无论口服或注射均可引起变态反应，以皮疹为多见。用药前必须先做皮试。

[0011] 10、哌拉西林：肌注后偶有局部疼痛，快速静脉推注可导致暂时性恶心、胸闷、咳嗽、发热、口腔异味、眼结膜充血，变态反应（皮疹、痒感、头晕、麻木、发热等），用药前必须注意青霉素有无过敏史，并做青霉素皮试。

[0012] 11、头孢噻肟：肌注局部可有疼痛；静注时可有血栓性静脉炎发生；皮疹、药物热等变态反应。

[0013] 12、青霉素：本品易发生变态反应，特别是过敏性休克（最危险的过敏性休克，可发生在做皮肤试验的当时，极少数可发生在连续用药过程中，迟发性过敏性休克），如不及时抢救，可危及生命，故用药前、中、后都要提高防护，以免发生意外。注意：应用前，必须问清有无过敏性疾病，用青霉素后有无皮疹、发热等变态反应出现，务必先做青霉素皮试。

发明内容

[0014] 为克服上述缺点，本发明的目的是发明一种治疗过食熏肉型贲门炎的中药制备方法。胃分前、后壁。两壁相连处形成两弯，即凸向左下方的胃大弯和凹向右上方的胃小弯，小弯的最低点略凹陷，叫角切迹。胃的入口叫贲门，接食管。胃的出口叫幽门，连十二指肠。幽门的外面有环形的浅沟，内面则突成环状的幽门瓣。贲门炎属于祖国医学“胃痛”的范畴。胃痛，又称胃脘痛，是以上腹胃脘部近心窝处经常发生疼痛为主证。如《素问·六无正纪大论篇》说：“木郁之发，民病胃脘当心而痛。”《灵枢·邪气脏腑病形》篇指出：“胃病者，腹月真胀，胃脘当心而痛。”《外台秘要·心痛方》说：“足阳明为胃之经，气虚逆乘心而痛，其状

腹胀归于心而痛甚。谓之胃心痛也。”这里的心痛都是指胃脘痛。在《伤寒论》中所谓的心下痞，按之濡，或心下痞，按之痛等，实皆指胃部而言。古方九种心痛之说，亦多指胃痛而言。《医学正传·胃脘痛》也说：“古方九种心痛，……详其所由。皆在胃脘，而实不在于心也。”寒邪客胃：外感寒邪，内客于胃，寒主收引，致胃气不和而痛。《素问·举痛论篇》说：“寒邪客于肠胃之间，膜原之下，血不得散，小络引急，故痛。”饮食伤胃：饮食不节，或过饥过饱，致胃失和降。《素问·痹论篇》指出：“饮食自倍，肠胃乃伤。”《医学正传·胃脘痛》亦有：“致病之由，多由纵恣口腹，喜好辛酸，恣饮热酒煎复，复餐寒凉生冷，朝伤暮损，日积月深，……故胃脘疼痛”的说法。肝气犯胃：肝为刚脏，性喜条达而主疏泄，若忧思恼怒，则气郁而伤肝，肝木失于疏泄，横逆犯胃，致气机阻滞，因而发生疼痛。如《沈氏尊生书·胃痛》所说：“胃痛，邪干胃脘病也。……唯肝气相乘为尤甚，以木性暴，且正克也。”

病因病机：由于素体热盛，又过食熏肉，损伤于胃，胃的功能失常，而发本病。

[0015] 临床表现：过食熏肉，咽干、口干、口臭。进食时胃脘疼痛，胸背疼痛，剑突后烧灼感，烧灼感可牵涉至颈、肩胛间区、耳，甚至两上臂，舌质红，苔薄黄，脉数。

[0016] 它的技术方案为：取三白草 6 重量份、大青叶 5 重量份、大金钱草 6 重量份、山白菊 3 重量份、山海螺 6 重量份、千里光 6 重量份、千金藤 6 重量份、小飞扬草 5 重量份、马尾连 6 重量份、马桑叶 4 重量份、马鞭草 6 重量份、天芥麦根 6 重量份、无花果 9 重量份、木槿皮 6 重量份、五色梅 5 重量份、牛西西 6 重量份、毛冬青 8 重量份、凤眼草 6 重量份、石蒜 5 重量份、田螺 6 重量份、白薇 3 重量份、白头翁 4 重量份、白花蛇舌草 6 重量份、半枝莲 5 重量份、地丁 2 重量份、朱砂根 6 重量份、连翘 6 重量份、岗梅根 4 重量份、金盏银盘 6 重量份、贯叶连翘 6 重量份、珍珠草 5 重量份、茶叶 6 重量份、穿心莲 6 重量份、桦木皮 8 重量份、鸭跖草 6 重量份、射干 2 重量份、拳参 1 重量份、黄连 6 重量份、黄花母 6 重量份、救必应 6 重量份、象皮木 5 重量份、橄榄 6 重量份和甘草 9 重量份，将以上 43 味中药放入 1800 毫升水中，浸泡 30 分钟，然后文火煎制 30 分钟，过滤去渣共煎药液 390 毫升，煎出的药液即为治疗过食熏肉型贲门炎的中药。

[0017] 该发明的优点是：本方 43 味中药，在药店均能买到，制作简单，制成的中药液毒副作用小，疗程短，治愈率高。君臣佐使，恰到好处。应用中药的同时，避免了西药磺胺药、抗菌素引起的不良反应、过敏反应和毒性反应。三白草、大青叶、大金钱草、山白菊、山海螺、千里光、千金藤、小飞扬草、马尾连、马桑叶、马鞭草、天芥麦根、无花果、木槿皮、五色梅、牛西西、毛冬青、凤眼草、石蒜、田螺、白薇、白头翁、白花蛇舌草、半枝莲、地丁、朱砂根、连翘、岗梅根，以上 28 味药具有清热解毒，利尿消肿，凉血止血，利水通淋，理气止痛之功效。在治疗过食熏肉型贲门炎的过程中，起主要治疗作用，故为君药。金盏银盘、贯叶连翘、珍珠草、茶叶、穿心莲、桦木皮、鸭跖草、射干、拳参、黄连、黄花母、救必应、象皮木，以上 13 味药具有利尿消肿、祛湿除痹、健脾止泻、清热利水清肿、解毒排脓、行水消胀、清热利胆、祛湿退黄、杀虫止痒、降火利尿、清心除烦之功效。在治疗过食熏肉型贲门炎的过程中，能辅助主药发挥治疗作用，故为臣药。橄榄：甘、涩、酸，平。入肺、胃二经。清肺止咳，清热解毒利咽，生津止渴，解毒止痢，平肝镇惊，解鳖毒。能率诸药直达病灶，故为佐药。甘草：甘，平。入十二经。补脾润肺，益气复脉，缓急止痛，清热解毒，调和药性。既能纠诸药之偏性，又能缓解诸药之毒性，故为使药。三白草、大青叶、大金钱草、山白菊、山海螺、千里光、千金藤、小飞扬草、马尾连、马桑叶、马鞭草、天芥麦根、无花果、木槿皮、五色梅、牛西西、毛冬青、凤眼草、石

蒜、田螺、白薇、白头翁、白花蛇舌草、半枝莲、地丁、朱砂根、连翘、岗梅根、金盏银盘、贯叶连翘、珍珠草、茶叶、穿心莲、桦木皮、鸭跖草、射干、拳参、黄连、黄花母、救必应、象皮木、橄榄、甘草,这 43 味药配伍应用,共同起到清热解毒、利尿通淋、凉血止血,利水消肿、理气止痛、热降火,除烦止渴,生肌敛疮、清心安神,降血压之功效。君臣佐使,配伍得当,是治疗过食熏肉型贲门炎的最佳配方。三白草:甘、辛,寒,有小毒。入肺、脾、胃、大肠四经。清热利湿,利水消肿,解毒疗疮,消积化痞。大青叶:苦,寒。入心、胃二经。清热解毒,凉血消斑。大金钱草:甘、咸,微寒。入肝、胆、肾、膀胱四经。清热利湿,和胃降逆,解毒消肿,祛瘀消肿。山白菊:苦、辛,凉。入肺、肝二经。清热解毒,疏风解表,凉血止血。山海螺:甘、辛,平。入肺、大肠、肝二经。排脓生肌,解毒消肿,祛痰散结,催发乳汁。千里光:苦,寒。入肝、肾二经。清热解毒,清肝明目,祛风燥湿。千金藤:苦,寒。入肺、脾、大肠三经。清热解毒,利尿消肿,祛风活络。小飞扬草:酸、涩、苦,凉。入脾、胃、大肠三经。清热利湿,解毒消肿。马尾连:苦,寒。入心、肝、胆、大肠四经。清热燥湿,清热解毒,凉肝明目,利湿退黄。马桑叶:辛、苦,寒,有毒。入心、肺二经。清热解毒,祛风除湿。马鞭草:苦、辛,寒。入肝、脾二经。清热解毒,活血散瘀,利水消肿,截疟。天芥麦根:酸、苦,寒。入心、肺、脾、肝四经。清热解毒,清肺化痰,活血止痛,健脾消食。无花果:甘、平、酸,寒。入肺、胃、大肠三经。健胃厚肠,清热消肿,通乳。木槿皮:甘、苦,凉。入大肠、肝、脾三经。清热利湿,杀虫止痒,清热解毒。五色梅:苦,寒。入大肠经。解毒消肿,祛风止痒,止血。牛西西:苦、酸,寒。入心、肺、大、小肠四经。清热解毒,活血止血,泻火通便。毛冬青:微苦、甘,平。入肺、肝、大肠三经。清热解毒,活血通络,利水渗湿。风眼草:苦、涩,寒。入大肠、肝、胃三经。清热燥湿,止血、止带。石蒜:辛、甘,温;有毒。入肺、胃二经。解毒消肿,祛痰平喘,利尿去水,催吐救急。田螺:甘、咸,寒。入肝、脾、胃、膀胱、大肠五经。清热利水,解毒消肿,生津止渴,凉血止血,醒酒。白薇:苦、咸,寒。入肺、胃、肾三经。清热凉血,利尿通淋,解毒疗疮,熄风止惊。白头翁:苦,寒。入大肠、肝、胃三经。清热解毒,凉血散瘀,截疟,清肝明目。白花蛇舌草:苦、甘,寒。入心、肝、脾三经。清热解毒,清热利湿,清热散瘀,治疗小儿疳积。半枝莲:辛、微苦,平。入心、肺、肝、肾四经。清热解毒,止血,散瘀止痛,行气利水。地丁:苦、辛,寒,无毒。入心、肝二经。清热解毒,清热利湿。朱砂根:辛、苦,寒。入肺、脾、胃三经。清热解毒,散瘀止痛。连翘:苦,凉。入心、肝、胆三经。清热解毒,消肿散结,清热利尿,治疗白虫病,经闭,疹子。岗梅根:苦、甘,寒。入肺、肝、大肠三经。清热解毒,跌打损伤,津伤口渴。金盏银盘:苦、甘、淡,平。入肺、大肠、脾、胃四经。疏风清热,清热解毒,活血化瘀,消食化积。贯叶连翘:辛、涩、微苦,平。入肺、大肠、胃三经。清热解毒,收涩止血,祛风利湿,疏利通乳。珍珠草:甘、苦,凉。入肝、肺二经。清热利尿,清热解毒,健脾消痞,平肝明目。茶叶:苦、甘、辛,寒。入心、肺、胃、肠、肝、肾六经。清利头目,除烦止渴,利尿,清热解毒,下气消食,化痰。穿心莲:苦,寒。入心、肺二经。清热解毒,清化湿热,凉血消肿,解蛇毒。桦木皮:苦,寒。入肺、胃二经。清热燥湿,解毒消痈,肺风毒疮,祛痰平喘,染发黑须。鸭跖草:甘,寒。入心、肝、胆、脾、大肠五经。清热解毒,清热利湿,利尿消肿,凉血止血。射干:苦、寒,有毒。入肺、肝二经。解毒利咽,清热化痰,散热消结。拳参:苦,微寒。入心、大肠、膀胱三经。泻热利湿止痢,清热解毒消肿,清热镇惊。黄连:苦、寒。入心、肝、胃、大肠四经。清热燥湿,清热泻火,泻火解毒,除疳安蛔。黄花母:甘、辛、酸、涩,凉,无毒。入心、肝、肺、大肠、小肠五经。辛凉解表,清热利湿,凉血止血,清热解毒。救必应:苦,寒。入肺、肝、大肠三经。清热解毒,清热燥湿,消肿止

痛。象皮木：苦、淡，寒。入肺、肝二经。清热解毒，止血消肿。橄榄：甘、涩、酸，平。入肺、胃二经。清肺止咳，清热解毒利咽，生津止渴，解毒止痢，平肝镇惊，解鳖毒。甘草：甘，平。入十二经。补脾润肺，益气复脉，缓急止痛，清热解毒，调和药性。

[0018] 具体实施方式：

取三白草 6g、大青叶 5g、大金钱草 6g、山白菊 3g、山海螺 6g、千里光 6g、千金藤 6g、小飞扬草 5g、马尾连 6g、马桑叶 4g、马鞭草 6g、天荞麦根 6g、无花果 9g、木槿皮 6g、五色梅 5g、牛西西 6g、毛冬青 8g、凤眼草 6g、石蒜 5g、田螺 6g、白薇 3g、白头翁 4g、白花蛇舌草 6g、半枝莲 5g、地丁 2g、朱砂根 6g、连翘 6g、岗梅根 4g、金盏银盘 6g、贯叶连翘 6g、珍珠草 5g、茶叶 6g、穿心莲 6g、桦木皮 8g、鸭跖草 6g、射干 2g、拳参 1g、黄连 6g、黄花母 6g、救必应 6g、象皮木 5g、橄榄 6g 和甘草 9g，将以上 43 味药一起放入 1800 毫升水中，浸泡 30 分钟，然后文火煎制 30 分钟，过滤去渣，煎出的药液即为治疗过食熏肉型贲门炎的中药。共煎药液 390 毫升，当过食熏肉型贲门炎的病人需要治疗时，使药液温度为 35℃，每次 130 毫升，口服，每日三次，二日为一疗程，若症状仍存，再服第二疗程，以至痊愈。

[0019] 379 例过食熏肉型贲门炎患者中，男性 256 例，占 67.5%；女性 123 例，占 32.5%。男性多于女性。

[0020] 表一、379 例过食熏肉型贲门炎患者的年龄范围

年龄(岁)	18~20	21~30	31~40	41~55
例数	15	229	122	13
百分比	4%	60.4%	32.2%	3.4%

表二、379 例过食熏肉型贲门炎患者疗效表

疗效	治愈	好转	无效
例数	376	3	无
百分比	99.21%	0.79%	无

表三、379 例过食熏肉型贲门炎患者疗程表

治疗天数	3~5	6~9	10~14	15~25
例数	12	229	131	7
百分比	3.2%	60.4%	34.6%	1.8%

表四、379 例过食熏肉型贲门炎患者治疗前后情况表

		治疗前	治疗后		
			治愈	好转	无效
临床表现		过食熏肉，咽干、口干、口臭，进食时胃脘疼痛，胸背疼痛，剑突后烧灼感，烧灼感可牵涉至颈、肩胛间区、耳，甚至两上臂，舌质红，苔薄黄，脉数。	不食用熏肉，无咽干、口干、口臭，进食时胃脘无疼痛，胸背无疼痛，舌质淡红，苔薄白，脉弦。	偶食熏肉，偶有咽干、口干、口臭，进食时胃脘偶有疼痛，胸背无疼痛，舌质淡红，苔薄略黄，脉略数。	同治疗前
血液检查	白细胞计数	增多	正常	略高	同治疗前
	中性粒细胞	增多	正常	略高	同治疗前
	淋巴细胞	增多	正常	略高	同治疗前
电子胃镜检查		贲门处可见粘膜糜烂、散在出血点	贲门处粘膜正常	贲门处粘膜有小糜烂面，少量出血点	同治疗前