(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)发明专利申请

(10)申请公布号 CN 104740211 A
(43)申请公布日 2015.07.01

(21)申请号 201510189687.2

(22)申请日 2015.04.21

(71)申请人 姚辉前
地址 274900 山东省菏泽市巨野县古城西路355号

(72)发明人 姚辉前

(51)Int.Cl.
A61K 36/896(2006.01)
A61P 9/14(2006.01)
A61K 35/36(2015.01)
A61K 35/618(2015.01)

权利要求书2页 说明书8页

(54)发明名称

一种治疗下肢静脉曲张的中药组合物及其制备方法

(57)摘要

本发明是一种治疗下肢静脉曲张的中药组合物，取下述重量配比的主要原料制备而成：当归10-20份，穿山龙10-25份，穿山甲5-15份，牡蛎15-25份，红花3-8份，元胡12-24份，透骨草20-30份，田七20-40份，牛膝13-27份，八角莲4-17份，川芎10-15份，千层塔4-10份，一叶萩15-25份，蚤休15-20份。该中药组合物对下肢静脉曲张的效果显著，不仅活血化瘀，还能舒筋活血，调理气血，改善患者长期因下肢静脉曲张带来的病痛，且本发明多选用地方常见药材，价格低廉，减轻了患者的经济负担。

CN 104740211 A

1. 一种治疗下肢静脉曲张的中药组合物，其特征在于：取下述重量配比的主要原料制备而成：当归 10-20 份，穿山龙 10-25 份，穿山甲 5-15 份，牡蛎 15-25 份，红花 3-8 份，元胡 12-24 份，透骨草 20-30 份，田七 20-40 份，牛膝 13-27 份，八角莲 4-17 份，川芎 10-15 份，千层塔 4-10 份，一叶萩 15-25 份，蚤休 15-20 份。

2. 根据权利要求 1 所述的治疗下肢静脉曲张的中药组合物，其特征在于：取下述重量配比的主要原料制备而成：当归 13-18 份，穿山龙 14-20 份，穿山甲 8-13 份，牡蛎 18-23 份，红花 4-6 份，元胡 16-20 份，透骨草 23-28 份，田七 25-35 份，牛膝 15-25 份，八角莲 7-10 份，川芎 11-14 份，千层塔 6-8 份，一叶萩 18-23 份，蚤休 16-19 份。

3. 根据权利要求 1 所述的治疗下肢静脉曲张的中药组合物，其特征在于：取下述重量配比的主要原料制备而成：当归 15 份，穿山龙 17 份，穿山甲 10 份，牡蛎 20 份，红花 5 份，元胡 18 份，透骨草 25 份，田七 30 份，牛膝 20 份，八角莲 9 份，川芎 13 份，千层塔 7 份，一叶萩 20 份，蚤休 17 份。

4. 根据权利要求 1-3 任一项所述的治疗下肢静脉曲张的中药组合物的制备方法，其特征在于：步骤如下：

（1）将当归、田七、千层塔和川芎淘洗 2-6 遍，置于阴凉通风处通风 10-20 小时，切碎放入高压锅，在出气口连接一较长有一定硬度的皮管，然后将其中的一段皮管浸入冷水中冷却，皮管另一段接一个饮料瓶，然后分离上层的油，分离出来的油就是混合挥发油；

（2）将红花和蚤休洗净切碎用黄酒喷匀，密封静置 2-4 天，挤出黄酒得酒制红花和蚤休；

（3）将牡蛎置于烧开的热水中，煮 1-3 分钟，取出晾凉，将牡蛎肉取出，切成块，置于锅内炒制 3-7 分钟，研末待用；

（4）将穿山甲洗净，用米醋泡 4-8 小时，置于无烟的炉火上锻制酥脆，研末成细末过 80-120 目筛待用；

（5）将穿山龙、元胡、透骨草、牛膝、八角莲和一叶萩置于砂锅内加原料总重量 4-6 倍的水，武火煎开，转文火煎煮 10-20 分钟后加入酒制红花和蚤休，大火加热至沸腾，待沸腾 2-8 分钟后停火，过滤，滤液晾至室温时投入步骤（3）和（4）所得物，大火煎煮至沸腾，用大铁勺搅拌 2-4 分钟后停火，静置 7-9 小时，取上清液装入密封瓶即得口服药液。

5. 根据权利要求 4 所述的制备方法，其特征在于：步骤（1）将当归、田七、千层塔和川芎淘洗 3-5 遍（优选的，将当归、田七、千层塔和川芎淘洗 4 遍）。

6. 根据权利要求 4 所述的制备方法，其特征在于：步骤（1）置于阴凉通风处通风 13-18 小时（优选的，置于阴凉通风处通风 15 小时）。

7. 根据权利要求 4 所述的制备方法，其特征在于：步骤（3）将牡蛎肉取出，切成块，置于锅内炒制 4-6 分钟（优选的，将牡蛎肉取出，切成块，置于锅内炒制 5 分钟）。

8. 根据权利要求 4 所述的制备方法，其特征在于：步骤（4）将穿山甲洗净，用米醋泡 5-7 小时（优选的，将穿山甲洗净，用米醋泡 6 小时）。

9. 根据权利要求 4 所述的制备方法，其特征在于：步骤（5）将穿山龙、元胡、透骨草、牛膝、八角莲和一叶萩置于砂锅内加原料总重量 4.5-5.5 倍的水（优选的，将穿山龙、元胡、透骨草、牛膝、八角莲和一叶萩置于砂锅内加原料总重量 5 倍的水）。

10. 根据权利要求 4 所述的制备方法，其特征在于：步骤（5）转文火煎煮 13-18 分钟后

加入酒制红花和蚤休(优选的,转文火煎煮 15 分钟后加入酒制红花和蚤休)。

一种治疗下肢静脉曲张的中药组合物及其制备方法

技术领域

[0001] 本发明公开了一种中药组合物，尤其是一种治疗下肢静脉曲张的中药组合物及其制备方法，本发明属中医中药领域。

背景技术

[0002] 单纯性下肢浅静脉曲张指病变仅局限于下肢浅静脉者，其病变范围包括大隐静脉、小隐静脉及其分支，绝大多数病人都发生在大隐静脉，临床诊断为大隐静脉曲张。病变的浅静脉表现为伸长、扩张和蜿蜒屈曲，多发生于持久从事站立工作和体力劳动的人群。单纯性下肢浅静脉曲张病情一般较轻，手术治疗常可获得较好的效果。多由于浅静脉第一对瓣膜(股隐静脉瓣膜)关闭不全导致的浅静脉血流反流，增加下肢静脉压力引起。其次，先天性的静脉壁薄弱也是重要原因，患者常合并有周身或局限性的静脉壁缺陷，在静脉压力增加的情况下，便产生静脉的迂曲、扩张。最后，长期站立、肥胖和腹腔压力等因素因可增加静脉压力均会增加静脉曲张发展发生的可能。

[0003] 临床表现：发病早期，多为下肢酸胀不适及钝痛感，同时有肢体沉重感，易乏力。多在久站后上述感觉加重，通过平卧、肢体抬高则可缓解。病变中后期，静脉壁受损，静脉隆起、扩张、迂曲，呈蚯蚓样外观，以小腿内侧大隐静脉走行区明显。病程长者，肢体皮肤则出现营养性改变，如脱屑、瘙痒、色素沉着等，甚至形成湿疹及溃疡。随着病情的演变，可以伴随血管走行的疼痛、下肢肿胀、淤积性皮炎、浅静脉血栓等症状。下肢浅静脉曲张具有明显的形态特征，通过一般体格检查即可以明确诊断。站立后，下肢浅静脉突起，即提示静脉曲张的可能。若要进一步全面了解病情，则需进一步进行详细体格检查，了解静脉瓣膜功能情况及深静脉通畅情况，必要时需进行静脉超声或造影检查。重点应与深静脉血栓后遗症导致的静脉曲张相鉴别，后者有深静脉血栓病史，下肢多有明显肿胀的表现。如下肢有靴区溃疡、重度皮炎等，需要注意交通静脉有无受累。

[0004] 在现有治疗下肢静脉曲张的方法中，授权公告号 CN 103330780 B（申请号 201310317486.7）公开了一种治疗下肢静脉曲张的药物，其特征在于：它是由下列重量范围内的原料药制成：生地黄 25—35 克、红 花 10—20 克、枳 壳 8—15 克、黄 芪 15—25 克、苦 参 25—35 克、白鲜皮 8—15 克、马齿苋 8—15 克、苍 术 10—20 克、黄 柏 10—20 克、蚯 蚓 8—15 克、赤 芍 8—15 克、柴 胡 5—10 克、川 芎 8—15 克、当 归 10—20 克。授权公告号 CN 103099996 B（申请号 201210558994.X）的专利公开了一种治疗下肢静脉曲张的中药组合物，其特征在于是由下述重量份的原料药制成：栀子 12、木瓜 10、络石藤 12、鸡血藤 15、地骨皮 15、马齿苋 15、紫草 12、伸筋草 10、牛膝 15、天花粉 12、地龙 8、薏苡仁 8、桂枝 12、桃仁 15。

[0005] 由此可见中药在治疗下肢静脉曲张方面占有很重要的地位，但是现存的专利其主要的剂型是汤剂，对于治疗下肢静脉曲张的效果并不如组合物理想，会对患者的身体造成额外的负担。

发明内容

[0006] 针对现有治疗下肢静脉曲张不足的现状，本发明的目的之一在于提供一种治疗下肢静脉曲张的中药组合物，具有携带方便，作用效果明显，能很快的起到活血化瘀的作用，并且它采用地方上较为常见的中药材作为原料，成本低廉。

[0007] 本发明的另一目的就是提供上述中药组合物的制备方法。

[0008] 本发明的上述目的是通过以下技术方案来实现的：

一种治疗下肢静脉曲张的中药组合物，取下述重量配比的主要原料制备而成：当归 10-20 份，穿山龙 10-25 份，穿山甲 5-15 份，牡蛎 15-25 份，红花 3-8 份，元胡 12-24 份，透骨草 20-30 份，田七 20-40 份，牛膝 13-27 份，八角莲 4-17 份，川芎 10-15 份，千层塔 4-10 份，一叶萩 15-25 份，蚤休 15-20 份。

[0009] 一种治疗下肢静脉曲张的中药组合物，优选配比，取下述重量配比的主要原料制备而成：当归 13-18 份，穿山龙 14-20 份，穿山甲 8-13 份，牡蛎 18-23 份，红花 4-6 份，元胡 16-20 份，透骨草 23-28 份，田七 25-35 份，牛膝 15-25 份，八角莲 7-10 份，川芎 11-14 份，千层塔 6-8 份，一叶萩 18-23 份，蚤休 16-19 份。

[0010] 一种治疗下肢静脉曲张的中药组合物，更佳优选的配比，取下述重量配比的主要原料制备而成：当归 15 份，穿山龙 17 份，穿山甲 10 份，牡蛎 20 份，红花 5 份，元胡 18 份，透骨草 25 份，田七 30 份，牛膝 20 份，八角莲 9 份，川芎 13 份，千层塔 7 份，一叶萩 20 份，蚤休 17 份。

[0011] 上述中药组合物的制备方法，制备步骤如下：

（1）将当归、田七、千层塔和川芎淘洗 2-6 遍，置于阴凉通风处通风 10-20 小时，切碎放入高压锅，在出气口连接一较长有一定硬度的皮管，然后将其中的一段皮管浸入冷水中冷却，皮管另一段接一个饮料瓶，然后分离上层的油，分离出来的油就是混合挥发油；

（2）将红花和蚤休洗净切碎用黄酒喷匀，密封静置 2-4 天，挤出黄酒得酒制红花和蚤休；

（3）将牡蛎置于烧开的热水中，煮 1-3 分钟，取出晾凉，将牡蛎肉取出，切成块，置于锅内炒制 3-7 分钟，研末待用；

（4）将穿山甲洗净，用米醋泡 4-8 小时，置于无烟的炉火上锻制酥脆，研末成细末过 80-120 目筛待用；

（5）将穿山龙、元胡、透骨草、牛膝、八角莲和一叶萩置于砂锅内加原料总重量 4-6 倍的水，武火煎开，转文火煎煮 10-20 分钟后加入酒制红花和蚤休，大火加热至沸腾，待沸腾 2-8 分钟后停火，过滤，滤液晾至室温时投入步骤（3）和（4）所得物，大火煎煮至沸腾，用大铁勺搅拌 2-4 分钟后停火，静置 7-9 小时，取上清液装入密封瓶即得口服药液。

[0012] 上述制备方法，步骤（1）将当归、田七、千层塔和川芎淘洗 3-5 遍（优选的，将当归、田七、千层塔和川芎淘洗 4 遍）。

[0013] 上述制备方法，步骤（1）置于阴凉通风处通风 13-18 小时（优选的，置于阴凉通风处通风 15 小时）。

[0014] 上述制备方法，步骤（3）将牡蛎肉取出，切成块，置于锅内炒制 4-6 分钟（优选的，将牡蛎肉取出，切成块，置于锅内炒制 5 分钟）。

[0015] 上述制备方法，步骤（4）将穿山甲洗净，用米醋泡 5-7 小时（优选的，将穿山甲洗

净，用米醋泡 6 小时）。

[0016] 上述制备方法，步骤（5）将穿山龙、元胡、透骨草、牛膝、八角莲和一叶荻置于砂锅内加原料总重量 4.5-5.5 倍的水（优选的，将穿山龙、元胡、透骨草、牛膝、八角莲和一叶荻置于砂锅内加原料总重量 5 倍的水）。

[0017] 上述制备方法，步骤（5）转文火煎煮 13-18 分钟后加入酒制红花和蚤休（优选的，转文火煎煮 15 分钟后加入酒制红花和蚤休）。

[0018] 使用方法：为使本发明达到最佳治疗效果，制成的挥发油一日数次涂抹在患处，并且适当的按摩，口服液每次 5-10ml，三餐后半小时服用。

[0019] 该中药组合物对下肢静脉曲张的效果显著，不仅活血化瘀，还能舒筋活血，调理气血，改善患者长期因下肢静脉曲张带来的病痛，且本发明多选用地方常见药材，价格低廉，减轻了患者的经济负担。

[0020] 一种治疗下肢静脉曲张的中药组合物，各原料药的药理功效分别为：

当归：味苦，温，无毒，补血；活血；调经止痛；润燥滑肠。主血虚诸证；月经不调；经闭；痛经；症瘕结聚；崩漏；虚寒腹痛；痿痹；肌肤麻木；肠燥便难；赤痢后重；痈疽疮疡；跌扑损伤。

[0021] 一叶荻：基原：为大戟科叶底珠属植物叶底珠的嫩枝叶或根。成分：全株含生物碱：一叶荻碱，叶底珠碱。叶中含二氢一叶荻碱，一叶荻醇 A、B，一叶荻醇 C 苦味酸盐，别一叶荻碱，一叶荻碱；还含有酚性成分：泽漆鞣质 B 及 11-O- 棓酰基去甲岩白菜素。茎中含没食子酸等。药性：辛、苦，微温，有小毒。功用主治：祛风活血，益肾强筋。主治风湿腰痛，阳痿，眩晕，耳鸣，耳聋，面瘫，小儿麻痹后遗症。

[0022] 穿山龙：别名穿地龙、串地龙、穿龙骨、地龙骨、金刚骨、鸡骨头、山常山、常山、爬山虎、鞭梢菜。性味功效苦，平。归肝、肺经。功能活血舒筋，怯风止痛，止咳平喘，怯痰。适用于腰腿疼痛、筋骨麻木、跌打损伤、闪腰岔气、咳嗽喘息。

[0023] 穿山甲：具有活血消症，通经下乳，消肿排脓，搜风通络的功效。用于经闭癥瘕，乳汁不通，痈肿疮毒，风湿痹痛，中风瘫痪，麻木拘挛。

[0024] 牡蛎：咸，微寒；归肝、胆、肾经。功能：平肝息风药；养阴药。煅牡蛎：收敛固涩除酸的作用强，治疗胃疼、胃酸等。生牡蛎：上收下敛，治疗头晕、便稀。有收敛、镇静、解毒、镇痛的作用；牡蛎的酸性提取物在活体中对脊髓灰质炎病毒具有抑制作用，使感染的鼠死亡率降低。

[0025] 红花：辛，温，无毒，活血通经，散瘀止痛，有助于治经闭、痛经、恶露不行、胸痹心痛、瘀滞腹痛、胸胁刺痛、跌打损伤、疮疡肿痛疗效。有活血化瘀，散湿去肿的功效。

[0026] 元胡：元胡味辛、苦，性温。有活血散瘀，理气止痛的功能，用于全身各部气滞血瘀之痛，痛经，经闭，症瘕，产后瘀阻，跌扑损伤，疝气作痛。

[0027] 透骨草：1. 祛风除湿，该品辛温，辛能行散，温胜寒湿。八肝经，故能祛风除湿，如《本草纲目》曰：透骨草“治筋骨一切风湿疼痛挛缩。”若因风寒湿邪侵袭肢体经络而导致肢体疼痛，麻木，屈伸不利。可选用该品，祛风散寒胜湿，病邪去，则诸症自愈。2. 舒筋活络，该品辛散温通，入肝经，而肝主筋．故该品具有舒筋活络之功效。对于外感风寒之邪，经气失宣，症见肢体筋脉收缩抽急，不能舒转自如。可选用透骨草，祛风散寒，舒筋活络治之。如《陕甘宁青中草药选》即选用该品，治筋骨拘挛。3. 活血止痛，该品辛散温通，入肝经血分，故能

活血止痛。对于一身上下，心腹腰膝，内外各种疼痛，均可选用该品治之，取其辛温善走，活血利气之功，血气通则不痛。4. 解毒化疹，灵秘丹药笺》曰：“疔热毒。”《杨诚经验方》选用该品，治肿毒初起。《陕甘宁青中草药选》则用该品，治阴囊湿疹，疮疡肿毒。故可思透骨草治疔疮癣肿毒，阴囊湿疹，一般多煎水外洗。因本药外洗还有引药透入经络、血脉，而祛风、活血、止痛的特点。

[0028] 田七：甘、微苦，温。归经归肝、胃经。功效散瘀止血，消肿定痛。主治用于咯血，吐血，衄血，便血，崩漏，外伤出血，胸腹刺痛，跌扑肿痛。

[0029] 牛膝：根入药，生用，活血通经；治产后腹痛，月经不调，闭经，鼻衄，虚火牙痛，脚气水肿；熟用，补肝肾，强腰膝；治腰膝酸痛，肝肾亏虚，跌打瘀痛。兽医用作治牛软脚症，跌伤断骨等，性味：苦、甘、酸，平。归经：归肝、肾经。功效：逐瘀通经，补肝肾，强筋骨，利尿通淋，引血下行。主治：用于经闭，痛经，腰膝酸痛，筋骨无力，淋证，水肿，头痛，眩晕牙痛，日疮，吐血，衄血。

[0030] 八角莲：八角莲：基原：为小檗科八角莲属植物八角莲、六角莲和川八角莲的根及根茎。成分：1. 八角莲根茎含木脂素：鬼臼毒素，鬼臼苦素；黄酮类：山荷叶素山奈酚，槲皮素等。2. 六角莲根茎含木脂素：鬼臼毒素，去氢鬼臼毒素，鬼臼毒酮等。3. 川八角莲 根含去氧鬼臼毒素，ß- 盾叶鬼臼素，鬼臼毒素，山奈酚 -3-ß-D- 葡萄糖苷，葡萄糖，蔗糖及 ß- 谷甾醇。药性：苦、辛，温。有毒。归肺、肝经。功用主治：化痰解毒，祛瘀散结。主治咳嗽，咽喉肿痛，瘰疬，瘿瘤，无名肿痛，带状疱疹，毒蛇咬伤，跌打损伤，风湿痹痛。

[0031] 千层塔：基原：为石杉科石杉属植物蛇石石杉的全草。成分：千层塔草含生物碱：石松碱，石松定碱，蛇足石松碱，石松灵碱，棒石松宁碱，千层塔宁碱，千层塔它宁碱，千层塔它尼定碱，石松文碱等。药性：苦、辛、微甘，平，小毒。功用主治：散瘀止血，清热除湿，主治跌打损伤，劳伤吐血，尿血，痔疮下血，臌胀，白带，毒蛇咬伤，溃疡久不收口，烫火伤。

[0032] 蚤休：基原：为当归科重楼属植物华重楼、云南重楼或七叶一枝花的根茎。成分：1. 华重楼根茎含甾体皂苷：-3-O- α -L- 呋喃阿拉伯糖基等。2. 云南重楼根茎含甾体皂苷：薯蓣皂苷元 -3-O- α -L- 吡喃鼠李糖基（1 → 2）-【α -L- 呋喃阿拉伯糖基（1 → 4）】- β -D- 吡喃葡萄糖苷，薯蓣皂白苷元 -3-O- α -L- 吡喃鼠李唐基（1 → 4）- α -L 吡喃鼠李唐基（1 → 4）-【α -L- 吡喃鼠李糖基（1 → 2）-】β -D- 吡喃葡萄糖苷，等。3. 七叶一枝花根茎含体皂苷：七叶一枝花皂苷 A，等。药性：苦，微寒，小毒。归肝经。功用主治：清热解毒，消肿定惊。主治痈肿疮毒，咽肿喉痹，乳痈，蛇虫咬伤，跌打伤痛，肝热抽搐。

[0033] 本发明中药组合物基于中医中药治疗下肢静脉曲张的原理。选用的中药药材均有活血化瘀，舒筋活血，理气和中的功效，且造价低廉，长期使用亦不会造成患者的经济负担，是治疗下肢静脉曲张较为理想的药物。

具体实施方式

[0034] 下面结合实施例和实验例详细说明本发明的技术方案，但保护范围不被此限制。

[0035] 实施例 1 一种治疗下肢静脉曲张的中药组合物，取下述重量配比的主要原料制备而成（每份取 10g）：当归 10 份，穿山龙 10 份，穿山甲 5 份，牡蛎 15 份，红花 3 份，元胡 12 份，透骨草 20 份，田七 20 份，牛膝 13 份，八角莲 4 份，川芎 10 份，千层塔 4 份，一叶荻 15 份，蚤休 15 份。

[0036] 上述中药组合物的制备方法，步骤是：

（1）将当归、田七、千层塔和川芎淘洗 2 遍，置于阴凉通风处通风 10 小时，切碎放入高压锅，在出气口连接一较长有一定硬度的皮管，然后将其中的一段皮管浸入冷水中冷却，皮管另一段接一个饮料瓶，然后分离上层的油，分离出来的油就是混合挥发油；

（2）将红花和蚤休洗净切碎用黄酒喷匀，密封静置 2 天，挤出黄酒得酒制红花和蚤休；

（3）将牡蛎置于烧开的热水中，煮 1 分钟，取出晾凉，将牡蛎肉取出，切成块，置于锅内炒制 3-7 分钟，研末待用；

（4）将穿山甲洗净，用米醋泡 4 小时，置于无烟的炉火上锻制酥脆，研末成细末过 80 目筛待用；

（5）将穿山龙、元胡、透骨草、牛膝、八角莲和一叶荻置于砂锅内加原料总重量 4 倍的水，武火煎开，转文火煎煮 10 分钟后加入酒制红花和蚤休，大火加热至沸腾，待沸腾 2 分钟后停火，过滤，滤液晾至室温时投入步骤（3）和（4）所得物，大火煎煮至沸腾，用大铁勺搅拌 2 分钟后停火，静置 7 小时，取上清液装入密封瓶即得口服药液。

[0037] 典型病例一 吴 XX，女，58 岁，山东省聊城市茌平县，2013 年 4 月发病，症状：主因双下肢血管迂曲近 15 年，左下肢溃疡一月余。患者自述此病患了 15 余年，15 年前自觉双下肢酸胀不适并伴轻微水肿，同时出现双下肢浅表血管迂曲增粗呈蚯蚓状。随时间延长右下肢不适症状加重，血管曲张加重，平卧位休息后可缓解症状，但站立走路时会反弹，多年一直未能治愈，后经人介绍开始服用本发明药物。

[0038] 服用实施例 1 所得中药口服液并配合使用挥发油，10 天后症状开始减轻，30 天时痊愈，痊愈后又使用本发明中药组合物巩固 1 个月，停药至今无复发。

[0039] 实施例 2 一种治疗下肢静脉曲张的中药组合物，取下述重量配比的主要原料制备而成（每份取 10g）：当归 20 份，穿山龙 25 份，穿山甲 15 份，牡蛎 25 份，红花 8 份，元胡 24 份，透骨草 30 份，田七 40 份，牛膝 27 份，八角莲 17 份，川芎 15 份，千层塔 10 份，一叶荻 25 份，蚤休 20 份。

[0040] 上述中药组合物的制备方法，步骤是：

（1）将当归、田七、千层塔和川芎淘洗 6 遍，置于阴凉通风处通风 20 小时，切碎放入高压锅，在出气口连接一较长有一定硬度的皮管，然后将其中的一段皮管浸入冷水中冷却，皮管另一段接一个饮料瓶，然后分离上层的油，分离出来的油就是混合挥发油；

（2）将红花和蚤休洗净切碎用黄酒喷匀，密封静置 4 天，挤出黄酒得酒制红花和蚤休；

（3）将牡蛎置于烧开的热水中，煮 3 分钟，取出晾凉，将牡蛎肉取出，切成块，置于锅内炒制 3-7 分钟，研末待用；

（4）将穿山甲洗净，用米醋泡 8 小时，置于无烟的炉火上锻制酥脆，研末成细末过 120 目筛待用；

（5）将穿山龙、元胡、透骨草、牛膝、八角莲和一叶荻置于砂锅内加原料总重量 6 倍的水，武火煎开，转文火煎煮 20 分钟后加入酒制红花和蚤休，大火加热至沸腾，待沸腾 8 分钟后停火，过滤，滤液晾至室温时投入步骤（3）和（4）所得物，大火煎煮至沸腾，用大铁勺搅拌 2-4 分钟后停火，静置 9 小时，取上清液装入密封瓶即得口服药液。

[0041] 实施例 3一种治疗下肢静脉曲张的中药组合物，取下述重量配比的主要原料制备而成（每份取 10g）：当归 13 份，穿山龙 14 份，穿山甲 8 份，牡蛎 18 份，红花 4 份，元胡 16 份，

透骨草 23 份，田七 25 份，牛膝 15 份，八角莲 7 份，川芎 11 份，千层塔 6 份，一叶萩 18 份，蚤休 16 份。

[0042] 上述中药组合物的制备方法，步骤是：

（1）将当归、田七、千层塔和川芎淘洗 3 遍，置于阴凉通风处通风 13 小时，切碎放入高压锅，在出气口连接一较长有一定硬度的皮管，然后将其中的一段皮管浸入冷水中冷却，皮管另一段接一个饮料瓶，然后分离上层的油，分离出来的油就是混合挥发油；

（2）将红花和蚤休洗净切碎用黄酒喷匀，密封静置 2 天，挤出黄酒得酒制红花和蚤休；

（3）将牡蛎置于烧开的热水中，煮 1 分钟，取出晾凉，将牡蛎肉取出，切成块，置于锅内炒制 3-7 分钟，研末待用；

（4）将穿山甲洗净，用米醋泡 5 小时，置于无烟的炉火上锻制酥脆，研末成细末过 90 目筛待用；

（5）将穿山龙、元胡、透骨草、牛膝、八角莲和一叶萩置于砂锅内加原料总重量 4.5 倍的水，武火煎开，转文火煎煮 13 分钟后加入酒制红花和蚤休，大火加热至沸腾，待沸腾 4 分钟后停火，过滤，滤液晾至室温时投入步骤（3）和（4）所得物，大火煎煮至沸腾，用大铁勺搅拌 2 分钟后停火，静置 7.5 小时，取上清液装入密封瓶即得口服药液。

[0043] 实施例 4一种治疗下肢静脉曲张的中药组合物，取下述重量配比的主要原料制备而成（每份取 10g）：当归 18 份，穿山龙 20 份，穿山甲 13 份，牡蛎 23 份，红花 6 份，元胡 20 份，透骨草 28 份，田七 35 份，牛膝 25 份，八角莲 10 份，川芎 14 份，千层塔 8 份，一叶萩 23 份，蚤休 16-19 份。

[0044] 上述中药组合物的制备方法，步骤是：

（1）将当归、田七、千层塔和川芎淘洗 5 遍，置于阴凉通风处通风 18 小时，切碎放入高压锅，在出气口连接一较长有一定硬度的皮管，然后将其中的一段皮管浸入冷水中冷却，皮管另一段接一个饮料瓶，然后分离上层的油，分离出来的油就是混合挥发油；

（2）将红花和蚤休洗净切碎用黄酒喷匀，密封静置 4 天，挤出黄酒得酒制红花和蚤休；

（3）将牡蛎置于烧开的热水中，煮 3 分钟，取出晾凉，将牡蛎肉取出，切成块，置于锅内炒制 3-7 分钟，研末待用；

（4）将穿山甲洗净，用米醋泡 7 小时，置于无烟的炉火上锻制酥脆，研末成细末过 110 目筛待用；

（5）将穿山龙、元胡、透骨草、牛膝、八角莲和一叶萩置于砂锅内加原料总重量 5.5 倍的水，武火煎开，转文火煎煮 18 分钟后加入酒制红花和蚤休，大火加热至沸腾，待沸腾 6 分钟后停火，过滤，滤液晾至室温时投入步骤（3）和（4）所得物，大火煎煮至沸腾，用大铁勺搅拌 4 分钟后停火，静置 8.5 小时，取上清液装入密封瓶即得口服药液。

[0045] 典型病例二张 XX，女，38 岁，河南郑州人，5 年前自觉左下肢沉重、酸胀不适并伴水肿，同时出现左下肢浅表血管迂曲增粗呈蚯蚓状。当时没有感觉出得了什么病，后来左下肢酸胀不适、迂曲增粗的症状日益明显，就连走路都成困难了，走一步都觉得腿部酸胀不已。

[0046] 服用实施例 4 所得中药口服液并配合使用挥发油按摩 10 天，肿块明显减小，20 天患者自己感觉全身有力气了，自甘痊愈，痊愈后又服用本发明组合物 10 天无复发。

[0047] 实施例 5一种治疗下肢静脉曲张的中药组合物，取下述重量配比的主要原料制备而成（每份取 10g）：当归 15 份，穿山龙 17 份，穿山甲 10 份，牡蛎 20 份，红花 5 份，元胡 18

份，透骨草 25 份，田七 30 份，牛膝 20 份，八角莲 9 份，川芎 13 份，千层塔 7 份，一叶萩 20 份，蚤休 17 份。

[0048] 上述中药组合物的制备方法，步骤是：

（1）将当归、田七、千层塔和川芎淘洗 4 遍，置于阴凉通风处通风 15 小时，切碎放入高压锅，在出气口连接一较长有一定硬度的皮管，然后将其中的一段皮管浸入冷水中冷却，皮管另一段接一个饮料瓶，然后分离上层的油，分离出来的油就是混合挥发油；

（2）将红花和蚤休洗净切碎用黄酒喷匀，密封静置 3 天，挤出黄酒得酒制红花和蚤休；

（3）将牡蛎置于烧开的热水中，煮 2 分钟，取出晾凉，将牡蛎肉取出，切成块，置于锅内炒制 3-7 分钟，研末待用；

（4）将穿山甲洗净，用米醋泡 6 小时，置于无烟的炉火上锻制酥脆，研末成细末过 100 目筛待用；

（5）将穿山龙、元胡、透骨草、牛膝、八角莲和一叶萩置于砂锅内加原料总重量 5 倍的水，武火煎开，转文火煎煮 15 分钟后加入酒制红花和蚤休，大火加热至沸腾，待沸腾 5 分钟后停火，过滤，滤液晾至室温时投入步骤（3）和（4）所得物，大火煎煮至沸腾，用大铁勺搅拌 3 分钟后停火，静置 8 小时，取上清液装入密封瓶即得口服药液。

[0049] 实验例目的在于验证一下本中药组合物对治疗下肢静脉曲张是否具有疗效。根据卫生部 1993 年制定的《中药新药临床研究指导原则》为诊断依据，共 400 例下肢静脉曲张患者，平均年龄为 50 岁。随机划分为给药组和对照组。

[0050] 在实验之前的一天，记录病人的身体状况，每天查看一下患者身体症状，确保给药组和对照组情况基本一致。给药组每天使用本产品实施例 5 所得中药组合物，10 天为一个疗程。每天查看患者身体状况，做好记录。结果如下表 1：

表 1：

组别	药物类别	病例数	有效人数	治愈人数	无效人数	复发人数	治愈率	总有效率
对照组	口服其他治疗下肢静脉曲张的中药	200 人	60	90	35	15	45%	75%
实验组	本发明中药组合物	200 人	40 人	156 人	4 人	1	78%	98%

疗效分析：给药组（本发明中药组合物）使用 15 天时大多数病人感觉症状明显减轻，患

处明显感觉有好转，病人情绪好转，用药 30 天时病人基本痊愈，停药一段时间未见反复，病情得到较好控制，对照组服药后治愈效果明显。本发明中药组合物见效快，能够达到迅速缓解病人痛苦的目的，且复发率低，是一种安全有效的治疗下肢静脉曲张的中药组合物。