



(19) 대한민국특허청(KR)
(12) 공개특허공보(A)

(11) 공개번호 10-2024-0103256
(43) 공개일자 2024년07월04일

(51) 국제특허분류(Int. Cl.)
G01N 30/72 (2006.01) G01N 30/88 (2006.01)
G01N 33/02 (2006.01)
(52) CPC특허분류
G01N 30/7206 (2013.01)
G01N 33/02 (2013.01)
(21) 출원번호 10-2022-0185261
(22) 출원일자 2022년12월27일
심사청구일자 2022년12월27일
기술이전 희망 : 기술양도

(71) 출원인
국립부경대학교 산학협력단
부산광역시 남구 용소로 45, 부경대학교내 (대연동)
(72) 발명자
양지영
부산광역시 남구 수영로 345, 106동 1701호
신지영
부산광역시 남구 유엔로 46, 102동 106호
(뒷면에 계속)
(74) 대리인
위병갑


전체 청구항 수 : 총 15 항

(54) 발명의 명칭 새꼬막 원산지 판별용 바이오마커 및 이의 용도

(57) 요약

본 발명은 새꼬막(*Scapharca subcrenata*)의 지방산을 포함하는, 새꼬막 원산지 판별용 조성물을 제공하는 것으로서, 새꼬막 원산지별 비표적 분석(Untargeted analysis)을 통해 각 국내산 또는 중국산의 원산지별 새꼬막에서 포함된 지방산에 대한 분석하였다. 또한, 원산지별 지방산인 라우릭산(Lauric acid), 팔미톨레산(palmitoleic acid), 마르가르산(margaric acid), 스테아르산(stearic acid), 에이코사펜타엔산(eicosapentaenoic acid, EPA) 및 도코사헥사엔산(docosahexaenoic acid)을 선정하였고, 다변량 통계 분석을 통해 각 지방산의 컷오프값을 설정한 결과, 새꼬막의 원산지를 효과적으로 판별할 수 있음을 확인하여, 이와 관련된 사업에 유용하게 사용될 수 있다.

대표도 - 도1



(52) CPC특허분류

G01N 2030/8809 (2013.01)

(72) 발명자

양준호

부산광역시 남구 수영로 276-1, 901호

김현석

부산광역시 부산진구 가야대로 450, 104동 3401호

심이강

경상남도 진주시 초장로14번길 29, 202동 1901호

차은지

충청북도 청주시 흥덕구 오송읍 오송생명3로 31, 103동 1512호

이 발명을 지원한 국가연구개발사업

과제고유번호 1525012939

과제번호 202004252

부처명 해양수산부

과제관리(전문)기관명 해양수산과학기술진흥원

연구사업명 수산생물 원산지 판별기술 및 현장단속 키트개발

연구과제명 수산생물 원산지 판별기술 및 현장단속 키트개발

기 여 율 1/1

과제수행기관명 부경대학교산학협력단

연구기간 2020.05.07 ~ 2023.12.31

명세서

청구범위

청구항 1

새꼬막(*Scapharca subcrenata*)의 지방산을 포함하는, 새꼬막 원산지 판별용 조성물.

청구항 2

제 1항에 있어서,

상기 지방산은 라우릭산(Lauric acid), 팔미톨레산(palmitoleic acid), 마르가르산(margaric acid), 스테아르산(stearic acid), 에이코사펜타엔산(eicosapentaenoic acid, EPA) 및 도코사헥사엔산(docosahexaenoic acid)으로 이루어진 군에서 선택된 1개 이상인 것인, 조성물.

청구항 3

제 1항에 있어서,

상기 원산지는 국내산 또는 중국산인 것인, 조성물.

청구항 4

제 1항에 있어서,

상기 지방산은 이화학 분석 방법으로 분석된 것인, 조성물.

청구항 5

제 2항에 있어서,

상기 지방산을 다변량 통계 분석한 것인, 조성물.

청구항 6

제 5항에 있어서,

상기 다변량 통계 분석은 PCA analysis, HCA analysis, OPLS-DA 및 ROC analysis으로 이루어진 군에서 선택된 1개 이상인 것인, 조성물.

청구항 7

제 1항에 조성물을 포함하는, 새꼬막 원산지 판별 키트.

청구항 8

분석하고자 하는 새꼬막의 지방산을 분석하는 단계;

상기 새꼬막의 국내산 지방산과 중국산 지방산을 비교하는 단계;를 포함하는, 새꼬막 원산지 판별 방법.

청구항 9

제 8항에 있어서,

상기 지방산이 라우릭산(Lauric acid), 팔미톨레산(palmitoleic acid), 마르가르산(margaric acid), 스테아르산(stearic acid), 에이코사펜타엔산(eicosapentaenoic acid, EPA) 및 도코사헥사엔산(docosahexaenoic acid)으로 이루어진 군에서 선택된 1개 이상인 것인, 방법.

청구항 10

제 8항에 있어서,

상기 지방산이 라우릭산(Lauric acid)일 때, 컷오프값 1.94% 전체 지방산 함량 대비 비율기준으로 초과되면 중국산, 미만이면 국내산으로 판별하는 것인, 방법.

청구항 11

제 8항에 있어서,

상기 지방산이 팔미톨레산(palmitoleic acid)일 때, 컷오프값 6.10% 전체 지방산 함량 대비 비율기준으로 초과되면 국내산, 미만이면 중국산으로 판별하는 것인, 방법.

청구항 12

제 8항에 있어서,

상기 지방산이 마르가르산(margaric acid)일 때, 컷오프값 2.12% 전체 지방산 함량 대비 비율기준으로 초과되면 중국산, 미만이면 국내산으로 판별하는 것인, 방법.

청구항 13

제 8항에 있어서,

상기 지방산이 스테아르산(stearic acid)일 때, 컷오프값 8.67% 전체 지방산 함량 대비 비율기준으로 초과되면 중국산, 미만이면 국내산으로 판별하는 것인, 방법.

청구항 14

제 8항에 있어서,

상기 지방산이 에이코사펜타엔산(eicosapentaenoic acid, EPA)일 때, 컷오프값 20.29% 전체 지방산 함량 대비 비율기준으로 초과되면 국내산, 미만이면 중국산으로 판별하는 것인, 방법.

청구항 15

제 8항에 있어서,

상기 지방산이 도코사헥사엔산(docosahexaenoic acid) 일 때, 컷오프값 18.93% 전체 지방산 함량 대비 비율기준으로 초과되면 중국산, 미만이면 국내산으로 판별하는 것인, 방법.

발명의 설명

기술 분야

[0001] 본 발명의 목적은 새꼬막 원산지 판별용 바이오마커 및 이의 용도를 제공하는 것이다.

배경 기술

[0002] 최근 원재료를 값싼 다른 원료로 속여 판매하거나, 표시사항을 허위로 기재하는 등의 식품 불량 판매 사례가 있다[Food Eng. Prog, 18(4), 419- 426. (2014)]. 식품 불량은 식품의 생산, 제조, 유통 그리고 판매까지 모든 단계에서 법을 위반한 제품으로, 최근에는 국민에게 불안감을 주는 식품을 의미한다. 이러한 불법 식품 유통은 국민의 건강을 위협할 뿐만 아니라 식품유통 질서를 어지럽히고 있다. 특히, 이중 혼합 식품이나 불법 식품의 경우 가공시 외관이나 관능적인 방법으로 원재료의 판별이 어려워 가공 후에도 원재료 판별이 가능한 과학적인 판별법이 필요하다. 원재료 판별법에는 단백질 분석법, 이화학적 분석법 및 유전자 분석법 등이 있다[J. Life Sci, 27(11), 1331-1339. (2017)], 이와 같은 단백질을 이용한 판별법은 열처리 및 건조시 단백질이 쉽게 분해될 수 있고, 단백질 변성에 의해 감수성이 떨어진다는 단점이 있어 가공식품에 적합하지 않다. 이화학적 분석법에는 고속 액체 크로마토그래피(High Performance Liquid Chromatography, HPLC), 가스 크로마토그래피(Gas Chromatography, GC) 등이 있다[J. Food Sci. Technol, 51(3), 295-299. (2019)]. 크로마토그래피를 이용한 판별법은 특정 물질의 정량 및 정성이 가능하지만 실험 방법이 복잡하고, 고가의 장비를 사용해야한다는 단점이 있다. 반면, 유전자 분석법을 이용한 판별법은 단백질 기반의 판별법보다 특이성 및 감도가 높고, 단백질보다 열에 강하여 가공 처리된 시료에서 보다 안정적인 결과를 얻을 수 있다[Journal of agricultural and food chemistry, 49(3), 1175-1179.(2001)]. 유전자 분석법의 일종인 중합효소 연쇄반응(Polymerase Chain

Reaction, PCR)은 일부 유전자를 증폭시키는 방법으로 신속성, 특이도, 민감도, 간편성 등이 우수하여 식품원료 동정에 이용되고 있다.

[0003] 식품 원료의 원산지를 판별하는 기술로는 형광분석기를 이용한 무기질 분석, 전자코를 이용한 분석법, 지방산 분석 등이 있지만, 농축산물에 한하여 판별법이 개발되어있다. 수산물의 경우 이화학적 방법으로 CE-MS, LC-MS 등으로 대사체 분석을 통해 지리적 차이에 대한 분석 사례가 있지만, 대사산물 특성상 매우 민감하여 실험 검체를 회수하는 과정에서 실험적 오차가 발생할 수 있으며, 많은 검체를 분석하기 위해서는 많은 비용이 요구되는 단점이 있다. 이화학 분석으로 방사선 동위원소 분석법이 대표적이라고는 하나 분석 시료를 냉동 보관할 시 시간이 경과함에 따라 결과가 다른 양상을 나타낼 수 있다는 단점이 있으며, 아미노산 및 무기질의 경우 유의한 차이가 나타나지 않는다는 연구보고가 대부분이다. 이에 반해, 지방산의 경우 수산물의 먹이에 따라 지방산 조성의 차이가 있다는 연구보고가 있다. 이를 이용하여 분석된 지방산을 단변량 및 다변량 통계분석을 통해 원산지가 다른 두 그룹 간의 차이를 나타낼 수 있는 지방산 성분을 선별할 수 있다.

[0004] 국내산 새꼬막과 중국산 새꼬막은 모두 생물로 유통되고 있으며, 원산지 표시를 하지 않을 경우 형태학적으로 육안으로 판별하기에는 어려움이 있다. 이에 지방산 분석을 통한 이화학분석을 이용하여 국내산과 중국산 새꼬막의 원산지 판별지표를 설정함으로써 원산지 위반 사례를 예방할 수 있는 하나의 방안으로 제시할 수 있을 것이라 판단된다.

[0005] 따라서, 본 발명자들은 원산지별 새꼬막들의 LC-MS를 이용한 지방산을 분석 하고, 이를 새꼬막의 원산지 판별용 바이오마커로 이용한 결과, 국내산 및 중국산 원산지 판별에 효과적임을 확인하여, 본 발명을 완성 시켰다.

발명의 내용

해결하려는 과제

[0006] 본 발명의 목적은 새꼬막(*Scapharca subcrenata*)의 지방산을 포함하는, 새꼬막 원산지 판별용 조성물을 제공하는 것이다.

[0007] 또한, 본 발명의 목적은 상기 조성물을 포함하는, 대게 원산지 판별 키트를 제공하는 것이다.

[0008] 아울러, 본 발명의 목적은 분석하고자 하는 새꼬막의 지방산을 분석하는 단계;

[0009] 상기 새꼬막의 국내산 지방산과 중국산 지방산을 비교하는 단계;를 포함하는, 새꼬막 원산지 판별 방법을 제공하는 것이다.

과제의 해결 수단

[0010] 본 발명은 새꼬막(*Scapharca subcrenata*)의 지방산을 포함하는, 새꼬막 원산지 판별용 조성물을 제공한다.

[0011] 또한, 본 발명은 상기 조성물을 포함하는, 대게 원산지 판별 키트를 제공한다.

[0012] 아울러, 본 발명은 분석하고자 하는 새꼬막의 지방산을 분석하는 단계;

[0013] 상기 새꼬막의 국내산 지방산과 중국산 지방산을 비교하는 단계;를 포함하는, 새꼬막 원산지 판별 방법을 제공한다.

발명의 효과

[0014] 본 발명은 새꼬막(*Scapharca subcrenata*)의 지방산을 포함하는, 새꼬막 원산지 판별용 조성물을 제공하는 것으로서, 새꼬막 원산지별 비표적 분석(Untargeted analysis)을 통해 각 국내산 또는 중국산의 원산지별 새꼬막에서 포함된 지방산에 대한 분석을 하였다. 또한, 지방산 분석을 통한 이화학분석을 이용하여 원산지별 지방산인 라우릭산(Lauric acid), 팔미톨레산(palmitoleic acid), 마르가르산(margaric acid), 스테아르산(stearic acid), 에이코사펜타엔산(eicosapentaenoic acid, EPA) 및 도코사헥사엔산(docosahexaenoic acid)을 선정하였고, 다변량 통계 분석을 통해 각 지방산의 컷오프값을 설정한 결과, 새꼬막의 원산지를 효과적으로 판별할 수 있음을 확인하여, 이와 관련된 사업에 유용하게 사용될 수 있다.

도면의 간단한 설명

[0015] 도 1은 국내산 새꼬막 또는 중국산 새꼬막 원산지별 새꼬막의 지방산인 라우릭산(Lauric acid)을 다변량 통계분

석(ROC curve) 값으로 나타낸 도이다.

도 2는 국내산 새꼬막 또는 중국산 새꼬막 원산지별 새꼬막의 지방산인 팔미톨레산(palmitoleic acid)을 다변량 통계분석(ROC curve) 값으로 나타낸 도이다.

도 3은 국내산 새꼬막 또는 중국산 새꼬막 원산지별 새꼬막의 지방산인 마르가르산(margaric acid)을 다변량 통계분석(ROC curve) 값으로 나타낸 도이다.

도 4는 국내산 새꼬막 또는 중국산 새꼬막 원산지별 새꼬막의 지방산인 스테아르산(stearic acid)을 다변량 통계분석(ROC curve) 값으로 나타낸 도이다.

도 5는 국내산 새꼬막 또는 중국산 새꼬막 원산지별 새꼬막의 지방산인 에이코사펜차엔산(eicosapentaenoic acid, EPA)을 다변량 통계분석(ROC curve) 값으로 나타낸 도이다.

도 6은 국내산 새꼬막 또는 중국산 새꼬막 원산지별 새꼬막의 지방산인 도코사헥사엔산(docosahexaenoic acid)을 다변량 통계분석(ROC curve) 값으로 나타낸 도이다.

발명을 실시하기 위한 구체적인 내용

- [0016] 이하, 첨부된 도면을 참조하여 본 발명의 구현예로 본 발명을 상세히 설명하기로 한다. 다만, 하기 구현예의 예는 본 발명에 대한 예시로 제시되는 것으로, 당업자에게 주지 저명한 기술 또는 구성에 대한 구체적인 설명이 본 발명의 요지를 불필요하게 흐릴 수 있다고 판단되는 경우에는 그 상세한 설명을 생략할 수 있고, 이에 의해 본 발명이 제한되지는 않는다. 본 발명은 후술하는 특허청구범위의 기재 및 그로부터 해석되는 균등 범주 내에서 다양한 변형 및 응용이 가능하다.
- [0017] 또한, 본 명세서에서 사용되는 용어(terminology)들은 본 발명의 바람직한 실시예를 적절히 표현하기 위해 사용된 용어들로서, 이는 사용자, 운용자의 의도 또는 본 발명이 속하는 분야의 관례 등에 따라 달라질 수 있다. 따라서 본 용어들에 대한 정의는 본 명세서 전반에 걸친 내용을 토대로 내려져야 할 것이다. 명세서 전체에서, 어떤 부분이 어떤 구성요소를 “포함” 한다고 할 때, 이는 특별히 반대되는 기재가 없는 한 다른 구성요소를 제외하는 것이 아니라 다른 구성 요소를 더 포함할 수 있는 것을 의미한다.
- [0018] 본 발명은 새꼬막(*Scapharca subcrenata*)의 지방산을 포함하는, 새꼬막 원산지 판별용 조성물을 제공한다.
- [0019] 일 실시예에 있어서, 상기 지방산은 라우릭산(Lauric acid), 팔미톨레산(palmitoleic acid), 마르가르산(margaric acid), 스테아르산(stearic acid), 에이코사펜차엔산(eicosapentaenoic acid, EPA) 및 도코사헥사엔산(docosahexaenoic acid)으로 이루어진 군에서 선택된 1개 이상인 것이나, 이에 제한되지 않는다.
- [0020] 일 실시예에 있어서, 상기 원산지는 국내산 또는 중국산인 것이나, 이에 제한되지 않는다.
- [0021] 일 실시예에 있어서, 상기 지방산은 CE-TOF/MS, nuclear magnetic resonance(NMR), gas chromatography/mass spectrometer(GC/MS), liquid chromatography(LC/MS) 및 near infrared spectroscopy(NIR)으로 이루어진 군에서 선택된 1개 이상의 대사체 분석 방법으로 분석된 것이나, 이에 제한되지 않는다.
- [0022] 일 실시예에 있어서, 상기 지방산을 다변량 통계 분석한 것이나, 이에 제한되지 않는다.
- [0023] 일 실시예에 있어서, 상기 다변량 통계 분석은 PCA analysis, HCA analysis, OPLS-DA 및 ROC analysis으로 이루어진 군에서 선택된 1개 이상인 것이나, 이에 제한되지 않는다.
- [0024] 일 구현예에 있어서, 본 발명은 상기 조성물을 포함하는, 새꼬막 원산지 판별 키트를 제공한다.
- [0025] 일 구현예에 있어서, 본 발명은 분석하고자 하는 새꼬막의 지방산을 분석하는 단계;
- [0026] 상기 새꼬막의 국내산 지방산과 중국산 지방산을 비교하는 단계;를 포함하는, 새꼬막 원산지 판별 방법을 제공한다.
- [0027] 일 실시예에 있어서, 상기 지방산이 라우릭산(Lauric acid), 팔미톨레산(palmitoleic acid), 마르가르산(margaric acid), 스테아르산(stearic acid), 에이코사펜차엔산(eicosapentaenoic acid, EPA) 및 도코사헥사엔산(docosahexaenoic acid)으로 이루어진 군에서 선택된 1개 이상인 것이나, 이에 제한되지 않는다.
- [0028] 일 실시예에 있어서, 상기 지방산이 라우릭산(Lauric acid)일 때, 컷오프값 1.94% 전체 지방산 함량 대비 비율 기준으로 초과되면 중국산, 미만이면 국내산으로 판별하는 것일 수 있다.

- [0029] 일 실시예에 있어서, 상기 지방산이 팔미톨레산(palmitoleic acid)일 때, 컷오프값 6.10% 전체 지방산 함량 대비 비율기준으로 초과되면 국내산, 미만이면 중국산으로 판별하는 것일 수 있다.
- [0030] 일 실시예에 있어서, 상기 지방산이 마르가르산(margaric acid)일 때, 컷오프값 2.12% 전체 지방산 함량 대비 비율기준으로 초과되면 중국산, 미만이면 국내산으로 판별하는 것일 수 있다.
- [0031] 일 실시예에 있어서, 상기 지방산이 스테아르산(stearic acid)일 때, 컷오프값 8.67% 전체 지방산 함량 대비 비율기준으로 초과되면 중국산, 미만이면 국내산으로 판별하는 것일 수 있다.
- [0032] 일 실시예에 있어서, 상기 지방산이 에이코사펜타엔산(eicosapentaenoic acid, EPA)일 때, 컷오프값 20.29% 전체 지방산 함량 대비 비율기준으로 초과되면 국내산, 미만이면 중국산으로 판별하는 것일 수 있다.
- [0033] 일 실시예에 있어서, 상기 지방산이 도코사헥사엔산(docosahexaenoic acid) 일 때, 컷오프값 18.93% 전체 지방산 함량 대비 비율기준으로 초과되면 중국산, 미만이면 국내산으로 판별하는 것일 수 있다.
- [0034] 이하, 실시예를 통하여 본 발명을 보다 자세히 설명한다. 다만, 상기 실시예 및 실험예는 본 발명에 대한 예시로 제시되는 것으로, 당업자에게 주지 저명한 기술 또는 구성에 대한 구체적인 설명이 본 발명의 요지를 불필요하게 흐릴 수 있다고 판단되는 경우에는 그 상세한 설명을 생략할 수 있고, 이에 의해 본 발명이 제한되지는 않는다. 본 발명은 후술하는 특허청구범위의 기재 및 그로부터 해석되는 균등 범주 내에서 다양한 변형 및 응용이 가능하다.

[0036] **준비에 1. 원산지 판별용 새꼬막**

- [0037] 표준시료로 사용된 국내산 새꼬막과 중국산 새꼬막을 시중 유통되고 있는 것을 구매하여 사용하였다. 표준시료의 경우 구입 후 조직을 채취해 동결건조하고 균질화하여 진공포장한 것을 -80℃에서 보관하였다.

[0039] **실시예 1. 이화학 분석 방법**

- [0040] CHCl₃-MeOH (1:2, v/v)을 이용하여 시료의 지질을 추출하고, 추출된 유지는 식품공전법(MFDS, 2021)에 따라 메탄올성 수산화나트륨용액으로 처리하여 알칼리염을 만든 후 트리플루오로보란메탄을 용액을 가하고 가열하여 에스테르화하였다. 생성된 지방산에스테르를 이소옥탄에 녹여 분석시료로 사용하였으며 지방산 분석은 GC(YL 6500 GC, Agilent technologies, Santa Clara, CA, USA)로 분석하였다. 시료 용액의 분석을 위한 GC분석 조건은 다음과 같으며(표 1), 분석된 개별 지방산의 함량은 식품공전법에 따라 36종의 지방산메틸에스터 표준물질을 통하여 GC-FID상에서의 각 지방산 전환계수를 구하여 지방산에틸에스터의 함량을 계산하고 이를 지방산으로 환산하였다.

표 1

[0041]

Instrument	Conditions
Column	SP-2560 (100 m × 0.25 m × 0.2 μm)
Carrier gas	Helium
Oven temperature	100℃ (5 min) → 4℃ (1 min) → 240℃ (20 min)
Detect temperature	260℃
Inject temperature	250℃
Split ratio	10:01
Injection volume	1 μL

[0043] **실시예 2. 원산지별 새꼬막의 지방산 분석**

- [0044] 원산지별 새꼬막의 지방산 분석을 하기위해, 준비예 1에 준비된 새꼬막을 GC/MS분석을 통해 각 원산지별 지방산의 포함되어 있는 지방산에 대한 분석을 진행하였고, 이화학 분석을 통해서 각 개체에 포함되어 있는 지방산

에 대한 분석 진행하였고, Library를 바탕으로 물질의 종류를 확인하였다.

[0045] 그 결과, 다변량 분석을 통해서 확인된 물질이 얼마나 각각의 원산지가 판별이 되는지에 대한 여부를 판단하고, 각각의 원산지 판별을 할 수 있는 물질을 통계학적으로 구분하여 라우릭산(Lauric acid), 팔미톨레산(palmitoleic acid), 마르가르산(margaric acid), 스테아르산(stearic acid), 에이코사펜차옌산(eicosapentaenoic acid, EPA) 및 도코사헥사옌산(docosahexaenoic acid)이 새꼬막의 원산지를 판별 가능한 후보물질로 선정하였다.

[0047] 실시예 3. 다변량 통계 분석

[0048] 새꼬막의 원산지 판별 할 수 있는 지방산들인 라우릭산(Lauric acid), 팔미톨레산(palmitoleic acid), 마르가르산(margaric acid), 스테아르산(stearic acid), 에이코사펜차옌산(eicosapentaenoic acid, EPA) 및 도코사헥사옌산(docosahexaenoic acid)을 다변량 분석을 통해서 새꼬막의 원산지를 구분할 수 있는 바이오 마커조성물로 선정하였다.

[0049] 도 1과 같이, 새꼬막의 라우릭산(Lauric acid)의 컷오프값 1.94% 전체 지방산 함량 대비 기준으로 초과되면 중국산, 미만이면 국내산으로 판별 가능한 것을 확인하였다.

[0050] 도 2와 같이, 새꼬막의 팔미톨레산(palmitoleic acid)의 컷오프값 6.10% 전체 지방산 함량 대비 기준으로 초과 되면 국내산, 미만이면 중국산으로 판별 가능한 것을 확인하였다.

[0051] 도 3와 같이, 새꼬막의 마르가르산(margaric acid)의 컷오프값 2.12% 전체 지방산 함량 대비 기준으로 초과되면 중국산, 미만이면 국내산으로 판별 가능한 것을 확인하였다.

[0052] 도 4와 같이, 새꼬막의 스테아르산(stearic acid)의 컷오프값 8.67% 전체 지방산 함량 대비 기준으로 초과되면 중국산, 미만이면 국내산으로 판별 가능한 것을 확인하였다.

[0053] 도 5와 같이, 새꼬막의 에이코사펜차옌산(eicosapentaenoic acid, EPA)의 컷오프값 20.29% 전체 지방산 함량 대비 기준으로 초과되면 국내산, 미만이면 중국산으로 판별 가능한 것을 확인하였다.


[0054] 도 6와 같이, 새꼬막의 도코사헥사옌산(docosahexaenoic acid)의 컷오프값 18.93% 전체 지방산 함량 대비 기준으로 초과되면 중국산, 미만이면 국내산으로 판별 가능한 것을 확인하였다.

[0055] 따라서, 각각의 라우릭산(Lauric acid), 팔미톨레산(palmitoleic acid), 마르가르산(margaric acid), 스테아르산(stearic acid), 에이코사펜차옌산(eicosapentaenoic acid, EPA) 및 도코사헥사옌산(docosahexaenoic acid) 컷오프값을 기준으로 새꼬막의 원산지를 판별 할 수 있음을 확인 하였다.


[0057] 이제까지 본 발명에 대하여 그 실시예를 들었다. 본 발명이 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자는 본 발명이 본 발명의 본질적인 특성에서 벗어나지 않는 범위에서 변형된 형태로 구현될 수 있다. 그러므로 개시된 실시예들은 한정적인 관점이 아니라 설명적인 관점에서 고려되어야 한다. 본 발명의 범위는 전술한 설명이 아니라 특허청구 범위에 나타나 있으며, 그와 동등한 범위 내에 있는 모든 차이점은 본 발명에 포함된 것으로 해석 되어야 할 것이다.

도면


도면1




도면2




도면3



도면4



도면5



도면6

