



(12) 发明专利申请

(10) 申请公布号 CN 103735849 A

(43) 申请公布日 2014. 04. 23

(21) 申请号 201410034910. 1

(22) 申请日 2014. 01. 24

(71) 申请人 王金文

地址 262700 山东省潍坊市寿光市圣城街  
98 号寿光市中医医院

(72) 发明人 王金文

(51) Int. Cl.

A61K 36/898 (2006. 01)

A61P 35/00 (2006. 01)

A61K 33/06 (2006. 01)

A61K 33/26 (2006. 01)

A61K 35/64 (2006. 01)

权利要求书1页 说明书6页

(54) 发明名称

一种治疗子宫肌瘤的药物及制备方法

(57) 摘要

本发明公开了一种治疗子宫肌瘤的药物及制备方法,属中药领域;本发明药物有效成分的原料组成为廊茵、过坛龙、赤楠、龙胆草、地葱、矮杨梅、白垩、紫泡、针砂、莱菔子、金樱子、禾虫、胡黄连、麦斛、马蹄根和红棉;本发明药物具有活血化瘀、散结止痛、疏肝理气之功效,可在短时间内改善增生子宫内膜的血液循环,使肌层的单纯性肥大逐渐消失,增生结缔组织逐渐变软,可从根本上使肌瘤软化、缩小,最终完全吸收和消失,从而达到彻底康复治疗的目的,疗效短见效快,无毒副作用的特点,成本低廉,值得推广应用。

1. 一种治疗子宫肌瘤的药物,其特征在于:制成所述药物有效成分的原料组成及重量份数为:

廊茵 42 ~ 72 份 过坛龙 37 ~ 67 份 赤楠 37 ~ 62 份 龙胆草 32 ~ 62 份  
地菘 32 ~ 62 份 矮杨梅 32 ~ 57 份 白垩 27 ~ 57 份 紫泡 27 ~ 57 份  
针砂 27 ~ 52 份 莱菔子 22 ~ 52 份 金樱子 22 ~ 47 份 禾虫 22 ~ 47 份  
胡黄连 22 ~ 46 份 麦斛 17 ~ 45 份 马蹄根 17 ~ 42 份 红棉 12 ~ 37 份。

2. 根据权利要求 1 所述的一种治疗子宫肌瘤的药物,其特征在于:制成所述药物有效成分的原料组成及重量份数为:

廊茵 47 ~ 67 份 过坛龙 42 ~ 62 份 赤楠 41 ~ 58 份 龙胆草 37 ~ 57 份  
地菘 37 ~ 57 份 矮杨梅 36 ~ 53 份 白垩 32 ~ 52 份 紫泡 32 ~ 52 份  
针砂 31 ~ 48 份 莱菔子 27 ~ 47 份 金樱子 26 ~ 43 份 禾虫 26 ~ 43 份  
胡黄连 26 ~ 42 份 麦斛 21 ~ 41 份 马蹄根 21 ~ 38 份 红棉 16 ~ 33 份。

3. 根据权利要求 1 所述的一种治疗子宫肌瘤的药物,其特征在于:制成所述药物有效成分的原料组成及重量份数为:

廊茵 52 ~ 62 份 过坛龙 47 ~ 57 份 赤楠 45 ~ 54 份 龙胆草 42 ~ 52 份  
地菘 42 ~ 52 份 矮杨梅 40 ~ 49 份 白垩 37 ~ 47 份 紫泡 37 ~ 47 份  
针砂 37 ~ 42 份 莱菔子 32 ~ 42 份 金樱子 30 ~ 39 份 禾虫 30 ~ 39 份  
胡黄连 30 ~ 38 份 麦斛 27 ~ 35 份 马蹄根 25 ~ 34 份 红棉 20 ~ 29 份。

4. 根据权利要求 1 所述的一种治疗子宫肌瘤的药物,其特征在于:制成所述药物有效成分的原料组成及重量份数为:

廊茵 57 份 过坛龙 52 份 赤楠 50 份 龙胆草 47 份  
地菘 47 份 矮杨梅 45 份 白垩 42 份 紫泡 42 份  
针砂 40 份 莱菔子 37 份 金樱子 35 份 禾虫 35 份  
胡黄连 34 份 麦斛 31 份 马蹄根 30 份 红棉 25 份。

5. 一种如权利要求 1 ~ 4 任一项所述治疗子宫肌瘤的药物的制备方法,其特征在于:包括以下工艺步骤:

(1) 将廊茵、过坛龙、地菘和胡黄连洗净,放阴凉处晾干,切碎,放入容器内,绞汁,滤杂质,留汁液备用;

(2) 将赤楠、白垩、紫泡、莱菔子、金樱子和禾虫洗净,放入容器内,加入 8 ~ 10 倍量的蒸馏水,浸泡 5 ~ 6 小时后,煮沸 3 ~ 4 小时,提取;再次加入 6 ~ 8 倍量蒸馏水,煮沸 2 ~ 3 小时,提取;最后,加入 4 ~ 6 倍量蒸馏水,加热煮沸 1 ~ 2 小时,提取;合并三次提取液,过滤,得滤液,备用;

(3) 将龙胆草、针砂、马蹄根和红棉去杂质混合均匀,烘干,进行粉碎处理研末,过 160 目细粉,备用;

(4) 将矮杨梅和麦斛洗净,浸入 2 倍量的 45% 的乙醇溶液浸泡 1 ~ 2 小时,加热提取 3 小时,回收乙醇,滤过,浓缩为 40℃ 下相对密度为 1.10 ~ 1.12 的稠膏,备用;

(5) 将上述步骤(1) ~ (4) 所制得的汁液、滤液、细粉以及稠膏混合,制成胶囊,即得本发明所述的治疗子宫肌瘤的药物。

## 一种治疗子宫肌瘤的药物及制备方法

### 技术领域

[0001] 本发明涉及中药领域,尤其涉及一种治疗子宫肌瘤的药物及制备方法。

### 背景技术

[0002] 子宫肌瘤是女性生殖器官中最常见的一种良性肿瘤,也是人体中最常见的肿瘤之一,由于子宫肌瘤主要是由子宫平滑肌细胞增生而成,其中有少量纤维结缔组织作为一种支持组织而存在,故称为子宫平滑肌瘤较为确切,简称子宫肌瘤。

[0003] 妇科专家介绍,子宫肌瘤的具体原因目前尚不十分明确,但研究表明,激素分泌过于旺盛,是导致子宫肌瘤的最普遍原因,而女性的这三种行为模式,是造成内分泌紊乱,导致激素分泌过剩的罪魁祸首,手术仍然是治疗子宫肌瘤的主要手段,因为子宫肌瘤行子宫切除术,严重影响妇女健康,故近年来对肌瘤的中西医治疗研究日益重视。

[0004] 超声检查为目前最为常用的辅助诊断方法,它可显示子宫增大,形状不规则,肌瘤数目、部位、大小及肌瘤内部是否均匀或液化、囊变等,超声检查既有助于诊断子宫肌瘤,并为区别肌瘤是否有变性提供参考,又有助于与卵巢肿瘤或其他盆腔肿块鉴别。

[0005] 对于子宫肌瘤的治疗目前主要分为药物治疗和手术治疗。子宫肌瘤的手术主要指子宫切除术(包括全切和半切)、子宫肌瘤剔除术,切除术一般适用于子宫>3个月妊娠子宫大小、肌瘤虽不大但症状明显,或肌瘤增长快不能排除恶性者,而剔除术主要是适用于35岁以下,对于药物治疗,一般是适用于一些肌瘤尚小,症状不明显,近绝经期或全身身体情况较差不能耐受手术的患者;现在还有一种子宫动脉血管结扎或血管栓塞法的治疗,不过手术后肌瘤虽会缩小,但仍存在。

[0006] 中医药为主的保守治疗,疗效肯定,免除了部分患者的手术痛苦,具有很好的治疗前景,具有花钱少,无风险,无后遗症,见效快和治愈率高的特点。

### 发明内容

[0007] 本发明的目的是提供一种治疗子宫肌瘤的药物及制备方法;本发明药物具有活血化瘀、散结止痛、疏肝理气之功效,可在短时间内改善增生子宫内膜的血液循环,使肌层的单纯性肥大逐渐消失,增生结缔组织逐渐变软,可从根本上使肌瘤软化、缩小,最终完全吸收和消失,从而达到彻底康复治疗的目的,疗效短见效快,无毒副作用的特点,成本低廉,值得广泛推广应用。

[0008] 为实现上述目的,本发明的技术方案的实施如下:

[0009] 一种治疗子宫肌瘤的药物,制成所述药物有效成分的原料组成及重量份数为:

[0010]

廊茵 42~72 份 过坛龙 37~67 份 赤楠 37~62 份 龙胆草 32~62 份  
地荜 32~62 份 矮杨梅 32~57 份 白垩 27~57 份 紫泡 27~57 份  
针砂 27~52 份 莱菔子 22~52 份 金樱子 22~47 份 禾虫 22~47 份  
胡黄连 22~46 份 麦斛 17~45 份 马蹄根 17~42 份 红棉 12~37 份。

[0011] 制成所述药物有效成分的原料组成及重量份数为：

[0012]

廊茵 47~67 份 过坛龙 42~62 份 赤楠 41~58 份 龙胆草 37~57 份  
地荜 37~57 份 矮杨梅 36~53 份 白垩 32~52 份 紫泡 32~52 份  
针砂 31~48 份 莱菔子 27~47 份 金樱子 26~43 份 禾虫 26~43 份  
胡黄连 26~42 份 麦斛 21~41 份 马蹄根 21~38 份 红棉 16~33 份。

[0013] 制成所述药物有效成分的原料组成及重量份数为：

[0014]

廊茵 52~62 份 过坛龙 47~57 份 赤楠 45~54 份 龙胆草 42~52 份  
地荜 42~52 份 矮杨梅 40~49 份 白垩 37~47 份 紫泡 37~47 份  
针砂 37~42 份 莱菔子 32~42 份 金樱子 30~39 份 禾虫 30~39 份  
胡黄连 30~38 份 麦斛 27~35 份 马蹄根 25~34 份 红棉 20~29 份。

[0015] 制成所述药物有效成分的原料组成及重量份数为：

[0016]

廊茵 57 份 过坛龙 52 份 赤楠 50 份 龙胆草 47 份  
地荜 47 份 矮杨梅 45 份 白垩 42 份 紫泡 42 份  
针砂 40 份 莱菔子 37 份 金樱子 35 份 禾虫 35 份

[0017]

胡黄连 34 份 麦斛 31 份 马蹄根 30 份 红棉 25 份。

[0018] 一种治疗子宫肌瘤的药物的制备方法,包括以下工艺步骤：

[0019] (1) 将廊茵、过坛龙、地荜和胡黄连洗净,放阴凉处晾干,切碎,放入容器内,绞汁,滤杂质,留汁液备用；

[0020] (2) 将赤楠、白垩、紫泡、莱菔子、金樱子和禾虫洗净,放入容器内,加入 8~10 倍量的蒸馏水,浸泡 5~6 小时后,煮沸 3~4 小时,提取；再次加入 6~8 倍量蒸馏水,煮沸 2~3 小时,提取；最后,加入 4~6 倍量蒸馏水,加热煮沸 1~2 小时,提取；合并三次提取液,过滤,得滤液,备用；

[0021] (3) 将龙胆草、针砂、马蹄根和红棉去杂质混合均匀,烘干,进行粉碎处理研末,过 160 目细粉,备用；

[0022] (4) 将矮杨梅和麦斛洗净,浸入 2 倍量的 45% 的乙醇溶液浸泡 1~2 小时,加热提取 3 小时,回收乙醇,滤过,浓缩为 40℃ 下相对密度为 1.10~1.12 的稠膏,备用；

[0023] (5) 将上述步骤(1)~(4)所制得的汁液、滤液、细粉以及稠膏混合,制成胶囊,即得本发明所述的治疗子宫肌瘤的药物。

[0024] 本发明所用中药的药性如下:

[0025] 廊茵:味苦、酸、微辛,性平。清热解毒,和湿止痒,散瘀消肿。主治痈疮疔疖,毒蛇咬伤,湿疹,黄水疮,带状疱疹,跌打损伤,内痔外痔。《甘肃中草药手册》载:“清热解毒,理气止痛,固脱。治小儿胎毒,胃气疼痛,子宫脱垂。”

[0026] 过坛龙:味苦、辛,性凉;归肝、膀胱、大肠经。清热利湿,解毒散结。主治流感发热,泄泻痢疾,黄疸,石淋,痈肿,瘰疬,蛇虫咬伤,跌打肿痛。《南宁市药物志》载:“收敛,止痛消肿。治痢疾,湿热腹泻,便血,跌打,烫火伤;洗疮,排脓散肿。”

[0027] 赤楠:味甘、辛、微苦,性平;归肾、脾、肝经。健脾利湿,平喘,散瘀消肿。主治喘咳,浮肿,淋浊,尿路结石,痢疾,肝炎,子宫脱垂,风湿痛,疝气,睾丸炎,痔疮,痈肿,水火烫伤,跌打肿痛。《广西药植名录》载:“治汤火伤,跌打,治手指疮。”

[0028] 龙胆草:味苦,性寒;归肝、胆经。清热燥湿,泻肝胆火。用于湿热黄疸,阴肿阴痒,带下,强中,湿疹瘙痒,目赤,耳聋,胁痛,口苦,惊风抽搐。《药品化义》载:“龙胆草专泻肝胆之火,主治目痛颈痛,两胁疼痛,惊痫邪气,小儿疳积,凡属肝经热邪为患,用之神妙。其气味厚重而沉下,善清下焦湿热,若囊痈、便毒、下疳,及小便涩滞,亦能除胃热,平蛔虫,盖蛔得苦即安耳。”

[0029] 地苘:味甘、微涩,性凉;归心、肝、脾、肺经。清热解毒,活血止血。主治高热,肺痈,咽肿,牙痛,赤白痢疾,黄疸,水肿,痛经,崩漏,带下,产后腹痛,瘰疬,痈肿,疔疮,痔瘡,毒蛇咬伤。《闽东本草》载:“治痛经,崩带,血痢,痔瘡,风疹,疝气。”现代医学研究证实,地苠有止血、解毒、消炎的效果,也具有治子宫出血、痢疾、疮痈溃烂红肿的作用。

[0030] 矮杨梅:味酸涩,性温。主治痢疾,腹泻,消化不良,崩漏,直肠出血,脱肛,风湿疼痛,跌打劳伤。《云南中草药》载:“涩,凉,酸,凉。治久泻久痢,治风湿痛。”

[0031] 白堊:味苦,性温,无毒;归脾、肺、肾经。温中暖肾,涩肠止血,敛疮。主治反胃,泻痢,男子遗精,女子月经不调,不孕,吐血,便血,衄血,眼弦赤烂,疔疮,痲子瘙痒。《医林纂要》载:“补肺生金,解渴消暑。治肺痈、痿,止赤白痢,和脾胃。治霍乱腹痛。”

[0032] 紫泡:味苦、涩,性平、微温。止泻痢,祛风止痛,清热利湿,消炎,补肾涩精。治痢疾,腹泻,风湿关节痛,痛风,急、慢性肝炎,月经不调,小儿疳积,挫伤疼痛,湿疹,皮肤化脓感染,口腔炎,咽喉炎,牙龈炎,泌尿道结石,神经衰弱,遗精,早泄。

[0033] 针砂:味酸、辛、咸,性寒、平,无毒;归脾、肝、大肠经。镇心平肝,健脾消积,补血利湿,消肿。主治惊悸癫狂,血虚黄肿,泄泻下痢,尿少水肿,风湿痹痛,项下气瘕。《本草纲目》载:“清积聚、肿满、黄疸,平肝气,散瘕。”

[0034] 莱菔子:味辛、甘,性平;归肺、脾、胃经。消食除胀,降气化痰。用于饮食停滞,脘腹胀痛,大便秘结,积滞泻痢,痰壅喘咳。《纲目》载:“下气定喘,治痰,消食,除胀,利大小便,止气痛,下痢后重,发疮疹。”

[0035] 金樱子:味酸、涩,性平,无毒;归肾、膀胱、大肠、脾、肺经。固精缩尿,涩肠止带。主治滑精,滑精,遗尿,尿频,久泻,久痢,白浊,白带,崩漏,脱肛,子宫下垂。《本草正》载:“止吐血,衄血,生津液,收虚汗,敛虚火,益精髓,壮筋骨,补五藏,养血气,平咳嗽,定喘急,疗怔忡惊悸,止脾泄血痢及小水不禁。”

[0036] 禾虫：味甘，性温；归脾、胃经。补脾胃，益气血，利水消肿。主治脾胃虚弱，泄泻，贫血，水肿。《纲目拾遗》载：“补脾胃，生血，利湿，行小便。”

[0037] 胡黄连：味苦，性寒；归肝、胃、大肠经。退虚热，消痞热，清热燥湿，泻火解毒。主治阴虚骨蒸，潮热盗汗，小儿疳疾，湿热泻痢，黄疸，吐血，衄血，目赤肿痛，痈肿疮疡，痔疮肿毒。现代医学研究证实，胡黄连内含的胡黄连甙 II 具有保肝利胆的作用。

[0038] 麦斛：味甘、淡，性凉；入肺、胃二经。滋阴清热，化痰止咳。用于肺燥咳嗽，肺结核咯血，热病烦渴，扁桃体炎。广州部队《常用中草药手册》载：“润肺化痰，滋阴养胃。治肺结核咳嗽，咯血，慢性气管炎咳嗽，肺炎恢复期，慢性咽痛，慢性胃炎，胃酸缺乏，食欲不振，遗精。”

[0039] 马蹄根：味苦、涩，性寒；归心、肺、大肠经。清热解毒，止血，祛湿利尿。主治肠炎，痢疾，食滞腹胀，肾炎水肿，肺结核，咳血，血崩，跌打，风湿，胃及十二指肠溃疡。

[0040] 红棉：味辛、甘，性平；入胃、大肠经。清热利湿，活血消肿。主治慢性胃炎，胃溃疡，泄泻，痢疾，腰脚不遂，腿膝疼痛、疮肿、跌打损伤等。现代医学研究证实，红棉具有清热凉血、去滞消积、调节人体免疫和抗癌的功能。

[0041] 本发明与现有技术相比，具有以下有益效果：

[0042] 本发明药物具有活血化瘀、散结止痛、疏肝理气之功效，可在短时间内改善增生子宫内膜的血液循环，使肌层的单纯性肥大逐渐消失，增生结缔组织逐渐变软，可从根本上使肌瘤软化、缩小，最终完全吸收和消失，从而达到彻底康复治疗的目的，疗效短见效快，无毒副作用的特点，成本低廉，值得广泛应用。

## 具体实施方式

[0043] 下面结合具体实施例对本发明做进一步补充，但不以任何方式限制本发明。实施例 1

[0044] 本发明药物有效成分的原料组成及重量为：

[0045]

廊茵 67g 过坛龙 62g 赤楠 58g 龙胆草 57g  
地菘 57g 矮杨梅 53g 白堍 52g 紫泡 52g  
针砂 48g 莱菔子 47g 金樱子 43g 禾虫 43g  
胡黄连 42g 麦斛 41g 马蹄根 38g 红棉 33g。

[0046] 一种治疗子宫肌瘤的药物的制备方法，包括以下工艺步骤：

[0047] (1) 将廊茵、过坛龙、地菘和胡黄连洗净，放阴凉处晾干，切碎，放入容器内，绞汁，滤杂质，留汁液备用；

[0048] (2) 将赤楠、白堍、紫泡、莱菔子、金樱子和禾虫洗净，放入容器内，加入 8～10 倍量的蒸馏水，浸泡 5～6 小时后，煮沸 3～4 小时，提取；再次加入 6～8 倍量蒸馏水，煮沸 2～3 小时，提取；最后，加入 4～6 倍量蒸馏水，加热煮沸 1～2 小时，提取；合并三次提取液，过滤，得滤液，备用；

[0049] (3) 将龙胆草、针砂、马蹄根和红棉去杂质混合均匀，烘干，进行粉碎处理研末，过 160 目细粉，备用；

[0050] (4) 将矮杨梅和麦斛洗净, 浸入 2 倍量的 45% 的乙醇溶液浸泡 1 ~ 2 小时, 加热提取 3 小时, 回收乙醇, 滤过, 浓缩为 40°C 下相对密度为 1.10 ~ 1.12 的稠膏, 备用;

[0051] (5) 将上述步骤(1) ~ (4) 所制得的汁液、滤液、细粉以及稠膏混合, 制成胶囊, 即得本发明所述的治疗子宫肌瘤的药物。

[0052] 用法用量: 口服即可, 每日 2 次, 早晚各 1 次, 每次 2 粒, 饭后温开水送服; 10 天为 1 个疗程, 2 ~ 3 个疗程可痊愈。

[0053] 实施例 2

[0054] 本发明药物有效成分的原料组成及重量为:

[0055]

廊茵 62g 过坛龙 57g 赤楠 54g 龙胆草 52g  
地苳 52g 矮杨梅 49g 白垩 47g 紫泡 47g  
针砂 42g 莱菔子 42g 金樱子 39g 禾虫 39g  
胡黄连 38g 麦斛 35g 马蹄根 34g 红棉 29g。

[0056] 本实施例的药物制备方法工艺步骤及用法用量与实施例 1 相同。实施例 3

[0057] 本发明药物有效成分的原料组成及重量为:

[0058]

廊茵 57g 过坛龙 52g 赤楠 50g 龙胆草 47g  
地苳 47g 矮杨梅 45g 白垩 42g 紫泡 42g  
针砂 40g 莱菔子 37g 金樱子 35g 禾虫 35g  
胡黄连 34g 麦斛 31g 马蹄根 30g 红棉 25g。

[0059] 本实施例的药物制备方法工艺步骤及用法用量与实施例 1 相同。实施例 4

[0060] 本发明药物有效成分的原料组成及重量为:

[0061]

廊茵 52g 过坛龙 47g 赤楠 45g 龙胆草 42g  
地苳 42g 矮杨梅 40g 白垩 37g 紫泡 37g  
针砂 37g 莱菔子 32g 金樱子 30g 禾虫 30g  
胡黄连 30g 麦斛 27g 马蹄根 25g 红棉 20g。

[0062] 本实施例的药物制备方法工艺步骤及用法用量与实施例 1 相同。实施例 5

[0063] 本发明药物有效成分的原料组成及重量为:

[0064]

廊茵 47g 过坛龙 42g 赤楠 41g 龙胆草 37g  
地蕊 37g 矮杨梅 36g 白堊 32g 紫泡 32g  
针砂 31g 莱菔子 27g 金樱子 26g 禾虫 26g  
胡黄连 26g 麦斛 21g 马蹄根 21g 红棉 16g。

[0065] 本实施例的药物制备方法工艺步骤及用法用量与实施例 1 相同。

[0066] 临床资料：

[0067] 1、病例选择：

[0068] 作为治疗子宫肌瘤的药物，选择确诊的子宫肌瘤患者 200 例临床观察，病人随机分成治疗组和对照组两组，治疗组女性 100 例，年龄 28 ~ 48 岁，平均年龄 37.3 岁，病程最短者 3 个月，最长者 6 年，平均 3.1 年。对照组女性 100 例，年龄 27 ~ 47 岁，平均年龄 36.3 岁，病程最短者 4 个月，最长者 5 年，平均 3.5 年。

[0069] 治疗组和对照组两组病例的病程、症状轻重程度基本一致，无显著差异，具有可比性。

[0070] 2、药物选择：

[0071] 治疗组服用本发明药物，口服，每日 2 次，早晚各 1 次，每次 2 粒，饭后温开水送服；10 天为 1 个疗程，连续服用 2 ~ 3 个疗程。

[0072] 对照组服用达那唑，每日 3 ~ 4 次，每次 50 ~ 200mg；15 天为 1 个疗程，连续服用 4 ~ 6 个疗程。

[0073] 3、疗效判定：

[0074] (1) 治愈：子宫肌瘤消失，子宫明显缩小。

[0075] (2) 显效：子宫肌瘤缩小，子宫缩小。

[0076] (3) 无效：子宫肌瘤大小无改变，子宫大小无变化。

[0077] 4、结果：

[0078] 选用本发明药物的治疗组中，治愈 65 例，显效 32 例，无效 3 例，治愈率 65%，总有效率 97%。

[0079] 对照组中治愈 43 例，显效 24 例，无效 33 例，治愈率 43%，总有效率 67%。

[0080] 以上结果显示，治疗组的治愈率和总有效率明显高于对照组。

[0081] 典型病例举例：

[0082] 1、薛某，女，35 岁，浙江湖州人。患者一年前在三等甲级医院确诊肌壁间肌瘤，瘤体 6×5.3×4.8cm。服用过多种冲剂，效果不好，后来我院就诊，服用本发明药物，服用 1 个疗程后，B 超检查，肌瘤明显缩小，服用第 2 个疗程后，B 超检查，肌瘤消失。

[0083] 2、李某，女，64 岁，山西吕梁人。患者例行体检，B 超检查发现粘膜下肌瘤 2 个，大的 1.2×0.8×0.6cm，小的 1.1×0.7×0.8cm。于是服用本发明药物，服用 1 个疗程后，B 超检查，肌瘤有所消失，服用 2 个疗程后，B 超检查，粘膜下肌瘤消失，一年后随访未复发。

[0084] 3、曹某，女，40 岁，山东潍坊人。患者因小腹部不适，去医院就诊，经 B 超检查发现子宫肌瘤 1 个，大的 1.3×0.9×0.7cm，服用本发明药物，服用 1 个疗程后，进行 B 超检查，肌瘤基本消失，服用第 2 个疗程后，进行 B 超检查，粘膜下肌瘤消失，随访至今未复发。