(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)发明专利

(10)授权公告号 CN 103386066 B
(45)授权公告日 2015.03.25

(21)申请号 201310309627.0

(22)申请日 2013.07.23

(73)专利权人 肖振锋
地址 236400 安徽省阜阳市临泉县瓦店镇肖坡行政村中肖坡34号

(72)发明人 肖振锋

(74)专利代理机构 安徽省阜阳市科颍专利事务所 34108
代理人 徐宝泉

(51)Int.Cl.
A61K 36/9062(2006.01)
A61P 43/00(2006.01)
A61P 1/00(2006.01)
A61P 1/14(2006.01)
A61P 29/00(2006.01)

(56)对比文件
张宝华.《散寒止痛小茴香》.《家庭医学》.2013,

审查员 周静

权利要求书1页 说明书3页

(54)发明名称

一种治疗疝气的药物及其制备方法

(57)摘要

本发明公开了一种治疗疝气的药物及其制备方法，它主要是由青皮、陈皮、昆布、小茴香、水菖蒲、延胡索、川楝子按一定重量配比制备而成，本发明药物具有清热解毒，理气健脾，散寒止痛，活血化瘀的功能，用于治疗疝气见效快，疗效好，治愈率高。

CN 103386066 B

1.一种治疗疝气的药物，其特征在于：它是由下列重量范围内的原料药制成：

青　皮 8-12 克 陈　皮 8-12 克 昆　布 10-20 克

小茴香 10-20 克　水菖蒲 8-12 克 延胡索 8-12 克

川楝子 10-20 克　橘　核 10-20 克　木　香 8-12 克

香　附 8-12 克 肉　桂 8-12 克 高良姜 8-12 克。

2.根据权利要求 1 所述的药物，其中各原料药的用量为：

青　皮 10 克　陈　皮 10 克　昆　布 15 克

小茴香 15 克　水菖蒲 10 克　延胡索 10 克

川楝子 15 克　橘　核 15 克　木　香 10 克

香　附 10 克　肉　桂 10 克　高良姜 10 克。

3.根据权利要求 1 或 2 所述药物的制备方法，它包括下列步骤：

(一) 备料

(1) 青皮：拣净杂质，用水浸泡，捞出，润透，切片，晒干；

(2) 陈皮：取原药材，除去杂质及变黑的果皮，抢水洗净，润软，切丝，晒干或低温干燥，筛去灰屑；

(3) 昆布：拣去杂质，用水漂净，切成宽丝，晾干；

(4) 小茴香：取原药材，除去杂质；

(5) 水菖蒲：取原药材，除去芦衣、杂质，洗净，润透，切厚片，低温干燥；

(6) 延胡索：拣去杂质，用水浸泡，洗净，晒晾，润至内外湿度均匀，切片或打碎；

(7) 川楝子：拣去杂质，洗净，烘干，轧碎或劈成两半；

(8) 橘核：筛去灰屑，拣净杂质，洗净，晒干；

(9) 木香：将原生药放清水内洗净，捞出，闷润 12—24 小时使软，切片，晒干；

(10) 香附：拣去杂质，碾成碎粒，簸去细毛及细末；

(11) 肉桂：拣净杂质，刮去粗皮，用时打碎，或刮去粗皮，用温开水浸润片刻，切片，晾干；

(12) 高良姜：拣净杂质，水洗，稍浸，捞出，润透，切片，晾干；

(二) 制备

(1) 将所述重量的青皮、陈皮、昆布、小茴香、水菖蒲、延胡索、川楝子、橘核、木香、香附、肉桂、高良姜原料药加 6 倍量水进行浸泡，浸泡 60 分钟后，武火煎煮沸腾 20 分钟，再用文火煎煮 30 分钟，过滤得第一次煎煮液；

(2)将过滤的药渣加水 4 倍量，武火煎煮沸腾 10 分钟，再用文火煎煮 15 分钟，过滤得第二次煎煮液；

(3) 将两次煎煮液混合搅拌均匀，再用文火煎煮 10 分钟，将煎煮液分为 3 剂服用。

一种治疗疝气的药物及其制备方法

技术领域

[0001] 本发明涉及一种治疗疝气的药物及其制备方法，属中药领域。

背景技术

[0002] 疝气，即人体组织或器官一部分离开了原来的部位，通过人体间隙、缺损或薄弱部位进入另一部位。疝气的形成和患者的体质有着很大的关系，多是由于咳嗽、喷嚏、用力过度、腹部过肥、用力排便、妇女妊娠、小儿过度啼哭、老年腹壁强度退行性变等原因，引起腹腔内产生负压，导致腹腔内气压增大，迫使腹腔内的游离脏器如：睾丸、小肠、盲肠、大网膜、膀胱、卵巢、输卵管等脏器见孔就钻，由原来的部位通过人体正常的或不正常的薄弱点或缺损、孔隙进入另一部位。目前，西药无法有效治疝气，且有较多副作用，因此，人们对有效治疗疝气的中药存在很大的需求。

发明内容

[0003] 本发明人依据中医理论的研究及临床反复的试验和验证，终于找到了有效治疗疝气的药物，从而完成了本发明。

[0004] 本发明的目的就是提供一种能够有效治疗疝气的组合药物。

[0005] 本发明的另一个目的就是提供了该组合药物的制备方法。

[0006] 本发明药物是选用青皮、陈皮、昆布、小茴香、水菖蒲、延胡索、川楝子、橘核、木香、香附、肉桂、高良姜药物进行组合的，将这些药物组合使得各药物功效产生协同作用，从而能够有效治疗疝气的复发。其中选用青皮是因为其性味苦辛，微温，入肝、胆经，有疏肝破气，散结消痰的功能，治胸胁胃脘疼痛，疝气，食积，乳肿，乳核，久疟癖块。选用陈皮是因为其性味苦、辛，温，归肺、脾经，有理气健脾，燥湿化痰的功能，治胸脘胀满，食少吐泻，咳嗽痰多。选用昆布是因为其性味咸，寒，入胃经，有软坚，行水的功能，治瘰疬，瘿瘤，噎膈，水肿，睾丸肿痛，带下。选用小茴香是因为其性味辛，温，归肝、肾、脾、胃经，有散寒止痛，理气和胃的功能，治寒疝腹痛，睾丸偏坠，痛经，少腹冷痛，脘腹胀满，食少吐泻，睾丸鞘膜积液。选用水菖蒲是因为其性味苦、辛，微温，入心、肺、胃经，有开窍化痰，辟秽杀虫的功能，治痰涎壅闭，神志不清，慢性气管炎，腹胀腹痛，食欲不振，肠炎，痢疾，风湿痹痛，外伤疥疮。选用延胡索是因为其性味辛苦，温，入肝、胃经，有活血，散瘀，理气，止痛的功能，治心腹腰膝诸痛，月经不调，癥瘕，崩中，产后血晕，恶露不尽，跌打损伤。选用川楝子是因为其性味苦，寒，有毒，入肝、胃、小肠经，有降湿热，清肝火，止痛，杀虫的功能，治热厥心痛，胁痛，疝痛，虫积腹痛。选用橘核是因为其性味苦，平，无毒，入肝、肾经，有理气，止痛的功能，治疝气，睾丸肿痛，乳痈，腰痛，膀胱气痛。选用木香是因为其性味辛苦，温，入肺、肝、脾经，有行气止痛，温中和胃的功能，治中寒气滞，胸腹胀痛，呕吐，泄泻，下痢里急后重，寒疝。选用香附是因为其性味辛微苦干，平，入肝、三焦经，有理气解郁，止痛调经的功能，治肝胃不和，气郁不舒，胸腹胁肋胀痛，痰饮痞满，月经不调，崩漏带下。选用肉桂是因为其性味辛甘，热，入肾、脾、膀胱经，有补元阳，暖脾胃，除积冷，通血脉的功能，治命门火衰，肢冷脉微，亡阳虚脱，腹痛泄泻，寒疝

奔豚，腰膝冷痛，经闭癥瘕，阴疽，流注，及虚阳浮越，上热下寒。选用高良姜是因为其性味辛温，入脾，胃经，有温胃，祛风，散寒，行气，止痛的功能，治脾胃中寒，脘腹冷痛，呕吐泄泻，噎膈反胃，食滞，瘴疟，冷癖。

[0007] 本发明药物组分的用量也是发明人经过大量摸索总结得出的，各组分的用量在下述重量范围内都具有较好疗效

[0008] 青 皮 8-12 克 陈 皮 8-12 克 昆 布 10-20 克

[0009] 小茴香 10-20 克 水菖蒲 8-12 克 延胡索 8-12 克

[0010] 川楝子 10-20 克 橘 核 10-20 克 木 香 8-12 克

[0011] 香 附 8-12 克 肉 桂 8-12 克 高良姜 8-12 克

[0012] 优选用量为

[0013] 青 皮 10 克 陈 皮 10 克 昆 布 15 克

[0014] 小茴香 15 克 水菖蒲 10 克 延胡索 10 克

[0015] 川楝子 15 克 橘 核 15 克 木 香 10 克

[0016] 香 附 10 克 肉 桂 10 克 高良姜 10 克

[0017] 本发明药物的制备方法如下

[0018] 一、备料

[0019] 1、青皮：拣净杂质，用水浸泡，捞出，润透，切片，晒干；

[0020] 2、陈皮：取原药材，除去杂质及变黑的果皮，抢水洗净，润软，切丝，晒干或低温干燥，筛去灰屑；

[0021] 3、昆布：拣去杂质，用水漂净，切成宽丝，晾干；

[0022] 4、小茴香：取原药材，除去杂质；

[0023] 5、水菖蒲：取原药材，除去芦衣、杂质，洗净，润透，切厚片，低温干燥；

[0024] 6、延胡索：拣去杂质，用水浸泡，洗净，晒晾，润至内外湿度均匀，切片或打碎；

[0025] 7、川楝子：拣去杂质，洗净，烘干，轧碎或劈成两半；

[0026] 8、橘核：筛去灰屑，拣净杂质，洗净，晒干；

[0027] 9、木香：将原生药放清水内洗净，捞出，闷润 12—24 小时使软，切片，晒干；

[0028] 10、香附：拣去杂质，碾成碎粒，簸去细毛及细末；

[0029] 11、肉桂：拣净杂质，刮去粗皮，用时打碎，或刮去粗皮，用温开水浸润片刻，切片，晾干；

[0030] 12、高良姜：拣净杂质，水洗，稍浸，捞出，润透，切片，晾干。

[0031] 二、制备

[0032] 1、将所述重量的青皮、陈皮、昆布、小茴香、水菖蒲、延胡索、川楝子、橘核、木香、香附、肉桂、高良姜原料药加 6 倍量水进行浸泡，浸泡 60 分钟后，武火煎煮沸腾 20 分钟，再用文火煎煮 30 分钟，过滤得第一次煎煮液。

[0033] 2、将过滤的药渣加水 4 倍量，武火煎煮沸腾 10 分钟，再用文火煎煮 15 分钟，过滤得第二次煎煮液。

[0034] 3、将两次煎煮液混合搅拌均匀，再用文火煎煮 10 分钟，将煎煮液分为 3 剂服用。

[0035] 本发明药物具有清热解毒，理气健脾，散寒，行气，止痛的功效，用于治疗疝气，疗程短、见效快、治愈后不复发、无毒副作用。

具体实施方式

[0036] 以下通过试验例来进一步阐述本发明所述药物的有益效果，这些试验例包括了本发明药物的动物毒性试验报告和临床观察资料。

[0037] [试验例 1] 本发明药物的动物毒性试验报告

[0038] 取家兔 20 只，雌雄兼用，体重 2.0—2.5kg，分两组，每组 10 只，其中一组为超剂量试验组，另一组为正常量试验组。超常量组为 20ml/kg，正常量为 10ml/kg，给药方式为灌胃法给药，每天 2 次，连服 7 天，每天观察给药反应，结果表明二组家兔活动、饮食正常，药物无不良毒副作用。

[0039] [试验例 2] 本发明药物治疗疝气的临床观察资料

[0040] 1、一般资料

[0041] 收治门诊患者共 160 例。

[0042] 2、诊断标准

[0043] 主要表现在腹股沟区，可以看到或摸到疝块。站立、用力、咳嗽时出现，平卧时可消失。肿块突出时，用于向上轻轻推挤有轻微阻力感随即很快消失。有时同时听到咕噜声。此外，肿块突出时病人有下坠感，伴有胀痛或牵扯性腹痛。同时会出现腹痛腹胀、便秘、抵抗力减弱、营养不良、消化不良等症状。

[0044] 3、治疗方法

[0045] 选用上述药剂，给患者服用，每次服用 1 剂，每天早、中、晚各服 1 次，5 天为一个疗程，连续服用 5 个疗程。

[0046] 4、疗效评定标准

[0047] 显效：疝气症状消失，体质恢复正常，观察半年无复发者；

[0048] 好转：疝气症状明显好转，体质逐步恢复；

[0049] 无效：达不到好转标准者。

[0050] 5、治疗结果（见下表）

[0051]

类型	病例总数	治疗时间	显效		好转		无效		总有效率%
			例数	显效率%	例数	好转率%	例数	无效率%	
疝气	160	25 天	155	96.875	3	1.875	2	1.25	98.75

[0052] 在上述的治疗中，用本发明药物治疗疝气患者 160 例，结果显效 155 例，显效率为 96.875%，好转 3 例，好转率为 1.875%，无效 2 例，总有效率为 98.75%。