



(12) 发明专利申请

(10) 申请公布号 CN 105288440 A

(43) 申请公布日 2016. 02. 03

(21) 申请号 201510904113. 9

A61K 35/64(2015. 01)

(22) 申请日 2015. 12. 09

A61K 33/06(2006. 01)

(71) 申请人 济南昊泽环保科技有限公司

地址 250103 山东省济南市高新区新宇路西
侧世纪财富中心 AB 座 1048-C

(72) 发明人 冉德焕

(74) 专利代理机构 济南舜源专利事务所有限公
司 37205

代理人 徐槐

(51) Int. Cl.

A61K 36/9064(2006. 01)

A61P 1/12(2006. 01)

A61P 29/00(2006. 01)

A61P 1/00(2006. 01)

权利要求书1页 说明书5页

(54) 发明名称

一种治疗伴有腹痛的饮食停滞型泄泻的中药

(57) 摘要

本发明涉及中药领域,更具体的讲是一种治疗伴有腹痛的饮食停滞型泄泻的中药,其由下述组分制成:神曲8-18g、陈皮8-18g、麦芽8-18g、菟丝子8-18g、白术5-12g、阿魏5-12g、枳实5-12g、地榆5-12g、莱菔子5-12g、佛手5-12g、砂仁3-10g、茯苓3-10g、青皮3-10g、芋莖3-10g、寒水石3-10g、大黄3-10g、补骨脂1-5g、诃子1-5g、益智仁1-5g、桑螵蛸1-5g、制南星1-5g、丁香1-5g、八月札1-5g,发明针对伴有腹痛的饮食停滞型泄泻的临床实验治愈率高于93.88%,最高可达98.98%,平均治愈率为96.53%,总有效率100%,非常适合治疗伴有腹痛的饮食停滞型泄泻,并且,本药见效快,当天有效者可达71.74%,5天即可全部有效,治愈周期短,本中药组合物纯中药制成,具有无毒副作用,无药物依赖的担忧。

1. 一种治疗伴有腹痛的饮食停滞型泄泻的中药,其特征在于:其由下述组分制成:神曲 8-18g、陈皮 8-18g、麦芽 8-18g、菟丝子 8-18g、白术 5-12g、阿魏 5-12g、枳实 5-12g、地榆 5-12g、莱菔子 5-12g、佛手 5-12g、砂仁 3-10g、茯苓 3-10g、青皮 3-10g、芋莢 3-10g、寒水石 3-10g、大黄 3-10g、补骨脂 1-5g、诃子 1-5g、益智仁 1-5g、桑螵蛸 1-5g、制南星 1-5g、丁香 1-5g、八月札 1-5g。

2. 根据权利要求 1 所述的一种治疗伴有腹痛的饮食停滞型泄泻的中药,其特征在于:其由下述组分制成:神曲 10-15g、陈皮 10-15g、麦芽 10-15g、菟丝子 10-15g、白术 6-10g、阿魏 6-10g、枳实 6-10g、地榆 6-10g、莱菔子 6-10g、佛手 6-10g、砂仁 5-8g、茯苓 5-8g、青皮 5-8g、芋莢 5-8g、寒水石 5-8g、大黄 5-8g、补骨脂 1.5-3.5g、诃子 1.5-3.5g、益智仁 1.5-3.5g、桑螵蛸 1.5-3.5g、制南星 1.5-3.5g、丁香 1.5-3.5g、八月札 1.5-3.5g。

3. 根据权利要求 1 所述的一种治疗伴有腹痛的饮食停滞型泄泻的中药,其特征在于:其由下述组分制成:神曲 8g、陈皮 8g、麦芽 8g、菟丝子 8g、白术 5g、阿魏 5g、枳实 5g、地榆 5g、莱菔子 5g、佛手 5g、砂仁 3g、茯苓 3g、青皮 3g、芋莢 3g、寒水石 3g、大黄 3g、补骨脂 1g、诃子 1g、益智仁 1g、桑螵蛸 1g、制南星 1g、丁香 1g、八月札 1g。

4. 根据权利要求 1 所述的一种治疗伴有腹痛的饮食停滞型泄泻的中药,其特征在于:其由下述组分制成:神曲 18g、陈皮 18g、麦芽 18g、菟丝子 18g、白术 12g、阿魏 12g、枳实 12g、地榆 12g、莱菔子 12g、佛手 12g、砂仁 10g、茯苓 10g、青皮 10g、芋莢 10g、寒水石 10g、大黄 10g、补骨脂 5g、诃子 5g、益智仁 5g、桑螵蛸 5g、制南星 5g、丁香 5g、八月札 5g。

5. 根据权利要求 2 所述的一种治疗伴有腹痛的饮食停滞型泄泻的中药,其特征在于:其由下述组分制成:神曲 10g、陈皮 10g、麦芽 10g、菟丝子 10g、白术 6g、阿魏 6g、枳实 6g、地榆 6g、莱菔子 6g、佛手 6g、砂仁 5g、茯苓 5g、青皮 5g、芋莢 5g、寒水石 5g、大黄 5g、补骨脂 1.5g、诃子 1.5g、益智仁 1.5g、桑螵蛸 1.5g、制南星 1.5g、丁香 1.5g、八月札 1.5g。

6. 根据权利要求 2 所述的一种治疗伴有腹痛的饮食停滞型泄泻的中药,其特征在于:其由下述组分制成:神曲 12g、陈皮 12g、麦芽 12g、菟丝子 12g、白术 8g、阿魏 8g、枳实 8g、地榆 8g、莱菔子 8g、佛手 8g、砂仁 6g、茯苓 6g、青皮 6g、芋莢 6g、寒水石 6g、大黄 6g、补骨脂 3g、诃子 3g、益智仁 3g、桑螵蛸 3g、制南星 3g、丁香 3g、八月札 3g。

7. 根据权利要求 2 所述的一种治疗伴有腹痛的饮食停滞型泄泻的中药,其特征在于:其由下述组分制成:神曲 15g、陈皮 15g、麦芽 15g、菟丝子 15g、白术 10g、阿魏 10g、枳实 10g、地榆 10g、莱菔子 10g、佛手 10g、砂仁 8g、茯苓 8g、青皮 8g、芋莢 8g、寒水石 8g、大黄 8g、补骨脂 3.5g、诃子 3.5g、益智仁 3.5g、桑螵蛸 3.5g、制南星 3.5g、丁香 3.5g、八月札 3.5g。

8. 一种治疗伴有腹痛的饮食停滞型泄泻的中药的制备方法,包括如下步骤:将神曲 8-18g、陈皮 8-18g、麦芽 8-18g、菟丝子 8-18g、白术 5-12g、阿魏 5-12g、枳实 5-12g、地榆 5-12g、莱菔子 5-12g、佛手 5-12g、砂仁 3-10g、茯苓 3-10g、青皮 3-10g、芋莢 3-10g、寒水石 3-10g、大黄 3-10g、补骨脂 1-5g、诃子 1-5g、益智仁 1-5g、桑螵蛸 1-5g、制南星 1-5g、丁香 1-5g、八月札 1-5g 放入砂锅中加水浸没中药材,浸泡 1-2 小时后煎煮 3 次,头煎 30-40 分钟,倒出煎液后加水浸没,二煎 20-30 分钟,倒出煎液后加水浸没,三煎 10-20 分钟后,将 3 次煎液合并过滤即得。

一种治疗伴有腹痛的饮食停滞型泄泻的中药

技术领域

[0001] 本发明涉及中药领域,更具体的讲是一种治疗伴有腹痛的饮食停滞型泄泻的中药。

背景技术

[0002] 泄泻系因感受外邪,或饮食内伤,致脾失健运,传导失司,以大便次数增多,质稀溏或如水样为主要表现的病症。食滞胃肠型泄泻是由于宿食内停,阻滞肠胃,传化失司,以腹满胀痛、矢气频频、泻下之物秽臭如败卵为主症的泄泻。其证候主要表现为:排便次数增多,粪便稀溏,甚至泄如水样为主证的病证。泄泻的病位主要在脾胃和大小肠,其中主脏在脾,其致病原因包括感受外邪,饮食所伤,情志失调,脾胃虚弱,脾肾阳虚等。其主要致病因素为湿,即《难经》所谓“湿多成五泄”。

[0003] 中医将就辨证施治,其主要分为:

1. 寒湿停滞

证候:泻下清稀,严重时如水样,腹痛伴有肠鸣,痞满,脘腹胀闷,食少,或者兼有外感症状既恶寒发热,鼻塞头痛,肢体酸痛等症。舌薄白或白腻,脉濡缓。

[0004] 2. 湿热壅滞

证候:腹痛即泻,泻下急迫,势如水注,或泻下不爽,粪色黄褐而臭,烦热口渴,小便短赤,肛门灼热,舌质红,苔黄腻,脉濡数或滑数。

[0005] 3. 暑湿壅滞

证候:发于盛夏之时,腹痛泄泻,泻下如水,暴急量多,粪色黄褐,伴见发热心烦,胸闷脘痞,泛恶纳呆,自汗面垢,口渴尿赤。

[0006] 4. 饮食停滞

证候:腹痛肠鸣,泻后痛减,泻下粪便臭如败卵,夹有不消化之物,伴见脘腹痞满,嗝腐酸臭,不思饮食。

[0007] 5. 肝气乘脾

证候:肠鸣攻痛,腹痛即泻,泻后痛缓,每因抑郁恼怒或情绪紧张而诱发,平素多有胸胁胀闷,暖气食少,矢气频作。

[0008] 6. 脾胃虚弱

证候:大便时溏时泻,反复发作,稍有饮食不慎,大便次数即多,夹见不化水谷,伴见饮食减少,脘腹胀闷不舒,面色少华,肢倦乏力。

[0009] 7. 肾阳虚衰

证候:每于黎明之前,脐腹作痛,继则肠鸣而泻,完谷不化,泻后则安,伴见形寒肢冷,腹部喜暖,腰膝酸软。

[0010] 8. 中气下陷

证候:多由久泻或大病或久病导致的久泻不止,甚者脱肛,伴见小腹坠胀,纳呆,少气懒言,体倦肢软,渴喜温饮,消瘦等。

[0011] 9. 上热下寒

证候：肠鸣下利，干呕呕吐，伴见心下痞满，口渴喜饮，偶有口苦，心中烦闷，小腹喜温等。

[0012] 西医治疗泄泻强调明确病因，诊断程序较为复杂，治疗多对症处理，疗效并不令人满意，而讲究辨证施治的中医也没有针对饮食停滞型泄泻的中药，并且饮食停滞型泄泻常常伴有腹痛，目前更没有针对伴有腹痛的饮食停滞型泄泻的中药。

发明内容

[0013] 本发明的发明目的在于针对现有技术中的不足之处，提供一种针对伴有腹痛的饮食停滞型泄泻的中药。

[0014] 本发明是通过以下技术方案实现的：

一种治疗伴有腹痛的饮食停滞型泄泻的中药，其由下述组分制成：神曲 8-18g、陈皮 8-18g、麦芽 8-18g、菟丝子 8-18g、白术 5-12g、阿魏 5-12g、枳实 5-12g、地榆 5-12g、莱菔子 5-12g、佛手 5-12g、砂仁 3-10g、茯苓 3-10g、青皮 3-10g、芋莢 3-10g、寒水石 3-10g、大黄 3-10g、补骨脂 1-5g、诃子 1-5g、益智仁 1-5g、桑螵蛸 1-5g、制南星 1-5g、丁香 1-5g、八月札 1-5g。

[0015] 优化的，上述的一种治疗伴有腹痛的饮食停滞型泄泻的中药，其特征在于：其由下述组分制成：神曲 10-15g、陈皮 10-15g、麦芽 10-15g、菟丝子 10-15g、白术 6-10g、阿魏 6-10g、枳实 6-10g、地榆 6-10g、莱菔子 6-10g、佛手 6-10g、砂仁 5-8g、茯苓 5-8g、青皮 5-8g、芋莢 5-8g、寒水石 5-8g、大黄 5-8g、补骨脂 1.5-3.5g、诃子 1.5-3.5g、益智仁 1.5-3.5g、桑螵蛸 1.5-3.5g、制南星 1.5-3.5g、丁香 1.5-3.5g、八月札 1.5-3.5g。

[0016] 优化的，上述的一种治疗伴有腹痛的饮食停滞型泄泻的中药，其特征在于：其由下述组分制成：神曲 8g、陈皮 8g、麦芽 8g、菟丝子 8g、白术 5g、阿魏 5g、枳实 5g、地榆 5g、莱菔子 5g、佛手 5g、砂仁 3g、茯苓 3g、青皮 3g、芋莢 3g、寒水石 3g、大黄 3g、补骨脂 1g、诃子 1g、益智仁 1g、桑螵蛸 1g、制南星 1g、丁香 1g、八月札 1g。

[0017] 优化的，上述的一种治疗伴有腹痛的饮食停滞型泄泻的中药，其特征在于：其由下述组分制成：神曲 18g、陈皮 18g、麦芽 18g、菟丝子 18g、白术 12g、阿魏 12g、枳实 12g、地榆 12g、莱菔子 12g、佛手 12g、砂仁 10g、茯苓 10g、青皮 10g、芋莢 10g、寒水石 10g、大黄 10g、补骨脂 5g、诃子 5g、益智仁 5g、桑螵蛸 5g、制南星 5g、丁香 5g、八月札 5g。

[0018] 优化的，上述的一种治疗伴有腹痛的饮食停滞型泄泻的中药，其特征在于：其由下述组分制成：神曲 10g、陈皮 10g、麦芽 10g、菟丝子 10g、白术 6g、阿魏 6g、枳实 6g、地榆 6g、莱菔子 6g、佛手 6g、砂仁 5g、茯苓 5g、青皮 5g、芋莢 5g、寒水石 5g、大黄 5g、补骨脂 1.5g、诃子 1.5g、益智仁 1.5g、桑螵蛸 1.5g、制南星 1.5g、丁香 1.5g、八月札 1.5g。

[0019] 优化的，上述的一种治疗伴有腹痛的饮食停滞型泄泻的中药，其特征在于：其由下述组分制成：神曲 12g、陈皮 12g、麦芽 12g、菟丝子 12g、白术 8g、阿魏 8g、枳实 8g、地榆 8g、莱菔子 8g、佛手 8g、砂仁 6g、茯苓 6g、青皮 6g、芋莢 6g、寒水石 6g、大黄 6g、补骨脂 3g、诃子 3g、益智仁 3g、桑螵蛸 3g、制南星 3g、丁香 3g、八月札 3g。

[0020] 优化的，上述的一种治疗伴有腹痛的饮食停滞型泄泻的中药，其特征在于：其由下述组分制成：神曲 15g、陈皮 15g、麦芽 15g、菟丝子 15g、白术 10g、阿魏 10g、枳实 10g、地榆

10g、莱菔子 10g、佛手 10g、砂仁 8g、茯苓 8g、青皮 8g、芋莢 8g、寒水石 8g、大黄 8g、补骨脂 3.5g、诃子 3.5g、益智仁 3.5g、桑螵蛸 3.5g、制南星 3.5g、丁香 3.5g、八月札 3.5g。

[0021] 上述一种治疗伴有腹痛的饮食停滞型泄泻的中药的制备方法,包括如下步骤:将神曲 8-18g、陈皮 8-18g、麦芽 8-18g、菟丝子 8-18g、白术 5-12g、阿魏 5-12g、枳实 5-12g、地榆 5-12g、莱菔子 5-12g、佛手 5-12g、砂仁 3-10g、茯苓 3-10g、青皮 3-10g、芋莢 3-10g、寒水石 3-10g、大黄 3-10g、补骨脂 1-5g、诃子 1-5g、益智仁 1-5g、桑螵蛸 1-5g、制南星 1-5g、丁香 1-5g、八月札 1-5g 放入砂锅中加水浸没中药材,浸泡 1-2 小时后煎煮 3 次,头煎 30-40 分钟,倒出煎液后加水浸没,二煎 20-30 分钟,倒出煎液后加水浸没,三煎 10-20 分钟后,将 3 次煎液合并过滤即得。

[0022] 本发明的有益效果是:发明针对伴有腹痛的饮食停滞型泄泻的临床实验治愈率高于 93.88%,最高可达 98.98%,平均治愈率为 96.53%,总有效率 100%,非常适合治疗伴有腹痛的饮食停滞型泄泻,并且,本药见效快,当天有效者可达 71.74%,5 天即可全部有效,治愈周期短,本中药组合物纯中药制成,具有无毒副作用,无药物依赖的担忧。

具体实施方式

[0023] 下面结合具体实施例对本发明做进一步说明,以便本领域技术人员可以更好的了解本发明,但并不因此限制本发明。

[0024] 实施例 1

一种治疗伴有腹痛的饮食停滞型泄泻的中药,其由下述组分制成:神曲 8g、陈皮 8g、麦芽 8g、菟丝子 8g、白术 5g、阿魏 5g、枳实 5g、地榆 5g、莱菔子 5g、佛手 5g、砂仁 3g、茯苓 3g、青皮 3g、芋莢 3g、寒水石 3g、大黄 3g、补骨脂 1g、诃子 1g、益智仁 1g、桑螵蛸 1g、制南星 1g、丁香 1g、八月札 1g。

[0025] 实施例 2

一种治疗伴有腹痛的饮食停滞型泄泻的中药,其由下述组分制成:神曲 18g、陈皮 18g、麦芽 18g、菟丝子 18g、白术 12g、阿魏 12g、枳实 12g、地榆 12g、莱菔子 12g、佛手 12g、砂仁 10g、茯苓 10g、青皮 10g、芋莢 10g、寒水石 10g、大黄 10g、补骨脂 5g、诃子 5g、益智仁 5g、桑螵蛸 5g、制南星 5g、丁香 5g、八月札 5g。

[0026] 实施例 3

一种治疗伴有腹痛的饮食停滞型泄泻的中药,其由下述组分制成:其由下述组分制成:神曲 10g、陈皮 10g、麦芽 10g、菟丝子 10g、白术 6g、阿魏 6g、枳实 6g、地榆 6g、莱菔子 6g、佛手 6g、砂仁 5g、茯苓 5g、青皮 5g、芋莢 5g、寒水石 5g、大黄 5g、补骨脂 1.5g、诃子 1.5g、益智仁 1.5g、桑螵蛸 1.5g、制南星 1.5g、丁香 1.5g、八月札 1.5g。

[0027] 实施例 4

一种治疗伴有腹痛的饮食停滞型泄泻的中药,其由下述组分制成:其由下述组分制成:神曲 12g、陈皮 12g、麦芽 12g、菟丝子 12g、白术 8g、阿魏 8g、枳实 8g、地榆 8g、莱菔子 8g、佛手 8g、砂仁 6g、茯苓 6g、青皮 6g、芋莢 6g、寒水石 6g、大黄 6g、补骨脂 3g、诃子 3g、益智仁 3g、桑螵蛸 3g、制南星 3g、丁香 3g、八月札 3g。

[0028] 实施例 5

一种治疗伴有腹痛的饮食停滞型泄泻的中药,其由下述组分制成:神曲 15g、陈皮 15g、

麦芽 15g、菟丝子 15g、白术 10g、阿魏 10g、枳实 10g、地榆 10g、莱菔子 10g、佛手 10g、砂仁 8g、茯苓 8g、青皮 8g、芋莢 8g、寒水石 8g、大黄 8g、补骨脂 3.5g、诃子 3.5g、益智仁 3.5g、桑螵蛸 3.5g、制南星 3.5g、丁香 3.5g、八月札 3.5g。

[0029] 临床试验

临床病例 490 例,其中男性 270 例,女性 220 例,年龄 16-78 岁,病程 1-6 月,平均 3.3 月。

[0030] 将 490 病例分为 5 组,每组在性别、年龄、病程、症状及体征均基本一致,具有可比性($p > 0.05$)。

[0031] 适应症:诊断依据国家中医药管理局颁发的《中医病证诊断疗效标准》:

- ①大便稀薄或如水样,次数增多,可伴腹胀腹痛等症;
- ②起病突然,病程短,可伴有恶寒、发热等症;
- ③饮食不当,受寒凉或情绪变化可诱发;
- ④大便常规可见少许红、白细胞,大便培养致病菌阳性或阴性。

[0032] 并有如下症状:腹痛严重,泻后痛减,泻下粪便臭如败卵,夹有不消化之物,伴见脘腹痞满,暖腐酸臭,不思饮食。

[0033] 用法用量:每日一副药,分两次,早晚各一副,一次 100ml,连续观察 4 周。

[0034] 治疗结果:

参照《中医药新药临床研究指导原则》指定:

治愈:大便正常,其他症状消失,临床检验正常;

好转:大便次数明显减少,其他症状改善;

未愈:症状未见改善。

[0035] 治疗结果见表 1、表 2。

表 1 总治疗效果

人数	有效	有效率%	显效	显效率%	治愈	治愈率%
1 天	352	71.84	209	42.65	53	10.82
3 天	476	97.14	338	68.98	177	36.12
5 天	490	100	426	86.94	308	62.86
7 天	-		455	95.10	391	79.80
14 天	-		485	98.98	443	90.41
21 天	-		-		466	95.10
28 天	-		-		473	96.53

表 2 各组实施例治疗效果

序号	人数	痊愈	显效	有效	无效	治愈率	总有效率
实施例 1	98	93	3	2	0	94.90%	100%
实施例 2	98	92	5	1	0	93.88%	100%
实施例 3	98	96	1	1	0	97.96%	100%
实施例 4	98	97	1	0	0	98.98%	100%
实施例 5	98	95	2	1	0	96.94%	100%

[0036] 由上表可以看出本发明针对伴有腹痛的饮食停滞型泄泻的临床实验治愈率高于 93.88%，最高可达 98.98%，平均治愈率为 96.53%，总有效率 100%，非常适合治疗伴有腹痛的饮食停滞型泄泻，并且，本药见效快，当天有效者可达 71.74%，5 天即可全部有效，治愈周期短，本中药组合物纯中药制成，具有无毒副作用，无药物依赖的担忧。