

⑫

DEMANDE DE BREVET D'INVENTION

A1

⑫② Date de dépôt : 15.10.92.

⑫③ Priorité : 03.08.92 FR 9209603.

⑫④ Date de la mise à disposition du public de la
demande : 25.02.94 Bulletin 94/08.

⑫⑤ Liste des documents cités dans le rapport de
recherche préliminaire : *Se reporter à la fin du
présent fascicule.*

⑫⑥ Références à d'autres documents nationaux
apparentés :

⑦① Demandeur(s) : *Société Anonyme dite : L'OREAL —
FR.*

⑦② Inventeur(s) : Ribier Alain, Simmonet Jean-Thierry et
Handjani Rose-Marie.

⑦③ Titulaire(s) :

⑦④ Mandataire : Cabinet Peuscet.

⑤④ Composition formée d'une dispersion aqueuse de vésicules de lipides amphiphiles non-ioniques stabilisées.

⑤⑦ Les vésicules sont préparées à partir d'une phase lipidique contenant un mélange de lipides amphiphiles non-ioniques constitué par un mélange d'esters d'au moins un polyol choisi dans le groupe formé par le polyéthylèneglycol comportant de 1 à 60 unités oxyde d'éthylène, le sorbitane, le sorbitane portant 2 à 60 unités d'oxyde d'éthylène, le glycérol portant 2 à 30 unités d'oxyde d'éthylène, les polyglycérols comportant 2 à 15 unités de glycérol, les sucro-ses, les glucoses portant 2 à 30 unités oxyde d'éthylène, et d'au moins un acide gras comportant une chaîne alkyle en C₆-C₁₇, saturée ou non saturée, linéaire ou ramifiée le nombre de chaînes alkyle par groupe polyol étant compris entre 1 et 10, stabilisé par de(s) lipide(s) amphiphile(s) ionique(s) choisi(s) dans le groupe formé par ceux conférant à la dispersion un pH compris entre 5,5 et 7,5.



COMPOSITION FORMEE D'UNE DISPERSION AQUEUSE DE VESICULES DE LIPIDES AMPHIPHILES NON-IONIQUES STABILISEES

La présente invention concerne une composition formée
5 d'une dispersion aqueuse de vésicules de certains lipides amphiphiles non-ioniques, qui sont stabilisées et ne se dégradent pas au cours du stockage. Cette composition est particulièrement intéressante en cosmétique et en dermopharmacie.

On sait que certains lipides amphiphiles possèdent la
10 propriété de former des phases mésomorphes, dont l'état d'organisation est intermédiaire entre l'état cristallin et l'état liquide et que, parmi eux, certains sont susceptibles de gonfler en présence d'une solution aqueuse pour former une phase lamellaire puis, après agitation, former des vésicules ou sphérules dispersées dans une phase aqueuse. Ces
15 vésicules sont formées par une membrane constituée par des feuilletts sensiblement concentriques comportant une ou plusieurs couches multimoléculaires, de préférence bimoléculaires, encapsulant une phase aqueuse.

Les vésicules susmentionnées peuvent être préparées par
20 de nombreux procédés. Selon un premier procédé, qui est par exemple décrit par BANGHAM et al. (J. Mol. Bio., 13, 1965 - pages 238 à 262), on dissout la phase lipidique dans un solvant volatil, on forme un film mince de phase lipidique sur les parois d'un flacon par évaporation du solvant, on introduit la phase à encapsuler sur le film lipidique et on
25 agite le mélange mécaniquement jusqu'à obtention de la dispersion de vésicules à la taille désirée ; on obtient ainsi une dispersion aqueuse de vésicules encapsulant une phase aqueuse, la phase aqueuse encapsulée et la phase aqueuse de dispersion étant identiques. Selon un second procédé dit "par cofusion des lipides", décrit par exemple dans FR-A-
30 2 315 991, on prépare la phase lipidique par mélange du (des) lipide(s) amphiphile(s) et des éventuels additifs, à une température où le mélange est fondu, si le mélange n'est pas liquide à température ambiante ; on forme une phase lamellaire, par introduction de la phase aqueuse à encapsuler ; puis on disperse la phase lamellaire sous forme
35 de vésicules, à l'aide d'un ultra-disperseur, d'un homogénéiseur ou d'ultrasons, dans une phase aqueuse de dispersion. Dans une variante

de ce procédé, la formation de la phase lamellaire ne constitue pas un stade séparé du procédé. Les vésicules obtenues par ces deux procédés sont généralement de type "multifeuillet". Pour obtenir des vésicules de type "monofeuillet", on peut utiliser l'enseignement de FR-A-
5 2 543 018.

Quel que soit le procédé utilisé, les vésicules sont obtenues sous forme de dispersion dans une phase aqueuse.

De façon connue, les vésicules de lipides amphiphiles peuvent contenir des actifs cosmétiques ou pharmaceutiques soit dans la phase aqueuse encapsulée si lesdits actifs sont hydrosolubles, soit dans
10 la membrane lipidique s'ils sont oléosolubles. Des actifs peuvent également être présents dans la phase aqueuse de dispersion.

Les lipides amphiphiles utilisés pour l'obtention des vésicules sont des lipides ayant pour formule générale :

15
$$X - Y$$

formule dans laquelle X représente un groupe hydrophile et Y représente un groupe lipophile. Les lipides amphiphiles peuvent être des lipides ioniques, pour lesquels le groupe X est ionique, ou des lipides non-ioniques pour lesquelles le groupe X est non-ionique.

20 De façon connue, on peut utiliser pour la fabrication des vésicules des mélanges de lipides amphiphiles ioniques, des mélanges de lipides amphiphiles non-ioniques et des mélanges de ces deux types de lipides.

On a proposé, par exemple dans FR-A 2 315 991, de
25 préparer des vésicules à partir de lipides amphiphiles non-ioniques constituées par des esters de polyols, oxyéthylénés ou non. Les vésicules préparées avec lesdits esters sont intéressantes en cosmétique et dermatopharmacie car elles sont biodégradables dans et sur la peau. Mais elles présentent un inconvénient majeur : en présence d'eau, on
30 constate une hydrolyse des groupements esters dans la membrane lipidique, ce phénomène d'hydrolyse étant particulièrement important dès que l'on s'écarte d'un pH proche de la neutralité. Pour remédier à cet inconvénient, on a proposé d'introduire dans la phase aqueuse de dispersion des vésicules une solution tampon saline maintenant le pH à
35 une valeur comprise entre 6 et 7, de préférence voisine de 6,5. Mais l'introduction de tampons salins dans les compositions utilisées en

cosmétique ou en dermopharmacie présente de nombreux inconvénients. Les tampons salins sont incompatibles avec de nombreux additifs ou actifs couramment utilisés en cosmétique, notamment, ils abaissent la viscosité des compositions contenant un
5 gélifiant anionique tel que les mélanges carboxyvinyles commercialisés sous la dénomination "CARBOPOL" par la société "GOODRICH" ; ils provoquent aussi la précipitation des protéines. La présence d'un tampon salin réduit la charge électrique (potentiel zéta) des vésicules, ce qui entraîne leur floculation. De plus, la présence
10 dudit tampon salin provoque une forte corrosion des métaux, en particulier des aciers, constituant les surfaces des homogénéiseurs utilisés pour la fabrication des vésicules. Enfin, les compositions cosmétiques contenant un tampon salin confèrent, après application sur la peau, un toucher plus rêche.

15 Selon la présente invention, on a trouvé un moyen permettant d'obtenir avec certains esters de polyol, des dispersions dans lesquelles les vésicules sont stables dans l'eau ; ces dispersions peuvent être, par conséquent, conservées et utilisées pour la préparation de compositions cosmétiques ou dermopharmaceutiques,
20 sans qu'il soit nécessaire d'introduire un tampon salin.

Selon la présente demande, on a trouvé qu'en associant dans la phase lipidique constituant la membrane des vésicules certains esters de polyol avec au moins un lipide ionique pris dans un certain groupe, on obtenait des vésicules stables à l'hydrolyse.

25 La présente invention a, par conséquent, pour objet une composition formée d'une dispersion aqueuse de vésicules constituées par une membrane de phase lipidique encapsulant une phase aqueuse, la phase lipidique comprenant des lipides amphiphiles non ioniques et au moins un lipide amphiphile ionique, caractérisée par le fait que :

30 - les lipides amphiphiles non-ioniques sont constitués par un mélange d'esters d'au moins un polyol choisi dans le groupe formé par le polyéthylèneglycol comportant de 1 à 60 unités oxyde d'éthylène, le sorbitane, le sorbitane portant 2 à 60 unités d'oxyde d'éthylène, le glycérol portant 2 à 30 unités d'oxyde d'éthylène, les polyglycérols
35 comportant 2 à 15 unités glycérol, les sucroses, les glucoses portant 2 à 30 unités oxyde d'éthylène, et d'au moins un acide gras comportant une

chaîne alkyle en C₅-C₁₇, saturée ou non saturée, linéaire ou ramifiée, le nombre de chaînes alkyle par groupe polyol étant compris entre 1 et 10 ; et que

- le(s) lipide(s) amphiphile(s) ionique(s) est(sont) choisi(s) dans le
5 groupe formé par ceux conférant à la dispersion un pH compris entre 5,5 et 7,5 ;

- le rapport en poids entre la quantité de lipides amphiphiles non-ioniques et celle de lipide(s) amphiphile(s) ionique(s) dans la phase lipidique étant compris entre 50/1 et 50/25 et le rapport en poids entre
10 la phase lipidique et la phase aqueuse de dispersion étant compris entre 1/1 000 et 300/1 000.

On a constaté que, dans la composition selon l'invention, les vésicules obtenues étaient stables dans l'eau, en l'absence de solutions salines tamponnées, après conservation pendant 2 mois à des
15 températures comprises entre la température ambiante et 45°C ; elles ont, par conséquent, une stabilité suffisante pour pouvoir être utilisées dans des compositions cosmétiques et dermatopharmaceutiques.


La composition selon l'invention permet donc de bénéficier de l'avantage des esters de polyol(s), qui est d'être dégradable sous
20 l'action du pH de la peau ou par les enzymes de la peau. Leur dégradation donne naissance à des produits qui, dans la plupart des cas, ont une action cosmétique ou dermatopharmaceutique sur la peau. En effet, les acides gras libres, tels que l'acide palmitique ou l'acide stéarique, ont une activité bactériostatique et les polyols tels que le
25 glycérol, les polyglycérols, le sorbitol ou le sucrose sont des humectants et peuvent éventuellement fournir un apport d'énergie.

Les vésicules obtenues présentent un bon taux d'encapsulation de substances hydrosolubles et une faible perméabilité. Elles permettent donc l'encapsulation d'actifs hydrosolubles. De plus,
30 la dégradation progressive des vésicules sur la peau permet une libération contrôlée des actifs hydrosolubles éventuellement contenus dans la phase aqueuse encapsulée ou des actifs liposolubles éventuellement contenus dans la phase lipidique.

Les dispersions de vésicules de la composition selon
35 l'invention peuvent être préparées par tout procédé connu de fabrication de vésicules de lipides amphiphiles, plus particulièrement

par le procédé dit "par cofusion des lipides", ce qui permet de les préparer de façon simple à l'échelle industrielle.

Dans la présente demande et les revendications, l'expression "mélange d'esters" couvre non seulement des mélanges d'esters purs de familles chimiques différentes mais couvre également tout produit, qui contient plusieurs esters de polyol chimiquement purs de la même famille dans des proportions variables. C'est, en particulier, le cas des produits ayant une formule statistique, dans leur partie hydrophile, par exemple un ester de polyglycérol de formule



où $\bar{n}$ est une valeur statistique et qui peut contenir des proportions diverses d'esters pour lesquels $n = 1$, $n = 2$, $n = 3$, $n = 4$, etc ... ; c'est aussi le cas des esters comportant plusieurs chaînes alkyle dans leur partie lipophile, tels que les cocoates, qui contiennent des chaînes alkyle en C₅ à C₁₇ ou les isostéarates, où les chaînes alkyle en C₁₇ sont un mélange complexe de formes isomères ; c'est également le cas des produits constitués par des mélanges de mono-, di-, tri-ou polyesters d'un même polyol. Il faut noter qu'un produit, qui ne contiendrait qu'un seul ester susceptible de former des vésicules et des impuretés d'un autre type ne pourrait pas être utilisé selon l'invention.

Des esters commerciaux utilisables seuls selon l'invention, car ils sont en réalité des mélanges d'esters, sont par exemple les suivants :

- les esters partiels de sorbitane (ou anhydride de sorbitol) et d'acide gras, vendus sous les dénominations commerciales "SPAN 20, 40, 60 et 80" par la société "ICI" ;
- l'isostéarate de sorbitane, vendu sous la dénomination commerciale "SI 10 R NIKKOL" par la société "NIKKO" ;
- le stéarate de sorbitane portant 4 unités oxyde d'éthylène, vendu sous la dénomination "TWEEN 61" par la société "ICI" ;
- le stéarate de polyéthylène glycol à 8 unités oxyde d'éthylène, vendu sous la dénomination "MYR J 45" par la société "ICI" ;
- le monostéarate du polyéthylène glycol de formule



formule dans laquelle n est égal à 4, vendu sous la dénomination "MYS 4" par la société "NIKKO" ;

- le stéarate de polyéthylène glycol de poids moléculaire 400, qualité chimique ou qualité produite par biotechnologie, vendu par la société "UNICHEMA" ;
- le stéarate de diglycéryle portant 4 unités d'oxyde d'éthylène, vendu sous la dénomination "HOSTACERINE DGS" par la société "HOECHST" ;
- le stéarate de tétraglycérol, vendu sous la dénomination "TETRAGLYN 1S" par la société "NIKKO" ;
- l'isostéarate de diglycéryle, vendu par la société "SOLVAY" ;
- le distéarate de diglycéryle, vendu sous la dénomination "EMALEX DSG 2" par la société "NIHON" ;
- les mono-, di- et tripalmitostéarate de sucrose, vendus sous les dénominations " F50, F70, F110 ET F160 CRODESTA" par la société "CRODA" ;
- le mélange de mono- et dipalmitostéarate de sucrose, vendu sous la dénomination "GRILLOTEN PSE 141 G" par la société "GRILLO" ;
- le mélange de stéarate de sucrose et de cocoate de sucrose, vendu sous la dénomination "ARLATONE 2121" par la société "ICI" ;
- le distéarate de méthylglucose portant 20 unités oxyde d'éthylène, vendu sous la dénomination "GLUCAM E 20 DISTEARATE" par la société "AMERCHOL".

Des mélanges entre eux de ces différents produits, qui sont déjà des mélanges, ou des mélanges de ces produits avec des produits purs peuvent, bien entendu, être utilisés.

Le(s) lipide(s) amphiphile(s) ionique(s) associé(s) aux lipides amphiphiles non-ioniques selon l'invention, est(sont), de préférence, pris dans le groupe formé par :


1) les lipides anioniques neutralisés , ces lipides anioniques étant, de préférence, choisis parmi :

- les sels alcalins du dicétylphosphate, et du dimyristylphosphate en particulier les sels de Na et K ;
- les sels alcalins du cholestérol-sulfate, en particulier le sel de Na ;

- les sels alcalins du cholestérol-phosphate, en particulier le sel de Na ; - les acylglutamates mono- et disodique ;
- le sel de sodium de l'acide phosphatidique ;

2) les lipides amphotères, ces lipides amphotères étant, de préférence, des phospholipides, en particulier la phosphatidyléthanolamine de soja pure ;

3) les dérivés alkylsulfoniques, ces dérivés étant, de préférence, les composés de formule :



10

formule dans laquelle R représente les radicaux $\text{C}_{16}\text{H}_{33}$ et $\text{C}_{18}\text{H}_{37}$ pris en mélange ou séparément et M est un métal alcalin, de préférence le sodium.

On peut, de façon connue, incorporer dans la phase lipidique constituant la membrane lipidique des vésicules, au moins un additif qui a pour fonction principale de diminuer la perméabilité des vésicules, de prévenir leur floculation et leur fusion et d'augmenter le taux d'encapsulation.

Selon l'invention, on peut ajouter à la phase lipidique au moins un additif choisi, de préférence, dans le groupe formé par :

- les stérols et notamment les phytostérols et le cholestérol,
- les alcools et diols à longue chaîne,
- les amines à longue chaîne et leurs dérivés ammonium quaternaire,

Ces additifs peuvent éventuellement avoir une activité cosmétique et/ou dermatopharmaceutique. C'est, par exemple, le cas du cholestérol.


Les vésicules des compositions selon l'invention peuvent contenir, de façon connue, un ou plusieurs composé(s) actif(s) ayant une activité cosmétique et/ou dermatopharmaceutique, qui, selon leurs caractéristiques de solubilité, peuvent avoir différentes localisations. Si les actifs sont hydrosolubles, on les introduit dans la phase aqueuse encapsulée des vésicules. Si les actifs sont liposolubles, on les introduit dans la phase lipidique constituant la membrane. Si les actifs sont

amphiphiles, ils se répartissent entre la phase lipidique et la phase aqueuse encapsulée avec un coefficient de partage, qui varie selon la nature de l'actif amphiphile et les compositions respectives de la phase lipidique et de la phase aqueuse encapsulée.

5 Les actifs hydrosolubles sont, par exemple, la glycérine, le sorbitol, l'érythrose et les antibiotiques. Les actifs liposolubles ou partiellement liposolubles (amphiphiles) sont choisis parmi ceux qui n'augmentent pas de façon significative la perméabilité des vésicules, ne provoquent pas leur floculation et leur fusion et ne diminuent pas le
10 taux d'encapsulation. On utilise avantageusement des actifs liposolubles qui constituent également des additifs.

Les actifs liposolubles préférés selon l'invention sont choisis dans le groupe formé par :

- les sphingomyélines,
- 15 - les glycosphingolipides, en particulier ceux issus de germe de blé et
- les céramides naturels ou de synthèse, de préférence ceux décrits dans la demande de brevet français N°9102091 déposée le 21 Février 1991, ayant pour formule :



20

formule dans laquelle :

R₁ représente un radical alkyle ou alcényle en C₁₁-C₂₁,

R₂ représente :

- un radical hydrocarboné en C₁₁-C₂₃ saturé,
- 25 - un mélange de radicaux hydrocarbonés en C₁₁-C₁₉, linéaires, saturés et portant au moins une insaturation éthylénique, de préférence 1 ou 2, dans lequel la proportion de radicaux saturés ne peut excéder 35%, le céramide de formule (I) étant sous forme d'un mélange racémique de diastéréoisomères érythro et thréo dans des proportions érythro/thréo
30 comprises entre 85/15 et 60/40.

Selon l'invention on introduit, de préférence, dans la phase lipidique constituant la membrane un mélange de céramide(s) et de cholestérol. En effet, l'utilisation de ce mélange est particulièrement

intéressante, car elle permet de reconstituer les lipides de la peau, lors de la dégradation des vésicules de la dispersion selon l'invention, sur la peau.

5 Les actifs introduits, qu'ils soient hydrophiles, lipophiles ou amphiphiles, peuvent avoir des activités cosmétiques et/ou dermopharmaceutiques (ou "fonctions") très variables qui sont données dans le tableau I ci-après :

TABLEAU I

FONCTION	ACTIFS UTILISABLES
Anti-oxydant ou anti-radicaux libres.	Les extraits des plantes suivantes : - Aubépine. - Ginkgo biloba. - Thé vert. - Vigne. - Romarin Les enzymes : - Commercialisées sous la dénomination SB 12 par SEDERMA et constituées par un mélange de lactoferrine et de lactoperoxydase, de glucose oxydase et de thiocyanate de potassium. - Superoxyde dismutase. - Glutathion peroxydase. La superphycodismutase extraite d'algues. Les coenzymes Q, en particulier la coenzyme Q10. Les séquestrants, en particulier des dérivés d'acides polyphosphoniques. Les tanins. Le sélénium et ses dérivés, en particulier la sélénométhionine. Les peptides, par exemple un mélange d'extraits de rate et de thymus, Thiolim et sérum albumine bovine non stabilisée. Les protéines, par exemple l'hémocyanine qui est une protéine cuivrée extraite de l'escargot marin et l'apohémocyanine qui est une protéine analogue sans cuivre. Les flavonoïdes, notamment la catéchine, les proanthocyanidines, les flavanols, les flavones, les isoflavones, les flavanénols, les flavanones, les flavanes et les chalcones. Les caroténoïdes, notamment le β-carotène et le rocou. L'acide sorbohydroxyamique. Les tocophérols, notamment l'alpha-tocophérol et l'acétate d'alpha-tocophérol. Le palmitate d'ascorbyle. Le gallate de propyle. L'acide caféique et ses dérivés. L'acide ascorbique. L'acide homogentisique. L'acide érythorbique. L'acide nordihydroguaiacétique. Le laurylméthionate de lysine. Le butylhydroxyanisole. Le butylhydroxytoluène. Les substances "SOD like".

TABLEAU I (suite 1)

FONCTION	ACTIFS UTILISABLES
Hydratant ou humectant	Une reconstitution de sueur ("Normal moisturizing factors"-NMF). Le pyroglutamate de sodium. L'acide hyaluronique. Les dérivés de chitosane (carboxyméthylchitine). Le β-glycérophosphate. Le lactamide. L'acétamide. Le lactate d'éthyle, de sodium et de triéthanolamine. Le pyrrolidone carboxylate de métaux en particulier de Mg, Zn, Fe, Ca ou Na. La thiamorpholinone. L'acide orotique. Les acides carboxyliques alpha-hydroxylés en C₃ à C₂₀, notamment l'acide alpha-hydroxy propionique. Les polyols, notamment l'inositol, le glycérol, la diglycérine, le sorbitol. Les polyolosides, notamment alginate et guar. Les protéines, notamment le collagène soluble et la gélatine. Les lipoprotides choisis parmi les dérivés mono ou polyacylés d'acides aminés ou de polypeptides dans lesquels le reste acide RCO comporte une chaîne hydrocarbonée en C₁₃-C₁₉, notamment l'acide palmitoylcaséinique, l'acide palmitoyl collagénique, le dérivé dipalmitoyl-O-N de l'hydroxyproline, le stéaroyl glutamate de sodium, le stéaroyl tripeptide de collagène, l'oléyltétra et pentapeptide de collagène, le linoléate d'hydroxyproline. L'urée et ses dérivés, notamment la méthylurée. L'extrait de tissu cutané, notamment celui commercialisé sous la dénomination "OSMODYN" par les Laboratoires Serobiologiques de Nancy (LSN) et contenant des peptides, des acides aminés, des saccharides et 17% de mannitol. Plus particulièrement une association de glycérol, d'urée et d'acide palmitoylcaséinique.
Mélanorégulateur : 1) accélérateur de bronzage	Les huiles de bergamote et de citrus. L'alpha-MSH et ses homologues synthétiques. La caféine. Les dérivés de tyrosine, notamment le tyrosinate de glucose et la N-malyltyrosine.

TABLEAU I (suite 2)

FONCTION	ACTIFS UTILISABLES
2) Dépigmentant	L'acide ascorbique ou vitamine C et ses dérivés, notamment l'ascorbyle phosphate de Mg. Les hydroxyacides, notamment l'acide glycolique. L'acide kojique. L'arbutine et ses dérivés. L'hémocyanine (protéine cuivrée de l'escargot marin) et l'apohémocyanine (protéine analogue à la précédente sans cuivre). L'hydroquinone et ses dérivés, notamment le monoalkyl éther et le benzyléther.
Coloration de la peau (brunissage artificiel)	L'ortho diacétylbenzène. Les indoles. La dihydroxyacétone. L'érythrulose. Le glycéraldéhyde. Les gamma-dialdéhydes, notamment l'aldéhyde tartrique.
Liporégulateurs (amincissant et anti-acné, anti-séborrhée)	Les complexes de vitamines et d'oligo-éléments, notamment le complexe vitamine B₆/zinc. L'orizanol. L'acide azélaïque. Les xanthines et alkylxanthines, notamment l'extrait de cola, la caféine et la théophylline. L'adénosine monophosphate cyclique et non cyclique. L'adénosine triphosphate. L'extrait de lierre. L'extrait de marron d'Inde. Les extraits d'algues, notamment l'extrait d'algues rouges (fucus serratus) et le cytofiltrat. L'extrait de ginseng. L'extrait de Centella Asiatica (asiaticoside) contenant de la génine et de l'acide asiatique. La thioxolone (HBT). La S-carboxyméthylcystéine. La S-benzylcystéamine.

TABLEAU I (suite 3)

FONCTION	ACTIFS UTILISABLES
Antivieillessement et anti-rides	Les insaponifiables par exemple de soja et d'avocats. Les acides gras insaturés, notamment l'acide linoléique et l'acide linoléique. Les hydroxyacides, notamment l'acide glycolique. Les facteurs de croissance. Les complexes oligoéléments - vitamines, notamment B₆-Zn. L'acide n-octanoyle-5 salicylique. L'adénosine. Le rétinol et ses dérivés, notamment l'acétate de rétinol et le palmitate de rétinol. Les rétinoïdes, notamment les acides rétinoïques cis ou trans et ceux décrits dans les brevets FR-A-2 570 377 ; EP-A-199636 ; et EP-A- 325540 et la demande de brevet européen 90-402072. L'association de rétinoïdes et de xanthines. L'hydroxyproline. Les acides sialiques. L'extrait de rate, de thymus, Thiolim et sérum albumine bovine non stabilisé vendu sous la dénomination commerciale "SILAB" par la Société "SILAB". Un extrait animal placentaire, notamment l'extrait embryonnaire placentaire de bovidés dans l'eau à 5,5 % stabilisé par 0,2 % d'exyl K100a (matrix). Les protéoglycannes, en particulier le protéoglycane de cartilage de trachée de bovidés à 5 % stabilisé (protéodermin). Le colostrum. Les facteurs d'oxygénation cellulaire, notamment l'octacosamol.
Anti-UV	Les filtres UV, notamment le paraméthoxycinnamate d'éthyl-2 hexyle ; la benzophénone, le benzylidène-camphre et leurs dérivés, en particulier, la tétrahydroxy-2,2', 4,4'-benzophénone et l'acide hydroxy-2 méthoxy-4 benzophénone-5 sulfonique ; l'acide paraaminobenzoïque, le salicylate de dipropylèneglycol, l'octyl salicylate, les dérivés de dibenzoylméthane vendus sous les marques EUSOLEX 8020 ou PARSOL 1789 et les produits vendus sous les marques EUSOLEX 232, UNIVUL T 150, UNIVUL N 539, ESCALOL 507.

TABLEAU I (suite 4)

FONCTION	ACTIFS UTILISABLES
Kératolytique	L'acide salicylique et ses dérivés, tels que les acides alkylsalicyliques, notamment l'acide n-octanoyl-5 salicylique et le n-dodécanoyl-5, salicylate de N-hexadécyl pyridinium. L'acide rétinolique. Les enzymes protéolytiques, notamment la trypsine, l'alpha-chymotrypsine, la papaïne, la bromelaine et la pepsine. Le peroxyde de benzoyle. L'urée. Les alpha-hydroxyacides.
Emollient	Esters tels que l'adipate d'isopropyle.
Anti-inflammatoire	Les corticoïdes tels que le 17-acétate de β-méthasone, l'indométhacine, le ketoprofène, l'acide flufenamique, l'ibuprofène, le dichlofenac, le diflunisal, le fenclofenac, le naproxène, le piroxidam, et le sulindac. Le monostéaryl éther de glycérol (alcool batylique) et le mono-cétyléther de glycérol (alcool chimylique). L'acide glycyrrhétinique et ses sels, notamment d'ammonium. L'alpha-bisabolol (extrait de camomille). La shikonine. Des extraits de plantes, tels qu'eau de bleuet, arnica, aloès. Des extraits de tissu méristématique, notamment l'extrait de racine de chêne. Le plancton.
Rafraichissant	Le menthol. Le lactate de menthyle.
Cicatrisant	L'arbre de peau, extrait de mimosa tenui flora. L'extrait de Centella Asiatica. L'acide β-glycyrrhétinique. L'hydroxyproline. L'arginine. Un extrait placentaire. Un extrait de levure. Le fagaramide. La N-acétyl hydroxyproline. L'acide acexamique et ses dérivés.

TABLEAU I (suite 5)

FONCTION	ACTIFS UTILISABLES
Protecteur vasculaire	Les flavonoïdes, notamment les dérivés de rutine, tels que l'étoxazorutine et le rutine propylsulfonate de sodium. Les extraits végétaux, notamment l'extrait huileux de Ginkgo biloba, l'extrait de marron d'Inde (escine), de lierre (saponines) et de petit houx. Le nicotinate d'alpha-tocophérol.
Anti-bactérien, antifongique	Le bromure de triméthylcétylammonium. L'acide sorbique. Le peroxyde de benzoyle. Le chlorure de cétylpyridinium. Le chlorure de benzalkonium. L'acide parahydroxybenzoïque et ses sels. Le bromo-2 nitro-2 propanediol-1,3. Le trichloro-3,4,4'-carbanilide. Le trichloro-2,4,4'-hydroxy-2 diphenyléther. L'acide déhydroacétique. Un extrait de pamplemousse dans la glycérine et le propylène glycol. La chlorhexidine. L'hexetidine. L'hexamidine.
Agent insectifuge	Le diméthyltoluamide.
Antiperspirant	Le chlorhydrate d'aluminium. Le chlorure d'aluminium. Le complexe lactate de sodium/aluminium chlorhydroxy. Le chlorhydrate de zirconyle.

TABLEAU I (suite 6)

FONCTION	ACTIFS UTILISABLES
Déodorant	L'oxyde de zinc. Le ricinoléate de zinc. L'éthyl-2 hexanediol-1,3. L'hexachlorophène. Le produit vendu sous la marque "IRGASAN DP 300".
Anti-pelliculaire	L'octopyrox. Les omadines. Le goudron de houille. L'hydroxy-1 méthyl-4 triméthyle-2,4,4 pentyl-6 pyridinone-2. Le sulfure de sélénium.
Anti-chute des cheveux	Les inhibiteurs de glucuronidases. Les muccopolysaccharides. Le nicotinate de méthyle ou d'hexyle. La forskoline. Le minoxidil. Les xanthines. Les rétinoïdes.
Colorant capillaire	Les bases et coupleurs d'oxydation. Les colorants directs. Les colorants auto-oxydables.
Agent décolorant pour cheveux	Le peroxyde d'hydrogène.
Réducteur pour permanentes	L'acide thioglycolique. La cystéine. La cystéamine. La N-acétyl cystéine. La N-acétyl cystéamine. Le thioglycolate de glycérol.
Agent conditionneur pour peau et cheveux	Polymères cationiques, cations.

Les différents actifs introduits peuvent être tous liposolubles, hydrosolubles ou amphiphiles ou appartenir à au moins deux de ces catégories. Les actifs introduits peuvent avoir la même fonction ou des fonctions différentes. Il faut noter que certains actifs
5 ont plusieurs fonctions.

La phase aqueuse de la dispersion de la composition selon l'invention peut également contenir une dispersion de gouttelettes d'un liquide non miscible à l'eau, comme décrit dans les brevets français 2 485 921 et 2 490 504. On a, en effet, constaté que les vésicules selon
10 l'invention stabilisent la dispersion de gouttelettes de liquide non miscible à l'eau sans qu'il soit nécessaire d'introduire un émulsionnant conventionnel.

Le liquide non miscible à l'eau, qui peut être présent sous forme de dispersion dans la phase aqueuse de dispersion, peut
15 notamment être choisi dans le groupe formé par :

- les huiles animales ou végétales formées par des esters d'acide gras et de polyols, en particulier les triglycérides liquides, par exemple les huiles de tournesol, de maïs, de soja, de courge, de pépins de raisin, de jojoba, de sésame, de noisette, les huiles de poisson, le tri-
20 caprocaprylate de glycérol, ou les huiles végétales ou animales de formule R_9COOR_{10} , formule dans laquelle R_9 représente le reste d'un acide gras supérieur comportant de 7 à 19 atomes de carbone et R_{10} représente une chaîne hydrocarbonée ramifiée contenant de 3 à 20 atomes de carbone, par exemple l'huile de Purcellin ;

25 - des huiles essentielles naturelles ou synthétiques telles que, par exemple, les huiles d'eucalyptus, de lavandin, de lavande, de vétiver, de litsea cubeba, de citron, de santal, de romarin, de camomille, de sarriette, de noix de muscade, de cannelle, d'hysope, de carvi, d'orange, de géraniol, de cade et de bergamote;

30 - des hydrocarbures, tels que l'hexadécane et l'huile de paraffine ;

- des carbures halogénés, notamment des fluorocarbures tels que des fluoroamines par exemple la perfluorotributylamine, des hydrocarbures fluorés, par exemple le perfluorodécahydronaphtalène,
35 des fluoroesters et des fluoroéthers ;

- des silicones, par exemple les polysiloxanes, les polydiméthylsiloxanes et les fluorosilicones ;
- des esters d'acide minéral et d'un alcool ; et
- des éthers et des polyéthers.

5 La phase aqueuse de dispersion peut aussi également contenir des actifs cosmétiques et/ou dermopharmaceutiques, hydrosolubles. Le liquide non-miscible à l'eau peut éventuellement contenir un actif liposoluble.

10 La phase aqueuse de dispersion peut aussi contenir des adjuvants n'ayant ni activité cosmétique ni activité dermopharmaceutique propre, mais utilisés pour la formulation de la dispersion sous forme de lotion, crème ou sérum. Ces adjuvants sont, en particulier, pris dans le groupe formé par les gélifiants, les conservateurs, les colorants, les opacifiants et les parfums. Parmi les
15 gélifiants utilisables, on peut citer les dérivés de cellulose tels que l'hydroxyéthylcellulose, les dérivés d'algues tels que le satium, des gommes naturelles, telles que l'adragante, et des polymères synthétiques, en particulier les mélanges d'acides polycarboxyvinyles commercialisés sous la dénomination
20 "CARBOPOL" par la société "GOODRICH" et le mélange de copolymères acrylate de Na/acrylamide commercialisé sous la dénomination "HOSTACERIN PN 73" par la société "HOECHST".

 Dans la composition selon l'invention, les vésicules ont généralement un diamètre moyen compris entre 10 et 5 000 nm.
25 Lorsque la phase aqueuse contient une dispersion de gouttelettes de liquide non miscible à l'eau, ces gouttelettes ont de façon avantageuse un diamètre moyen compris entre 100 et 10 000 nm.

 Les exemples ci-après, donnés à titre purement illustratif et non limitatif permettront de mieux comprendre l'invention.

30 Dans tous les exemples donnés ci-après les dispersions de vésicules sont préparées par le procédé dit "par cofusion des lipides" dans lequel :

- dans une première phase, on prépare la phase lipidique par mélange sous forme liquide des différents lipides amphiphiles la composant, et
35 éventuellement associés à des additifs ou des actifs liposolubles, et on met la phase lipidique obtenue en présence d'une phase aqueuse

contenant éventuellement des actifs hydrosolubles, de façon à obtenir une phase lamellaire,

- dans une deuxième phase, on ajoute à la phase lamellaire hydratée obtenue une phase aqueuse de dispersion contenant éventuellement un liquide non miscible à l'eau et différents additifs,
- et dans une troisième phase, on soumet le mélange à une agitation énergique dans un homogénéiseur pour obtenir des vésicules dispersées dans une phase aqueuse de dispersion.

EXEMPLE 1

On a préparé, à titre comparatif, des vésicules à partir de phase lipidique contenant, comme lipide non-ionique, l'un ou l'autre des deux produits A et B suivants :

A) Palmitate de sorbitane, commercialisé par la société "ICI" sous la dénomination "SPAN 40", qui est un mélange contenant en majeure partie du monopalmitate de sorbitane et de faibles quantités de di-, tri- et tétrapalmitate de sorbitane ;

B) Le composé chimiquement pur de formule :



Lorsqu'on utilise le produit A, la composition obtenue comme indiqué ci-après est dans le cadre de l'invention alors qu'elle ne l'est pas avec le produit B.

La composition a la formulation suivante :

- Lipide non-ionique A ou B 1,425 g
- Cholestérol 1,425 g
- Glutamate monosodique commercialisé sous la dénomination "ACYLGLUTAMATE HS 11" par la société "AJINOMOTO" 0,15 g
- Conservateur 0,02 g
- Eau qsp 100 g

On a obtenu après homogénéisation une dispersion contenant des vésicules de 250 nm.

On a soumis les deux dispersions obtenues à un test de stabilité en les soumettant à 5 cycles successifs de variation de température entre -20°C et +20°C, chaque cycle se déroulant de la façon suivante :

- 10 heures à - 20°C
- 2 heures de - 20° à + 20°C
- 10 heures à + 20°C.

Les changements de température s'effectuent avec un gradient de
5 0,33 °C/mn

A l'issue des cycles, on a observé, à l'oeil et au microscope optique, la dispersion de vésicules contenant le lipide non-ionique A selon l'invention et celle de vésicules contenant le lipide non-ionique B chimiquement pur (composition ne faisant pas partie de
10 l'invention). On a constaté que les vésicules contenant le lipide non-ionique A selon l'invention sont intactes, tandis que les vésicules contenant le lipide non-ionique B sont massivement recristallisées.

EXEMPLES 2 à 6

On a préparé, à titre comparatif, des compositions
15 contenant une dispersion de vésicules dont la phase lipidique contient un lipide ionique faisant partie de l'invention et, des compositions contenant une dispersion dont la phase lipidique contient un lipide ionique ne faisant pas partie de l'invention.

La formulation des phases lipidiques utilisées dans les
20 différents exemples est donnée dans le tableau II ci-après :

TABLEAU II

	Exemples				
	2	3	4	5	6
Stéarate de tétraglycérol commercialisé par la société "NIKKO"	47,5	-	47,5	-	-
Isostéarate de diglycéryle commercialisé par la société "SOLVAY"	-	90	-	90	-
Palmitate de sorbitane commercialisé sous la dénomination "SPAN 40" par la société "ICI"	-	-	-	-	45
Cholestérol	47,5	-	47,5	-	45
Dicétylphosphate acide	5	10			
Glutamate commercialisé sous la dénomination "ACYLGLUTAMATE HS 11" par la société "AJINOMOTO"			5	10	10
pH de la dispersion aqueuse(1) (1)Le pH a été mesuré sur des dispersions contenant 2% de lipide et 0,1% de conservateur.	3,3	3,2	6,3	6,3	6,1

On a mesuré à l'aide d'un granulomètre laser AMTECH BI 90 le diamètre des vésicules au temps T0, juste après leur formation, après 2 mois de stockage à température ambiante (TA), à 37°C et à 45°C ; les résultats sont donnés dans le tableau III ci-après :

5

TABLEAU III**DIAMETRE MOYEN DES VESICULES EN MICRON**

Associations lipidiques testées	au temps T0	après 2 mois		
		à TA	à 37°C	à 45°C
Exemple 2	0,24	S	C	C + +
Exemple 3	0,09	S	S	0.18 - I
Exemple 4	0,25	S	S	S
Exemple 5	0,19	S	S	S
Exemple 6	0,24	S	S	S
S : vésicules de diamètre stable I : vésicules de diamètre instable C : présence de cristaux C + + : présence massive de cristaux				

10 Ce tableau III montre que la présence d'un lipide anionique acide ne faisant pas partie de l'invention (exemples 2 et 3) ne permet pas de stabiliser les vésicules, tandis qu'un lipide anionique neutralisé selon l'invention (exemples 4 à 6) permet de stabiliser les vésicules.

EXEMPLE 7 : Biodégradabilité des vésicules selon l'invention sous l'effet des enzymes des couches superficielles de la peau humaine.

15 On a préparé une composition vésiculaire ayant la formulation suivante (en % en poids) :

- Palmitate de sorbitane vendu sous la
dénomination "SPAN 40" par la société "ICI" 1,425 %
- Cholestérol 1,425 %
- 20 - Glutamate monosodique commercialisé sous
la dénomination "ACYLGLUTAMATE HS 11"
par la société "AJINOMOTO" 0,15 %
- Glycérine 3,00 %

- Conservateur NaN_3 0,02 %

- Eau qsp 100 %

Le pH de la phase aqueuse de dispersion est de 6,0 et le diamètre des vésicules est de 260 nm.

5 On a préparé, par ailleurs, un jus enzymatique par traitement d'une surface de la peau du dos de 4 x 4 cm ayant subi 8 strips successifs. Le matériel enzymatique est extrait par l'acétone puis lyophilisé. La poudre obtenue est dissoute dans 0,5 ml de la dispersion de vésicules ci-dessus.

10 On dose l'acide palmitique libéré dans le mélange réactionnel après 0 à 7 jours d'incubation à 37°C. Le dosage de l'acide palmitique libéré est effectué par deux procédés :

1) par chromatographie en couche mince haute performance dans les conditions suivantes :

15 . Eluant : Hexane 80 - Ether de pétrole 20 - Acide acétique 3 (en volume)

. Révélateur : Sulfate de cuivre à 4 % (en poids) dans l'acide orthophosphorique à 15 % (en poids)

. Traitement : Carbonisation à 180°C pendant 5 minutes

20 . Lecture : Densitomètre SHIMADZU à 540 nm.

2) à l'aide du kit enzymatique BOHRINGER n°10 82 914 de dosage des acides gras libres étalonnés sur l'acide palmitique.

Les deux dosages donnent des résultats concordants.

25 Dans le tableau IV ci-après, la quantité d'acide palmitique libérée est donnée en % par rapport au total présent au départ sous forme de palmitate de sorbitane.

TABLEAU IV

Temps d'incubation	Acide palmitique
15 heures	3 %
3 jours	23 %
7 jours	40 %

30 Les vésicules selon l'invention permettent donc une libération retardée des actifs présents dans les vésicules, soit dans la phase aqueuse encapsulée, soit dans la membrane lipidique.

EXEMPLE 8: Crème de jour pour le visage destinée au soin des peaux sèches.

La crème est préparée par le procédé défini ci-dessus.

Dans une première phase, la formulation utilisée pour la composition vésiculaire est la suivante :

- Palmitate de sorbitane commercialisé sous la
- 5 dénomination de "SPAN 40" par la société "ICI" 3,8 g
- Cholestérol 3,8 g
- Sel monosodique de l'acide N-stéaroyl glutamique commercialisé sous la dénomination "ACYLGLUTAMATE HS 11"
- 10 par la société "AJINOMOTO" 0,4 g
- Eau déminéralisée qsp 50 g
- Conservateurs 0,3 g
- Glycérine 5,0 g

Dans une deuxième phase, la formulation de la dispersion d'huile est la suivante :

- 15 - Huile de macadamia 16,0 g
- Parfum 0,2 g
- Mélange d'acides polycarboxyvinyliques commercialisé sous la dénomination de
- 20 "CARBOPOL 940" par la société "GOODRICH" 0,42g
- Triéthanolamine qs pH 6
- Eau déminéralisée qsp 100 g

Dans une troisième phase, on mélange comme indiqué précédemment les deux formulations pour obtenir la composition selon l'invention.

25 Après une semaine d'application quotidienne, chaque matin, sur le visage soigneusement nettoyé, on constate une amélioration de l'aspect et de l'éclat de la peau du visage qui devient plus lisse, plus ferme, plus hydratée, avec un teint plus éclatant.

EXEMPLE 9: Crème de jour anti-âge pour le visage.

30 On prépare, comme dans l'exemple 8, une crème ayant la formulation suivante :

Première phase :

- Stéarate de sorbitane commercialisé sous la
- dénomination de "SPAN 60" par la société "ICI" 3,8 g
- 35 - Cholestérol 3,8 g
- Sel monosodique de l'acide N-stéaroyl glutamique

	commercialisé sous la dénomination	
	"ACYLGLUTAMATE HS 11" par la société	
	"AJINOMOTO"	0,4 g
	- Glycérine	3,0 g
5	- L-Hydroxyproline	1,0 g
	- D-Panthenol	1,5 g
	- Guanosine	0,01 g
	- Eau déminéralisée qsp	50 g
	- Conservateurs	0,3 g
10	- Polyphosphonate commercialisé sous la dénomination	
	de "DEQUEST 2046" par la société	
	"MONSANTO CHEMICAL"	0,8 g
	- Hydrolysate lactique commercialisé sous la dénomination	
	de "LACTOLAN LS" par les "Laboratoires Sérobiologiques	
15	de Nancy"	5,0 g
	- L-Sérine	0,2 g
	<i>Deuxième phase :</i>	
	- Paraoxybenzoate de propyle	0,3 g
	- Huile de macadamia	7,0 g
20	- Concentrats naturels de tocophérols	4,0 g
	- Filtres antisolaires	1,0 g
	- Huile de silicone volatile	7,5 g
	- Glycérides de vitamine F	3,0 g
	- Mélange d'acides polycarboxyvinyle commercialisé	
25	sous la dénomination de "CARBOPOL 940"	
	par la société "GOODRICH"	0,5 g
	- Paraoxybenzoate de méthyle	0,2 g
	- Triéthanolamine qs	pH 6,5
	- Eau déminéralisée qsp	100 g

30 Après une semaine d'application quotidienne, chaque matin, sur le visage soigneusement nettoyé, on constate une amélioration de l'aspect et de l'éclat de la peau du visage, qui devient plus lisse, plus ferme, plus hydratée, avec un teint plus éclatant.

EXEMPLE 10 : Sérum anti-âge pour le visage.

35 On prépare un sérum ayant la formulation suivante :

- Laurate de sorbitane commercialisé sous le

	nom de "SPAN 20" par la société "ICI"	1,5 g
	- Cholestérol	0,4 g
	- Sel monosodique de l'acide N-stéaroyl glutamique commercialisé sous le nom	
5	"ACYLGLUTAMATE HS 11" par la société "AJINOMOTO"	0,1 g
	- Glycérine	3,0 g
	- L-Hydroxyproline	1,0 g
	- D-Panthenol	1,5 g
10	- Guanosine	0,01 g
	- Conservateurs	0,3 g
	- Polyphosphonate commercialisé sous la dénomination de "DEQUEST 2046" par la société "MONSANTO CHEMICAL"	0,8 g
15	- Hydrolysate lactique commercialisé sous la dénomination de "LACTOLAN LS" par les "Laboratoires Sérobiologiques de Nancy"	5,0 g
	- L-Sérine	0,2 g
	- Solution aqueuse de superoxyde dismutase à	
20	5 000 unités par ml commercialisée par la société "PENTAPHARM"	1,0 g
	- Mélange d'acides polycarboxyvinylques commercialisé sous la dénomination "CARBOPOL 940" par la société "GOODRICH"	0,3 g
25	- L-Lysine monohydrate qs	pH 6,5
	- Eau déminéralisée qsp	100 g

Après application deux fois par jour, pendant trois semaines, on note un net raffermissement de la peau.

EXEMPLE 11 : Sérum anti-âge pour le visage.

30	On prépare un sérum ayant la formulation suivante :	
	- Oléate de sorbitane commercialisé sous la dénomination de "SPAN 80" par la société "ICI"	0,75 g
	- Cholestérol	0,20 g
	- Sel de sodium de l'acide phosphatidique	0,05 g
35	- Glycérine	3,0 g
	- L-Hydroxyproline	1,0 g

- D-Panthenol 1,5 g
- Guanosine 0,01 g
- Conservateurs 0,3 g
- Polyphosphonate commercialisé sous la dénomination
5 de "DEQUEST 2046" par la société
"MONSANTO CHEMICAL" 0,8 g
- Hydrolysate lactique commercialisé sous la dénomination
de "LACTOLAN LS" par les "Laboratoires
Sérobiologiques de Nancy" 5,0 g
- 10 - L-Sérine 0,2 g
- Solution aqueuse de superoxyde dismutase à
5 000 unités par ml commercialisée par la
société "PENTAPHARM" 1,0 g
- Mélange d'acides polycarboxyvinyles
15 commercialisé sous la dénomination de
"CARBOPOL 940" par la société "GOODRICH" 0,3 g
- L-Lysine monohydrate qs pH 6,5
- Eau déminéralisée qsp 100 g

20 On a observé que les vésicules contenues dans le sérum
sont restées stables après 3 mois de stockage. Après application 2 fois
par jour, pendant 3 semaines, on note un net raffermissment de la
peau.

EXEMPLE 12 : Crème de jour pour le visage.

On a préparé une crème ayant la formulation suivante :

25 ***Première phase :***

- Stéarate de sorbitane oxyéthyléné 4 moles
commercialisé sous la dénomination de
"TWEEN 61" par la société "ICI" 3,8 g
- Cholestérol 3,8 g
- 30 - Sel monosodique de l'acide N-stéaroyl glutamique
commercialisé sous la dénomination
"ACYLGLUTAMATE HS 11" par la société
"AJINOMOTO" 0,4 g
- Glycérine 5,0 g
- 35 - Conservateurs 0,3 g
- Eau déminéralisée qsp 50 g

Deuxième phase :

- Huile de macadamia 16,0 g
- Parfum 0,2 g
- Mélange d'acides polycarboxyvinylques commercialisé
- 5 sous la dénomination de "CARBOPOL 940"
- par la société "GOODRICH" 0,42 g
- Triéthanolamine qs pH 6
- Eau déminéralisée qsp 100 g

Après une semaine d'application quotidienne, chaque

10 matin, sur le visage soigneusement nettoyé, on constate une amélioration de l'aspect et de l'éclat de la peau du visage, qui devient plus lisse, plus ferme, plus hydratée, avec un teint plus éclatant.

EXEMPLE 13 : Crème de jour pour le visage.

On a préparé une crème ayant la formulation suivante :

15 *Première phase :*

- Stéarate de sorbitane oxyéthyléné 8 moles
- commercialisé sous la dénomination de
- "MYRJ 45" par la société "ICI" 4,4 g
- Cholestérol 3,2 g
- 20 - Sel disodique de l'acide N-stéaroyl glutamique
- commercialisé sous la dénomination
- "ACYLGLUTAMATE HS 21" par la société
- "AJINOMOTO" 0,4 g
- Glycérine 5,0 g
- 25 - Conservateurs 0,3 g
- Eau déminéralisée qsp 50 g

Deuxième phase :

- Huile de macadamia 16,0 g
- Parfum 0,2 g
- 30 - Mélange d'acides polycarboxyvinylques commercialisé
- sous la dénomination de "CARBOPOL 940"
- par la société "GOODRICH" 0,42 g
- Triéthanolamine qs pH 6
- Eau déminéralisée qsp 100 g

35 Après une semaine d'application quotidienne, chaque

matin, sur le visage soigneusement nettoyé, on constate une

amélioration de l'aspect et de l'éclat de la peau du visage, qui devient plus lisse, plus ferme, plus hydratée, avec un teint plus éclatant.

EXEMPLE 14 : Crème de jour pour le visage.

On prépare une crème ayant la formulation suivante :

5 *Première phase :*

- Stéarate de tétraglycérol
commercialisé sous la dénomination de
"TETRAGLYN 1 S" par la société "NIKKO" 3,8 g
- Cholestérol 3,8 g
- 10 - Sel monosodique de l'acide N-stéaroyl glutamique
commercialisé sous la dénomination
"ACYLGLUTAMATE HS 11" par la société
"AJINOMOTO" 0,4 g
- Glycérine 5,0 g
- 15 - Conservateurs 0,3 g
- Eau déminéralisée qsp 50 g

Deuxième phase :

- Huile de macadamia 16,0 g
- Parfum 0,2 g
- 20 - Mélange d'acides polycarboxyviniliques commercialisé
sous la dénomination de "CARBOPOL 940"
par la société "GOODRICH" 0,42 g
- Triéthanolamine qs pH 6
- Eau déminéralisée qsp 100 g


- 25 Après une semaine d'application quotidienne, chaque matin, sur le visage soigneusement nettoyé, on constate une amélioration de l'aspect et de l'éclat de la peau du visage, qui devient plus lisse, plus ferme, plus hydratée, avec un teint plus éclatant.

EXEMPLE 15: Crème de jour pour le visage.

- 30 On prépare une crème ayant la formulation suivante :

Première phase :

- Palmitate de sorbitane commercialisé sous la
dénomination de "SPAN 40" par la société "ICI" 1,0 g
- Céramide de synthèse répondant à la formule



pour laquelle R_1 et R_2 sont $C_{15}H_{31}$

et qui est un mélange des formes érythro et

thréo dans la proportion 70 : 30 1,0 g

5 - Cholestérol 0,7 g

- Sel de sodium du cholestérol sulfate 0,30 g

- Glycérine 3,0 g

- Conservateurs 0,3 g

- Laurate de sorbitane oxyéthyléné à 20 moles

10 d'O.E. commercialisé sous le nom de

"TWEEN 20" par la société "ICI" 1,0 g

- Eau déminéralisée qsp 50 g

Deuxième phase

- Huile de silicone volatile 10,0 g

15 - Huile d'amandes d'abricots 10,0 g

- Parfum 0,2 g

- Mélange d'acides polycarboxyvinyliques

commercialisé sous la dénomination de

"CARBOPOL 940" par la société "GOODRICH" 0,42 g

20 - Triéthanolamine qs pH 6,5

- Eau déminéralisée qsp 100 g

Cette crème permet, après décomposition du palmitate de sorbitane et du laurate de sorbitane, par les enzymes de la peau, de traiter la peau par l'acide palmitique, l'acide laurique, le sorbitol, un
25 céramide et du cholestérol, et fournit à la peau une protection particulièrement efficace. Cette crème appliquée quotidiennement, pendant 20 jours, sur une peau fatiguée, donne des résultats appréciables.


EXEMPLE 16: Sérum anti-âge.

30 On prépare un sérum ayant la formulation suivante :

- Palmitate de sorbitane commercialisé sous la

dénomination de "SPAN 40" par la société "ICI" 0,17 g

- Céramide de synthèse répondant à la formule



- pour laquelle R₁ est C₁₅H₃₁ et R₂ est le reste du chlorure d'oléyle commercialisé par la société "BASF" avec un titre en chlorure d'acide de 98 % et qui est un
- 5 mélange des formes érythro et thréo dans la proportion 70 : 30 0,17 g
- Cholestérol 0,11 g
 - Cholestérol phosphate (sel de sodium) 0,05 g
 - Glycérine 5,0 g
- 10 - Laurate de sorbitane oxyéthyléné à 20 moles d'O.E. commercialisé sous le nom de "TWEEN 20" par la société "ICI" 0,17 g
- Conservateurs 0,3 g
 - Palmitate d'ascorbyle 0,01 g
- 15 - Polyéthylène glycol (poids moléculaire = 400) 1,0 g
- Propylène glycol 3,0 g
 - Eau 50,0 g
 - Hyaluronate de sodium 0,1 g
 - Eau 15,0 g
- 20 - Mélange d'acides polycarboxyvinyles commercialisé sous la dénomination de "CARBOPOL 940" par la société "GOODRICH" 0,25 g
- Triéthanolamine qs pH 6,5
 - Eau déminéralisée qsp 100 g
- 25 Ce sérum permet, après décomposition par les enzymes de la peau, du palmitate de sorbitane et du laurate de sorbitane, de traiter la peau par l'acide palmitique, l'acide laurique, le sorbitol, un céramide et du cholestérol, et fournit à la peau une protection particulièrement efficace. Ce sérum appliqué quotidiennement, pendant 20 jours, sur
- 30 une peau fatiguée, donne des résultats appréciables.

EXEMPLE 17: Crème de jour pour le visage.

On prépare une crème ayant la formulation suivante :

Première phase

- Palmitate de sorbitane commercialisé sous la

	dénomination de "SPAN 40" par la société "ICI"	1,4 g
	- Glycocéramides de germes de blé commercialisés par la société "ARD"	1,4 g
	- Cholestérol	0,90 g
5	- Cholestérol sulfate (sel de sodium)	0,30 g
	- Glycérine	4,0 g
	- Eau déminéralisée qsp	56 g

Deuxième phase

	- Huile de silicone volatile	10,0 g
10	- Huile d'amandes d'abricots	10,0 g
	- Mélange d'acides polycarboxyvinyles commercialisé sous la dénomination de "CARBOPOL 940" par la société "GOODRICH"	0,42 g
	- Paraoxybenzoate de méthyle	0,20 g
15	- Triéthanolamine qs	pH 6,5
	- Eau déminéralisée qsp	100 g

Après une semaine d'application quotidienne, chaque matin, sur le visage soigneusement nettoyé, on constate une amélioration de l'aspect et de l'éclat de la peau du visage, qui devient plus lisse, plus ferme, plus hydratée, avec un teint plus éclatant.

EXEMPLE 18 : Lait parfumé pour le corps.

On prépare un lait ayant la formulation suivante :

Première phase :

	- Isostéarate de diglycéryle commercialisé par la société "SOLVAY"	0,9 g
	- Sel monosodique de l'acide N-stéaroyl glutamique commercialisé sous la dénomination "ACYLGLUTAMATE HS 11" par la société "AJINOMOTO"	0,1 g
30	- Glycérine	3,0 g
	- Conservateurs	0,3 g
	- Eau déminéralisée qsp	69,7 g

Deuxième phase :

	- Huile essentielle de bergamote (exempte de bergaptène)	5,0 g
35	- Mélange d'acides polycarboxyvinyles commercialisé	

sous la dénomination de "CARBOPOL 940"

par la société "GOODRICH" 0,10 g

- Triéthanolamine qs pH 6

- Eau déminéralisée qsp 100 g

5 Ce lait appliqué une fois par jour sur le corps sur des sujets à peau ferme donne une amélioration de l'aspect et de l'éclat de la peau, qui devient plus lisse et plus hydratée, de façon appréciable, après 20 jours d'application.

10 **EXEMPLE 19** : Crème de jour pour le visage destinée à la nutrition des peaux ternes.

On prépare une crème ayant la formulation suivante :

Première phase :

- Stéarate de polyéthylène glycol "PEG 400"

produit par biotechnologie commercialisé

15 par la société "UNICHEMA" 1,9 g

- Cholestérol 1,9 g

- Sel monosodique de l'acide N-stéaroyl glutamique commercialisé sous la dénomination

"ACYLGLUTAMATE HS 11" par la société

20 "AJINOMOTO" 0,2 g

- Sorbitol 4,0 g

- Mélange d'acides aminés, manitol, saccharose végétal, glycogène marin, acide pyrrolidone carboxylique non stabilisé commercialisé sous la dénomination

25 "HYDROSMYL LS 4513" par les "Laboratoires Sérobiologiques de Nancy" 0,5 g

- Conservateurs 0,3 g

- Eau déminéralisée

Deuxième phase :

30 - Huile de pépins de raisin 8,0 g

- Huile de tournesol 8,0 g

- Huile de silicone volatile 4,0 g

- Parfum 0,2 g

- Mélange d'acides polycarboxyvinyliques commercialisé

35 sous la dénomination de "CARBOPOL 940"

par la société "GOODRICH" 0,42 g

- Triéthanolamine qs pH 6
- Eau déminéralisée qsp 100 g

Après une semaine d'application quotidienne, chaque matin, sur le visage soigneusement nettoyé, on constate une
 5 amélioration de l'éclat de la peau du visage, qui devient plus éclatant.

EXEMPLE 20: Lait hydratant pour le corps

On prépare un lait ayant la formulation suivante :

Première phase :

- Distéarate de sucrose commercialisé sous la
 10 dénomination "CRODESTA F 50"
 par la société "CRODA" 1,35 g
- Cholestérol 1,35 g
- Sel disodique de l'acide N-stéaroyl glutamique
 commercialisé sous la dénomination
 15 "ACYLGLUTAMATE HS 21" par la société
 "AJINOMOTO" 0,30 g
- Glycérine 3,0 g
- Conservateurs 0,30 g
- Eau déminéralisée

20 *Deuxième phase :*

- Huile de vaseline légère 6,0 g
- Huile d'amande douce 4,0 g
- Parfum 0,20 g
- Mélange d'acides polycarboxyvinyles commercialisé
 25 sous la dénomination de "CARBOPOL 940"
 par la société "GOODRICH" 0,40 g
- Triéthanolamine qs pH 6,5
- Eau déminéralisée qsp 100 g

Ce lait appliqué une fois par jour sur le corps sur des
 30 sujets à peau ferme donne une amélioration de l'aspect et de l'éclat de
 la peau, qui devient plus lisse et plus hydratée, de façon appréciable,
 après 20 jours d'application.

EXEMPLE 21: Crème de jour anti-âge pour le visage.

On prépare une crème ayant la formulation suivante :

35 *Première phase :*

- Distéarate de sucrose commercialisé sous la

	dénomination "GRILLOTEN PSE 141 G"	
	par la société "GRILLO"	2,70 g
	- Cholestérol	2,70 g
	- Sel disodique de l'acide N-stéaroyl glutamique	
5	commercialisé sous la dénomination	
	"ACYLGLUTAMATE HS 21" par la société	
	"AJINOMOTO"	0,60 g
	- Acétate de vitamine E	0,60 g
	- Glycérine	3,00 g
10	- L-Hydroxyproline	1,00 g
	- Guanosine	0,02 g
	- Conservateurs	0,30 g
	- Polyphosphonate commercialisé sous la dénomination	
	de "DEQUEST 2046" par la société "MONSANTO	
15	CHEMICAL"	0,80 g
	- Hydrolysate lactique commercialisé sous la	
	dénomination de "LACTOLAN LS" par la société	
	"Laboratoires Sérobiologiques de Nancy"	5,00 g
	- Eau déminéralisée	40 g
20	<i>Deuxième phase :</i>	
	- Huile d'amandes d'abricots	10,0 g
	- Huile de silicone volatile	10,0 g
	- Filtres antisolaires	1,00 g
	- Glycérides de vitamine F	2,00 g
25	- Mélange d'acides polycarboxyvinyliques commercialisé	
	sous la dénomination de "CARBOPOL 940"	
	par la société "GOODRICH"	0,50 g
	- Conservateurs	0,20 g
	- Triéthanolamine	qs pH 6,5
30	- Eau déminéralisée	qsp 100 g

Après une semaine d'application quotidienne, chaque matin, sur le visage soigneusement nettoyé, on constate une amélioration de l'aspect et de l'éclat de la peau du visage, qui devient plus lisse, plus ferme, plus hydratée, avec un teint plus éclatant.

35 **EXEMPLE 22:** Crème de jour pour le visage et le cou destinée au soin des peaux fatiguées.

On prépare une crème ayant la formulation suivante :

Première phase :

	- Mélange de stéarate de sorbitane et de cocoate de sucrose commercialisé sous la dénomination	
5	"ARLATONE 2121" par la société "ICI"	3,60 g
	- Cholestérol	3,60 g
	- Sel monosodique de l'acide N-stéaroyl glutamique commercialisé sous la dénomination	
	"ACYLGLUTAMATE HS 11" par la société	
10	"AJINOMOTO"	0,80 g
	- Glycérine	3,00 g
	- D-Panthénol	1,00 g
	- Mélange d'acides aminés, manitol, saccharose végétal, glycogène marin, acide pyrrolidone carboxylique	
15	commercialisé sous la dénomination	
	"HYDROSMYL LS 4513" par les	
	"Laboratoires Sérobiologiques de Nancy"	0,2 g
	- Guanosine	0,01 g
	- Polyphosphonate commercialisé sous la dénomination	
20	de "DEQUEST 2046" par la société "MONSANTO CHEMICAL"	0,80 g
	- Hydrolysate lactique commercialisé sous la dénomination de "LACTOLAN LS" par les	
	"Laboratoires Sérobiologiques de Nancy"	3,00 g
25	- Conservateurs	0,30 g
	- Eau déminéralisée	40 g

Deuxième phase :

	- Huile de macadamia	7,50 g
	- Huile de pépins de raisin	5,00 g
30	- Huile de silicone volatile	5,0 g
	- Filtres antisolaires	1,00 g
	- Parfum	0,20 g
	- Concentrats naturels de tocophérol	3,00 g
	- Mélange d'acides polycarboxyviniliques commercialisé	
35	sous la dénomination de "CARBOPOL 940"	
	par la société "GOODRICH"	0,42 g

- Triéthanolamine qs pH 6
- Eau déminéralisée qsp 100 g

Après une semaine d'application quotidienne, chaque matin, sur le visage et le cou soigneusement nettoyés, on constate une
 5 amélioration de l'aspect et de l'éclat de la peau du visage et du cou, qui devient plus lisse, plus ferme, plus hydratée, avec un teint plus éclatant.

EXEMPLE 23 : Fluide anti-âge pour le visage.

On prépare un fluide ayant la formulation suivante :

10 *Première phase :*

- Polyéthylène glycol 20 distéarate commercialisé
 sous la dénomination de "GLUCAM E 20 DISTEARATE"
 par la société "AMERCHOL" 1,80 g
- Cholestérol 1,80 g
- 15 - Sel de sodium de l'acide phosphatidique 0,40 g
- Acétate de vitamine E 0,20 g
- Glycérine 2,00 g
- L-Hydroxyproline 1,00 g
- Guanosine 0,01 g
- 20 - Solution aqueuse de superoxyde dismutase
 5 000 unités/ml commercialisée par la
 société "PENTAPHARM" 1,00 g
- Conservateurs 0,30 g
- Hydrolysate lactique commercialisé sous la
 25 dénomination de "LACTOLAN LS" par les
 "Laboratoires Sérobiologiques de Nancy" 5,00 g
- Eau déminéralisée

Deuxième phase :

- Huile de pépins de raisin 4,0 g
- 30 - Huile de silicone volatile 2,0 g
- Mélange d'acides polycarboxyviniliques commercialisé
 sous la dénomination de "CARBOPOL 940"
 par la société "GOODRICH" 0,20 g
- L-Lysine monohydrate qs pH 6,5
- 35 - Eau déminéralisée qsp 100 g

Après une semaine d'application quotidienne, chaque matin, sur le visage soigneusement nettoyé, on constate une amélioration de l'aspect et de l'éclat de la peau du visage, qui devient plus lisse, plus ferme, plus hydratée, avec un teint plus éclatant.

5 **EXEMPLE 24** : Sérum anti-âge pour le visage.

On prépare un sérum ayant la formulation suivante :

	- Polyglyceryl-2 stéarate commercialisé sous la dénomination "HOSTACERINE DGS" par la société "HOESCHT"	1,30 g
10	- Cholestérol	0,60 g
	- Sel de sodium de l'acide phosphatidique	0,10 g
	- Glycérine	3,00 g
	- L-Hydroxyproline	1,00 g
	- D-Panthénol	1,50 g
15	- Guanosine	0,01 g
	- Conservateurs	0,30 g
	- Polyphosphonate commercialisé sous la dénomination de "DEQUEST 2046" par la société "MONSANTO CHEMICAL"	0,80 g
20	- Hydrolysate lactique commercialisé sous la dénomination de "LACTOLAN LS" par les "Laboratoires Sérobiologiques de Nancy"	5,00 g
	- Solution aqueuse de superoxyde dismutase à 5 000 unités/ml commercialisée par la société "PENTAPHARM"	1,00 g
25	- Mélange d'acides polycarboxyvinyliques commercialisé sous la dénomination de "CARBOPOL 940" par la société "GOODRICH"	0,50 g
	- Triéthanolamine	qs pH 6,5
30	- Eau déminéralisée	qsp 100 g

Après une semaine d'application quotidienne, chaque matin, sur le visage soigneusement nettoyé, on constate une amélioration de l'aspect et de l'éclat de la peau du visage, qui devient plus lisse, plus ferme, plus hydratée, avec un teint plus éclatant.

35 **EXEMPLE 25**: Lait parfumé pour le corps.

On prépare un lait ayant la formulation suivante :

Première phase :

- Isostéarate de sorbitane commercialisé sous la
dénomination "NIKKOL SI 10 R"
par la société "NIKKO" 0,90 g
- 5 - Sel disodique de l'acide N-stéaroyl glutamique
commercialisé sous la dénomination
d' "ACYLGLUTAMATE HS 21" par la société
"AJINOMOTO" 0,10 g
- Glycérine 3,00 g
- 10 - Conservateurs 0,30 g
- Eau déminéralisée

Deuxième phase :

- Huile essentielle de bergamote (exempte
de bergaptène) 5,0 g
- 15 - Mélange d'acides polycarboxyviniliques commercialisé
sous la dénomination de "CARBOPOL 940"
par la société "GOODRICH" 0,10 g
- Triéthanolamine qs pH 6,5
- Eau déminéralisée qsp 100 g
- 20 Ce lait appliqué une fois par jour sur le corps sur des
sujets à peau ferme donne une amélioration de l'aspect et de l'éclat de
la peau, qui devient plus lisse et plus hydratée, de façon appréciable,
après 20 jours d'application.

EXEMPLE 26 : Crème de jour pour le visage.

- 25 On prépare une crème ayant la formulation suivante :

Première phase :

- Distéarate de sucrose commercialisé sous la
dénomination "CRODESTA F 160"
par la société "CRODA" 2,20 g
- 30 - Cholestérol 1,40 g
- Sel de sodium du cholestérol sulfate 0,40 g
- Glycérine 3,00 g
- Eau déminéralisée

Deuxième phase :

- 35 - Huile de pépins de raisin 7,0 g
- Huile de tournesol 5,0 g

- Huile de silicone volatile 4,0 g
- Filtres antisolaires 1,0 g
- Mélange d'acides polycarboxyviniliques commercialisé
sous la dénomination de "CARBOPOL 940"
- 5 par la société "GOODRICH" 0,42 g
- Triéthanolamine qs pH 6,5
- Eau déminéralisée qsp 100 g

Après une semaine d'application quotidienne, chaque
matin, sur le visage soigneusement nettoyé, on constate une
10 amélioration de l'aspect et de l'éclat de la peau du visage, qui devient
plus lisse, plus ferme, plus hydratée, avec un teint plus éclatant.

EXEMPLE 27 : Crème de nuit pour le visage destinée à la nutrition
des peaux ternes.

On prépare une crème ayant la formulation suivante :

15 *Première phase :*

- Distéarate de saccharose commercialisé sous la
dénomination de "GRILLOTEN PSE 141 G"
par la société "GRILLO" 1,80 g
- Cholestérol 1,80 g
- 20 - Sphingomyéline de lait 1,80 g
- Sel disodique de l'acide N-stéaroyl glutamique
commercialisé sous la dénomination
"ACYLGLUTAMATE HS 21" par la société
"AJINOMOTO" 0,60 g
- 25 - Mélange d'acides aminés, manitol, saccharose végétal,
glycogène marin, acide pyrrolidone carboxylique
non stabilisé commercialisé sous la dénomination
"HYDROSMYL LS 4513" par les
"Laboratoires Sérobiologiques de Nancy" 1,00 g
- 30 - Conservateurs 0,30 g
- Eau déminéralisée 40 g

Deuxième phase :

- Huile de pépins de raisin 8,00 g
- Huile de tournesol 4,00 g
- 35 - Huile de silicone volatile 4,00 g
- Parfum 0,20 g

- Mélange d'acides polycarboxyvinylques commercialisé sous la dénomination de "CARBOPOL 940" par la société "GOODRICH" 0,42 g
 - Triéthanolamine qs pH 6,5
 - 5 - Eau déminéralisée qsp 100 g
- Après une semaine d'application quotidienne, chaque soir, sur le visage soigneusement nettoyé d'un sujet à peau terne, on constate une amélioration de l'éclat de la peau, qui devient plus lisse, plus ferme, plus hydratée, avec un teint plus éclatant.

10 **EXEMPLE 28:** Crème de jour anti-âge pour le visage.

On prépare une crème ayant la formulation suivante :

Première phase :

- Pentastéarate d'hexaglycéryle commercialisé sous la dénomination "HEXAGLYN 5S" par la société "NIKKO" 2,70 g
- 15 - Cholestérol 2,70 g
- Sel disodique de l'acide N-stéaroyl glutamique commercialisé sous la dénomination "ACYLGLUTAMATE HS 21" par la société "AJINOMOTO" 0,60 g
- 20 - Acétate de vitamine E 0,60 g
- Glycérine 3,00 g
- L-Hydroxyproline 1,00 g
- Guanosine 0,02 g
- 25 - Conservateurs 0,30 g
- Polyphosphonate commercialisé sous la dénomination de "DEQUEST 2046" par la société "MONSANTO CHEMICAL" 0,80 g
- Hydrolysate lactique commercialisé sous la dénomination de "LACTOLAN LS" par les "Laboratoires Sérobiologiques de Nancy" 5,00 g
- 30 - Eau déminéralisée 40 g

Deuxième phase :

- Huile d'amandes d'abricots 10,0 g
- 35 - Huile de silicone volatile 10,0 g
- Filtres antisolaire 1,00 g

- Glycérides de vitamine F 2,00 g
- Mélange d'acides polycarboxyvinyliques commercialisé
sous la dénomination de "CARBOPOL 940"
par la société "GOODRICH" 0,50 g
- 5 - Conservateurs 0,20 g
- Triéthanolamine qs pH 6,5
- Eau déminéralisée qsp 100 g

10 - Après une semaine d'application quotidienne, chaque matin, sur le visage et le cou soigneusement nettoyés, on constate une amélioration de l'aspect et de l'éclat de la peau du visage et du cou, qui devient plus lisse, plus ferme, plus hydratée, avec un teint plus éclatant.

15 **EXEMPLE 29:** Crème de jour anti-âge pour le visage et le cou destinée au soin des peaux fatiguées.

On prépare une crème ayant la formulation suivante :

Première phase :

- Décastéarate de décaglycéryle commercialisé sous la
20 dénomination "DECAGLYN 10S"
par la société "NIKKO"..... .. 2,70 g
- Cholestérol 2,70 g
- Sel disodique de l'acide N-stéaroyl glutamique
commercialisé sous la dénomination
25 "ACYLGLUTAMATE HS 21" par la société
"AJINOMOTO" 0,60 g
- Acétate de vitamine E 0,60 g
- Glycérine 3,00 g
- L-Hydroxyproline 1,00 g
- 30 - Guanosine 0,02 g
- Conservateurs 0,30 g
- Polyphosphonate commercialisé sous la dénomination
de "DEQUEST 2046" par la société "MONSANTO
CHEMICAL" 0,80 g
- 35 - Hydrolysate lactique commercialisé sous la
dénomination de "LACTOLAN LS" par les

- "Laboratoires Sérobiologiques de Nancy" 5,00 g
 - Eau déminéralisée 40 g

Deuxième phase :

- Huile d'amandes d'abricots 10,0 g
 5 - Huile de silicone volatile 10,0 g
 - Filtres antisolaires 1,00 g
 - Glycérides de vitamine F 2,00 g
 - Mélange d'acides polycarboxyvinyliques commercialisé
 sous la dénomination de "CARBOPOL 940"
 10 par la société "GOODRICH" 0,50 g
 - Conservateurs 0,20 g
 - Triéthanolamine qs pH 6,5
 - Eau déminéralisée qsp 100 g
- 15 - Après une semaine d'application quotidienne, chaque
 matin, sur le visage et le cou soigneusement nettoyés, on constate une
 amélioration de l'aspect et de l'éclat de la peau du visage et du cou, qui
 devient plus lisse, plus ferme, plus hydratée, avec un teint plus
 éclatant.
- 20 **EXEMPLE 30 :** Crème de jour pour le visage.
 On prépare, comme dans l'exemple 8, une crème ayant la
 formulation suivante :

Première phase :

Palmitate de sorbitane commercialisé sous la dénomination de "SPAN 40" par la société "ICI"	3,8 g
Cholestérol	3,8 g
Ester α - sulfone de formule	
$C_{16}H_{33}-CH$ $\begin{cases} \text{COO}-(CH_2-CH_2-O)_2-CH_3 \\ \text{SO}_3Na \end{cases}$	0,4 g

Eau déminéralisée.....	qsp	50 g
Conservateurs.....		0,3 g
Glycérine		5,0 g

Deuxième phase :

Huile de macadamia	16,0 g
Parfum	0,2 g
Mélange d'acides polycarboxyvinyliques commercialisé sous la dénomination de	
5 "CARBOPOL 940" par la société "GOODRICH"	0,42 g
Triéthanolamineqs.....	pH6
Eau déminéralisée.....qsp	100 g
On mélange, comme indiqué dans l'exemple 8, les deux formulations ci-dessus définies pour obtenir la composition selon l'invention.	

10 Après une semaine d'application quotidienne, chaque
matin, sur le visage soigneusement nettoyé, on constate une
amélioration de l'aspect de la peau du visage qui devient plus lisse, plus
ferme et plus hydratée.

15

On a constaté que, dans les crèmes, laits ou sérums des
exemples 8 à 30, les vésicules lipidiques sont restées stables après 3
mois de stockage.

REVENDECATIONS

1 - Composition formée d'une dispersion aqueuse de vésicules constituées par une membrane de phase lipidique encapsulant une phase aqueuse, la phase lipidique comprenant des lipides amphiphiles non-ioniques et au moins un lipide amphiphile ionique, caractérisée par le fait que :

- les lipides amphiphiles non-ioniques sont constitués par un mélange d'esters d'au moins un polyol choisi dans le groupe formé par le polyéthylèneglycol comportant de 1 à 60 unités oxyde d'éthylène, le sorbitane, le sorbitane portant 2 à 60 unités d'oxyde d'éthylène, le glycérol portant 2 à 30 unités d'oxyde d'éthylène, les polyglycérols comportant 2 à 15 unités de glycérol, les sucroses, les glucoses portant 2 à 30 unités d'oxyde d'éthylène, et d'au moins un acide gras comportant une chaîne alkyle en C₅-C₁₇, saturée ou non saturée, linéaire ou ramifiée, le nombre de chaînes alkyle par groupe polyol étant compris entre 1 et 10 ; et que

- le(s) lipide(s) amphiphile(s) ionique(s) est(sont) choisi(s) dans le groupe formé par ceux conférant à la dispersion un pH compris entre 5,5 et 7,5 ;


- le rapport en poids entre la quantité de lipides amphiphiles non-ioniques et celle de lipide(s) amphiphile(s) ionique(s) dans la phase lipidique étant compris entre 50/1 et 50/25 et le rapport en poids entre la phase lipidique et la phase aqueuse de dispersion étant compris entre 1/1 000 et 300/1 000.

2 - Composition selon la revendication 1, caractérisée par le fait que le(s) lipide(s) amphiphile(s) ionique(s) est(sont) choisi(s) dans le groupe formé par les lipides anioniques neutralisés, les lipides amphotères et les dérivés alkylsulfoniques.

3 - Composition selon la revendication 2, caractérisée par le fait que le(s) lipide(s) amphiphile(s) ionique(s) est (sont) choisi(s) dans le groupe formé par :

- les sels alcalins du dicétyl et du dimyristylphosphate,
- les sels alcalins du cholestérol sulfate,
- les sels alcalins du cholestérol phosphate,
- les acylglutamates mono et disodique,
- le sel de sodium de l'acide phosphatidique,

- les phospholipides,
- les dérivés alkylsulfoniques de formule :



- 5 formule dans laquelle R représente les radicaux C₁₆ H₃₃ et C₁₈ H₃₇ pris en mélange ou séparément et M est un métal alcalin.
- 4 - Composition selon l'une des revendications 1 à 3, caractérisée par le fait que la membrane lipidique des vésicules contient au moins un additif .
- 10 5 - Composition selon la revendication 4, caractérisée par le fait que l'additif est choisi dans le groupe formé par les stérols, les alcools et diols à longue chaîne, les amines à longues chaînes et leurs dérivés ammonium quaternaire.
- 6 - Composition selon la revendication 5, caractérisée par le fait que l'additif est le cholestérol.
- 15 7 - Composition selon l'une des revendications 1 à 6, caractérisée par le fait que les vésicules contiennent au moins un actif ayant une activité cosmétique et/ou dermopharmaceutique.
- 8 - Composition selon la revendication 7, caractérisée par le fait que les vésicules contiennent au moins un actif hydrosoluble dans la phase aqueuse encapsulée.
- 20 9 - Composition selon la revendication 7, caractérisée par le fait que les vésicules contiennent au moins un actif liposoluble dans la phase lipidique constituant leur membrane.
- 25 10 - Composition selon la revendication 9, caractérisée par le fait que l'actif liposoluble est choisi dans le groupe formé par les sphingomyélines, les glycocéramides et les céramides naturels ou synthétiques.
- 30 11 - Composition selon les revendications 6 et 10 prises en combinaison, caractérisée par le fait que la phase lipidique constituant la membrane contient un mélange de cholestérol et de céramide(s) naturel(s) ou de synthèse.

12 - Composition selon la revendication 7, caractérisée par le fait que les vésicules contiennent un actif amphiphile qui se répartit entre la phase lipidique et la phase aqueuse encapsulée.

5 13 - Composition selon l'une des revendications 1 à 12, caractérisée par le fait que la phase aqueuse de dispersion contient une dispersion de gouttelettes d'un liquide non miscible à l'eau.

10 14 - Composition selon l'une des revendications 1 à 13, caractérisée par le fait que la phase aqueuse de dispersion contient au moins un adjuvant pris dans le groupe formé par les gélifiants, les conservateurs, les colorants, les opacifiants et les parfums.

INSTITUT NATIONAL
de la
PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE

RAPPORT DE RECHERCHE
établi sur la base des dernières revendications
déposées avant le commencement de la recherche

N° d'enregistrement
national

FR 9212343
FA 478355

DOCUMENTS CONSIDERES COMME PERTINENTS		Revendications concernées de la demande examinée
Catégorie	Citation du document avec indication, en cas de besoin, des parties pertinentes	
X	EP-A-0 433 131 (L'ORÉAL)	1-9, 13, 14
Y	* page 7; exemple 4 * ---	10-12
X	US-A-4 670 185 (FUJIWARA ET AL.)	1-8
Y	* colonne 3, ligne 1 - colonne 8, ligne 11 * * * colonne 15; exemple 6 * ---	1-8
Y	FR-A-2 552 666 (KAO CORPORATION) * page 3, ligne 34 - page 7, ligne 38 * * page 14; exemple 2 * * page 15, ligne 19 - ligne 22 * * page 15, ligne 25 * ---	1-8
X	WO-A-9 006 747 (MICRO VESICULAR SYSTEMS, INC.) * page 17 - page 18; exemple 1 * * page 18, ligne 1 * * page 18, ligne 17 - ligne 25 * ---	1, 2, 4-9
Y	EP-A-0 319 638 (ESTEE LAUDER INC.) * le document en entier * -----	10-12
		DOMAINES TECHNIQUES RECHERCHES (Int. Cl.5)
		A61K
Date d'achèvement de la recherche 08 AVRIL 1993		Examineur BENZ K.F.
CATEGORIE DES DOCUMENTS CITES X : particulièrement pertinent à lui seul Y : particulièrement pertinent en combinaison avec un autre document de la même catégorie A : pertinent à l'encontre d'au moins une revendication ou arrière-plan technologique général O : divulgation non-écrite P : document intercalaire T : théorie ou principe à la base de l'invention E : document de brevet bénéficiant d'une date antérieure à la date de dépôt et qui n'a été publié qu'à cette date de dépôt ou qu'à une date postérieure. D : cité dans la demande L : cité pour d'autres raisons & : membre de la même famille, document correspondant		