

(19)



**Евразийское
патентное
ведомство**

(11) **039060**

(13) **B1**

(12) ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ К ЕВРАЗИЙСКОМУ ПАТЕНТУ

(45) Дата публикации и выдачи патента
2021.11.29

(51) Int. Cl. *C12N 7/00* (2006.01)
C12N 15/86 (2006.01)

(21) Номер заявки
201600476

(22) Дата подачи заявки
2014.12.19

(54) ВАРИАНТ ВИРУСА РРСС, СПОСОБ ЕГО ПОЛУЧЕНИЯ С ПОМОЩЬЮ МОЛЕКУЛЫ
НУКЛЕИНОВОЙ КИСЛОТЫ, КОНСТРУКЦИИ ДНК ИЛИ КЛЕТКИ И ЕГО
ПРИМЕНЕНИЕ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ И ПРОФИЛАКТИКИ РРСС

(31) **13199177.0; 14175691.6**

(32) **2013.12.20; 2014.07.03**

(33) ЕР

(43) **2016.11.30**

(86) РСТ/ЕР2014/078929

(87) WO 2015/092058 2015.06.25

(71)(73) Заявитель и патентовладелец:
**БЁРИНГЕР ИНГЕЛЬХАЙМ
ВЕТМЕДИКА ГМБХ (DE)**

(72) Изобретатель:

**Галлай Андреас, Келлер Кристоф,
Шахт Эрик, Херрель Мариеке (DE)**

(74) Представитель:

**Веселицкая И.А., Кузенкова Н.В.,
Веселицкий М.Б., Каксис Р.А.,
Белоусов Ю.В., Куликов А.В.,
Кузнецова Е.В., Соколов Р.А.,
Кузнецова Т.В. (RU)**

(56) KVISGAARD L. K. ET AL.: "Genetic and antigenic characterization of complete genomes of Type 1 Porcine Reproductive and Respiratory Syndrome viruses (PRRSV) isolated in Denmark over a period of 10 years", VIRUS RESEARCH, vol. 178, no. 2, 20 October 2013 (2013-10-20), pages 197-205, XP028782594, ISSN: 0168-1702, DOI: 10.1016/J.VIRUSRES.2013.10.009 figure S2 & KVISGAARD L. K. ET AL.: "Supplementary Figure S2, Genetic and antigenic characterization of complete genomes of Type 1 Porcine Reproductive and Respiratory Syndrome viruses (PRRSV) isolated in Denmark over a period of 10 years", Virus Research, 1 December 2013 (2013-12-01), page 1, XP055180373, DOI: 10.1016/j.virusres.2013.10.009 Retrieved from the Internet: URL: http://www.sciencedirect.com/science?_ob=MiamiCaptionURL&method=retrieve&_eid=1-s2.0-S0168170213003560&_image=1-s2.0-S0168170213003560-mmcc3.jpg&_cid=271060&explode=defaultEXP_LIST&_idxType=defaultREF_WORK_INDEX_TYPE&_alpha=defaultALPHA&_ba=&_rdoc=1&_fmt=FULL&_issn=01681702&_pii=50168170213003560&m [retrieved on 2015-03-31]
US-A1-2012213810
EP-A2-1018557

PRIETO C. ET AL.: "Similarity of European porcine reproductive and respiratory syndrome virus strains to vaccine strain is not necessarily predictive of the degree of protective immunity conferred", VETERINARY JOURNAL, BAILLIERE TINDALL, LONDON, GB, vol. 175, no. 3, 1 March 2008 (2008-03-01), pages 356-363, XP022516400, ISSN: 1090-0233, DOI: 10.1016/J.TVJL.2007.01.021 abstract; materials and methods;

(57) Изобретение относится к области здоровья животных и обеспечивает средства для получения и исследования репродуктивно-респираторного синдрома свиней (РРСС), вирусного заболевания, которое поражает свиней, и способу профилактики и лечения РРСС с использованием, в том числе, композиции, содержащей молекулу нуклеиновой кислоты, которая кодирует РРСС генотипа I. Изобретение также относится к новому варианту вируса РРСС, получаемому с помощью вышеупомянутой молекулы нуклеиновой кислоты, способной продуцировать живой вирус при трансфекции в клетки с помощью конструкции ДНК или РНК транскрипта.

B1

039060

039060
B1

Область техники

Изобретение относится к области здоровья животных.

В первом рассмотрении изобретение относится к новому варианту вируса PPCC. Изобретение также относится к применению такого вируса PPCC для изучения репродуктивно-респираторного синдрома свиней (PPCC), вирусного заболевания, которое поражает свиней, и к разработке вакцин, терапевтических и диагностических средств для профилактики, лечения и диагностики PPCC.

В втором рассмотрении изобретение относится к последовательности нуклеиновой кислоты, которая включает геном клона вируса PPCC генотипа I для получения аттенуированных живых вирусов, полезных для предотвращения или лечения репродуктивно-респираторного синдрома свиней (PPCC) у свиней и при разработке вакцин, терапевтических и диагностических средств для профилактики, лечения и диагностики PPCC.

Сочетание указанных двух рассмотрений, а также новых вирусов PPCC с улучшенными свойствами обеспечивается в соответствии с третьим рассмотрением изобретения.

Информация об уровне техники

Вирус репродуктивно-респираторного синдрома свиней (PPCC) представляет собой члена семейства вирусов Arteriviridae и принадлежит, вместе с Coronaviridae, к порядку вирусов Nidovirales. Вирус PPCC представляет собой вирусом, который имеет оболочку и геном на основе двухцепочечной положительно-полярной нитью РНК размером приблизительно 15 килобаз, который включает девять открытых рамок считывания (ORF), в частности, ORF1a, ORF1ab, ORF2a, ORF2ab и ORF3 - ORF7. ORF1a и 1ab кодируют большие полипротеины, которые подвергаются процессингу с образованием вирусных неструктурных белков (nsp) путем ауторасщепления и трансрасщепления вирусных протеаз nsp1, nsp2 и nsp4 (Snijder и Meulenbergh, 1998). ORF4 кодирует минорный гликопротеин (GP4), который обнаруживается рядом с основным гликопротеином (GP5) и двумя другими минорными гликопротеинами (GP2a и GP3) в оболочке вируса, где все указанные гликопротеины являются важными для продукции инфекционного вируса.

Вирус PPCC рассматривается как один из экономически наиболее важных инфекционных агентов у свиней, который вызывает позднюю репродуктивную недостаточность у свиноматок и заболевания органов дыхания у растущих свиней. Часто инфекция вирусом PPCC осложняется вторичными бактериальными инфекциями, которые относятся к иммуносупрессивной природе вируса. Кроме того, вирусемия PPCC длится в течение нескольких недель, и вирус после этого все еще можно обнаружить в лимфоидных органах в течение нескольких месяцев, что демонстрирует сложности или недостаточность иммунного ответа хозяина для того, чтобы избавиться от вируса (Allende и др., 2000).

Существует два различных вирусных генотипа PPCC, вызывающие сходные клинические симптомы, которые отличаются примерно на 40% на уровне нуклеотидной последовательности, генотип I (EU) и генотипа II (US). Североамериканский (US) прототипный штамм представляет собой VR-2332, в то время как Европейский (EU) прототипный штамм представляет собой вирус Lelystad.

Тем не менее, в первом рассмотрении, поскольку штаммы вируса PPCC обладают высоким биологическим разнообразием и быстро размножаются на отдельных фермах (Badaoui и др. BMC Veterinary Research 2013, 9:58), новые изоляты вируса PPCC являются необходимыми для лучшего понимания PPCC, для воспроизведения указанного заболевания в его различных формах, для сравнительных исследований, а также в качестве основы для разработки новых вакцин, лекарственных препаратов и диагностических средств для профилактики, лечения и диагностики PPCC.

Во втором рассмотрении растущее количество инфекционных клонов кДНК вируса PPCC становится доступным для научного сообщества, большинство из которых основываются на американском типе вируса. Для типа EU, однако, являются доступными лишь немногие клоны. Таким образом, существует острая необходимость в новых клонах инфекционных кДНК европейского (генотип I) вируса PPCC для лучшего понимания PPCC, для сравнительных исследований, в качестве основы для разработки новых вакцин, лекарственных препаратов и диагностических средств для профилактики, лечения и диагностики PPCC, в которых применение клонов кДНК приводит к высокому выходу продукции вируса. Таким образом, для экспериментального удобства в исследовании вакцины PPCC необходим клон инфекционной кДНК, который обеспечивал бы возможность получения вируса PPCC генотипа I в больших количествах.

Описание изобретения

Решение указанных технических задач достигается за счет описания и вариантов осуществления, характеризованных в формуле изобретения.

Таким образом, изобретение в его различных аспектах и вариантах осуществления осуществляется в соответствии с формулой изобретения.

1. Первое рассмотрение настоящего изобретения.

В соответствии с первым рассмотрением, которое подробно описано в данном разделе, изобретение основано на изоляции нового вируса PPCC, который неожиданно оказался способным вызывать серьезные клинические симптомы у боровов. Более подробный анализ этого варианта вируса PPCC выявил существенную делецию в гене orf4 указанного вируса.

В одном аспекте изобретение, таким образом, относится к вирусу репродуктивно-респираторного

синдрома свиней (PPCC), где указанный вирус является выбранным из группы, состоящей из следующих (а), (б), (в), (г), (д) и (е):

(а) вириуса PPCC, который включает ORF4 белок, включающий аминокислотную последовательность, выбранную из группы, которая состоит из SEQ ID NO: 1-12;

(б) вириуса PPCC, предпочтительно вириуса PPCC генотипа I, который включает ORF4 белок, который имеет делецию 9, 10, 11 или более аминокислотных остатков в участке, расположенному между первыми двумя спрогнозированными N-терминальными β -складками, по сравнению с ORF4 белком вириуса PPCC генотипа I дикого типа;

(в) генотипа II вириуса PPCC, который включает ORF4 белок, который имеет делецию 5, 6, 7 или более аминокислотных остатков в участке между первыми двумя спрогнозированными N-терминальными β -складками, по сравнению с вириусом PPCC генотипа II дикого типа;

(г) вириуса PPCC, предпочтительно вириуса PPCC генотипа I, который включает ORF4 белок, который имеет делецию 9, 10, 11 или более аминокислотных остатков между положениями аминокислот от 50 до 71, где нумерация положений аминокислот относится к аминокислотной последовательности ORF4 белка вириуса Lelystad;

(д) вириуса PPCC генотипа II, который включает ORF4 белок, который имеет делецию 5, 6, 7 или более аминокислотных остатков между положениями аминокислот от 50 до 67, где нумерация положений аминокислот относится к аминокислотной последовательности ORF4 белка вириуса PPCC VR2332;

(е) комбинации любых из (а), (б), (в), (г) и (д);

и в дополнительном аспекте изобретение, соответственно, относится к вириусу репродуктивно-респираторного синдрома свиней (PPCC), выбранному из группы, которая состоит из следующих А), Б), В), Г) и Е):

А) вириуса PPCC, геном которого включает молекулу нуклеиновой кислоты, которая кодирует ORF4 белок, который включает аминокислотную последовательность, выбранную из группы, которая состоит из SEQ ID NO: 1-12;

Б) вириуса PPCC, предпочтительно вириуса PPCC генотипа I, геном которого включает молекулу нуклеиновой кислоты, которая кодирует ORF4 белок, который имеет делецию 9, 10, 11 или более аминокислотных остатков в участке, расположенному между первыми двумя спрогнозированными N-терминальными β -складками, по сравнению с ORF4 белком вириуса PPCC генотипа I дикого типа;

В) вириуса PPCC генотипа II, геном которого включает молекулу нуклеиновой кислоты, которая кодирует ORF4 белок, который имеет делецию 5, 6, 7 или более аминокислотных остатков в участке между первыми двумя спрогнозированными N-терминальными β -складками, по сравнению с вириусом PPCC генотипа II дикого типа;

Г) вириуса PPCC, предпочтительно вириуса PPCC генотипа I, геном которого включает молекулу нуклеиновой кислоты, которая кодирует ORF4 белок, который имеет делецию 9, 10, 11 или более аминокислотных остатков между положениями аминокислот 50 - 71, где нумерация положений аминокислот относится к аминокислотной последовательности ORF4 белка вириуса Lelystad;

Д) вириуса PPCC генотипа II, геном которого включает молекулу нуклеиновой кислоты, которая кодирует ORF4 белок, который имеет делецию 5, 6, 7 или более аминокислотных остатков между положениями аминокислот 50 -67, где нумерация положений аминокислот относится к аминокислотной последовательности ORF4 белка вириуса PPCC VR2332;

Е) комбинации любых из А), Б), В), Г) и Д).

Предпочтительно, когда указанный вириус PPCC, который также называется "вириусом PPCC в соответствии с настоящим изобретением" в данной заявке ниже, представляет собой изолированный вириус PPCC.

В контексте настоящего изобретения является понятным, что фраза "аминокислотные остатки в участке" является эквивалентной фразе "аминокислотные остатки, расположенные в участке" и, соответственно, является также понятным, что термин "аминокислотные остатки между положениями аминокислот" является взаимозаменяемым с термином "аминокислотные остатки, расположенные в участке между положениями аминокислот".

Также является понятным, что термины "генотип I" и "генотип II" являются эквивалентными терминами "генотип 1" и "генотип 2" или терминами "тип 1" и "тип 2", как часто используется в литературе в контексте вириуса PPCC.

В соответствии с первым аспектом ((а)), вириус PPCC в соответствии с настоящим изобретением, таким образом, представляет собой вириус PPCC, который включает ORF4 белок, который включает аминокислотную последовательность, выбранную из группы, которая состоит из SEQ ID NO: 1-12, где указанный ORF4 белок предпочтительно включает аминокислотную последовательность, выбранную из группы, которая состоит из SEQ ID NO: 13-24, и где указанный ORF4 белок в типичном неограничивающем варианте осуществления включает аминокислотную последовательность SEQ ID NO: 31.

Таким образом, в соответствии с первым аспектом ((А)) вириус PPCC в соответствии с настоящим изобретением представляет собой вириус PPCC, геном которого включает молекулу нуклеиновой кисло-

ты, которая кодирует ORF4 белок, который включает аминокислотную последовательность, выбранную из группы, состоящей из SEQ ID NO: 1-12, где указанный ORF4 белок предпочтительно включает аминокислотную последовательность, выбранную из группы, которая состоит из SEQ ID NO: 13-24, и где указанный ORF4 белок в типичном неограничивающем варианте осуществления включает аминокислотную последовательность SEQ ID NO: 31.

В соответствии со вторым аспектом ((б)) вирус PPCC в соответствии с настоящим изобретением представляет собой вирус PPCC, в частности, вирус PPCC генотипа I, который включает ORF4 белок, имеющий делецию 9, 10, 11 или более аминокислотных остатков в участке между первыми двумя спрогнозированными N-терминальными β-складками, по сравнению с ORF4 белком вируса PPCC генотипа I дикого типа, где указанные первые две N-терминальные β-складки предпочтительно представляют собой аминокислотные последовательности, как представлено в SEQ ID NO: 25 и SEQ ID NO: 26, или предпочтительно представляют собой аминокислотные последовательности, как представлено в SEQ ID NO: 29 и SEQ ID NO: 30, и где в типичном неограничивающем варианте осуществления указанный ORF4 белок включает аминокислотную последовательность SEQ ID NO: 32.

Следовательно, в соответствии со вторым аспектом ((Б)) вирус PPCC в соответствии с настоящим изобретением представляет собой вирус PPCC, в частности, вирус PPCC генотипа I, геном которого включает молекулу нуклеиновой кислоты, которая кодирует ORF4 белок, который имеет делецию 9, 10, 11 или более аминокислотных остатков в участке между первыми двумя спрогнозированными N-терминальными β-складками, по сравнению с ORF4 белком вируса PPCC генотипа I дикого типа, где указанные первые две спрогнозированные N-терминальные β-складки предпочтительно представляют собой аминокислотные последовательности, как представлено в SEQ ID NO: 25 и SEQ ID NO: 26, или предпочтительно представляют собой аминокислотные последовательности, как представлено в SEQ ID NO: 29 и SEQ ID NO: 30, и где в типичном неограничивающем варианте осуществления указанный ORF4 белок включает аминокислотную последовательность SEQ ID NO: 32.

Как описывается в данной заявке, с целью сравнения вирус PPCC генотипа I дикого типа предпочтительно представляет собой прототипный вируса генотипа I Lelystad. Геном вируса Lelystad кодируется последовательностью нуклеиновой кислоты SEQ ID NO: 41.

В соответствии с третьим аспектом ((в)) вирус PPCC в соответствии с настоящим изобретением представляет собой вирус PPCC генотипа II, который включает ORF4 белок, который имеет делецию 5, 6, 7 или более аминокислотных остатков в участке между первыми двумя спрогнозированными N-терминальными β-складками, по сравнению с вирусом PPCC генотипа II дикого типа, где первые две спрогнозированные N-терминальные β-складки предпочтительно представляют собой аминокислотные последовательности, как представлено в SEQ ID NO: 27 и SEQ ID NO: 28, и где указанный ORF4 белок в типичном неограничивающем примере включает аминокислотную последовательность SEQ ID NO: 33.

Следовательно, в соответствии с третьим аспектом ((Б)) вирус PPCC в соответствии с настоящим изобретением представляет собой вируса PPCC генотипа II, геном которого включает молекулу нуклеиновой кислоты которая кодирует ORF4 белок, который имеет делецию 5, 6, 7 или более аминокислотных остатков в участке между первыми двумя спрогнозированными N-терминальными β-складками, по сравнению с вирусом PPCC генотипа II дикого типа, где первые две спрогнозированные N-терминальные β-складки предпочтительно представляют собой аминокислотные последовательности, как представлено в SEQ ID NO: 27 и SEQ ID NO: 28, и где указанный ORF4 белок в типичном неограничивающем примере включает аминокислотную последовательность SEQ ID NO: 33.

Как упомянуто в данной заявке, с целью сравнения, вирус PPCC генотип II дикого типа предпочтительно представляет собой прототипный вирус генотипа II VR2332. Геном вируса VR2332 кодируется последовательностью нуклеиновой кислоты SEQ ID NO: 42.

В контексте данного изобретения делеция аминокислотных остатков предпочтительно представляет собой делецию последовательных аминокислотных остатков. Таким образом, например, делеция 9, 10, 11 или более аминокислотных остатков, как описывается в данной заявке, предпочтительно представляет собой делецию 9, 10, 11 или более последовательных аминокислотных остатков и, соответственно, делеция 5, 6, 7 или более аминокислотных остатков, как описывается в данной заявке, предпочтительно представляет собой делецию 5, 6, 7 или более последовательных аминокислотных остатков.

В соответствии с четвертым аспектом ((г)) вирус PPCC в соответствии с настоящим изобретением представляет собой вирус PPCC, предпочтительно вирус PPCC генотипа I, который включает ORF4 белок, который имеет делецию 9, 10, 11 или более аминокислотных остатков, или предпочтительно делецию 11, 12, 13, 14, 15, 16 или 17 аминокислотных остатков, между положениями аминокислот 50-71, где нумерация положений аминокислот относится к аминокислотной последовательности ORF4 белка вируса Lelystad, и где в неограничивающем типичном варианте реализации ORF4 белок, который имеет делецию 11 аминокислотных остатков между положениями аминокислот 50-71, представляет собой ORF4 белок, который включает аминокислотную последовательность SEQ ID NO: 34.

Следовательно, в соответствии с четвертым аспектом ((Г)) вирус PPCC в соответствии с настоящим изобретением представляет собой вирус PPCC, предпочтительно вирус PPCC генотипа I, геном которого

включает молекулу нуклеиновой кислоты, которая кодирует ORF4 белок, который имеет делецию 9, 10, 11 или более аминокислотных остатков, или предпочтительно делецию 11, 12, 13, 14, 15, 16 или 17 аминокислотных остатков между положениями аминокислот 50 - 71, где нумерация положений аминокислот относится к аминокислотной последовательности ORF4 белка вируса Lelystad, и где в неограничивающем типичном варианте реализации ORF4 белок, который имеет делецию 11 аминокислотных остатков между положениями аминокислот 50-71, представляет собой ORF4 белок, который включает аминокислотную последовательность SEQ ID NO: 34.

Как описывается в данной заявке, нумерация положений аминокислот, которая относится к вирусу Lelystad, относится к полноразмерной аминокислотной последовательности ORF4 белка вируса Lelystad. Таким образом, нумерация положений аминокислот, как упоминается в контексте данной заявки, является такой по отношению к белку ORF4 вируса Lelystad, содержащему 183 аминокислотных остатка, включая остаток метионина в (N-терминальном) аминокислотном положении 1.

Таким образом, выражение "где нумерация положений аминокислот относится к аминокислотной последовательности ORF4 белка вируса Lelystad", как используется в контексте настоящего изобретения, относится к последовательности ORF4 белка, как представлено в SEQ ID NO: 43.

В соответствии с пятым аспектом ((д)) вирус PPCC в соответствии с настоящим изобретением представляет собой вирус PPCC генотипа II, который включает ORF4 белок, который имеет делецию 5, 6, 7 или более аминокислотных остатков, или предпочтительно делецию 8, 9, 10, 11 или более аминокислотных остатков, между положениями аминокислот 50-67, где нумерация положений аминокислот относится к аминокислотной последовательности ORF4 белка вируса PPCC VR2332, и где в неограничивающем типичном варианте реализации ORF4 белок, который имеет делецию 7 аминокислотных остатков между положениями аминокислот 50-67, представляет собой ORF4 белок, который включает аминокислотную последовательность SEQ ID NO: 35.

Следовательно, в соответствии с пятым аспектом ((Д)) вирус PPCC в соответствии с настоящим изобретением представляет собой вирус PPCC генотипа II, геном которого включает молекулу нуклеиновой кислоты, которая кодирует ORF4 белок, который имеет делецию 5, 6, 7 или более аминокислотных остатков, или предпочтительно делецию 8, 9, 10, 11 или более аминокислотных остатков, между положениями аминокислот 50 - 67, где нумерация положений аминокислот относится к аминокислотной последовательности ORF4 белка вируса PPCC VR2332, и где в неограничивающем типичном варианте реализации ORF4 белок, который имеет делецию 7 аминокислотных остатков между положениями аминокислот 50-67, представляет собой ORF4 белок, который включает аминокислотную последовательность SEQ ID NO: 35.

Как описывается в данной заявке, нумерация положений аминокислот, которые относятся к вирусу PPCC VR2332, относится к полноразмерной аминокислотной последовательности ORF4 белка вируса PPCC VR2332. Таким образом, нумераций положений аминокислот, как упоминается в данном контексте, является такой, которая относится к ORF4 белку вируса VR2332, который имеет 178 аминокислотных остатков, включая остаток метионина в (N-терминальном) аминокислотном положении 1.

Таким образом, фраза "где нумерация положений аминокислот относится к аминокислотной последовательности ORF4 белка вируса PPCC VR2332, который имеет 178 аминокислотных остатков", как используется в контексте настоящего изобретения, относится к последовательности ORF4 белка, как представлено в SEQ ID NO: 44.

В соответствии с шестым аспектом ((е)) вирус PPCC в соответствии с настоящим изобретением представляет собой комбинацию любых из аспектов (а), (б), (в), (г) и (д), как описывается в данной заявке, предпочтительно комбинацию любых из аспектов (а), (б) и (г) или комбинацию любых из аспектов (а), (в) и (д). В этом контексте, в частности, понятно, что фраза "комбинация любого из (а), (б), (в), (г) и (д)" и "комбинация любого из аспектов (а), (б), (в), (г) и (д)", соответственно, означает вирус PPCC, который имеет комбинацию признаков любого из вирусов PPCC (а), (б), (в), (г) и (д), как описывается в данной заявке, где комбинация признаков любого из вирусов PPCC аспектов (а),

(б) и/или (в) или комбинация признаков любого из вирусов PPCC аспектов (а),

(в) и (д) является, в частности, предпочтительной.

Следовательно, в соответствии с шестым аспектом ((Е)) вирус PPCC в соответствии с настоящим изобретением представляет собой комбинацию любых из аспектов (А), (Б), (В), (Г) и (Д), как описывается в данной заявке, предпочтительно комбинацию любых из аспектов (А), (Б) и (Г) или комбинацию любых из аспектов (А), (В) и (Д). В этом контексте является, в частности, понятным, что фраза "комбинация любого из (А), (Б), (В), (Г) и (Д)" и "комбинация любого из аспектов (А), (Б), (В), (Г) и (Д)", соответственно, означает вирус PPCC, который имеет комбинацию признаков любого из вирусов PPCC (А), (Б), (В), (Г) и (Д), как описывается в данной заявке, где комбинация признаков любого из вирусов PPCC аспектов (А), (Б) и/или (В) или комбинация признаков любого из вирусов PPCC аспектов (А), (В) и (Д) является, в частности, предпочтительной.

Вирус PPCC в соответствии с настоящим изобретением предпочтительно включает:

ORF4 белок, который включает или состоит из аминокислотной последовательности, имеющей по крайней мере 84,5%, предпочтительно по крайней мере 90%, более предпочтительно по крайней мере

95%, еще более предпочтительно по крайней мере 97% и в частности предпочтительно по крайней мере 99% идентичности последовательности с аминокислотной последовательностью SEQ ID NO: 36, или ORF4 белок, который включает или состоит из аминокислотной последовательности, кодируемой последовательностью нуклеиновой кислоты, которая имеет по крайней мере 83,5%, предпочтительно по крайней мере 90%, более предпочтительно по крайней мере 95%, еще более предпочтительно по крайней мере 97% и в частности предпочтительно по крайней мере 99% идентичности последовательности с последовательностью нуклеиновой кислоты SEQ ID NO: 37, где указанный вирус PPCC предпочтительно представляет собой вирус PPCC генотипа I, и где указанный вирус PPCC, в частности, представляет собой вирус PPCC генотипа I.

Как используется в данной заявке, в частности, понятно, что термин "идентичность последовательности с аминокислотной последовательностью SEQ ID NO: 36" является эквивалентным термину "идентичность последовательности с аминокислотной последовательностью SEQ ID NO: 36 по всей длине последовательности SEQ ID NO: 36" или термину "идентичность последовательности с аминокислотной последовательностью SEQ ID NO: 36 по всей длине последовательности SEQ ID NO: 36", соответственно.

Кроме того, как используется в данной заявке, является особенно понятным, что термин "идентичность последовательности с последовательностью нуклеиновой кислоты SEQ ID NO: 37" является эквивалентным термину "идентичность последовательности с последовательностью нуклеиновой кислоты SEQ ID NO: 37 по всей длине последовательности SEQ ID NO: 37" или термину "идентичность последовательности с последовательностью нуклеиновой кислоты SEQ ID NO: 37 по всей длине последовательности SEQ ID NO: 37", соответственно.

Идентичность последовательности в контексте первого рассмотрения изобретения понимается как такая, которая основывается на прогрессивном выравнивании (Feng, D. F. и Doolittle, R. F. (1987). Progressive sequence alignment as a prerequisite to correct phylogenetic trees. *J. Mol. Evol.*, 25(4):351-360, которое является введенным в заявку в качестве ссылки). Этот способ основывается на комбинировании последовательностей в выравниваниях, которые, в свою очередь, могут сочетаться с другими последовательностями или выравниваниями с образованием больших выравниваний. Процедуру осуществляют до тех пор, пока все входящие в состав последовательности не будут объединены в одном множественном выравнивании. Для целей в соответствии с настоящим изобретением процент идентичности последовательности определяется с помощью программного обеспечения CLC MAIN WORKBENCH 4.1.1 (CLC BIO).

В одном типичном и неограничивающем варианте осуществления вирус PPCC в соответствии с настоящим изобретением представляет собой вирус PPCC генотипа I, геном которого включает молекулу РНК, кодирующую молекулой нуклеиновой кислоты, которая имеет по крайней мере 84,5%, предпочтительно по крайней мере 90%, более предпочтительно по крайней мере 95%, еще более предпочтительно по крайней мере 97% и в частности предпочтительно по крайней мере 99% идентичности последовательности с последовательностью нуклеиновой кислоты SEQ ID NO: 38.

Как используется в данной заявке, является в частности понятным, что термин "идентичность последовательности с последовательностью нуклеиновой кислоты SEQ ID NO: 38" является эквивалентным термину "идентичность последовательности с последовательностью нуклеиновой кислоты SEQ ID NO: 38 по всей длине последовательности SEQ ID NO: 38" или термину "идентичность последовательности с последовательностью нуклеиновой кислоты SEQ ID NO: 38 по всей длине последовательности SEQ ID NO: 38", соответственно.

В соответствии с другим предпочтительным аспектом вирус PPCC в соответствии с настоящим изобретением является способным индуцировать репродуктивные симптомы у беременных свиноматок и/или респираторные симптомы у поросят.

В соответствии с дополнительным предпочтительным аспектом вирус PPCC в соответствии с настоящим изобретением является способным индуцировать респираторные симптомы у боров.

Таким образом, вирус PPCC в соответствии с настоящим изобретением предпочтительно представляет собой инфекционный вирус PPCC.

Термин "инфекционный вирус PPCC" в соответствии с изобретением, в частности, понимается как вирус PPC, который инфицирует свиней, вызывая ассоциированное заболевание, репродуктивно-респираторный синдром свиней (PPCC).

Указанная инфекция свиней вирусом PPCC в соответствии с настоящим изобретением, в частности, включает прикрепление вируса к хозяйской клетке, проникновение вируса в клетку, разборку вириона, репликацию и транскрипцию вирусного генома, экспрессию вирусных белков, сборку и высвобождение новых инфекционных вирусных частиц.

В одном аспекте изобретение дополнительно относится к вирусу PPCC, предпочтительно к вирусу PPCC в соответствии с настоящим изобретением, генетически модифицированному для содержания в нем экзогенной РНК, где экзогенная РНК встраивается в ORF4 ген указанного вируса, и где экзогенная РНК предпочтительно является встроенной:

а) в участок ORF4 гена указанного вируса, кодирующего аминокислотную последовательность, вы-

бранную из группы, которая состоит из SEQ ID NO: 1-12 или 13-24;

б) в участок ORF4 гена указанного вируса, кодирующего участок, который размещается между первыми двумя спрогнозированными N-терминальными J3-складками, по сравнению с ORF4 белком вируса PPCC генотипа I дикого типа;

с) в участок ORF4 гена указанного вируса, кодирующего участок, который размещается между первыми двумя спрогнозированными N-терминальными β-складками, по сравнению с ORF4 белком вируса PPCC генотипа II дикого типа;

д) в участок ORF4 гена указанного вируса, кодирующего участок, который размещается между положениями аминокислот 50 - 71, где нумерация положений аминокислот относится к аминокислотной последовательности ORF4 белка вируса Lelystad; или

е) в участок ORF4 гена указанного вируса, кодирующего участок, который размещается между положениями аминокислот 50 - 67, где нумерация положений аминокислот относится к аминокислотной последовательности ORF4 белка вируса PPCC VR2332.

Как используется в данной заявке, термин "экзогенная РНК" или "экзогенная последовательность нуклеиновой кислоты", в частности, относится к последовательности нуклеиновой кислоты, которая введена в геном вируса PPCC из внешнего источника, такого, как из рекомбинантной последовательности. Примеры таких внешних источников включают последовательности, которые получены из вируса PPCC, а также последовательности, которые имеют происхождение не от вируса PPCC. Более конкретно, введение экзогенной последовательности нуклеиновой кислоты приводит к получению генома или гена, соответственно, который имеет не существующую в природе часть. Используемый в данном описании термин "экзогенная РНК", таким образом, в частности, относится к нуклеотидной последовательности, которая является такой, которая в природе не обнаруживается в геноме вируса PPCC. Такая не существующая в природе часть или не обнаруженная в природе последовательность, соответственно, может также быть результатом встраивания одной существующей в природе нуклеотидной последовательности в другую существующую в природе нуклеотидную последовательность.

Экзогенная РНК, как описано в настоящей заявке, в частности, кодирует продукт экспрессии, выбранный из группы, которая состоит из эпитопа, который представляет интерес, биологического модулятора ответа, фактора роста, последовательности распознавания и слитого белка, и где указанный эпитоп, который представляет интерес, предпочтительно является эпитопом, который представляет интерес, из антигена или ветеринарного патогена или токсина.

В предпочтительном воплощении указанный эпитоп, который представляет интерес, представляет собой пептид, который кодируется геном ORF5 вируса PPCC, где указанный пептид, который кодируется геном ORF5 вируса PPCC, в частности, включает или состоит из, по крайней мере, 4 последовательных аминокислотных остатков последовательности, как представлено в SEQ ID NO: 39 или, в частности, указанный пептид, который кодируется геном ORF5 вируса PPCC, включает или состоит из аминокислотной последовательности SEQ ID NO: 39.

В другом предпочтительном воплощении указанный эпитоп, который представляет интерес, представляет собой эктодомен ORF4 белка (GP4) из отличного штамма вируса PPCC, где указанный эктодомен GP4 отличного штамма вируса PPCC, в частности, включает или состоит из, по крайней мере, 4 последовательных аминокислотных остатков последовательности, как представлено в SEQ ID NO: 40, или, в частности, указанный эктодомен GP4 отличного штамма вируса PPCC включает или состоит из аминокислотной последовательности SEQ ID NO: 40.

Изобретение также обеспечивает вирус PPCC, который является генетически модифицированным для содержания в нем экзогенной РНК, как описывается в данной заявке, для применения в качестве лекарственного средства.

Настоящее изобретение также обеспечивает вирус PPCC, описанный в данной заявке, для применения в качестве вируса для стимуляции, в частности, если указанный вирус PPCC по своей природе индуцирует вакцинирующее действие при введении в организм животного.

Настоящее изобретение дополнительно обеспечивает применение вируса PPCC в соответствии с настоящим изобретением в качестве вируса для стимуляции, в частности, если указанный вирус PPCC по своей природе индуцирует вакцинирующее действие при введении в организм животного.

Термин "животное", как упомянуто в данной заявке, в частности, относится к свинообразным, в частности, к свиньям, предпочтительно к домашней свинье.

Предпочтительно, когда вирус PPCC должен вводиться или вводится, соответственно, при использовании интраназального, внутримышечного, перорального или внутриматочного пути введения животному.

Также, настоящее изобретение обеспечивает применение вируса PPCC, описанного в данной заявке, в качестве маркера для определения, предпочтительно для дифференциации между инфицированными и вакцинированными животными (DIVA).

В соответствии с дополнительным аспектом изобретение также относится к молекуле ДНК, которая кодирует вирус PPCC, описанный в данной заявке, где указанная молекула ДНК предпочтительно представляет собой изолированную молекулу ДНК и/или где указанная молекула ДНК предпочтительно

включает молекулу нуклеиновой кислоты, которая имеет по крайней мере 84,5%, предпочтительно по крайней мере 90%, более предпочтительно по крайней мере 95%, еще более предпочтительно по крайней мере 97% и в частности предпочтительно по крайней мере 99% идентичности последовательности с последовательностью нуклеиновой кислоты SEQ ID NO: 38.

Настоящее изобретение также обеспечивает конструкцию ДНК, которая включает молекулу ДНК, описанную в данной заявке, где указанная конструкция ДНК представляет собой, в частности, вектор ДНК такой, как плазмида. ДНК векторы или плазмиды, в которые может быть встроена молекула ДНК в соответствии с настоящим изобретением, будут знакомы среднему специалисту в данной области техники. Конструкция ДНК, как описывается в данной заявке, предпочтительно представляет собой изолированную конструкцию ДНК. Как используется в данной заявке, термин "включающий молекулу ДНК", в частности, понимается как такой, который является эквивалентным термину "включающий последовательность молекулы ДНК".

Кроме того, настоящее изобретение обеспечивает РНК транскрипт конструкции ДНК, описанной в данной заявке, где указанный РНК транскрипт предпочтительно представляет собой изолированный РНК транскрипт.

Настоящее изобретение также обеспечивает клетку, трансфицированную с помощью конструкции ДНК, описанной в данной заявке, где указанная клетка предпочтительно представляет собой изолированную клетку.

Кроме того, настоящее изобретение обеспечивает клетку, трансфицированную с помощью РНК транскрипта, упомянутого в данной заявке, где указанная клетка предпочтительно представляет собой изолированную клетку.

Термин "клетки" или "клетка", как упомянуто в данной заявке, предпочтительно представляет собой клетки млекопитающих, в частности, клетки свиней или обезьян, такие как MA-104 клетки или MARC-145 клетки или клетки Vero, более предпочтительно является понятным, что термин "клетки" или "клетка" является направленным на клетки-хозяева вируса PPCC, в частности, на макрофаги свиней. Таким образом, клетка, как упомянуто в данной заявке, является предпочтительно выбранной из группы, которая состоит из клеток свиней, клеток обезьян, MA-104 клеток, MARC-145 клеток, клеток Vero и макрофагов свиней.

В дополнительном аспекте изобретение обеспечивает способ получения вируса PPCC, описанного в данной заявке, где способ включает этап трансфекции клетки при использовании конструкции ДНК, описанной в данной заявке, и, необязательно, сбор вируса из клетки и/или среды.

В одном аспекте изобретение обеспечивает способ получения вируса PPCC, описанного в данной заявке, где способ включает этап трансфекции клетки-хозяина при использовании РНК транскрипта, описанного в данной заявке, и, необязательно, сбор вируса из клетки и/или среды.

Получение нуклеиновой кислоты/молекул ДНК, описанных в данной заявке, находится в пределах компетенции специалиста в данной области техники и может осуществляться в соответствии с рекомбинантными методиками, описанными, среди прочих у Sambrook и др., 2001, Molecular Cloning, A Laboratory Manual, Cold Spring Harbor Laboratory Press, Cold Spring Harbor, NY; Ausubel, и др., 2003, Current Protocols In Molecular Biology, Greene Publishing Associates & Wiley Interscience, NY; Innis и др. (eds), 1995, PCR Strategies, Academic Press, Inc., San Diego; и Erlich (ред.), 1994, PCR Technology, Oxford University Press, New York, которые все являются введенными в данную заявку в качестве ссылки.

2. Второе рассмотрение в соответствии с настоящим изобретением.

В соответствии со вторым рассмотрением, которое подробно изложено в данном разделе, изобретение обеспечивает в одном аспекте молекулу нуклеиновой кислоты, которая кодирует вирус PPCC генотипа I и которая является способной продуцировать живой вектор при трансфекции в клетки, где указанная молекула включает первую последовательность нуклеиновой кислоты, которая имеет по крайней мере 95% идентичности последовательности с последовательностью нуклеиновой кислоты SEQ ID NO: 45, вторую последовательность нуклеиновой кислоты, которая фланкирует 5' конец первой последовательности нуклеиновой кислоты и которая имеет по крайней мере 95% идентичности последовательности с последовательностью нуклеиновой кислоты SEQ ID NO: 46, третью последовательность нуклеиновой кислоты, которая фланкирует 3' конец первой последовательности нуклеиновой кислоты и которая имеет по крайней мере 95% идентичности последовательности с последовательностью нуклеиновой кислоты SEQ ID NO: 47, и нуклеотидную последовательность полиаденина, которая фланкирует 3' конец третьей последовательности нуклеиновой кислоты.

Является предпочтительным, когда указанная первая последовательность нуклеиновой кислоты имеет по крайней мере 96%, предпочтительно по крайней мере 97%, более предпочтительно по крайней мере 98%, еще более предпочтительно по крайней мере 99% и в частности предпочтительно 100% идентичности последовательности с последовательностью нуклеиновой кислоты SEQ ID NO: 45; и/или указанная вторая последовательность нуклеиновой кислоты имеет по крайней мере 96%, предпочтительно по крайней мере 97%, более предпочтительно по крайней мере 98%, еще более предпочтительно по крайней мере 99% и в частности предпочтительно 100% идентичности последовательности с последовательностью нуклеиновой кислоты SEQ ID NO: 46; и/или указанная третья последовательность нуклеиновой кислоты

вой кислоты имеет по крайней мере 96%, предпочтительно по крайней мере 97%, более предпочтительно по крайней мере 98%, еще более предпочтительно по крайней мере 99% и в частности предпочтительно 100% идентичности последовательности с последовательностью нуклеиновой кислоты SEQ ID NO: 47; и/или указанная нуклеотидная последовательность полиаденина состоит из п нуклеотидов аденина, где п представляет собой любое целое число от 1 до 51, и где п предпочтительно равно 12, 13 или 14.

Молекула нуклеиновой кислоты в соответствии с настоящим изобретением предпочтительно представляет собой молекулу ДНК. Предпочтительно, когда указанная молекула нуклеиновой кислоты представляет собой изолированную молекулу нуклеиновой кислоты.

В контексте настоящего изобретения является, в частности, понятным, что термин "нуклеотидная последовательность полиаденина" является эквивалентным термину "последовательность полиадениловой кислоты" или "поли (А) хвост", соответственно. Термин "нуклеотид(ы) аденина", как описывается в данной заявке, в частности, понимается как такой, который является эквивалентным термину "дезоксиаденилат(ы)".

Фраза "нуклеотидная последовательность, которая фланкирует 5' конец (чего-либо)", как описывается в данной заявке, в частности, является эквивалентной фразе "нуклеотидная последовательность, ковалентно связанная с 5' концом (чего-либо)" или, соответственно, фразе "нуклеотидная последовательность, где ее 3' терминальный нуклеотид является ковалентно связанным с 5' терминальным нуклеотидом", и где является, в частности, понятным, что два указанных терминальных нуклеотида являются ковалентно связанными с группой фосфата, присоединенной к 5' углероду пентозы и 3' атому углерода соседней пентозы.

Фраза "нуклеотидная последовательность, которая фланкирует 3' конец (чего-либо)", как описывается в данной заявке, в частности, является эквивалентной фразе "нуклеотидная последовательность, ковалентно связанная с 3' концом (чего-либо)" или, соответственно, фразе "нуклеотидная последовательность, где ее 5' терминальный нуклеотид является ковалентно связанным с 3' терминальным нуклеотидом", и где, в частности, является понятным, что два указанных терминальных нуклеотида являются ковалентно связанными между 3' атомом углерода пентозы и группой фосфата, присоединенной к 5' углероду пентозы соседней пентозы.

Также является понятным, что фраза "имеющая 100% идентичности последовательности с последовательностью нуклеиновой кислоты", как используется в данной заявке, является эквивалентной фразе "является идентичной последовательности нуклеиновой кислоты" или "состоящая из последовательности нуклеиновой кислоты", соответственно.

В особенно предпочтительном аспекте молекула нуклеиновой кислоты в соответствии с настоящим изобретением включает последовательность нуклеиновой кислоты, которая имеет, по крайней мере, 99% идентичности последовательности с последовательностью нуклеиновой кислоты SEQ ID NO: 48, или где указанная молекула нуклеиновой кислоты включает или состоит из РНК копии последовательности нуклеиновой кислоты, которая имеет по крайней мере 99% идентичности последовательности с последовательностью нуклеиновой кислоты SEQ ID NO: 48.

Термин "клетки" или "клетка", как упомянуто в данной заявке, предпочтительно представляет собой клетки млекопитающих, в частности, клетки свиней или обезьян, такие как MA-104 клетки или MARC-145 клетки или клетки Vero, более предпочтительно является понятным, что термин "клетки" или "клетка" является направленным на клетки-хозяева вируса PPCC, в частности, на макрофаги свиней. Таким образом, клетка, как упомянуто в данной заявке, является предпочтительно выбранной из группы, которая состоит из клетки свиней, клетки обезьян, клетки MA-104, клетки MARC-145, клетки Vero и макрофага свиней.

Термин "живой вирус" в соответствии с изобретением, в частности, понимается как вирус PPCC, который имеет способность инфицировать приемлемого субъекта (в противовес инактивированному (убитому) вирусу) и/или инфективность которого является подобной или идентичной таковой для нативного вируса. В частности, живой вирус может инфицировать свои нативные клетки-хозяева.

Указанное инфицирование клеток-хозяев вирусом PPCC, полученным при использовании молекулы нуклеиновой кислоты в соответствии с настоящим изобретением, в частности, включает прикрепление вируса к хозяйской клетке, проникновение вируса в клетку, разборку вириона, репликацию и транскрипцию вирусного генома, экспрессию вирусных белков, сборку и высвобождение новых инфекционных вирусных частиц. Указанное инфицирование клеток-хозяев вирусом PPCC, полученным при использовании молекулы нуклеиновой кислоты в соответствии с настоящим изобретением, дополнительно предпочтительно включает транскрипцию последовательности кДНК, в частности, в ВНК клетках, с получением функциональной молекулы РНК, трансфекцию культивируемых клеток, предпочтительно клеток свиньи, клеток обезьян, MA-104 клеток, MARC-145 клеток, клеток Vero и макрофагов свиньи, с помощью указанной молекулы РНК, получение живых вирионов путем вирусной репликации в указанных культивируемых клетках, изоляцию таких вирионов и инфицирование клеток-хозяев.

В частности, молекула нуклеиновой кислоты в соответствии с настоящим изобретением предпочтительно кодирует аттенуированный вирус PPCC генотипа I или, соответственно, молекула нуклеиновой кислоты в соответствии с настоящим изобретением, которая является способной продуцировать живой

аттенуированный вирус при трансфекции в клетки.

В частности, молекула нуклеиновой кислоты в соответствии с настоящим изобретением кодирует вирус PPCC генотипа I, который не является способным индуцировать тяжелый репродуктивно-респираторный синдром свиней (PPCC) у свиней или, соответственно, молекула нуклеиновой кислоты в соответствии с настоящим изобретением является способной продуцировать живой вирус при трансфекции в клетки, где указанный живой вирус не является способным индуцировать тяжелый репродуктивно-респираторный синдром свиней (PPCC), подобный таковому для вируса дикого типа, у свиней, как вызывается вирулентными полевыми вирусами PPCC.

В одном особом воплощении молекула нуклеиновой кислоты в соответствии с настоящим изобретением кодирует вирус PPCC генотипа I, который является способным достигать титров по крайней мере от 5×10^5 до 1×10^6 дозу заражения 50% культуры ткани (TCID₅₀) на миллилитр (мл) в течение 24 ч после инфекции MA104 клеток, где указанные MA104 клетки предпочтительно являются инфицированными с помощью указанного вируса при МЗ (множественность заражения) от 0,001 до 0,1.

В частности, молекула нуклеиновой кислоты в соответствии с настоящим изобретением кодирует вирус PPCC генотипа I, который является способным достигать титров от 5×10^6 до 1×10^7 или более дозу заражения 50% культуры ткани (TCID₅₀) на миллилитр (мл) в течение 48 ч после инфекции MA104 клеток, где указанные MA104 клетки предпочтительно являются инфицированными с помощью указанного вируса при МЗ (множественности заражения) от 0,001 до 0,1.

Таким образом, молекула нуклеиновой кислоты в соответствии с настоящим изобретением предпочтительно кодирует вирус PPCC генотипа I, который является способным достигать титров по крайней мере от 5×10^5 до 1×10^6 дозу заражения 50% культуры ткани (TCID₅₀) на миллилитр (мл) в течение 24 ч и/или достигать титров по крайней мере от 5×10^6 до 1×10^7 дозу заражения 50% культуры ткани (TCID₅₀) на миллилитр (мл) в течение 48 ч после инфекции MA104 клеток при МЗ (множественности заражения) от 0,001 до 0,1, в частности, при МЗ от 0,001 или 0,01, или 0,1.

В контексте вируса PPCC, как описывается в данной заявке, является понятным, что термин "генотип I" является эквивалентным терминам "генотип 1" или "тип 1" или "европейский (EU)", как часто используется в литературе в контексте вируса PPCC.

В другом предпочтительном воплощении молекула нуклеиновой кислоты в соответствии с настоящим изобретением включает последовательность нуклеиновой кислоты, которая имеет по крайней мере 99,1% или 99,2%, предпочтительно по крайней мере 99,3% или 99,4%, более предпочтительно по крайней мере 99,5% или 99,6%, еще более предпочтительно по крайней мере 99,8% или 99,9% и в частности предпочтительно по крайней мере 99,95% идентичности последовательности с последовательностью нуклеиновой кислоты, представленной в SEQ ID NO: 48.

Идентичность последовательностей в контексте второго рассмотрения изобретения понимают как такую, которая основывается на попарном определении сходства между нуклеотидными последовательностями. Определение процента идентичности между двумя последовательностями предпочтительно осуществляют при использовании математического алгоритма, в частности, хорошо известного алгоритма Смита-Уотермана (Smith and Waterman, M. C. (1981) Mol Biol J, 147 (1): 195-197). Для целей настоящего изобретения процент идентичности нуклеотидной последовательности определяется с помощью алгоритма поиска гомологии Смита-Уотермана при использовании штрафа за открытие пробела 25 и штрафа за удлинение пробела 5. Алгоритм поиска гомологии Смита-Уотермана является описанным у Smith and Waterman (1981) Adv. Appl. Math 2: 482-489, который включен в данную заявку в качестве ссылки. Такое определение идентичности последовательностей может быть осуществлено при использовании, например, DeCypher Hardware Accelerator от TimeLogic Version G, или идентичность последовательности может определяться при использовании программного обеспечения CLC MAIN WORKBENCH 4.1.1 (КРК BIO).

Как используется в данной заявке, является, в частности, понятным, что термин "имеющая, по крайней мере, X% идентичности последовательности с последовательностью нуклеиновой кислоты SEQ ID NO: Y" (или, альтернативно, термин "имеющая, по крайней мере, X% идентичности последовательности с последовательностью нуклеиновой кислоты, представленной в SEQ ID NO: Y") является эквивалентным термину "имеющая, по крайней мере, X% идентичности последовательности с последовательностью нуклеиновой кислоты SEQ ID NO: Y по всей длине последовательности SEQ ID NO: Y" или термину "имеющая, по крайней мере, X% идентичности последовательности с последовательностью нуклеиновой кислоты SEQ ID NO: Y по всей длине последовательности SEQ ID NO: Y", соответственно. В этом контексте "X" представляет собой любое целое число от 95 до 100, в частности, любое целое число, выбранное из 95-99, так что "X% идентичности последовательности" представляет собой любой процент идентичности последовательности, упомянутый в данной заявке. Соответственно, "Y" в этом контексте представляет собой любое целое число, выбранное из 1-6, так, что "SEQ ID NO: Y" представляет собой любую SEQ ID NO, упомянутую в данной заявке.

В особенно предпочтительном воплощении молекула нуклеиновой кислоты в соответствии с настоящим изобретением включает последовательность нуклеиновой кислоты SEQ ID NO: 48.

В другом предпочтительном воплощении молекула нуклеиновой кислоты в соответствии с настоящим изобретением кодирует вирус PPCC генотипа I, который не является способным индуцировать репродуктивно-респираторный синдром свиней (PPCC) у свинообразных или, соответственно, молекула нуклеиновой кислоты в соответствии с настоящим изобретением является способной продуцировать живой вирус при трансфекции в клетки, где указанный инфекционный вирус не является способным индуцировать репродуктивно-респираторный синдром свиней (PPCC) у свинообразных.

Как используется в данной заявке, термин "не является способным индуцировать репродуктивно-респираторный синдром свиней (PPCC)" в частности, относится к уменьшению клинических симптомов PPCC или симптомов, связанных с инфекцией PPCC, соответственно, таких как поражения легких у поросят, репродуктивная недостаточность у беременных свиноматок, и/или длительная PPCC виремия, по сравнению с диким типом вириуса PPCC. В одном из аспектов вириус PPCC генотипа I, который не является способным индуцировать PPCC у свиней, таким образом, представляет собой вириус, который демонстрирует один или более клинических признаков, когда вводится свиньям, по сравнению с диким типом вириуса PPCC, который вводится свинообразным. Термин "вириуса PPCC дикого типа", как упомянуто в данной заявке, в частности, относится к вириусу PPCC генотипа I дикого типа.

Настоящее изобретение также обеспечивает конструкцию ДНК, которая включает молекулу нуклеиновой кислоты в соответствии с данным изобретением, где указанная конструкция ДНК представляет собой, в частности, вектор ДНК такой, как плазмида. Термины ДНК векторы или плазмиды, в которые может быть встроена нуклеотидная молекула в соответствии с настоящим изобретением, являются понятными специалисту в данной области техники. Конструкция ДНК, как описывается в данной заявке, предпочтительно представляет собой изолированную конструкцию ДНК. Как используется в данной заявке, термин "включающий молекулу нуклеиновой кислоты" или "включающий молекулу ДНК", соответственно, понимается, в частности, как такой, который является эквивалентным термину "включающий последовательность молекулы нуклеиновой кислоты" или "включающий последовательность молекулы ДНК", соответственно.

Кроме того, настоящее изобретение обеспечивает РНК транскрипт конструкции ДНК, описанный в данной заявке, где указанный РНК транскрипт предпочтительно представляет собой изолированный РНК транскрипт.

Настоящее изобретение также обеспечивает клетку, трансфицированную с помощью конструкции ДНК, описанной в данной заявке, где указанная клетка предпочтительно представляет собой изолированную клетку.

Таким образом, настоящее изобретение также обеспечивает вириус PPCC генотипа I, который производится в упомянутой выше клеткой, где указанный вириус PPCC генотипа I предпочтительно представляет собой изолированный вириус PPCC генотипа I.

Кроме того, настоящее изобретение обеспечивает клетку, трансфицированную с помощью РНК транскрипта, упомянутого в данной заявке, где указанная клетка предпочтительно представляет собой изолированную клетку.

Таким образом, настоящее изобретение также обеспечивает вириус PPCC генотипа I, который производится в упомянутой выше клеткой, где указанный вириус PPCC генотипа I предпочтительно представляет собой изолированный вириус PPCC генотипа I.

Настоящее изобретение также обеспечивает вириус PPCC генотипа I, геном которого включает молекулу нуклеиновой кислоты в соответствии с настоящим изобретением или геном которого включает молекулу РНК, которая кодируется молекулой нуклеиновой кислоты в соответствии с настоящим изобретением, где указанный вириус PPCC генотипа I предпочтительно представляет собой изолированный вириус PPCC генотипа I.

В одном аспекте настоящее изобретение обеспечивает способ получения вириуса PPCC генотипа I, где указанный способ включает трансфекцию клетки с помощью конструкции ДНК, описанной в данной заявке.

Кроме того, настоящее изобретение обеспечивает способ получения вириуса PPCC генотипа I, где указанный способ включает трансфекцию клетки с помощью РНК транскрипта, упомянутого в данной заявке.

Еще в одном аспекте настоящее изобретение обеспечивает композицию, где указанная композиция включает молекулу нуклеиновой кислоты в соответствии с изобретением, супензированную в приемлемом количестве фармацевтически приемлемого разбавителя или наполнителя.

Получение молекул нуклеиновой кислоты, описанных в данной заявке, находится в компетенции специалиста в данной области техники и может быть осуществлено в соответствии с рекомбинантными методиками, описанными в других источниках, например, у Sambrook и др., 2001, Molecular Cloning, A Laboratory Manual, Cold Spring Harbor Laboratory Press, Cold Spring Harbor, NY; Ausubel, и др., 2003, Current Protocols In Molecular Biology, Greene Publishing Associates & Wiley Interscience, NY; Innis и др. (eds), 1995, PCR Strategies, Academic Press, Inc., San Diego; и Erlich (ed), 1994, PCR Technology, Oxford University Press, New York, которые все являются введенными в данную заявку в качестве ссылки.

В еще одном аспекте изобретение также относится к применению молекулы нуклеиновой кислоты в

соответствии с изобретением или конструкцией ДНК, описанный в данной заявке для получения аттенуированного вируса генотипа I, где одна или более мутаций являются введенными в молекулу нуклеиновой кислоты или в конструкцию ДНК.

Изобретение также обеспечивает способ получения аттенуированного вируса PPCC генотипа I, который включает этап введения одной или более мутаций в молекулу нуклеиновой кислоты в соответствии с изобретением или в конструкцию ДНК, описанную в данной заявке.

Предпочтительно, одна или более мутаций, описанных в данной заявке, вводят в первую последовательность нуклеиновой кислоты, которая имеет, по крайней мере, 95% идентичности последовательности с последовательностью нуклеиновой кислоты SEQ ID NO: 45.

Термин "аттенуированный вирус PPCC", как описывается в данной заявке, в частности, относится к вирусу PPCC, который является аттенуированным *in vitro* и/или *in vivo*, в частности, в чувствительных клеточных линиях и/или хозяине.

Термин "хозяин", как используется в данной заявке, в частности, относится к животным, которые инфицированы с помощью вируса PPCC, в частности, к свинообразным, более конкретно, к свиньям, таким, как домашняя свинья.

Как упомянуто в данной заявке, "аттенуированный", в частности, относится к сниженной вирулентности патогена, в частности, вируса PPCC дикого типа, где под "вирулентностью" понимается степень патогенности, и где "патогенность" относится к способности возбудителя вызывать клинические признаки у хозяина или потомства хозяина, например, репродуктивную недостаточность.

Термин "вирус PPCC дикого типа" или "PPCC дикого типа", соответственно, как используется в данной заявке, в частности, относится к инфекционному патогенному вирусу PPCC, который является, в частности, способным вызывать PPCC у свиней. В одном особенно предпочтительном варианте осуществления изобретения термин "вирус PPCC дикого типа" относится к вирусу PPCC, геном которого содержит последовательность РНК или состоит из РНК полинуклеотида, в котором указанная РНК последовательность или РНК полинуклеотид представляет собой РНК копию последовательности SEQ ID NO: 41 (что соответствует вирусу Lelystad с полным геном).

Предпочтительно, одна или более мутаций, как описывается в данной заявке, включают или состоят из одной или более точечных мутаций и/или одной или более геномных делеций и/или одной или более инсерций.

Кроме того, изобретение обеспечивает аттенуированный вирус PPCC генотипа I, геном которого включает молекулу РНК, которая кодируется молекулой нуклеиновой кислоты в соответствии с изобретением, но где указанная первая последовательность нуклеиновой кислоты, которая имеет, по крайней мере, 95% идентичности последовательности с последовательностью нуклеиновой кислоты SEQ ID NO: 45, содержит одну или более мутаций, которые аттенуируют кодируемый вирус PPCC и/или которые отключают кодируемый вирус PPCC для супрессии продукции интерферона типа I и секреции клеткой, инфицированной указанным вирусом, и где указанный аттенуированный вирус PPCC генотипа I предпочтительно представляет собой изолированный аттенуированный вирус PPCC генотипа I.

Изобретение также обеспечивает применение аттенуированного вируса PPCC генотипа I, описанного в данной заявке, для получения лекарственного средства, в частности, вакцины или вакцинной композиции, для предотвращения клинических симптомов инфекции вирусом PPCC, как например, путем уменьшения симптомов инфекции вирусом PPCC, например, снижения длительности виреемии вируса PPCC.

Термин "предотвращение" или "снижение", соответственно, как используется в данной заявке, означает, но без ограничения, способ, который включает введение антигена вируса PPCC, в частности, аттенуированного вируса PPCC генотипа I, описанного в данной заявке, животному, где указанный антиген вируса PPCC, при введении указанному животному вызывает или способен вызвать иммунный ответ у указанного животного против вируса PPCC. В совокупности такое лечение приводит к снижению клинических симптомов PPCC или симптомов, ассоциированных с инфекцией вирусом PPCC, соответственно. В частности, термин "предотвращение", как используется в данной заявке, означает в общем случае процесс профилактики, при котором животное подвергают воздействию иммуногенной композиции в соответствии с настоящим изобретением перед индукцией или началом процесса болезни (PPCC).

В данной заявке "снижение клинических симптомов инфекции вирусом PPCC" означает, но без ограничения таковыми, как снижение количества инфицированных субъектов в группе, снижение или устранение количества субъектов, которые демонстрируют клинические симптомы инфекции, или снижение тяжести каких-либо клинических симптомов, которые присутствуют у субъекта, по сравнению с инфекцией вирусом PPCC дикого типа. Например, оно должно относиться к любому снижению патогенной нагрузки, распространения патогена, снижению передачи патогена или уменьшению любого клинического признака, типичного для PPCC инфекции, в частности, репродуктивной недостаточности и/или индукции поражения легких. Предпочтительные эти клинические признаки уменьшаются у субъектов, получающих аттенуированный вирус РСС генотипа I соответствии с настоящим изобретением, по крайней мере, на 10% по сравнению с субъектами, не получающими композицию и которые могут подвергаться инфицированию. Более предпочтительным является, когда клинические признаки снижаются у

пациентов, получающих композицию в соответствии с настоящим изобретением по крайней мере на 20%, предпочтительно по крайней мере на 30%, более предпочтительно по крайней мере на 40%, еще более предпочтительно по крайней мере на 50%, еще более предпочтительно по крайней мере на 60% и более предпочтительным по крайней мере на 70%, еще более предпочтительно по крайней мере на 80%, еще более предпочтительно по крайней мере на 90% и наиболее предпочтительно на 100%.

Термин "субъект", как упомянуто в данной заявке, в частности, относится к животному.

Термин "животное", как упомянуто в данной заявке, в частности, относится к свинообразным, например, к свинье, предпочтительно к домашней свинье.

Термин "снижение длительности виремии вируса PPCC" означает, но без ограничения, снижение длительности поступления вируса PPCC в кровь животного, по крайней мере, на один день по сравнению с субъектами, которые не получали композиции, и были инфицированы вирусом PPCC дикого типа.

Термин "виремия" относится к присутствию вируса PPCC в крови инфицированных животных, как отражается, например, путем определения числа копий РНК вируса PPCC в сыворотке крови.

Также, изобретение относится к вакцинной композиции, которая включает вирус PPCC с аттенуированным генотипом I, описанный в данной заявке, суспендированный в приемлемом количестве фармацевтически приемлемого разбавителя или наполнителя.

Один или более фармацевтически приемлемых носителей или разбавителей, как упомянуто в данной заявке, являются предпочтительно выбранными из группы, которая состоит из растворителей, дисперсионной среды, адьювантов, стабилизирующих агентов, разбавителей, консервантов, антибактериальных и антитриковых агентов, изотонических агентов и агентов, которые замедляют адсорбцию.

В предпочтительном аспекте иммуногенная композиция в соответствии с изобретением включает количество от 10^1 до 10^7 вирусных частиц вируса PPCC аттенуированного генотипа I, описанного в данной заявке, на дозу предпочтительно от 10^3 до 10^6 частиц на дозу, более предпочтительно от 10^4 до 10^6 частиц на дозу.

В другом предпочтительном аспекте иммуногенная композиция в соответствии с изобретением включает количество вируса PPCC в соответствии с изобретением, которое является эквивалентным титру вируса, по крайней мере, приблизительно 10^3 TCID (инфицирующая доза для тканевой культуры)₅₀/мл на дозу, предпочтительно от 10^3 до 10^5 TCID₅₀/мл на дозу.

Как используется в данной заявке, термин "вакцинная композиция" в частности, относится к композиции, которая будет вызывать протективный иммунный ответ у животного, которое подвергается воздействию композиции. Иммунный ответ может включать индукцию антител и/или индукцию Т-клеточного ответа.

Обычно "иммунный ответ" включает, но не ограничивается, одним или более из следующих эффектов: продукция и активация антител, В-клеток, хелперных Т-клеток, супрессорных Т-клеток и/или цитотоксических Т-клеток, специфически направленных на антиген или антигены, включенные в состав композиции или вакцины, которые представляют интерес. Предпочтительно, хозяин будет демонстрировать либо терапевтический, либо протективный иммунный (память) ответ так, что устойчивость к новой инфекции будет повышаться и/или клиническая тяжесть заболевания будет снижаться. Такая защита будет демонстрироваться либо снижением количества, либо тяжести клинических симптомов, либо отсутствием одного или более клинических симптомов, ассоциированных с инфекцией патогеном, отсрочкой начала виремии, сниженной персистенцией вируса, снижением общей вирусной нагрузки и/или снижением экскреции вируса.

Таким образом, "иммунный ответ", в частности, означает, но без ограничения таковым, как развитие подмножества факторов клеточного и/или опосредованного антителами иммунного ответа на композицию или вакцину, которые представляют интерес.

Кроме того, изобретение относится к вакцинной композиции в соответствии с изобретением для применения в способе для предотвращения клинических симптомов инфекции вирусом PPCC, например, путем уменьшения клинических симптомов инфекции вирусом PPCC, например, снижения длительности виремии вируса PPCC.

Кроме того, изобретение обеспечивает способ для предотвращения клинических симптомов инфекции PPCC, например, путем уменьшения клинических симптомов инфекции вирусом PPCC, например, путем снижения длительности виремии вируса PPCC, где указанный способ включает этап введения вакцины в соответствии с изобретением животному, которое в этом нуждается.

Воплощения в соответствии со вторым рассмотрением настоящего изобретения.

Следующие пункты также являются описанными в данной заявке.

1. Молекула нукleinовой кислоты, которая кодирует вирус PPCC генотипа I и которая является способной продуцировать живой вирус при трансфекции в клетки, где указанная молекула включает первую последовательность нукleinовой кислоты, которая имеет, по крайней мере, 95% идентичности последовательности с последовательностью нукleinовой кислоты SEQ ID NO: 45, вторую последовательность нукleinовой кислоты, которая фланкирует 5' конец первой последовательности нукleinовой кислоты и которая имеет по крайней мере 95% идентичности последовательности с последовательностью нукleinовой кислоты SEQ ID NO: 46, третью последовательность нукleinовой кислоты, которая

фланкирует 3' конец первой последовательности нуклеиновой кислоты и которая имеет по крайней мере 95% идентичности последовательности с последовательностью нуклеиновой кислоты SEQ ID NO: 47, и нуклеотидную последовательность полиаденина, которая фланкирует 3' конец третьей последовательности нуклеиновой кислоты.

2. Молекула нуклеиновой кислоты в соответствии с п.1, где указанная первая последовательность нуклеиновой кислоты имеет по крайней мере 96%, предпочтительно по крайней мере 97%, более предпочтительно по крайней мере 98%, еще более предпочтительно по крайней мере 99% и в частности предпочтительно 100% идентичности последовательности с последовательностью нуклеиновой кислоты SEQ ID NO: 45; и/или указанная вторая последовательность нуклеиновой кислоты имеет по крайней мере 96%, предпочтительно по крайней мере 97%, более предпочтительно по крайней мере 98%, еще более предпочтительно по крайней мере 99% и в частности предпочтительно 100% идентичности последовательности с последовательностью нуклеиновой кислоты SEQ ID NO: 46; и/или указанная третья последовательность нуклеиновой кислоты имеет по крайней мере 96%, предпочтительно по крайней мере 97%, более предпочтительно по крайней мере 98%, еще более предпочтительно по крайней мере 99% и в частности предпочтительно 100% идентичности последовательности с последовательностью нуклеиновой кислоты SEQ ID NO: 47; и/или указанная нуклеотидная последовательность полиаденина состоит из нуклеотидов аденина, где n представляет собой целое число от 1 до 51 и где n предпочтительно равно 12, 13 или 14.

3. Молекула нуклеиновой кислоты в соответствии с п.1 или 2, где указанный вирус является аттенуированным и/или где указанный вирус является способным индуцировать протективный иммунный ответ против респираторных и/или репродуктивных симптомов заболевания после инфекции вирусом репродуктивно-респираторного синдрома свиней (PPCC) у свинообразных.

4. Молекула нуклеиновой в соответствии с любым из пп.1-3, где указанный вирус является способным достигать титров по крайней мере от 5×1^5 до 1×10^6 дозы заражения 50% культуры ткани (TCID₅₀) на миллилитр (мл) в течение 24 ч после инфекции клеток MA104, предпочтительно при M3 (множественности заражения) от 0,001 до 0,1.

5. Молекула нуклеиновой в соответствии с любым из пп.1-4, где указанный вирус является способным достигать титров по крайней мере от 5×1^6 до 1×10^7 дозы заражения 50% культуры ткани (TCID₅₀) на миллилитр (мл) в течение 48 ч после инфекции клеток MA104, предпочтительно при M3 (множественности заражения) от 0,001 до 0,1.

6. Молекула нуклеиновой в соответствии с любым из пп.1-5, где указанная молекула включает последовательность нуклеиновой кислоты, которая имеет по крайней мере 91% или 92%, предпочтительно по крайней мере 93% или 94%, более предпочтительно по крайней мере 95% или 96%, еще более предпочтительно по крайней мере 98% или 99% и в частности предпочтительно по крайней мере 99% идентичности последовательности с последовательностью нуклеиновой кислоты SEQ ID NO: 48.

7. Молекула нуклеиновой в соответствии с любым из пп.1-6, где указанная молекула включает последовательность нуклеиновой кислоты, которая имеет по крайней мере 99,1% или 99,2%, предпочтительно по крайней мере 99,3% или 99,4%, более предпочтительно по крайней мере 99,5% или 99,6%, еще более предпочтительно по крайней мере 99,8% или 99,9% и в частности, предпочтительно по крайней мере 99,95% идентичности последовательности с последовательностью нуклеиновой кислоты SEQ ID NO: 48.

8. Молекула нуклеиновой в соответствии с любым из пп.1-7, где указанная молекула включает последовательность нуклеиновой кислоты SEQ ID NO: 48.

9. Молекула нуклеиновой в соответствии с любым из пп.1-8, где указанный вирус не является способным индуцировать тяжелый репродуктивно-респираторный синдром свиней (PPCC) у свинообразных, как вызывается с помощью вирулентных полевых штаммов вируса PPCC.

10. Молекула нуклеиновой в соответствии с любым из пп.1-9, где указанная молекула представляет собой молекулу ДНК.

11. Конструкция ДНК, которая включает молекулу ДНК в соответствии с п.10.

12. РНК транскрипт конструкции ДНК в соответствии с п.11.

13. Клетка, тарифицированная с помощью конструкции ДНК в соответствии с п.11.

14. Клетка, трансфицированная с помощью РНК транскрипта в соответствии с п.12.

15. Вирус PPCC генотипа I, полученный с помощью клетки в соответствии с п.13.

16. Вирус PPCC генотипа I, полученный с помощью клетки в соответствии с п.14.

17. Вирус PPCC генотипа I, геном которого включает молекулу нуклеиновой кислоты в соответствии с любым из пп.1-9 или геном которого включает молекулу РНК, которая кодируется молекулой нуклеиновой кислоты в соответствии с любым из пп.1-10.

18. Способ получения вируса PPCC генотипа I, который включает трансфекцию клетки с помощью конструкции ДНК в соответствии с п.11.

19. Способ получения вируса PPCC генотипа I, который включает трансфекцию клетки-хозяина с помощью РНК транскрипта в соответствии с п.12.

20. Композиция, которая включает молекулу нуклеиновой в соответствии с любым из пп.1-10, супендируемую в приемлемом количестве фармацевтически приемлемого разбавителя или наполнителя.

21. Применение молекулы нуклеиновой в соответствии с любым из пп.1-10 или конструкции ДНК в соответствии с п.11 для получения аттенуированного вируса PPCC генотипа I, где одна или более мутаций являются введенными в молекулу нуклеиновой кислоты или в конструкцию ДНК.

22. Способ получения аттенуированного вируса PPCC генотипа I, который включает этап введения одной или более мутаций в молекулу нуклеиновой в соответствии с любым из пп.1-10 или в конструкцию ДНК в соответствии с пунктом 11.

23. Аттенуированный вирус PPCC генотипа I, геном которого включает молекулу РНК, которая кодируется молекулой нуклеиновой кислоты в соответствии с любым из пп.1-10, но где указанная первая последовательность нуклеиновой кислоты, которая имеет по крайней мере 95% идентичности последовательности с последовательностью нуклеиновой кислоты SEQ ID NO: 45 содержит одну или более мутаций, которые не позволяют кодирующему вирусу PPCC супрессировать продукцию интерферона типа I и его секрецию клеткой, инфицированной с помощью указанного вируса.

24. Применение аттенуированного вируса PPCC генотипа I в соответствии с любым из пп.21-23 для получения лекарственного средства для предотвращения клинических симптомов инфекции PPCC.

25. Вакцинальная композиция, которая включает аттенуированный вирус PPCC генотипа I в соответствии с любым из пп.21-23, супендируемый в приемлемом количестве фармацевтически приемлемого разбавителя или наполнителя.

26. Вакцинальная композиция в соответствии с п.25 для применения в способе для предотвращения клинических симптомов инфекции PPCC.

27. Способ для предотвращения клинических симптомов инфекции PPCC, который включает этап введения вакцинальной композиции в соответствии с п.26 животному, которое в этом нуждается.

3. Третье рассмотрение в соответствии с настоящим изобретением.

В соответствии с третьим рассмотрением, которое подробно изложено в этом разделе, изобретение базируется на обнаружении того, что первое рассмотрение в соответствии с настоящим изобретением может сочетаться со вторым рассмотрением в соответствии с настоящим изобретением. Таким образом, третье рассмотрение в соответствии с настоящим изобретением относится к комбинации (1) аспектов и воплощений первого рассмотрения в соответствии с настоящим изобретением и (2) аспектов и воплощений второго рассмотрения в соответствии с настоящим изобретением. Таким образом, является понятным, что все возможные признаки и определения, в частности, признаки и определения, которые относятся к вирусу PPCC генотипа I первого рассмотрения в соответствии с настоящим изобретением могут произвольным образом сочетаться с признаками и определениями второго рассмотрения в соответствии с настоящим изобретением.

В одном аспекте молекула нуклеиновой кислоты в соответствии со вторым рассмотрением настоящего изобретения, таким образом, кодирует вирус репродуктивно-респираторного синдрома свиней (PPCC) в соответствии с первым рассмотрением настоящего изобретения, как указано в любом из пп.36-42.

В одном аспекте, соответственно, вирус репродуктивно-респираторного синдрома свиней (PPCC) в соответствии с первым рассмотрением настоящего изобретения, таким образом, кодируется молекулой нуклеиновой кислоты в соответствии со вторым рассмотрением настоящего изобретения, как указано в пп. 56 или 57.

Таким образом, комбинация первого рассмотрения в соответствии с настоящим изобретением со всеми возможными аспектами второго рассмотрения в соответствии с настоящим изобретением, в частности, также отражена в указанных пунктах и в зависимых от них пунктах формулы изобретения.

Изобретение также является направленным на вирус PPCC генотипа I, в частности, упомянутый выше вирус PPCC, геном которого кодируется молекулой нуклеиновой кислоты, которая кодирует вирус PPCC генотипа I и которая является способной продуцировать живой вирус при трансфекции в клетки, где указанная молекула включает последовательность нуклеиновой кислоты, которая имеет, по крайней мере 91% или 92%, предпочтительно по крайней мере 93% или 94%, более предпочтительно по крайней мере 95% или 96%, еще более предпочтительно по крайней мере 98% или 99% и в частности предпочтительно по крайней мере 99% или 100% идентичности последовательности с последовательностью нуклеиновой кислоты SEQ ID NO: 48, но где указанная последовательность нуклеиновой кислоты содержит мутацию, которая приводит к получению указанного вируса, который включает ORF4 белок, имеющий делецию 9, 10, 11 или более аминокислотных остатков между положениями аминокислот 50-71, где нумерация положений аминокислот относится к аминокислотной последовательности ORF4 белка вируса Lelystad.

Изобретение также относится к вирусу PPCC генотипа I, геном которого кодируется молекулой нуклеиновой кислоты, которая кодирует вирус PPCC генотипа I и которая является способной продуцировать живой вирус при трансфекции в клетки, где указанная молекула включает последовательность нуклеиновой кислоты, которая имеет по крайней мере 91 или 92%, предпочтительно по крайней мере 93 или 94%, более предпочтительно по крайней мере 95 или 96%, еще более предпочтительно по крайней

мере 98 или 99% и в частности, предпочтительно по крайней мере 99 или 100% идентичности последовательности с последовательностью нуклеиновой кислоты SEQ ID NO: 48, но где указанная последовательность нуклеиновой кислоты содержит мутацию, которая приводит к получению указанного вируса, который включает ORF4 белок, имеющий делецию 11, 12, 13, 14, 15, 16 или 17 аминокислотных остатков между положениями аминокислот 50-71, где нумерация положений аминокислот относится к аминокислотной последовательности ORF4 белка вируса Lelystad.

Изобретение также предполагает вирус PPCC генотипа I, геном которого кодируется молекулой нуклеиновой кислоты, которая кодирует вирус PPCC генотипа I и которая является способной продуцировать живой вирус при трансфекции в клетки, где указанная молекула включает последовательность нуклеиновой кислоты, которая имеет по крайней мере 91 или 92%, предпочтительно по крайней мере 93 или 94%, более предпочтительно по крайней мере 95 или 96%, еще более предпочтительно по крайней мере 98 или 99% и в частности предпочтительно по крайней мере 99 или 100% идентичности последовательности с последовательностью нуклеиновой кислоты SEQ ID NO: 48, но где указанная последовательность нуклеиновой кислоты содержит мутацию, которая приводит к получению указанного вируса, который включает ORF4 белок, имеющий делецию 13 аминокислотных остатков между положениями аминокислот 56-70 или между положениями аминокислот 57-69, где нумерация положений аминокислот относится к аминокислотной последовательности ORF4 белка вируса Lelystad.

Мутация, как упоминается в данной заявке, предпочтительно представляет собой делецию.

Предпочтительно, вирус PPCC в соответствии с изобретением является генетически модифицированным для содержания в нем экзогенной РНК, где экзогенная РНК встраивается в orf4 ген указанного вируса, и где экзогенная РНК является, в частности, встроенной в участок orf4 гена указанного вируса, кодирующего участок, который размещается между положениями аминокислот 50-71, где нумерация положений аминокислот относится к аминокислотной последовательности ORF4 белка вируса Lelystad.

В другом предпочтительном аспекте экзогенная РНК встраивается в orf4 ген вируса и заменяет нуклеотидную последовательность, кодирующую аминокислотные остатки, удаленные в контексте данного изобретения.

В соответствии с дополнительным предпочтительным аспектом экзогенная РНК кодирует продукт экспрессии, выбранный из группы, которая состоит из эпитопа, который представляет интерес, модулятора биологического ответа, фактора роста, последовательности узнавания, слитого белка, где эпитоп, который представляет интерес, предпочтительно является эпитопом, который представляет интерес, из антигена или ветеринарного патогена, или токсина.

В частности, эпитоп, который представляет интерес, является пептидом, который кодируется orf5 геном вируса PPCC, или представляет собой аминокислотную последовательность, которая кодируется геном orf5 вируса PPCC, где указанный пептид или аминокислотная последовательность, которая кодируется геном orf5 вируса PPCC предпочтительно включает или состоит из аминокислотной последовательности SEQ ID NO: 39 или SEQ ID NO: 50 или предпочтительно включает или состоит по крайней мере из 4 последовательных аминокислотных остатков последовательности, как представлено в SEQ ID NO: 39 или SEQ ID NO: 50, или предпочтительно включает или состоит из аминокислотной последовательности SEQ ID NO: 51 или SEQ ID NO: 52.

В соответствии с другим предпочтительным аспектом экзогенная РНК кодирует аминокислотную последовательность, выбранную из группы, которая состоит из SEQ ID NO: 53-55.

В особенно предпочтительном аспекте изобретение обеспечивает, в качестве неограничивающего примера, вирус PPCC генотипа I, геном которого кодируется молекулой нуклеиновой кислоты, которая включает последовательность нуклеиновой кислоты, выбранную из группы, которая состоит из любой из SEQ ID NO: 56-59.

Вирус PPCC в соответствии с любым из пп.58-73, где указанный вирус представляет собой изолированный вирус и/или где указанная мутация представляет собой делецию.

Вирус PPCC, как упомянуто в данной заявке, который предпочтительно представляет собой изолированный вирус и/или не существующий в природе вирус.

Изобретение также является направленным на вирус PPCC генотипа I, где указанный вирус включает ORF4 белок, который имеет остаток пролина в положении аминокислоты 56 и/или который имеет остаток глутамина в положении аминокислоты 66, где нумерация положений аминокислот относится к аминокислотной последовательности ORF4 белка вируса Lelystad, и где аминокислотная последовательность ORF4 белка вируса Lelystad представляет собой последовательность, представленную в SEQ ID NO: 43.

Изобретение также касается вируса PPCC генотипа I, геном которого включает молекулу нуклеиновой кислоты, кодирующую ORF4 белок, который имеет остаток пролина в положении аминокислоты 56 и/или который имеет остаток глутамина в положении аминокислоты 66, где нумерация положений аминокислот относится к аминокислотной последовательности ORF4 белка вируса Lelystad, и где геном указанного вируса предпочтительно кодируется молекулой нуклеиновой кислоты, где указанная молекула включает последовательность нуклеиновой кислоты, которая имеет по крайней мере 91 или 92%, предпочтительно по крайней мере 93 или 94%, более предпочтительно по крайней мере 95 или 96%, еще бо-

лее предпочтительно по крайней мере 98 или 99% и в частности предпочтительно по крайней мере 99% идентичности последовательности с последовательностью нуклеиновой кислоты SEQ ID NO: 45 или SEQ ID NO: 48.

Такой вирус PPCC генотипа I, геном которого включает молекулу нуклеиновой кислоты, которая кодирует ORF4 белок, имеющий остаток пролина в положении аминокислоты 56, представляет собой типичный неограничивающий аспект вируса PPCC, геном которого кодируется молекулой нуклеиновой кислоты, которая включает последовательность нуклеиновой кислоты SEQ ID NO: 58.

В другом типичном неограничивающем аспекте такой вирус PPCC генотипа I, геном которого включает молекулу нуклеиновой кислоты, кодирующую ORF4 белок, который имеет остаток глутамина в положении аминокислоты 66, представляет собой вирус PPCC, геном которого кодируется молекулой нуклеиновой кислоты, которая включает последовательность нуклеиновой кислоты SEQ ID NO: 57.

Вирус PPCC в соответствии с изобретением предпочтительно предназначен для применения в качестве лекарственного средства или для использования в профилактике или лечении репродуктивно-респираторного синдрома свиней, в частности, у свинообразных, и где, необязательно, указанный вирус, который предназначен для введения, или вводится, соответственно, путем интраназального, внутримышечного, перорально или внутриматочного способа введения животному, в частности свинье.

Лекарственное средство, как упоминается в данном описании, предпочтительно представляет собой вакцину.

В соответствии с другим аспектом вирус PPCC по изобретению предпочтительно используется в качестве маркера для определения, предпочтительно для дифференциации между инфицированными и вакцинированными животными (DIVA).

Еще в одном аспекте изобретение относится к молекуле ДНК, которая кодирует вирус PPCC в соответствии с изобретением и где указанная молекула ДНК предпочтительно включает молекулу нуклеиновой кислоты, которая имеет последовательность, выбранную из группы, которая состоит из SEQ ID NO: 56-58.

Еще в одном аспекте изобретение предпочтительно относится к изолированной конструкции ДНК, которая включает указанную молекулу ДНК, предпочтительно включает ее изолированный РНК транскрипт.

В соответствии с еще одним аспектом изобретение также предпочтительно относится к изолированной клетке, трансфицированной с помощью указанной конструкции ДНК или указанного РНК транскрипта.

Изобретение также относится к способу получения вируса PPCC в соответствии с изобретением, где указанный способ включает этап трансфекции клетки при использовании указанной конструкции ДНК или включает этап трансфекции клетки-хозяина с помощью указанного РНК транскрипта.

В заключение следует отметить, что информация, которая обеспечивает возможность встраивания делеции в соответствии с настоящим изобретением в последовательность, кодирующую эктодомен GP4 вируса PPCC, такого как вирус PPCC генотипа I, в настоящее время обеспечивает ряд полезных применений.

Вирус, который основывается на этой информации, может быть использован в качестве изолята для контрольного заражения для парентерального, перорального, интраназального, внутри маточного инфицирования и для инфицирования при использовании спермы у положительных по PPCC и интактных по PPCC и/или чувствительных к PPCC видов.

Изобретение обеспечивает делеционные маркеры для серологической дифференциации или для дифференциации последовательностей (DIVA концепция), каждого возможного штамма вируса PPCC, для того, чтобы отличить штаммы вируса PPCC генотипа II, невзирая на то, присутствуют ли уже делеции в соответствующем сайте или нет.

Кроме того, делеционные маркеры обеспечиваются для серологической дифференциации также в связи или в комбинации с другими эпитопами. Например, вирусы PPCC без делеции могут отличаться серологически от вирусов PPCC с полной или частичной делецией этих эпитопов (например, Lelystad GP4 aa60-aa71: AAQEKISFGKS, как включено в последовательность SEQ ID NO: 43), путем использования антител, направленных против этого эпитопа. Например, два вируса PPCC, которые имеют делецию в этом участке/домене, могут быть дифференцированы друг от друга в сочетании с другими эпитопами.

Изобретение также обеспечивает инсерционный участок/домен для введения "чужеродной" РНК вместо вирусной РНК в положении, где размещается делеция в соответствии с изобретением (эктодомен GP4).

Инсерция может быть осуществлена как для различных целей, так и для всех возможных штаммов вируса PPCC, а также для штаммов вируса PPCC генотипа II, которые уже имеют небольшую делецию в этом участке.

Встраивание чужеродной последовательности может иметь место, например, в штамм B1 EU PPCC генотипа I, описанный в данной заявке, и может заменять последовательность, кодирующую эктодомен GP4 указанного штамма аминокислотной последовательностью (aa) aa54-aa70 (QSHRASTAQGTTPLRRS (SEQ ID NO: 40)) или ее укороченными производными или производными, полученными в результате

мутагенеза.

Кроме того, для улучшения иммунного ответа также является возможным встраивать один или два последовательных эпитопа Т- или В-клеток:

- а) из других генных/геномных участков вируса PPCC, например, из (i) участка, кодирующего гликопротеин 5 (aa) штамма BI EU PPCCV генотипа I, описанного в данной заявке, например, последовательности, которые кодируют аминокислотные остатки (aa) aa36-aa52 (SSHLQLIYNLTICELNG (SEQ ID NO: 39)), или их укороченные производные или производные, полученные в результате мутагенеза, дополнительно с приемлемым(и) линкером(ами), например, с aa мотивом GSS; соответственно, также из других изолятов вируса PPCC, например, из прототипного изолята Lelystad вируса PPCC генотипа I или, соответственно, из вирусов PPCC других генотипов, таких, как, например, из прототипного изолята VR2332 вируса PPCC генотипа II;
- б) из других патогенов, например, из другого патогена свиньи, для установления или улучшения иммунного ответа против указанного(ых) патогена(ов);
- с) из неспецифических для вируса эпитопов Т- или В-клеток в качестве генетического или серологического позитивного маркера, также в комбинации с а);
- д) из иммунологических энхансеров, отличных от а), например, цитокинов, в качестве примера, интерлейкинов, также в комбинации с б).

Для улучшения иммунного ответа является также возможным встраивать один или более последовательных эпитопов Т- или В-клеток для снижения патогенности вируса.

Примеры

Пример 1.

а) Изоляция вируса PPCC.

Вирус PPCC изолировали из образцов крови (bS-720789), которые ранее были тестированы как позитивные в ПЦР определении вируса PPCC EU-типа. Изоляцию вируса осуществляли на MA104 клетках. После размножения изолированного вируса PPCC EU-типа на MA104 клетках исходный материал вируса для полного геномного секвенирования получали путем ультрацентрифугирования на сахарозной подушке, после чего осуществляли обработку РНКазой и ДНКазой. В завершение, вирусную РНК экстрагировали из полученного материала вируса и подвергали полному секвенированию генома (Roche 454 platform). Полученная последовательность генома (14854 нуклеотидов) продемонстрировала делецию из 33 нуклеотидов в ORF4 по сравнению с последовательностью эталонного генома EU-типа штамма Lelystad.

б) Инфекция.

Инфекция боровов с помощью вируса а) вызывает серьезные клинические симптомы PPCC.

Пример 2.

а) Получение и характеристика нового клона инфекционной кДНК вируса PPCC EU типа.

Этот пример описывает получение и характеристику нового клона инфекционной кДНК вируса PPCC EU типа, который обозначен "BI EU" в данной заявке. BI EU базируется на аттенуированном штамме вируса PPCC EU типа, но не является идентичным ему, и является на 89% идентичным на нуклеотидном уровне EU прототипному штамму вируса Lelystad или на 87% идентичным вставке кДНК вируса PPCC инфекционного клона кДНК вируса PPCC типа EU LoN94-13 (WO 2013017568 A1) соответственно. Последовательность кДНК BI EU представлена в SEQ ID NO: 48.

Живой вирус восстанавливали из клона кДНК BI EU после трансфекции синтетических кэптированных транскриптов в BHK21 клетки и путем последующего переноса супернатанта культуры клеток из трансфицированных клеток в чувствительные к вирусу PPCC MA104 клетки. Определяли сильный цитопатический эффект (ЦПЭ) в течение 3-4 дней после переноса супернатанта культуры клеток из трансфицированных BHK21 клеток в MA104 клетки (фиг. 1A). После окрашивания клеток при использовании моноклонального антитела, специфического для капсидного белка SDOW17 вируса PPCC (Rural Technologies), определяли сильный сигнал в ЦПЭ позитивных MA104 клетках (фиг. 1B), но не в клетках, которые трансфицировали супернатантами, полученными при имитации трансфекции BHK21 клеток (не показано).

Для анализа роста вируса BI EU, имеющего происхождение от кДНК клона, MA104 клетки инфицировали восстановленным вирусом при использовании множественности заражения (МЗ), которая составляла 0,001, 0,01 или 0,1, соответственно. Супернатанты инфицированных клеток собирали через 0, 24, 48, 72 и 96 часов после инфекции и определяли титры вируса с помощью серийных разведений вируса на планшетах на 96 ячеек, которые содержали MA104 клетки. Полученная кривая роста для восстановленного из BI EU вируса показана на фиг. 2.

Вне зависимости от МЗ, используемой для MA104 клеток, вирус BI EU достигал титров 5×10^5 - 1×10^6 дозы заражения 50% культуры ткани (TCID₅₀) на миллилитр (мл) в течение 24 ч после инфекции. Титры достигали максимума приблизительно через 48 часов после инфицирования при использовании 1×10^6 - 1×10^7 TCID₅₀/мл, демонстрируя высокую эффективность репликации BI EU вируса на клетках MA104.

Этот факт позволял использовать ВИ EU в качестве платформы для исследования вакцины вируса PPCC, например, в качестве одного из множества применений, для исследования взаимодействия вируса PPCC с иммунными ответами хозяина на вирусную инфекцию.

б) Применение нового клона инфекционной кДНК вируса PPCC EU типа в исследовании PPCC вакцины.

Специфический иммунный ответ на инфекцию вирусом PPCC характеризуется отсроченной индукцией нейтрализующих антител (Lopez и Osorio, 2004) и коротким клеточно-опосредованным иммунным ответом (Xiao и др., 2004). Является общепризнанным, что эти эффекты могут частично быть приписаны, наряду с презентацией эпитопов-ловушек (Ostrowski и др., 2002; Ansari и др., 2006) и гликановым экранированием белков оболочки вируса (Ansari и др., 2006), ингибицию вирусом врожденной иммунной системы хозяина. Было продемонстрировано, что инфекция вирусом PPCC не индуцирует или только слабо или отсроченным образом индуцирует продукцию интерферона типа I (IFN), (интерферон- α и интерферон- β ; (Miller и др., 2004)) или IFN типа II, (интерферон- γ ; (Meier и др., 2003)) в чувствительных линиях клеток (альвеолярные макрофаги легких свиньи, клетки почек обезьян MARC-145) и/или у свиней (Buddaert и др., 1998).

Интерфероны играют важную роль в установлении эффективного адаптивного иммунного ответа против вирусных инфекций, и многие вирусы, таким образом, развили стратегии для противодействия проявлению ответа врожденной иммунной системы хозяина (Haller и Weber, 2009). В интересах идентификации предполагаемого(ых) PPCC антагониста(ов) IFN, всесторонние скрининг-анализы, которые базируются на клеточных линиях, которые стабильно экспрессируют гены, представляющие интерес, или на клетках, трансфицированных при использовании экспрессирующих белок плазмид, идентифицировали несколько неструктурных белков вируса PPCC (nsp), в том числе nsp1 (смотри выше), nsp2 (Beura и др., 2010; Li и др., 2010), nsp4 (Beura и др., 2010) и nsp11 (Beura и др., 2010; Shi и др., 2011a), которые являются вовлечеными в блокирование индукции IFN типа I.

nsp1 размещается на N-терминальном конце полипротеина 1а, который имеет происхождение от ORF1a вируса PPCC и подвергается процессингу с образованием двух мультифункциональных субъединиц, nsp1 α и nsp1 β , каждая из которых содержит домен подобной папаину цистеинпротеазы (PCP), существенный для самовысвобождения из вирусного полипротеина (den Boon и др., 1995; Chen и др., 2010). nsp1 α содержит N-терминальный домен цинковых пальцев и домен PCP α протеазы, в то время как nsp1 β содержит PCP β . Для обоих nsp1 субъединиц, nsp1 α и nsp1 β , была определена трехмерная пространственная структура (Sun и др., 2009; Xue и др., 2010). В соответствии с этими анализами, nsp1 β состоит из N-терминального домена (NTD), линкерного домена (LKD), PCP домена (PCP бета) и C-терминального удлинения (CTE); (Xue и др., 2010). С-терминальное, опосредованное nsp1 β отщепление nsp1 от nsp2 происходит в сайте WYG/AGR для US штаммов вируса PPCC (Kroese и др., 2008) или прогнозируется в сайте WYG/AAG для EU штаммов вируса PPCC (Chen и др., 2010), в то время как nsp1 α /nsp1 β расщепление происходит в сайте ECAM/AxVYD для US штаммов вируса PPCC или прогнозируется в сайте EEAH/SxVYR для EU штаммов вируса PPCC (Chen и др., 2010).

Несколько исследований продемонстрировали, что механистическая деталь, которая заключается в том, что nsp1 вируса PPCC и/или его субъединицы, которые получены путем ауторасщепления nsp1 α и/или nsp1 β ингибируют продукцию интерферона типа I путем препятствования транскрипции IFN (Song и др., 2010; Kim и др., 2010; Chen и др., 2010; Beura и др., 2010). Кроме того, было продемонстрировано, что nsp1 β препятствует клеточному ответу на интерферон (сигнальная система интерферона); (Chen и др., 2010). Кроме того, было продемонстрировано, что инфекция вирусом PPCC ингибирует продукцию IFN- α и/или IFN- β инфицированными вирусом PPCC клетками *in vitro* (Kim и др., 2010; Beura и др., 2010), была определена субклеточная локализация nsp1 (субъединицы) (Song и др., 2010; Chen и др., 2010) и механистические аспекты ингибиции IFN типа I, которые были получены при использовании экспериментов, отличных от экспериментов по экспрессии единичного белка, были подтверждены в клетках, инфицированных вирусом PPCC (Shi и др., 2010). В завершение, исследование мутагенеза nsp1, которое базируется на экспрессии nsp1 белка, изучило влияние на вирусное ингибицию IFN (Shi и др., 2011b).

Были получены существовавшие ранее жизнеспособные штаммы вируса PPCC (EU) (как описывается в WO 2013017570 A1), которые содержали мутации (делеции) в гене nsp1 β , который индуцирует продукцию IFN типа I (IFN- β) в чувствительных клетках (MARC145), и которые являются чувствительными к IFN типа (IFN- β).

Для того чтобы проверить, могут быть получены такие же, а также различные индуцирующие IFN вирусные мутанты на основе нового инфекционного клона ВИ EU, конструировали набор вирусов, несущих делеции в гене nsp1 β . Точнее, эти делеции были расположены в N-терминальном домене (NTD) nsp1 β , который был продемонстрирован как такой, который является необходимым для гомодимеризации белка (Xue и др., 2010). Фиг. 3 показывает nsp1 β выравнивание аминокислотных последовательностей нескольких штаммов вируса PPCC US и EU типов. Были указаны аминокислоты, которые, как про-

гнозируется, образуют нити (выделены голубым) или альфа-спирали (выделены красным).

Было получено десять *nsp1β* делеционных мутантов на основе инфекционного клона кДНК BI EU. Делеции включали аминокислоты, которые были спрогнозированы как такие, которые не вовлечены в образование бета-нитей или альфа-спиралей, которые были (частично) сохранены в рамках всех штаммов вируса PPCC EU типа, проанализированных при выравнивании (выделены рамками красного цвета на фиг. 3).

Делеции, введенные в ген *nsp1β*, визуализировали при выравнивании аминокислотных последовательностей, что представлено на фиг. 4. Были сконструированы BI EU-*nsp1β* делеционные мутанты BI EU-*nsp1β-delALEV*, BI EU-*nsp1β-delEV*, BI EU-*nsp1β-delLEV*, BI EU-*nsp1β-delLE*, BI EU-*nsp1β-delDD*, BI EU-*nsp1β-delSDDS*, BI EU-*nsp1β-delHH*, BI EU-*nsp1β-delGRSR*, BI EU-*nsp1β-delRSR* и BI EU-*nsp1β-delSDGRSR*, соответственно.

Для проверки жизнеспособности *nsp1β* делеционных мутантов, синтетические транскрипты кДНК BI EU, которые несут соответствующую делецию, трансфицировали в ВНК21 клетки. После переноса супернатантов клеточной культуры из трансфицированных клеток на чувствительные к PPCC MA104 клетки, определяли цитопатический эффект (ЦПЭ) и специфическое для нуклеокапсида иммунофлюоресцентное окрашивание, которое указывает на жизнеспособность мутантов вируса PPCC, в девяти из десяти полученных *nsp1β* делеционных мутантов (не показано). Эти результаты продемонстрировали, что, за исключением BI EU-*nsp1β-delLEV*, все делеционные мутанты были жизнеспособными. Для дальнейшего анализа, можно ли выращивать *nsp1β* делеционные мутанты до высоких титров на IFN-компетентных клетках MA104, получали кривые роста существенно так, как описано выше для вируса BI EU. Вкратце, клетки MA104 инфицированы при использовании одного из девяти *nsp1β* делеционных мутантов или вируса BI EU в качестве контроля. Супернатанты культуры клеток собирали через 0, 24, 48, 72 и 93 ч после заражения и титровали на клетках MA104 при использовании планшетов на 96 ячеек. Титры вируса рассчитывали на основе положительных по ЦПЭ лунок. Фиг. 5 показывает результат двух независимых экспериментов и демонстрирует, что BI EU-*nsp1β* делеционные мутанты можно выращивать на клетках MA104 так же эффективно, как и исходный вирус BI EU. Максимальные титры от 5×10^6 до 1×10^7 TCID₅₀/мл наблюдали через 48 ч после заражения.

После этого подвергали анализу, могут ли делеции, введенные в ген *nsp1β*, действительно устранять антагонистическую активность *nsp1β* белка в отношении IFN. С этой целью измеряли уровни IFN-β в 100 мкл пробах, отобранных через 0, 24, 48, 72 и 93 ч после заражения в экспериментах по изучению кривой роста, так как описано выше, с помощью коммерческого ELISA, специфичного для человеческого IFN-бета (Invitrogen). По утверждению производителя, этот ELISA может также применяться для обнаружения IFN-бета приматов, отличных от человека, и хорошо работает для образцов из клеток MA104, которые представляют собой эпителиальные клетки почки зеленой мартышки (смотрите фиг. 6). Для количественной оценки полученных результатов включали кривую калибровки с использованием положительного контроля ELISA от производителя.

Уровни IFN-β, измеренные в супернатантах MA104 клеток, инфицированных одним из девяти жизнеспособных *nsp1β* делеционных мутантов или исходным вирусом BI EU, полученные из двух независимых экспериментов, представлены на фиг. 6.

Как и ожидалось, исходный BI EU эффективно блокировал секрецию IFN-бета в процессе инфекции, что приписывается функциональному(ым) вирусному(ым) антагонисту(ам) IFN. Не определяли или определяли только незначительные количества IFN-β в супернатанте культуры клеток через 0, 24 и 48 ч после инфицирования с помощью различных делеционных мутантов BI EU *nsp1β*. Однако, в более поздние моменты времени некоторые мутанты были неспособны ингибировать экспрессию IFN-β в инфицированных клетках MA104, что указывает на дефект в IFN антагонистической активности *nsp1β*. Интересно отметить, что этот дефект значительно варьировал среди девяти проанализированных BI EU делеционных мутантов *nsp1β*. В то время как большинство мутантов индуцировали уровни IFN-β ниже 50 международных единиц (МЕ) в 100 мкл супернатанта клеточной культуры, мутантный BI EU *nsp1β-delALEV* был совершенно не в состоянии противодействовать экспрессии IFN-β в инфицированных клетках MA104. Количества IFN-бета, измеренные через 72 и 93 ч после инфицирования даже превышали предел теста ELISA, который устанавливается на уровне ~ 200 МЕ на 100 мкл. Этот результат наглядно продемонстрировал, что антагонистическая активность белка *nsp1β* в отношении IFN может быть упразднена путем удаления A₃₀LEV₃₃ аминокислот в инфекционном клоне кДНК BI EU.

Таким образом, получали новый инфекционный кДНК клон вируса PPCC EU типа, который можно эффективно выращивать до титров 1×10^7 TCID₅₀/мл в MA104 клетках почки зеленой мартышки. На основе этого клона было получено девять жизнеспособных BI EU-*nsp1β* мутантов, которые несли делеции в NTD *nsp1β*, который был продемонстрирован как такой, который является необходимым для гомодимеризации белка (Xue и др., 2010). Все эти мутанты могут выращиваться до получения высоких титров на MA104 клетках. Все мутанты BI EU-*nsp1β-delALEV*, BI EU-*nsp1β-delEV*, BI EU-*nsp1β-delLE*, BI EU-*nsp1β-delSDDS*, BI EU-*nsp1β-delGRSR*, BI EU-*nsp1β-delRSR* и BI EU-*nsp1β-delSDGRSR* индуцировали

секрецию IFN- β в поздние моменты времени инфекции, что находится в строгом отличии от исходного вируса BI EU. Из этих семи мутантов четыре мутанта BI EU-nsp1 β -delALEV, BI EU-nsp1 β -delEV, BI EU-nsp1 β -delLE и BI EU-nsp1 β -delSDDS представляли новый класс мутантов, которые ранее не были описаны в WO 2013017570 A1. В частности, инфекция при использовании мутанта BI EU-nsp1 β -delALEV индуцировала чрезвычайно высокие количества IFN- β в MA104 клетках, что приводило к выводу, что этот вирус является существенно поврежденным в отношении блокирования индукции IFN типа I.

Это открытие имеет серьезные последствия для разработки вакцины против вируса PPCC, поскольку можно предположить, что иммунный ответ естественного хозяина против PPCC может быть существенно улучшен за счет введения делеции, например, путем удаления аминокислот A₃₀LEV₃₃ в nsp1 β белке штаммов вируса PPCC генотипа I.

nsp1 β делеционные мутанты, описанные в данной заявке, либо отдельно, либо в сочетании с другими аттенуирующими мутациями, представляют собой перспективных кандидатов для живых аттенуированных вакцин против вируса PPCC.

Пример 3.

a) Введение делеции в ORF4 белок инфекционного клона кДНК BI вируса PPCC EU типа.

Исследовали, может ли быть введена делеция, как описано в соответствии с первым рассмотрением настоящего изобретения, в ген orf4 любого штамма вируса PPCC без отрицательного влияния на репликацию вируса. Таким образом, делецию вводили в геномный участок, кодирующий эктодомен белка orf4 между положениями аминокислот 50 - 71 инфекционного клона кДНК BI EU вируса PPCC типа EU (содержащего последовательность SEQ ID NO: 48). Делеция в белке orf4 BI EU включала аминокислоты 57-69 (как кодируется SEQ ID NO: 49).

Для проверки жизнеспособности ORF4 делеционного мутанта, синтетический транскрипт кДНК BI EU, который несет делецию, трансфицировали в BHK21 клетки. После переноса супернатантов клеточных культур из трансфицированных клеток на чувствительные к вирусу PPCC MA104 клетки, цитопатический эффект (ЦПЭ) определяли в течение от 3 до 4 дней после переноса супернатантов клеточных культур из трансфицированных BHK21 клеток в MA104 клетки. После окрашивания клеток с помощью специфических для белка капсида вируса PPCC моноклональных антител SDOW17 (Rural Technologies), сильный сигнал определяли в ЦПЭ-положительных MA104 клетках, но не в клетках, которые получали супернатанты иммитационно трансфицированных клеток BHK21 (не показано). Эти результаты продемонстрировали, что ORF4 делеционный мутант BI EU является жизнеспособным. Выделенный мутантный вирус обозначается как BI EU-GP5-36-46-ctr (сравни пример 6).

Для дальнейшего анализа, может ли BI EU-GP5-36-46-ctr выращиваться до высоких титров на MA104 клетках, исследовали кинетики роста. Так, MA104 клетки инфицировали с помощью восстановленного вируса и при использовании исходного BI EU вируса в качестве контроля с множественностью заражения (МЗ) 0,01. Супернатанты инфицированных клеток собирали через 0, 24, 48, 72 и 96 ч после инфекции, и определяли титры вируса с помощью серийных разведений вируса на планшетах на 96 лунок, содержащих MA104 клетки. Фиг. 7 показывает результаты трех независимых экспериментов и демонстрирует, что BI EU-GP5-36-46-ctr может выращиваться на MA104 клетках так же эффективно, как и исходный BI EU вирус. Наблюдали максимальные титры ~1×10⁷ TCID₅₀/мл для обоих вирусов через 48 ч после инфекции.

В целом, делеция аминокислот 57-69 в ORF4 белке не оказывает негативного влияния на рост BI EU, что свидетельствует о том, что вариации последовательности в этом участке хорошо переносятся вирусом PPCC *in vitro*. Исходя из этих результатов, участок, который размещается между положениями аминокислот 50-71 BI EU ORF4 белка, может также использоваться в качестве сайта инсерции для экзогенных последовательностей.

b) Применение сайта делеции ORF4 белка для инсерции экзогенной РНК: Инсерция последовательности нейтрализующего эпитопа ORF5 белка вируса PPCC в ORF4 ген инфекционного кДНК клона BI EU.

Этот пример описывает инсерцию экзогенной РНК в участок, который размещается между положениями аминокислот 50-71 BI EU ORF4 белка. Экзогенная РНК в этом примере кодирует нейтрализующий эпитоп, который размещается в ORF5 белке вируса PPCC (Ostrowski, M. и др.) и состоит из аминокислот 1-11 SEQ ID NO: 39. Эта последовательность (SEQ ID NO: 51) была выбрана для встраивания в эктодомен ORF4 белка для того, чтобы повысить доступность ORF5 нейтрализующего эпитопа в потенциальной вакцине, которая позволяет получить улучшенные иммунные ответы у вакцинированных животных.

Для получения вируса экзогенную последовательность встраивали в ORF4 делеционный сайт, описанный в Примере а), и заменили аминокислоты 57-69 BI EU ORF4 белка аминокислотами 1-11 последовательности SEQ ID NO: 39 (представляющей аминокислоты 36-46 в ORF5 белке штаммов вируса PPCC типа 2), и фланкировали G-G линкером. Инсерция приводила к получению последовательности Gly57-Ser-Ser-His-Leu-Gln-Leu-Ile-Tyr-Asn-Leu-Thr-Gly69 (SEQ ID NO: 53) в ORF4 белке BI EU. Рекомбинантный вирус, который несет инсерцию, в дальнейшем обозначали как BI EU-GP5-36-46 (который включает

последовательность SEQ ID NO: 56).

Для анализа, может ли BI EU-GP5-36-46 быть восстановленным, синтетический транскрипт кДНК BI EU, который несет мутацию, трансфицировали в ВНК21 клетки. Рекомбинантный вирус может быть восстановлен тем же способом, как описано выше. Цитопатический эффект (ЦПЭ) наблюдали через 3-4 дня после переноса супернатантов клеточной культуры из трансфицированных ВНК21 клеток на чувствительные к вирусу PPCC клетки MA104. Кроме того, определяли специфическое для капсидного белка вируса PPCC окрашивание в позитивных по ЦПЭ MA104 клетках, но не в клетках, которые получали супернатанты иммитационно трансфицированных клеток ВНК21 (не показано).

Исследовали ростовые кинетики для определения, может ли рекомбинантный вирус выращиваться до высоких титров. Таким образом, MA104 клетки инфицировали с помощью BI EU-GP5-36-46 и при использовании исходного BI EU вируса в качестве контроля при множественности заражения (МЗ) 0,01. Супернатанты инфицированных клеток собирали через 0, 24, 48, 72 и 96 ч после инфекции, и определяли титры вируса с помощью серийных разведений вируса на планшетах на 96 лунок, содержащих MA104 клетки. Результаты трех независимых экспериментов представлены на фиг. 7. Через 48 ч после инфекции мутантный вирус BI EU-GP5-36-46 достигал того же максимального значения титра $\sim 1 \times 10^7$ TCID₅₀/мл, что и исходный BI EU вирус, демонстрируя, что встроенная в ORF4 белок последовательность не оказывает отрицательного влияния на высокий титр выращивания вируса.

Дополнительные эксперименты на MA104 клетках выявили, что экзогенная последовательность РНК стабильно поддерживается при множественных пассажах. Анализ последовательности продемонстрировал стабильность вставки при всех проанализированных пассажах. Интересно отметить, что единственная нуклеотидная мутация аденина на тимин, которая приводила к аминокислотной замене His на Pro в положении 56, выше сайта инсерции определялась после 1 пассажа в независимых экспериментах. Таким образом, дополнительную мутацию встраивали в BI EU-GP5-36-46 с помощью методов реверсивной генетики. Для получения рекомбинантного вируса экзогенную последовательность встраивали в сайт делекции ORF4, описанный в примере а), и заменяли аминокислоты 56-69 BI EU ORF4 белка аминокислотами 1-11 последовательности SEQ ID NO: 39 (представляющей аминокислоты 36-46 в ORF5 белке штаммов вируса PPCC типа 2), N-терминально фланкованными аминокислотной последовательностью PG и C-терминально фланкированными G-линкером. Эта инсерция приводила к получению заключительной последовательности Pro56-Gly-Ser-Ser-His-Gln-Leu-Ile-Tyr-Asn-Leu-Thr-Gly69 (SEQ ID NO: 55) в ORF4 белке BI EU. Полученный рекомбинантный вирус обозначали в дальнейшем как BI EU-GP5-36-46-AtoC (который включал последовательность SEQ ID NO: 58). Ростовые кинетики, представленные на фиг. 7, показывают, что BI EU-GP5-36-46-AtoC может выращиваться с такими же титрами, что и BI EU-GP5-36-46 и BI EU дикого типа, соответственно.

Исследовали, будут ли последовательности, имеющие происхождение от ORF5-в участка, кодирующего эктодомен ORF4 в BI EU-GP5-36-46-AtoC, обеспечивать мутантный вирус, который является более чувствительным к сывороточной нейтрализации. С этой целью проводили реакции сывороточной нейтрализации (SNT). Предполагается, что повышенная доступность встроенного нейтрализующего эпигопа, который имеет происхождение от ORF5, расположенного в ORF4 белке эктодомена, будет приводить к улучшенной чувствительности рекомбинантного вируса на действие нейтрализующих антител по сравнению с исходным вирусом BI EU.

SNT сыворотки, которые были взяты от шести свиней через 48 дней после вакцинации с помощью BI EU вируса дикого типа, серийно разводили и смешивали либо с BI EU-GP5-36-46-AtoC, либо с BI EU дикого типа.

После инкубации в течение одного часа при 37°C и 5% CO₂ прибавляли MA104 клетки к образцам. Титры сыворотки определяли через 4 дня на основе ЦПЭ, индуцированного вирусом, который не подвергся нейтрализации. Сыворотка, которую брали у тех же животных перед вакцинацией, служила в качестве негативных контролей (не показано). Средние значения и стандартные отклонения двух независимых экспериментов представлены на фиг. 8.

Может быть продемонстрировано, что BI EU-GP5-36-46-AtoC является последовательно более чувствительным к *in vitro* нейтрализации по сравнению с BI EU вирусом дикого типа, несмотря на вариации, которые наблюдали между шестью животными, подвергшимся анализу. Титры сыворотки, измеренные для

BI EU-GP5-36-46-AtoC составляли в 3 - 15 раз выше, чем титры, которые определяли для исходного BI EU вируса (фиг. 8). Данные, полученные из различных экспериментов, дополнительно предполагают, что титры сыворотки для BI EU-GP5-36-46-AtoC могут быть дополнительно повышены путем мутации сайта N-гликозилирования (аминокислота N9 SEQ ID NO: 39), присутствующего в последовательности, которая имеет происхождение от ORF5 от Asn₉ до Gln₉ (SEQ ID NO: 50 и 52) в качестве природного экрана N-гликозилирования ORF5 нейтрализующего эпигопа ((Ansari и др., 2006) и данные, которые не представлены). Таким образом, данные фиг. 8 ясно показывают, что нейтрализующий эпигоп, который имеет происхождение от ORF5, встроенный в эктодомен ORF4 белка, является в высокой степени доступным в рекомбинантном вирусе BI EU-GP5-36-46-AtoC, что делает последний многообещающим вакцинным кандидатом. Продемонстрированная высокая чувствительность к сыворотке, содержащей спе-

цифические для вируса PPCC нейтрализующие антитела, позволит осуществлять более быстрое выведение и гарантировать повышенную безопасность вакциниального вируса.

Также можно ожидать, что специфические для вируса PPCC нейтрализующие антитела будут индуцироваться до более высоких уровней и в более ранние временные точки у поросят или свиноматок, которые были вакцинированы с помощью BI EU-GP5-36-46-AtoC, по сравнению с животными, которые были вакцинированы при использовании исходного вируса BI EU. Ранняя индукция нейтрализующих антител после вакцинации будет приводить к более быстрому выведению и, таким образом, к меньшему выделению вакциниального вируса (повышенная безопасность), а также к более эффективному иммунному ответу после природной инфекции с помощью вируса PPCC (повышенная эффективность).

Рекомбинантный вирус BI EU-GP5-36-46-AtoC, таким образом, представляет собой многообещающего кандидата для вакцины на основе живого аттенуированного вируса PPCC с улучшенной безопасностью и эффективностью.

Список фигур

Фиг. 1 - А. Инфекционный вирус, восстановленный из клона кДНК BI EU, вызывает сильный ЦПЭ на MA104 клетках, как показано с помощью светлопольной микроскопии. В. Специфическое для капсидного белка вируса PPCC иммунофлуоресцентное (IF) окрашивание инфицированных BI EU MA104 клеток.

Фиг. 2 - рост вируса, восстановленного из инфекционного клона кДНК BI EU, на MA104 клетках.

Фиг. 3- выравнивание аминокислотной последовательности nsp1 β N-терминального домена (NTD) нескольких штаммов US (типа II, вверху) и EU (типа I, внизу) вируса PPCC. NTD аминокислотная последовательность BI EU приведена в самой нижней части. Аминокислоты R22, PR24, E32, SFP и H52 обозначены сверху от выравнивания и продемонстрированы как критические для nsp1 β гомодимеризации (Xie и др., 2010). Целевые участки для nsp1 β мутагенеза обозначены в красных рамках. Мотив SDGRSR соответствует участку, описанному в WO 2013017570 A1 при использовании LoN94-13 клона кДНК вируса PPCC EU.

Фиг. 4 - выравнивание аминокислотной последовательности BI EU-nsp1 β делеционных мутантов.

Фиг. 5 - рост BI EU-nsp1 β делеционных мутантов на IFN-компетентных MA104 клетках.

Фиг. 6 - уровни IFN- β , которые измеряются в различные моменты времени в супернатантах культуры клеток MA104, инфицированных при использовании BI EU-nsp1 β делеционных мутантов или при использовании исходного BI EU вируса.

Фиг. 7 - кинетика роста рекомбинантных BI EU вирусов, которые несут делеции или инсерции в ORF4 белке.

Фиг. 8 - реакции сывороточной нейтрализации для рекомбинантного вируса BI EU-GP5-36-46-AtoC и для исходного вируса BI EU.

В списке последовательностей:

SEQ ID NO: 1-24 соответствуют последовательностям эктодомена ORF4 белка вируса PPCC с делецией;

SEQ ID NO: 25 и SEQ ID NO: 26 соответствуют последовательностям первых двух спрогнозированных N-терминальных β -складок ORF4 белка вируса PPCC (генотипа I);

SEQ ID NO: 27 и SEQ ID NO: 28 соответствуют последовательностям первых двух спрогнозированных N-терминальных β -складок ORF4 белка вируса PPCC (генотипа II);

SEQ ID NO: 29 и SEQ ID NO: 30 соответствуют последовательностям первых двух спрогнозированных N-терминальных β -складок ORF4 белка вируса PPCC (генотипа I);

SEQ ID NO: 31 и SEQ ID NO: 32 соответствуют последовательностям первых двух спрогнозированных N-терминальных β -складок ORF4 белка вируса PPCC (генотипа II);

SEQ ID NO: 32 соответствует (частичной) последовательности ORF4 белка вируса PPCC (генотипа I), который имеет делецию 11 аминокислотных остатков в участке между первыми двумя спрогнозированными N-терминальными β -складками;

SEQ ID NO: 33 соответствует (частичной) последовательности ORF4 белка вируса PPCC (генотипа II), который имеет делецию 7 аминокислотных остатков в участке между первыми двумя спрогнозированными N-терминальными β -складками;

SEQ ID NO: 34 соответствует последовательности эктодомена ORF4 белка вируса PPCC, который имеет делецию 11 аминокислотных остатков;

SEQ ID NO: 35 соответствует последовательности эктодомена ORF4 белка вируса PPCC, который имеет делецию 7 аминокислотных остатков;

SEQ ID NO: 36 соответствует последовательности ORF4 белка вируса PPCC (генотипа I), который имеет делецию 11 аминокислотных остатков (и включает последовательность SEQ ID NO: 34, соответственно);

SEQ ID NO: 37 соответствует нуклеотидной последовательности, которая кодирует последовательность SEQ ID NO: 36;

SEQ ID NO: 38 соответствует нуклеотидной последовательности, которая кодирует вирус PPCC ге-

нотипа I, геном которого включает молекулу нуклеиновой кислоты, которая кодирует последовательность SEQ ID NO: 36;

SEQ ID NO: 39 соответствует последовательности пептида, который кодируется геном ORF5 вируса PPCC;

SEQ ID NO: 40 соответствует последовательности пептида, который кодируется геном ORF5 вируса PPCC;

SEQ ID NO: 41 соответствует полному геному вируса Lelystad;

SEQ ID NO: 42 соответствует полному геному вируса VR2332;

SEQ ID NO: 43 соответствует последовательности ORF4 белка вируса Lelystad;

SEQ ID NO: 44 соответствует последовательности ORF4 белка вируса VR2332;

SEQ ID NO: 45 соответствует первой последовательности нуклеиновой кислоты, как описывается в данной заявке;

SEQ ID NO: 46 соответствует второй последовательности нуклеиновой кислоты, как описывается в данной заявке, которая фланкирует 5' конец первой последовательности нуклеиновой кислоты;

SEQ ID NO: 47 соответствует третьей последовательности нуклеиновой кислоты, как описывается в данной заявке, которая фланкирует 3' конец первой последовательности нуклеиновой кислоты;

SEQ ID NO: 48 соответствует полной вставке вирусной кДНК В1 EU;

SEQ ID NO: 49 соответствует последовательности SEQ ID NO: 48 с делецией, которая, таким образом, кодирует ORF4 белок, который имеет делецию 13aa (aa 57-69);

SEQ ID NO: 50 соответствует последовательности SEQ ID NO: 39 с заменой N->Q в положении 9;

SEQ ID NO: 51 соответствует последовательности aa 1-11 SEQ ID NO: 39;

SEQ ID NO: 52 соответствует последовательности SEQ ID NO: 51 с заменой N->Q в положении 9;

SEQ ID NO: 53 соответствует последовательности SEQ ID NO: 51 с Gly-Gly линкером;

SEQ ID NO: 54 соответствует последовательности SEQ ID NO: 52 с Gly-Gly линкером;

SEQ ID NO: 55 соответствует последовательности SEQ ID NO: 53 с N-терминальным остатком пролина;

SEQ ID NO: 56 соответствует последовательности SEQ ID NO: 49 с инсерцией, которая, таким образом, кодирует последовательность SEQ ID NO: 53;

SEQ ID NO: 57 соответствует последовательности SEQ ID NO: 49 с инсерцией, которая, таким образом, кодирует последовательность SEQ ID NO: 54;

SEQ ID NO: 58 соответствует последовательности SEQ ID NO: 48 с делецией, которая, таким образом, кодирует ORF4 белок, который имеет

делецию 14aa (aa 56-69), куда включена вставка, кодирующая последовательность SEQ ID NO: 55.


Список использованной литературы

- Allende, R., Laegreid, W.W., Kutish, G.F., Galeota, J.A., Wills, R.W., Osorio, F.A., 2000. Porcine reproductive and respiratory syndrome virus: description of persistence in individual pigs upon experimental infection. *J. Virol.* 74, 10834-10837.
- Ansari, I.H., Kwon, B., Osorio, F.A., Pattnaik, A.K., 2006. Influence of N-linked glycosylation of porcine reproductive and respiratory syndrome virus GP5 on virus infectivity, antigenicity, and ability to induce neutralizing antibodies. *J. Virol.* 80, 3994-4004.
- Beura, L.K., Sarkar, S.N., Kwon, B., Subramaniam, S., Jones, C., Pattnaik, A.K., Osorio, F.A., 2010. Porcine reproductive and respiratory syndrome virus nonstructural protein 1beta modulates host innate immune response by antagonizing IRF3 activation. *J. Virol.* 84, 1574-1584.
- Buddaert, W., Van, R.K., Pensaert, M., 1998. In vivo and in vitro интерферон (IFN) studies with the porcine reproductive and respiratory syndrome virus (PRRSV). *Adv. Exp. Med. Biol.* 440, 461-467.
- Chen, Z., Lawson, S., Sun, Z., Zhou, X., Guan, X., Christopher-Hennings, J., Nelson, E.A., Fang, Y., 2010. Identification of two auto-cleavage products of nonstructural protein 1 (nsP1) in porcine reproductive and respiratory syndrome virus infected cells: nsP1 function as интерферон antagonist. *Virology* 398, 87-97.
- den Boon, J.A., Faaberg, K.S., Meulenberg, J.J., Wassenaar, A.L., Plagemann, P.G., Gorbalenya, A.E., Snijder, E.J., 1995. Processing and evolution of the N-terminal region of the arterivirus replicase ORF1a protein: identification of two papainlike cysteine proteases. *J. Virol.* 69, 4500-4505.
- Haller, O., Weber, F., 2009. The интерферон response circuit in antiviral host defense. *Verh. K. Acad. Geneesk. Belg.* 71, 73-86.
- Kim, O., Sun, Y., Lai, F.W., Song, C., Yoo, D., 2010. Modulation of type I интерферон induction by porcine reproductive and respiratory syndrome virus and degradation of CREB-binding protein by non-structural protein 1 in MARC-145 and HeLa cells. *Virology* 402, 315-326.
- Kroese, M.V., Zevenhoven-Dobbe, J.C., Bos-de Ruijter, J.N., Peeters, B.P., Meulenberg, J.J., Cornelissen, L.A., Snijder, E.J., 2008. The nsP1alpha and nsP1 papain-like autoproteinases are essential for porcine reproductive and respiratory syndrome virus RNA synthesis. *J. Gen. Virol.* 89, 494-499.


- Li, H., Zheng, Z., Zhou, P., Zhang, B., Shi, Z., Hu, Q., Wang, H., 2010. The cysteine protease domain of porcine reproductive and respiratory syndrome virus non-structural protein 2 antagonizes интерферон regulatory factor 3 activation. *J. Gen. Virol.* 91, 2947-2958.
- Lopez, O.J., Osorio, F.A., 2004. Role of neutralizing antibodies in PRRSV protective immunity. *Vet. Immunol. Immunopathol.* 102, 155-163.
- Meier, W.A., Galeota, J., Osorio, F.A., Husmann, R.J., Schnitzlein, W.M., Zuckermann, F.A., 2003. Gradual development of the интерферон-gamma response of swine to porcine reproductive and respiratory syndrome virus infection or vaccination. *Virology* 309, 18-31.
- Miller, L.C., Laegreid, W.W., Bono, J.L., Chitko-McKown, C.G., Fox, J.M., 2004. Интерферон type I response in porcine reproductive and respiratory syndrome virus-infected MARC-145 cells. *Arch. Virol.* 149, 2453-2463.
- Ostrowski, M., Galeota, J.A., Jar, A.M., Platt, K.B., Osorio, F.A., Lopez, O.J., 2002. Identification of neutralizing and nonneutralizing epitopes in the porcine reproductive and respiratory syndrome virus GP5 ectodomain. *J. Virol.* 76, 4241-4250.
- Shi, X., Wang, L., Li, X., Zhang, G., Guo, J., Zhao, D., Chai, S., Deng, R., 2011a. Endoribonuclease activities of porcine reproductive and respiratory syndrome virus nsp11 was essential for nsp11 to inhibit IFN-beta induction. *Mol. Immunol.* 48, 1568-1572.
- Shi, X., Wang, L., Zhi, Y., Xing, G., Zhao, D., Deng, R., Zhang, G., 2010. Porcine reproductive and respiratory syndrome virus (PRRSV) could be sensed by professional beta интерферон-producing system and had mechanisms to inhibit this action in MARC-145 cells. *Virus Res.* 153, 151-156.
- Shi, X., Zhang, G., Wang, L., Li, X., Zhi, Y., Wang, F., Fan, J., Deng, R., 2011b. The Nonstructural Protein 1 Papain-Like Cysteine Protease Was Necessary for Porcine Reproductive and Respiratory Syndrome Virus Nonstructural Protein 1 to Inhibit Интерферон-beta Induction. *DNA Cell Biol.* 30, 355-362.
- Snijder, E.J., Meulenberg, J.J., 1998. The molecular biology of arteriviruses. *J. Gen. Virol.* 79 (Pt 5), 961-979.
- Song, C., Krell, P., Yoo, D., 2010. Nonstructural protein 1alpha subunit-based inhibition of NF-kappaB activation and suppression of интерферон-beta production by porcine reproductive and respiratory syndrome virus. *Virology* 407, 268-280.
- Sun, Y., Xue, F., Guo, Y., Ma, M., Hao, N., Zhang, X.C., Lou, Z., Li, X., Rao, Z., 2009. Crystal structure of porcine reproductive and respiratory syndrome virus leader protease Nsp1alpha. *J. Virol.* 83, 10931-10940.
- Xiao, Z., Batista, L., Dee, S., Halbur, P., Murtaugh, M.P., 2004. The level of virus-specific T-cell and macrophage recruitment in porcine reproductive and respiratory syndrome virus infection in pigs is independent of virus load. *J. Virol.* 78, 5923-5933.
- Xue, F., Sun, Y., Yan, L., Zhao, C., Chen, J., Bartlam, M., Li, X., Lou, Z., Rao, Z., 2010. The crystal structure of porcine reproductive and respiratory syndrome virus nonstructural protein Nsp1beta reveals a novel metal-dependent nuclease. *J. Virol.* 84, 6461-6471.

ФОРМУЛА ИЗОБРЕТЕНИЯ

1. Молекула нуклеиновой кислоты, которая кодирует вирус репродуктивно-респираторного синдрома свиней (PPCC) генотипа I и способна продуцировать живой вирус при трансфекции в клетки, где указанная молекула включает последовательность нуклеотидов, которая по меньшей мере на 99,6% идентична последовательности нуклеиновой кислоты SEQ ID NO: 48 по всей ее длине, или где указанная молекула содержит SEQ ID NO: 48.
2. Молекула нуклеиновой кислоты п.1, где указанный вирус является аттенуированным.
3. Молекула нуклеиновой кислоты по любому из пп.1-2, где указанная молекула представляет собой молекулу ДНК.
4. Конструкция ДНК, которая включает молекулу ДНК по п.3.
5. РНК транскрипт конструкции ДНК по п.4.
6. Клетка продуцент вируса PPCC генотипа I, трансфицированная с помощью конструкции ДНК по п.4 или с помощью РНК транскрипта по п.5.
7. Вирус PPCC генотипа I, продуцируемый клеткой по п.6.
8. Вирус PPCC генотипа I, геном которого включает молекулу нуклеиновой кислоты по любому из пп.1-2 или геном которого включает РНК молекулу, которая кодируется молекулой нуклеиновой кислоты по любому из пп.1-3, или геном которого кодируется молекулой нуклеиновой кислоты по любому из пп.1-3.
9. Способ получения вируса PPCC генотипа I, который включает трансфекцию клетки-хозяина с помощью конструкции ДНК по п.4 или с помощью РНК транскрипта по п.5.
10. Композиция для лечения или профилактики вируса PPCC генотипа I, которая включает молекулу нуклеиновой кислоты по любому из пп.1-2, сuspendedированную в приемлемом количестве фармацевтически приемлемого разбавителя или наполнителя.
11. Применение вируса PPCC генотипа I по любому из пп.7-8 в качестве лекарственного средства для профилактики или лечения репродуктивно-респираторного синдрома свиней.
12. Способ профилактики или лечения вируса PPCC генотипа I, предусматривающий интраназальное, внутримышечное, пероральное или внутриматочное введение животному вируса PPCC генотипа I по любому из пп.7-8 или композиции по п.10.



Фиг. 1




Фиг. 2


039060

	RMM	RGG	SFP	
	R22	PR24	E32	B52
gi 325534751 gb ADZ2 0000	ADVYD1GRCGAIVVYAG--G-	KVSNAPRGNEVKFEPVPKELKLVANRLHTSPPPHHVVDMSRFTFMT		
gi 325534724 gb ADZ2 0001	ADVYD1GRCGAIVVYAG--G-	KVSNAPRGNEVKFEPVPKELKLVANRLHTSPPPHHVVDMSRFTFMT		
gi 156181651 gb ABUS 0002	ADVYD1GRCGAIVVYAG--G-	KVSNAPRGNEVKFEPVPKELKLVANRLHTSPPPHHVVDMSRFTFMT		
gi 159147384 gb ABW9 0003	ADVYD1GRCGAIVVYAG--G-	KVSNAPRGNEVKFEPVPKELKLVANRLHTSPPPHHVVDMSRFTFMT		
gi 194338901 gb ACF4 0004	ADVYD1GRCGAIVVYAG--G-	KVSNAPRGNEVKFEPVPKELKLVANRLHTSPPPHHVVDMSRFTFMT		
gi 224177850 gb ACG6 0005	ADVYD1GRCGAIVVYAG--G-	KVSNAPRGNEVKFEPVPKELKLVANRLHTSPPPHHVVDMSRFTFMT		
gi 224177880 gb ACG6 0006	ADVYD1GRCGAIVVYAG--G-	KVSNAPRGNEVKFEPVPKELKLVANRLHTSPPPHHVVDMSRFTFMT		
gi 211907565 gb ACO1 0007	ADVYD1GRCGAIVVYAG--G-	KVSNAPRGNEVKFEPVPKELKLVANRLHTSPPPHHVVDMSRFTFMT		
gi 399145994 gb AFP2 0008	ADVYD1GRCGAIVVYAG--G-	KVSNAPRGNEVKFEPVPKELKLVANRLHTSPPPHHVVDMSRFTFMT		
gi 260175548 gb ACX3 0009	ADVYD1GRCGAIVVYAG--G-	KVSNAPRGNEVKFEPVPKELKLVANRLHTSPPPHHVVDMSRFTFMT		
gi 254771965 gb ACT8 0010	ADVYD1GRCGAIVVYAG--G-	KVSNAPRGNEVKFEPVPKELKLVANRLHTSPPPHHVVDMSRFTFMT		
gi 187372768 gb ACD0 0011	ADVYD1GRCGAIVVYAG--G-	KVSNAPRGNEVKFEPVPKELKLVANRLHTSPPPHHVVDMSRFTFMT		
gi 331399 gb AAA4627 0012	SSVYRKKFVVIIDSSLNGRSRMWNTPESDDSAALEVLPPELERQVEIILIRSPPAHHPVVLADWELTE			
gi 51094058 gb AAAT95 0013	SSVYRKKFVVIIDSSLNGRSRMWNTPESDDSAALEVLPPELERQVEIILIRSPPAHHPVVLADWELTE			
gi 302393818 sp Q045 0014	SSVYRKKFVVIIDSSLNGRSRMWNTPESDDSAALEVLPPELERQVEIILIRSPPAHHPVVLADWELTE			
gi 112821998 gb ADZ2 0015	SSVYRKKFVVIIDSSLNGRSRMWNTPESDDSAALEVLPPELERQVEIILIRSPPAHHPVVLADWELTE			
gi 322518723 gb ADX0 0016	SSVYRKKFVVIIDSSLNGRSRMWNTPESDDSAALEVLPPELERQVEIILIRSPPAHHPVVLADWELTE			
gi 262358373 gb ACV5 0017	SSVYRKKFVVIIDSSLNGRSRMWNTPESDDSAALEVLPPELERQVEIILIRSPPAHHPVVLADWELTE			
gi 259017818 gb ACV8 0018	SSVYRKKFVVIIDSSLNGRSRMWNTPESDDSAALEVLPPELERQVEIILIRSPPAHHPVVLADWELTE			
gi 322518732 gb ADX0 0019	SSVYRKKFVVIIDSSLNGRSRMWNTPESDDSAALEVLPPELERQVEIILIRSPPAHHPVVLADWELTE			
gi 99082873 gb ABF66 0020	SDVYRKKFVVIIDSSLNGRSRMWNTPESDDSAALEVLPPELERQVEIILTRSPPAHHPINLADWELTE			
gi 40019009 gb AAR37 0021	SDVYRKKFVVIIDSSLNGRSRMWNTPESDDSAALEVLPPELERQVEIILTRSPPAHHPINLADWELTE			
nspl1 0022	SSVYRKKFVVIIDSSLNGRSRMWNTPESDDSAALEVLPPELERQVEIILIRSPPAHHPVSLADWELAE			
nspl1BIEU 0023	SSVYRKKFVVIIDSSLNGRSRMWNTPESDDSAALEVLPPELERQVEIILIRSPPAHHPVSLADWELAE			


Фиг. 3




Фиг. 4




Фиг. 5



Фиг. 6



Фиг. 7



Фиг. 8



Евразийская патентная организация, ЕАПО

Россия, 109012, Москва, Малый Черкасский пер., 2