



(19) REPUBLIKA HRVATSKA
DRŽAVNI ZAVOD ZA
INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO

(10) Identifikator
dokumenta:



HR P20250329 T1

HR P20250329 T1

(12) **PRIJEVOD PATENTNIH ZAHTJEVA
EUROPSKOG PATENTA**

(51) MKP:

A61K 31/485 (2006.01)
A61P 25/32 (2006.01)

(46) Datum objave prijevoda patentnih zahtjeva: 09.05.2025.

(21) Broj predmeta: P20250329T

(22) Datum podnošenja: 27.06.2013.

(96) Broj europske prijave patenta: EP 23163177.1
Datum podnošenja europske prijave patenta: 27.06.2013.

(97) Broj objave europske prijave patenta: EP 4223296 A2
Datum objave europske prijave patenta: 09.08.2023.

(97) Broj objave europskog patenta: EP 4223296 B1
Datum objave europskog patenta: 29.01.2025.

(31) Broj prve prijave: 201261664804 P (32) Datum podnošenja prve prijave: 27.06.2012. (33) Država ili organizacija podnošenja prve prijave: US
201261721539 P 02.11.2012. US
201261736740 P 13.12.2012. US
201361788810 P 15.03.2013. US

(62) Broj i datum prvobitne prijave u slučaju podjele patenta: 13732471.1 27.06.2013.
16187426.8 27.06.2013.
17206034.5 27.06.2013.

(73) Nositelj patenta:

H. Lundbeck A/S, Ottiliavej 9, 2500 Valby, DK

(72) Izumitelji:

Lars Torup, Værløse, DK

Afsaneh Abbariki, Holte, DK

Anna Bladström, Lund, DK

Christine Persson, Lund, DK

Didier Meulien, Boulogne Billancourt, FR

Per Sørensen, Copenhagen Ø, DK

Thomas Jon Jensen, Virum, DK

Jette Buch Østergaard, Copenhagen N, DK

(74) Zastupnik:

ZMP IP d.o.o., 10000 Zagreb, HR

(54) Naziv izuma:

**NALMEFEN ZA SMANJENJE KONZUMACIJE ALKOHOLA U SPECIFIČNO CILJNIM
POPULACIJAMA**

HR P20250329 T1

PATENTNI ZAHTJEVI

1. Nalmefen za uporabu u smanjenju konzumacije alkohola kod pacijenata s ovisnošću o alkoholu, naznačen time što navedena uporaba sadrži sljedeće korake;
 - a) identificiranje bolesnika s ovisnošću o alkoholu
 - i) koji ima razinu rizika od pijenja (DRL) koja odgovara konzumaciji >60 g/dan čistog alkohola za muškarce i >40 g/dan za žene, i
 - ii) koji održava DRL konzumacije alkohola nakon razdoblja promatranja nakon početne procjene, pri čemu navedeno razdoblje promatranja nakon početne procjene iznosi 1-2 tjedna, i
 - b) davanje nalmefena pacijentu identificiranom u koraku a), pri čemu navedeni nalmefen treba primijeniti po potrebi, kao što je svaki dan kada pacijent uoči rizik od pijenja alkohola, poželjno 1-2 sata prije predviđenog vremena pijenja.
2. Nalmefen za uporabu prema zahtjevu 1, naznačen time što navedenom pacijentu nije potrebna trenutna detoksikacija.
3. Nalmefen za uporabu prema bilo kojem od zahtjeva 1 ili 2, naznačen time što navedeni pacijent podliježe stalnoj motivacijskoj podršci.
4. Nalmefen za uporabu prema bilo kojem od zahtjeva 1-3, naznačen time što navedeni pacijent podliježe savjetovanju usmjerenom na poboljšano pridržavanje liječenja i smanjenu konzumaciju alkohola.
5. Nalmefen za uporabu prema zahtjevu 4, naznačen time što se navedeno savjetovanje izvodi prema BRENDA modelu.
6. Nalmefen za uporabu prema bilo kojem od zahtjeva 1-5, naznačen time što navedeni pacijent je pacijent za kojeg neposredna apstinencija nije cilj liječenja.
7. Nalmefen za uporabu prema bilo kojem od zahtjeva 1-6, naznačen time što se navedeni nalmefen koristi u razdoblju liječenja od 6-12 mjeseci, kao što je 6 mjeseci.
8. Nalmefen za uporabu prema bilo kojem od zahtjeva 1-7, naznačen time što je pacijent odrasla osoba ili adolescent.
9. Nalmefen za uporabu prema bilo kojem od zahtjeva 1-8, naznačen time što navedeni pacijent ima 12 godina ili više, kao što je 14 godina ili više, kao što je 16 godina ili više, kao što je 18 godina ili više.
10. Nalmefen za uporabu prema bilo kojem od zahtjeva 1-9, naznačen time što se navedeni nalmefen koristi u dozi od 10-20 mg kao što je 10 mg, 11 mg, 12 mg, 13 mg, 14 mg, 15 mg, 16 mg, 17 mg, 18 mg, 19 mg ili 20 mg.
11. Nalmefen za uporabu prema bilo kojem od zahtjeva 1-10, naznačen time što se navedeni nalmefen koristi u dozi od 18 mg.
12. Nalmefen za uporabu prema bilo kojem od zahtjeva 1-11, naznačen time što se navedeni nalmefen koristi u obliku farmaceutski prihvatljive kisele adicijske soli.
13. Nalmefen za uporabu prema bilo kojem od zahtjeva 1-12, naznačen time što se navedeni nalmefen koristi u obliku hidrokloridne soli.
14. Nalmefen za uporabu prema bilo kojem od zahtjeva 1-13, naznačen time što se navedeni nalmefen koristi u obliku hidroklorid dihidrata.
15. Nalmefen za uporabu prema bilo kojem od zahtjeva 1-14, naznačen time što se navedeni nalmefen koristi u kristalnom obliku.
16. Nalmefen za uporabu prema bilo kojem od zahtjeva 1-15, naznačen time što se navedeni nalmefen koristi u obliku oralne doze kao što su tablete ili kapsule.
17. Nalmefen za uporabu prema bilo kojem od zahtjeva 1-16, naznačen time što se navedeni nalmefen koristi u kombinaciji s daljnjim aktivnim sastojkom.
18. Nalmefen za uporabu prema bilo kojem od zahtjeva 1-17, naznačen time što navedeni pacijent ne spada u jednu ili više od sljedećih kategorija: pacijenti koji uzimaju opioidne analgetike, pacijenti ovisni o opioidima bez uspješnog odvikavanja, pacijenti s akutnim simptomima odvikavanja od opioida, pacijenti kod kojih se sumnja na nedavnu uporabu opioida, pacijenti s umjerenim ili teškim oštećenjem jetre, pacijenti s umjerenim ili teškim oštećenjem bubrega.