



(12) 发明专利申请

(10) 申请公布号 CN 104324350 A

(43) 申请公布日 2015. 02. 04

(21) 申请号 201410659001. 7

(22) 申请日 2014. 11. 19

(71) 申请人 厉岩

地址 276800 山东省日照市东港区泰安路
126 号日照市人民医院

(72) 发明人 厉岩

(51) Int. Cl.

A61K 36/9068(2006. 01)

A61P 1/00(2006. 01)

权利要求书1页 说明书7页

(54) 发明名称

一种用于慢性结肠炎的中药组合物及其制备方法

(57) 摘要

本发明公开了一种用于慢性结肠炎的中药组合物,它是由三七粉、金银花、黄芩、连翘、藿香、苍术、佩兰、砂仁、肉豆蔻、草果、生薏苡仁、泽泻、枳椇子、附子、干姜、吴茱萸、萹澄茄、青皮、白术、党参、炙甘草按照一定的重量配比组成,具有清热散瘀、燥湿温中、温脾止泻、散寒止痛的功效,能够有效治疗慢性结肠炎。

1. 一种用于慢性结肠炎的中药组合物,其特征在于,该中药组合物是由以下重量份的药物组成:三七粉 1-5 份、金银花 15-25 份、黄芩 10-20 份、连翘 13-23 份、藿香 10-20 份、苍术 10-20 份、佩兰 7-17 份、砂仁 3-9 份、肉豆蔻 3-9 份、草果 4-14 份、生薏苡仁 25-35 份、泽泻 10-20 份、枳椇子 10-20 份、附子 10-20 份、干姜 13-23 份、吴茱萸 3-9 份、萆澄茄 1-5 份、青皮 7-17 份、白术 15-25 份、党参 10-20 份、炙甘草 4-14 份。

2. 根据权利要求书 1 所述的用于慢性结肠炎的中药组合物,其特征在于,由以下重量份的药物组成:三七粉 3 份、金银花 20 份、黄芩 15 份、连翘 18 份、藿香 15 份、苍术 15 份、佩兰 12 份、砂仁 6 份、肉豆蔻 6 份、草果 9 份、生薏苡仁 30 份、泽泻 15 份、枳椇子 15 份、附子 15 份、干姜 18 份、吴茱萸 6 份、萆澄茄 3 份、青皮 12 份、白术 20 份、党参 15 份、炙甘草 9 份。

3. 根据权利要求 1 或 2 所述的用于慢性结肠炎的中药制剂,其特征在于:所述中药制剂为灌肠剂。

4. 一种用于慢性结肠炎的中药制剂的制备方法,其特征在于,制备方法如下:步骤一:按照本发明重量配比,将连翘、砂仁、肉豆蔻、草果、生薏苡仁、枳椇子、吴茱萸、萆澄茄、青皮用纱布包好,放于水中浸泡约 45 分钟,过滤,备用;步骤二:按本发明重量配比,称取黄芩、苍术、附子、干姜、白术、党参放入砂锅中,加步骤一中浸泡后剩余冷水,加水超过药面 2-4 厘米,用武火煮沸后,再用文火煎 30 分钟,过滤,得滤液,在剩余药渣中加入 3 厘米左右的水,继续煎煮约 20 分钟,然后加入步骤一种的药包和藿香、佩兰、泽泻、炙甘草继续煎煮 30 分钟,最后加入金银花煎煮 10 分钟,过滤,弃渣,合并两次滤液,备用;步骤三:将步骤二中所得药液静置、取上清液,浓缩,加入三七粉,搅拌,分装灭菌得灌肠药剂。

一种用于慢性结肠炎的中药组合物及其制备方法

技术领域

[0001] 本发明涉及一种中药组合物,具体涉及一种用于慢性结肠炎的中药组合物。本发明还涉及该中药组合物的制备方法。

背景技术

[0002] 慢性结肠炎是一种慢性、反复性、多发性以结肠、乙状结肠和直肠为发病部位。指直肠结肠因各种致病原因导致肠道的炎性水肿,溃疡、出血病变。慢性结肠炎是慢性结肠通常根据致病原因分为特异性,即有明显原因的结肠炎,和非特异性即致病原因不明的结肠炎。在常规治疗用药后症状可得到缓解,症状减轻,停药后容易复发。具体症状为左下腹疼、腹泻、里急后重、时便下沾液、便秘或泄泻交替性发生、时好时坏,体重下降、消瘦、精神不振、缠绵下断、反复发作。

[0003] 慢性结肠炎的病程较长,发病原因多样化,病因很难确定,因此治疗起来比较困难,西医对此病主要运用抗生素进行消炎止痛,抗感染治疗。根据中医整体观念,可以针对不同病因,多角度进行治疗,发挥中医辨证论治的优势,因而疗效显著。由于本病具有虚实夹杂、寒热错杂的特点,调理病人的肝肾脾胃,增强人的体质,以此达到机体抗病毒的目的。

[0004] 目前,在慢性结肠炎的治疗方面,对于病情较轻的,口服一些药物可以进行治疗,但是多数药物属于化学药品,虽然消炎可以解除一时的痛苦,但是治标不治本,易引起反复,而且化学药品均有不同程度的副作用,若病程日久,呈糜烂性或溃疡性的结肠炎则难于治疗,反复无常,给病人带来极大的痛苦,有些必须进行开刀手术,不仅给病人带来痛苦,又给病人家庭带来经济负担。

发明内容

[0005] 本发明的目的是提供一种中药组合物,该中药组合物对于治疗慢性结肠炎具有疗效确切,副作用小,价格低廉,标本兼治,不易复发的特点。

[0006] 本发明的另一目的是提供该用于慢性结肠炎的中药制剂的制备方法。

[0007] 发明人在多年的临床医疗实践中,观察到慢性结肠炎给患者带来的痛苦,根据该病症的发展规律,以及中药的配伍原则,并通过大量的临床验证,反复探索总结出一种治疗慢性结肠炎的中药制剂的新配方,本发明选择三七粉、金银花、黄芩、连翘、藿香、苍术、佩兰、砂仁、肉豆蔻、草果、生薏苡仁、泽泻、枳椇子、附子、干姜、吴茱萸、萆薢、青皮、白术、党参、炙甘草进行组合,将这些药物组合使得各药物功效产生协同作用,使之具有清热散瘀、燥湿温中、温脾止泻、散寒止痛的功效,从而能够有效治疗慢性结肠炎。

[0008] 本发明中药物的作用:

其中:

三七粉:为五加科植物三七 *Panax notoginseng* (Burk.) F. H. Chen 的干燥根风干粉碎所制得的粉。性味:甘、微苦、温。归肝、胃经。功效:散瘀止血,消肿定痛。用于咯血,吐血,衄血,便血,崩漏,外伤出血,胸腹刺痛,跌扑肿痛。《本草求真》中记载:三七,世人仅知

功能止血住痛,殊不知痛因血瘀则疼作,血因敷散则血止。三七气味苦温,能于血分化其血瘀。

[0009] 金银花:为忍冬科植物忍冬 *Lonicera japonica* Thunb.、红腺忍冬 *Lonicera hypoglauca* Miq.、山银花(毛萼忍冬) *Lonicera confusa* DC. 或毛花柱忍冬 *Lonicera dasystyla* Rehd. 的干燥花蕾或带初开的花。性味:甘、寒。归肺、心、胃经。功效:清热解毒,疏风散热。本品性味甘寒,既能清热解毒,又善散痈消肿,为治疗一切阳证痈肿疔疮的要药。古方记载,金银花治一切肿毒,不问已溃未溃,或初起发热,并疔疮便毒。

[0010] 黄芩:为唇形科植物黄芩 *Scutellaria baicalensis* Georgi 的干燥根。性味:苦,寒。归肺、胆、脾、胃、大肠、小肠经。功效:清热燥湿,泻火解毒,止血,安胎,降血压。黄芩的临床应用抗菌比较好,而且不产生抗药性。本品有清热凉血止血之功,用治火热炽盛,迫血妄行的吐血,崩漏,便血等。

[0011] 连翘:为木犀科植物连翘 *Forsythia suspensa* (Thunb.) Vahl 的干燥果实。性味:苦,微寒。归肺、心、小肠经。功效:清热解毒,消肿散结。用于痈疽,瘰疬,乳痈,丹毒,风热感冒,温病初起,温热入营,高热烦渴,神昏发斑,热淋尿闭。连翘常与金银花同用,连翘性凉味苦,轻清上浮,可治上焦诸热,尤能解毒消痈而散结,故为疮家的要药。连翘有广谱抗菌作用,对金黄色葡萄球菌、贺氏痢疾杆菌有很强的抑制作用,对其他致病菌、流感病毒、真菌都有一定抑制作用。有抗炎作用。抗菌作用:连翘浓缩煎剂在体外有抗菌作用,可抑制伤寒杆菌、副伤寒杆菌、大肠杆菌、痢疾杆菌、白喉杆菌及霍乱弧菌、葡萄球菌、链球菌等。

[0012] 藿香:为唇形科植物广藿香 *Cablin Potchouli* Herb 或藿香 *Wrinkled Gianthyssop* Herb 的全草。性味:辛,微温。归肺、脾、胃经。功效:快气,和中,辟秽,祛湿。治感冒暑湿,寒热,头痛,胸脘痞闷,呕吐泄泻,疟疾,痢疾,口臭。

[0013] 苍术:为菊科植物茅苍术 *Atractylodes lancea* (Thunb.) DC. 或北苍术 *Atractylodes chinensis* (DC.) Koidz. 的干燥根茎。性味:辛、苦,温;归脾、胃、肝经;功效:燥湿健脾、祛风散寒、明目;本品苦辛性温,芳烈燥散,可升可降,走而不守,能是湿邪除而恢复脾的运化功能。

[0014] 佩兰:为菊科植物佩兰 *Eupatorium fortunei* Turcz. 的干燥地上部分。性味:辛,平。归脾、胃、肺经。功效:芳香化湿,醒脾开胃,发表解暑。用于湿浊中阻,脘痞呕恶,口中甜腻,口臭,多涎,暑湿表症,头胀胸闷。治疗湿温病症要药,常与藿香、黄芩、苡仁等药配合应用。

[0015] 砂仁:为姜科植物阳春砂 *Amomum villosum* Lour.、绿壳砂 *Amomum villosum* Lour. var. *xanthioides* T. L. Wu et Senjen 或海南砂 *Amomum longiligulare* T. L. Wu 的干燥成熟果实。性味:辛、温。归脾、胃、肾经。功效:化湿开胃,温脾止泻,理气安胎。用于湿浊中阻,脘痞不饥,脾胃虚寒,呕吐泄泻,妊娠恶阻,胎动不安。对于湿阻脾胃引起的食欲不振及呕吐泄泻等症,常配合白朮、陈皮等同用。

[0016] 肉豆蔻:为肉豆蔻科肉豆蔻属植物肉豆蔻 *Myristica fragrans* Houtt. 的干燥种仁。性味辛,温。归脾、胃、大肠经。功效:温中行气,涩肠止泻。用于脾胃虚寒,久泻不止,脘腹胀痛,食少呕吐。《本草衍义补遗》:肉豆蔻,温中补脾,为丸。日华子称其下气,以其脾得补而善运化,气自下也,非若陈皮、香附之馱泄。

[0017] 草果:为姜科植物草果 *Amomum tsao-ko* Crevost et Lemaire 的干燥成熟果实。

性味：辛、温。归脾、胃经。功效：燥湿温中，除痰截疟。用于寒湿内阻，脘腹胀痛，痞满呕吐，疟疾寒热。用于寒湿阻滞脾胃，脘腹胀满，疼痛及呕吐腹泻等症，可与肉豆蔻等同用。

[0018] 生薏苡仁：为禾本科植物薏苡 *Coix lacryma-jobi* L. var. *ma-yuen* (Roman.) Stapf 的干燥成熟种仁。性味：甘、淡、凉。归脾、胃、肺经。功效：健脾渗湿、除痹止痛、清热排脓。用于水肿，脚气，小便不利，湿痹拘挛，脾虚泄泻，肺痈，肠痈；扁平疣。本品多用于湿热内蕴之症。

[0019] 泽泻：为泽泻科植物泽泻 *Alisma orientalis* (Sam.) Juzep. 的干燥块茎。性味：甘、寒。归肾、膀胱经。功效：利小便，清湿热。用于水湿内停之水肿、小便不利。本品入肾、膀胱经，性寒善清下焦湿热，多用于下焦湿热证。

[0020] 枳椇子：本品为鼠李科植物枳椇 *Hovenia dulcis* Thunb. 的干燥成熟种子。性味：味甘；性平。归心；脾；肺经。功效：解酒毒；止渴除烦；止呕；利大小便。主醉酒；烦渴；呕吐；二便不利。《本草拾遗》：止渴除烦，润五脏，利大小便，去膈上热，功用如蜜。

[0021] 附子：为毛茛科植物乌头 *Aconitum carmichaeli* Debx. 的子根的加工品。性味辛、甘，大热；有毒。归心、肾、脾经。功效：回阳救逆，补火助阳，散寒止痛。用于亡阳虚脱，肢冷脉微，阳萎，宫冷，心腹冷痛，虚寒吐泻，阴寒水肿，阳虚外感，寒湿痹痛。本品大热，祛寒力强，故能治寒邪内侵之胃腹疼痛、泄泻，以及寒湿阻络之痹痛。

[0022] 干姜：为姜科植物姜 *Zingiber officinale* Rosc. 的干燥根茎。性味：辛、热。归脾、胃、心、肺经。功效：温中散寒，回阳通脉，燥湿消痰，温肺化饮。用于脘腹冷痛，呕吐泄泻，肢冷脉微，痰饮喘咳。品辛热燥烈、主入脾胃经，长于温暖中焦脾阳而散寒，故凡中焦寒证，无论外寒内侵之实寒证，还是阳气不足之虚寒证，均为要药。

[0023] 吴茱萸：为芸香科植物吴茱萸 *Evodia rutaecarpa* (Juss.) Benth.、石虎 *Evodia rutaecarpa* (Juss.) Benth. var. *officinalis* (Dode) Huang 或疏毛吴茱萸 *Evodia rutaecarpa* (Juss.) Benth. var. *bodinieri* (Dode) Huang 的干燥近成熟果实。性味：辛、苦，热；有小毒。归肝、脾、胃、肾经。功效：散寒止痛，降逆止呕，助阳止泻。用于寒疝腹痛，寒湿脚气，脘腹胀痛，呕吐吞酸，五更泄泻，本品温能补脾益肾，助阳止泻，为治脾肾阳虚、五更泄泻之常用药。常配生姜等。

[0024] 萆澄茄：为樟科植物山鸡椒 *Litsea cubeba* (Lour.) Pers. 的干燥成熟果实。性味：辛，温。归脾、胃、肾、膀胱经。功效：温中散寒，行气止痛。用于胃寒呕逆，脘腹冷痛，寒疝腹痛，寒湿郁滞，小便浑浊。药理学研究表萆澄茄还具有广谱抗菌和杀死真菌的作用。

[0025] 青皮：为芸香科植物橘 *Citrus reticulata* Blanco 及其栽培变种的干燥幼果或未成熟果实的果皮。性味苦、辛、温。入肝、胆、胃经。功效：疏肝破气，消积化滞。用于胸胁脘胀痛，乳痈、疝痛，食积气滞。

[0026] 白术：为菊科植物白术 *Atractylodes macrocephala* Koidz. 的干燥根茎。性味：苦、甘，温。归脾、胃经。功效：健脾益气，燥湿利水，止汗，安胎，白术既能补气健脾，又能燥湿利水，为健脾燥湿的要药。

[0027] 党参：为桔梗科植物党参 *Codonopsis pilosula* (Franch.) Nannf.、素花党参 *Codonopsis pilosula* Nannf. var. *modesta* (Nannf.) L. T. Shen 或川党参 *Codonopsis tangshen* Oliv. 的干燥根。性味：甘、平。归脾、肺经。功效：补益脾肺，养血生津。用于脾肺虚弱、气短、心悸、食少便溏、虚喘咳嗽，内热消渴等。《本草从新》记载：补中益气、和脾胃、

除烦渴。中气微弱,用以调补,甚为平妥。

[0028] 炙甘草:甘草为豆科植物甘草 *Glycyrrhiza uralensis* Fisch., 胀果甘草 *Glycyrrhiza Inflata* Bat. 或光果甘草 *Glycyrrhiza Glabra* L. 的干燥根及根茎。炙甘草为甘草的蜜烘制加工品。性味甘,平。归心、肺、脾、胃经。功效:补脾和胃,益气复脉。《日华子本草》:安魂定魄。补五劳七伤,一切虚损、惊悸、烦闷、健忘。通九窍,利百脉,益精养气,壮筋骨,解冷热。

[0029] 本发明的方解是:方中三七粉散瘀止血、消肿定痛,金银花、连翘清热解毒、抗菌消炎,黄芪清热燥湿,藿香祛湿和中,以上五味共为君药,首先三七粉散瘀止痛,痛因血瘀则疼作,血因敷散则血止,从基本症状上缓解患者因肠腔内淤血而引起的疼痛,金银花和连翘合用不仅清热解毒,而且两者合用增加的抗菌消炎的效果,扩大了抗菌的范围,黄芩和藿香清热燥湿,从整体上消除患者体内的实热症状,缓解患者的病痛。苍术燥湿健脾,佩兰芳香化湿、醒脾开胃,砂仁化湿开胃、温脾止泻,肉豆蔻、草果燥湿温中、涩肠止泻,生薏苡仁健脾渗湿,以上六味共为臣药,在协助君药清热燥湿的同时,臣药还具有温脾止泻的作用,从临床症状上控制患者腹泻的情况,另外以上几味醒脾开胃,从整体上调理患者的身体,增加患者的食欲,以及营养物质的吸收,促进患者身体的恢复。泽泻、枳椇子清热利便,附子补火助阳、散寒止痛,干姜回阳通脉、燥湿消痰,吴茱萸、萆澄茄助阳止泻、温中散寒,青皮疏肝理气,白术健脾益气,党参补益脾肺、养血生津,以上几味共为佐药,多有补火助阳、散寒止痛的作用,调理患者体内失衡,补肾益精,加强患者身体之根本的恢复,缓和药物作用,减少对患者身体的伤害,炙甘草补脾和胃、调和诸药、引药归经,为使药。此方诸药合用,君臣协力,佐使共辅,具有清热散瘀、燥湿温中、温脾止泻、散寒止痛的功效,能够有效治疗慢性结肠炎。

[0030] 本发明药物原料用量是经发明人进行大量摸索总结得出的,各原料用量为在所述重量份范围都具有较好的疗效:三七粉 1-5 份、金银花 15-25 份、黄芩 10-20 份、连翘 13-23 份、藿香 10-20 份、苍术 10-20 份、佩兰 7-17 份、砂仁 3-9 份、肉豆蔻 3-9 份、草果 4-14 份、生薏苡仁 25-35 份、泽泻 10-20 份、枳椇子 10-20 份、附子 10-20 份、干姜 13-23 份、吴茱萸 3-9 份、萆澄茄 1-5 份、青皮 7-17 份、白术 15-25 份、党参 10-20 份、炙甘草 4-14 份。

[0031] 其中优选为:三七粉 3 份、金银花 20 份、黄芩 15 份、连翘 18 份、藿香 15 份、苍术 15 份、佩兰 12 份、砂仁 6 份、肉豆蔻 6 份、草果 9 份、生薏苡仁 30 份、泽泻 15 份、枳椇子 15 份、附子 15 份、干姜 18 份、吴茱萸 6 份、萆澄茄 3 份、青皮 12 份、白术 20 份、党参 15 份、炙甘草 9 份。

[0032] 本发明药物采用中药灌肠法,是将药汁通过灌肠直达病所,中药灌肠液由直肠静脉丛吸收,故中药保留灌肠能起到局部用药,直达病灶的功效,在病变处能有较高的浓度,从而起到理想的治疗效果,同时避免有效成分受胃酸、消化液、和肝脏的破坏而降低药效,而且用药量少,浓度高,起效快,疗效好,毒副作用少,弥补了口服给药的不足,有利于保持药物性能和疗效的提高,避免或减轻了药物对肝肾的损害。

[0033] 本发明中药制剂,其制备方法如下:

步骤一:按照本发明重量配比,将连翘、砂仁、肉豆蔻、草果、生薏苡仁、枳椇子、吴茱萸、萆澄茄、青皮用纱布包好,放于水中浸泡约 45 分钟,过滤,备用;

步骤二:按本发明重量配比,称取黄芩、苍术、附子、干姜、白术、党参放入砂锅中,加步

骤一中浸泡后剩余冷水,加水超过药面 2-4 厘米,用武火煎沸后,再用文火煎 30 分钟,过滤,得滤液,在剩余药渣中加入 3 厘米左右的水,继续煎煮约 20 分钟,然后加入步骤一种的药包和藿香、佩兰、泽泻、炙甘草继续煎煮 30 分钟,最后加入金银花煎煮 10 分钟,过滤,弃渣,合并两次滤液,备用;

步骤三:将步骤二中所得药液静置、取上清液,浓缩,加入三七粉,搅拌,分装灭菌得灌肠药剂。

[0034] 本发明的使用方法:按照本发明配方所得到的灌肠合剂,分两次从肛门灌入,每次 100ml,取臀部抬高体位,使药液全部进入不排除,7 天为一个疗程。

[0035] 本发明药物具有清热散瘀、燥湿温中、温脾止泻、散寒止痛等功效,且疗效确切,副作用小,价格低廉,标本兼治,不易复发,据对临床 160 例患者观察统计,使用本发明药物一个疗程总有效率 85%,两个疗程总有效率 97.5%。

具体实施方式

[0036] 实施例一、三七粉 1 份、金银花 15 份、黄芩 10 份、连翘 13 份、藿香 10 份、苍术 10 份、佩兰 7 份、砂仁 3 份、肉豆蔻 3 份、草果 4 份、生薏苡仁 25 份、泽泻 10 份、枳椇子 10 份、附子 10 份、干姜 13 份、吴茱萸 3 份、萆澄茄 1 份、青皮 7 份、白术 15 份、党参 10 份、炙甘草 4 份。

[0037] 实施例二、三七粉 3 份、金银花 20 份、黄芩 15 份、连翘 18 份、藿香 15 份、苍术 15 份、佩兰 12 份、砂仁 6 份、肉豆蔻 6 份、草果 9 份、生薏苡仁 30 份、泽泻 15 份、枳椇子 15 份、附子 15 份、干姜 18 份、吴茱萸 6 份、萆澄茄 3 份、青皮 12 份、白术 20 份、党参 15 份、炙甘草 9 份。

[0038] 实施例三、三七粉 5 份、金银花 25 份、黄芩 20 份、连翘 23 份、藿香 20 份、苍术 20 份、佩兰 17 份、砂仁 9 份、肉豆蔻 9 份、草果 14 份、生薏苡仁 35 份、泽泻 20 份、枳椇子 20 份、附子 20 份、干姜 23 份、吴茱萸 9 份、萆澄茄 5 份、青皮 17 份、白术 25 份、党参 20 份、炙甘草 14 份。

[0039] 下面是患者使用本发明药物的临床统计资料:

一、一般资料

收治患者共 320 例,将患者随机分为观察组和对照组,其中男性 170 例,女性 150 例,男女比例 1.13 : 1,最大年龄 76 岁,最小年龄 16 岁,平均年龄 40 岁,病程几天年到几个月不等,平均病程 3 个月。两组患者年龄、性别、病程等各项基本资料基本相同,差异无统计学意义 ($P > 0.05$)。

[0040] 二、诊断标准

- 1、反复腹痛、腹泻稀便(或便秘),大便带粘液,甚至出现脓、血的症状;
- 2、下腹部局限性轻压痛,躲在左下腹或左腹,肠鸣音活跃,可伴有体温轻度增高,消瘦、面色少华、萎黄等营养不良的体征;
- 3、大便常规见红、白细胞以及少量的脓细胞,未发现痢疾杆菌及阿米巴原虫,大便培养找到致病菌;
- 4、肠镜检查见肠粘膜有多发性糜烂或浅表溃疡,伴有弥漫性充血、水肿、或黏膜粗糙、黏膜血管模糊、纤维组织增生、管腔狭窄等慢性炎症的症状。

[0041] 三、治疗方法

1、观察组按照本发明药物实施例二，称取原料药(一日剂量)，将中药浓煎成 200 毫升，采用灌肠法。每天 2 次，7 日为一个疗程。

[0042] 2、对照组按照 CN 102631512 A 中治疗慢性结肠炎的中药汤剂，每日一剂，每天两次，治疗观察期为 7 天。

[0043] 四、注意事项：

1、灌肠前让病人排空大便。

[0044] 2、药液温度应保持在 39℃～41℃，过低可使肠蠕动加强，腹痛加剧，过高则引起肠粘膜烫伤或肠管扩张，产生强烈便意，致使药液在肠道内停留时间短、吸收少、效果差，39℃～41℃这个温度持续作用于病灶有一定的按摩和局部加温的作用，可扩张血管，增加血流量，起到理疗作用改善微循环，抑制结缔组织增生，促进炎症吸收，亦能疏通腺管，消散分泌物，有利于炎症的消退。

[0045] 3、为使药液能在肠道内尽量多保留一段时间，药液一次不应超过 200ml，可在晚间睡前灌肠，灌肠后不再下床活动，以提高疗效。

[0046] 五、疗效评定标准

1、治愈：临床症状、体征消失，腹痛、泄泻症状消失，大便成形，纤维结肠镜复查正常，肠黏膜病变恢复正常；

2、有效：临床症状明显减轻，体征基本消失，大便次数减少，并且基本成形，纤维结肠镜复查好转，肠黏膜病变明显改；

3、无效：治疗前后临床症状和体征无改善，纤维结肠镜复查无好转。

[0047] 六、观察组结果统计

治疗 时间	治愈		好转		未愈	
	例数	治愈率%	例数	好转率%	例数	未愈率%
一个疗程	84	52.5	52	32.5	24	15
两个疗程	120	75	36	22.5	4	2.5

对照组结果统计

治疗 时间	治愈		好转		未愈	
	例数	治愈率%	例数	好转率%	例数	未愈率%
一个疗程	56	35	56	35	48	30
一个疗程	60	37.5	68	42.5	32	20

其中：总有效率 = 治愈率 + 好转率

使用该中药制剂两个疗程两组患者的疗效对比情况

组别	例数	治愈[n(%)]	好转[n(%)]	未愈[n(%)]	总有效率(%)
观察组	160	120 (75)	36 (22.5)	4 (2.5)	97.5
对照组	160	60 (37.5)	68 (42.5)	32 (20)	80.0

通过对比两组患者的治疗总有效率可以发现观察组明显高于对照组，由此说明，本发明中药在治疗慢性结肠炎具有良好的临床效果，能有效提高治疗的治愈率，减轻患者的痛苦，值得在临床应用上推广。

[0048] 典型病例及疗效：

病例一、吴某，女，25岁，腹部隐痛大约有一个月的时间，吃了几次药没有效果，并且有便秘的现象，面色蜡黄，没有光泽，吴某去医院进行检查，粪便检查中带有粘液和脓血，肠镜检查有溃疡生成，医院诊断为慢性结肠炎，服用医院所开药物之后，症状消失，但是一周之后复发，后使用本发明实施例二中所制制剂，以及所选的制备方法，进行灌肠治疗，2天后患者腹痛、腹胀消失，便秘现象得到缓解，继续使用一个疗程，患者临床症状完全消失，排便正常，面色逐渐恢复红润，营养状况也得到提成，去医院镜检肠粘膜恢复正常，痊愈，随访半年，未复发。

[0049] 病例二、陈某，男，49岁，经常腹泻、腹痛、泻后痛减，严重期间每日大便次数约7-10次，尤其是在早上起来的时候，伴有少量粘液，去医院检查，诊断为慢性结肠炎，患者身体一直不是特别好，希望采用中医治疗，后来我处就诊，采用本发明实施例二中所制制剂，以及所选的制备方法，使用1个疗程后，患者大便成形，腹泻次数减少，疼痛等症状明显好转，为巩固疗效，继续使用1个疗程，腹痛、腹泻症状完全好转，去医院复查，肠粘膜恢复，随访半年未复发，痊愈。

[0050] 病例三、刘某、男、39岁，近一年多时间里每天起床后急去厕所大便1-2次，滞而不爽，左下腹部长隐隐作痛，并且最近食量没变，但是整个人却消瘦，面色难看，去医院检查，诊断为慢性结肠炎，采用各种药物，效果甚微，并且容易复发，后来我处就诊，采用本发明实施例二中所制制剂，以及所选的制备方法，使用1个疗程后，患者大便成形，腹泻次数减少，疼痛等症状明显好转，继续使用1个疗程，腹痛、腹泻症状完全好转，面色的到改善，身体状况也有所恢复，去医院复查，肠粘膜恢复，随访半年未复发，痊愈。